THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES

Digitized by Google

Digitized by Google

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES

ed by Google

Digitized by Google

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Begründet

von

Dr. Karl Ruß.

Mit zahlreichen Tafeln und Textbildern von Emil Schmidt, O. Kleinſchmidt
und Karl Neunzig.

Achtundzwanzigſter Jahrgang.

Magdeburg, 1899.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung.
(M. Kretſchmann.)

Digitized by Google

MUSEUMS
QL
671
.G29
v.28

Digitized by Google

Inhalts-Verzeichniß.

Aasgeier 170.
Accentor alpinus 69. 112.
Acrocephalus palustris 228.
Aegintha melpoda 32; — phoenicotis 32; — Wieneri 31.
Alariofink ſ. Fink.
Alexanderſittich ſ. Sittich.
Alpenflüevogel, Alpenbraunelle, ſ. Braunelle.
Alpendohle 69.
Alpenmauerläufer ſ. Mauerläufer. Alpenſchneehuhn ſ. Schneehuhn.
Alpenſumpfmeiſe ſ. Meiſe.
Amandine, Argus- 7. 9. 41. 268. 276; —, Paradis- 7. 9. 41. 268. 276; —, Rothkopf- 357.
Amazone 175. 271; —, Doppelgelbkopf- 175; —, mit rothem Flügelbug 408; —, gelbköpfige, kleine 24; —, Gelbnacken- 185. 192; —, Prêtre's 20. Amazonenpapagei ſ. Papagei.
Ammer 86; —, Gold- 158. 380; —, Grau- 381; —, Schnee- 151; —, ſiebenſtreifiger 64. Ammern, Die deutſchen 338; —, gekäfigt 354.
Ampelis cedrorum 177. 185; —, garrula 177. 185; —, garulus 150.
Amſel 47. 55. 65. 77. 158. 188; —, Alpen- 307; —, gelbfüßige 20; —, Ring- 69; —, Waſſer- 159. 176. 381; —, weiße 191.
An die Leſer 8. 208. 216. 288.
Anfragen und Auskunft 8. 15. 32. 40. 48. 55. 64. 71. 80. 88. 96. 104. 111. 120. 128. 136. 144. 152. 160. 168. 176. 184. 191. 200. 208. 215. 224. 239. 247. 256. 264. 272. 287. 296. 303. 312. 320. 328. 336. 343. 351. 359. 368. 375. 383. 392. 399. 407.
Anodorhynchus hyacinthinus 196.
Anthus aquaticus 69. 295.
Arara, Azara's 264; —, dunkelrother 271; —, hellrother 264. 271; —, hyazinthblauer 196. 271; —, Illigers 196; —, kleiner blauer 271; —, Spix' 196; —, Zwerg- 271.
Araſſari, Schrift- 216; —, ſchwarzkehliger 360.
Arauſamandine ſ. Amandine.
Artamus sordidus 128.
Aſtrild, Wiener's 31; —, violettbäckiger 357.
Auf der Waldwieſe 26.
Aufruf 120. 401.
Aus dem zoologiſchen Garten von Berlin 20. 361. Aus den Vereinen ſ. Verein. Aus meiner Vogelſtube ſ. Vogelſtube.

Bachſtelze 149. 240. 354; — gelbe 106. 136. 303; — graue 92; —, weiße 136. 158. 256. 407; —, Gebirgs- 381.
Baumelſter ſ. Elſter; —, kauz 6; —, läufer 18. 81. 380; — pieper ſ. Pieper.
Bein, künſtliches für Vögel 183. 215.
Beobachtungen auf einer Gebirgswanderung in Galizien, der Bukowina, Siebenbürgen und Rumänien 22. 49. 57. 65. 77; —, aus der freilebenden Vogelwelt. Aus dem Sauerlande 149. 158. 380; —, Ornithologiſche, in Süddeutſchland und Tirol 404.
Bergfink ſ. Fink. Berghänfling ſ. Hänfling.
Berichtigung 144. 168. 200. 264. 272. 288. 376.
Betrachtungen über Papageien-Krankheiten 377.
Birkhuhn 92.
Blattvogel, goldſtirniger 169. 198.
Blaudroſſel ſ. Droſſel. Blaukehlchen 23. 189. Blauracke 12. 328.
Blutbauchſittich ſ. Sittich. Blutſchnabelweber ſ. Weber.
Bolborhynchus lineolatus 304.
Brachpieper ſ. Pieper.
Brandente ſ. Ente.
Braundroſſel ſ. Droſſel.
Braunelle 354; —, Alpen- 65. 69. 77. 112. 295. 354.
Breitſchwanzlori ſ. Lori.
Briefliche Mittheilungen 15. 31. 39. 47. 55. 71. 79. 86. 104. 112. 127. 135. 143. 160. 168. 175. 183. 191. 199. 215. 222. 239. 248. 256. 263. 271. 287. 295. 303. 311. 319. 343. 350. 360. 366. 375. 384. 407.
Briefwechſel 48. 160. 192. 208. 216. 232. 240. 256. 304. 336. 368. 408.
Brillen-Hordenſtärling ſ. Star.
Brotogerys tirica 328.
Brut des Blutſchnabelweber 121.
Buchfink ſ. Fink.
Bücher- und Schriftenſchau: Franz Anzinger, Die unterſcheidenden Kennzeichen der Vögel Mitteleuropas in analytiſchen Beſtimmungs-Tabellen 160; Cory, The Birds of eastern North America 400; Der Zoologiſche Garten 360; Gätke, Die Vogelwarte Helgoland 343; Dr. Heck, Lebende Bilder aus dem Reich der Thiere 344. 51; Kalender des Deutſchen Thierſchutzvereins 352; Adolf Nehrkorn. Katalog der Eierſammlung 152; von Tſchuſi zu Schmidhoffen, Ornithologiſches Jahrbuch 344. 400.
Bülbül, grauſchwarzer Himalaya-, 320.
Buntſpecht ſ. Specht.

Cacatua sanguinea 196.
Callocephalon galeatum 196.
Caprimulgus europaeus 304.
Cathartes aura 170.
Cedernvogel 185.
Certhia familiaris 380; —, muraria 112.
Chinaſittich ſ. Sittich.
Chlorophonia callophrys 314; — occipitalis 314.
Chrysotis auripalliatus 185; — inornata 43.
Cinclus aquaticus 8. 159. 381.
Cissa sinensis 40.
Coccothraustes aurantiacus 240; — chrysopeplus 240; — coeruleus 225; — melanurus 336; — Morelleti 393; — tibialis 233. 240.
Colaptes auratus 184.
Coloburis bengalensis 20.
Columba oenas 240.
Conurus Finschi 43; — Petzii 194; — rubritorquis 43.
Copsychus saularis 198.
Coracias garrula 328.
Corvus cornix 381.
Coryllis 196.
Cypselus apus 176.

Dayaldroſſel ſ. Droſſel.
Diſtelfink ſ. Stiglitz.
Dohle 6. 150. 159.

Digitized by Google

Dompfaff 48. 56. 77. 149. 156. 159; Kurze Geſchichten zweier — 54.
Doppelgelbkopf 175.
Dorngrasmücke ſ. Grasmücke.
Drei für die Liebhaberei neue Papageienarten 43.
Droſſel 188; —, Blau- 326. 332; —, Braun-, kaliforniſche 38. 45; —, Bunt- 45; —, Dayal- 169. 198; —, Grau- 150; —, Gray's 16; —, Oliven- 38; —, Ring- 65. 77. 305; —, Ring-, Nordiſche 307; —, roſtrückige 38. 45; —, rothbäuchige 16. 20; —, Schwarz- 86; Vordringen der Schwarz- 312. 350; —, Sing- 66. 77. 92. 143. 151; —, Spott- 37. 45; —, Wachholder- 6; —, Wander-, weſtliche 45; —, weißkehlige 16; —, Zwerg- 38; Haltung, Wartung und Pflege, Fütterung auf billigſte und doch genügende Art, ſowie die Eingewöhnung der Wildfänge — artiger Vögel 94. 98. 109.
Dull-Lerche ſ. Lerche.

Edelfink ſ. Fink. Edelpapagei ſ. Papagei.
Eichelheher 39. 149.
Einbürgerung fremdländiſcher Vögel in unſeren Fluren 113.
Einführung fremdländiſcher Vögel 209.
Eingewöhnung friſch eingeführter Graupapageien 53.
Eisvogel 136. 150.
Elſter 79; —, Baum-, rothbäuchige 40.
Elſterchen 128.
Emberiza miliaria 381; — tahapisi 64.
Ente, Brand- 395; —, Braut- 395; —, Knäck- 389; —, Krick- 388; —, Löffel- 389; —, Mandarinen- 395; —, —, Pfeif- 389; —, Schnatter- 389; —, Spieß- 395; —, Stock- 395; —, Tauch- 395.
Ergänzungen zu der Lehre über die Ernährung der Papageien ſ. Ernährung.
Ernährung, Ueber die beſte, — der Papageien, bzl. aller weichlichen Exoten 298. 308. 337. 345.
Eucalyptus-Oel im Papageienzimmer 287.
Eule, Ohr- 11; —, Schleier- 7.
Euphemia violacea 104.

Falco tinnunculus 92.
Falk, Baum- 11; —, Thurm- 12. 67. 92.
Fangvorrichtung für kleinere vierfüßige Raubthiere 222.
Feldlerche ſ. Lerche. Feldſperling ſ. Sperling.
Fink 65. 77; —, Alario- 114; —, Berg- 159. 223. 381; —, Buch- oder Edel- 10. 34. 77. 86. 353. 380; —, Flachs- 10; —, Grauedel- 85; —, Grün-, algeriſcher 21; —, Grün-, chineſiſcher 21; —, Jakarini- 323; —, Kuba- 32; —, Schmetterlings- 32; —, Schnee- oder Alpen- 2. 13. 91. 288; —, Polar-, grauköpfiger 20; —, Zebra- 128.
Finken, Fremdländiſche 20. 28. 63. 75. 85. 114. 129. 145.
Fiſchreiher 388.
Fitislaubvogel ſ. Laubvogel.
Fledermauspapagei 196.
Fliegenſchnäpper, grauer 123. 159. 200. 380; —, Zwerg- 386; — ſeine Behandlung als Stubenvogel 355.
Flugkäfig oder Einzelhaft? 353.
Flußregenpfeifer ſ. Regenpfeifer.
Fringilla alario 114; — angolensis 85; — aurantiiventris 21; — barbata 114; — brevirostris 76; — butyracea 114; — canaria 76; — canicollis 86; — canora 32; — carduelis 381; — citrinella 92; — coelebs 34; — columbiana 63; — cucullata 28; — flavivertex 114; — jacarina 323; — juncorum 168; — Lavrencei 30; — lepidoptera 153; — marginalis 63; — montana 256; — montifringilla 159. 381; — musica 85. 238. 243; — nivalis 2. 13. 288; — pinus 69; — psaltria 29; — pusilla 168; — Selbyi 86; — sinica 21; — spinoides 28; — sulfurata 114; — tristis 28; — uropygialis 63.
Frühlingsbotſchaft des Stars 58.
Frühlingstag im märkiſchen Hochwald 126.
Futter für inſektenfreſſende Singvögel ſ. Wachsmotte.
Futter, Welches iſt das beſte — für die in den Wintermonaten mauſernden Vögel? 197.

Galleria cerella ſ. Wachsmotte.
Gans, Nonnen- 396.
Gänſejäger 6.
Gartenlaubvogel ſ. Laubvogel. Gartenrothſchwanz ſ. Rothſchwanz.
Gebirgsſtelze 106. 150.
Gefangene Meiſen ſ. Meiſen.
Gelbſpötter 112. 137. 183; — und ſeine Behandlung als Stubenvogel 1. 130.
Gelbnackenamazone ſ. Amazone.
Geſangsgabe des Hausſperlings 292.
Gimpel 48. 54. 92; —, Caſſins Purpur- 130; —, Haken- 146; —, Haus- 130; —, Karmin- 145; —, Purpur- 129; —, Roſen- 129.
Girlitz 135. 176. 354; —, Bart- 114; —, braungeſtreifter 114; —, gelbrückiger 114; —, gelbſtirniger 114; —, Grau-, gelbbürzeliger 85; —, graukehliger 86; —, Grau-weißbürzeliger 238. 243; —, Hagenbecks gelbköpfiger 114; —, kurzſchnäbliger 76; —, ſchwefelgelber 114; —, Totta- 76; —, weißkehliger 86.
Goldammer ſ. Ammer. Goldhähnchen 67. 92. 380; —, feuerköpfiges 387. Goldſpecht ſ. Specht.
Gouldsamandine, rothköpfige 241. 249; —, ſchwarzköpfige 241. 249.
Grasmücke 354; —, Dorn- 138. 208. 402; —, Garten- 77. 160. 163. 184. 401; —, Mönchs- 159; —, Orpheus- 412; —, ſchwarzköpfige 224. 402; —, Sänger-, als Stubengenoſſe 210. 220; —, Zaun- 159.
Grauammer ſ. Ammer. Grauedelfink ſ. Fink. Graugirlitz ſ. Girlitz. Graupapagei ſ. Papagei.
Großvögel als Stubengenoſſen 100.
Grünling 21. Grünſpecht ſ. Specht.
Gürtelgrasfink, ſpitzſchwänziger 289; Züchtung des — ſ. Miſchling.

Haidelerche ſ. Lerche.
Hakengimpel ſ. Gimpel.
Halcyon giganteus 344.
Halsband-Edelſittich ſ. Sittich.
Hänfling 11. 188; —, Roth- 354.
Harporhynchus redivivus 38.
Hartlaubszeiſig ſ. Zeiſig.
Haſelhuhn 92.
Haubenlerche ſ. Lerche.
Hausgimpel ſ. Gimpel. Hausrothſchwanz ſ. Rothſchwanz. Hausſchwalbe ſ. Schwalbe.
Heckenbraunelle 115.
Helenafaſänchen 215.
Hesperocichla naevia 45.
Himalaya-Stieglitz ſ. Stieglitz.
Hirundo rustica 159.
Hohltaube ſ. Taube.
Hüttenſänger 104. 215.
Hypsipetes psaroïdes 320.

Icterus baltimore 267; — cucullatus 282; — Giraudi 275; — Graysoni 281; — gularis 281; — maculatus 274; — mesomelas 282; — pectoralis 275; — prosthemelas 275; — pustulatus 282; — Sclateri 276; — spurius 266; — Wagleri 266.
Inkakakadu ſ. Kakadu.
Inſeparables 196.
Jägerlieſt 344.

Käfig, Beſchreibung eines Beruhigungs- und Schlaf-, — für die des Nachts tobenden Weichfuttervögel 222; — für Weichfreſſer 167. 174. 181.
Kakadu 271; —, blutbefleckter 196; —, Gang-gang- 196; Goffins- 96; —, Helm- 196. 407; —, Inka- 144; —, Nymphen- 272.
Kampfläufer 388.
Kanarienvogel 188; —, Bewertung der — auf den Ausſtellungen 4. 14. 25. 46. 50. 60; —, engliſche 89; —, Kap- 86; —, Norwich-, gehäubter 89; —, wilder 76; —, Yorkſhire 104; Zucht und Geſang ſ. Plaudereien.
Keilſchwanzſittich, Finſch- ſ. Sittich.
Karmingimpel ſ. Gimpel.
Kernbeißer 353; —, gelber 233; —, graugelber 240; —, hellblauer 225; —, hochgelber 240; — röthlichgelber 240; —, ſchwarzſchwänziger 336.
Kibitz 159.
Kitta, blaugrüne 40.
Kleiber 116.

Digitized by Google

Klippenhahn 362.
Körnerfreſſer, Ueber den Fang und die Eingewöhnung junger — 317.
Kohlmeiſe ſ. Meiſe.
Krähe 143. 159; —, Nebel- 6. 381; —, Raben- 68. 150; —, Sat- 6; —, Schnee- 90; —, Stein- 90.
Krankheiten, Uebertragbarkeit anſteckender — von Papageien auf Menſchen 17. 127. 141. 146.
Kreuzſchnäbel 77.
Kubafink ſ. Fink.
Kukuk 149. 159. 203. 215. 370. 396.

Lagopus albus 91.
Lampronessa sponsa 395; — galericulata 395.
Lanius collurio 245. 380; — excubitor 245; — minor 245; — rufus 284; — senator 245.
Laubvogel 66. 77; —, Fitis- 23. 143. 151; —, Garten- 23. 77. 78. 112. 260; —, Weiden- 122.
Leiden und Freuden des Vogelliebhabers 349. 357.
Leiothrix luteus 349.
Lerche 149. 158. 354. 380; —, Dull- 206; —, Feld- 205; —, Haide- 32. 77. 206; —, Haltung und Pflege in Gefangenſchaft 205; —, Hauben- 23. 207; —, Kalander- 397.
Leucosticte tephrocotis 20.
Liebe und Ehe im Leben der Vögel 118. 124. 133.
Linaria rufescens 223.
Löffelente ſ. Ente. Löffelreiher ſ. Reiher.
Lori, Breitſchwanz- 248; —, ſchwarzkäppiger- 248; —, ſchwarzköpfiger 271; —, von den blauen Bergen 248.
Loxia pyrrhula 92.

Magellanzeiſig ſ. Zeiſig.
Mancherlei 8. 200. 240. 312. 320. 343. 366.
Mauerläufer, Alpen- 91. 112. Mauerſchwalbe ſ. Schwalbe. Mauerſegler 176.
Meine Roſenpapageien 362.
Meiſe, Alpenſumpf- 92; —, Anſichten über das Käfigen unſerer — 110; —, Blau- 68. 158; — in Gefangenſchaft 291; —, Hauben- 68. 92; —, Kohl- 67. 136. 158; —, Laſur- 406; —, Liebhaberei in Innsbruck und Umgebung 140; —, Schwanz- 68. 158; —, Specht- 158. 380; Sumpf- 68. 116. 136; —, Tannen- 68. 92. 140. 158; —, auſtraliſche Tannen- 357.
Mergus merganser 6.
Merula migratoria propinqua 45.
Mimus polyglottus 37.
Miſchling von Ceresaſtrild-Männchen und Zebrafink-Weibchen 320. 369; —, von beiden Gouldsamandinen 385; —, von Gürtelgrasfink und weißem Mövchen 370. 404.
Mittheilungen aus Centralamerika 170. 177. 185. 193. 201. 209. 218. 225. 233. 250. 257. 265. 274. 281. 314. 323. 393.
Mönchsgrasmücke ſ. Grasmücke. Mönchsſittich ſ. Sittich.
Monticola cyanus 326. 332; — saxatilis 347.
Montifringilla nivalis 91.
Morellet-Pfäffchen ſ. Pfäffchen.
Morgenammerſperling ſ. Sperling.
Morgen, Ein, in der Vogelſtube 409.
Motacilla alba 158. 381; flava 88. 158; — sulphurea 92. 381.
Motmot 48.
Mövchen 239; — japaniſches ſ. 28.
Möve, braunköpfige Lach- 388; —, Silber- 389; —, Sturm- 388.
Mozambikzeiſig ſ. Zeiſig.
Müllerchen 163.
Muscicapa grisola 159. 200. 380; — parva 286. 355.
Muskatfink 239.

Nachtigal 161. 178. 191. 396; —, Waſſer- 189.
Nachtreiher ſ. Reiher.
Nährſalz ſ. Ernährung.
Nebelkrähe ſ. Krähe.
Niſtkaſten, Zweckmäßige — für Baumläufer 81.
Nucifraga caryocatactes 92.
Numenius arcuatus 389.
Nycticorax griseus 388.
Nymphenkakadu ſ. Kakadu.

Olivendroſſel ſ. Droſſel.
Orangebäckchen 32.
Organiſt 104. 122; —, dickſchnäbliger 20.
Ornithologiſcher Ausflug in den Glarner Alpen (Schweiz) 68. 90.
Ornithologiſches vom Danziger Stadtgraben 230.

Palaeornis derbyanus 361.
Palmtäubchen 168.
Papagei, Amazonen-, weißſtirniger 250; —, Edel- 271; —, —, Müllers- 368; —, —, Neuguinea- 376; —, Ernährung ſ. Ernährung; —, Grau- 154. 165. 199. 215. 256; —, —, Zur Eingewöhnung friſch eingeführter — 53; —, Krankheiten 377; —, Langflügel- 196; —, —, blauſchwarzer 196; —, —, weißköpfiger 195; —, Meyer's 196; —, Roſen- 362. 366; Schwarz- 271.
Papageichen, blauſcheiteliges 248.
Paradisamandine ſ. Amandine.
Paradisea apoda 196. 362; — papuana 362.
Paradisvogel, ſmaragdgrüner 196.
Parus ater 92. 158; — borealis 92; — caudatus 158; — coeruleus 158; — cristatus 92; — major 158; — palustris 136.
Passer domesticus 292; — pileatus 218.
Petz, Keilſchwanzſittich ſ. Sittich.
Pfäffchen, Morellet- 393.
Pflege und Behandlung von Papageien 73.
Philomachus pugnax 388.
Phyllornis aurifrons 169.
Pica rufa 40.
Picus major 381; — martius 92; — viridis 381.
Pieper 354; —, Baum- 65. 77. 86; —, Brach- 12.
Pionus chalcopterus 196; — senilis 195.
Pitta bengalensis 20.
Pitta, bengaliſche 20.
Pitylia afra 31.
Platalea leucerodia 395.
Plattſchweifſittich ſ. Sittich.
Platycercus Brownii 361.
Plauderei von meiner Nordlandreiſe 142. 151; —, über Kanarienzucht und Kanariengeſang 298. 310. 333. 341. 358. 372. 381.
Poeocephalus meyeri 196.
Polarfink ſ. Fink.
Polytelis alexandrae 195.
Porphyrio smaragdonotus 395.
Prachtfinken, Bedürfen die — zur guten Lebenserhaltung unter anderem der Frucht bzl. Beren 105.
Pratincola rubicola 217.
Prinzess of Wales Parrakeet 195.
Prionites brasiliensis 48.
Psittacus aestivus 408; — albifrons 250; — atricapillus 248; — auripalliatus 185. 192; — chrysopterygius 120; — cyanopygus 279; — galgulus 248; — guatemalae 192; — haematogaster 352; — haematonotus 392; — — Leadbeateri 144; — Linnéi 376; — Mülleri 368; — multicolor 279; — Novae-Hollandiae 272; — Novae-Zeelandiae 279; — ochropterus 24; — Petzi 193; — Prêtrei 20; — pulcherrimus 279. 384; — semitorquatus 279; — Swainsoni 248; — — torquatus 232; — tovi 201.
Pteroglossus atricollis 360; — inscriptus 216.
Purpurgimpel ſ. Gimpel.
Pyrrhocorax alpinus 69.
Pyrrhula Cassini 130; — enucleator 146; — erythrina 145; — europaea 56; — frontalis 130; — purpurea 129.

Rabe 6. Rabenkrähe ſ. Krähe.
Raubwürger ſ. Würger.
Rauchſchwalbe ſ. Schwalbe.
Regenpfeifer, Fluß- 12.
Regulus cristatus 380; — ignicapillus 381.
Reiher, Fiſch- 388; —, Kuh- 395; —, Löffel- 395; —, Nacht- 388; —, Seiden- 152.
Reiſen und Forſchungen 135.
Rieſenfiſcher ſ. Jägerlieſt.
Rieſenvoliere im Düſſeldorfer zoologiſchen Garten 387. 395.
Ringamſel ſ. Amſel. Ringdroſſel ſ. Droſſel.
Roſengimpel ſ. Gimpel. Roſenpapagei ſ. Papagei. Roſenſtar ſ. Star.

Digitized by Google

Rothhalsſittich ſ. Sittich. Rothkehlchen 13. 57. 65. 67. 72. 77. 143. 158. 172. 254. 354.
Rothkopfamandine ſ. Amandine. Rothrückiger Würger ſ. Würger.
Rothſchwänzchen 149. 158; —, Haus- 68. 380.
Rückblick 416.
Rupicola crocea 362.
Ruß, Karl † 280; —, Dr. Karl † 313; —, Dr. Karl, Sein Entwickelungsgang als Schriftſteller 321. 329.
Ruticilla phoenicurus 380; — titys 158. 381.

Sängergrasmücke ſ. Grasmücke.
Saxicola oenanthe 160.
Schafſtelze 88.
Schickſal unſerer Vogelneſter und die wichtigſten Faktoren des Vogelſchutzes 30.
Schilderungen aus der Vogelwelt Kaliforniens 37. 45.
Schleiereule ſ. Eule.
Schlußbeobachtung zur Baſtardzüchtung zwiſchen beiden Gouldsamandinen ſ. Miſchling.
Schmalſchnabelſittich ſ. Sittich.
Schmetterlingsfink ſ. Fink.
Schneefink ſ. Fink. Schneehuhn 91. 112. Schneekrähe ſ. Krähe.
Schwalbe 149. 246. 262. 303; —, Erd- 13; —, Haus- 215. 380; —, Mauer- 215; —, Mehl- 13; —, Nacht- 301; —, Rauch- 159. 215. 380; —, Thurm- 262. 380; —, auſtraliſche Wald- 356.
Schwan, weißer Höcker- 396; —, Sing- 396; —, ſchwarzer Trauer- 396.
Schwanzmeiſe ſ. Meiſe.
Schwarzkehlchen 217. Schwarzſpecht ſ. Specht. Schwarzſtirnwürger ſ. Würger.
Schwarzplättchen 22. 55. 57. 65. 77. 86. 163.
Seidenreiher ſ. Reiher. Seidenſchwanz 150. 177. 185.
Senegaltäubchen 168.
Sepſis, Die — (Blutzerſetzung) der (jungen) Papageien bzl. Graupapageien 273.
Singdroſſel ſ. Droſſel.
Sitta caesia 158. 380.
Sittich, Alexander-, kleiner 232; —, Band- 279; —, Blutbauch- 352; —, China- 351; — Halsband-Edel- 232; —, Katharina- 304; —, Keilſchwanz-, Finſchs 43; —, —, Pet' 193; —, Mönchs- 113; —, Paradis- 384; —, Plattſchweif-, blaugrüner 279; —, —, Brown's 361; —, —, mit blauem Unterrücken 279; —, —, gelbſchulteriger 120; —, —, mit gelbem Halsband und rother Stirnbinde 279; —, —, rothſtirniger Neuſeeländer- 279; —, —, vielfarbiger 279; —, Prinzess of Wales- 195; —, Rothhals- 44; —, Sing- 271. 392; —, Tirika- 328; —, Tovi-Schmalſchnabel- 201; —, Wellen- 175; —, —, gelber 271.
Spatzengeſchichte, Eine 364.
Specht, Bunt- 381; —, Gold- 184; —, Grün- 381; —, Schwarz- 92.
Sperling 237; — in der Gefangenſchaft 385; —, Feld- 256; —, Haus-, Geſangsgabe des 292; —, Morgenammer 218; —, ſchnurrbärtiger 153.
Spermestes acuticauda 289; — Argus 7. 9. 41. 268; erythrocephala 7. 9. 41. 268; — Gouldi 241. 249. 289; — mirabilis 241. 249.
Sproſſer 22. 161. 178. 183. 191. 396.
Steinkauz 68. Steinkrähe ſ. Krähe. Steinſchmätzer 13. 65; —, grauer 160. Steinröthel 347. 397.
Stieglitz 156. 188. 354. 381; —, Himalaya- 63.
Star 6. 79. 149. 158. 159; —, einfarbiger 400; —, gemeiner 293; —, orangeköpfiger 296; —, Roſen-, Wanderzug des 212. 231. 255; —, Waſſer- 231; —, Frühlingsbotſchaft des ſ. Frühlingsbotſchaft.
Storch, ſchwarzer 152; — weißer 152.
Sturnus roseus 212. 231; — unicolor 400; — vulgaris 293; — xanthocephalus 296.
Sumpfmeiſe ſ. Meiſe
Sumpfrohrſänger, in ſeiner Bedeutung als Stubenvogel 228. 234.
Sylvia atricapilla 159. 224; — cinerea 208; — curruca 159; — flavicapilla 92; — hortensis 160. 401; — hypolaïs 1. 112. 130; — orphea 210. 220; — rubecula 72. 158; — rufa 159; — tithys 68.
Syrnium aluco 6.

Tanagra crassirostris 20; — septicolor 356; — tricolor 356
Tannenheher 92. 149.
Taube-, Haus- 7; —, Hohl- 240; —, Ringel- 11.
Tetrao alpinus 112.
Thurmfalk ſ. Falk.
Tovi-Schmalſchnabelſittich ſ. Sittich.
Trauerfliegenfänger 13. Trauerzeiſig ſ. Zeiſig.
Trichodroma muraria 91.
Trupial, Baltimore- 267; —, Garten- 266; —, gefleckter 274; —, geſprenkelter 282; —, Giraud's 275; —, Grayſon's 281; —, Orange- 282; —, ſchwarzbrauner 275; —, ſchwarzbrüſtiger 275; —, ſchwarzkehliger 281; —, ſchwarzſtreifiger 282; —, Sclater's 276; —, Waglers- 266.
Trupiale von Guatemala 257. 265. 274. 281.
Turdus albicollis 16; — alpestris 304; — flavipes 20; — Grayi 16; — iliacus 381; — musicus 92; — rufiventris 16. 20; — Swainsonii 88; — torquatus 69. 305; 307; — ustulatus 88.

Ueberwinterung einheimiſcher Kleinvögel im Freien 92.
Uferſchnepfe 389.
Ungleiche Geſellen 278.

Verein, Ornithologiſche Geſellſchaft in Baſel 87; —, Deutſche Ornithologiſche Geſellſchaft in Berlin 87. 95; —, für Vogelkunde und Geflügelzucht in Breslau 47. 79. 366; —, Vogelfreund in Landau (Pfalz) 128; —, der Liebhaber einheimiſcher Vögel in Leipzig 64; — für Geflügel und Vogelzucht in Mainz 55. 176. 335. 390.
Verſammlung, Ornithologiſche — in Sarajevo 223.
Vögel, Freundnachbarlichniſtende 6. 11; — Selten gehaltene einheimiſche 106. 115. 122. 138. 159. 163; — Wie bekomme ich in meinen Garten 190; — Zwei werthvolle, für unſere Vogelſtuben 314. Vogeleier, Anfertiger falſcher 8; —, händler-Verband und Vogelſchutz 33. 97. 108; — leben in der Großſtadt 236; — liebhaberei, Engliſche 10. 44. 89. 156. 188. 194. 226. 283. 356; — liebhaberei und — ſchutz 270. 284; — liebhaberei, Unwiſſende 247; — maſſenmord auf Helgoland 343; — maſſenmord, gegen den 367; — neſt, Ein merkwürdiges 367; — neſter, Das Schickſal unſerer — und die wichtigſten Faktoren des Vogelſchutzes 30; — ſchutz 255. 270; — ſchutz und Liebhaberei 120; — ſtimmen im Munde des Untererzgebirglers 15; — ſtube, Aus meiner 164. 207 — Stubenpflege im Winter 406; — welt, freilebende, des Sauerlandes 380.
Von meinen Stubenvögeln und Züchtungsergebniſſen 238. 243
Von meinen Vögeln 365.
Vorfrühling 102.

Wachsmotte, als Futter für inſektenfreſſende Vögel 294. 363.
Wachtel 23. 212.
Waldſchwalbenwürger ſ. Würger.
Warum züchten Sie mit Vorliebe Miſchlinge? 369. 404.
Waſſeramſel ſ. Amſel. Waſſerpieper ſ. Pieper. Waſſernachtigal ſ. Nachtigal. Waſſerſchmätzer 8. 259. Waſſerſtar ſ. Star.
Weber, Blutſchnabel- 121. 215.
Weidenlaubvogel ſ. Laubvogel.
Wellenſittich ſ. Sittich.
Wie ich Ornithologe wurde 301.
Wiedehopf. Sachgemäße Aufzucht und Pflege vom Neſtling bis zum ausgewachſenen Vogel 69. 78. 82.
Wieners Aſtrild ſ. Aſtrild.
Wildgans ſ. Gans.
Wintergaſt, Ein ſeltener 406.
Wintervögel, Bilder aus dem Leben unſerer 66.
Würger 6. 12. 245. 252; —, Raub- 245; —, Rothkopf- 245; —, Rothrückiger- 245. 263. 354; —, Schwarzſtirn- 245. —, Waldſchwalben- 128.

Zaungrasmücke ſ. Grasmücke.
Zaunkönig 65. 77. 117. 215.
Zebrafink ſ. Fink.
Zeiſig 21. 77. 188. 354; — von Arkanſas 29; —, bärtiger 63; —, Fichten- 63; —, Gebirgs- 28; —, Hartlaubs- 111; —, kaliforniſcher 30; —, von Kolumbien 63; —, Kordilleren- 63; —, Magellan- 63; —, Mozambik- 114; —, ſchwarzer 64; —, ſchwarzköpfiger 28; —, Trauer- 28
Zitronfink ſ. Fink.

Google

Zosterops 356.
Züchtung, Ergänzung zu meinen früheren — Berichten 241. 249. 268. 276; — des ſpitzſchwänzigen Gürtelgrasfink 289; —, Miſchlings- zwiſchen rothköpfiger und ſchwarzköpfiger Gouldsamandine 241. 249; — der Paradis-Amandine bzl. Argus-Amandine 7. 9. 41. 268. 276; —, Schwalben- im Zimmer 246.
Züchtungsreſultate 1899er, mit Dompfaffen und Kanarien 415.
Zugvögel, Das Wandern der — 315. 321.
Zur Eingewöhnung friſch eingeführter Graupapageien ſ. Papagei
Zwergdroſſel ſ. Droſſel. Zwergrohrdommel 13. Zwergfliegenfänger ſ. Fliegenſchnäpper. Zwergtaucher 13.

Verzeichniß der abgebildeten Vögel.

Aegintha melpoda 27; — phoenicotis 27.
Amazone, mit rothem Flügelbug 403; —, kleine gelbköpfige 19; —, gelbnackige 187; —, Guatemala- 187
Ammer, ſiebenſtreiſiger 59.
Arara, Azara's 259; — hellrother 259.
Araſſari, Schrift- 211; —, ſchwarzkehliger 355
Ardea garzetta 147
Artamus sordidus 123.
Baumelſter, rothbäuchige 35.
Brillen-Hordenſtärling 291.
Bolborhynchus lineolatus 299.
Brotogerys tirica 323.
Bülbül, Grauſchwarzer Himalaya- 315
Ciconia alba 147; — nigra 147
Cissa sinensis 35.
Coccothraustes melanurus 331.
Colaptes auratus 179.
Droſſel, Gray's 11; —, Ring- 307; —, rothbäuchige 11; —, weißkehlige 11.
Emberiza tahapisi 59.
Fringilla brevirostris 75; — canora 27; — juncorum 163; — montana 251; — nivalis 3; — pusilla 163
Gelbkopf, Doppelter 411.
Girlitz, kurzſchnäbliger 75.
Halcyon giganteus 339.
Hypsipetes psaroïdes 315.
Jägerlieſt 339.
Kakadu, Goffins- 91; —, Inka- 139; —, Nymphen- 267
Kanarienvogel, reingelber Yorkſhire- 99.
Kernbeißer, Schwarzſchwänziger 331.
Kitta, blaugrüne 35.
Kubafink 27.
Lori, ſchwarzkäppiger 243; — von den blauen Bergen 243.
Motmot 43.
Orangebäckchen 27.
Papagei, Müllers Edel- 363; —, Neuguinea-Edel- 371.
Papageichen, Blauſcheiteliges 243.
Pica rufa 35.
Prionites brasiliensis 43.
Psittacus aestivus 403; — atricapillus 243; — auripalliatus 187; — Azarae 259; — chrysopterygius 115; — galgulus 243; — Goffini 91; — guatemalae 187; — haematogaster 347; — haematonotus 387; — Leadbeateri 139; — Linnëi 371; — macao 259; — Mülleri 363; — Novae-Hollandiae 267; — ochropterus 19; — pulcherrimus 379; — Swainsoni 243; — torquatus 227.
Pteroglossus atricollis 355; — inscriptus 211.
Schmetterlingsfink 27.
Schneefink 3.
Seidenreiher 147.
Sittich, Alexander-, kleiner 227; —, Blutbauch- 347; —, Paradis- 379; —, Plattſchweif-, gelbſchultriger 115; —, Katharina- 299; —, Sing- 387; —, Tirika- 323
Specht, Gold- 179.
Star, einfarbiger 395.
Storch, ſchwarzer 147; — weißer, 147.
Sturnus unicolor 395; — xanthocephalus 291.
Turdus albicollis 11; — Grayi 11; — rufiventris 11; — torquatus 307.
Waldſchwalbenwürger 123.
Zwergammerſperling 163.

Verzeichniß der Neſtbilder.

Bachſtelze, gelbe (Motacilla flava) 83
Dompfaff (Pyrrhula europaea) 51.
Feldſperling (Fringilla montana) 251.
Fliegenſchnäpper, grauer (Muscicapa grisola) 195.
Gartenlaubvogel oder Gelbſpötter (Sylvia hypolaïs) 107
Grasmücke, Dorn- (Sylvia cinerea) 203; —, ſchwarzköpfige (Sylvia atricapilla) 219.
Hohltaube (Columba oenas) 235.
Mauerſegler (Cypselus apus) 171.
Meiſe, Sumpf- (Parus palustris) 131.
Rothkehlchen (Sylvia rubecula) 67.
Steinſchmätzer, grauer (Saxicola oenanthe) 155
Waſſerſchmätzer (Cinclus aquaticus) 5

Verzeichniß der Kunſtbeilagen.

Eine Farbendrucktafel, darſtellend: 1. Sproſſer, 2. Nachtigal, 3. Schwarzköpfige Grasmücke, 4. Sperbergrasmücke, 5. Gartengrasmücke.

Eine Tafel in Schwarzdruck, darſtellend: 1. Alpenſchneehuhn, 2. Alpenmauerläufer, 3. Alpenbraunelle.

Ein Original-Aquarell, darſtellend: 1. Rothkehlchen, 2. Blaukehlchen, 3. Gelbſpötter, 4. Sumpfrohrſänger, 5. Orpheusgrasmücke.

Eine Tafel in Schwarzdruck, darſtellend: Gartenrothſchwänzchen (Neſtbild).

Inhalt der Nr. 1.

Der Gelbſpötter und ſeine Behandlung als Stubenvogel.
Der Schneefink.
Die Verwerthung der Kanarienvögel auf den Ausſtellungen.
Ueber freundnachbarlich niſtende Vögel.
Weiteres zur Züchtung der Paradis-Amandine, bzl. Argus-Amandine.
Mancherlei.
Anfragen und Auskunft.
An die Leier.
Zu unſeren Bildern.

Anzeigen.

Annahme von Anzeigen in der **Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet

Betone ausdrücklich, es kommen nur

= geſunde kräftige Exemplare =

zum Verſand, unter Garantie lebender Ankunft, in ſorgfältiger, warmer, praktiſcher Verpackung. Bedienung ſtreng reell, Umtauſch geſtattet.

Rieſenfiſcher, Seltenheit, Mch.	40 ℳ
Pfefferfreſſer, „ „	65 „
Goldohrbüſchler, „ „	35 „
Singſittiche, prachtvolle Zuchtpare	30 „
Barrabandſittiche, prachtv. Zuchtp.	30 „
Wonga-Wonga-Tauben, Zuchtpare	40 „
Gürtelgrasfinken, Zuchtpare	10 „
Cereſaſtrilde, Zuchtpare	8,50 „
Nandayſittiche in voller Pracht, P.	16 „
Chin. Nachtigalen, Ia voll durchſchlag., M. St. 4 ℳ, 5 St. 18 ℳ, Par 5 ℳ, extra ausgeſ., pr. Doppelüberſchläger	5 „
Himmelbl. Hüttenſänger, Zuchtpare	9 „
Jamaika-Trupiale, Ia Sänger	16 „
Roſellaſittiche in voller Pracht P.	20 „
Blumenauſittiche, prachtv. Zuchtpare	8 „
Silber-Lizard-Kanarien, Ia Zuchtp.	15 „
Barnardi-Sittiche, Zuchtpare	40 „
Chin. Zwergwachteln, reizende Zuchtp.	9 „
Calif. Schopfwachteln, Zuchtpare	12 „
Spitzſchw. Gürtelamand. Zuchtpare	16 „
Schilffinken, Zuchtp.	6,50 „
Schamadroſſeln, prima Ia Säng., bei mir abgemauſerte Exemplare	35—40 „
Spottdroſſeln, prima Ia Sänger, St.	12 „
Mönchſittiche, lernen ſprechen, St.	4 „
Kl. Alexanderſ., Mch., lern. ſprch., St.	5 „
Grauk. Zwergpap., P. 2,50 ℳ, 3 P. 6 „, 5 Par	8,50 „
Import. Zebrafinken, Zuchtp.	5 „
Jap. Mövch., gelb- und braunbunt, P.	3 „
Indigofinken, Ia Sänger St.	4 „
Nymphenſittiche, import. Zuchtp.	10,50 ℳ
Roſenpapageien, richtige Zuchtpare	25 „
Schwefelg. Wellenſittiche, Ia Zuchtp.	26 „
Wellenſittiche Ia, imp. große, ſtarke, richt. Zuchtp., P. 7 ℳ, 3 P.	20 „
Wellenſittiche, Zuchtpare 6 ℳ, 3 P.	16 „
Grüne Kardinäle, M., Ia Sänger,	12 „
do. Weibchen, St.	6 „
Amerik. Seidenſchwänze, Mch., St.	6 „
Seidenglanzſtare, Mch., Ia Säng.	4,50 „
Madagaskarweber, in Pracht, St.	4,50 „
Safranfinken, Männchen in Pracht, St.	4 „
do. Weibchen St.	2,50 „
Rothe Kardinäle, Ia Sänger, St.	8 „
do. Zuchtweibch., St.	5,50 „
Rothgeh. gr. Kardinäle, Männchen,	5 „
Dominik.-Kardinäle, Ia Säng., St.	5,50 „
Schneeweiße Reisfinken, Zuchtp.	7,50 „
do. graue, prachtvoll, Par	2,25 „
Kurzſchn. Girlitze, Ia Säng., Zuchtp.	5,50 „
Gutſpr. Amazonen, Ia Ia	25—45 „
Graupapageien, garant. ſprech.,	30—50 „
Gutſprech. Graupapageien	60—150 „
Auſtraliſche Schopftauben, Zuchtp.	15 „
Zebra- od. Sperbertäubch., Zuchtp.	4,50 „
Weiße Lachtauben, Zuchtpare	5 „
Gelbe do. „	2,50 „
Weiße Mäuſe, Zuchtpare	0,60 „
Marmoſettäffchen, fingerzahm, Par	18 „
Meerſchweinchen, Stück	1 „
Belgiſche Rieſenkaninch., Junge St.	1,50 „

In richtigen, kräftigen Zuchtparen:

Broncemännchen 2,50 ℳ, **Malabaramandinen** 2,50 ℳ, **Atlasfinken i. Pracht** 2,50 ℳ, **Orangebäckchen** 2 ℳ, **Aſtrilde** 2 ℳ, **kl. Elſterchen** 2 ℳ, **Muskatfinken** 2 ℳ, **Silberfaſänchen** 2 ℳ, **Bandfinken** 2 ℳ, **Helenafaſänchen** 2 ℳ, **Paradiswitwen** 3 ℳ, **Feuer- oder Orangeweber in Pracht** 4 ℳ, **Blutſchnabelweber in Pracht** 2 ℳ, **Chineſerfinken** 1,80 ℳ, **rothe Tigerfinken** 2,25 ℳ. Dieſe **Senegalvögel**, gemiſcht nach meiner Wahl in reizendem Sortiment, 5 P. 9,50 ℳ, 10 P. 17 ℳ, 20 Par 33 ℳ. [1]

Georg Brühl, Vogel-Exporthaus, **Kötzſchenbroda b. Dresden.**

Vögel u. Säugethiere werden naturgetreu u. ſauber ausgeſtopft. Preisliſte über ſonſtigen Vorrath: **Kanarienedelroller**, alle Sorten **Vogelfutter** u. ſ. w. portofrei.

Futtermittel.

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [2]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

---

500 St. Vogelbisquit 4 ℳ [3]
ff. Maizena-Bisquit in Würfeln, 150 St. für 4,50 ℳ **ff. Eierbrot**, à Kilo 2 ℳ **ff. Eier-Zwieback**, ohne Hefe, unübertr. beſte Qual., Poſtkolli 5 ℳ verſ. fr. g. Nachn.
E. Salomon, Leipzig, Gerberſtr. 23.

! Gut gereinigtes Vogelfutter !

ohne jede weitere Anpreiſung wie Ia, prima u. a., verſende nur wirkl. beſte Ware.

Sommerrübſ.	5 Ko.	1,70 ℳ,	1 Ko.	40 ₰
Glanzkorn	„ „	1,30	„ „ „	30 „
Silberhirſe	„ „	1,80	„ „ „	40 „
Schälhafer	„ „	1,80	„ „ „	40 „
Senegalhirſe	„ „	2,00	„ „ „	50 „
Sonnenroſenk.	„ „	1,80	„ „ „	50 „
Hanf	„ „	1,60	„ „ „	40 „
Carottengries	„ „	4,50	„ „ „	110 „
Droſſelfutter	„ „	4,00	„ „ „	100 „
Nachtigalfutt.	„ „	7,00	„ „ „	200 „

Ameiſeneier 1 Lit. 80 ₰, 10 Lit. 7,50 ℳ.
Alle anderen Futterſort. bill. Prsl. frei. [4]
H. P. Lange, Samenhdl., **Gottesberg** i. Schlſ.

= Diesjährige konkurrenzloſe =

Ameiseneier,

hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, 1 Liter 95 ₰; ferner **Ameiſeneier**, **prima Qualität**, 1 Liter 80 ₰; [5]

Weisswurm,

hochprima, 1 Liter 90 ₰ liefert ſtets

Wenzel Petzold, Prag 394/I.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko 3½, à Ltr. 80 ₰.

Muska, hochf. 98er, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr. 4½, à Ko. 8.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 4, 5 Ko. 19.

Bisquit u. Eierbrot, beſt. Qualit, à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack	5	Ko.	no.	1,50
Hanfſat	„	„	„	„	1,60
Hafer geſchält	„	„	„	„	2,25
Mohn blau	„	„	„	„	3,75
Hirſe weiß Pa.	„	„	„	„	2,
do. Senegal	„	„	„	„	2,25
do. do. i. Kolb.	„	„	„	„	5,—
do. algeriſche	„	„	„	„	2,
do. indiſche	„	„	„	„	1,75
Sonnenblumen	„	„	„	„	2,—
Kürbiskerne	„	„	„	„	3,25
Reis i. Hülſe	„	„	„	„	2,25
Zirbelnüſſe	„	„	„	„	4,—

Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [6]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Vom Besten

das Beſte. 98er **Ameiſeneier Ia** Ko. 3 ℳ, Ltr. 70 ₰, Prima Tiroler Ltr. 1 ℳ, **Elbe-Weißw. Ia** Ko. 3,50, Ltr. 80 ₰, **Mehlwürmer Ia**, rein, Liter 4,50 ℳ, **Univerſalfutter** prima, f. zarte Inſektenfreſſer Ko. 2 ℳ, für Droſſeln Ko. 1,20, Papageifutter 5 Ko. 3,—, Prachtfinkenfutter 5 Ko. 2,50, Sittichfutter 5 Ko. 2,50, Waldvogelfutter 5 Ko. 3,—, Kanarienſingfutter 5 Ko. 3,— mit Sack, und alle Futterſämereien in Prima-Qualitäten billigſt. Preisliſte gratis. Wer einmal beſtellt, bleibt Kunde. [7]

Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Mehlwurmzüchterei

empfiehlt prima Würmer ℔ 4,— ℳ [8]

F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

gewaſchener weißer Leinwand, bringe das Vogelbauer an einen hellen Standort, wo daſſelbe, ohne den Vogel bis zu ſeinem Abſingen zu ſtören, in unbedingter Ruhe verharrt. Der Sprung iſt, von der Decke abwärts gerechnet, 16 cm tief, der ſogenannte Zweiſprung; außerdem iſt weiter unten, 23 cm tief, ein Sprungholz zum Futter- und eins zum Waſſergefäß und ein dritter Stab in der Mitte angebracht, damit der Vogel nicht allzuſehr auf dem Boden im Schmutz ſich aufhalten ſoll; alſo ungefähr ſo:



Die Springſtäbe wähle ich aus getrockneten Hollunderſchößlingen in verſchiedener Stärke, wie nebenſtehend veranſchaulicht.

Als Eingewöhnungsfutter nehme man wirklich friſch geſammelte Ameiſenpuppen (keine blauen oder gar verdorbenen), lege als Reizmittel etwa zwölf kleine Mehlwürmer oben darauf und laſſe den Vogel ungeſtört. Nach ungefähr drei bis vier Stunden nehme man ganz behutſam das Futtergefäß heraus und verſichere ſich, ob der Wildfang gefreſſen hat. Iſt dies der Fall — und nur in den ſeltenſten Ausnahmen tritt beim Gelbſpötter das Gegentheil ein —, ſo hat man ſich um den Vogel weiter nicht mehr zu kümmern, als ihm täglich ſeine guten Ameiſenpuppen nebſt einigen Mehlwürmern zu reichen, im übrigen ihn unbehelligt laſſend, mit Ausnahme der Reinigung des Schiebers, die mindeſtens allwöchentlich zweimal geſchehen muß, und zwar ſo vorſichtig wie nur irgend möglich, um den friſch gekäfigten und noch ängſtlichen Vogel nicht unnütz zu erſchrecken. Sollte man jedoch zufälligerweiſe einen ganz alten Trotzkopf erhalten haben, der nicht an's Futter geht, ſo ſtelle man noch ein kleines, niedriges Glasgefäß dazu und thue zwölf bis fünfzehn lebende und recht zappelige Mehlwürmer hinein; dieſem Köder widerſteht auch der älteſte, dickköpfigſte Spötter nicht. Sind dieſe lebenden Würmer nun vertilgt und der Vogel weiß erſt, wie gut dieſelben ſchmecken, ſo geht er unſchwer an die toten Würmer und an die Ameiſenpuppen — und nach drei bis vier Tagen, öfter noch früher, wird man dem anfangs ſchüchternen, nach kurzer Zeit aber feurigen Geſang des Gelbſpötters lauſchen können.

Der Anfänger oder der jüngere Vogelliebhaber (und für dieſe ſoll ja hauptſächlich der heutige Artikel hier niedergeſchrieben ſein) beachte eben als Hauptſache eins: er beſchaffe ſich möglichſt früh, alſo bald nach der Ankunft, ſeinen Wildfang; je eher er ſeinen Gelbſpötter in den Käfig bekommt, deſto leichter iſt deſſen Eingewöhnung und deſto früher beginnt er auch demzufolge mit ſeinem Geſang. Nach der erſten Woche des Juni, ſelbſt wenn der Vogel gleich nach der Ankunft gefangen wäre — und dies lege ich jedem, auch dem alterfahrenen Liebhaber an's Herz —, käfige man aber keinen Gelbſpötter mehr, und zwar deshalb, weil dann die Hauptbrunſt des Vogels vorbei iſt. Wenn der Vogel nicht vollſtändig abgeſungen hat, alſo der Geſang durch den Wechſel ab- bzl. unterbrochen wurde, ſo iſt es auch ſpäter mit der Wintermauſer ſchlecht beſtellt und er geht zur Unzeit, ohne dem Pfleger nur im geringſten Freude gemacht zu haben, ein. Hierauf führe ich die vielen Verluſte, worüber ſich die Liebhaber des Gelbſpötters beklagen, hauptſächlich zurück.

Aber dieſer Umſtand hat noch etwas Andres und im Intereſſe unſres Vogels ſehr Gutes im Gefolge; dadurch wird der leidigen ſpäten Fangerei, ſei es nun von den Eiern oder gar von den Jungen, am beſten entgegengewirkt. Kauft der Händler (die meiſten thun es ja, Gottlob, nicht) um dieſe Zeit, alſo etwa um Mitte Juni, ſich noch friſchgefangene Gelbſpötter, ſo laſſe man ihm dieſelben ruhig und mag er dann die Folgen allein auf ſein Gewiſſen nehmen und die armen Vögel, die faſt ſtets rettungslos verloren ſind, auch ſelbſt durchzuwintern verſuchen. Dadurch gewitzigt, wird er das nächſtemal ſich ſchon keine Vögel um dieſe vorgerückte Jahreszeit mehr einbauern, und die Schlußfolgerung davon bleibt die, daß der unbarmherzige Vogelſteller um dieſe Zeit der höchſten Liebe des Vogels von ſelbſt aufhören wird, Netze zu ſtellen oder Leimruthen zu legen, weil er kein Abſatzgebiet mehr für dieſelben hat. Dies wäre alſo die Eingewöhnung und ich komme nun zum zweiten Punkt, zur Gewöhnung an das Miſchfutter. (Fortſetzung folgt).

Der Schneefink (Fringilla nivalis, *L.*)*).

Von F. Hauſer.

Die alpine Vogelfauna zählt nur wenige Glieder, welche mit gleicher Zähigkeit und Beharrlichkeit ſich innerhalb der eng gezogenen Grenzen ihrer eigentlichen Heimat halten, wie der Schneefink. Der hübſche, kräftige, an Größe den Edelfink ziemlich übertreffende Vogel iſt in den ſchweizeriſchen Hochalpen geeigneten Orts faſt überall zu finden, an manchen Gebirgsſtöcken in recht namhafter Zahl. Erkundigt man ſich aber bei den Bewohnern jener Gegenden nach ſeinem Vorkommen und ſeinem Aufenthalt, dann wird im allerbeſten Fall ein mit der Vogelwelt etwas näher vertrauter Aelpler oder Gemsjäger ſpärliche Auskunft auf geſtellte Fragen geben können. Der „Steinfink“, wie hierorts der Schneefink benannt wird, iſt in der untern Alpen- und Bergregion und beſonders im Thal ein ſeltner und flüchtiger Gaſt, und während ſeine Nachbarn: das „Bergtübli“ (Alpenmauerläufer), die „Schneekrähe“ (Alpendohle) und der „Heuplüemter“ (Flüevogel), der gar zutraulich und ohne Scheu im Winter die zerſtreut im Gebirge gelegenen Bauerngüter beſucht und vor den Stallthüren Heuſamen zuſammenpickt — während dieſe den gleichen einſamen, unwirthlichen Regionen entſtammenden Vögel jeder Bauer als alte Bekannte nennt, iſt der Schneefink ihm fremd und unbekannt geblieben.

---

*) Hierzu die Abbildung in dieſer Nummer

Der Name „Schneefink“ charakteriſirt dieſen Vogel ganz treffend. Seine Daſeinsbedingungen ſcheinen auf das engſte an die Nachbarſchaft von Firnen und Schneefeldern geknüpft. Die wildeſten und unwirthlichſten Stellen oberhalb der Grenze des Holzwuchſes, zerklüftete, verwitterte, rundum noch vom Schnee umſchloſſene Felſenkämme, wo erſt an wenigen Orten der Wind die eiſigen Kryſtalle von der Erde fegte und die Sonne erſt nach langem, hartnäckigem Widerſtand ſich ein par kleine Raſenbetichen, ein par winzige Oaſen inmitten der weiten, winterlichen Wüſte erkämpfen konnte, das iſt des Schneefinken Heimat; da fühlt er ſich behaglich und ſo recht eigentlich daheim, und wohlgemuth richtet ſich der zähe kleine Vogel, unbekümmert um alle Grauſen des dieſe Höhen immerfort umtobenden und alle Lebeweſen ſtets mit Vernichtung bedrohenden Kampfs der Naturgewalten, ſein Neſtchen her. Solches wird an einer vor Wind und Näſſe gut geſchützten Stelle, gewöhnlich in einer unzugänglichen Felshöhle oder Felsſpalte, zwiſchen Steinblöcken u. drgl. angelegt. Nach Tſchudi niſten Schneefinken auch in Mauerlöchern und im äußern Balkenwerk der Dächer der Hoſpizgebäude auf der Grimſel, dem Bernhard und dem Simplon. Ich fand im Sommer des vergangnen Jahrs ein Neſt in der auf dem höchſten Punkt eines etwas über 2200 Meter hohen Gipfels der Glarner Alpen



Schneefink (Fringilla nivalis. *L.*).
Originalzeichnung von F. Hauſer.

errichteten Steinpyramide. Anfangs Mai, bei beſonders milder Witterung wol ſchon Ende April, liegen fünf bis ſechs mattglänzende, reinweiße Eier in dem großen, warmen, zur Hauptſache aus Grashalmen und Mos beſtehenden, innen dicht mit Wolle, Haren und Federn gepolſterten Bau gebettet. Nach vierzehntägiger Brut ſchlüpfen die Jungen aus. Von dieſer Zeit ab, bis das hungrige Völklein endlich ſelbſtändig geworden iſt, ſteht den Alten manch' mühſame, kummervolle Stunde bevor. Die Aetzung der Jungen bilden kleine Inſekten. Manchmal aber ſind dieſe gar ſchwer in der nöthigen Menge aufzutreiben, wenn tagelang die fürchterlichſten Unwetter wüthen und Neuſchnee alles wieder überdeckt. Wild und wüſt zerrt und zauſt der Sturm da am Federwämschen; unbarmherzig ſchlagen die ſchweren Tropfen, die harten, ſchmerzenden Eiskügelchen auf den kleinen, ſchutzloſen Körper ein. Durchnäßt und frierend trippeln die armen Vögel im Schnee umher, der ihnen die Uebung der Elternpflicht ſo bitter erſchwert.

Bald nach dem Flüggewerden der Jungen vereinigen ſich zwei bis vier Pärchen ſammt ihren Nachkommen zu fünfzehn bis dreißig Köpfe ſtarken Flügen. Zu dieſer Zeit iſt die Beobachtung des Schneefink am leichteſten. Föhn und Juni-Sonne haben zwar dem Schnee gar arg mitgeſpielt und auch in der obern Alpenregion ein gutes Stück ſeines innegehabten Reichs für den freundlichen Zauberer Frühling erobert. An ſchattigen Halden, zwiſchen Karren und Steingeröll zerſtreut, leuchten aber noch allenthalben einzelne der weißen Felder hervor, und wer ſich für den ſeltnen und anziehenden Hochgebirgsbürger näher intereſſirt, der hat in den Monaten Juni und Juli den Schritt nur der Schneegrenze zuzulenken.

Bei nicht allzu heißem Wetter entwickeln die Schneefinkenſchwärme ein recht lebhaftes Weſen. Schon aus beträchtlicher Ferne iſt der helle, weich und angenehm tönende Lockruf, der mich an die Stimme des Diſtelfink erinnerte, zu vernehmen. Ab und zu ergeht ſich einer der Alten in Ueberfülle ſprudelnder Lebensluſt wol auch in einem zwitſchernden Liedchen, für welches ihm ein Geſangskenner jedoch kaum ein ſonderlich großes Lob zuerkennen würde. Der Schneefink ſteht als Geſangskünſtler mit dem Bergfink faſt auf gleich niedriger Stufe. In vielen Punkten ſeiner Haltung und ſeines Betragens ſtimmt er mit dem Edelfink überein. Munter hüpft und ſchreitet er auf dem Geſtein, im Geröll und auf den Raſenſätzen der Felsköpfe umher. Bald jagt er hinter einer Spinne oder einer Motte her, lieſt die Samen von den Grasriſpen oder befördert jählings ein glänzendes Käferchen vom Blattſtiel weg in die dunkle Tiefe ſeines Kropfs. Dann hebt der ganze Schwarm ſich hoch in die Luft und zieht luſtig ſich tummelnd dahin, wie vom Sturm gepeitſchte Schneeflocken. Im Flug ſind die Schneefinken prächtig; ſie ſcheinen weiß und ſchwarz gefärbt zu ſein, machen ſich daher auch dem geübten Auge von weitem ſchon erkenntlich und laſſen ſich nicht leicht mit einem andern Vogel verwechſeln. Bei vorgeſchrittener Entwicklung der Jungen bilden dieſe zuweilen von den Alten geſonderte Scharen, und ſo ſtreichen Alte und Junge getrennt durch das Gebiet. Dann trifft man wieder einzelne Familien, die ſich den geſellig vereinigten Nachbarn nicht anſchließen und allein ihres Wegs ziehen.

Die in den Hoſpizgebäuden groß gewordenen Schneefinken zeigen vor dem Menſchen herzlich wenig Furcht, benehmen ſich vielmehr höchſt zutraulich und frech. Von den übrigen kann das Gleiche nicht geſagt werden. Wie ich ihr Benehmen bezeichnen ſoll oder darf, iſt mir nicht ganz klar. Es iſt ein Gemiſch von Dummheit, Neugierde, Mißtrauen und Sorgloſigkeit. Als ich neulich auf einem meiner Ausflüge in der Schneeregion zwiſchen Steinen meine Maggi-Suppe kochte, ſetzte ſich ein Schneefink in allernächſter Nähe neben mich hin und beſchaute offenbar recht erſtaunt den ſeltſamen Gaſt. Er trieb ſich längre Zeit ganz nahe um mich herum, bis die Lockrufe ſeiner Genoſſen ihn zur Abreiſe bewogen. (Schluß folgt).

Die Bewerthung der Kanarienvögel auf den Ausſtellungen.

Von R. Groſſe.

Motto: Jahrelang ſchöpfen wir ſchon in das Sieb und brüten den Stein aus;
Aber der Stein wird nicht warm, aber das Sieb wird nicht voll.
(Schiller).

Es iſt thatſächlich ſo, die Verbeſſerung der Bewerthungsweiſe des Kanarienvogellieds auf den Ausſtellungen iſt in Wahrheit eine Danaiden-Arbeit, die anſcheinend auch nach jahrelangen Bemühungen nicht vollendet werden ſoll. Nicht ſeit Jahren, nein ſeit Jahrzehnten tritt das Bedürfniß nach einem offenen, für Jedermann verſtändlichen Verfahren wieder und wieder in den Vordergrund, aber alle Anſtrengungen, die gemacht werden, Klarheit zu ſchaffen und den berechtigten Wünſchen der Ausſteller, bzl. der ausſtellenden Züchter gerecht zu werden, werden grundſätzlich bekämpft oder doch mindeſtens als wenig beachtenswerth beiſeite gelegt. Wer die ziemlich umfangreiche Fachpreſſe aufmerkſam lieſt und geleſen hat, wird zu der Ueberzeugung gelangt ſein, daß das Verlangen nach Offenheit und Verſtändlichkeit der Bewerthungsweiſe unſerer Preisſänger ſchon ſo alt iſt, wie die Gewohnheit überhaupt, die Vögel nach einer beſtimmten Art und Weiſe abzuurtheilen, beſteht. Ich werde das ſpäter beweiſen. Vorher will ich nicht unterlaſſen, zu bemerken, daß die Beſtrebungen der Kanarienzüchter, zu einer offenen und lehrreichen Bewerthungsweiſe zu gelangen, wol für gerechtfertigt gehalten werden müſſen; denn ſie wollen nicht nur wiſſen, welchen Werth ihre ausgeſtellten Vögel haben, ſondern ſie wollen auch erfahren, auf welche Weiſe ſie Fortſchritte machen können und was, bzl. welche Strofen in dem Liede ihrer Preisſänger ausgemerzt und welche vervollkommnet werden müſſen. Im Hinblick hierauf iſt alſo das Amt der Preisrichter ein doppeltes, auf der einen Seite ſollen ſie den Geſang der Ausſtellungsvögel beurtheilen, wie er iſt, und zwar ſoll das Urtheil ohne jegliche

den mir vorliegenden Fachzeitſchriften erſehen kann, erſt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen. Bis zum Jahr 1880 begnügte man ſich mit dem Urtheil des Preisrichters, der ohne jede feſtſtehende Grundlage, wie erwähnt, nur nach dem Eindruck, den das Kanarienvogellied auf ihn machte, die einzelnen Vögel bewerthete. Daß der Geſchmack der verſchiedenen Preisrichter auch ein recht verſchiedener war und daß ſo mancher Ausſteller, der annahm, etwas Vollendetes zur Schau gebracht zu haben, durch die Bewerthungserfolge bitter enttäuſcht wurde, wenn ſeine Vögel nicht die Lieblingsſtrofen des jeweiligen Richters zu Gehör brachten, war unter ſolchen Verhältniſſen unausbleiblich, und dieſe Umſtände mögen auch wol die Veranlaſſung zu dem Verlangen nach einer feſtſtehenden Bewerthungsweiſe gegeben haben, das im Lauf der Zeit immer bemerkbarer wurde. In den damaligen Zeiten, in denen die Benennungen der einzelnen Strofen des Kanarienvogellieds ſehr vielſeitige waren und ähnlich wie in der Neuzeit gegen jede Verbeſſerung der beſtehenden Bewerthungsweiſe gearbeitet wurde, alle Vorſchläge auf Vereinfachung der Namen für die vom Vogel gebrachten Geſangsſtücke abgelehnt wurden, war es ſehr ſchwierig, eine paſſende Art für die Bewerthung zu finden; aber nichtsdeſtoweniger unternahm es der rührige Kanarienzüchterverein Leipzig, den Verhältniſſen Rechnung tragend, eine ſogenannte „Skala" für die Preisrichter aufzuſtellen. Zum beſſern Verſtändniß für die folgenden Auseinanderſetzungen laſſe ich die vom genannten Verein feſtgeſetzte Bewerthungsweiſe hier folgen:

Rollen:				Anzahl der Werththeile:
Einfache Hohl-Rolle,			hohe Lage	25
„	„	„	mittlere Lage	40
„	„	„	tiefſte Lage	60
	Koller-	„		20, 30, 40—60
	Gluck-	„		20, 30, 40—50
	Lach-	„	fallend	30—50
	„	„	ſteigend	20—40
	Klingel-	„		20—40
	Waſſer-	„		15—30
	Schwirr-	„		5—10
	Lispel-	„		5—10
	Knorr-	„		15—45
	Knarr-	„		10—30
Knatterknorre				15—45
Länge der Touren				15—35
Schmelz der Touren				20—50
Harmoniſches Zuſammenſpiel				20—50

Pfeifen:				Anzahl der Werththeile:
Gluck-Pfeife		à	Stoß	4
Boy-	„	à	„	3
Tu-	„ hohe	à	„	2
„	„ mittlere	à	„	3
„	„ tiefe	à	„	4
Tiefes Baß		à	„	4

(Mehr als 4 Stöße ſind, weil Ueberreizung, nicht zu bewerthen).

NB. Ein Prämirungsvogel darf haben:

Schnetter Spitzpfeife, jedoch nicht mehr als 6 Stöße Naſenpfeife Geß Zengpfeife	Vorausgeſetzt, daß dieſe alle weich ſind.

(Alle anderen ſchlechten Geſangsſtücke ſchließen den Vogel von der Prämirung aus).

(Fortſetzung folgt).

Ueber freundnachbarlich niſtende Vögel.

Von H. Hocke.

Wir haben in unſerm Norddeutſchland eine ganze Reihe von Vögeln, die nachbarlich gern zuſammen wohnen und dabei auf eine gewiſſe Freundſchaft halten. Wenn ſie nicht miteinander verwandt ſind, iſt das Verhältniß der Nachbarn ein durchaus gutes zu nennen, und je näher ſie verwandt, kann es leicht zu fortwährenden Streitereien führen. Einen deutlichen Beweis dafür, daß verwandte Vögel einer Art am Niſtplatz im entſetzlichen Streit ſich befinden, um irgend eine Kleinigkeit, geben Satkrähen und Dohlen, wenn wir ihr Leben in ihren Kolonien betrachten; die nächſten Anverwandten, Nebelkrähen und Raben, ſind ihnen nicht freundlich geſinnt. Ich kann nicht bezweifeln, daß dort, wo gewiſſe Vögel, z. B. große und kleine graue Würger, Wachholderdroſſeln, Stare, Segler u. a. ſehr nahe niſten, nicht Streitereien zu verzeichnen ſeien, doch ein derartiger Haß und Hader, wie bei Satkrähen und Dohlen iſt es ſicherlich nicht. Nach allen Richtungen finden Ausnahmen ſtatt, ſo auch hier.

Bei Würgern, die ausnahmsweiſe reichliche Nahrung zuſammenführt, bei Wachholderdroſſeln, die nur gelegentlich in unſeren Marken brüten, iſt ein kurzer Kampf des Gatten wegen, um den Standort des Neſts, kaum jemals um deſſen Material, eine Ausnahme, demnach weſentlich anderer Natur, wie bei Satkrähen oder Dohlen. Ein wichtiger Umſtand kommt dabei in Betracht: Satkrähen und Dohlen benutzen das Neſt, das ſie erbaut hatten, wiederholt im Lauf der Jahre oder wechſeln es, Würger und Droſſeln benutzen es ein-, ſelten zweimal, während Höhlenbrüter wol um deſſen Stand, doch nicht um deſſen Material, umſomehr, da es unbrauchbar geworden iſt, in Streitereien gerathen. Nun gibt es Vögel, die höchſt verſchiedener Art ſind und dennoch friedlich zuſammen wohnen, ſie kennen ſich, doch keiner kümmert ſich um den andern, weil — fügen wir erklärend hinzu — ſich ihre Intereſſen nicht im mindeſten berühren. Für dieſe Arten gilt der Wahrſpruch: „Raum für Alle hat die Erde".

Wir wollen derartige Bilder beſprechen. Eins der intereſſanteſten Beiſpiele freundnachbarlichen Verhältniſſes iſt: Gänſeſäger und Baumkauz! Zwei von Natur durchaus verſchiedene Vögel, der Gänſeſäger (Mergus merganser, *L.*) und der Baumkauz (Syrnium aluco, *L.*), wohnen in unſeren alten Eichen, die längs unſerer Flüſſe und Waldſeen als Wahrzeichen vergangener Herrlichkeit erhalten worden ſind. Eigentlich iſt es keine natürliche Neigung, die beide Arten anwies, in einunddderſelben Höhlung zu wohnen, hier rechts ein Par, dort links, aber die Wohnung war bequem eingerichtet, und das iſt annehmbar. Im übrigen iſt die Wohnungsnoth, unter der die größeren Höhlenbrüter zu leiden haben, entſcheidend geworden und ſie iſt es auch, die für ein äußerlich gutes Einverſtändniß und genaue Innehaltung des nunmehr anerkannten Wohnraums beider Parteien ſorgt. Da nun beide Arten Ende März bereits brüten, der Kauz auf vier bis fünf, der Säger auf zwölf oder noch mehr Eiern, ſo würde eines Tags, ſollten die Kleinen groß geworden ſein, der erwählte Platz nicht mehr ausreichen! Wie oft mögen da die Augen der alten Käuze in banger Vorausſicht nach den werdenden Sägern hinüber geglotzt haben? Die gütige Natur löſte die ſtreitige Frage ſehr leicht. Der Säger wird mit ſeinen Jungen, die er ſelbſt eins nach dem andern von oben nach unten befördert, frühzeitig die Höhlung verlaſſen und ſie nach dem nächſten fiſchreichen Gewäſſer führen, und ſomit verbleibt der Kauz, mit ihm ſeine Jungen, im Alleinbeſitz der Höhlung. Mag auch dieſes höchſt intereſſante Bild in unſrer Gegend immer ſeltner beobachtet werden können, es erinnert uns an ein anderes, wenn auch gewöhnlicheres, an das Niſten der Schleiereulen bei unſeren Haustauben in den Taubenböden. Ich kann die Verſicherung abgeben, daß in ſolchem Fall die jungen Eulen und Tauben nicht ſo verdutzt ſich anſehen werden, wie derjenige unſerer Mitmenſchen ausſehen wird, der die ungleichen Nachbarn zum erſtenmal erblickt und die jungen Eulen, weil er ſie für ſchädlich hält, nun töten will.

(Fortſetzung folgt).

Weiteres zur Züchtung der Paradis-Amandine (Spermestes erythrocephala, *L.*), bzl. Argus-Amandine (S. Argus, *Rchb.*).

Von Premierlieutenant Hauth.

Schon ſeit Jahren war es mein ſtetes Beſtreben, dieſe ſchöne, im ſüdweſtlichen Afrika heimiſche Amandinen-Art, die zu den ſeltenſten der im Vogelhandel erſcheinenden fremdländiſchen Finkenvögel zählt, zu erlangen, um ſie in allen ihren Eigenthümlichkeiten zu erforſchen. Da endlich im Frühjahr 1895 kam ich in den Beſitz eines Pärchens der genannten Vögel, mit denen mir, nachdem das Weibchen leider nach kurzer Zeit eingegangen war, die Kreuzungszucht mit einem Bandfink-Weibchen bald darauf gelang, worüber ich im Jahr 1896 in dieſer Zeitſchrift ausführlich berichtete. Spätere Verſuche einer Züchtung zwiſchen dem reinraſſigen Männchen Paradis-Amandine und einem Weibchen der Baſtarde führte aus mir nicht recht erklärlichen Gründen zu keinem Erfolg, obgleich das Weibchen zahlreiche, aber eben anſcheinend unbefruchtete Eier gelegt hatte. Zwei Jahre darauf ging leider auch das Männchen den Weg alles Fleiſches, und ſo war den weiteren Züchtungsverſuchen vor der Hand ein Ziel geſteckt. Jetzt endlich verdanke ich es der außerordentlichen Liebenswürdigkeit der Direktion des Berliner zoologiſchen Gartens, dieſe Verſuche wieder aufnehmen zu können, indem Herr Direktor Dr. Heck mir das ſeit etwa zwei Jahren daſelbſt befindliche ſchöne Pärchen der eingangs genannten Art zu Züchtungszwecken auf einige Monate gütigſt überließ. Und da über ſie bisher nur wenige Beobachtungen ſowol aus ihrem Freileben, wie auch aus den Vogelſtuben vorliegen, aber nur möglichſt erſchöpfende ein genaues Lebensbild der Vögel gewähren können, ſo wird es vielleicht nicht unwillkommen ſein, wenn ich in Nachſtehendem die Kenntniß ihrer Eigenthümlichkeiten zu vervollſtändigen ſuche.

Inbetreff der Artbezeichnung in der Ueberſchrift dieſes Berichts muß ich noch vorausſchicken, daß bei der Rothkopf- oder Paradis-Amandine noch eine Unterart oder Abart, die ſogenannte Argus-Amandine, vorkommt; der hauptſächlichſte Unterſchied zwiſchen beiden beſteht darin, daß die erſtere eine braungefleckte Unterſeite zeigt, die letztere dagegen eine weißgefleckte, bzl. geſchuppte oder getropfte. Da es ſich in meinen früheren, wie auch in den diesmaligen Berichten um die letztere Art handelt, ſo ſei dies hier beſonders erwähnt. Das Gefieder des Weibchens dieſer Art, das ich nirgends beſchrieben finde, iſt nach dem Vogel, den ich vor mir habe und der zweifellos zu dieſer gehört, wie folgt gefärbt: Oberſeits, bis auf das Fehlen des Roth am Kopf, wie beim Männchen, vielleicht ein wenig verwiſchter in der Geſammtfärbung, am Hinterkopf mit etwas röthlichen Endſpitzen der Federchen; unterſeits: Unterſchnabelwinkel und Oberkehle hell mausgrau; Kehle und Bruſt graubräunlich (an der Unterbruſt das Braun vorherrſchender) und mit halbmondförmigen, ſchwarzgeränderten, weißlichen Querſtreifen gefleckt; Körperſeiten braun, mit ebenſolchen, wie oben beſchriebenen, doch weit größeren und deutlicheren Tropfenflecken unregelmäßig gezeichnet; Oberbauch bräunlich, Unterbauch weiß; ſonſt wie das Männchen.

Wie ſchon eingangs erwähnt, befanden ſich die Paradisamandinen ſeit Anfang 1897 im Vogelhaus des Berliner zoologiſchen Gartens, ohne meines Wiſſens je einen Niſtverſuch gemacht zu haben, und ſo begegnete mein dem Leiter des Inſtituts geäußerter Wunſch, die Vögel auf kurze Zeit zu Zuchtverſuchen überlaſſen zu bekommen, freundliche Aufnahme, ſodaß ich alſo am 28. November v. J. die Vögel in den für ſie beſtimmten Kiſtenkäfig in meiner Vogelſtube einſetzen konnte. Da mir zu ihrer Züchtung nur etwa vier Monate eingeräumt waren, ſo kam mir natürlich alles darauf an, die Vögel ſo ſchnell wie möglich zur Zucht zu bringen und dazu all' meine vieljährigen Erfahrungen in der Vogelzucht zu Rathe zu ziehen, um das geſteckte Ziel womöglich zu erreichen. Wie erwähnt, hatte das Par in den vergangenen Jahren keine Niſtluſt geäußert und ſo hielt ich es für räthlich, das Männchen Rothkopfamandine zunächſt mit dem von mir früher gezüchteten Baſtardweibchen Rothkopf-Bandfink, das alljährlich ſich außerordentlich niſtluſtig und als ſehr fleißige Legerin gezeigt hatte, zu verparen und das Weibchen Rothkopfamandine mit einem Bandfinkmännchen zuſammen zu thun. Es iſt nun recht intereſſant, die verſchiedenen ſeeliſchen Empfindungen dieſer vier Vögel und deren daraus entſpringendes Verhalten zu einander zu beobachten, ſowie zu ſehen, wie durch deren Wahrnehmung und Berückſichtigung ſeitens des Züchters es ermöglicht wird, ſich allmählich und doch verhältnißmäßig ſchnell dem geſteckten Ziel zu nähern; daher wollen die geehrten Leſer mir gütigſt geſtatten, hierauf ausführlicher einzugehen. (Fortſetzung folgt).

Mancherlei

Die Eierforſcher haben einen **Anfertiger falſcher Vogeleier** für wiſſenſchaftliche Sammlungen und Liebhaber entdeckt. Er fertigte vor den Augen eines Beſuchers ein Pinguinei, das von dem echten, welches ihm als Muſter gedient hatte, garnicht zu unterſcheiden war. Dazu hatte er die Schale aus Gips angefertigt, gebrannt und glaſirt. Das Ei war für den Lieferanten einer ausländiſchen naturwiſſenſchaftlichen Sammlung beſtimmt. Für gewöhnliche Kunden genügt die Schale irgend eines Eies, das die erforderliche Größe beſitzt. Uebrigens ſind die Fälſchungen nicht beſonders ſchwer, da unter den echten Eiern der meiſten Vogelgattungen ſo viele Abweichungen vorkommen, daß ſelbſt die geübteſten Kenner ſie nicht alle zu unterſcheiden vermögen. Die Eier des gewöhnlichen Fliegenfängers ſind ungemein billig. Durch chemiſche Behandlung verſchafft man ihnen eine blaue, in's Grüne ſchimmernde Farbe, worauf ſie als Ei des Seidenſchwanzes ungefähr ſechsmal theurer bezahlt werden. Aus gewöhnlichen Enteneiern, zu 15 bis 20 Centimes das Stück, werden Eier des Geierfalken hergeſtellt, die mit 40 bis 60 Fr. bezahlt werden. Es handelt ſich hierbei darum, den Enteneiern eine ſilbergrüne Farbe zu verſchaffen. Haustaubeneier werden durch geeignete Färbung und Sprenkelung zu verſchiedenen Nachahmungen mittelgroßer Vogeleier verwandt. Ebenſo die Eier der Holztaube. Eier der Nachtigal ſind ſehr ſchwer zu erlangen, alſo theuer, deshalb werden braungefärbte Lercheneier als ſolche verkauft und theuer bezahlt. Der Herſteller all dieſer gefälſchten Vogeleier macht gute Geſchäfte; hieſige (Pariſer) und auswärtige Händler vervollſtändigen bei ihm ihre Vorräthe. Oeffentliche und Liebhaber-Sammlungen dürfte es nur noch wenige geben, in die nicht das eine oder andere ſeiner Erzeugniſſe Eingang gefunden hätte. Der Herſteller dieſer falſchen Eier war lange Gehilfe in einer naturgeſchichtlichen Sammlung der Provinz, wodurch er ſich viele Erfahrungen aneignete. Als er ſeine Stelle verlor, kam er mit ſeiner eigenen Sammlung nach Paris und fing damit einen kleinen Handel an. Um ſeinen Vorrath zu erneuern und fehlende ſeltene Eier liefern zu können, half er der Natur nach, wie jeder andere Künſtler, fertigte falſche Eier an, worin er bald eine ungemeine Uebung erlangte. Wie es ſcheint, iſt er bis jetzt ohne Nebenbuhler. („Voſſiſche Zeitung").

Anfragen u. Auskunft

Gotha: 1. Gewiß iſt der Alexanderſittich gelehrig, ja er lernt ſogar viel und deutlich ſprechen und eignet ſich auch zur Anſchaffung für einen Anfänger. Allerdings muß derſelbe, bevor er einen ſolchen werthvollen Papagei kauft, ſich genau unterrichten, wie er ihn zu beherbergen, zu füttern und zu behandeln, bzl. abzurichten hat. Der Käfig für einen einzelnen Alexanderſittich muß etwa 60 cm lang, 50 cm hoch und 35 cm tief und viereckig ſein. Sein Futter muß in Folgendem beſtehen: Hanf, Kanarienſamen, Hafer, ſchwach angekochtem Pferdezahnmais, etwas Reis in Hülſen; zur Zugabe etwas Löffelbiskuit und ein wenig gutes reifes Obſt, namentlich Apfel, auch Hafer in Aehren und immer grüne Zweige zum Benagen. Wenn Sie wirkliche Freude an einem ſolchen Vogel haben wollen, ſo muß ich Ihnen rathen, daß Sie ſich mein Buch „Die ſprechenden Papageien" (vierte Auflage) anſchaffen und den Papagei nach den darin gegebenen Anleitungen zähmen und abrichten. 2. Ganz feine Harzer Kanarien hält man nicht gern mit einem Papagei im gleichen Zimmer, denn für beide beſteht die Gefahr, daß einer durch den andern verdorben werden kann. 3. Wenn Ihnen Miſchlingszüchtung überhaupt Vergnügen macht, ſo iſt die mit Stieglitz und Kanarienweibchen beſonders empfehlenswerth, da ſie in der Regel ohne Mühe glückt. Die jungen Miſchlinge können wol den Geſang eines guten Kanarienvorſchlägers lernen, aber nicht ſelten werden aus ihnen überhaupt keine Sänger, ſondern im Gegentheil, ſie verderben ſogar den Vorſchläger.

◆

An die Leſer.

Für die zahlreich eingegangenen Glückwünſche zum neuen Jahre herzlichen Dank und aufrichtige Erwiderung!

◆

Zu unſeren Bildern.

Zu den intereſſanteſten Vögeln unſerer heimiſchen Fluren gehört der **Waſſerſchmätzer** (Cinclus aquaticus, *L.*), auch Waſſerſtar oder Waſſeramſel genannt. Er vereinigt die Eigenſchaften eines Singvogels mit denen eines vollendeten Tauchers, denn er läuft nicht allein, auf der Suche nach Beute, bis zum Hals in das Waſſer, ſondern er taucht ſelbſt in die Strudel der Sturzbäche und Waſſerfälle bis auf den Grund, läuft und ſchwimmt ganze Strecken unter der Oberfläche des Waſſers, ſelbſt unter dem Eis fort, kurz, er bewegt ſich im Waſſer ebenſo gewandt wie auf dem Lande. Zuſtatten kommt ihm, daß ſein Gefieder dick und pelzartig iſt, ſowie daß die ſchmalen Naſenlöcher durch ein Häutchen verſchließbar ſind; doch hat er an den Füßen keine Spur von Schwimmhäuten. Seine Nahrung beſteht aus Waſſerinſekten, Würmern, Krebsthieren u. a., ſelten in Fiſchbrut; überhaupt wird der Waſſerſchmätzer der Fiſcherei nur wenig ſchädlich, und es iſt ein großes Unrecht, wenn man den ſchönen Vogel als „Fiſchräuber" arg verfolgt und auszurotten ſucht. Er iſt in jeder Beziehung eine Zierde der Landſchaft am fließenden Waſſer. Das Rothbraun des Kopfes und der Unterbruſt im Gefieder des Männchens hebt ſich prächtig vom glänzenden Weiß der Kehle und Oberbruſt, ſowie von der ſchwarzen Färbung ab. Das Weibchen iſt am Kopf und Hals etwas heller, die weiße Färbung an der Bruſt trüber.

Zur Brut ſchreitet das Pärchen Ende März oder Anfang April; eine zweite Brut findet Ende Juni oder im Juli ſtatt. Das Neſt ſteht immer in der Nähe des Waſſers, in Mauerlöchern, Felſenritzen, unter Brückenbogen, in alten, hohlen, vom Waſſer umſpülten Baumſtämmen u. a. Es wird aus Erde, Moos, Pflanzenſtengeln, Wurzeln, Gras, Stroh u. a. dickwandig geformt und innen mit trockenen Blättern und Gras ausgelegt. Es iſt meiſt backofenförmig von Geſtalt, bisweilen, je nach der Höhlung, in welcher es gebaut wurde, unförmig groß. Eine Decke zum Schutz muß es immer haben; wo eine natürliche fehlt, baut der Waſſerſtar eine ſolche künſtlich nach Art des Zaunkönigs. Das Gelege beſteht aus vier bis ſechs weißen Eiern, die von dem Weibchen in 15 Tagen erbrütet werden. Die Jungen ſind oberſeits ſchiefergrau, jede Feder dunkelbraun gerändert; Hals und Bruſt düſterweiß, ſchwarzbraun geſchuppt; unterſeits röthlichgrau.

Als Stubenvogel wird der Waſſerſchmätzer bisweilen gehalten, doch iſt ſeine Haltung nur erfahrenen Liebhabern zu empfehlen, da ſie viele Mühe macht, wenn man den Vogel ſeiner Natur entſprechend verpflegen will. —

Zu dem Titelbild dieſer Nummer hat der Künſtler ſelbſt den Text geſchrieben, da er Gelegenheit hatte, den Schneefink in den Schweizer Alpen genau zu beobachten. —

Das Farbenbild zeigt die beliebteſten deutſchen Sänger, die ſowol in freier Natur, wie im Käfig Hunderte von Vogelfreunden alljährlich entzücken. Ihre Haltung und Pflege als Stubenvögel werden wir im Lauf dieſes Jahres eingehend beſprechen. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 1. Magdeburg, den 5. Januar 1899. XXVIII. Jahrg.

Die

Vogel-Export-Handlung

(Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der beſten Singvögel)

Inhaber:

Mathias Rauſch

Schriftſteller für Stubenvogelkunde, Mitglied der ornithologiſchen Sektion der k. k. zoologiſch-botaniſchen Geſellſchaft in Wien ꝛc. ꝛc.

Wien VIII/3 Bzk., Schottenfeldgaſſe 95

empfiehlt ſich als erſte und beſte Bezugsquelle zur zeitgemäßen Lieferung aller edlen Singvögel, insbeſondere für Sproſſer und Nachtigalen der feinſten Lokalraſſen, Gebirgs-Schwarzplattchen mit den ſchönſten Doppel-Endauslauten, Gelbſpötter, Sumpfrohrſänger und alle Arten Grasmücken. Ferner alle Arten Würger, Blaukehlchen und Gebirgsrothkehlchen (Wipfelſänger), Steinröthel, Blaudroſſeln, Pirole, Singdroſſeln und Amſeln, ſowie überhaupt alle Sorten Weichfutter-Vögel.

Die beſten Käfige für Weichfreſſer, einzig brauchbar in ihrer Art.

Bedienung: Anerkannt ſtreng reell und abſolut fachmänniſch. — Zahlreiche Anerkennungen der hohen Herrſchaften und der erſten Vogelkundigen der Welt. — Zeitgemäße Preisliſten ſtets koſtenlos und poſtfrei bei Angabe über welche Vogelart. [51]

S. Risius, Thierhandlung, Bremerhaven

empfiehlt prachtvolle **Sonnenaſtrilde,** ſpitzſchwänzige Gürtelgrasfinken, Diamantfinken, Zebrafinken, weiße und graue Reisfinken u. die gewöhnlichen Prachtfinken, Sonnenvögel, amerik. Spottdroſſeln, grüne, rothe u. graue rothgehäubte Kardinäle, **ſchwarzkäppiger Lori,** an Samen gewöhnt, zahmer Gebirgslori, Roſellas, Pennant-S., prachtvolle ausgefärbte **Königsſittiche,** Männch. u. Weibch., gr. u. kl. Alexander-S., Mönchs-, Halbmond- u. impt. Wellenſittiche, grauköpfige Inſeparables, gr. u. kl. Gelbhauben-Kakadus, Roſa-, Nacktaugen- u. Inkakakadus, Goldflügel-Araras, gutſprechende Graupapageien, Surinam und Doppelgelbkopf, ſehr ſchöne ſprechende blauſt. Amazonen. Kleine zahme Kronen- und Lapunder-Affen.

1 Blauſtirn-Amazone, ſingt 6 Lieder in Worten, flötet, lacht, ſpricht ſehr viel in Sätzen ſo deutlich wie ein Menſch, lernt ſehr leicht Neues. 250 ℳ [52]

Feinſte Kanarienſänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [58]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.

Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

Wellenſittich-Männch.,

à 1,50 ℳ. **L. Brinkmann, Calefeld** i. Hannover. [59]

Offerire

tadellos befied., gut ſprechende, theils in Sätzen u. Lieder ſing. **Papageien,** verſchied. **Kakadus, Wellen-** u. andere **Sittiche,** 1 zahm. **Eichelheher** 3 ℳ, verſchied. Waldvögel, 1 P. bochſ. kleine **Affenpintſcher.** Sprachverzeichniß und Preisliſte geg. bezahlte Rückantwort. Bedien. ſtreng reell. [60]

J. Götz, Hoil., **Neu-Ulm.**

Kanarienvögel, echte Harzer prima Roller, vers. von 6—18 Mk.

Fritz Trübel, Clausthal, Oberharz. Preisliste frei. [61]

Wilh. Geyer, Regensburg

Spezialgeſchäft

für Aquarien- und Terrarien-Kultur.

Import und Züchtung fremder u. einheimiſcher Zierfiſche, Amphibien, Reptilien u. Waſſerpflanzen.

Aquarien, Terrarien und Zubehör. Apparate, Gefäße, Grotten. Anerkannt reelles, altes Geſchäft. [62]

Illuſtrirte Preisliſten gegen 30 ₰ in Marken (bei Beſtellung Rückvergütung).

Hochfeine

Harz. Edelroller

(Stamm Trute),

welche vorzüglich in tief. gebog. u. geraden Hohlrollen, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Klingel, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 6, 8, 10, 12 u. 15 ℳ, Dtz. 60, 72, 84 und 96 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, verſende gegen Nachn. 6 Tage Probezeit. Nichtgefallendes tauſche um, ev. Betrag zurück. [53]

Herm. Voigt, Thale a. Harz.

Pariſer Trompeter,

nur hochgeſtellt, fein geſcheitelte Pare, präm. Abſtammung. [54]

E. Grub, Metzingen.

Harzer Kanarien-

Roller mit Nachtigaltouren zu 6, 8 ℳ, edle Roller v. 10 ℳ an, **Harzer Vogelkäfige** u. Utenſilien, Geflügelkäfige, Poſtverſandt-Kiſten u. ſ. w. Preisl. frei. [55]

Ad. Janſon, Lauterberg, Harz.

W. Lembcke

Zoologische Grosshandlung,

Schwerin i. Meckl., Stiftstr. 9

empfiehlt in ca. 800 Exemplaren: Papageien, rabengroße graue mit rother Bruſt u. Haube, gut angelernt, à 12 ℳ Grüne Papageien, ſprechen lernend, à 6 ℳ, desgleichen etwas defekt in Federn 3,50 ℳ, Alpenſtiglitze, à 1,50, 5 Stck. 6 ℳ, Edelfinken, Zeiſige, [illegible], [illegible], Prachtfinken, Sonnenvögel, Droſſeln, Harzer Edelkanarien u. and. Vögel billigſt. Preisliſte gratis. Poſtverſandt über den ganzen Kontinent, nachweislich reelle Ware, große, helle [illegible] im eigenen neuen Hauſe, tägl. Neuheiten. Direkter Import überſeeiſcher Vögel. [56]

---

1 sing. Amsel

(Naturſänger) 5 ℳ, 1 ſchlag. **Nachtigal,** gut befiedert, 12 ℳ geg. Nachn. Verpack. frei. [57]

Jos. Ehrlich, Würzburg, Zellerſtr.

Anzeigen.

Käfige und Geräthſchaften.

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [63]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.



Vogelkäfige
aller Art
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [64]
☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜
Arthur Herrmann & Luther, Oſchatz i. S.

Der beſte Fangapparat
für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [65]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.



Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ. [66]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Ltr. 1 ℳ Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen.** M.-Gladbach 112.

Holzwaarenfabrik.

C. L. Flemming
Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen
empfiehlt: [67]
Flug- und Heckbauer, Einſatzbauer, Geſangskaſten.
Muſterpackete 9 St. ſort. f. Kanarienzüchter M. 6 franko.

Holzwaarenfabrik.



Man verlange Preisliste.



☞ **Specialität** ☜
Papageien und Papageien-Käfige
mit Porzellannäpfen. Versandt nach überall unter Garantie lebender, gesunder Ankunft. [68]
F. Rejsek,
Papageien-Grosshandlung,
Hamburg, Peterstrasse 28.

☞ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **fachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [69]


Die gefiederte Welt
Wochenſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler
Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß
Magdeburg.
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
R. & M. Kretſchmann.

☞ Verkleinerte Zeichnung der Decke!

Wir haben für den 1898er Jahrgang der „Gefiederten Welt"

braune Einbanddecken
in Schwarz- und Goldpreſſung

nach Zeichnung des bekannten Malers Emil Schmidt herſtellen laſſen, welche wir unſeren geehrten Abonnenten

für nur 80 Pfg.

zur Verfügung ſtellen. Jede Buchhandlung beſorgt dieſelben! Nach Orten, in denen keine Buchhandlungen ſind, verſenden wir direct gegen Einſendung von M. 1.— (incl. Porto).

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

☞ Verkleinerte Zeichnung der Decke!

Anzeigen.

P. P.

Für die Abonnenten des XXVIII. (1899er) Jahrganges der „Gefiederten Welt“ legen wir der Nummer 1 dieſes Jahrganges eine

farbige Darſtellung von fünf der beliebteſten einheimiſchen Singvögel

nach Aquarellen des hochgeſchätzten Malers Emil Schmidt bei, welcher im ſpäteren Verlauf des Jahres **noch eine zweite**, ebenfalls **fünf weitere einheimiſche Sänger darſtellende Farbendrucktafel** folgen ſoll. — Wir hoffen dadurch die bisherigen Abnehmer umſo feſter an unſer Blatt zu feſſeln und auch viele neue Freunde demſelben zuzuführen.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

An unsere Abonnenten!

Sie haben in dem nunmehr vollständig gewordenen XXVII. Jahrgang (1898) der „Gefiederten Welt“ ein Bild vor sich, in welcher Weise die Schriftleitung wie die Geschäftsstelle bemüht gewesen sind, sich die Zufriedenheit ihrer Leser zu erwerben.

Gefällt Ihnen das bisher Erreichte, und wollen Sie mindestens ein Gleiches für die Folge gewährleistet haben, so werben Sie unter den massenhaft zu findenden Vogelliebhabern **neue Freunde für unsre „Gefiederte Welt“!**

Die Einsendung neuer Adressen von Vogelliebhabern, denen wol eine Probenummer willkommen sein könnte, ist vor wie nach erwünscht und wird mit bestem Dank im Voraus entgegengenommen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Vogelliebhaber

erhalten auf Wunſch koſtenlos und poſtfrei unſre 32 Seiten umfaſſende **illuſtrierte Verlagsbroſchüre.**

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

P. P.

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur

„mit Nachlieferung“

bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert die Post nur vom Tage der Bestellung ab. Die inzwischen erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem Besteller dann nicht zugehen.

Also, bitte, **„mit Nachlieferung“!**

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Den vielfach ergangenen Nachfragen zu begegnen, theilen wir hierdurch mit, daß wir die noch jetzt vorhandenen, nicht oder doch nur wenig illuſtrirten

☛ Alten Jahrgänge ☚

der „Gefiederten Welt“ ſauber broſchiren ließen und nunmehr ſtatt für M. 6.- zu M. 4.— für den einzelnen Jahrgang zur Verfügung ſtellen; 5 Jahrgänge auf einmal bezogen koſten M. 12.—, 10 Jahrgänge M. 20.—! Vorhanden ſind noch die Jahrgänge 1877—1880, 1882—1893.

Die **reich illuſtrirten** 1894er, 1896er, 1897er, 1898er Jahrgänge ſind ſauber in Umſchlag geheftet nur zum Preiſe von M. 6.—, elegant gebunden zum Preiſe von M. 7.50 zu haben, während vom 1895er Jahrgang das I. Vierteljahr fehlt, demnach nur noch das II. bis IV. Vierteljahr (pro Vierteljahr M. 1.50) zu haben iſt.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Brehm's Thierleben, neueſte Aufl., 10 Bd., ſehr ſchönes Exempl., ſtatt 150 ℳ für nur 85 ℳ, v. Kerner, Pflanzenleben, neueſte Aufl., 2 Bd., ſtatt 32 ℳ für nur 20 ℳ, Ratzel, Völkerkunde, 3 Bd., ſtatt 48 ℳ für nur 28 ℳ, alle Bücher ſind ſehr gut erhalten. Verſandt gegen Nachnahme. [70]

C. Thesing, Blankenburg, Harz.

Bei uns erschien:

Der Sprosser oder die Aunachtigal

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gesangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber und Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung.
Magdeburg.

Soeben erschien:



Preis jeder Lieferung Mk. 1,50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Beſitzer des

Handbuch für Vogelliebhaber

von **Dr. Karl Ruß**

in früheren Ausgaben ſtehen die dem Werke jetzt beigegebenen Illuſtrationen, beſtehend in

28 Vollbildern fremdländiſcher Stubenvögel

(zu Band I), ſowie

25 Vollbildern einheimiſcher Stubenvögel

(zu Band II)

für den Preis von je nur 1 Mark

durch jede Buchhandlung, ſowie in der unterzeichneten Verlagshandlung ſelbſt zu Dienſten.

Das **Illuſtrirte Handbuch** koſtet auch jetzt noch, wie bisher, für

Bd. I (Fremdl. Stubenv.) broch. 6.50, geb. 8 ℳ
„ II (Einh. Stubenv.) „ 6.— „ 7.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.

Anzeigen.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die

Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [9]

Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Geſetzl. geſchützt.

Mehlwürmer, [10]

ausgeſucht ſchöne, geſunde Futterware, empfiehlt porto- u. verpackungfrei 1 Ko. 7,75 ℳ, ½ Ko. 4,— ℳ Garantie für Vollgewicht bei Ankunft. Größere Quantitäten billigſt.

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Ameiſeneier,

1898er Ia geſiebte, ſandfreie Ware,	per	Kilo	ℳ	3,20
Weißwurm, prima	„	Liter	„	1,—
Muska	„	„	„	0,90
Univerſalfutter, extra	„	Kilo	„	1,20
Mohnmehl, weiß	„	„	„	0,60
Sonnenblumenk., weiße	„	„	„	0,60
Reis in Hülſen	„	„	„	0,60
Ossa sepia, prima	„	„	„	3,–
Sommerrübſen, Ia großkern. ſüß	„			0,44

Ferner Mohar-, Senegal-, Kolben-, weiße **Hirſen, Mohn** und alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [11]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

1898er hochprima getrocknete und ſorgfältigſt gereinigte [12]

Ameiseneier,

1 Liter mit 85 ₰ liefert

Gottlieb Wanek, Vogelhdl.

Prag (Böhmen).

Mehlwürmer,

rein reell gemeſſen, Ltr. 4,25 ℳ, Kilo 7,75 ℳ, 1000 Stck. 1,60 ℳ **Anweiſung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer** 30 ₰, **Ameiſeneier**, nur feinſte, ſtaubfreie Ware, pr. Ltr. 80 ₰, Kilo 3,75, 10 Ltr. 7 ℳ, **Weißwurm** feinſter Beſchaffenheit, Ltr. 80 ₰, **Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln, Neſter, Samen u. a.** Preisliſte poſtfrei. [13]

Theodor Frank, Barmen.

Mehlwürmer, vegetariſch gefüttert, 1000 St. ℳ 1,25, bei vorheriger Einſendung v. ℳ 1,60 in Briefmarken **portofrei,** verſendet zu jeder Zeit [14]

B. Glöckner, Chemnitz, Peterſtr. 15.

Ameiſeneier

hochprima, beſtgereinigte Qualität, per Liter 80 ₰, per 10 Liter ℳ 7,50. [15]

Futter für Inſektenfreſſer

I. Qual. p. Ko. ℳ 2, II. Qual. p. Ko. ℳ 1,20.

Sommerrübſen Ia ſüß

per 5 Ko. ℳ 2,20, per 50 Ko. ℳ 18.

Singfutter für Kanarien per Ko. ℳ 72

empfiehlt **Carl Kämpf, Mainz.**

Mehlwürmer,

rein gewogen, ℔ 4 ℳ [16]

A. P. Hansen, zool. Handlung.

Hannover.

Suche Pelz- und Speckkäferlarven.

Hosang, [17]

Magdeburg, Hohepforteſtr. 40 b III.

Vögel.

!!Kanarienvögel!!

Meine weltbekannten, tieftourenreichſten 1898er Sänger ſind in großartigſter Auswahl alle wieder geſangsreif u. beſtens ſortirt. Liefere garantirt reell überallhin, ſteigend nur nach Geſangsgüte, à Stück 10, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ, Nachnahme oder Betrag vorher. [18]

Julius Häger,

St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864. Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Prachtvoll tief und langgehende

Hohl- und Baßroller

à 10, 12, 15 und 20 Mk. franko Nachnahme. Garantie für Werth und geſundes Eintreffen, eventl. Rückzahl. des Betrages. Dutzendweiſe zu 72, 84 und 96 Mk. Ia Zuchtweibchen St. 1,50 Mk. [19]

Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Kanarienvögel,

wirkl. echte Harzer, tiefe tourenreiche Sänger. Stamm m. ſilb. u. gold. Medaille prämirt, à 8 30 ℳ je nach Geſangsleiſtung. Verſ. u. Garantie d. Werths u. geſ. Empfang. **Preisliſte frei.** Probezeit geſtattet. [20]

W. Walter, Großzüchterei,

St. Andreasberg i. Harz 76.

Dompfaffen,

ſtrm angelernt, ſind noch etliche im Januar bis März von mir zu beziehen. [21]

F. Schlag, Steinbach-Hallenberg b. Schmalk.

Geſucht: Granataſtrilde, Buntaſtrilde, Wiener's Aſtrilde, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen.

F. Beedzler, [22]

20, Norton Folgate, **London** (England).

Doppelgelbkopf-Papagei!

Ein Prachtexemplar in Farbe u. Gefieder, äußerſt zahm u. Prima-Sprecher erſten Ranges, ganz vorzüglich rein u. deutlich ſprechend u. auf Kommando militäriſch exerzirend, hochamüſant und einzig da in ſeiner Art, ohne Fehler u. ohne Tadel in jeder Beziehung, **für nur 150 Mk.,** unter Garantie u. geſunde Ankunft; dito ein ſehr viel ſprechenden **Blauſtirnamazonen-Papagei,** ſehr viel, ſehr rein, ſehr deutlich, fleißig, ganz allerliebſt ſprechend, äußerſt zahm, täglich Neues lernend, **für nur 80 Mk.** unter jeder Garantie u. geſunde Ankunft offerirt [23]

F. Rejsek, Hamburg, Peterſtraße 28.

---

[24]

Gutſprechender

rein u. deutlich deutſch ſprechender **Graupapagei,** großes, ſtarkes Prachtexemplar, abſolut kerngeſund, fingerzahm, tadellos ſchmuck im Gefieder, **vollſtändig akklimatiſirt u. abgehärtet,** ſelten **talentvoll** beanlagt und artiger Vogel, ſpricht gegen 150 Wörter in ganzen Sätzen (nichts Unartiges), ſingt 1 Lied, überhaupt ein ſelten gelehriger und fleißiger Sprecher, ausführliches Sprachverzeichniß gern zu Dienſten, **feſter Preis 125 ℳ.** Es empfiehlt ſich, dieſen Vogel ſelbſt anzuhören. Garantie für tadelloſe geſunde Ankunft.

Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Unſeren geehrten Abnehmern bringen unſere anerkannt guten

Kanarienvögel

beſtens in Erinnerung. [25]

Pet. Rob. Erntges,

Elberfeld und **Duisburg.**

Mathilde Erntges, Elberfeld.

Hochfeine prämirte

Harzer Edelroller

(Stamm Trute), welche vorzüglich in Hohlrolle, Knorre, Klingelrolle, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 8, 10, 12, 15, 20 ℳ. Zuchtweibchen 1,50 ℳ verſende gegen Nachn., bei achttägiger Probe. Nichtgefallende tauſche um, ev. Betrag zurück, gebe zwei St. Zuchtweibchen gratis bei. [26]

Wilh. Keye, Thale, Harz.

Weisse Dohlen

P. 30 ℳ, einzeln 15 ℳ, Singdroſſeln u. Schwarzamſelmännchen à 3 ℳ, Schwarzplättchen m. Ueberſchlag à 5 ℳ, Bartmeiſen, richtige P. 5 ℳ, 5 P. 20 ℳ, Zippammer P. 5 ℳ, Zaunammer P. 4 ℳ, Grauammer P. 2 ℳ, prima Holländerkanarien m. großen Krauſen P. 15 ℳ, Schamadroſſeln, vorzügl. Sänger, à 30 ℳ, Wanderdroſſel 25 ℳ, Weißohrbülbül à 5 ℳ, Roſenſtare à 6 ℳ, Alpendohle 12 ℳ, Tannenheher 10 ℳ, Sperlingseule 50 ℳ, Zwergohreule 5 ℳ, Steinkauz 5 ℳ, Rauhfußkauz 15 ℳ, Waldkauz P. 4 ℳ, à 2 ℳ, Schleiereule P. 5 ℳ, à 3 ℳ, Thurmfalken à 2 ℳ, Steinadler à 30 ℳ, Schreiadler à 10 ℳ, Jungfernkraniche à 30 ℳ, P. 50 ℳ, blaue Pfauen i. P. P. 25 ℳ, ſchwarze Schwäne P. 90 ℳ, Smaragdenten P. 12 ℳ, Gold- u. Silberfaſanen i. P. P. 25 ℳ, Hohltauben P. 4 ℳ, Turteltauben P. 4 ℳ, weiße Lachtauben P. 4 ℳ, gelbe Lachtauben 5 P. 6 ℳ, roſenköpfiger Zwergpapagei P. 25 ℳ, weiße Reisfinken P. 6 ℳ, jap. Mövchen P. 3 ℳ, gelbe Wellenſittiche P. 25 ℳ, Singſittiche P. 32 ℳ, blauer Biſchof P. 15 ℳ, Zwergwachteln P. 8 ℳ, Sperbertäubchen P. 4 ℳ [27]

Preisliſte über Säugethiere auf Verlangen gratis und franko.

Häusler, Wien I, Annagaſſe 18.

Tadelloſe junge Wellenſittiche

Weibch. à 3,50, Männch. 3, P. 6 ℳ [28]

Frau **Fritsch, Straßburg,** Kellermannſtaden.

Vögel aller Art,

gut eingewöhnt, zu billigſten Preiſen. **Kanarienhähne** 5—10 ℳ, Weibch. 1 ℳ, vegetabl. gezücht. **Mehlwürmer** 1000 St. 1,50 ℳ. Bei Anfr. erb. Rückporto. [29]

A. Seyfert, Magdeburg-Neuſt., Morgenſtr. 4.

Anzeigen.



No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.

No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50

Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.–**

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

☞ Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige für Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc.** mit **sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [30]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Cayenne-Kanarien

prachtvoll à P. 20, à Mch. 12, à Wbch. 8.

Norwich-Kanarien prachtvoll à P. 20, à Mch. 12, à Wbch. 8.

Rothe Kardinäle à P. 14, à Mch. 8½, à Wbch. 5½.

Grasſittiche à P. 9, à Mch. 5.

Pflaumenkopfſittiche à P. 10, 3 P. 28.

Wellenſittiche import à P. 6, 5 P. 29.

Calif. Wachteln à P. 14, à Mch. 5.

Hüttenſänger à P. 10, à Mch. 7

Sonnenvögel abgehörte Männchen à Stck. 4½, 3 Stck. 13, 5 Stck. 20, à Wbch. 2.

Graukövf. Zwergpapageien à P. 2½, 3 P. 7.

Graue Kardinäle à P. 9, à Mch. 5.

Weiße Reisfinken à P. 7½, 3 P. 21.

Schwarzk. Nonnen, Muskatfinken, Tigerfinken, Helenafaſänchen, Broncemännchen à P. 2, 5 P. 8

Feuerweber, Männchen in Pracht, à St. 2½, 3 Stck. 6.

Mövchen bunt à P. 3, 3 P. 8, 5 P. 12½.

Sperbertäubchen à P. 4.

Chineſ. Zwergwachteln à P. 9 [31]

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Dompfaffen,

ſelbſtdreſſirte, 2 Lieder ſi. flötend u. Garantie. Beſte Referenz. [32]

Jenn Schmidt, Lehrer, **Schlotzau,** [illegible]

Reell!

Weg. Aufg. meiner Vogelſtube verk. billig:

1 Pirol,

ſchönes hochgelbes Männchen, zahm und fleißiger Sänger, ℳ 10, **1 Davidzippe,** dito ℳ 8, **1 Rothkehlchen** ℳ 1,50, **1 Müllerchen,** fleißiger Sänger, ℳ 2,50, **1 Schwarzplättchen,** la ℳ 4,50, **1 P. Schneemeiſen** ℳ 4,50, **1 P. Bartmeiſen,** ſelten ſchön im Gefieder, ℳ 6,50, **1 P. Zaunkönige** ℳ 6, **1 Sperbergrasmücke** ℳ 4, **1 Gelbſpötter,** la ℳ 6, u. **1 Zwergſtrandläufer.** Garantie für geſunde Vögel u. gute Sänger. [33]

Feldt, Berlin, Dämmſtr. 5 III.

Harzer Edel-Kanarien m. mit tiefen Hohl-, Flöten-, Klingel- u. Knorrtouren v. 7,50 bis 30 ℳ, Wbch. 1–1,50 ℳ. Verp. frei. Weiteſte Gar., verſ. ſeit 1879 nur eig. Zucht. [34]

H. Gantz, [illegible]

☞ [illegible] **Harzer Kanarienvögel** 1. Staatspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Klingelroller à 10–25 ℳ [illegible]

Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [35]

Metall-Käfige

für Weichfreſſer in eleganter ſolider u. praktiſcher Ausführung empfiehlt zu billigſten Preiſen [36]

Th. Kapff Nchf., Ludwigsburg.

☞ Kataloge, auch über Artikel für Kanarienzucht, grat. u. franko.

☞ Jahresanzeige! ☜

Raſſe-Holländerkanarien

v. 10–50 ℳ p. St., höchſt prämirt. Retourm. [37]

B. Ziegler, München, Frauenſtr. 13.

Verk. oder vert. auf Vögel:

70 gut präparirte **Schmetterlinge** zu 10 ℳ, darunter theuere Sorten. [38]

Georg Stahl, Dietlingen b. Pforzheim.

☞ **1 Kanarienvogel,** ſingt „Wer will unter die Soldaten" ꝛc. ꝛc. Garantie. Preis 45 ℳ [39]

Beck, Stuttgart, Bahnhofſtr.

☟ ☟ ☟ ☟

14 Tage auf Probe

verſende ich überallhin auf meine Gefahr nur prima

ff. Harzer Kanarienvögel,

gehen in Knorre, Hohl- u. Klingelrolle, ſowie Du-Pfeifen u. Kluckerrolle, à St. 10, 12, 15, 20, 25 ℳ, mit Porto u. Verpackung, und gegen Nachnahme, bei Nichtzufriedenheit nehme die Vögel gegen Umtauſch oder zahle den Betrag zurück. Gute **Zuchtweibchen** 1,50. Anfr. mit Retourm. erbeten.

L. G. Müller, Vogelzüchterei,

[40] **Nordhauſen a. Harz.**

Stiglitze,

ganz prachtvolle Vögel, Männch. Dtz. 9 ℳ, Weibch. Dtz. 4 ℳ, Bluthänflinge Dtz. 9 ℳ, Spechtmeiſen P. 10 ℳ, Goldhähnchen P. 10 ℳ, [illegible] Sänger, 10 ℳ, Mehlwürmer Lt. 1,50 ℳ liefert u. Gar. [41]

Findeis, Thierhandl., **Wien I.** Wollzeile 25.

Graupapagei,

1 Jahr alt, ganz zahm, ſpricht gegen 60 Wörter und ganze Sätze mit Betonung, feſter Preis 85 ℳ, gegen Voreinſendung [illegible] [42]

W. Kuhne, Blaſewitz, [illegible]

Empf. Waldvögel:

Stieglitze, Rothhänfl., Rothkehlch. u. Edelfinken à 1,50–2 ℳ, Zeiſige, Girlitze u. Kreuzſchnäbel à 1–1,50 ℳ, Goldammern, Grünfinken, Tannenfinken u. Blaumeiſen à 0,75–1 ℳ, rothe Dompfaffen 2,50–3 ℳ, dito blaue à 1–1,50 ℳ, Amſeln u. Droſſeln à 5–8 ℳ, Stare, Elſtern, Dohlen u. Eichelheher à 2–3 ℳ, Lachtauben Zuchtp. 2 ℳ, Eichhörnchen (zahm) à 2,50 ℳ. Vom April ab Nachtigalen, Sproſſer, [illegible] u. alle Grasmückenarten zu billigen Preiſen. Garantie für Hähne u. gute Ank. Mehlwürmer à Pfd. 4 ℳ. Bei Anfragen Rückporto erbeten. [43]

A. Schulz, Zool. Handl.,

Breslau I, Altbüßerſtr. 36.

Prima 2 Lieder pfeifende

Dompfaffen

à 30–40 ℳ offerirt u. Garantie u. 4 Tage Probe [44]

K. Diehl III.

Angersbach, Oberheſſen.

Meine ſelbſtgezüchteten ff.

Kanarienſänger

verſende vom 1. Novbr. ab, unter Garantie des Werthes und lebender Ankunft, zu 9, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ à St. [45]

Carl Trute, St. Andreasberg, Harz 146.

NB. Bei Anfrage Rückporto erbeten.

Kanarienvögel.

Empfehle meine tieftourenreichen Sänger von 8–36 ℳ. Leiſte Garantie für Werth u. leb. Ankunft, gebe 8 Tage Probezeit, tauſche um, evtl. zahle d. Betrag retour, [illegible]

Wilh. Schick, St. Andreasberg i. H.

vormals **W. Schwanebeck.** [46]

Prima Kanarien-Hohlroller

zu herabgeſetzten Preiſen à 7 u. 8 ℳ, 6 St. 30 ℳ, Weibchen 1 ℳ. [47]

C. Fr. Deyl,

Großgraupa b. Pillnitz a. d. Elbe.

☞ Achtung! ☜

Thüringer Waldvögel:

Dompfaff, roth 2,20 ℳ, blau 1 ℳ, Stieglitz, Rothhänfling, Kreuzſchnabel, Rothkehlchen à 1,50 ℳ, Zeiſig, Buchfink à 1 ℳ, Bergfink, Goldammer, Grünfink à 80 ₰, Meiſenarten à 1 ℳ, Amſel, Schwarzplättchen, laut ſingend à 5 ℳ, Turteltaube à 6 ℳ per Nachnahme. **Garantie lebender Ankunft, ſichere Männchen.** [48]

Hermann Graf, Vogelhandlung,

Sonneberg i. Th.

Harzer Kanarienvögel

(Trute'ſche Hohlroller),

Zuchtvögel auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämiirt, verſende [illegible] welche [illegible] Hohlrollen, Hohlklingel, Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. Du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen [illegible] Ausführliche Preisliſte **gratis und franko.** Weibchen deſſelb. Stammes 2,50 ℳ [49]

C. G. Vodel, Leipzig, [illegible]ſtr. 16.

Harzer Kanarien,

ſehr gute Sänger, werden wegen Aufgabe der Zucht zu herabgeſetzten Preiſen abgegeben, [illegible] [50]

W. Becker, [illegible] **Wetzlar.**

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von August Hopfer in Burg b. M.

Hierzu eine Beilage.

Inhalt der Nr. 2.

Weiteres zur Züchtung der Paradis-Amandine, bzl. Argus-Amandine (Fortſetzung).
Engliſche Vogelliebhaberei.
Ueber freundnachbarlich niſtende Vögel (Schluß).
Der Schneefink (Schluß).
Die Bewerthung der Kanarienvögel auf den Ausſtellungen (Fortſetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Zu unſerm Bilde.

Anzeigen.

Annahme von Anzeigen in der **Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** ſowie in allen Annoncengeſchäften

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.


Die gefiederte Welt
Wochenschrift für Vogelliebhaber Züchter und Händler
Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß
Magdeburg
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
R. & M. Kretschmann.

☛ **Verkleinerte Zeichnung der Decke!**

Wir haben für den 1898er Jahrgang der „Gefiederten Welt“

braune Einbanddecken

in Schwarz- und Goldpreſſung

nach Zeichnung des bekannten Malers Emil Schmidt herſtellen laſſen, welche wir unſeren geehrten Abonnenten

für nur 80 Pfg.

zur Verfügung ſtellen. Jede Buchhandlung beſorgt dieſelben! Nach Orten, in denen keine Buchhandlungen ſind, verſenden wir direct gegen Einſendung von M. 1.— (incl. Porto).

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

☛ **Verkleinerte Zeichnung der Decke!**

Importirte

echt auſtraliſche Wellenſittiche mit dunkelblauen Füßen, prachtvoll intenſivem Gefieder, richt. Zuchtp 6 ℳ, 3 P. 16,50 ℳ, 5 P. 25 ℳ, do. einzelne Mch. zur Blutsauffriſchung St. 2,75 ℳ, **Wellenſittiche,** ausgefärbte Pare, 5 ℳ, 3 P. 13,50 ℳ, 5 P. 20 ℳ, **Graukövfchen,** prachtvolle Zuchtpare, 2,50 ℳ, 3 P. 6 ℳ, 5 P. 8,50 ℳ, import. **Zebrafinken** Zuchtpar 5 ℳ, **Singſittiche,** prachtv. Zuchtpare, 30 ℳ, **Chin. Nachtigalen** (ſelten ſchön), extra ausgeſuchte Doppelüberſchläger, 5 ℳ und von allen in Nr. 1 ausgebotenen Vogelarten noch Vorrath. Reelle Bedienung; Garantie f. lebende und tadelloſe Ankunft. [71]

Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

Ein verzinntes Papageibauer,
75 cm hoch, 40 cm Durchm., preisw. z. verk.
[72] **Marie Puhlmann,**
Burg b. M., Schartauerſtr. 37.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [73]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.



Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Netzfallen,** kleine 80 ₰, größ. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ, **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [74]
Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112.
Illuſtrirte Preisliſte gratis.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [75]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.



Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [77]
☛ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☚
Arthur Herrmann & Luther, Oschatz i. S.

Futtermittel.

Suche Pelz- und Speckkäferlarven.
Hosang, [78]
Magdeburg, Hoheſpforteſtr. 40 b III.

! Gut gereinigtes Vogelfutter !
ohne jede weitere Anpreiſung wie Ia, prima u. a., verſende nur wirkl. beſte Ware.

Sommerrübſ.	5 Ko.	1,70 ℳ,	1 Ko.	40 ₰
Glanzkorn	„ „	1,30	„ „ „	30 „
Silberhirſe	„ „	1,80	„ „ „	40 „
Schälhafer	„ „	1,80	„ „ „	40 „
Senegalhirſe	„ „	2,00	„ „ „	50 „
Sonnenroſenk.	„ „	1,80	„ „ „	50 „
Hanf	„ „	1,60	„ „ „	40 „
Carottengries	„ „	4,50	„ „ „	110 „
Droſſelfutter	„ „	4,00	„ „ „	100 „
Nachtigalfutt.	„ „	7,00	„ „ „	200 „

Ameiſeneier 1 Lit. 80 ₰, 10 Lit. 7,50 ℳ.
Alle anderen Futterſort. bill. Prsl. frei. [79]
H. P. Lange, Samenhdl., Gottesberg i. Schl.



Die von Herrn Dr. Karl Ruß in ſeinen Werken immer empfohlenen

Frühauf'schen Nistkasten,

prämirt in London, Berlin u. a., empfehle billigſt. Händlern und Vereinen Rabatt. [76]

Carl Frühauf in Schleuſingen, Thür. Wald.



ein wenig beſchleunigtern und verſtärktern Heben und Senken des Unterleibs die erſten Anzeichen des beginnenden Legens bemerkte; aber richtig, am nächſten Tag, dem 4. Dezember v. J., lag das erſte Ei im Neſt, dem am 6. Dezember ein zweites folgte. Beide Eier wurden anſcheinend ohne beſondere Beſchwerden gelegt, und dennoch fand ich leider am nächſten Morgen das Weibchen verendet im Futternapf liegen. Ein unglückliches Zuſammentreffen der Umſtände wollte es, daß ich an demſelben Tag gerade abweſend vom Hauſe war, andernfalls wäre es mir vielleicht noch möglich geweſen, es am Leben zu erhalten. — Wenn ich natürlich das Eingehen dieſes faſt unerſetzlichen Vogels, auf den ich ſo große Hoffnungen geſetzt hatte, auch ſchmerzlich beklagte, ſo blieb mir doch die Genugthuung, ſchon nach einer Woche dieſe ſchönen Amandinen zum Niſten gebracht zu haben, ſowie die Hoffnung, aus den beiden Eiern vielleicht jungen Nachwuchs erſtehen zu ſehen. Dieſe Hoffnung zeigte ſich nun freilich ſpäter ebenfalls als eine trügeriſche, denn die japaniſchen Mövchen, denen ſie unterzulegen ich gezwungen war, brüteten unſicher, und die als gut befruchtet ſich erweiſenden Eier gelangten nicht zur vollen Zeitigung. Die Eier ſelbſt ſind, der Größe des Vogels angemeſſen, ziemlich groß, 17 : 14 mm, weiß, glattſchalig und durchſcheinend. – Doch noch war das Spiel keineswegs verloren; noch war mein niſtluſtiges Baſtard-Weibchen Rothkopf-Bandfink da, das nunmehr ſogleich in die geriſſene Lücke einſpringen mußte, und über deren ferneren Brutverlauf die Fortſetzung dieſes Berichts handeln ſoll.

(Fortſetzung folgt)

Engliſche Vogelliebhaberei.

Von Albert Rettich.

Leider kommen bei der hieſigen Liebhaberei vielerlei Grauſamkeiten vor, von denen nur einige genannt ſeien. Es kommen jährlich ungefähr eine viertel Million kleine Singvögel in den ſogenannten Harzer Bauerchen nach England herüber. Etwas Beſſeres für den Transport der Vögel läßt ſich nicht denken, aber nur für den Transport! Hier in London allein werden Tauſende und aber Tauſende von friſchgefangenen Vögeln in noch kleinere Bauer geſteckt und kommen während ihrer Lebenszeit nicht wieder heraus. Die Menſchen leben zu eng eingepfercht und haben zu wenig Platz für ſich ſelbſt, geſchweige denn für Vogelbehälter der richtigen Größe. Dann lieben es die Arbeiter auch, einen oder zwei Sänger mit auf die Werkſtätte, hauptſächlich aber mit zum Bier zu ſchleppen, und da muß er eben an einen möglichſt kleinen Käfig gewöhnt ſein. Dann wird er in verſchiedenen Wirthshäuſern an die Wand gehängt, um etwas zu lernen oder unter Umſtänden ein Wettſingen abzuhalten oder einen günſtigen Verkauf zu erzielen, und zu alledem iſt das zu kleine Bauer doch gut genug. Warum aber der Flachsfink, der nicht herumgeſchleppt wird, in einem Gefängniß verharren muß, das nur fünf Zoll lang und vier Zoll breit und hoch iſt, kann nur dadurch erklärt werden, daß der Preis nur 30 Pfennig beträgt. Der innere Flächenraum iſt noch dadurch um vier Kubikzoll vermindert, daß ein zollbreites Leiſtchen unter der Thür befeſtigt iſt, welches als Futternapf und Sitzſtange zugleich dient. Dieſe Seite wird an die Wand gehängt, um das Zerſtreuen der Sämereien zu verhindern und gegenüber, nach der Stube zu, hängt das blecherne Waſſernäpfchen außen. Von einem Sandſchieber iſt keine Rede. Man kratzt den Boden durch eine Lücke im Rahmen. Darin ſoll ſich nun das arme Rothkäppchen ſeines Daſeins erfreuen.

Für größere Finken wird dies Prinzip auch aufrecht erhalten, nur wird die Höhe um drei Zoll vergrößert.

Am häufigſten ſieht man Buchfinken in ſolchen Zwingern, deren Elend noch dadurch verſchlimmert wird, daß ſie nach zwei- oder dreitägigem Einſatz des Augenlichts beraubt werden und nun ein freudenloſes Leben beginnen, das ſich auf zwei Stäbchen abſpielt, die je vier Zoll lang ſind und von welchen aus Waſſer und Futter durch den Gefühlsſinn erreicht wird. Dieſe Blendung iſt an und für ſich eine Unmenſchlichkeit, die in keinem Land der ziviliſirten Welt entſchuldigt werden kann, aber die Schande der üblen That will ich dadurch einigermaßen vermindern, daß ich den Vollzug derſelben als weniger ſchmerzhaft erkläre, als man im allgemeinen glaubt. Von einem Ausſtechen oder Ausbrennen iſt ſchon ſeit Jahren nicht mehr die Rede; Anwendung ſpitzer oder ſcharfer Inſtrumente findet auch nicht mehr ſtatt; ich gehe ſoweit, meine Leſer zu verſichern, daß nicht einmal Lebensgefahr für den Vogel dabei vorhanden iſt. Aber ich muß auf eine genauere Beſchreibung des Verfahrens verzichten, getreu meinem Vorſatz, unſere Lieblinge möglichſt zu beſchützen. In allen meinen Schriften habe ich mich immer enthalten, dasjenige preiszugeben, was durch Nachahmung einem Geſchöpf nachtheilig werden könnte. Genüge es hier, zu ſagen, daß nach vier Tagen der Vogel von allen Schmerzen frei iſt und in kurzer Zeit anfängt zu ſingen; viel früher als er es beim vollen Beſitz ſeiner fünf Sinne thun würde, und darin liegt der Grund, warum ihm eine dieſer Gottesgaben geraubt wurde. Die Unmenſchen, die dieſe Buchfinken behandeln, kaufen und zum Wettſingen gebrauchen, gehören glücklicherweiſe alle der niederſten Klaſſe an. Hier und da nimmt ein humaner Liebhaber einmal einen in ſeine Vogelſtube auf und erlöſt ihn von ſeinem unreinen, engen Zwinger. Ich erinnere mich zweier ſolcher Fälle, wo ich ſelbſt der Barmherzige war. Vor fünfzehn Jahren erſtand ich einen ausgezeichneten Sänger für ſechszehn Mark, ſetzte ihn in einen langen Käfig mit ſechs Stäbchen, alle auf derſelben Höhe, und in einer Stunde fand er Waſſer und Futter und ſang mit hochgeſtelltem Kopf, was er ſeit Jahren nicht hatte thun können. Das Erfreulichſte war, daß in wenigen Wochen der Vogel wieder anfing zu ſehen und dann jahrelang ein glückliches Käfigleben führte. Dies liefert die Genugthuung, daß die obenerwähnte Behandlung nicht ſo durchgreifend iſt, als man fürchten könnte, denn ich bin

trachten wir die ſonderbare Geſellſchaft genauer! Wir gelangen dann zu der Erkenntniß, daß die ſchutzſuchende Taube oder Eule bittere Erfahrungen durchgemacht haben muß, ehe ſie das Schutzmittel, den Schutzverband, kennen lernte. Ein Verband von höchſt ungleichen Vögeln und unter dem Schutz eines Raubvogels! Das Bild wird ein immer häufigeres werden müſſen, weil die Zahl der Tauben und Eulen ſich verringert, die ihrer Feinde, der Nebelkrähen, ſich unbedingt vermehrt.

Am 22. Juni v. J. machten wir ſogar die Beobachtung, daß zwei Par Ringeltauben ihr Neſt in nächſter Nähe von dem des Baumfalk errichtet hatten.

Auch Thurmfalken niſten gern in kleineren Geſellſchaften, doch dürften ſie nichts Beſonderes für die Beobachtung bieten.

Eins der intereſſanteſten Beiſpiele eines gewiſſen nachbarlichen Einverſtändniſſes iſt: Brachpieper und Triel*). Beide Arten ſind in unſeren Ländern nicht häufig, ſomit weniger bekannt, doch die Mark Brandenburg birgt heute dieſe Vögel noch genug. Charaktervögel eines Landsſtrichs, dem ſie förmlich die Signatur anheften, ſagen ſie uns, wenn wir ihr Lied vernehmen, daß ſie dem Menſchen, der die Hoffnung aufgegeben hat oder ſie aufgeben mußte, ein Wohngebiet nutzbar zu machen, ihren Aufenthalt zu verdanken haben, denn die Kultur iſt die Feindin beider Arten; wo ſie rationell betrieben wird, iſt ihres Bleibens nicht. Betrachten wir ein Wohngebiet der beiden Vögel, dann werden wir erfahren, daß es meiſtens bäuerliches Eigenthum iſt, in ſeltenen Fällen gehört es zum großen Grundbeſitz oder gar dem Staat. Der Boden iſt hoffnungslos und alle die Mühen, ihn zu verbeſſern, ſtehen in keinem Verhältniß mit dem Ertrag; dieſer Zuſtand kommt dem Brachpieper und dem Triel zugute, ſie werden Nutznießer des Landes. Derartige Plätze ſind in unſeren Marken noch genug! Sollten wir weitere Plätze nennen, wo beide Arten ebenſo ihre Lebensbedingungen erfüllt ſehen, dann ſind es ſandige und ſteinige Inſeln oder Dünen, insbeſondre die unfruchtbarſten und ödeſten Theile unſerer Bauernhaiden, die an ihren Grenzen, in hellem Sand verlaufend, ſo bezeichnend „Sandenden“ genannt werden, wo der große, weit mehr der kleine graue Würger ſich ſtets häuslich einrichtet. Beide Arten wohnen gern an den Grenzen der Kultur. Den kleinen grauen Würger muß ich beſonders erwähnen. Es hat mir vielen Spaß bereitet, ihn zu hören, wie er die Stimme manches Vogels täuſchend nachahmen kann, am meiſten, wenn er in der vereinſamten Steppe, von der höchſten Spitze einer verwachſenen Kiefer aus, den Lockruf des Piepers hören läßt. War der Würger neidiſch auf das Liebesglück des Vogels? Nein, ſo muß ich antworten. Vom höchſten Punkt in der einſamen Gegend, von dem aus er auf alles achtet, was ihm gut dünkt, muß er auf den Geſang des Piepers. auf den des Triels ebenſo achten; umſomehr, da ſie beſonders markante Lockrufe haben. Dem Spötter macht es Freude. Uebrigens muß ich dem Würger meinen Dank ausſprechen, wenn er ſeine Kunſt verkündet; ſie ſagt mir, welche Vögel an ſeinem Platz wohnen.

Am 8. Mai v. J. ſah ich verſchiedene Brachpieperpare auf einem dürren, verſandeten und verſengten Kiefernboden, deſſen obendrein kümmerlicher Wuchs vollſtändig durch Inſektenfraß zerſtört worden war. Die Stämme glichen nackten Gerippen, nur noch Aeſte, doch keine Nadeln mehr waren an dieſen vorhanden. Ich vermuthete, daß ein derartiger Zuſtand die Brachpieper mehr wie ſonſt herangelockt hat und ſie hier ihre volle Thätigkeit ausüben könnten. Sie mochten ſoeben aus dem Süden heimgekehrt ſein und luſtig ließen ſie ihr helles „triblin, triblin“ im Flug ertönen. Am 22. Mai ſah ich ſie an demſelben Platz, ebenſo am 29. Mai. Mehrere Brachpieper gingen vor unſeren Füßen auf und verſuchten uns vom Platz fortzulocken. Erſt nach einer langwierigen Suche, obendrein im Sonnenbrand, finden wir ein volles Neſt, enthaltend fünf Eier des Neſtvogels und ein Kukuksei; die Eier ſind ein wenig bebrütet. Zum letztenmal hörte ich Brachpieper, die gewöhnlich Ende Auguſt von uns ziehen, am 15. September v. J., ihr Lied, wie ſtets, im Flug ſingend, doch war der Ruf nicht mehr ſo hell und hoch, ſo laut und freudig, wie einſt im Mai. Gleichſam als Begleitung zum Abſchied antwortete der Triel.

Der Triel kommt ein wenig früher zu uns, wie der Brachpieper, Mitte, bzl. Ende April. Die eigentliche Heimat dieſes Vogels ſind die Länder Südeuropas, Nordafrikas und Weſtaſiens, in denen es wirkliche Wüſten gibt. Die Wüſte mit ihrem Flugſand würde er bevorzugen, wenn ſich ihm Gelegenheit bietet, doch haben wir derartige Plätze nur in verſchwindend kleinem Maß. Er muß ſich begnügen mit den ſprichwörtlich bekannten Verhältniſſen Brandenburgs; in den entlegenſten und unwirthbarſten Theilen werden wir ihn ſtets antreffen. Charakterbaum iſt ihm krüpplige Kiefer; auf dem Boden, wo dieſer genügſamſte unſerer Bäume mit allem Willen kaum gedeiht, lebt außer ihm noch der Brachpieper. Ein derartiger Platz, den ich im vergangnen Jahr wiederholt beging, wurde bewohnt an einem Endtheil (verkommene Kiefern) von kleinen grauen Würgern und beſucht von Blauraken; an dem andern, dem ſich ein von jedem Pflanzenwuchs entblößtes ſeichtes Gewäſſer anſchloß, von etwa zehn Paren Flußregenpfeifern (Charadrius fluviatilis, *Bchst.*). Dieſe Vögel verdienten bei uns eher den Namen Sand-, als Flußregenpfeifer. An dem ſeichten Gewäſſer waren die Spuren der Dickfüße oft zu beobachten. Wird es ſpät im Jahr, ſo kommen an dieſes unſcheinbare kleine Gewäſſer tagtäglich ungezählte Entenſcharen. Dieſe Beobachtungen erbringen den Beweis, wie wenig dieſe Gegend durch den Beſuch der Menſchen geſtört wird. Hinzufügen muß ich noch, daß der verkümmerte Kieferſtrauch der Liebling des Brachpiepers iſt und dieſer Vogel ſich an der Sonne Gluth und Licht erfreut und der Triel, ſeltſamerweiſe, an der ſtillen und kühlen Pracht des Mondes. Wenn die Nacht hereinbricht, dann erſt iſt ihm wohl! Ob der große Nachbar, der mit anderen Vögeln keine Gemeinſchaft hält, der ſich von Schnecken, Käfern, Fröſchen, Mäuſen, Eidechſen und Schlangen ernährt, dem kleinen gelegentlich ſchadet oder ihm ſein Neſt ausraubt, möchte ich nicht erörtern.

---

*) Oedicnemus crepitans, *Temm.*, auch Dickfuß, Eulenkopf genannt.

Ruhe und Eintracht kennzeichnet die Anſiedlungen unſerer Erdſchwalben als eine Vereinigung der harmloſeſten aller Vögel, wenn auch in ihrer Mitte ein oder mehrere Par Steinſchmätzer (Saxicola oenanthe, *L.*) niſten ſollten, ebenſo die der Mehlſchwalben, die in dreifacher Reihe unter den Geſimſen und Dächern ihre Neſter errichtet haben. Gute Nachbarn ſind Baumläufer (Corthia familiaris, *L.*). Sind Waldverwüſter an der Arbeit, dann niſten ſie faſt gemeinſchaftlich, nicht ſelten zwei Pärchen in einer Baumſpalte oder in einem Holzſtoß; gute Nachbaren ſind auch Trauerfliegenfänger und Rothkehlchen, aber in keinem Fall Blau- oder Kohlmeiſen, die wol imſtande ſind, die erſten Miether einer Höhlung zu verdrängen, wollen ſie dieſelbe in Anſpruch nehmen.

In gutem Einverſtändniß mit einander leben unſere Spechte. Mögen in einem Stamm- oder Aſtende die Höhlen von größeren und kleineren Spechten bezogen worden ſein, die Vögel zeigen ſich verträglich. Sie ſuchen keine Freundſchaft anzubahnen, beläſtigen ſich aber auch nicht gegenſeitig, ſondern betrachten ſich ſo gleichgiltig, als wären ſie nicht anweſend. Ich habe Gelegenheit genug gefunden, Spechte bei der Arbeit oder am Neſt zu beobachten, Streitereien konnte ich nicht wahrnehmen. Daß Buntſpechte zu Kleibern, Baumläufern und Meiſen in ein gewiſſes Verhältniß treten, iſt bekannt genug, doch fordern die Spechte nicht die Führung; die kleineren Vögel folgen ihnen freiwillig.

Ein höchſt lehrreiches Bild, das jedoch ſehr mühſam geſucht werden muß, iſt das nachbarliche Niſten der Zwergrohrdommel und des Zwergtauchers, bzl. des grünfüßigen Rohrhuhns. Mögen die letztgenannten Arten recht verträgliche Nachbarn ſein, die Rohrdommel iſt es allen ſchwächeren gegenüber niemals, ſie achtet nur gleiche oder höhere Kräfte. Aus dieſem Grund finden wir in den unfreundlichſten und entlegenſten Stellen unſerer buſchreichen Gewäſſer, friedlich zuſammenwohnend, Neſt an Neſt der Rohrdommel, des kleinen Tauchers oder des Rohrhuhns und unverſehrt, doch ſelten, die Neſter der Rohrſänger. Nicht der Rohrdommel oder Ralle wegen brauchen Taucher die Eier zu bedecken, die Rohrhühner das Neſt mit einem Schutzdach zu ſchmücken, ſie thun es der Krähen und Weihen wegen. Die Geſchädigten im Sumpf ſind ſtets die ſchwächeren Bewohner, die Rohrſänger; ſie ſind es auch, die durch ihr Verhalten deutlich erkennen laſſen, wie wenig Sympathie ſie für den räuberiſchen Nachbar, die kleine Rohrdommel, hegen. Auch Taucher wohnen gern geſellſchaftlich; kommen jedoch drei Arten, obendrein Waſſerhühner hinzu, iſt es mit dem Frieden der Anſiedler ſchlecht beſtellt.

Der Schneefink (Fringilla nivalis, *L.*).

Von F. Hauſer.

(Schluß).

Ich habe dieſe Vögel ſchon ſtundenlang verfolgt, ohne daß es mir gelungen wäre, einen zu erlegen. Und plötzlich ließ ſich am Ende zu meiner freudigen Ueberraſchung die ganze Schar auf halbe Schußnähe vor mir auf die Karren nieder. Ich habe erfahren, daß beim erſten Knall alle das Weite ſuchten und ihnen ſpäter nicht mehr beizukommen war. In anderen Fällen wäre es mir ein Leichtes geweſen, die ganze Geſellſchaft zu erbeuten. Je mehr ich ſchoß, deſto weniger dachten ſie an Flucht, und als ich den Ort verließ, folgten ſie mir noch eine gute Strecke mit lauten Warnrufen nach. Ob, ähnlich wie bei der Alpendohle, die Anhänglichkeit und Liebe zu den Ihrigen ſie dazu trieb? —

Mit dem allmählichen Rückgang der Schneegrenze in den Monaten Auguſt und September verſchwindet der Schneefink mancherorts auch aus der nunmehr durch die Herden belebt gewordenen oberen Alpenregion und ſtreift weit in die todathmende Gletſcherwelt empor, wo neben ihm allein das Schneehuhn, der Alpenmauerläufer, die Alpendohle und die ſehr ſeltne Schneekrähe längern Aufenthalt nehmen können. Keine der übrigen kleinen alpinen Vogelformen ſteigt ſo hoch wie er. Sein anſpruchsloſes, wetterfeſtes Weſen läßt ſich durch die kargſte, armſeligſte Vegetation noch feſſeln, und Gebiete, welche der gleichfalls wenig verwöhnte Flüevogel, der Waſſerpieper, das Steinhuhn, der Kolkrabe, ſelbſt der königliche Steinadler nur ſporadiſch, nur für kurze Stunden zu beſuchen wagen, erſcheinen dem Schneefink merkwürdigerweiſe noch ſo verlockend und gaſtlich, daß es der rauhen Hand des vorrückenden Winters bedarf, um ihn zum Rückzug in mildere Lagen zu bewegen.

Solange irgend etwas Genießbares aufzutreiben iſt, verweilt der Schneefink an den Flüen und mit Raſenbändern durchzogenen Felsabſtürzen oberhalb der Holzgrenze, wo an vielen Stellen, ihrer Steilheit halber, die Schneeſchicht nicht haften bleibt. Gegen Neujahr hin drängen ihn Futtermangel und Kälte in die Trosbeſtände und in die oberſten Bergwälder, ſpäte Schneeſtürme, wie ſie ſich im Februar und März im Gebirge mit beſonderer Heftigkeit einſtellen, wol bis in die unteren Alpſtaffel und in die Thäler hinab. In ſolchen Lagen wird er jedoch nur ganz ausnahmsweiſe einmal beobachtet, wie ich hierüber bereits in Nr. 16 des vorigen Jahrgangs dieſer Zeitſchrift berichtete. Hat das Unwetter ſich verzogen, gleich treibt es da den kleinen Wanderer wieder aufwärts, hinauf zu den heimatlichen Bergen, zu den wilden Graten und Zacken empor, die in ihrem weißen Mantel gar unfreundlich und unnahbar durch die Nebel in die Thäler niederſchauen.

Im Frühjahr werden die blaß wachsgelben Schnäbelchen der Jungen oberſeits und an der Spitze ſchwarz und das etwas verwaſchene Farben zeigende Gefieder wechſelt mit dem lebhafter und beſtimmter gezeichneten Kleid der Alten. Bei dieſen iſt Kopf und Nacken aſchgrau, die Kehle ſchwarz, weißlich gerandet

Das ganze Gefieder der Unterſeite iſt grauweiß. Der Rücken, die Flügeldeckfedern und die letzten Schwingen ſind kaffeebraun, mit lichteren Federrändern. Alle übrigen Schwingen, bis an die ſieben erſten ſchwarzen, braungekanteten und die achte, außen und an der Wurzel ſchwarze Handſchwinge, ſind reinweiß, ebenſo die Schwanzfedern, mit Ausnahme der ganz ſchwarzen Mittelſchwanzfedern, doch ſchwarz geſäumt. Das Auge iſt dunkelbraun, der Fuß ſchwarz. Die beiden Geſchlechter unterſcheiden ſich nur unmerklich. Im Winter erhalten alle Federn lichtere, breitere Ränder, und dadurch erſcheint das Gefieder im ganzen heller, weißer.

Hierorts bleibt der Schneefink vom Menſchen unbehelligt. Die wenigen Stücke, die gelegentlich für wiſſenſchaftliche Zwecke ihr Leben büßen, fallen in keinen Betracht. Doch müſſen dem harmloſen Finken in der Thierwelt, vielleicht auch in den klimatiſchen Verhältniſſen ſeiner Heimat, gefährliche Feinde auflauern, welche den jährlichen Nachwuchs empfindlich zehnten. Soweit wenigſtens die von mir ſeit Jahren genau beobachteten Gebiete in Betracht fallen, konnte ich eine erhebliche Vermehrung des hübſchen Vogels nirgends feſtſtellen. Jedes Jahr weiſen die verſchiedenen von ihm bewohnten Gebirgszüge ſo ziemlich genau die gleiche Zahl Brutpare auf. Die meiſten Opfer ſind auf Rechnung des Thurmfalken zu ſchreiben, der, im Gegenſatz zu der Lebensweiſe, die er im Thal führt, im Hochgebirge als ſehr gefährlicher, frecher und gewandter Räuber auftritt. Dann und wann eine Brut zerſtört der Kolkrabe und weiter mögen auch Fuchs und Edelmarder, welche ihre Streifzüge bis zur Schneeregion ausdehnen, einzelne dieſer Vögel als willkommene Leckerbiſſen erhaſchen.

Einige Mittheilungen über das Gefangenleben der Schneefinken werde ich gelegentlich ſpäter der Redaktion dieſer Zeitſchrift zur Verfügung ſtellen*).

---

*) Wir bitten ſehr darum. D. L.

Die Bewerthung der Kanarienvögel auf den Ausſtellungen.

Von R. Groſſe.

(Fortſetzung).

Wenn es auch jedem unbefangnen Leſer der vorſtehenden Grundlage für die Bewerthung der Preisſänger auf den erſten Blick klar werden muß, daß es für einen Preisrichter faſt unüberwindliche Schwierigkeiten bieten mußte, jede einzelne der damals noch ſehr mannigfaltig benannten Strofen nach dieſem Verfahren zu bewerthen, ſo war das Beſtreben des Leipziger Vereins, die beſtehenden Mängel zu beſeitigen, doch unter allen Umſtänden anzuerkennen und es hätte nach meiner Anſicht nichts näher gelegen, als auf den gemachten Vorſchlag einzugehen und die aufgeſtellte Bewerthungsweiſe zu verbeſſern und vereinfachen. Dies wäre umſo leichter geweſen, als ſchon zu damaliger Zeit eine Vereinfachung des Namenverzeichniſſes der Strofen des Liedş empfohlen wurde, welche zwar auch hartnäckig bekämpft worden iſt, ſchließlich aber doch infolge des Strebens nach Beſeitigung aller Strofen, die außerhalb des von berühmten Größen empfohlenen und gepflegten Rahmens lagen, eintrat. Bevor man jedoch Zeit fand, ſich mit der Verbeſſerung dieſer „Skala“ zu beſchäftigen, kam aus St. Andreasberg, der ſogenannten Wiege der Kanarienzucht, ein anderes Verfahren zum Vorſchein, das zwar den Anſchein erwecken konnte, als ob die bis zum Jahr 1880 gehandhabte willkürliche Bewerthungsweiſe zu Grabe getragen und feſte Grundlagen geſchaffen worden ſeien, das aber in Wirklichkeit die frühere Art beibehielt und ihr nur ein Geſicht gab, das allerdings noch recht undeutlich und verſchwommen war. Dies war das ſogenannte „Punktirſyſtem“. Der Preisrichter ſollte jedem Vogel nach ſeiner Geſammtleiſtung eine beſtimmte Punktzahl zuerkennen und zwar:

einem 3. Preisvogel 1—10 Punkte
" 2. " 11—20 "
" 1. " 21—30 "

Man glaubte hierdurch alle Uebelſtände beſeitigt zu haben, die Grundlage, für die Leiſtungen der Vögel ſichtbare Bewerthungszeichen den Ausſtellern auftiſchen zu können, war geſchaffen und, was die Hauptſache war, im Grunde genommen konnte die frühere Handhabung der Bewerthung beibehalten werden, denn man war ja nicht genöthigt, die einzelnen Geſangsſtrofen zu bewerthen, ſondern man ſagte, der betr. Vogel hat z. B. 21 Punkte und infolgedeſſen einen 1. Preis oder 14 Punkte, alſo einen 2. Preis erhalten; vielfach wurden auch wol zunächſt die Preiſe und dann die Punkte zuerkannt und man bewerthete alſo: Der Vogel iſt ein guter 2. Preisvogel und kann alſo 19 Punkte bekommen u. ſ. w. Wenn man aber glaubte, durch dieſes Verfahren alle Züchter zufrieden geſtellt zu haben, ſo war man ſehr auf dem Holzweg. Anfangs glaubte man allerdings wol in weiten Kreiſen, daß mit dem „Punktirſyſtem“ den Wünſchen der Züchter Rechnung getragen worden ſei und daß jegliche Klagen nunmehr verſtummen würden. Das neue Verfahren bildete anſcheinend eine feſte Grundlage und erſchien auch kurz und überſichtlich. Aber ſchon nach wenigen Jahren wurden die Schwächen und Mängel, die die neue Bewerthungsweiſe enthielt, fühlbar, man ſah ein, daß durch das „Punktirſyſtem“ die früheren Uebelſtände nicht beſeitigt worden waren, daß vielmehr noch in derſelben unverſtändlichen Weiſe vorgegangen wurde, wie vor Aufſtellung der Leipziger „Skala“; allerdings trug dieſes verſchwommene Bild eine liebliche Maske, nämlich die 30 Punkte, die den Vögeln je nach ihren Leiſtungen zuerkannt wurden. Sobald die Unzulänglichkeit des Verfahrens erkannt wurde, begann man auch, daſſelbe in der Preſſe zu brandmarken. Zum Beweiſe meiner Ausführungen laſſe ich hier einige Aeußerungen folgen, die das „Punktirſyſtem“ mit Nachdruck bekämpften, und es dürfte außerdem für diejenigen Züchter, denen noch nicht bekannt iſt, daß ſchon jahrzehntelang der Kampf gegen dieſe Bewerthungsweiſe geführt wird, überraſchend ſein, zu erfahren, wie heftig gegen dieſes Verfahren, das trotzdem noch heute die Geſammtlage beherrſcht, das aber, ſo hoffen viele Vereine und Züchter, bald mindeſtens in in einer verſtändlicheren Geſtalt ſich zeigen werde, ſeit langen Jahren angekämpft wird. Im Jahr 1884 ſchrieb u. a. ein im Vordergrunde ſtehender Züchter und Preisrichter:

> „Nach dieſem Syſtem wird auch in Zukunft die Werthſchätzung eines zu prämirenden Vogels nur nach der ſubjektiven Beurtheilung des betreffenden Preisrichters erfolgen, indem letzterer dem Vogel je nach ſeiner Geſammtleiſtung den erſten, zweiten oder dritten Preis zuertheilt, und dann erſt auf Grund derſelben Geſangsleiſtung und des ihm zur Abmeſſung des Werthes zur Verfügung ſtehenden Dezimalzahlenraums (1 10) den Grad feſtſtellt, welchen der Vogel ſich errungen. Abgeſehen davon, daß die Preisrichter zu einer Prämirung nach dieſem Syſtem die doppelte bis dreifache Zeit gebrauchen, wäre es zuviel verlangt, daß ein Preisrichter bei den zu prämirenden Vögeln 30 Unterſchiede machen und am Schluß noch denſelben Maßſtab bezüglich der Vertheilung der Points anlegen ſolle, wie zu Anfang, um jedem Vogel dem andern gegenüber gerecht zu werden. . . . die gleichmäßige Zutheilung der Werthpunkte von Anfang bis zu Ende des Abhörens von etwa 150 bis 200 Vögeln iſt ſehr in Zweifel zu ziehen“.

Wenn ſchon der erſte Theil dieſes Gutachtens wol von einer Mehrzahl der Züchter unterſchrieben werden kann (denn es iſt in der That ſchwierig und zuverläſſig nicht durchführbar, in einem Zahlenraum von 1—30 unbedingt die richtige Zahl für die Geſammtleiſtung eines Vogels zu finden), ſo können wir die Wahrheit der letzten Anſicht, nämlich, daß eine gleichmäßige Zutheilung von Punkten bei einer umfangreichen Prämirung in Zweifel gezogen werden muß, mehr oder weniger auf jeder Ausſtellung beſtätigt finden. Diejenigen Züchter, deren Vögel mit niedrigen Preiſen bedacht werden, ſind nämlich nur zu gern geneigt, die ungünſtigen Erfolge der Abſpannung der Preisrichter in dem Fall zuzuſchreiben, wenn ihre Vögel gegen Schluß der Bewerthung abgeurtheilt worden ſind. Wenn ich nun hier gleich die zum Theil von den Preisrichtern in den letzteren Jahren gefallenen Aeußerungen einſchiebe, nämlich, daß das „Punktirſyſtem“ auch die einzelnen Geſangsſtrofen bewerthe und aus dieſen Einzelzahlen die Geſammtſumme bilde, ſo möchte ich in der That einmal die einzelnen Zuſammenſtellungen dreier Preisrichter leſen, die dieſes Verfahren auf die Geſangsſtrofen anwenden, ohne vorher eine beſtimmte Anzahl von Punkten für jede zu Gehör gebrachte Strofe feſtgeſetzt zu haben. Geſchieht dieſe Feſtſetzung aber von Fall zu Fall, ſo hat ſie für die Züchterwelt keinen greifbaren Nutzen. Von einer Einzelbewerthung der Strofen des Kanarienlieds iſt bis jetzt nichts bekannt geworden und ſie wird auch wol durchweg nicht gehandhabt. In den Jahren 1885 und 1886 werden die Bemühungen, die Schwächen des „Punktirſyſtems“ aufzudecken und zu beſeitigen, fortgeſetzt, eine im Jahr 1884 vorgeſchlagene vierklaſſige Bewerthung findet keinen Anklang. Es wird in beiden zuerſt genannten Jahren das Unzulängliche einer Geſammtbewerthung des Vogellieds beſprochen und die Vertheilung der Ehrenpreiſe auf dieſer Grundlage als nicht gerecht bezeichnet. In den folgenden Jahren 1887 und 1888 wird dieſe Art der Begutachtung wiederholt als unzulänglich hingeſtellt, weil die oberflächlich, nur allgemein ſtattfindende Begutachtung des Lieds nach keiner Seite befriedigen könne. So ſchreibt z. B. 1887 ein tüchtiger Kenner und Preisrichter:

> „Die Zahl der nach dem Punktirſyſtem gewährten Points verſteckt ſich häufig hinter die allgemeine ſubjektive Auffaſſung, die trotz annähernder Summengleichheit bei den einzelnen Preisrichtern ganz verſchiedenartig auslaufen kann“

(Fortſetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

… Vogelſtimmen im Munde des Untererzgebirglers. Wenn im März die Sonne mit ihren warmen Strahlen den Schnee thaut, ſodaß ſo rechte Hoffnung auf baldigen Frühling auch in's Herz des Menſchen einzieht, da ſitzt die Kohlmeiſe auf ihrem Aſt und ruft: „Sind ſie da! Sind ſie da!“ Wenn dann die Fröſte nachgelaſſen, ſitzt der Goldammer auf dem kahlen Buſch und ſingt: „Bauer, ſpann an, ich will ziehn!“

Schon ſpitzen die Knospen an Baum und Strauch, und trotz des kalten Reifs, der des Morgens die Zweige einhüllt, ruft der Weidenzeiſig ſein liebliches: „Hier, hier, hier, ſind, ſind, ſind, Sau, Sau, Sau“! Nebenan auf dem Birnbaum ſingt der Fink: „Hitt, hatt, hütt, ich, ich, ich, doch den Winter bald mein' Füßchen erfrört“! Der Star ſitzt bei ſeiner „Kanne“, guckt in den rauhen Morgen, ſträubt ſein Gefieder und ruft verdrießlich: „Pfui, wie kalt, mich friert!“

Und wie vielſeitig ſind im Munde des Volks die Rufe der Zippe (Singdroſſel) benannt, da heißt es: „David, David! Wo kommſt Du her? Aus der Stadt! Aus der Stadt! (lebhafter). Was haſt geholt? Was haſt geholt? Ein alt Pferd! Is'n fett? Is'n fett? Beendärr, beendärr!“ Oder auch: „Dürr Ficht, Dürr Ficht! Holzfraa, Holzfraa! Hacks ab, hacks ab! Der Jäger kimmt, der Jäger kimmt! Reiß aus, reiß aus!“

Kommt ein Nachtſchwärmer ſpät nach Haus, ſo ſitzt ſchon, kaum daß am öſtlichen Himmel das Morgenroth dämmert, das Hausrothſchwänzchen auf der Firſt des Dachs und höhnt: „Fritz, Fritz, kimmſt oh ſchun heem?“

Dann, wenn der Frühling voll eingezogen, tummelt ſich in den Aeſten der Bäume, die den Bach umſäumen, der Pirol und ruft: „Bertho! brüh Häuſer oh! brüh's oll oh! Bertho!“ Der Plattmönch ruft: „Kannſt Du machen, was Du willſt, mich kriegſt Du nicht!“

Die Grasmücke: „Dorchen, Eleonorchen, heute morgen ſchon frühauf“. Und ſo ließe ſich noch Verſchiedenes anführen, ein Beweis dafür, wie innig die Volksſeele mit der Vogelwelt verwoben iſt. H. U.

Anfragen u. Auskunft.

Herrn N. Janke: Der Rübſamen war zwar nicht beſonders ſchön, voll- und großkörnig, aber doch in keiner Weiſe verdorben. Infolge der Fütterung mit demſelben ſind Ihre Kanarien nicht geſtorben. Dagegen fand ich bei zweien derſelben im Magen grüne Zeugfaſern vor, welche jedenfalls von dem grünen Tuch herſtammen, mit dem Sie die Vögel zugedeckt halten. Durch Knabbern daran iſt wahrſcheinlich der

Tod der Vögel hervorgerufen worden. Hoffentlich ſind Ihnen inzwiſchen weitere nicht eingegangen; doch rathe ich, daß Sie das grüne Tuch entfernen oder doch ſo anbringen, daß die Vögel keinenfalls dazu gelangen können.

Herrn Carl J. Schmidt: 1. Ihr Goldbrüſtchen war allerdings an Legenoth geſtorben. 2. Den Prachtfinken regelmäßig das Körnerfutter mit gepulverter Sepia überſtreut zu bieten, würde ich nicht rathen. Vornehmlich wenn Junge vorhanden ſind, kann die Zugabe von jedem Kalk ſchädlich werden, wenn die Alten von letzterm zu viel freſſen und den Kleinen damit die Kröpfe vollſtopfen, während die ihn nicht verdauen können. Sodann hat man namentlich in letzterer Zeit die die Erfahrung gemacht, daß man mit der Darbietung von Sepienſchale vorſichtig ſein muß, weil dieſe vom Salz des Seewaſſers oft zu ſehr durchdrungen iſt und dann den Vögeln ſchädlich werden kann. Bieten Sie Ihren Prachtfinken doch einmal ein Stückchen Kalk von alten Wänden oder Kreide oder gebrannte, bzl. geglühte Auſternſchale. Ein klein wenig von ſolchem Pulver könnten Sie ja hin und wieder auch über das Körnerfutter ſtreuen.

Herrn Fritz Katheder: Geben Sie Ihrer Spottdroſſel mindeſtens 14 Tage hindurch nichts anderes zu trinken, als täglich friſch gekochten dünnen reinen Haferſchleim, mehrmals im Tage ſchwach erwärmt. Zur Abwechslung könnten Sie anſtatt des hartgekochten Hühnereies auch hin und wieder etwas fein zerhacktes gekochtes mageres Fleiſch geben.

Herrn Max Dorn: 1. Es iſt wol möglich, daß das Wellenſittichweibchen die Eier allein erbrüten und auch die Jungen aufziehen wird. Laſſen Sie es nur ungeſtört und bieten Sie das zur Aufzucht nothwendige Futter. 2. Vor dem Lebensbaum habe ich immer gewarnt, weil Liebhaber mehrfach die Erfahrung gemacht haben, daß den Vögeln, namentlich Papageien, das Freſſen vom Lebensbaum verderblich geworden iſt. Entfernen Sie denſelben alſo aus Ihrem Vogelzimmer. Allerdings könnte das Wellenſittich-Männchen ſich ja beim ungeſtümen Umherfliegen das Rückgrat oder den Kopf beſchädigt haben und infolgedeſſen plötzlich geſtorben ſein.

Herrn P. Link: 1. Den Händler, der Sie ſo unreell bedient hat, ſollten Sie verklagen und wir würden dann das gerichtliche Erkenntniß hier zum Abdruck bringen. Vielleicht zieht es der Mann aber doch vor, ſeinen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachzukommen, wenn Sie ihm nochmals ſchreiben. 2. Die von Ihnen genannte Handlung in Wien iſt zuverläſſig und reell. 3. Auf Ihre letzte Frage erhalten Sie brieflich Antwort.

Frau Eveline Wermke: Trotzdem Sie mein Buch „Die ſprechenden Papageien“ beſitzen, haben Sie Ihren Papagei nicht richtig verpflegt, indem Sie ihm 5 Jahre hindurch nur Kaffee zu trinken gegeben. Entziehen Sie ihm denſelben jetzt völlig und geben Sie ihm nichts andres zu trinken, als täglich friſch gekochten dünnen reinen Haferſchleim (ohne Zuſatz von Zucker, Salz, Butter u. a.), mehrmals im Tage ſchwach erwärmt. Als Futter bieten Sie ihm nur ſchwach angekochten beſten Pferdezahnmais, guten vollreifen Hanfſamen und täglich etwa wie eine Wallnuß groß altbacknes Weizenbrot (ohne Zucker, Milch, Butter gebacken) in etwas von dem dünnen Haferſchleim erweicht, von der Schale befreit und gut ausgedrückt. Da die Krämpfe nicht wieder gekommen ſind, geben Sie vorläufig keine Arzenei. Namentlich das Opium reichen Sie in keinem Fall weiter.

Zu unſerm Bilde.

Die Abbildung zeigt drei ſeltene und intereſſante Droſſelarten, die von Zeit zu Zeit in den Handel gelangen.

Augenblicklich im zoologiſchen Garten von Berlin zu ſehen iſt die rothbäuchige Droſſel (Turdus rufiventris, *Vll.*); ſie erſcheint an der ganzen Oberſeite olivengrünlichbraungrau; Kopf reiner grau, Schwingen und Schwanzfedern dunkelolivengrünlichbraun, am Grunde roſtfarbig, Unterflügeldecken roſtroth; Kehle roſtröthlichweiß, braun ſchaftſtreifig; übrige Unterſeite roſtroth; Schnabel hornfarbig; Augen braun; Füße bräunlichgrau. Ihre Heimat erſtreckt ſich über Braſilien, Argentinien, Bolivia und Peru. Sie lebt niemals in großen Schwärmen beiſammen, ſondern nur parweiſe oder in kleinen Flügen. Auch bilden ihren Aufenthalt nicht die weiten Waldungen allein, ſondern ebenſo lichte, einzeln ſtehende Gebüſche. Sie ſoll eine Zierde der Kokoshaine, gleicherweiſe wie des Urwalds ſein, wenn ſie, in der Spitze eines hohen Baumes ſitzend oder im mittelhohen Gebüſch lebhaft umherhüpfend, früh morgens oder ſpät abends ihr Lied erſchallen läßt. Sie iſt die gemeinſte Droſſel im Waldgebiet Braſiliens und beſonders häufig in der Nähe von Anſiedlungen. Ihren Geſang rühmen alle Reiſenden. Prinz Max von Neuwied bezeichnet ihn als laut, volltönend, ſchön flötend, wenn auch weniger abwechſelungsreich als den unſrer Singdroſſel; ebenſo beſchreibt ihn Burmeiſter. Obwol die Ernährung auch dieſer Droſſel vorzugsweiſe in Kerbthieren und Gewürm beſteht, tritt ſie zeitweilig zugleich als ſehr ſtarker Fruchtfreſſer auf; ſo beſonders an den wildwachſenden Papayen- und Melonenbäumen, ſpäterhin an den Mandarinen- und Apfelſinenbäumen, wenn deren Früchte von anderen Vögeln, wie Papageien und Spechten, bereits angehackt ſind. Am gründlichſten iſt ſeitens der Reiſenden ihr Neſt beſchrieben worden. Euler fand daſſelbe mit Gelege oder Jungen im September, Oktober, November und Januar. Meiſtens ſtand es nach den Angaben aller Forſcher in der Nähe von einem Gewäſſer, nach Karl Petermann's Schilderung auch oft unweit von menſchlichen Wohnungen, in vereinzelten Gebüſchen, Hecken, auf Fruchtbäumen, vornehmlich dichten Orangenbäumen in $1{,}_6$ bis $3{,}_2$ m Höhe, doch auch bis zu 33 m und auf bewachſenen Baumſtümpfen nur $0{,}_6$ m hoch. Immer iſt es recht verſteckt, dicht am Baumſtamm ſtehend oder in einer Aſtgabel hängend, ein großer, ſchön geformter Napf, zuweilen nicht rund, ſondern oval aus biegſamen Pflanzenwurzeln geformt und mit feuchter Erde förmlich durchkittet, innen mehr aus Wurzelfaſern und und mit feinen Faſern ausgerundet, ſodaß die Erde nirgends zum Vorſchein kommt, von außen dicht mit grünem Mos verkleidet. In Braſilien wird dieſe Droſſel nicht für den Käfig gefangen, ſondern wenn ein ſolcher Vogel in irgend eine Fangvorrichtung geräth, ſo wird er getötet und verzehrt. Dagegen werden vielfach Junge aus den Neſtern genommen, und mit Mandiokmehl und Milch, gekochtem Reis und Maisbrei, Regenwürmern und hartgekochtem Ei großgezogen.

Nahe verwandt iſt die weißkehlige Droſſel (Turdus albicollis, *Vll.*): an der Oberſeite olivengrünlich röthlichbraun; Oberkopf reiner dunkelbraun; Kopfſeiten dunkel ſchwärzlichgrau; Schwanzfedern ſchieferfarben, olivengrünlichbraun gerandet; Kehle und Vorderhals weißlich, in der Mitte ſchwarzbraun geſtreift, Bruſt grau; Seiten lebhaft roſtroth, unterſeitige Flügeldecken gelblichroſtroth; Bauchmitte und Steiß weiß; Oberſchnabel ſchwarzbraun, Unterſchnabel blaßgelb; Augen braun; Füße hell fleiſchfarbenbraun. Ihre Heimat iſt Braſilien. Sie ſoll nur im Walde leben und zwar im Buſchwald des Binnenlandes und wenig oder garnicht auf den Boden herabkommen. Euler gibt an, daß ſie nicht ſo häufig wie die vorige ſei, aber in Aufenthalt, Lebensweiſe und Brut mit ihr übereinſtimme. Das Neſt ſtehe meiſtens in mittlerer Höhe, gleiche dem der rothbäuchigen Droſſel, ſei jedoch kleiner und nachläſſiger gebaut. Das Gelege bilden bläulichmeergrüne Eier, die zahlreich und gleichmäßiger roſtroth gefleckt und gepunktet ſeien. Bei uns gehört ſie zu den größten Seltenheiten. Im Berliner zoologiſchen Garten wurde beobachtet, daß dieſer Vogel ſich nicht nach Art anderer Droſſeln bewegt, ſondern wie Rothkehlchen oder Steinröthel nach jedem Sprung mit dem Schwanz wippt.

Zu den hervorragendſten fremdländiſchen Sängern gehört Gray's Droſſel (Turdus Grayi, *Bp.*). Ihr Lied erklingt ſo mannigfaltig wechſelreich, ſchön und wohllautend, ohne ſchrille u. a. Mißlaute, daß es zweifellos ſelbſt den Beifall unſerer ſtrengſten Geſangskritiker, oder richtiger geſagt unſerer Geſangskenner, die gewohnt ſind, hohe Anforderungen an die Leiſtungen des Vogels zu ſtellen, finden würde. Die Heimat erſtreckt ſich über Mexiko und Mittelamerika. In der Lebensweiſe gleicht ſie den übrigen Droſſeln. Als Stubenvogel iſt ſie ſehr dankbar und erhält ſich gut bei jedem Droſſelfutter; daneben verzehrt ſie gern Obſt. H. Burghard ſagt, ihr Geſang lautet dem der Singdroſſel ähnlich, jedoch in der Tonlage tiefer und viel weicher, weshalb ſie als Stubenvogel vorzuziehen ſei. Das Gefieder der Graydroſſel iſt oberſeits fahl olivengrünlichbraun; Schwingen dunkelbraun, Außenfahne hell geſäumt; Unterſeite fahl roſtröthlichgelb, Kehle gelblichbraun, undeutlich dunkel längsgeſtreift; Bruſt dunkler als die übrige Unterſeite; Schnabel grünlichgrau, Schneidenränder und Spitze heller; Augen braun mit gelblichem Federnring; Füße horngrau.

K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Die Samen-Großhandlung
von
Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [80]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Vom Besten

das Beſte. 98er **Ameiſeneier Ia** Ko. 3 ℳ, Ltr. 70 ₰, Prima Tiroler Ltr 1 ℳ, **Elbe-Weißw. Ia** Ko. 3,50, Ltr. 80 ₰, **Mehlwürmer Ia,** rein, Liter 4,50 ℳ, **Univerſalfutter** prima, f. zarte Inſektenfreſſer Ko. 2 ℳ, für Droſſeln Ko. 1,20, Papageifutter 5 Ko. 3,—, Prachtfinkenfutter 5 Ko. 2,50, Sittichfutter 5 Ko. 2,50, Waldvogelfutter 5 Ko. 3,—, Kanarienſingfutter 5 Ko. 3,— mit Sack, und alle Futterſämereien in Prima-Qualitäten billigſt. Preisliſte gratis. Wer einmal beſtellt, bleibt Kunde. [81]

Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Diesjährige konkurrenzloſe

Ameiseneier,

hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, 1 Liter 95 ₰; ferner **Ameiſeneier,** **prima Qualität,** 1 Liter 80 ₰; [82]

Weisswurm,

hochprima, 1 Liter 90 ₰ liefert ſtets

Wenzel Petzold, Prag 394/I.

Ameiseneier,

1898er Ia geſiebte, ſandfreie Ware,

	per Kilo	ℳ	3,20
Weißwurm, prima	„ Liter	„	1,—
Muſka	„ „	„	0,90
Univerſalfutter, extra	„ Kilo	„	1,20
Mohnmehl, weiß	„ „	„	0,60
Sonnenblumenk., weiße	„ „	„	0,60
Reis in Hülſen	„ „	„	0,60
Ossa sepia, prima	„ „	„	3,—
Sommerrübſen, Ia großkern. ſüß		„	0,44

Ferner Mohar-, Senegal-, Kolben-, weiße **Hirſen, Mohn** und alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [83]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

1898er hochprima getrocknete und ſorgfältigſt gereinigte [84]

Ameiseneier,

1 Liter mit 85 ₰ liefert

Gottlieb Wanek, Vogelhdl.
Prag (Böhmen).

Vögel.

Hochfeine prämirte

Harzer Edelroller

(Stamm Trute), welche vorzüglich in Hohlrolle, Knorre, Klingelrolle, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 8, 10, 12, 15, 20 ℳ. Zuchtweibchen 1,50 ℳ verſende gegen Nachn., bei achttägiger Probe. Nichtgefallende tauſche um, ev. Betrag zurück, gebe zwei St. Zuchtweibchen gratis bei. [85]

Wilh. Keye, Thale, Harz.

Tauſche: 1,1 Schopfwachteln 14 ℳ,
0,1 „ 10 ℳ,
[86] **Dolff, Meckenheim** b. Bonn.

Harzer Kanarien,

ſehr gute Sänger, werden wegen Aufgabe der Zucht zu herabgeſetzten Preiſen abgegeben, Weibchen deſſelben Stamms zu 1,50 ℳ [87]

W. Böcker, Kontroleur, **Wetzlar.**

Meine ſelbſtgezüchteten ff.

Kanarienſänger

verſende vom 1. Novbr. ab, unter Garantie des Werthes und lebender Ankunft, zu 9, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ à St. [88]

Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, 146.

NB. Bei Anfrage Rückporto erbeten.

Achtung!

Thüringer Waldvögel:

Dompfaff, roth 2,20 ℳ, blau 1 ℳ, Stiglitz, Rothhänſling, Kreuzſchnabel, Rothkehlchen à 1,50 ℳ, Zeiſig, Buchfink à 1 ℳ, Bergfink, Goldammer, Grünfink à 80 ₰, Meiſenarten à 1 ℳ, Amſel, Schwarzplättchen, laut ſingend à 5 ℳ, Davidzippe à 6 ℳ per Nachnahme. **Garantie lebender Ankunft, ſichere Männchen.** [89]

Hermann Graf, Vogelhandlung, **Sonneberg** i. Th.

Harzer Kanarienvögel

(Trutesche Hohlroller), Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. i. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel, Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis** und **franko.** Weibchen deſſelb. Stamms 2,50 ℳ [90]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Empf.: 2 St. fleißig ſing. **Kanarien-** u. **Stiglitz-Baſtarde,** ſchön gezeichnet, einer mit Haube, à St. 5 ℳ, gute Harzer Kanarienhähne 5—15 ℳ, dito gute Zuchtweibchen à 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ. **Mehlwürmer,** ff. Ware, à Pfd. 3 ℳ. Unter **Garantie.** [91]

A. Schulz, Breslau, Altbüßerſtr. 36.

Nymphenſittich,

gar. Zuchtp. Mk. 9 zu verk. Tauſche auch beſſeres Prachtfink.-Zuchtpar. [92]

Jos. Porzelt, Fürth (Bayern).

Goldhähnchen,

Zaunkönige, Baumläufer P. 6 ℳ, Hauben- und Schwanzmeiſen P. 4 ℳ, Blau- und Tannenmeiſen P. 2 ℳ, Ortolane und Dompfaffen P. 4,50 ℳ, aufgezogene Dompfaffweibchen zur Zucht St. 3 ℳ, ſing. Haidelerchen und Schwarzplättchen St. 4 ℳ, Feldlerchen und Rothkehlchen St. 3 ℳ, eine prachtvolle ſingende Schama 40 ℳ, Bülbül und grüner Kardinal, ſingend, St. 10 ℳ, grauer Kardinal mit rother Haube, Glanzſtar und Sonnenvogel, alle im Geſang, St. 6 ℳ, 1 amerik. Spottdroſſel und Singdroſſel, beide hochfein, St. 15 ℳ, Schwarzdroſſel-Mch. 4 ℳ, Wbch. 2,50 ℳ, ein ſehr ſchönes Zuchtp. Nymphenſittiche 15 ℳ, Buchfinken, Hänflinge, Stiglitze, ausgeſucht ſchöne, laut ſingende Exemplare, St. 3 ℳ, gewöhnliche St. 1,50 ℳ, Erlen- und Birkenzeiſige St. 1,25 ℳ u. a. liefert in bekannter Güte unter jeder Garantie [93]

W. Hiltmann, Berlin S., Dresdenerſtr. 23.

Kanarienvögel, echte Harzer prima Roller, vers. von 6—18 Mk.
Fritz Trübel, Clausthal, Oberharz. Preisliste frei. [94]

Zu kaufen gesucht:

Drei kräftige Zuchtweibchen **Wellenſittiche** u. ein Zuchtpar **Singſittiche.**

Zu verkaufen:

Eine leichte, kurze Zeit gebrauchte **Vogelvoliere** (85 cm hoch, 70 cm breit, 45 cm tief) für 15 ℳ oder zu vertauſchen gegen Vorhergenanntes. [95]

Dr. Zurhellen, München-Schwabing.

---

2 ſafranköpf. Goldhähnchen,

1 Zaunkönig und **1 Schwanzmeiſe** um 9 ℳ zu verkaufen. [96]

Karl Mayer, München, Parkſtr. 28.

Geſucht: Granataſtrilde, Buntaſtrilde, **Wiener's Aſtrilde, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen.**

F. Beedzler, [97]
20, Norton Folgate, **London** (England).

1898 erhielt mein Stamm Harzer Kanarienvögel 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ. u. Gar., 8 T. Pr.

Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [98

Hochfeine

Harz. Edelroller

(Stamm Trute),

welche vorzüglich in tief. gebog. u. geraden Hohlrollen, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Klingel, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 6, 8, 10, 12 u. 15 ℳ, Dtz. 60, 72, 84 und 96 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, verſende gegen Nachn. 6 Tage Probezeit. Nichtgefallendes tauſche um, ev. Betrag zurück. [99]

Herm. Voigt, Thale a. Harz.

Harzer Kanarien-

Roller mit Nachtigaltouren zu 6, 8 ℳ, edle Roller v. 10 ℳ an, **Harzer Vogelkäfige** u. Utenſilien, Geflügelkäfige, Poſtverſandt-Kiſten u. ſ. w. Preisl. frei. [100]

Ad. Janson, Lauterberg, Harz.

Feinste Kanariensänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [101]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.

Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

Wellenſittich-Männch.,

à 1,50 ℳ. **L. Brinkmann,**
[102] **Calefeld** i. Hannover.

---

1 Pirol

im Prachtgefieder 10 ℳ, **Amſeln** 3 ℳ, pfeif. **Droſſeln** 6 u. 8 ℳ, **Schwarzplättchen** 5 ℳ verſ. geg. Nachn. [103]

M. Bergmann's Vogelhdl., Görlitz i. Schl.

Bei uns erschien:

Der Dompfaff,

seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht.

Von

F. Schlag.

3. Auflage. — Preis M. 1.—.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Anzeigen.

Neuheit!
Vollständig unzerbrechliches
Vogelbadehaus.

No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.—
No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50
Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.—**

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige** für **Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc.** mit **sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen franco und **gratis** zu Diensten. [104]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Zeitſchrift für ***Elektrotechnik***
und ***Maſchinenbau,*** Poſtzeitungsliſte Nr. [illegible]
ſowie für ***Metall-*** *und* ***Montaninduſtrie.***

Abonnementspreis: **pro Monat 20 Pf.** durch jede Buchhandlung,
bei der Poſt **60 Pf. für das Vierteljahr.**

Bereits erſchienene Nummern des Quartals werden koſtenlos nachgeliefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervorragendſten Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und berufen, unendlichen Nutzen zu ſtiften

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik und dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montaninduſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt, Alles, was irgendwie für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elektrotechnik und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in fachwiſſenſchaftlicher, leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend **alle ſpeziellen Zweige** der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des **Auslandes** hat die Zeitſchrift **zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute als Mitarbeiter,** welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem Gebiete der Elektrotechnik **und des Maſchinenbaues** ꝛc. ſofort Kenntnis geben und über alle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten. Jede Nummer der Zeitſchrift wird daher eine Reihe **elektrotechniſch-wiſſenſchaftlicher** und **maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel** aus der Feder erprobter Autoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten. Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl **kleiner Mitteilungen** aus dem Gebiete der **Elektrotechnik, des Maſchinenbaues** und der **Metall-** und **Montaninduſtrie** an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und allezeit wiſſen, **welche neuen** Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die **Patentnachrichten, die von uns** ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den Leſern einen Überblick über die neuen Erfindungen ꝛc. zu geben. Der **techniſche Briefkaſten** erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch Fachmitarbeiter zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner **handelspolitiſche Leitartikel,** die energiſch für die Intereſſen der deutſchen Induſtrie eintreten. **Unter dem Titel: „Kleine handelsinduſtrielle Mitteilungen“** wird **alles** dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt Metall- u. Montaninduſtrie Bezug **hat.** Ebenſo finden die **Submiſſionen, geſchäftlichen Mitteilungen** ꝛc. ꝛc. eine gebührende Stätte in unſerem Blatte. — Jeder Nummer iſt eine ***Unterhaltungsbeilage*** hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeitſchrift das inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt.

Nach alledem wird die **„Zeitſchrift für Elektrotechnik und Maſchinenbau,** ſowie für **Metall- und Montaninduſtrie“** ein **unentbehrliches Organ** nicht bloß für die **Beſitzer** maſchineller und elektrotechniſcher **Fabriken** und **Werkſtätten, Walz-** und **Hüttenwerke, Schloſſereien** und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie ꝛc., ſondern auch für alle **Ingenieure, Techniker** und **ſonſtigen techniſch Thätigen** ſein.

Probenummern koſtenlos und franko von der
Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechnik u. Maſchinenbau,
ſowie für **Metall-** und **Montaninduſtrie,** ***Leipzig.***

Mit 119 farbigen Abbildungen auf 40 Farbendrucktafeln!

statt Mk. 22.50 nur Mk. 13.—.

Wir haben eine kleine Parthie von dem bekannten Werke:

Die Vögel der Heimat.

Unsere Vogelwelt in Lebensbildern
von
Dr. Karl Russ.
Mit 119 farbigen Abbildungen auf 40 Farbendrucktafeln
in hochfeinem Ganzleinenband

übernommen, welche wir unseren geehrten Abonnenten
statt für Mk. 22.50 für nur Mk. 13.—
zur Verfügung stellen. Gefl. Bestellungen sehen wir baldigst entgegen.

Creutz'sche Buchhandlung in Magdeburg.

Metall-Käfige

für Weichfreſſer in eleganter, ſolider u. praktiſcher Ausführung empfiehlt zu billigſten Preiſen [105]

Th. Kapff Nchf., Ludwigsburg.

Kataloge, auch über Artikel für Kanarienzucht, grat. u. franko.

Gefiederte Welt, Jahrg. 1895, eleg. geb., f. 5,50 ℳ z. verk. Rich. Gründig, Zwönitz. [106

In unſerem Verlage erſchien:

Die ſprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch
von
Dr. Karl Ruß.
Dritte verbeſſerte Auflage.
Mit 2 Farbendrucktafeln u. 32 Vollbildern in Schwarzdruck.
Preis: M. 4.50, gebunden M. 5.50.
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

In unserem Verlage erschien:

Das Huhn als Nutzgeflügel.

Von
Dr. Karl Russ.
Zweite, reich illustrirte Auflage.
Preis M. 2.—; geb. 2.50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Bei uns erſchien:

Vogelzucht-Buch,

Stubenvogelpflege und -Zucht
zum Vergnügen, zum Erwerb und für wiſſenſchaftliche Zwecke.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Auflage, mit 13 Tafeln u. 30 Textabbildungen.
Preis Mk. 1.50, geb. Mk. 2.—.
Creutz'ſche Verlagsbuchhdlg. in Magdeburg.

Bei uns erschien:

Die künstliche Geflügelzucht

unter Anwendung
von
Brutapparaten.
Von
Max Schwarzlose.
Mit 19 Holzschnitten im Text.
Preis: Mk. 2.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg. in Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 3.

Nochmals über die Uebertragbarkeit anſteckender Krankheiten von Papageien auf Menſchen.
Fremdländiſche Finken.
Beobachtungen auf einer Gebirgswanderung in Galizien, der Bukowina, Siebenbürgen und Rumänien.
Anfragen und Auskunft.
Zu unſerm Bilde.

Anzeigen.

Annahme von Anzeigen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.



Vogelkäfige aller Art, Zuchtvolieren, Niſtutenſilien, unerreicht in praktiſcher Anordnung großer Auswahl u. billigem Preis [107]
Illuſtrirte Preisliſte [illegible]
Arthur Herrmann & Luther, Oschatz i. S.

Neſter
für Kanarien, Exoten, Tauben ꝛc. liefern billigſt [108]
Proskauer & Pauson
Korbwaarenfabrik
Berlin, Schwedterſtr. 251.
Telephon: Amt III 2418.

Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰ **Natur-Niſtkäſten** „ 60 „ **Univerſalfutter** für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [109]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Lit. 1 ℳ Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112.**

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,
mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [110]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

2 größere **Volieren,** wovon die eine zuſammenlegbar, ſowie einige Einzelkäfige, ſämmtlich in gutem Zuſtand mit Zubehör, ſind z. verkaufen. [111]
Th. Bicker Caarten,
Hamburg-Hohenfelde, Neuſtr. 95.

Der beſte Fangapparat
für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrages. [112]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Für alle Arten Vögel fertige ich **fachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [113]

Niſtkäſten für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[114] **R. Schröter, Ellingen-Greußen.**

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [115]



Man verlange Preisliste.
Man verlange Preisliste.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Futtermittel.

Mehlwürmer Pfund 3,50 Nachnahme. Gegen Einſ. von 1,50 in Briefmarken 1000 St. franko verſ. [116]
D. Waschinsky, Berlin NW, Wilsnackerſtr. 63.

Ja! Ja! es ist wahr!
Ich verſende nur ſaubere Ware. [117]
Futter für: **Prachtfinken, Reisfinken, Kardinäle, Sittiche, Papageien** (große), **Dompfaff** und **Waldvögel** (als Hänſling, Stieglitz, Zeiſig, Fink) je 5 Ko. 2 ℳ. Bei Entnahme von 3 Poſtkolli füge ich eine ſelbſtthätige Trinkflaſche, ſehr praktiſch für Vögel, **gratis bei.**
H. P. Lange, Samenhdl., Gottesberg i. Schl.

Importirte
echt auſtraliſche Wellenſittiche mit dunkelblauen Füßen, prachtvoll intenſivem Gefieder, richt. Zuchtp 6 ℳ, 3 P. 16,50 ℳ, 5 P. 25 ℳ, do. einzelne Mch. zur Blutsauffriſchung St. 2,75 ℳ, **Wellenſittiche,** ausgefärbte Pare, 5 ℳ, 3 P. 13,50 ℳ, 5 P. 20 ℳ, **Graaköpfchen,** prachtvolle Zuchtpare, 2,50 ℳ, 3 P. 6 ℳ, 5 P. 8,50 ℳ, import. **Zebrafinken** Zuchtpar 5 ℳ, **Singſittiche,** prachtv. Zuchtpare, 30 ℳ, **Chin. Nachtigalen** (ſelten ſchön), extra ausgeſuchte Doppelüberſchläger, 5 ℳ und von allen in Nr. 1 ausgebotenen Vogelarten noch Vorrath. Reelle Bedienung; Garantie f. lebende und tadelloſe Ankunft. [118]
Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Mehlwürmer,
rein reell gemeſſen, Ltr. 4,50 ℳ, Kilo 8,25 ℳ, 1000 Stck. 1,60 ℳ **Anweiſung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer** 30 ₰, **Ameiſeneier,** nur feinſte, ſtaubfreie Ware, pr. Ltr. 80 ₰, Kilo 3,75, 10 Ltr. 7 ℳ, **Weißwurm** feinſter Beſchaffenheit, Ltr. 80 ₰, **Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln, Neſter, Samen** u. a. Preisliſte poſtfrei. [119]
Theodor Frank, Barmen.

Mehlwürmer, [120]
ausgeſucht ſchöne, geſunde Futterware, empfiehlt porto- u. verpackungfrei 1 Ko. 7,75 ℳ, ½ Ko. 4,— ℳ Garantie für Vollgewicht bei Ankunft. Größere Quantitäten billigſt.
Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Mehlwürmer,
große dicke Futterwürmer, 1000 St. 1,70 ℳ geg. vorher. Mark. frko. **Ameiſeneier, Ia,** ganz rein, à Lit. 80 ₰, verſendet [121]
H. Dambock, Landeshut i. Schl.

Vom Besten
das Beſte. 98er **Ameiſeneier Ia** Ko. 3 ℳ, Ltr. 70 ₰, Prima Tiroler Ltr 1 ℳ, **Elbe-Weißw. Ia** Ko. 3,50, Ltr. 80 ₰, **Mehlwürmer Ia,** rein, Liter 4,50 ℳ, **Univerſalfutter** prima, f. zarte Inſektenfreſſer Ko. 2 ℳ, für Droſſeln Ko. 1,20, Papageifutter 5 Ko. 3,—, Prachtfinkenfutter 5 Ko. 2,50, Sittichfutter 5 Ko. 2,50, Waldvogelfutter 5 Ko. 3,—, Kanarienſingfutter 5 Ko. 3,— mit Sack, und alle Futterſämereien in Prima-Qualitäten billigſt. Preisliſte gratis. Wer einmal beſtellt, bleibt Kunde. [122]
Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

häufig die Ausſtellung beſucht. Viel Schuld ſollen, wie man allgemein behauptet, die vollſtändig unzulänglichen Räume der Ausſtellung getragen haben. Sie waren ſtets überheizt, niedrig und beſaßen überhaupt keine Lüftungseinrichtung“.

Hochgeehrter Herr Profeſſor!

Im Intereſſe der Kunde der Vögel, insbeſondre deren Haltung als Stubengenoſſen, ferner im Intereſſe des Vogelhandels, ſoweit dieſer werthvolle ſprechende Papageien anbetrifft, ſchließlich im Intereſſe der zoologiſchen Gärten und anderer Naturanſtalten, ſowie namentlich auch der Vogelausſtellungen, geſtatte ich mir, Sie mit nachſtehenden Zeilen zu beläſtigen.

Durch viele Berliner und auswärtige Zeitungen, darunter die „Kölniſche Zeitung“ und die „Baſeler Nationalzeitung“, ging in dieſen Tagen die Notiz, welche ich zur gefälligen Kenntnißnahme für Sie beizulegen mir erlaube. Dieſelbe enthält die Mittheilung, daß nach der Ausſtellung des Berliner Vereins der Kanarienzüchter und -Liebhaber verſchiedene Mitglieder an einer Art Typhus ſchwer erkrankt und drei Perſonen bereits geſtorben ſeien. Die behandelnden Aerzte haben feſtgeſtellt, daß der Typhus durch Papageien auf die betreffenden Menſchen übertragen worden; Sie, verehrter Herr Profeſſor, hätten den verſtorbenen Drechslermeiſter Grauel und deſſen noch im Krankenhaus am Urban liegende Gattin behandelt.

Nach meinen eigenen mehr als dreißigjährigen Erfahrungen, ſowie nach denen der Direktoren zoologiſcher Gärten und der Vogelhändler kann ich nun an die Möglichkeit der Uebertragung von anſteckenden Krankheiten durch Vögel, bzl. Papageien, auf Menſchen noch keineswegs glauben. Ich ſelbſt hatte im Lauf der Jahre viele Hunderte von lebenden und geſtorbenen Vögeln, vornehmlich Papageien, zur Beobachtung und Unterſuchung vor mir. Zeitweiſe pflegte ich in meiner eigenen verhältnißmäßig engen Häuslichkeit 20 bis 30 Stück friſch importirter Papageien zugleich, welche von Sepſis und anderen anſteckenden Krankheiten befallen waren, um Heilungsverſuche zu machen und den Verlauf der Krankheit zu beobachten. Trotzdem iſt in meiner Familie bei Menſchen niemals irgend eine anſteckende Krankheit aufgetreten. Ebenſo haben auf meine Anfrage hin die Direktoren der zoologiſchen Gärten von Berlin (Dr. Heck), Hamburg (Dr. Bolau), Köln (Dr. Wunderlich), Düſſeldorf (Goſſart), Dresden (Schoepf), Hannover (Schäff), Amſterdam (Dr. Kerbert) verſichert, daß niemals Angeſtellte, alſo Wärter von Papageien, derartig erkrankt ſeien. Noch größer wäre doch die Gefahr ſolcher Anſteckung für die Vogelgroßhändler und deren Perſonal. Dieſelben empfangen nicht ſelten Hunderte, ſelbſt Tauſende tropiſcher Vögel, vornehmlich Papageien, auf einmal direkt von den Schiffen und müſſen gerade die Papageien längere Zeit halten und ſorgfältig pflegen, ehe dieſe eingewöhnt und damit verkäuflich ſind. Die Großhändler Chriſtiane und Karl Hagenbeck, Auguſt und Heinrich Fockelmann in Hamburg, L. Ruhe und C. Reiche in Alfeld, Schiffer und Voß in Köln, Rohleder in Leipzig, Brühl in Dresden, Anton und Chs. Jamrach und J. Abrahams in London, Croß in Liverpool und noch Andere mehr haben auf mein Befragen erklärt, daß derartige Erkrankungen bei ihnen und ihren Leuten noch niemals vorgekommen ſeien.

In der Zeitungsnotiz heißt es, und mein Sohn, der mehrmals auf der Ausſtellung war, ſagte mir ſogleich nach ſeinem erſten Beſuch, daß die Räume ſehr ungünſtig, zu klein, nicht gelüftet und ſtark geheizt geweſen ſeien. Wäre es da nicht möglich, daß namentlich die Mitglieder, welche ſich immer lange Zeit, zuweilen den ganzen Tag, auf derartigen Ausſtellungen aufhalten, ſich dann beim Hinausgehen in das naßkalte Wetter, das wir in jenen Tagen hatten, erkältet und eine ſtarke Influenza, allerdings in einer beſondern, neuen Form, davongetragen haben? Ihnen, hochgeehrter Herr, wird ja gewiß bekannt ſein, ob eine ähnliche anſteckende Krankheit in dieſer Zeit in Berlin noch bei anderen Perſonen aufgetreten iſt.

Hiermit bitte ich Sie ſehr, verehrter Herr Profeſſor, mir gütigſt Ihre perſönliche Anſicht in der Angelegenheit mitzutheilen. Ich würde Ihre Aeußerung mit größtem Dank aufnehmen, einerſeits, da ich ſeitens vieler Betheiligten aufgefordert bin, den Sachverhalt feſtzuſtellen und Klarheit zu ſchaffen und andrerſeits weil mir ſelbſt als Herausgeber der Zeitſchrift „Die gefiederte Welt“ hieran gelegen ſein muß.

Für die gütige Erfüllung meines Wunſches ſage ich Ihnen im Voraus verbindlichſten Dank und habe die Ehre zu unterzeichnen

Ihr ganz ergebener
Dr. Karl Ruß, Ornithologe.

Sehr geehrter Herr Doktor! 9. Januar 1899.

Hierdurch geſtatte ich mir, Ihnen einige Zeilen der gewünſchten Aufklärung über die Erkrankung des Ehepars Grauel zukommen zu laſſen. Wie die Nachricht in die Zeitungen gelangte, daß Mann und Frau von einer Infektion durch Papageien befallen ſeien worden, iſt mir unerfindlich. Der Ehemann Grauel wurde am 28. Dezember dem Krankenhauſe von ſeinem Arzt mit der Diagnoſe Ileo-Typhus überwieſen. Wir konnten indeß angeſichts der Unbeſtimmtheit der Symptome uns nicht mit Sicherheit für das Vorliegen eines ſolchen entſcheiden. Der Patient war nach Ausſage ſeiner noch jetzt bei uns befindlichen Frau ſchon ſeit vierzehn Tagen nicht mehr recht auf dem Poſten und fiel durch ſeine enorme Bläſſe auf; es beſtand lebhaftes Fieber und zunehmende Benommenheit des Senſoriums; ſonſt aber fehlte jedes Zeichen von Typhus. Schon drei Tage ſpäter erfolgte der Tod. Die Sektion ergab das Beſtehen mehrerer Magengeſchwüre und eines großen Geſchwürs des Zwölffingerdarms, aus welchem eine erhebliche Blutung — vermuthlich die eigentliche Todesurſache — erfolgt ſein muß, da ſich noch im Darm theerartig gefärbter Inhalt befand. Außerdem beſtand hypoſtatiſche doppelſeitige Pneumonie.

Sechs Tage nach dem Mann war die Frau erkrankt, welche nur ganz vorübergehend mit einem in ihrem Hauſe befindlichen Papagei in Berührung gekommen war. Die Affektion, an der ſie litt, war eine rechts-

Aus dem zoologiſchen Garten von Berlin.

Wiederum hat Herr Dr. Heck für das Vogelhaus eine Seltenheit erworben, die das Entzücken der Vogelfreunde erregt. Dies iſt eine bengaliſche Pitta (Pitta s. Coloburis bengalensis, *Gm.*), jener abſonderliche Vogel, der vor zwei Jahren zum erſtenmal von Herrn Aug. Fockelmann eingeführt wurde und deſſen Schilderung und Abbildung wir damals hier brachten. Für die ſeitdem neu hinzugekommenen Leſer ſei bemerkt, daß dieſer droſſelgroße hochbeinige Vogel dadurch auffällt, daß ſein Schwanz kaum halb ſo lang wie der Flügel iſt. Die Pitta im zoologiſchen Garten erregt beſondres Aufſehen, weil ſie ſo ſchön ausgefärbt iſt. Namentlich die blauen und rothen Abzeichen des Gefieders (an Flügel, Bürzel, Unterſchwanzdecken u. a.) treten prächtig hervor. Der Vogel befindet ſich in einem Glaskäfig, neben Meiſen-, Blauflügel- und Kronwaldſänger, und zeigt ſich nicht allein ſchön im Gefieder, munter und lebhaft, ſondern auch wenig ſcheu, ja faſt zutraulich. Er erhält Meuſel's Tangarenfutter.

Bei dieſer Gelegenheit ſei übrigens als Ergänzung der Schilderung in Nrn. 32 und 33 d. J. 1896 Folgendes bemerkt. Während die Pittas früher zu den Droſſeln gezählt wurden, hatte Cabanis auf Grund äußerer Merkmale (Bildung des Bauchs) die Vermuthung ausgeſprochen, daß ſie überhaupt nicht zu den Singvögeln, ſondern zur Ordnung Schreivögel (Clamatores) geſtellt werden müſſen; den Beweis für die Richtigkeit dieſer Annahme hat dann der engliſche Anatom Garrod durch Unterſuchung des Singmuskelapparats geliefert. —

Zum erſtenmal lebend eingeführt iſt meines Wiſſens Brown's Plattſchweifſittich (Psittacus Browni, *Tmm.*), auch Schwarzkopfſittich genannt, ein zu den Plattſchweifſittichen gehöriger Papagei. Er erſcheint an Kopf, Hals und Rücken ſchwarz, am letztern die Federn gelblich geſäumt; Wangenfleck weiß, unterſeits blau geſäumt; Schwingen an der Außenfahne blau, Innenfahne ſchwarz, große Deckfedern blau; Schulterdecken gelb mit ſchwarzem, keilförmigem Mittelfleck; Bürzel gelb, Federn ſchwärzlich geſäumt; Schwanz grün, Federn blau und weiß geſpitzt; Unterſeite gelb, an den Bruſtſeiten die Federn mit ſchwarzem Mittelfleck; Unterſchwanzdecken roth. (Beim jüngern Vogel fehlen die blauen Abzeichen). Seine Verbreitung erſtreckt ſich über ganz Nordauſtralien. Auf Grasebenen und den Rändern der Sümpfe, wo Gräſer üppig wachſen, von deren Sämereien dieſe Sittiche ſich ernähren, ſah Gould ſie parweiſe oder in Familien von zehn bis zwanzig Köpfen. Sie leben vorzugsweiſe auf dem Erdboden; der Flug geht niedrig, nicht ſehr raſch, im Zickzack und immer nur auf kurze Strecken dahin.

Als Seltenheit zu bezeichnen iſt auch Prêtre's Amazone (P. Prêtrei, *Tmm.*), einer der ſchönſten Amazonenpapageien, der nur vereinzelt im Lauf der Jahre zu uns gelangte.

Ebenfalls ſelten iſt die rothbäuchige Droſſel (Turdus rufiventris, *Vll.*), die gelbfüßige Amſel (T. flavipes, *Vll.*) und der dickſchnäblige Organiſt (Tanagra crassirostris, *Gm.*). K. R.

Fremdländiſche Finken*).

Von K. Ruß.

II. Unterfamilie: Gimpel (Pyrrhulinae).

Zu dieſer Unterfamilie werden nicht allein die echten Gimpel, Roſengimpel und Kreuzſchnäbel, ſondern neuerdings auch die Girlitze, Zeiſige, Grünfinken und Polarfinken gezählt. Als gemeinſames Kennzeichen gilt der in der Regel auffallend kurze und hohe Schnabel, deſſen Schneiden nicht gewinkelt, und deſſen ganze Baſis von kurzen, nach vorn gerichteten Borſtenfedern umgeben iſt.

Die Gattung Polarfinken (Leucosticte, *Sws.*), auch Roſenfinken genannt, dürfte den Vogelliebhabern kaum bekannt ſein, da noch kein Vertreter derſelben lebend eingeführt worden. Es ſind ammergroße Vögel mit kurzem, ſpitzem Schnabel, deren in der Grundfarbe ſchwarzbraunes Gefieder auf den Flügeln und der Unterſeite ſchön roſaroth überhaucht erſcheint. Ihre Heimat erſtreckt ſich über den Weſten von Britiſch-Nordamerika, Alaska, die Aleuten und Nordoſtaſien. Im Weſen ſollen ſie den Ammern gleichen, doch iſt ihre Lebensweiſe in den ſchwer zugänglichen hochnordiſchen Heimatsgebieten noch wenig erforſcht; überhaupt ſind ſie der Wiſſenſchaft erſt ſeit verhältnißmäßig kurzer Zeit bekannt. In den Vereinigten Staaten, deren Norden ſie auf dem Zuge beſuchen, haben ſich eifrige Vogelfreunde emſig der Beobachtung dieſer intereſſanten Vögel zugewandt. Eine Art wurde bereits im Jahr 1881 im Käfig gehalten.

Dies iſt der grauköpfige Polarfink (L. tephrocotis, *Sws.*). Er erſcheint in der Hauptfarbe zimmtbraun, mit großem ſchwarzem Fleck am Hinterkopf, der im Winter grau wird; oft ſind alle Federn roſaroth (im Winter karminroth) gerändert; Spitzen der Schwanzfedern mit breitem roſa- oder karminrothem Rand; im Sommer iſt der Schnabel ſchwarz, im Winter gelb. Sein Brutgebiet erſtreckt ſich vom Norden der Vereinigten Staaten nordwärts. Dort findet man ihn hoch im Gebirge, oberhalb der Waldgrenze, in der Umgebung der Schneefelder und zugefrorener Seen. Sein Brutgeſchäft iſt noch unbekannt. Im Winter zieht er ſüdlich bis zum Norden der Union, wo er in trockenen Gräben und Gärten nach Nahrung ſucht und in Geſellſchaft von Schneeammern, Zeiſigen u. a. Vögeln in die Nähe menſchlicher Wohnungen kommt. Zum Schutz vor der Kälte ſoll er die verlaſſenen Neſter der Traufſchwalben aufſuchen, die ſich unter den Dachtraufen der Ställe befinden. Im Käfig hielt ihn, wie bereits angedeutet,

---

*) Vergl. die Schilderung im vorigen Jahrgang.

Lieutenant Dr. R. Shufeldt, deſſen Mittheilungen H. Nehrling wiedergibt. Er ſchreibt: „Als ich in Fort Fettermann, Wyoming, ſtationirt war, fing ich im Frühling 1881 acht gut befiederte, geſunde grauköpfige Roſenfinken. Es ſchienen vier richtige Pärchen zu ſein. Sie wurden in einem ziemlich geräumigen Käfig untergebracht. Der Boden deſſelben war mit Raſen belegt worden. Ich bezweckte zweierlei: einmal wollte ich beobachten, wie ſie ſich zum Hochzeitskleid verfärbten, und zum andern beabſichtigte ich, ſie womöglich zum Brüten zu bringen. Groß war meine Freude, als ich ſah, daß ſie ſich ſchon nach einigen Tagen vollſtändig eingewöhnt hatten und anſcheinend zufrieden und glücklich waren. Vorüberziehende Genoſſen wurden herbeigelockt. Dieſe ließen ſich auf den Zäunen, auf dem Boden und ſelbſt auf dem Käfig nieder. Das Gefieder ſchien für dieſe Jahreszeit vollkommen zu ſein; die ganze Färbung deſſelben war eine ſehr dunkle. Meine Gefangenen wurden mit Kanarienſamen, geſtoßenem Weizen, Flachsſamen und ſpäter im Jahr mit Salat und zarten Blättern gefüttert. Da der Raſen fortwährend erneuert wurde, erlangten ſie ohne Zweifel auch viele Inſekten. Sie hatten ſich ſo an meine Perſon gewöhnt, daß ſie fröhlich zwitſcherten, wenn ich morgens mit Futter und Waſſer erſchien. Ganz beſonders angenehm war es ihnen, wenn ich ſie mit einer Gießkanne überbrauſte. Sie ſonnten ſich auch gern und die Männchen gaben gelegentlich ihren tiefen, einfachen Geſang zum beſten. Mitte Mai hatten alle Roſenfinken die Gegend verlaſſen. Der Frühlingszug war vorüber und das Wetter wurde ſehr warm. Schwalben brüteten und die übrigen Vögel ſchickten ſich an, ihrem Beiſpiel zu folgen. Ich richtete den Käfig ſo bequem wie möglich her. Neſter anderer Vögel von derſelben Größe wurden in das Bauer gethan, aber ſie wurden ſtets noch an demſelben Tag völlig zerzauſt. Mitte Juni war es bereits und noch machten ſie nicht die geringſte Anſtalt zum Niſten. Anfangs Juli waren ſie ſo zahm, daß ſie mir die Sämereien aus der Hand holten und ſich auf den Fingern niederließen, wenn man ſie durch die Sproſſen ſteckte. Am 10. Juli öffnete ich die Thür ihres Käfigs und gab ihnen die Freiheit wieder. Anfangs Mai ſchien das Gefieder am ſchönſten zu ſein; jetzt war es um einige Farbentöne heller“.

Seitdem ſind nahezu zwei Jahrzehnte verfloſſen und aus dem damaligen „Wilden Weſten“, in dem die vorſtehenden intereſſanten Beobachtungen bereits gemacht wurden, iſt ein blühendes Land mit reicher Kultur geworden, in dem auch die Vogelliebhaberei und die Naturerforſchung bedeutende Fortſchritte gemacht haben. Daher können wir wol hoffen, daß in abſehbarer Zeit auch dieſe Roſenfinken zu uns gelangen werden. Obwol ſie keine Sänger ſind, würden ſie doch zweifellos Liebhaber finden und ihre Züchtung dürfte denſelben Reiz bieten, wie z. B. die des Hakengimpels und der Kreuzſchnäbel.

Die nächſte Gattung ſind die Grünlinge (Ligurinus, *Koch*, s. Chloris, *Cuv.*); ihr europäiſcher Vertreter iſt der wol allen unſeren Leſern bekannte Grünfink (Fringilla chloris, *L.*). Er wird ſeiner Anſpruchsloſigkeit und Ausdauer wegen oft in Käfig und Vogelſtube gehalten, obwol ſein Geſang unbedeutend iſt und er ſich bisweilen (nicht immer gegen) andere Vögel futterneidiſch und bösartig zeigt; dagegen wird er leicht zahm und läßt ſich unſchwer züchten. Die fremdländiſchen Verwandten, die nur ſelten und vereinzelt im Handel erſcheinen, dürften bei genauerer Beobachtung dieſelben Eigenſchaften zeigen. Lebend eingeführt wurden bisher nur der algeriſche Grünfink (F. aurantiiventris, *Br.*) und der chineſiſche Grünfink (F. sinica, *L.*). Der erſtere, deſſen Heimat ſich über Südweſteuropa und Nordweſtafrika erſtreckt, iſt von unſerm Grünfink nur durch lebhafter gelbliche Färbung unterſchieden und wird von manchen Ornithologen nur für eine Oertlichkeitsraſſe gehalten. Eine gute Art iſt dagegen der chineſiſche Grünfink; er erſcheint an Kopf und Nacken olivenbräunlichgrau; ganze übrige Oberſeite grünlichrothbraun; Schwingen ſchwarz, an der Grundhälfte gelb, Flügelrand und Achſeln hochgelb; Schwanz ſchwarz, Grundhälfte gelb; Wangen und Kehle gelblicholivengrün mit ſchwachem dunklem Bartſtreif; Unterſeite gelblicholivenbraun, von der Unterbruſt an heller gelblich; Bauch und Hinterleib weißlich. Das Weibchen ſoll düſtrer und unterſeits mehr grau ſein. In ſeinem Freileben gleicht er der europäiſchen Art, ebenſo in ſeinem Benehmen als Stubenvogel. Ein Kopf befindet ſich gegenwärtig im Berliner zoologiſchen Garten.

Man füttert die Grünfinken am beſten mit Hanf, Rübſen, geſpelztem Hafer, Sonnenblumenkernen, unter Zugabe von Grünkraut und Obſtſtücken, auch Veren je nach der Jahreszeit; im Frühjahr bietet man ihnen auch ein Ameiſenpuppengemiſch mit Mehlwürmern an; einige der letzteren ſind ihnen immer zuträglich. Zu Zuchtverſuchen für ein Pärchen benutzt man einen Finkenheckkäfig*).

An die Grünlinge ſchließt ſich die Gattung Zeiſige (Chrysomitris, *Boie*); zu dieſer werden auch die (früher abgetrennten) Untergattungen Hänflinge (Acanthis, *Bchst.*, s. Aegiothus, *Cab.*) und Stiglitze (Carduelis, *Briss.*) gerechnet; in dieſer Ausdehnung umfaßt die Gattung etwa fünfzig Arten im gemäßigten und nördlichen Europa, Aſien und Nordamerika, ſowie im gemäßigten Südamerika.

Die fremdländiſchen Zeiſige ſind, ſoweit man ſie in der Vogelſtube, bzl. im Käfig erforſcht hat, ebenſo wie unſer einheimiſcher Erlenzeiſig und Stiglitz (Diſtelfink), angenehme und empfehlenswerthe Stubenvögel. Sie zeichnen ſich nicht durch Farbenpracht aus, haben aber ein anſprechendes und hübſches Gefieder aufzuweiſen; ſie ſind zwar keine hervorragenden Sänger, doch klingt ihr einfaches, fleißig vorgetragenes Lied angenehm. Sie ſind leicht einzugewöhnen (nur wenige zeigen ſich heikler) und erweiſen ſich dann als ausdauernd und kräftig; zugleich iſt ihre Verpflegung eine ſehr einfache. Anderen Vögeln gegenüber benehmen ſie ſich in der Regel friedlich und verträglich; wenn ſie futterneidiſch ſind, ſo werden ſie anderen Vögeln doch nicht gefährlich. Auch ſchreiten ſie in der Vogelſtube, wie pärchenweiſe im Käfig gehalten, unſchwer zur Brut. Als Nahrung bietet man ihnen im allgemeinen alle möglichen öligen und mehligen Sämereien: Mohn, Kanarienſamen, verſchiedene Hirſen, allerlei heimiſche Kraut-, Gras- und Waldſämereien, Hanf nur wenig und gequetſcht. Daneben erhalten ſie Grünkraut aller Art, Obſtzugabe und ein leichtes Weichfuttergemiſch mit Ameiſenpuppen und Mehlwürmern. Zur Niſtzeit reicht man ihnen dieſelbe Nahrung wie den Prachtfinken, unter reichlicher Zugabe von kleinen weichen Kerbthieren. Im übrigen zeigen die einzelnen bisher gezüchteten oder ſonſt näher erforſchten Arten nach den Beobachtungen liebevoller Pfleger zum Theil abweichenden Geſchmack, bzl. haben verſchiedene Bedürfniſſe, welche in der folgenden Ueberſicht berückſichtigt werden ſollen. Im ganzen ſei man in jedem einzelnen Fall in der Auswahl der Sämereien und des Grünkrauts vorſichtig, ebenſo in der Größe der Weichfutter-Gabe und der des Hanf. Es kommt natürlich ſehr auf die Individualität der einzelnen Vögel an und darauf, wie ſie bisher aus der Freiheit, während der Ueberfahrt und beim Händler gewöhnt waren. (Fortſetzung folgt).

---

*) S. Dr. Ruß, „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, S. 52.

Beobachtungen auf einer Gebirgswanderung in Galizien, der Bukowina, Siebenbürgen und Rumänien.

Von Joſef Wagner.

Obwol im Frühjahr 1897 bis ziemlich Ende Mai kühles, trübes, regneriſches Wetter herrſchte, ſo lockte mich die Natur wieder einmal in's Freie und ich entſchloß mich, wie alljährlich, eine kleine Reiſe zu unternehmen. Es war anfangs Juni, als ich unſere ſchöne Großſtadt verlaſſen konnte, und mit welcher Freude ging es nun an meine ſchon längſt geplante Reiſe! Hatte ich mir doch vorgenommen, einmal wieder die Sproſſer in ihren mannigfaltigen Geſängen zu belauſchen und zu ſtudiren und zu dieſem Zweck Länder aufzuſuchen, wo noch der echt reine Sproſſergeſang vorhanden und der Sproſſer als Brutvogel heimiſch iſt. Zunächſt faßte ich die Bukowina in's Auge, weil ich dort zunächſt auf günſtige und erfolgreiche Beobachtungen rechnen konnte.

Wie vielen Vogelliebhabern bekannt ſein dürfte, läßt der Sproſſer nicht lange Zeit in den Sommer hinein ſeinen Vortrag hören, wie es z. B. Schwarzplättchen oder Rothkehlchen thun. Die Sproſſer hören mit Vorliebe mit dem Geſang bereits von Mitte Juni an auf; ſchon in der zweiten Hälfte des Juni hört man nicht mehr viel Sproſſer-Geſang im Freien. Daher fuhr ich, ohne Aufenthalt zu nehmen, gleich über Krakau nach Lemberg. Es macht den Eindruck einer alten Polenſtadt, die indeſſen viel vom Gewand der Neuzeit angenommen hat. Beſonders erfreute mich das Vogelleben in den ſtädtiſchen Anlagen, wo ich beinahe zwei Stunden einem Schwarzplättchen zuhörte, welches Vorgeſang und Ueberſchlag brachte. Auch vernahm ich häufig Schwarzplättchen, welche in Käfigen zwiſchen den Fenſtern oder den Thüren hingen.

Lemberg verlaſſend, wandte ich mich nach Süden, um an den Dnieſterfluß zu gelangen. Dort durchquerte ich ein ziemlich großes Gebiet und traf mehrere Pärchen Sproſſer an und lauſchte dem ſchönen Geſang der Männchen und kam als eifriger Sproſſerliebhaber aus dem Entzücken nicht heraus. Gerade beim Sproſſer kommt es ja bei der Beurtheilung des Geſangs ſehr auf die Oertlichkeitsraſſe an. Wie abweichend waren dieſe Vögel von denjenigen, die ich ſ. Z. in Dänemark hörte, oder von denen, die auf der Inſel Rügen vorkommen! Leider übrrraſchte mich ein großes Gewitter und infolgedeſſen verließ ich das herrliche Fleckchen Erde und begab mich weiter an den Pruthfluß.

Die hochromantiſche und ſehr fruchtbare Gegend, deren Feldfrüchte vor Wohlgedeihen ſtrotzten, bietet für den Naturfreund außerordentlich viel Schönes. Von dort gelangte ich bis Stanislaus, einer Handelsſtadt von nahezu 20 000 Einwohnern, die mehr der Neuzeit entſpricht, und von da gegen Abend nach Colomea. Frühmorgens um 3 Uhr brach ich auf, um durch die Stadt am Pruthfluß entlang zu wandern. Colomea zeigt nichts Sehenswerthes, es iſt eine kleine Stadt von 24 000 Einwohnern, welche einen unſaubern Eindruck macht. Kaum hatte ich die Holzbrücke, welche von der Stadt ſüdweſtlich über den Pruthfluß führt, betreten, als ich trotz des ſtarken Rauſchens des Waſſers ſchon von weitem Töne hörte, wie „Wat, wat, wat“, und ich war mir gleich darüber einig: es müſſen Sproſſer ſein.

Schon von weitem kam ein unabſehbares Weidengelände zu Geſicht, der Geſang wurde immer heftiger, immer greller. Ich gelangte näher, ſchwenkte links ab und nun ging es hinein in das Weidengebüſch. Kleine ſchmale Fußwege führten hindurch, die Weiden waren zum Theil von ihren Wurzelſtöcken aus ſo dick verwachſen, daß es als unmöglich erſchien, hindurch zu kommen.

Die Sproſſer brachten ungeſtört ihren Geſang immer deutlicher und ausdrucksvoller zum Vortrag. Und nun hatte ich abermals Gelegenheit, deren Geſänge richtig zu belauſchen und echte Weidenſproſſer zu hören. Stunde um Stunde verging und ich hatte noch keinen Kaffee, kein Frühſtück genoſſen, aber könnte an einem ſolchen herrlichen Morgen, bei ſolchem ſchönen Konzert überhaupt ein Naturfreund oder eifriger Vogelliebhaber Hunger bekommen? Ich wenigſtens nicht, zumal ich von früheſter Jugend ein großer Sproſſerliebhaber geweſen und beſtändig dieſen Vogel in verſchiedenen Exemplaren gehalten habe.

Der Erdboden war ziemlich feucht, ſodaß es unmöglich erſchien, ſich hinzuſetzen; ich mußte öfter meinen langen Bergſtock quer durch die Weiden legen, um mich nothdürftig auszuruhen.

Die Zeit verſchwand in Eile, die Sonne nahm ihren Gang immer höher; ſo durchkreuzte ich weit und breit dieſes Vogel-Eldorado und hatte im Lauf des Vormittags 13 Sproſſer ganz genau in ihrer Geſangsleiſtung abgehört. Einen dieſer Vögel hörte ich ſchon um 4 Uhr morgens und um 10 Uhr vormittags hatte er noch nicht aufgehört zu ſingen, nur kleine Pauſen hatte er ſich zum Futterſuchen gegönnt. Der Vogel ſaß meiſt auf einem Weidenkopf und veränderte ſeinen Platz wenig; ich beobachtete ihn eine lange Weile. Seiner Größe, ſowie des ſchönen Geſangs und der hart metallartigen Stimme wegen hielt ich ihn für einen alten Vogel, jedenfalls Stammhalter und Lehrmeiſter. Verſchiedene andere, die in unmittelbarer Nähe waren, verſuchten mit ihm zu wetteifern, aber vergebens, er blieb Sieger. Es gab beſſere und mindere Sänger darunter, doch muß ich behaupten, das alles einunddieſelbe Raſſe war.

Außerdem hörte ich noch mehrere Sumpfrohrſänger, welche in ihrer Geſangsweiſe von denen, welche ich ſchon öfter an der Oder und anderen Orten vernommen, gänzlich abwichen. Auch bei dieſer Art wäre von einer Oertlichkeitsraſſe zu ſprechen. Die Rohrſänger hatten viele Töne vom Sproſſer in ihren Geſang mit eingeflochten, wie „Wat, wat, wat, torrrrrtzek, krja, krja, krja, tok, tok, tok“ und eine ziemlich tiefe Stimme. Sie waren unermüdlich fleißig in ihren Vorträgen.

Von Schwarzplatteln, die vereinzelt von den gegenüberliegenden laubreichen Bäumen ihre Ueberſchläge hören ließen, will ich hier nicht ſprechen; ich werde ſpäter noch darauf zurückkommen. Auch der Gartenlaubvogel war vereinzelt vorhanden und brachte in ſeinem Geſang öfters die Knorre des Sproſſer zum Vortrag. Auf einem alten Fahrweg beobachtete und hörte ich eine ganze Weile einen Albino der Haubenlerche.

Blaukehlchen habe ich dort nicht gehört und das erklärt ſich dadurch, daß in dieſem Weidengebüſch kein Morboden vorhanden war.

Nach einem Abſchiedsgruß an die Sproſſer (wol auf Nimmerwiederſehen), wanderte ich den Strom abwärts und erreichte nach Zurücklegung verſchiedener Meilen die ſchon von weitem am Berg ſichtbare Stadt Czernowitz. Dieſe Tour ging durch fruchtbares Thal und Felder, wo auch die Wachtel häufig vorkommt.

Bevor ich die Brücke, welche über den Pruthfluß von der Landſtraße nach der Stadt führt, überſchreiten konnte, hörte ich ſchon von beiden Ufern des genannten Stroms aus den Weidenpflanzungen die Sproſſer wieder ſchlagen. Ich marſchirte immer weiter, um die Stadt zu erreichen, obwol ich ſehr müde, infolge von den täglichen Märſchen, war, denn es war ſehr warm und ich mußte in der Hitze meinen Touriſtenſack, Bergſtock, Regenſchirm u. a. allein tragen, da kein Träger zu bekommen war. Dabei mußte ich zuguterletzt noch den entſetzlichen Anſtieg, den die Stadt vom Bahnhof aus hat, erklimmen.

Czernowitz, eine Stadt von 45 000 Einwohnern, welche am Berg erbaut, iſt im Norden und Oſten vom Pruthfluß, im Süden und Weſten, wenn auch von gebirgigen Geländen, doch mit ſchönen fruchtbaren Feldern begrenzt. Der untere Theil der Stadt gewährt eine ſchöne Ausſicht über den Pruth und deſſen Thal. Dicht am Strom gibt es prachtvolle Weidenpflanzungen, welche zum Theil eingezäunt ſind, um der Beſchädigung durch Vieh vorzubeugen, umſo heimiſcher und ſicher konnten ſich die Vögel darin fühlen; das Weidengebüſch iſt ſtellenweiſe ſo dick, daß es die ſchönſten Brutplätze für Sproſſer gibt; da hatte ich wieder Gelegenheit, den echten Weidenſproſſer zu hören.

Es war morgens 2 Uhr, als ich von neuem aufbrach; mein erſter Blick war zum Fenſter hinaus und ich ſah ſchon, daß es ein ſchöner Morgen werden konnte. Ich gelangte nun zu den Weidenpflanzungen, wo ich ſchon am Abend vorher die Sproſſer gehört hatte. Meine Wünſche waren bald erfüllt; kaum hatte ich am untern Stadttheil den Graben überſchritten, als ich ſchon von weitem den Schlag der Sproſſer hörte.

Der Morgen wurde herrlich, die Sonne zeigte ſich mit ſtrahlender Wärme, und es werden mir unvergeßliche Morgenſtunden bleiben, die ich dort verlebte. Es iſt kaum zu beſchreiben, mit welchem Eifer, welchem Feuer und welch' greller Stimme ſich die Vögel gegenſeitig immer aneiferten; jeder wollte augenſcheinlich der Beſte ſein, und das wiederholte ſich immer wieder. Wie wol auch andere Liebhaber wiſſen, werden ſechs bis acht Sproſſer, die man in einem kleinen Zimmer überwintert, niemals alle zu gleicher Zeit laut und kräftig ſchlagen, immer werden einige davon ſchweigen und nicht zum Geſang kommen. In der Freiheit iſt das Gegentheil der Fall; da reizen ſie ſich gegenſeitig zum Geſang an, freilich in weiterer Entfernung. Dennoch behauptet jeder ſein Niſtgebiet, und würden wir den Vögeln im Zimmer auch eine ſolche Entfernung bieten können, wie in der Freiheit, ſodaß jeder ſeinen Platz behaupten könnte, ſo würde bei guter Behandlung und ſorgfältiger Pflege ein jeder laut ſchlagen; aber leider iſt dies ja nicht möglich.

Die Weidenſproſſer kommen hier nur in Betracht, die in Weidenpflanzungen größerer Stromgebiete ihre Niſtplätze aufſuchen; auf Waldſproſſer werde ich ſpäter zurückkommen.

Die geehrten Leſer werden ſich noch erinnern, daß ich ſchon vor Jahren in dieſem Blatt Sproſſer-Geſänge veröffentlichte; daher will ich auch heute nicht verſäumen, den Geſang eines dort (Czernowitz) gehörten Vogels dem Klang nach wiederzugeben:

Vilip vilip
Tatra tatra tatra tatra
Gulük gulük gulük
Woutwout
Torrrrrrrrrrrrtouh
Terek terek tek tek wit

Truronk truronk
Titri titri titri
Thou gerk gerk gerk
Wat wat
Tatra tatra tatra tilip
Perkerk perkerk perkerk
Vilip vilip.

Gulük gulük lük lük lük
Wiwat wiwat
Thou thou thou
Thararararararthou
Schalo ſchala vilip.

Dieſes Konzert wurde dadurch noch verſchönert, daß in unmittelbarer Nähe die Sumpfrohrſänger ihre Spötter-Geſänge dazwiſchen brachten; ebenſo ließen ſich Schwarzplättchen und andere Grasmücken, Fitislaubvögel, nicht weit davon auf hohen Bäumen Stiglitze nebſt Grünfinken hören.

(Fortſetzung folgt).

* * *

Anfragen u. Auskunft

Herrn C. Emil Skrey: In keinem Fall dürfen Sie die Pärchen zur Miſchlingszucht ſchon jetzt zuſammenſetzen. Sie müſſen vielmehr die Kanarienweibchen zuſammen in einem Bauer überwintern und den Kanarienhahn, Zeiſig und Stieglitz je in einem beſondern Käfig, falls dieſelben nicht bereits an einander gewöhnt ſind. Erſt zum beginnenden Frühjahr, zu Anfang März, dürfen Sie die Vögel verparen und in die Hecke ſetzen. Bringen Sie dann doch Stieglitz und Zeiſig mit je einem Kanarienweibchen in je ein Kaſtenbauer und den Kanarienhahn mit ſeinen Weibchen in das Flugbauer. Da Sie mein Buch „Der Kanarienvogel“ beſitzen, ſo leſen Sie über alles Nähere in demſelben nach.

Herrn Fritz Körber: Zwiſchen Paradisvögeln und Paradiswitwen beſteht ein bedeutender Unterſchied. Die erſteren ſind große, krähenartige, erſt wenige Male lebend nach Europa gelangte und daher ſehr koſtbare Vögel, die letzteren gehören zur Familie der Finken und kommen zeitweiſe zahlreich in den Handel. Der Käfig für ein Pärchen derſelben muß, da ſie, ihrer langen Schwanzfedern wegen, zur Bewegung eines weiten Raums bedürfen, mindeſtens 60 cm hoch, 95 cm lang und 55 cm tief ſein und eine Drahtweite von $1_{,5}$ cm haben.

Herrn Prediger Reinhold Pritſch: 1. Der kurzſchnäbelige Girlitz (Fringilla s. Crithagra brevirostris, *Gld.*) von Chile iſt mit dem Graugirlitz oder Grauedelfink (F. musica, *Vieill.*) von Afrika nicht übereinſtimmend. Sein Geſang ſoll an den des europäiſchen Girlitz und des Kanarienvogels erinnern. Er wird jetzt häufiger eingeführt. Beſchrieben habe ich ihn in meinem großen Werk „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ Band I Die Körnerfreſſer und demnächſt ſoll er hier in dem Artikel „Fremdländiſche Finken“ beſprochen werden. 2. Allerdings läßt der Sonnenvogel nur wenige wohlklingende Droſſelrufe hören. Den Namen chineſiſche Nachtigal führt er nicht mit Berechtigung, denn zu dem herrlichen Geſang unſerer europäiſchen Nachtigal ſteht der des Sonnenvogels in keinem Vergleich. 3. Ein durchaus ſicheres Unterſcheidungszeichen zwiſchen Männchen und Weibchen der Haidelerche gibt es, namentlich für den Laien, nicht. Das Weibchen iſt etwas heller und lebhafter braun und dunkler gefleckt. Das ſicherſte Kennzeichen des Männchens iſt der Geſang, auf den Sie erſt im März rechnen dürfen.

Herrn Ignatz Mager: 1. Wenn Ihr Graupapagei ſeine Sitzſtange zerknabbert, ſo iſt das doch keine ſchlimme, ſondern eine natürliche Gewohnheit. Entweder müſſen Sie dann die Sitzſtange von Zeit zu Zeit erneuern oder ihm immer noch ein anderes, nicht zu hartes Stück Holz zum Zernagen bieten. 2. Maisfütterung halte ich für durchaus nothwendig. Sie müſſen beſten großkörnigen Pferdezahnmais kaufen und täglich ſoviel, wie der Vogel freſſen mag, ſchwach ankochen, d. h. ſo lange, bis die Körner den Eindruck eines Fingernagels annehmen, damit die etwa in ihnen vorhandenen Schimmelpilze ertötet werden. Dann ſuchen Sie die ſchwarz gewordenen oder ſonſtwie ſchlechten Körner heraus und werfen ſie fort, die guten betrocknen Sie mit einem ſaubern Leinentuch und laſſen ſie erkalten, bevor Sie ſie dem Papagei geben.

Herrn Th. Wiesböck: Die beiden von Ihnen zur Unterſuchung eingeſandten Holländer Kanarien waren infolge von einer heftigen Hals- und Lungenentzündung geſtorben. Dieſelbe war jedenfalls durch eine ſtarke Erkältung hervorgerufen, durch zu kaltes Trinkwaſſer, Zugluft oder in's Zimmer geſtrömte kalte Luft.

Herrn Carl E. Schmidt: 1. Wenn Sie die Tradeskantia nicht in gewünſchter Weiſe erlangen können, ſo geben Sie doch Vogelmiere. 2. Der Artikel über „Einrichtung und Bevölkerung einer Vogelſtube“ von Premierlieutenant Hauth ſoll in dieſem Jahre fortgeſetzt werden. 3. Bieten Sie den Bülbüls nicht zu viel Obſt an und vor allen Dingen nur ſolches in beſter Beſchaffenheit. Eine beſtimmte Gabe läßt ſich nicht feſtſtellen, umſo weniger, da die fruchtfreſſenden Vögel doch immer mehrerlei Obſt zugleich erhalten. Geben Sie niemals viel auf einmal, dagegen mehrmals im Tage und beobachten Sie dabei die betreffenden Vögel genau, ſo werden Sie ſicherlich das rechte Maß finden.

Herrn Anton Olszewski: 1. Da Sie Ihren Sproſſer im September v. J. empfangen haben, ſo hätte damals die Mauſer ſchon beendet ſein müſſen. Sie ſelbſt ſchreiben, er ſei vom Vorbeſitzer ohne Sachkenntniß verpflegt und behandelt worden. Einen Beweis hierfür liefern die gänzlich fehlenden Schwanzfedern, welche alſo in der Mauſer nicht nachgewachſen ſind. Der Vogel iſt demnach in der Mauſer ſtecken geblieben und wird erſt nach der nächſten Mauſer (Ende Juni bis Anfang Auguſt), vorausgeſetzt, daß dieſe gut verläuft, in vollſtändiges Gefieder kommen. Eben weil er nicht in naturgemäßem Körper- und Gefiederzuſtand ſich befindet, ſingt er bis jetzt auch nicht. Ihr bisheriges Miſchfutter geben Sie bis zum Frühjahr nur weiter; aber mit dem Zuſatz von Garnelenſchrot ſeien Sie vorſichtig und fügen Sie nur hin und wieder ein wenig vom feinſten hinzu. Geben Sie jetzt mehr Mehlwürmer, bis 20 Stück täglich. Sobald es friſche Ameiſenpuppen gibt, füttern Sie nur ſolche und zwar wennmöglich täglich friſch geſammelte. Die warmen Bäder können nichts nützen, ſondern eher ſchaden, indem Sie den Vogel dabei leicht erkälten. 2. In neuerer Zeit gibt man allen kerbthierfreſſenden Vögeln an Stelle des Sands mehrere Lagen Löſchpapier auf die Käfigſchublade, weil man durch tägliche Erneuerung der oberen, feucht gewordenen Lagen den Käfig leicht ſauber halten kann.

Zu unſerm Bilde.

Der kleine Gelbkopf oder die kleine gelbköpfige Amazone (Psittacus ochropterus, *Gm.*), auch Sonnenpapagei genannt, iſt an der geringern Größe, den dunklen Federrändern an der Ober- und Unterſeite und dem breiten gelben Flügelbug ſogleich von allen Verwandten zu unterſcheiden. Im Gegenſatz zu anderen Amazonen laſſen ſich bei dieſer Art die Geſchlechter am Gefieder erkennen. Das Männchen iſt an Stirn und Zügeln gelblichweiß; Vorder- und Oberkopf, Wangen, Kopfſeiten, Ohrgegend und Oberkehle gelb; Flügelbug mit großem gelben Fleck; Spiegelfleck im Flügel ſcharlachroth; die vier äußeren Schwanzfedern am Grunddrittel über beide Fahnen zinnoberroth; ganze übrige Oberſeite dunkelgrasgrün, jede Feder mit ſchwärzlichem Rand, nur die oberen Schwanzdecken einfarbig gelbgrün; Unterſeite kaum bemerkbar heller grün, jede Feder gleichfalls dunkel gerandet; Schenkelgegend gelb; Schnabel hornweiß, mehr oder weniger bläulichgrau, Wachshaut grauweiß; Augen dunkelbraun, gelblichbraun bis rothgelb mit rothem äußern Kreis der Iris, nackte Haut um's Auge weiß; Füße und Krallen weißlichhorngrau. Das alte, ausgefärbte Weibchen iſt in allen Farben matter und um den Unterſchnabel, mehr oder minder weit über die Wangen, an Unterbruſt und Bauch meerblau. Das Jugendkleid hat gleichfalls die meerblaue Färbung, und dieſelbe erſtreckt ſich zuweilen auch über die Kopfſeiten und Kehle. Bei manchen alten Vögeln ſind die grünen Federn an Kopf, Wangen, Kehle, Hals und Flügelbug mehr oder minder mit gelben oder orangefarbenen gemiſcht. Die Größe iſt etwa die einer Dohle (Länge 32—34 cm; Flügel 18—$20_{,2}$ cm; Schwanz $9_{,6}$—$11_{,5}$ cm); ſie ſchwankt übrigens außerordentlich, nicht allein bei jung aufgezogenen, ſondern auch bei alten, in der Freiheit erlegten Vögeln. Der kleine Gelbkopf iſt häufig im Handel und wird leicht zahm. Die Begabung iſt bei den einzelnen Vögeln recht verſchieden, doch hat man ſchon außerordentlich begabte Sprecher darunter gefunden; durchſchnittlich zeigen ſie ſich als angenehme Hausgenoſſen.

Der bekannte Ornithologe E. Hartert fand auf ſeiner Reiſe in Weſtindien i. J. 1892 auf der Inſel Bonaire (bei Curacao) einen Papagei, welcher der kleinen gelbköpfigen Amazone überaus ähnlich erſchien und den er als neue Art feſtſtellte und dem Beſitzer des Tring-Muſeum in England zu Ehren benannte. Dieſer Vogel unterſcheidet ſich nach Hartert's Angaben von dem kleinen Gelbkopf durch Folgendes: „Der bei P. ochropterus immer gelbe innere Flügelbug, der nur ſelten an der Wurzel etwas Roth zeigt, iſt bei P. Rothschildi lebhaft roth, mit nur geringer gelber Beimiſchung, und der gelbe Schulterfleck iſt viel kleiner; die Federn des Bauchs ſind nur ſchwach mit Schwarz geſäumt“. Es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß ſich unter den vielen alljährlich eingeführten kleinen Gelbköpfen auch Vögel dieſer Art unerkannt befinden.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [123]

Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt). Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos).

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko 3½, à Ltr. 80 ₰.

Muska, hochſ. 98er, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr. 4½, à Ko. 8.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 4, 5 Ko. 19.

Bisquit u. Eierbrot, beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,60
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,—
do. **Senegal**	„ „ „ „	2,25
do. do. **i. Kolb.**	„ „ „ „	5,—
do. **algeriſche**	„ „ „ „	2,
do. **indiſche**	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	4,—

Oſſa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [124]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. Vogelfutterarten gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Suche Pelz- und Speckkäferlarven.
Hosang, [125]
Magdeburg, Hohepforteſtr. 40 b III.

Mehlwurmzüchterei

empfiehlt prima Würmer ℔ 4,— ℳ [126]

F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

☞ **Ameiſeneier,** ☜

1898er Ia geſiebte, ſandfreie Ware,	per	Kilo	ℳ	3,20
Weißwurm, prima	„	Liter	„	1,—
Muska	„	„	„	0,90
Univerſalfutter, extra	„	Kilo	„	1,20
Mohnmehl, weiß	„	„	„	0,60
Sonnenblumenk., weiße	„	„	„	0,60
Reis in Hülſen	„	„	„	0,60
Oſſa ſepia, prima	„	„	„	3,—
Sommerrübſen, Ia großkern. ſüß			„	0,44

Ferner Mohar-, Senegal-, Kolben-, weiße **Hirſen, Mohn** und alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [127]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

═ **Diesjährige konkurrenzloſe** ═

Ameiſeneier,

hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, 1 Liter 95 ₰; ferner **Ameiſeneier,** **prima Qualität,** 1 Liter 80 ₰; [128]

Weisswurm,

hochprima, 1 Liter 90 ₰ liefert ſtets

Wenzel Petzold, Prag 394/I.

☞ **1898er** hochprima getrocknete und ſorgfältigſt gereinigte [129]

Ameiſeneier,

1 Liter mit 85 ₰ liefert

Gottlieb Wanek, Vogelhdl.
Prag (Böhmen).

Vögel.

1 Kanarienroller,

fleißig. Sänger, 6 ℳ, 1 **Lerche,** 97er Frühfang, tadellos, 3 ℳ Nehme in Tauſch: **Schwarzpl., Rothk., Wellenſittiche** oder exotiſche Vögel, zahle auch zu. [130]

Th. Wittmann, Rath b. Düſſeldorf.

Habe noch zu verkaufen:

Jap. Mövchen,

3 ſchöne Zuchtp., gelbb., à P. 4,50 ℳ u. 1 Zuchtweibch. 2,50 ℳ, **Gef. Welt,** 1897 mit Einbanddecke 4,50 ℳ, 1898 ohne Einbanddecke 3,50 ℳ [131]

W. Rehe, Coblenz, Löhrſtr. 52.

☞ **Reell!** ☜

Weg. Aufg. meiner Vogelſtube verk. billig:

1 Blaudroſſel,

alter Wildfang, tadellos im Gefieder und großartiger Sänger, ſtatt 25 ℳ für 18 ℳ **1 Davidzippe,** ſingt an jedem Platz, auch bei Lampenlicht, 7 ℳ, **1 Schwarzplättchen** dito, **1 Gartengrasmücke, 1 Reitzugfink** à 4 ℳ, **1 Haidelerche** 3 ℳ, **1,0 junge Sperbergrasm.** u. **1 Stieglitz** à 1,50, **1 Steinröthel.** Sämmtliche Vögel ſind jetzt im Geſang u. tadellos im Gefieder. [132]

Feldt, Berlin, Ohmſtr. 5 III.

Schamadroſſeln,

Wildfänge in vollem Geſang, ganz eingewöhnt St. ℳ 28.

Singſittiche, importirt, tadellos ſchön, P. ℳ 28.

Wellenſittiche, tadellos ſchön, ganz verfärbt, P. ℳ 6.

do. importirte, noch nicht ganz verfärbt, P. ℳ 5. [133]

Grauköpfige Mainaſtare St. 6 ℳ

„Ornis“, Vogel-Verſandt, Hamburg.

Meine ſelbſtgezüchteten ff.

Kanarienſänger

verſende vom 1. Novbr. ab, unter Garantie des Werthes und lebender Ankunft, zu 9, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ à St. [134]

Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, 146.
NB. Bei Anfrage Rückporto erbeten.

F. Rejsek, Hamburg, Peterstr. 28

Papageien-Grosshandlung

═ **Prämirt auf allen beschickten Ausstellungen.** ═



Offerire um zu räumen, zu bedeutend herabgesetzen Preisen: Junge, schöne, recht gesunde, leicht und schnell lernende **Graupapageien,** jetzt schon ½ Jahr hier, an Hanf und Wasser gewöhnt, anfang. schön zu sprechen, statt 35 Mk. jetzt nur 25 Mk., einige sehr viel sprechende statt 150 Mk. nur 100 Mk. Junge **Blaustirn-** u. **Rothbug-Amazonen,** schon sehr gut sprech., statt 50 Mk. nur 40 Mk. Junge grosse **Doppelgelbköpfe** und grosse **Gelbnacken,** prachtvoll und tadellos im Gefieder, anf. schön zu sprechen, statt 35 Mk. jetzt nur 25 Mk., solche schon sehr gut sprech. statt 65 Mk. nur 50 Mk. **1 Gelbnacken,** wahres Prachtexemplar, schon sehr gut sprechend, sammt elegantem, nur 8 Tage gebrauchtem Salonkäfig, statt 80 Mk. nur 60 Mk. **Gelbwangen-Amazonen** in Pracht, fingerzahm u. schon gut sprech., statt 35 Mk. nur 25 Mk. **Brillen-Amazonen,** fingerzahm, nur 15 Mk. Grauköpfige **Zwergpapageien** Par 3 Mk. **Wellensittiche** Par 6 Mk., alte gute Zuchtpare Par 8 Mk. **Rosellas** in Pracht Par 20 Mk. **Kalifornische Schopfwachteln** Par 15 Mk. **Harzer Kanarienroller** 6, 8, 10, 12 Mk., Weibchen 1 Mk. Zahme, hochamüsante ☞ **Affen** Stück 15, 20, 25 M. Versandt gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages unter Garantie lebender und gesunder Ankunft. Hunderte von Dankschreiben und Empfehlungen zu Diensten.

☞ **Papageien-Salonkäfige** ☜

mit den neuesten, praktischsten **Porzellannäpfen,** in allen neuesten Façons und Grössen, schon **von 4 Mk. an** stets auf Lager. Anfragen werden nur gegen Retourmarke beantwortet und solche aller Länder auch in Zahlung genommen. [135]

Bedienung sehr streng reell! Umtausch gestattet!

Gebe ab: einige Pare **jap. Mövchen,** brbt. u. glbt., à P. 6 ℳ, desgl. mehr. Wbch. à 3 ℳ. Kaufe: einige Pare **Bandfk., Mnch.** von **Spitzſchwanz-Grasfk., Wbch.** von **Masken-Grasfk., Diamantfk.** u. **Bartfk.** [136]

Hauth, Potsdam, Margarethenſtr. 21.

---

1 prachtvolle Schamadroſſel,

vorzüglicher Sänger, 42 ℳ, 1 hellſingende **Schwarzamſel** 5 ℳ. Verp. frei, geg. Nachn. Garantie f. geſunde Ank. [137]

Jos. Ehrlich, Würzburg, Zellerſtr.

Anzeigen.



No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.

No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50

Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.**–

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

☞ Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige** für **Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc.** mit **sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [138]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

S. m k.: Ein ſchönes ſicheres [139] **Männchen Roſellaſittich. Verkaufe** m. ſ. längerer Zeit gehaltene ſ. **chineſiſche Heherdroſſel** z. Preiſe v. 30 ℳ m. Verp. u. Porto, hat 40 ℳ gekoſtet.
Ernst Voerkel, Leipzig-Eutritzſch,
Marienſtr. 27, 1. Etage.

Tauſche: 1,1 Schopfwachteln 14 ℳ,
0,1 „ 10 ℳ,
[140] **Dolff, Meckenheim** b. Bonn.

▬ **Hochfeine prämirte** ▬

Harzer Edelroller

(Stamm Trute), welche vorzüglich in Hohlrolle, Knorre, Klingelrolle, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 8, 10, 12, 15, 20 ℳ. Zuchtweibchen 1,50 ℳ verſende gegen Nachn., bei achttägiger Probe. Nichtgefallende tauſche um, ev. Betrag zurück, gebe zwei St. Zuchtweibchen gratis bei. [141]
Wilh. Keye, Thale, Harz.

Harzer Kanarien,

ſehr gute Sänger, werden wegen Aufgabe der Zucht zu herabgeſetzten Preiſen abgegeben, Weibchen deſſelben Stamms zu 1,50 ℳ [142
W. Böcker, Kontroleur, **Wetzlar.**

☞ **Achtung!** ☜

Thüringer Waldvögel:

Dompfaff, roth 2,20 ℳ, blau 1 ℳ, Stieglitz, Rothhänfling, Kreuzſchnabel, Rothkehlchen à 1,50 ℳ, Zeiſig, Buchfink à 1 ℳ, Bergfink, Goldammer, Grünfink à 80 ₰, Meiſenarten à 1 ℳ, Amſel, Schwarzplättchen, laut ſingend à 5 ℳ, Davidzippe à 6 ℳ per Nachnahme. **Garantie lebender Ankunft, ſichere Männchen.** [143]
Hermann Graf, Vogelhandlung,
Sonneberg i. Th.

Harzer Kanarienvögel

(Trute'ſche Hohlroller), Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. i. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel, Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis und franko.** Weibchen deſſelb. Stamms 2,50 ℳ [144]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Feinste Kanariensänger



mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ. Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [145
R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.
Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

Metall-Käfige

für Weichfreſſer in eleganter, ſolider u. praktiſcher Ausführung empfiehlt zu billigſten Preiſen [146]
Th. Kapff Nchf., Ludwigsburg.
☞ Kataloge, auch über Artikel für Kanarienzucht, grat. u. franko.

Specialität.

Den geehrten Herrſchaften halte ſtets mein gut ſortirtes Lager von wirklich gut u. deutlich ſprechenden jungen **Graupapageien** u. **Amazonen** beſtens empfohlen, den Leiſtungen entſprechend grundſolide Preiſe u. abſolut reelle Bedienung. Garantie für geſunde tadelloſe Ankunft, bei Anfragen erbitte Preislage anzugeben, Sprachverzeichniſſe u. Dankſchreiben über gelieferte gutſprechende Papageien gern zu Dienſten. [147]
Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

!! Kanarienvögel !!

Meine weltbekannten, tieftourenreichſten 1898er Sänger ſind in großartigſter Auswahl alle wieder geſangsreif u. beſtens ſortirt. Liefere garantirt reell überallhin, ſteigend nur nach Geſangsgüte, à Stück 10, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ, Nachnahme oder Betrag vorher. [148]

Julius Häger,
St. Andreasberg (Harz).
Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864. Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

▬ Prima 2 Lieder pfeifende ▬

Dompfaffen

à 30–40 ℳ offerirt u. Garantie u. 4 Tage Probe [149]
K. Diehl III.
Angersbach, Oberheſſen.

Kanarienvögel.

Empfehle meine tieftourenreichen Sänger von 8–36 ℳ. Leiſte Garantie für Werth u. leb. Ankunft, gebe 8 Tage Probezeit, tauſche um, evtl. zahle d. Betrag retour. Preisl. fr.
Wilh. Schick, St. Andreasberg i. H.
vormals **W. Schwanebeck.** [150]

☞ 1898 erhielt mein Stamm **Harzer Kanarienvögel** I. Staatspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10–25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.
Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [151]

Harzer Kanarien-

Roller mit Nachtigaltouren zu 6, 8 ℳ, edle Roller v. 10 ℳ an, **Harzer Vogelkäfige** u. Utenſilien, Geflügelkäfige, Poſtverſandt-Kiſten u. ſ. w. Preisl. frei. [152]
Ad. Janson, Lauterberg, Harz.

Geſucht: Granataſtrilde, Buntaſtrilde, **Wiener's Aſtrilde, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen.**
F. Beedzler, [153]
20, Norton Folgate, **London** (England).



Hochfeine

Harz. Edelroller

(Stamm Trute),
welche vorzüglich in tief. gebog. u. geraden Hohlrollen, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Klingel, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 6, 8, 10, 12 u. 15 ℳ, Dtz. 60, 72, 84 und 96 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, verſende gegen Nachn. 6 Tage Probezeit. Nichtgefallendes tauſche um, ev. Betrag zurück. [154]
Herm. Voigt, Thale a. Harz.

☞ Unſeren geehrten Abnehmern bringen unſere anerkannt guten

Kanarienvögel

beſtens in Erinnerung. [155]

Pet. Rob. Erntges,
Elberfeld und **Duisburg.**
Mathilde Erntges, Elberfeld.

Bei uns erschien:

Der Dompfaff,

seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht.

Von
F. Schlag.
1. Auflage. — Preis M. 1
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

In unserem Verlage erschien:

Das Huhn als Nutzgeflügel.

Von
Dr. Karl Russ.
Zweite, reich illustrirte Auflage.
Preis M. 2.—; geb. 2.50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Bei uns erschien:

Vogelzucht-Buch,

Stubenvogelpflege und -Zucht
zum Vergnügen, zum Erwerb und für wiſſenſchaftliche Zwecke
Von Dr. Karl Ruß.
2. Auflage, mit 13 Tafeln u. 30 Textabbildungen
Preis Mk. 1.50, geb. Mk. 2.—.
Creutz'sche Verlagsbuchhdlg. in Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von [illegible]

Digitized by Google

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Alliancestraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 4. Magdeburg, den 26. Januar 1899. XXVIII. Jahrg.

Die Bewerthung der Kanarienvögel auf den Ausſtellungen.

Von R. Groſſe.

(Fortſetzung).

Kein Zweifel, daß dieſe Anſicht in allen ihren Punkten unterſchrieben werden kann; denn wenn auch die Behauptung aufgeſtellt wird, daß geübte Preisrichter zum allergrößten Theil in ihren Urtheilen übereinſtimmen, ſo iſt es doch ganz unzweifelhaft, daß dieſe Urtheils-Gleichheit eine Folge langjähriger gemeinſchaftlicher Arbeit iſt und daß ferner eine von einem bewährten Preisrichter während der Begutachtung ausgeſprochene Anſicht ſehr wohl dazu angethan iſt, jüngere Mitarbeiter zu einer andern Meinung umzuſtimmen. Angelernt kann das „Punktirſyſtem“ nicht werden, denn es fehlen ihm jedwede belehrenden Einzelheiten, es kann nur „angewöhnt“ werden. Ich bin der Anſicht, daß die Urtheile ſelbſt alter Preisrichter doch oft recht verſchiedene ſein würden, wenn jeder Einzelne für ſich in einem beſondern Raum die Ausſtellungsvögel zu bewerthen hätte. Entſchieden berechtigt aber iſt die Frage, die in demſelben Jahr von einem Züchter aufgeworfen und zugleich treffend beantwortet wird; der Letztere ſchreibt:

> „Warum erhält der Examinand 10, 20 oder 30 Werthzeichen? Das Punktirſyſtem kennt kein Warum, es überläßt uns wie vor zwanzig Jahren der Willkür der Preisrichter, es zwingt uns zu dem unbedingten Vertrauen in deren Tüchtigkeit und Ehrlichkeit, und nach demſelben kann in den Ausſtellungen die Eile dem Einen die Beine mit derſelben Sorgfalt amputiren, mit welcher man dem Andern an Stelle ſeines Kopfs einen goldenen ſetzt. Reklamationen ſind nach dem Weſen des Punktirſyſtems unzuläſſig, und umgekehrt kann auch der Preisrichter unberechtigten Tadel und Unzufriedenheit der Ausſteller mit dem Syſtem nicht pariren!“

Ja deshalb ſind eben Erhebungen und Einwürfe nicht geſtattet, weil es unmöglich oder doch mindeſtens unzuverläſſig ſein würde, wenn ein Preisrichter ſein Gutachten, das ſich nach dieſem Bewerthungsverfahren nur auf die Geſammtleiſtung des Vogels erſtreckt, bei einer Berufung gegen ſein Urtheil zergliedern und ſagen wollte, er habe die zuerkannten Punkte auf die einzelnen Geſangsſtrofen vertheilt und dieſer oder jener Strofe nur eine geringe Anzahl Punkte zuertheilt, weil ſie mangelhaft zum Vortrag gekommen ſei. Das kann er ja auch nicht; denn das „Punktirſyſtem“ kennt keine Einzelbewerthung und ſoll ſie auch nach der aufgeſtellten Grundlage nicht kennen.

Alle dieſe Einwände gegen das Bewerthungsverfahren fanden aber entweder wenig Gehör bei den Förderern deſſelben, oder aber man war nicht imſtande, ſie zu entkräften; denn die Entgegnungen, welche man ihnen entgegenſtellte, waren ziemlich matt. Letztere klangen dahin aus, daß es ein Unding ſei, den Preisrichtern zuzumuthen, in der kurzen Zeit, die ihnen zur Begutachtung des Geſangs der Kanarienvögel gewährt würde, jede einzelne Geſangsſtrofe zu bewerthen. Ich würde dies unbedingt zugeben, wenn zu jener Zeit noch die verſchiedenartigen Benennungen der Strofen an der Tagesordnung geweſen wären, wie ſie die Leipziger „Skala“ aufgeführt hatte; eine ſolche Menge einzelner Geſangsergüſſe würde der Preisrichter ſogar wol ſchwerlich in ſein Büchlein haben niederſchreiben können, ohne in ſeiner Thätigkeit des Abhörens geſtört zu werden. Das ſchon zu dieſer Zeit ſehr hervortretende Streben, den Geſang unſeres Lieblings auf wenige beſonders beliebte Strofen zu beſchränken und alle anderen auszumerzen, erleichterte jedoch dieſe Arbeit in hohem Maß. Die vorher gern gehörte Glucke und auch die Koller waren damals ſchon eine Seltenheit, und das Namensverzeichniß der gebliebenen Strofen war derartig vereinfacht, daß man es in der Hauptſache, wie jetzt, auch zu der Zeit ſchon nur mit Hohlrolle, Hohlklingel, Knorre und den Pfeifen zu thun hatte. Es konnte alſo unmöglich mit Recht als ein Unding bezeichnet werden, die herabgeminderten Theile des Geſammtliedes zu vermerken und ihnen beſondere Punkte zuzuerkennen. Man ſchien aber einfach keine Neigung zu haben, von der bequemeren Bewerthungsart abzulaſſen; das erkannte auch ein Artikelſchreiber, der im Jahr 1888 ſich alſo ausließ:

> „Die meiſten Preisrichter haben das Punktirſyſtem ſofort acceptirt; ſie geben dem Vogel ſo und ſoviel Punkte und halten es vielfach nicht einmal der Mühe werth, noch Notizen über die einzelnen Geſangstouren zu führen. Das iſt ja ſehr natürlich; denn wer wollte ſich's nicht bequem machen".

Wenn ich auch unbedingt zugebe, daß dieſe Aeußerung ſehr ſcharf und auf unſere jetzigen Preisrichter durchaus nicht anwendbar iſt, ſo läßt ſich auf der andern Seite doch eine gewiſſe Bequemlichkeit, die die bis jetzt gehandhabte Bewerthung nach Punkten und zwar die Bewerthung des Geſammtliedes in ſich ſchließt, nicht verkennen. Es iſt bequem:

1. Den Geſammtvortrag zu begutachten, wenigſtens nur das über dieſen gefällte Urtheil bekannt zu geben und
2. ſich vor Berufungen dadurch zu ſchützen, daß bekannt gegeben wird in den Ausſtellungs-Ankündigungen: „das Urtheil der Preisrichter iſt unanfechtbar!"

Ungleich mehr würde ohne Zweifel das abgegebene Gutachten mindeſtens diejenigen Ausſteller, die wider Erwarten geringe Preiſe davongetragen haben, befriedigen bzl. beruhigen, wenn ihnen Gelegenheit gegeben würde, in die Bücher, welche die Einzelvermerke der Preisrichter über die Leiſtungen ihrer Sänger enthalten, einen Einblick thun zu dürfen. Wenn dieſer Wunſch aber in den ausſtellenden Züchtern rege wird, dann ſind meiſtens die Preisrichter ſchon wieder auf der Heimreiſe begriffen und das wichtige Büchlein befindet ſich in ihrem Gewahrſam. Dieſer Uebelſtand wäre leicht zu beſeitigen, wenn ſich die Herren Preisrichter bereit finden laſſen wollten, ihre Vermerke den Vereinen behufs Abſchriftnahme für kurze Zeit zu überlaſſen. Das Verlangen iſt auch ſchon im Jahr 1888 ausgeſprochen worden, und zwar läßt ſich ein Züchter nach dieſer Richtung wie folgt hören:

> „So berechtigt es iſt, den Preisrichtern ihr ſchweres Amt nach Möglichkeit zu erleichtern, ſo erſcheint doch das einfache Punktirſyſtem ohne Begründung der Punktzahlen, d. h. Angabe der Touren, als ein Rückſchritt auf dem Gebiet des Prämirungsweſens. Was nützt es dem Ausſteller, zu wiſſen, daß ſeinem Vogel 12, 10 und 9 Punkte, mithin der niedrigſte zweite Preis, zuerkannt worden iſt, wenn er nicht gleichzeitig erfährt, welche guten Touren und welche Schnitzer derſelbe gebracht hat?" (Fortſetzung folgt).

* * *

Auf der Waldwieſe.

Plauderei von L. Aelbert.

Recht früh waren wir hinausgewandert, mein Freund und ich, um, wie ſchon oft, wieder einmal die ewig neuen und doch ſo alten Reize der erwachenden Natur und beſonders der gefiederten Welt auf uns wirken zu laſſen. Wie gewöhnlich war auch heute das Ziel unſerer Morgenwanderung der Aaper Wald, ein großer, eine Stunde von unſerm Heimatsort Düſſeldorf entfernter Forſt. Noch ballten ſich die grauen Nebelmaſſen der Herbſt-Nacht trotzig zuſammen, wie wenn ſie das Anbrechen des jungen Tags verhindern wollten. In unklaren Umriſſen hoben ſich in der düſtern Morgendämmerung des ehrwürdigen, noch tiefen Frieden athmenden Forſts die alten Föhren von dem im Oſten ſanft gerötheten Himmel ab. Ein kühler, linder Morgenwind trug den Harzduft der ernſten Fichten über die Waldwieſe hinüber bis zu dem Rand des Buchenbeſtands, deſſen Baumrieſen ihre Wipfel wie träumend gegeneinander neigten. Wir ſtanden unter einer der breitäſtigen Buchen und warteten ſchweigend und geſpannt auf die erſten Strahlen der Morgenſonne, die unſere gefiederten Freunde lebendig machen ſollten. Das Roth am Horizont breitete ſich immer mehr aus, und über der Waldwieſe machte ein Waldkauz ſeine letzten wunderlichen Flugübungen. Mit lautloſem Flügelſchlag ſtrich er dicht an uns vorüber und ſtieß zuweilen ſeinen halb neckiſchen, halb klagenden Ruf aus, der ja im Volksmund Gegenſtand der ſchönſten Schauermärchen geworden iſt; denn „wehe dem Unglücklichen, der ihn vernimmt! er iſt einem baldigen Tode geweiht". — Wir ſtanden ſtill an den Buchenſtamm gelehnt und dachten über die Gründe nach, die das Volk bewegen konnten, dem harmloſen Käuzchen eine wenn auch nur unwillkürliche und unbewußte Macht über das menſchliche Schickſal zuzuſprechen. Faſt hatten wir über dieſen Gedanken den Zweck unſres Kommens vergeſſen, als wir durch helles, lautes Kichern aus einer Vogelkehle jäh aufgeſchreckt wurden. Am Horizont ſtieg die goldige Sonnenkugel langſam und majeſtätiſch herauf und übergoß die ganze bezaubernde Waldlandſchaft mit einem rothen Schein; ein prachtvoller Anblick. Der Morgen war ſchön und vielverheißend für einen Vogelfreund angebrochen.

Bald hatten wir den Störenfried, der uns ſo plötzlich aus unſeren Betrachtungen herausgeriſſen, uns aber nichtsdeſtoweniger ſehr willkommen war, entdeckt, es war ein Buntſpecht; ob der große oder kleine, war bei der noch nicht ganz beſiegten Dämmerung und der Entfernung nicht mit Beſtimmtheit feſtzuſtellen. Meiſter Zimmermann jedoch war heute ſehr zutraulich, er verließ die Fichte, auf der wir ihn geſehen hatten, und kam leiſe gluckſend über die Lichtung herüber gerade auf uns zugeflogen. Wir verhielten uns natürlich mäuschenſtill. Schon an dem „glück, glück“, das er im Flug hören ließ, verrieth er ſich als ein großer Buntſpecht, und als wenn er ſich uns in ſeiner ganzen Pracht hätte zeigen wollen, fußte er auf einer etwa zehn Schritte von uns entfernten dicken Buche an. Unſere Befürchtung, daß er ſeine Beobachter ſogleich bemerken und dann verſchwinden würde, war unbegründet. Wir hatten hinreichend Gelegenheit, die Farbenpracht des herrlichen Vogels, die kein Maler malen und kein Forſcher beſchreiben kann, zu bewundern. Unverzüglich begann er mit der Arbeit Während der Schall der kräftigen, ungemein ſchnell aufeinander folgenden Schnabelhiebe an unſer Ohr ſchlug, ſtieg deren Urheber ruckweiſe und in einer Schraubenlinie an dem feſten Buchenſtamm empor, zeitweilig ein kleines Rinden- oder Holztheilchen nachläſſig mit dem Schnabel wegſchlendernd. Eins dieſer Stückchen hob ich auf, es war ein dürrer Aſtabbruch. Meine Bewegung hatte ſelbſtverſtändlich zur Folge, daß der „Tambour des Waldes“ blitzſchnell in flatterndem Fluge abſtrich. — Wir ſahen ihm nach, bis der Schein ſeiner bräunlichrothen Schwanzfedern im Waldesdunkel verſchwunden war.



Schmetterlingsfink (Aegintha phoenicotis, *Sws.*).
Kubafink (Fringilla canora, *Gm.*).
Orangebäckchen (Aegintha melpoda, *Vll.*).

Wieder war alles ſtill. Geduldig warteten wir länger als eine halbe Stunde auf das Erſcheinen anderer Gefiederten, da man meiſt „auf dem Anſtande“ mehr Erfolg hat, als durch ruheloſes Umherſtreifen. Heute jedoch ſchien uns der Zufall, oft der größte Freund, oft aber auch der ſchlimmſte Feind des forſchenden Vogelliebhabers, nicht hold zu ſein. „Nun“, meinte mein Freund, „wenn ſie nicht freiwillig kommen, dann rufen wir ſie; hell genug iſt es jetzt dazu, was meinſt Du zu einem Markolf?“ Ich war damit einverſtanden, und langgezogen, ſchneidend ertönte der Buſſardſchrei dreimal durch die klare Morgenluft. Richtig! aus weiter Ferne klang es kaum hörbar „rätſch, rätſch“. Eine halbe Minute ſpäter ſaßen am Rand des gegenüberliegenden Erlenbeſtands drei prächtige Eichelheher und ſpähten nach allen Seiten nach dem vermuthlichen Genoſſen umher. Wir Betrüger ſteckten indeß hinter einer kleinen knorrigen Kiefer und freuten uns der gelungnen Liſt. Nachdem die Heher ſich davon überzeugt hatten, daß die Luft rein war, gingen ſie ungeſtört ihren Beſchäftigungen nach. Zwei machten ſich auf dem Waldboden zu ſchaffen, wo ſie abwechſelnd mit ihrem langen, kräftigen Schnabel die Erde aufwühlten, um unter dem Mos ihre Leckerbiſſen hervorzuholen oder die alten, abgefallenen Erlenzapfen ihres Samens beraubten. Der dritte dagegen, augenſcheinlich der ſchönſte, machte es ſich auf dem ziemlich tragfähigen Erlenaſt bequem. Er ließ die Federn hängen, ſodaß er ſo rund wurde, wie ein meldender Uhu, und ſchwatzte luſtig drauf los. Sein Monolog beſtand aus den verſchiedenſten und wunderbarſten Tönen. Der freundliche Leſer denke ſich den ſanften Lockton des Gimpels und den ſcharfen Buſſardſchrei, das Schnarren der Elſter und den warnenden Amſelruf, das alles eingekleidet in gurgelnde und ſchnalzende Kehltöne, ſo hat er ungefähr eine Vorſtellung von dem Lied, welches unſer Markolf zum beſten gab. Ueber ihm in der Krone der ſchlanken Erle wiegten ſich ein Par reizende Schwanzmeiſen, und in ihr „zörr, zörr, zörr“ miſchte ſich wie Klänge eines Silberglöckchens der Lockruf einer Haubenmeiſe, die hinter uns in dem Zweiggewirr des Unterholzes ihr Weſen trieb. Wahrlich, ein eigenartiges Naturkonzert, für das wir uns, in einem Saal ausgeführt, wol hübſch bedankt haben würden; und doch paßte es zu der märchenhaften, traumverlorenen Waldwieſe ſo vortrefflich, und mir kamen unwillkürlich die Worte Eſaias Tegner's in's Gedächtniß:

„Keiner höhne
Mir der Waldesſänger Töne!
Ewige Natur,
Deine Stimme iſt es nur“.

Noch geraume Zeit beobachteten wir die Vögel, bis es ihnen in den Sinn kam, andere Theile des Aaper Waldes aufzuſuchen, ungeſtört flogen und hüpften ſie von Baum zu Baum davon. Nur die Schwanzmeiſen blieben noch; ſie ließen ſich ſelbſt nicht dadurch ſtören, daß wir unſer Verſteck verließen, um zum Schluß für unſere Lieblinge zu Hauſe noch einige Leckerbiſſen zu ſammeln. Bald waren Taſchen und Schachteln gefüllt mit Rothtannenzapfen für die Meiſen, Spinnen für das Rothkehlchen und die Braunelle, etwas Miere und Kreuzwurz für die Finken und mit ſonſtigem friſchen Naturfutter. Mit dieſen Schätzen traten wir dann froh und beglückt den Heimweg an, um den Reſt des Vormittags daheim bei unſerm gefiederten Völkchen zuzubringen.

Fremdländiſche Finken.

Von K. Ruß.

(Fortſetzung).

Den Uebergang von den Grünfinken zu den Zeiſigen bildet der **Gebirgszeiſig** (Fringilla spinoides, *Vig.*). Sein Gefieder iſt an Oberkopf und Backen nebſt Bartſtreif ſchwärzlicholivengrün; Stirnſtreif, Zügel, Wangen, Halsſeiten und Bürzel lebhaft gelb; Schwingen ſchwarzbraun, an den Spitzen grau geſäumt; über den Flügeln eine breite gelbe Querbinde; Schwanzfedern ſchwarzbraun, am Grunde gelb; ganze Unterſeite lebhaft gelb, Seiten fahl olivengrünlich; Unterleib düſterweiß; Schnabel und Füße röthlichhorngrau; Augen braun. Er erſcheint größer und hübſcher gefärbt als unſer Erlenzeiſig; der Schnabel iſt verhältnißmäßig viel ſtärker. Seine Heimat iſt das Himalayagebirge, von wo er im Winter in die Thäler hinabkommt und gelegentlich auch Gärten aufſucht, während er ſonſt Wälder bewohnt. Sein Geſang klingt dem des europäiſchen Zeiſigs ſehr ähnlich. Er wurde im Lauf der Zeit vereinzelt lebend eingeführt; über ſeinen Werth als Stubenvogel liegen keine Angaben vor.

Der ſchönſte aller fremdländiſchen Zeiſige, die wir bisher lebend vor uns hatten, iſt unzweifelhaft der **ſchwarzköpfige Zeiſig** (F. cucullata, *Sws.*), mit ſchwarzem Kopf, dunkelrothem Mantel, breiter, rother und weißer Binde über den ſchwarzen Flügel und feuerrothem Unterkörper; das Weibchen iſt ſchlicht aſchgrau, röthlich überflogen, mit röthlichweißer Binde auf den Flügeln. Der hübſche Vogel erſcheint kleiner als andere Zeiſige (er hat ungefähr die Größe der Aſtrilde) und enfaltet ein zierlicheres, anmuthigeres Weſen. Sein Verbreitungsgebiet erſtreckt ſich über den Norden von Südamerika und einige weſtindiſche Inſeln. Dieſer tropiſchen Heimat entſprechend, zeigt er ſich gegen Kälte empfindlich; ſonſt aber iſt er nach der Eingewöhnung keineswegs weichlich. In der Vogelſtube harmlos und friedlich, ſchreitet er auch leicht zur Brut. Die erſte Züchtung gelang Herrn Kreisgerichtsrath Heer, bei dem ſie ein Par Zebrafinken vertrieben und deren Neſt benutzten. In Dr. Ruß' Vogelſtube begann im Juli das Weibchen aus dem Kropf zu füttern. Letztres trug dann in ein offnes Niſtkäſtchen, tief in der Krone, die in der Mitte der Vogelſtube angebracht war, Gräſerrispen, Faden und Halme zuſammen und formte hauptſächlich aus Baumwolle, Leinenfaſern und Kuhharen eine runde flache Mulde. Das Gelege beſtand einmal in drei, einmal in vier Eiern von zart bläulichweißer oder grünlichweißer Grundfarbe, fein rothbraun gepunktet. Das Jugendkleid iſt dem des alten Weibchens gleich, doch iſt das junge Männchen an Bruſt, Flügeln und Oberſchwanzdecken bereits lebhaft feuerroth gefärbt; bei der Verfärbung des letztern überfliegt das Roth gleichſam den ganzen Körper in einzelnen zerſtreuten Flecken; ebenſo kommen einzelne ſchwarze Federn an Stirn und Kehle hervor. — Auch Baſtarde mit Kanarienweibchen ſind bereits mehrfach gezüchtet worden. Der Geſang des ſchwarzköpfigen Zeiſigs iſt angenehm, dem unſres Erlenzeiſigs ähnlich, doch beiweitem wechſelreicher und melodiſcher, ohne das ſog. Krähen.

Hinſichtlich der Fütterung iſt zu beachten, daß man ihn am beſten mit Hirſe und Kanarienſamen eingewöhnt; Dr. W. Jantzen in Hamburg machte die Beobachtung: „Sobald man ihm blauen Mohn, Rübſen und algeriſche Hirſe bietet, verzehrt er nur dieſe, vorzugsweiſe den Mohnſamen, und rührt die anderen Körner kaum an“. Später wird er an mannigfaltiges Körnerfutter gewöhnt und erhält als Zugabe hartgekochtes Ei. Zur Brutzeit ſind dieſe Zeiſige wie Prachtfinken zu behandeln. Leider kommt die ſchöne Art ſelten in den Handel und man ſieht ſie jetzt faſt nur noch als Schmuckſtück in zoologiſchen Gärten.

In der Mitte zwiſchen Stiglitzen und Zeiſigen ſteht der **Trauerzeiſig** (F. tristis, *L.*). Er kommt für die Liebhaberei in höherm Grade in Betracht als der vorige, da er häufiger eingeführt wird. Seine Heimat iſt das nördliche Amerika, von den Pelzgegenden bis zum mexikaniſchen Golf, vom Atlantiſchen bis zum Stillen Ozean; im Norden befindet ſich ſein Brutgebiet, den Süden beſucht er nur auf dem Zuge. Sein Vorkommen richtet ſich nach der Fülle der vorhandenen Nahrung; letztere beſteht hauptſächlich aus den Samen verſchiedener Diſtelarten, doch auch aus allerlei anderen Unkrautſämereien, ſowie aus Salat-, Kohl-, Hanfſamen u. a. Die in Scharen in die Felder einfallenden Vögel klettern an den Stengeln gewandt umher.

Daneben freſſen ſie natürlich auch allerlei Kerbthiere, namentlich zur Brutzeit. Im Winter ſollen ſie vornehmlich die Samenkörner aus den Fruchtbällen der Sykomoren verzehren. Ihr Flug geht in hüpfenden Bogenlinien dahin, während der Zugzeit aber hoch in der Luft, oft ſo hoch, daß man die wandernden Vögel nicht ſehen, ſondern nur an ihren Rufen erkennen kann. Wenn ſie ſich niederlaſſen wollen, iſt der Flug ſchwebend.

Der Geſang des Trauerzeiſigs iſt außerordentlich ſchmelzend, wohllautend und wechſelvoll; die amerikaniſchen Vogelkundigen wiſſen ihn nicht genug zu rühmen.

Außerhalb der Brutzeit ſieht man nur ſelten einen einzelnen, ſondern faſt immer Geſellſchaften von zehn bis dreißig Stück. Ihren Aufenthalt wählen ſie immer in der Nähe des Waſſers, zumal ſie auch gern baden. In trockenen Berggegenden und im Innern des Waldes trifft man ſie faſt nie; ſie bevorzugen Waldränder, Wieſen und Viehweiden mit vielem Gebüſch. Zur Brutzeit, nach Auflöſung der Flüge, ſuchen die Pärchen erſt wochen-, ſelbſt monatelang nach einem paſſenden Niſtplatz. Das Neſt bauen ſie mit Vorliebe in Apfel-, Birn- und Pflaumenbäumen, doch auch in allerlei anderen Bäumen und Zierſträuchern. Zur Anlage des Neſts wird gewöhnlich eine aufrechtſtehende Aſtgabel von fünf bis dreißig Fuß Höhe gewählt. Es iſt ſorgfältig hergerichtet, feſt und kunſtvoll gebaut, aus zarten Baſtfaſern, Halmen, Gräſern u. drgl., innen dick mit weicher Diſtelwolle u. a. weichen Stoffen ausgekleidet, und wird in ſechs Tagen erbaut (nach Nehrling). Das Gelege beſteht aus vier bis ſechs bläulichweißen Eiern, die in elf bis zwölf Tagen erbrütet werden.

Bei uns im Handel iſt der Trauerzeiſig nicht ſelten und er würde ſeiner Schönheit, Harmloſigkeit und Zutraulichkeit wegen zweifellos viele Liebhaber finden, wenn er nicht in den meiſten Fällen ſich weichlich und hinfällig zeigte. Schon die amerikaniſchen Vogelpfleger — der Vogel wird in den Vereinigten Staaten gern gehalten — haben dies frühzeitig feſtgeſtellt. Nehrling meint, daß alle nach Mitte Mai gefangenen Vögel dieſer Art nach wenigen Tagen eingehen, da ſie um dieſe Zeit ſchon abgepart ſind und den Verluſt der Freiheit nicht mehr verſchmerzen könnten. Aber auch ſonſt dauern altgefangene ſelten nur ein Jahr lang aus und Nehrling räth daher, ein Neſt voll Junge im Käfig durch die Alten aufziehen zu laſſen. Auch in Deutſchland hat man zumeiſt ungünſtige Erfahrungen mit dem Trauerzeiſig gemacht; allerdings haben ſich Vögel dieſer Art in einzelnen Fällen mehrere Jahre erhalten, aber das waren eben nur Ausnahmen. Erſt in neueſter Zeit dürfte Herr Friedrich Aßmann das richtige Verfahren zur dauernden Erhaltung des Trauerzeiſigs gefunden haben. Für die neu hinzugetretenen Leſer will ich die Hauptpunkte aus ſeiner in Nr. 15 des vorigen Jahrgangs veröffentlichten Schilderung noch einmal kurz hervorheben: Das Anfang Mai erworbene Pärchen wurde bis zum Auguſt mit blauem Mohn, Hirſe, Glanz und ganz wenig Hanf gefüttert; als Zugabe erhielten ſie friſche Ameiſenpuppen, zerſchnittene Mehlwürmer und häufig Grünkraut. Als die Zeit der friſchen Ameiſenpuppen zu Ende ging, ſuchte der Vogelwirth die Fütterung mannigfaltiger zu geſtalten. Er bot vor allem in größerer Gabe kleinkörnigen Diſtelſamen (ſoweit möglich geſammelte Diſtelköpfe, an einem Faden aufgehängt, die von den Zeiſigen beſonders gern genommen wurden), ebenſo Cichorienſamen, blauen Mohn und weiße Hirſe, in geringerem Maße Salatſamen, Glanzſamen, Wegebreit und ferner noch Hanf, Leinſamen, engliſchen Reygrasſamen und Fichtenſamen. Dazu kamen dann noch von Zeit zu Zeit aufgequellte Ameiſenpuppen, zerſchnittene Mehlwürmer, angefeuchtetes Eierbrot und Grünkraut. So brachte er ſie durch den Winter und im Sommer wurden dann wieder friſche Ameiſenpuppen als Zugabe gereicht.

Auf dieſem oder einem ähnlichen Wege wird es hoffentlich bald vielen Liebhabern gelingen, dieſe ſchönen Vögel länger am Leben zu erhalten und vielleicht auch zu züchten.

Herr Apotheker Nagel erhielt ein Pärchen bei bloßer Fütterung mit Spitzſamen, Hanf, Mohn nebſt Vogelmiere zwei Jahre. Herr Hauptmann Boedicker züchtete ſ. Z. Baſtarde mit Kanarienweibchen.

Zum Schluß noch ein Wort über die Gefiederfärbung des Trauerzeiſigs, da dieſe letzthin Gegenſtand der Erörterung wurde (ſ. Nr. 49 v. J.). Die Vögel, welche mein Vater lebend vor ſich hatte, erſchienen folgendermaßen gefärbt: Stirn und Oberkopf ſchwarz, nach hinten ſpitz zulaufend; Flügel ſchwarz, Armſchwingen mit ſchmalen weißen Spitzen, welche einen Querſtreif über den Flügel bilden, Handſchwingen an der äußern Seite ſchmal weiß geſäumt, Schwanzfedern ſchwarz mit weißen Innenfahnen; Bürzel, Ober- und Unterſchwanzdecken weiß; Kopf, Rücken, Bruſt zitron- oder dunkelkanariengelb; Unterleib weiß; Schnabel hellbraun; Augen braun; Füße gelblichbraun. Das Weibchen iſt an Oberkopf und ganzer Oberſeite olivengrünlichroſtröthlichbraun; Stirnrand, Geſicht und Kehle fahlgelb; Flügel ſchwarz mit fahlröthlichgelber Querbinde; Schwanzfedern ſchwarz mit weißlichem Fleck an der Innenfahne; obere Schwanzdecken und ganze Unterſeite bräunlichweiß. Das Winterkleid des Männchens iſt dem des Weibchens gleich, nur etwas lebhafter in den Farben; Unterſeite heller, faſt reinweiß; Schwanzfedern mit weißen Innenfahnen. Nehrling, der den Vogel im Freileben beobachtete und auch im Käfig hielt, beſchreibt ihn kürzer in Folgendem: Männchen glänzend zitrongelb; Kopfkrone, Flügel und Schwanz ſchwarz; kleinere Flügeldecken, ein Band über die Schwanzdecken und die Spitzen derſelben, die Innenfahnen der Schwanzfedern weiß; Weibchen oberſeits gelblichgrau, unterſeits grünlichgelb; Flügel und Schwanz ähnlich wie beim Männchen.

Die Frage iſt nun, ob unter dem Namen Trauerzeiſig, bzl. Goldſtiglitz, wie er auch genannt wird, nicht zugleich andere, nächſtverwandte Arten eingeführt werden.

Da haben wir zunächſt den Zeiſig von Arkanſas (F. psaltria, *Say*) vor uns; er zeigt ſchwarze Kopfplatte, Flügel und Schwanz, die übrige Oberſeite, ſowie der Hals iſt olivengrün; die Unterſeite erſcheint ſchön gelb. In Arizona und Mexiko kommen zwei Abarten vor, die indeſſen kaum zu unterſcheiden ſind.

Nahe verwandt iſt auch der *kaliforniſche Zeiſig* (F. Lawrencei, *Cass.*); die Kopfhaube, Kopfſeiten bis zum Auge und die Kehle ſind ſchwarz, die Oberſeite iſt aſchgrau, mit Ausnahme der Flügel und des Schwanzes, die ſchwärzlich erſcheinen, die Unterſeite grünlichgelb. Dem Weibchen fehlt die ſchwarze Kappe.

Andere Verwandte kommen hier nicht in Betracht. Der Zeiſig von Arkanſas wurde einmal vereinzelt eingeführt. Seine Heimat iſt der Weſten der Vereinigten Staaten, wo er beſonders die Gebirge bewohnt. In der Lebensweiſe gleicht er dem Trauerzeiſig, niſtet auch ebenſo wie jener. Der Geſang ſoll ähnlich ſein, doch nicht ſo laut und voll erklingen. (Fortſetzung folgt).

Das Schickſal unſerer Vogelneſter und die wichtigſten Faktoren des Vogelſchutzes.

Von M. Dankler.

Wenn die Volkszählung, welche im Deutſchen Reich alle vier Jahre abgehalten wird, vorüber iſt, dann wiſſen die Zeitungen nach einiger Zeit anzugeben, um wieviel Prozent die Bevölkerung geſtiegen iſt. Würde man aber alle vier Jahre eine Vogelzählung abhalten, ſo würde man prozentlich nachweiſen, wie unſre Vogelwelt ſich zwar langſam, aber mit unheimlicher Sicherheit vermindert.

Als Urſache wird allgemein das Wegfangen der Reiſevögel in den Ländern, die ſie durchziehen müſſen, beſonders der Vogelmord in Italien angeſehen.

Gewiß, die Gefahren der Reiſe werden Tauſende von Opfern fordern; aber die Thatſache, daß auch die Vögel, welche die harte Winterzeit mit uns theilen, ſich ebenſo vermindern, läßt noch auf andere, tiefer gehende Urſachen ſchließen. Dieſe aufzuſuchen und zu bekämpfen, ſoll das Ziel der heutigen Arbeit, wie auch das Streben eines jeden Vogelfreundes ſein. Nach meinen Beobachtungen iſt *das Schickſal der Vogelneſter der Hauptgrund dafür, daß unſere Vogelwelt ſich in ſo beängſtigender Weiſe vermindert.*

Zum Beweiſe theile ich einige Beobachtungen mit. Der Ort Büsbach bei Aachen in der Rheinprovinz iſt von allen Seiten mit kleineren Wäldern, Geſtrüpp und Dornen bewachſenen Abhängen umgeben, welche vielen Hundert Vögeln Gelegenheit zum Neſtbau bieten. Bei einem botaniſchen Ausflug fand ich in einer Landſchaft, Oberſtein genannt, daſelbſt einen Jungen, welcher anfangs ſcheu ausreißen wollte, durch ein Geſchenk aber bald zutraulich wurde. Derſelbe konnte mir (am Samstag Abend) auf einem halben Quadratkilometer Raum 67 Vogelneſter zeigen, von denen wol 45 bis 50 Junge enthielten. Am Dienstag darauf traf ich den Jungen wieder und fragte: „Nun, wie ſteht es mit den Vogelneſtern?“ „O“, verſetzte dieſer gleichgiltig, die ſind bald alle ausgeriſſen“. Davon mußte ich mich überzeugen, der Junge führte wieder, und ſiehe: *Von den 67 waren mehr als 50 ausgeriſſen.* „Das iſt immer ſo“, ſagte mein Führer, „des Sonntags geht Alles Neſter ſuchen“. Beſonders die kaum der Schule entlaſſenen Burſchen ſind hier die ſchlimmſten.

Im Jahr 1896 verzeichnete ich mir im Laufe des Sommers etwa 40 Vogelneſter, davon kamen von 7 die Jungen zum Ausfliegen. Erhebungen in einer Schule ergaben, daß von 283 Neſtern, welche die 40 Schüler derſelben im Sommer „gewußt“ hatten, nach Angabe der Kinder etwa 40 bis 50 zum Ausfliegen gekommen ſind. Nach meinen zufälligen Beobachtungen an Neſtern, die ich beim Inſektenfang fand, iſt die Zahl der ausgeriſſenen Neſter aber noch viel größer, ja von zehn Neſtern werden acht bis neun ausgeriſſen, durch Thiere ausgeraubt oder ſonſt zerſtört, und dadurch gehen alſo auch 80 bis 90 Prozent der Nachkommenſchaft zugrunde. In Gärten, Parkanlagen und ähnlichen mehr geſchützten Orten kommen natürlich mehr Neſter zur Entwicklung und zum Ausfliegen der Jungen, aber auch hier gehen noch 50 bis 70 Prozent durch raubende Katzen, Eichhörnchen, Heher u. drgl. zugrunde.

Es iſt nun wol zu unterſcheiden: die obigen hohen Prozentſätze beziehen ſich nicht auf die Neſter im Allgemeinen, ſondern auf entdeckte Neſter und zwar auf ſolche, die von Menſchen entdeckt wurden. Dies iſt nämlich ein gewaltiger Unterſchied, denn über Vogelneſter, die vom Menſchen entdeckt werden, ſcheint die Vernichtung mehr Gewalt zu haben, ſie ſcheinen, ſelbſt wenn der Menſch ſie nicht bedroht, leichter ihren andern Feinden zur Beute zu werden. Mein Garten bietet manchem Vogel Unterſchlupf. Beinahe alle Neſter, die ich fand, gingen zugrunde, während plötzlich ausſchlüpfende junge Vögel zeigten, daß andere Bruten, von deren Daſein Keiner eine Ahnung gehabt, durchgekommen waren.

Ein *zweiter Hauptgrund*, daß den Vögeln immer mehr die natürlichen Daſeinsbedingungen ententzogen werden, iſt mehr allgemein bekannt, ſodaß ich darauf nicht einzugehen brauche. Die Hauptfaktoren, welche für den Vogelſchutz in Betracht kommen, ſind zunächſt Schulen und landwirthſchaftliche Vereine.

Die Schule kann für den Vogelſchutz von bahnbrechender Wirkung ſein, natürlich nur, wenn die Lehrerſchaft eines Orts Hand in Hand geht und kräftig durchgreift. Ein einfaches Verbot *nützt nichts*. Wie oben ſchon erwähnt, ſind die meiſten Neſter verloren, die nur ein Menſch findet, daher ſoll nicht nur das Ausreißen und Zerſtören, ſondern das Neſterſuchen verboten werden. Soll dieſes aber wirken, ſo muß überhaupt das Streifen durch Feld und Gebüſch abſeits der Wege aufhören. Dieſes kann ein Lehrer dadurch erreichen, daß er einigen braven und vertrauenswerthen Schülern ein beſtimmtes Gebiet anweiſt, welches ſie beſchützen ſollen, ſie müſſen dem Lehrer die Kinder melden, welche planlos von den Wegen durch's Gebüſch ſchweiften. Die Schule aber hat ſelbſt Vortheil davon, indem ſie die Kinder, deren Erziehung ihre Hauptaufgabe iſt, vor Gemüthsrohheit, ja im ſpätern Leben vor Gefängniß und Zuchthaus bewahrt. Das klingt ſtark, iſt aber wahr, denn das Vogelneſterſuchen und Ausreißen iſt die Schule der Wilderer, und wie mancher Wilderer zum Mörder wird, weiß Jeder, der die Tagespreſſe verfolgt. Die Wahrheit des Behaupteten, die ſich aus den Thatſachen ergibt, iſt aber auch eine Folgerung der reinen Vernunft, denn daß ein Kind, welches in roher Weiſe ein Neſt zerſtört und die jungen Vögel zu Tode quält, grundverdorben wird, daß ein ſolches Kind mit ſeinen Mitmenſchen kein Mitleid hat, iſt ein nur leichter Schluß. Und die Schule kann hier viel, ſehr viel ausrichten, wenn nur mit der eben angedeuteten Anordnung ein feſter Wille und eine heilſame Strenge ſich verbindet. Mit ſcharfem Gebot muß natürlich Belehrung und Anleitung Hand in Hand gehen. Kinder, die im Winter Freude daran haben, die hungernden Vögel zu füttern, werden auch im Sommer ihre Neſter nicht beunruhigen, aber Buben, die im Winter mit kleinen Schlagfallen (Feder- oder Spatzenfallen), deren zuſchlagende Federn die Beine der Gefangenen vielfach zerſchlagen, den Vögeln nachſtellen, das ſind auch im Sommer die ſchlimmſten Feinde.

Das Verbot, Neſter auszureißen, darf keine Ausnahme haben. Das Kind, welches ein Spatzenneſt ausreißt, werde ſo ſtreng beſtraft wie dasjenige, welches andere Neſter vernichtet, denn eins bringt das andere mit ſich. Sollen die Spatzen vermindert werden, ſo mögen dies Erwachſene beſorgen, aber nicht einmal in Gegenwart der Kinder.

Ein zweiter Hauptpunkt des Vogelſchutzes müſſen die landwirthſchaftlichen Vereine und Kaſinos werden. Hier müſſen die Landwirthe über den Nutzen der Vögel immer mehr aufgeklärt werden. Sie gerade können ſo vieles thun! Zunächſt können ſie das Betreten ihres Eigenthums in der Brutzeit für jeden Fremden verbieten und ihre Ackergehilfen anweiſen, jeden Unberufenen daran zu verhindern. Sodann können ſie viel erreichen durch Sorge für Niſtgelegenheit. Warum ſoll jede Böſchung rein abgeholzt, jeder Strauch an der Feldecke, jede Hecke am Wieſenrand verſchwinden? Im Gegentheil, laßt die Hecken recht dick wachſen, laßt Bromberranken und Geißblatt daran emporranken, die Vögel ſind dankbar dafür und ſie danken nicht nur mit ſüßem Lied, ſondern durch kräftige Mitarbeit; ſie ſind eher auf dem Felde als die Tagelöhner und unermüdlich thätig.

Der Einzelne iſt hier zu ſchwach, die Allgemeinheit ſtark, und wer einen Bauernverein, ein Kaſino für den Vogelſchutz gewinnt, der hat viel gethan, mehr als einer, der einen viele Meter langen Entrüſtungsartikel gegen die böſen Italiener ſchreibt. Wer alſo einem derartigen Verein angehört und dabei die Gabe des Wortes etwas beſitzt, der vergrabe ſein Talent nicht, ſondern wuchere damit, halte einen kurzen, aber energiſchen Vortrag über Nutzen und Schutz der Vögel, und er kann ſicher ſein, es hilft immer etwas. Jäger, Förſter und Jagdhüter, ebenſo Flurſchützen und Feldhüter müſſen geborene Verfechter des Vogelſchutzes ſein, indem ſie nicht nur räubernde Buben vertreiben, ſondern auch die ſchlimmſten Feinde der jungen Brut, wildernde Katzen, abſchießen, und die Feinde aus der Vogelwelt ſelbſt, Raubvögel und Heher, nicht zu zahlreich werden laſſen.

Endlich ſoll jeder Vogelfreund zum Schutz ſeiner gefiederten Freunde ſoviel beitragen, als er kann. Viele Wenig machen eben ein Viel.

Und wer den Vögeln gern in ſeinem Garten eine Heimſtätte bietet, der ſorge in erſter Stelle für eine dichte Umzäunung, die am allerbeſten durch Drahtgitter für Katzen unpaſſirbar gemacht wird. Thun dies die Beſitzer mehrerer nahe zuſammen liegender Gärten zugleich und ſorgen dabei für Niſtgelegenheit, ſo werden ſie ſich über den Vogelbeſtand, den ſie in ein par Jahren erzielen, recht wundern.

Briefliche Mittheilungen.

... Geſtern habe ich vier Vögel als „Rothkopf-Amandinen“ erhalten, die ich ſchon vor Jahren als „Schönaſtrilde“ empfangen hatte. Doch iſt es weder die eine, noch die andere Art. Sie ſtammen von der Mozambik-Küſte. Sie haben die Form der Aurora-Aſtrilde, aber helle Schnäbel. Das Männchen (?), noch jung, erhält ein rothes Geſicht; jetzt hat es erſt einige rothe Federn. Die Flügel, der Rücken ſind dunkelbraun, Außenſäume der Flügelfedern, Bürzel, Schwanz braunroth, unterhalb bräunlichgrau geſchuppt. Weibchen (?) ohne Roth am Kopf, heller gefärbt. Hoffentlich kann ich die Vögel, die ſonſt ſchön im Gefieder, erhalten und züchten.

Die vor Jahren erhaltenen Vögel der Art, es waren ein Männchen und zwei Weibchen, bauten im letzten Jahr ihres Lebens ein Neſt im dichten Gebüſch, aber an ganz heller Stelle. Sie brüteten regelrecht. Jedoch hatten ſie bei der Beſichtigung nicht einmal Eier im Neſt. Als ſie ſtarben, waren ſie ſo ſchlecht im Gefieder, daß ſie zum Ausſtopfen nicht zu gebrauchen. Ich ſuche noch zu erwerben: Weibchen: Diamanttäubchen, Schönaſtrild; in Pärchen: ſeltene Aſtrilde, Amandinen und Schönſittiche.

Nagel, Apotheker.

Leider ſind die beiden ſeltenen Vögel inzwiſchen eingegangen, Herr Apotheker Nagel hatte die Freundlichkeit, ſie uns zu überſenden und ſie erwieſen ſich unzweifelhaft als Wiener's Aſtrild (Aegintha Wieneri, *Rss.*, s. Pitylia afra, *Gm.*), wenngleich das Roth an den Kopfſeiten des Männchens noch nicht ſeine volle Ausdehnung erlangt hatte. Wir ſagen Herrn Nagel auch an dieſer Stelle beſten Dank und bedauern herzlich den Verluſt der werthvollen Vögel. Es iſt eine eigenthümliche Erſcheinung, die von Zeit zu Zeit immer wiederkehrt, daß eine höchſt ſeltne Vogelart, ohne von den Händlern erkannt zu werden, eingeführt und unter irgend einem Namen verkauft wird und dann, wenn ſie nicht ein reich erfahrener Liebhaber erwirbt, unbeachtet bleibt. So iſt es namentlich bei Prachtfinken oft der Fall. Wiener's Aſtrild habe ich im vorigen Jahrgang, Nr. 37, ausführlich geſchildert, da ein Stück damals in den Berliner zoologiſchen Garten gelangte. Hoffentlich wird der abſonderlich hübſche Vogel jetzt häufiger in den Handel kommen. K. R.

Anfragen u. Auskunft

Herrn Präparator Carl Sahl: Wie kann ich Ihnen ſagen, ob der Händler erſatzpflichtig iſt, wenn Sie mir nicht angeben: 1. wie lange Ihr Bekannter den Graupapagei gehabt; 2. wie er ihn gefüttert und verpflegt hat und ob der btrf. Händler ihn überhaupt unter Garantie voller Geſundheit geliefert hat. Der Papagei iſt ein elender Vogel, abgezehrt, mit ſpitzem Bruſtknochen und in ruppigem Gefieder. Für ſo billigen Preis konnte der Beſitzer aber auch kaum einen gut eingewöhnten, lebenskräftigen Graupapagei erwarten.

Herrn Wilh. Fuchs: 1. Bei Ihrem Futter für die Haidelerche fehlt Kanarienſamen und kleingehacktes Grünkraut (Vogelmiere oder Kohlblätter). Daß dem Vogel, ſelbſt nach gut überſtandener Mauſer, jetzt die Federn leicht (bei jedem Auffliegen faſt) ausfallen, liegt jedenfalls darin begründet, daß Sie dem Miſchfutter zu viel Sepiapulver zugeſetzt haben. Die Sepienſchale iſt oft ſo ſtark von Seewaſſer durchdrungen, daß ſie auf den Geſundheitszuſtand der Vögel ſchädlich wirkt, namentlich wenn dieſe viel davon freſſen. Laſſen Sie das Sepiapulver einmal fort und geben Sie ein Stückchen Kalk von alten Wänden oder Kreide. 2. Wenn die Lerche ſich in ſo unnaturgemäßem Gefiederzuſtande befindet, ſo geben Sie ihr im Mai nicht die Freiheit, denn ſie wird nicht gut flugbar ſein und im Freien nicht fortkommen können.

A. B. in M.: Nehmen Sie für Ihre Schamadroſſel einen Futterwechſel vor; vor allem laſſen Sie das Univerſalfutter fort. Dagegen ſetzen Sie einem Miſchfutter aus beſten getrockneten Ameiſenpuppen und geriebener Möre abwechſelnd zu: geriebenes, hartgekochtes Hühnerei und geriebene altbackne Semmel oder etwas friſches fein geſchabtes rohes Fleiſch, ein wenig gequetſchten Hanf und angequellte zerſchnittene Korinthen. An den Mehlwürmern hat die Schamadroſſel ſich jedenfalls einmal überfreſſen; deshalb mag ſie dieſelben jetzt nicht mehr. Sie müſſen nun andere lebende Kerbthiere für ſie beſchaffen und nicht zu viele davon geben: Pelz- und Speckkäferlarven, beſonders Spinnen, ſodann auch Fliegen, Schaben, Motten u. a. Hoffentlich wird ſie dann von ihrer Verdauungsſtörung bald geſunden und Sie wieder mit ihrem vollen Geſang erfreuen.

Herrn Paul Köhler: Ihre Frage iſt nicht klar geſtellt. Es geht aus derſelben nicht hervor, ob Sie von Dompfaff und Birkenzeiſig Miſchlingszucht erzielen oder ob Sie jede der beiden Arten für ſich züchten wollen. Weiter geben Sie nicht an, was für andere Vögel Sie in Ihrer Vogelſtube halten. Sie müſſen alſo Ihre Fragen ganz genau faſſen, ehe es uns möglich iſt, Ihnen Auskunft zu ertheilen.

◆

Zu unſerm Bilde.

Zumal für Anfänger in der Liebhaberei ſind die drei Vögel der heutigen Abbildung empfehlenswerth.

Zwei Arten gehören zu den allbeliebten Prachtfinken, die jetzt noch in höherm Grade ſich der Zuneigung der Vogelfreunde erfreuen, als früher, da ſie zu bedeutend billigeren Preiſen im Handel ausgeboten werden. Das Orangebäckchen (Aegintha melpoda, *Vll.*) iſt dem Ausſehen nach wol den meiſten Liebhabern bekannt: Vorderkopf bläulichaſchgrau, Hinterkopf bräunlichgrau, Wangen orangegelb, Strich über und unter dem Auge roth; am ganzen obern Körper hellbräunlichgrau und am untern dunkelaſchgrau mit ſchwarzbraunem Schwanz, glänzend rothem Bürzel und mattgelbem Unterbauch. Der Schmetterlingsfink (A. phoenicotis, *Swns.*) erſcheint hübſcher gefärbt: oberſeits rehbraun, Kopfſeiten, Unterſeite und Schwanz hellblau, Wangenfleck roth. Das erſtere iſt leicht einzugewöhnen, dagegen ſchwieriger als andere Prachtfinken zu züchten; beim Schmetterlingsfink liegt das Verhältniß gerade umgekehrt. Der Anfänger wolle bei allen Prachtfinken beachten, wenn ſie nicht vom Verkäufer bereits als völlig eingewöhnt bezeichnet werden, daß man ſie nach dem Empfang zunächſt in höherer als der gewöhnlichen Stubenwärme halten muß, alſo bei 16 bis 18 Grad R., und im Winter darf die Temperatur des Zimmers nicht unter 8 Grad ſinken. (Selbſtverſtändlich dürfen im Winter bei kaltem Wetter ſoeben angelangte Vögel nicht ſogleich in die warme Wohnſtube gebracht werden, ſondern müſſen vorerſt kurze Zeit im wenig oder garnicht geheizten Zimmer bleiben). Allmählich werden ſie dann an die normale Zimmerwärme (14 bis 15 Grad R.) gewöhnt. Prachtfinkenkäfige, ſowol zum Eingewöhnen eines Pärchens, bzl. zur Haltung deſſelben als Schmuckvögel, wie auch beſonders Prachtfinkenheckkäfige ſind heutzutage bei jedem Käfigfabrikanten in ſachgemäßer Einrichtung zu erlangen. Hinſichtlich der Fütterung iſt dieſelbe Regel zu beachten, wie bei allen Stubenvögeln, daß man ſie zunächſt genau ſo verpflegt, wie es vorher der Händler gethan, und erſt nach einiger Zeit die bisherige Fütterung ändert, vorausgeſetzt, daß dieſelbe nach den Erfahrungen der beſten Vogelwirthe unrichtig iſt. Der Liebhaber, der dieſe Prachtfinken nur halten will, um ſich an ihrem anmuthigen und zierlichen Weſen zu erfreuen (in dieſer Beziehung übertreffen ſie ja jeden andern fremdländiſchen Stubenvogel) kann bei der Fütterung mit weißer und Senegalhirſe, nebſt Kanarienſamen, ſowie zeitweiſer geringer Gabe von etwas hartgekochtem Ei ſeine Pfleglinge geſund erhalten; dazu mag er ihnen noch etwas Grünkraut (Vogelmiere im Sommer, im Winter Tradeskantia oder Doldenrieſche) bieten. Noch beſſer iſt es natürlich, wenn man ihnen möglichſt mannigfaltig kleine Sämereien reicht, ſowie Gräſerähren in halb- und ganz reifem Zuſtande, auch von Zeit zu Zeit einige kleingeſchnittene Mehlwürmer u. a. wohlbekömmliche Leckereien. Wer Zuchtverſuche unternehmen will, muß ihnen zur beginnenden Niſtzeit die bisherigen Sämereien auch eingequellt geben und dazu reichlicher als ſonſt animaliſche Nahrung: kleine friſche Ameiſenpuppen oder ein Ameiſenpuppengemiſch, mit zerſchnittenen Mehlwürmern geſpickt, ſowie, wenn zu erlangen, andere kleine weiche Kerbthiere. Manche erfolgreichen Züchter laſſen die eingequellten Sämereien fort und geben als Aufzuchtfutter ein Gemiſch von kleingehacktem, hartgekochtem Hühnerei mit aufgebrühten Ameiſenpuppen zu gleichen Theilen, das Ganze mit feingeſtoßnem, altbacknem reinem Weißbrot zu einem krümeligen Gemenge bereitet.

Nach vollendeter Eingewöhnung läßt man die Orangebäckchen ſowol wie die Schmetterlingsfinken am beſten in der Vogelſtube frei fliegen, in der ſich natürlich keine größeren unverträglichen oder gar bösartigen Bewohner befinden dürfen. Oder man läßt ſie im Prachtfinkenheckkäfig zur Brut ſchreiten. Als Niſtgelegenheit werden zweckmäßig Harzer Bauerchen verwendet, in denen ein mit Leinwand ausgenähtes Neſtkörbchen angebracht iſt, oder auch andere ähnliche Niſtkörbchen, wie man ſie im Handel meiſtens ſchon fertig bekommt. In dieſe legt man eine Handvoll Agavefaſern, und dieſelben, ſowie andere zweckmäßige weiche Bauſtoffe: Charpie, Halme u. a., bietet man zugleich frei im Käfig. Auch wer die Vögel nicht niſten laſſen will, muß ſolche Neſtkörbchen, mit weichen Bauſtoffen gefüllt, anbringen, damit die Prachtfinken nachts, wenn es kalt wird, hineinſchlüpfen und ſich, dicht aneinander gedrängt, wärmen können.

Der Kubafink (Fringilla canora, *Gm.*) hat, obwol zu den eigentlichen Finken gehörig, im Weſen viel Aehnlichkeit mit den Prachtfinken, namentlich den Aſtrilde, wenigſtens inbezug auf ſeine angenehmen Eigenſchaften als Stubenvogel. Er gehört zu den beſten Zuchtvögeln. Im Verlauf der Schilderung „Fremdländiſche Finken“ werde ich ihn eingehend beſprechen. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Geſetzl. geſchützt.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die
Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [172]
Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Geſetzl. geſchützt.

☛ **1898er** hochprima getrocknete und ſorgfältigſt gereinigte [173]

Ameiſeneier,

1 Liter mit 85 ₰ liefert
Gottlieb Wanek, Vogelhdl.
Prag (Böhmen).

Hochprima **echten Elbweißwurm** (Eintagsfliege) habe noch etwas abzugeben, das beſte u. ſchönſte, was es in dieſem Artikel gibt, Preis per Lit. 1 ℳ [174]
Carl Schwertner, Auſſig a. E.

☛ Ameiſeneier, ☚

1898er Ia geſiebte, ſandfreie Ware,	per Kilo	ℳ 3.20
Weißwurm, prima	„ Liter	„ 1,—
Muſka	„ „	„ 0,90
Univerſalfutter, extra	„ Kilo	„ 1,20
Mohnmehl, weiß	„ „	„ 0,60
Sonnenblumenk., weiße	„ „	„ 0,60
Reis in Hülſen	„ „	„ 0,60
Ossa sepia, prima	„ „	„ 8,—
Sommerrübſen, Ia großkern. ſüß	„	0,44

Ferner Mohar-, Senegal-, Kolben-, weiße **Hirſen, Mohn** und alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [175]
G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Vögel.

!! 12 Lieder !!

ſingender und ſehr viel rein und [176] **deutlich ſprechender**

Blauſtirn-Amazonenpapagei,

Prachtexemplar u. Schönheit ohne gleichen, äußerſt zahm gegen Jedermann, nie ſchreiend u. ohne Fehler u. Tadel, verkauft für nur 250 Mk.
F. Rejsek, Hamburg, Peterſt. 28.

Wellenſittiche,

kräftige, junge Zuchtp., blutsfrd., 6 ℳ inkl. Porto u. Verp., auch einzelne Vögel. [177]
Frau **Fritsch, Straßburg** (Elſaß), Kellermannſtaden 6.

Zeiſige, Kreuzſchnäbel

je à St. 1,50 ℳ, Wbch. z. Hälfte, Hohlroller à 8, 10 u. 12 ℳ, Wbch. 2 ℳ [178]
Zool. Handl. Ornis, Wernigerode, Harz.

☛ 1 P. ſpitzſchwänzige **Gürtelgrasfinken** 15 ℳ, 1 P. **jav. Mövchen,** Mnch. brbt., Weibch. weiß, 6 ℳ, zuſ. 20 ℳ inkl. Verpack., abzugeben bei [179
H. Gerstaecker, Dresden, Werderſtr. 2.

Wer liefert unter voller Garantie für ſtreng reelle Bedienung **prima Sänger,** parweiſe, zwecks Anſiedelung in Park-Anlagen? Offerten geeigneter Vogelarten, auch Nachtigalen und Sproſſer, erbittet **Aug. Gottlieb,**
[180] **Hersfeld** (Heſſen-Naſſau).

Selten ſchöner

Graupapagei,

prachtvoll hell und tadellos im Gefieder, ungewöhnlich klug, erſt 2 Jahre alt, lernt überraſchend leicht zu, jedes Vorgeſprochene in 2 Tagen, keine Unarten, ein artiger Vogel; ſpricht klar u. deutlich: Wackerlora, wackere Frau, Papa kommt, gute Frau, mein Zuckervogel, Karl, wie ſiehſt Du aus, Du Stromer, ich heiß' Jakob Beyer! Gute Frau, einen Kuß; 1, 2, 3, hurrah; herrein; guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, meine gute Lora, Adieu, Lora will Brot mit Zucker haben; nicht ſchreien, ruhig ſein; Emma aufſtehen; komm Lorchen Lorchen Köpſchen krabbeln; Mama biſt Du böſe? Ausgehen, Klara, Martha, Bertha, nicht beißen; au, au, au, hah, hah, hah, na mein Lora, was ſagſt Du denn, komm mein Lorchen, gieb Kuß; komm mein Jung; Papa biſt Du da. Das ausführliche Sprachverzeichniß anzuführen, wäre zu viel. Gebe volle Garantie für geſunde Ankunft und Tadelloſigkeit, feſter Preis 125 ℳ

Graupapagei,

erſt ein Jahr alt, ausgezeichnetes Exemplar, überaus klug, tadellos in Federn, feſt akklimatiſirt, an Hanf, Mais und Waſſer gewöhnt, ſpricht klar und deutlich Hugo, 1, 2, 3 hurrah, Kukuk, Papa. Ausführliches Sprachverzeichniß gegen Retourmarke. 65 ℳ.

Graupapagei!

Ebenfalls tadelloſer Vogel, ſchon ganze Sätze ſprechend, z. B. Lora, komm, komm mal her u. ſ. w., 50 ℳ, 1 Jahr alt.

Die Vögel ſind vollſtändig fingerzahm u. nur gute, bei Privaten zugelernte Sprecher, dieſelben werden nur per Nachnahme verſandt unter voller Garantie. Anfragen Retourmarke. [181]
W. Isaaks, Landbriefträger, **Harburg** (Elbe).

Meine ſelbſtgezüchteten ff.

Kanarienſänger

verſende vom 1. Novbr. ab, unter Garantie des Werthes und lebender Ankunft, zu 9, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ à St. [182]
Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, 146.
NB. Bei Anfrage Rückporto erbeten.



Hochfeine

Harz. Edelroller

(Stamm Trute),
welche vorzüglich in tief. gebog. u. geraden Hohlrollen, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Klingel, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 6, 8, 10, 12 u. 15 ℳ, Dtz. 60, 72, 84 und 96 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, verſende gegen Nachn. 6 Tage Probezeit. Nichtgefallendes tauſche um, ev. Betrag zurück. [183]
Herm. Voigt, Thale a. Harz.

Harzer Kanarien-Roller

Roller mit Nachtigaltouren zu 6, 8 ℳ, edle Roller v. 10 ℳ an, **Harzer Vogelkäfige** u. Utenſilien, Geflügelkäfige, Poſtverſandt-Kiſten u. ſ. w. Preisl. frei. [184]
Ad. Janson, Lauterberg, Harz.

Schwarzkopf

m. echtem Doppelüberſchlag u. gute **Orpheusgrasmücke** zu kaufen geſucht. Offerten unter **A. B.** an die Exped. d. Bl. [185]

☛ 1898 erhielt mein Stamm Harzer Kanarienvögel 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10–25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.
Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [186

▬ Hochfeine prämirte ▬

Harzer Edelroller

(Stamm Trute), welche vorzüglich in Hohlrolle, Knorre, Klingelrolle, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 8, 10, 12, 15, 20 ℳ. Zuchtweibchen 1,50 ℳ verſende gegen Nachn., bei achttägiger Probe. Nichtgefallende tauſche um, ev. Betrag zurück, gebe zwei St. Zuchtweibchen gratis bei. [187]
Wilh. Keye, Thale, Harz.

Verk. oder tauſche auf Vögel:

70 gut präparirte **Schmetterlinge** 10 ℳ,
1 Harzer Vorſänger 10 ℳ. [188]
Georg Stahl, Dietlingen b. Pforzheim.

Harzer Kanarienvögel

(Truteſche Hohlroller),

Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. i. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel. Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis** und **franko.** Weibchen deſſelb. Stamms 2,50 ℳ [189]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Geſucht: Granataſtrilde, Buntaſtrilde, **Wiener's Aſtrilde, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen.**
F. Beedzler, [190]
20, Norton Folgate, **London** (England).

Feinſte Kanarienſänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [191]
R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.
Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

Papageien-Sprech-Schule.

Den geehrten Herrſchaften halte ſtets mein gut ſortirtes Lager von wirklich gut u. deutlich ſprechenden jungen **Graupapageien** u. **Amazonen** beſtens empfohlen, den Leiſtungen entſprechend grundſolide Preiſe u. abſolut reelle Bedienung. Garantie für geſunde tadelloſe Ankunft, bei Anfragen erbitte Preislage anzugeben, Sprachverzeichniſſe u. Dankſchreiben über gelieferte gutſprechende Papageien gern zu Dienſten. [192]
Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Bücher-Anzeigen.

Gefiederte Welt, 1894, 1895, 1896, 1897, Originalbände, tadellos erhalten, verkaufe gegen Meiſtgebot. [193]
G. Schmidt, Wien IV.
Karlsgaſſe 22 III.



No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.–
No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50
Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.–**

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

☞ Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige für Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc. mit sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [191]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Zeitſchrift für ***Elektrotechnik***
und ***Maſchinenbau,*** Poſtzeitungsliſte 81[illegible]a.
ſowie für ***Metall- und Montaninduſtrie.***

Abonnementspreis: **pro Monat 20 Pf.** durch jede Buchhandlung, **bei der Poſt 60 Pf. für das Vierteljahr.**

Bereits erſchienene Nummern des Quartals werden koſtenlos nachgeliefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervorragendſten Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und berufen, unendlichen Nutzen zu ſtiften.

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik und dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montaninduſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt, Alles was irgendwie für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elektrotechnik und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in populär-wiſſenſchaftlicher, leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle **ſpeziellen Zweige** der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des **Auslandes** hat die Zeitſchrift **zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute als Mitarbeiter,** welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues ꝛc. ſofort **Kenntnis** geben und über alle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten. Jede Nummer der Zeitſchrift wird dabei eine Reihe **elektrotechniſch-wiſſenſchaftlicher und maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel** aus der Feder erprobter Autoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten. Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl **kleiner Mitteilungen** aus dem Gebiete **der Elektrotechnik, des Maſchinenbaues** und der **Metall- und Montaninduſtrie** an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und allezeit wiſſen, welche neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die **Patentnachrichten,** die **von uns** ſorgfältig geſammelt **werden,** um durch ſie den Leſern einen Überblick über die neuen Erfindungen ꝛc. **zu geben. Der techniſche Briefkaſten** erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch Fachmitarbeiter zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner **handelspolitiſche Leitartikel,** die energiſch für die Intereſſen der deutſchen Induſtrie eintreten. Unter dem Titel: **„Kleine handelsinduſtrielle Mitteilungen“** wird **alles** dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt Metall- u. Montaninduſtrie Bezug **hat.** Ebenſo finden **die Submiſſionen, geſchäftlichen Mitteilungen** ꝛc. ꝛc. eine gebührende Stätte in unſerem Blatte. — Jeder Nummer iſt eine ***Unterhaltungs-beilage*** hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeitſchrift das Inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt.

Nach alledem wird die **„Zeitſchrift für Elektrotechnik und Maſchinenbau, ſowie für Metall- und Montaninduſtrie“ ein unentbehrliches Organ** nicht bloß für **die Beſitzer maſchineller und elektrotechniſcher Fabriken und Werkſtätten, Walz- und Hüttenwerke, Schloſſereien** und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie ꝛc., ſondern auch für **alle Ingenieure, Techniker und ſonſtigen techniſch Thätigen** ſein.

☞ **Probenummern koſtenlos und franko von der**
Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechnik u. Maſchinenbau,
ſowie für Metall- und Montaninduſtrie, ***Leipzig.***

In unserem Verlage erschien:

Das Huhn als Nutzgeflügel.

Von
Dr. Karl Russ.
Zweite, reich illustrirte Auflage.
Preis M. 2.—; geb. 2.50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Bei uns erſchien:

Vogelzucht-Buch,
Stubenvogelpflege und -Zucht
zum Vergnügen, zum Erwerb und für wiſſenſchaftliche Zwecke.
Von Dr. **Karl Ruß.**
2. Auflage, mit 13 Tafeln u. 30 Textabbildungen.
Preis Mk. 1.50, geb. Mk. 2.—.
Creutz'ſche Verlagsbuchhdlg. in Magdeburg.

Für Beſitzer des
Handbuch
für
Vogelliebhaber
von **Dr. Karl Ruß**

in früheren Ausgaben ſtehen die dem Werke jetzt beigegebenen Illuſtrationen, beſtehend in
28 Vollbildern fremdländiſcher Stubenvögel
(zu Band I), ſowie
25 Vollbildern einheimiſcher Stubenvögel
(zu Band II)
für den Preis von je nur 1 Mark
durch jede Buchhandlung, ſowie in der unterzeichneten Verlagshandlung ſelbſt zu Dienſten.

Das **Illuſtrirte Handbuch** koſtet auch jetzt noch, wie bisher, für
Bd. I (Frembl. Stubenv.) broch. 6.50, geb. 8 ℳ
„ II (Einh. Stubenv.) „ 6.—, „ 7.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.


Die gefiederte Welt
Wochenſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler
Herausgegeben von
Magdeburg
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
R. & M. Kretſchmann.

☞ **Verkleinerte Zeichnung der Decke!**

Wir haben für den 1898er Jahrgang der „Gefiederten Welt“

braune Einbanddecken
in Schwarz- und Goldpreſſung

nach Zeichnung des bekannten Malers Emil Schmidt herſtellen laſſen, welche wir unſeren geehrten Abonnenten

für nur 80 Pfg.

zur Verfügung ſtellen. Jede Buchhandlung beſorgt dieſelben! Nach Orten, in denen keine Buchhandlungen ſind, verſenden wir direct gegen Einſendung von M. 1.— (incl. Porto).

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

☞ **Verkleinerte Zeichnung der Decke!**

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. – Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 5.

Vogelhändler-Verband und Vogelſchutz.
Der Buch- oder Edelfink.
Schilderungen aus der Vogelwelt Kaliforniens.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.

Schädliche Inſekten im Obſt- u. Gartenbau werden am ſicherſten durch Meiſen vertilgt. **Niſtkäſten für Meiſen** aus Rundholz Stück 35 ₰, 10 Stück 3 ℳ, 100 Stück 28 ℳ. [195] **Kempf, Neuforg,** Fichtelgeb.

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,
mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [196]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Neſter
für Kanarien, Exoten, Tauben ꝛc. liefern billigſt [197]
Proskauer & Pauson
Korbwaarenfabrik
Berlin, Schwedterſtr. 251.
Telephon: Amt III 2418.

Der beſte Fangapparat
für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [198]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in praktiſcher Anordnung,
großer Auswahl u. billigem Preis. [199]
☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜
Arthur Herrmann & Luther, Oſchatz i. S.



Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ. [200]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Lit. 1 ℳ. Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen.** M.-Gladbach 112.

☞ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **fachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [201]

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [202]

Holzwaarenfabrik.

Holzwaarenfabrik.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

☞ **Preisliſte über praktiſche**
Vogelkäfige
Aquarien, Terrarien ꝛc. (m. 100 Abb.)
Hochfeine beſt gereinigte
☞ **Vogelfutter** ☜
verſende gratis und franko. [203]
E. Göller, Köln a. Rh.

Niſtkäſten für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[204] **R. Schröter, Clingen-Greußen.**

Porzellan-Neſteier
Poſtkolli franko Kiſte ca. 90 Stck. ℳ 4,25 Nachnahme. [205]
Elgersburger Porzellan-Manufaktur
v. **A. H. S. Wörmer,** Elgersburg i. Th.

Futtermittel.

Mehlwürmer in guter, ſauberer Ware, d. Liter 5 ℳ, Kilo 8 ℳ. Verpackung frei. [206]
Carl Bertram, Elberfeld, Brüderſtr. 8.

98er Ameiſeneier,
feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.
Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ.
Weißwurm, 98er hochprima, à Ko 3½, à Ltr. 80 ₰.
Muska, hochf. 98er, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.
Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr. 4½, à Ko. 8
Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 4, 5 Ko. 19
Biscuit u. Eierbrot, beſt. Qualit. à Ko. 3.
Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1
Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16
Glanzſaat Poſtſack 5 Ko. no. 1,50
Hanfſat „ „ „ „ 1,60
Hafer geſchält „ „ „ „ 2,25
Mohn blau „ „ „ „ 1,75
Hirſe weiß Pa. „ „ „ „ 2,
do. Senegal „ „ „ „ 2,25
do. do. i. Kolb. „ „ „ „ 5,
do. algeriſche „ „ „ „ 2,
do. indiſche „ „ „ „ 1,75
Sonnenblumen „ „ „ „ 2,
Kürbiskerne „ „ „ „ 3,25
Reis i. Hülſen „ „ „ „ 2,25
Zirbelnüſſe „ „ „ „ 4,—
Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [207]
Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter
Poſtſack 5 Ko. no. 2,—
Ausführl. Preisliſten ſämmtl. Vogelfutterarten gratis und poſtfrei.
J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Rothe u. ſchwarze Hollunder- u. Ebereſchenberen b. **Markert, Scheibenberg.** [208]

═ Diesjährige konkurrenzloſe ═
Ameiseneier,
hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, 1 Liter 95 ₰; ferner **Ameiſeneier,**
prima Qualität, 1 Liter 80 ₰; [209]
Weisswurm,
hochprima, 1 Liter 90 ₰ liefert ſtets
Wenzel Petzold, Prag 391/I.

Mehlwürmer, [210]
ausgeſucht ſchöne, geſunde Futterware, empfiehlt porto- u. verpackungfrei 1 Ko. 7,75 ℳ, ½ Ko. 4,— ℳ. Garantie für Vollgewicht bei Ankunft. Größere Quantitäten billigſt.
Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Allianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 5. Magdeburg, den 2. Februar 1899. **XXVIII. Jahrg.**

Vogelhändler-Verband und Vogelſchutz.

Von Forſtaſſeſſor Hildebrand.

Nachdem Herr Schiffer-Köln die im Intereſſe der Vogelliebhaberei gewiß nur mit Freuden zu begrüßende Anregung zu einer Organiſation der Vogelhändler und zu einem möglichſt bald anzuſtrebenden Zuſammenſchluß aller Vogelliebhaber gegeben hat, bitte auch ich, in dieſer ſchon mehrfach berührten Frage hier meine Anſicht kurz ausſprechen zu dürfen.

Bezüglich der beiden erſten ſ. Z. von Herrn Schiffer als Zweck des Verbands hingeſtellten Punkte, d. i. Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs und einheitliche Regelung des Vogel-Ein- und Verkaufs, halte ich mich für zu wenig ſachverſtändig, um darüber ein Urtheil abgeben zu können. Dies iſt eine mehr interne Angelegenheit der Händler, denen es eben nun anheimgegeben iſt, ſich miteinander in Verbindung zu ſetzen und je eher, je beſſer ein erſprießliches Einvernehmen zu erzielen. Mir ſcheint für uns Liebhaber der dritte Punkt, nämlich „Bekämpfung derjenigen Vogelſchutzbeſtrebungen, die auf Unterdrückung der Vogelliebhaberei hinzielen“, gerade in der Jetztzeit beſonders wichtig zu ſein. Denn wenn wir die Hände weiter in den Schoß legen, wie bis jetzt, und uns nie zu einer Abwehr aufraffen, ſo liegt, wie in einem der letzten Artikel ganz richtig angedeutet wurde, die Gefahr nahe, daß mit der Zeit die Liebhaberei durch allerhand Chikane einem geradezu verleidet, bzl. ganz unterdrückt wird. Dies gilt namentlich für die deutſchen Bundesſtaaten, in denen ſchon über die Maßen ſtrenge Vogelſchutzgeſetze beſtehen und außerdem die Liebhaberei fortwährenden Anfeindungen ſeitens mancher Thierſchutzvereine ausgeſetzt iſt, wie z. B. in Sachſen. Wenn es ſchon ſoweit gekommen iſt, daß man das Halten einheimiſcher Singvögel, wie in der ſächſiſchen Stadt Zwenkau, durch eine hohe Beſteuerung zu vereiteln ſucht und dadurch dem armen Arbeiter und Handwerker, der nur ſelten einmal Zeit findet, hinaus in's Freie zu gehen, die vielleicht einzige Freude, welche er ſo indirekt an der Natur haben kann, benimmt, ſo enthält dies doch wol eine Mahnung an alle Vogelliebhaber, gegen dieſen vermeintlichen Vogelſchutz der Jetztzeit Stellung zu nehmen. Ich habe als Forſtmann reichlich Gelegenheit gehabt, die Vogelliebhaberei kennen und beurtheilen zu lernen, habe mehr als einmal geſehen, mit welcher Anhänglichkeit der Gebirgsbewohner ſeinem Zeiſig, Kreuzſchnabel u. a. zugethan iſt und bin dabei zu der Ueberzeugung gekommen, daß das Halten einheimiſcher Vögel, mag man in gewiſſen Kreiſen darüber denken wie man will, ſeine ſehr guten Seiten hat. Es gereicht nicht nur dem Liebhaber zur Freude und wirkt erzieheriſch auf ihn, ſondern dient auch dem Vogelſchutz ſelbſt. Kann man doch ſo oft die Wahrnehmung machen, daß gerade diejenigen, welche Stubenvögel haben, auch den befiederten Sängern draußen in der freien Natur ein reges Intereſſe entgegenbringen, denſelben nach Möglichkeit Niſtgelegenheiten verſchaffen und ſie zur kältern Jahreszeit füttern und pflegen.

Das iſt jedenfalls ein viel beſſerer Vogelſchutz, als der, welcher in möglichſter Unterdrückung der angeblichen „thierquäleriſchen“ Liebhaberei ſeinen Hauptzweck ſieht und mitunter aus rein geſchäftlichen, egoiſtiſchen Motiven von einzelnen Kanarienzüchtern unterſtützt wird.

Daß durch das Käfigen von Singvögeln eine auch nur nennenswerthe Verminderung derſelben eintritt, wird Jeder, der einigermaßen einen Einblick in's Vogelleben bekommen und nicht von Haus aus ein

Vorurtheil hat, in Abrede ſtellen. Desgleichen können ſich auch alle Vogelliebhaber gegen den Vorwurf der Thierquälerei, wie er von Thierſchutzvereinen ſo gern erhoben wird, mit gutem Gewiſſen verwahren. Die in der Gefangenſchaft lebenden Vögel befinden ſich — dies lehren unzählige Beiſpiele — bei entſprechender Abwartung außerordentlich wohl. Sonſt würde gewiß nicht der Fall ſo oft eintreten, daß ſie nach erlangter Freiheit wieder in ihren Käfig am Fenſter zurückkehren, bzl. wochenlang, wie ich aus eigener Erfahrung beſtätigen kann, aus- und einfliegen.

So hat, denke ich, die Liebhaberei, die ja glücklicherweiſe in der Stadt und auf dem Lande immer noch ziemlich viele Anhänger beſitzt, eine nicht abzuleugnende Berechtigung, umſomehr, als ſie Charakter und Gemüth des Menſchen zweifellos auf's vortheilhafteſte beeinflußt. Ich ſehe nicht ein, weshalb wir uns dieſelbe verkleinern oder mit der Zeit gar nehmen laſſen ſollen. Laſſen wir daher nicht bloß immer unſere Gegner handeln, ſondern ſprechen wir, wenn nöthig, auch ſelbſt einmal mit und treten ungerechtfertigten Anſchuldigungen und Petitionen derſelben entgegen! Da die Stimme des Einzelnen dabei aber kaum gehört und beachtet wird, ſo iſt es an der Zeit, daß ſich die Liebhaber einheimiſcher Vögel zu Vereinen zuſammenthun und zwar vorerſt in den größeren Städten, wo ſie am erſten in der erforderlichen Anzahl vorhanden ſind. Späterhin würden dann in paſſendſter Weiſe, ſei es nun durch Aufforderung in Fachzeitungen, ſei es durch Vermittlung von Freunden und Bekannten, auch Vogelliebhaber von auswärts, wo ſelbſtändige Vereine nicht zu ſtande kommen können, zum Anſchluß, vielleicht als „auswärtige Mitglieder“ zu veranlaſſen ſein. Die ſo entſtandenen Vereine könnten in einem größern Kreiſe, bzl. einer Provinz, eventuell unſchwer einen Verband bilden, der die Intereſſen der Liebhaber entſprechend zu wahren hätte. So halte ich z. B. in Sachſen, wo ja der Zuſammenſchluß von Vogelliebhabern aus mehrfachen Gründen am allermeiſten Noth thut, dafür, daß die meines Wiſſens in einigen Städten vorhandenen Liebhabervereine miteinander in Verbindung treten und in der oben gedachten Weiſe weiter verfahren. Warum ſollte ſo ein Zuſammengehen der Vogelliebhaber nicht möglich ſein, vorausgeſetzt natürlich, daß die nöthige Luſt und Liebe zur Sache vorhanden iſt? Sicherlich würden viele von ihnen derartige Beſtrebungen freudig unterſtützen und einer entſprechenden Anregung, die am beſten von einem bereits beſtehenden Verein ausgehen dürfte, gern Folge geben. Durch eine unmittelbare diesbezügliche Aufforderung in der „Gefiederten Welt“ u. a. Blättern ließe ſich vielleicht die Grundlage für einen Zuſammenſchluß geben.

Iſt dieſer einmal erreicht, ſo wird es auch möglich ſein, an maßgebenden Stellen für das ſo viel angefeindete Halten von Stubenvögeln einzutreten und weiteren Benachtheiligungen deſſelben mit Erfolg entgegenzuarbeiten. So gut wie die Thierſchutzvereine, meine ich, können auch die Vereine von Vogelliebhabern ein Recht auf Berückſichtigung gerechtfertigter Wünſche geltend machen und billigerweiſe verlangen, daß dem Grundſatz „audiatur et altera pars“ gemäß auch ſie zu Worte kommen. Wenn natürlich ohne irgendwelche Entgegnung immer faſt nur Stimmen laut werden, welche die Liebhaberei direkt und indirekt anfeinden, ja mitunter geradezu als etwas Verwerfliches hinſtellen, ſo darf man ſich nicht wundern, wenn dieſelbe allgemach ſo mancherlei Vorurtheilen begegnet und den verſchiedenſten Beeinträchtigungen ausgeſetzt iſt. Das jetzige Reichsvogelſchutzgeſetz geſtaltet den „Fang von Stubenvögeln“ unter gewiſſen Bedingungen und erkennt damit die Berechtigung des Haltens derſelben ohne weiteres an. Was nützt dies aber, wenn den Einzelſtaaten der Erlaß noch weiterer Verbote zum Schutz der Vögel anheimgegeben und dadurch, ohne daß es wol in der Abſicht des Geſetzgebers lag, allerhand Beſchränkungen der Liebhaberei Thür und Thor geöffnet wird? Soviel mir bekannt, iſt eine Abänderung gedachten Geſetzes geplant und ſind ſchon Geſuche von Thierſchutzvereinen um möglichſt weitere Verſchärfung deſſelben eingegangen. Da wäre es z. B. recht ſchön, wenn es nun genug Liebhabervereine gäbe, und dieſe auch einmal im Intereſſe der Liebhaberei mit den Weg der Petition beträten und darum bäten, daß letztere in einem eventuellen neuen Geſetze, welches meiner Anſicht nach ein möglichſt einheitliches, für alle Bundesſtaaten gleichermaßen Geltung habendes ſein müßte, gebührend berückſichtigt würde.

Dies in kurzem meine Anſichten über die ſchon mehrfach beregte Frage, die durch weitere Vorſchläge vielleicht noch mehr geklärt und gefördert werden wird. Möge ſich denn zum Nutzen und Gedeihen unſerer ſchönen Liebhaberei in den betheiligten Kreiſen recht bald eine Einigung erzielen laſſen, damit Jedermann, wenn er ſonſt Intereſſe und Freude daran findet, dem Liede unſerer deutſchen Sänger nicht nur draußen im ſchönen, grünen Wald, ſondern bei Sturm und Wetter auch drinnen im traulichen Heim unbehindert lauſchen kann!

(Wir ſchließen uns Ihrem Vorſchlage voll und ganz an und ſind ebenfalls überzeugt, daß nur durch einheitliches Vorgehen der Vereine die Angriffe der raſtloſen Gegner der Liebhaberei zurückgewieſen werden können. D. L.).

Der Buch- oder Edelfink (Fringilla coelebs, *L.*).

Nach einem Vortrag, gehalten im Verein „Ornis“ zu Berlin im Jahr 1894, von Joſef Wagner.

Die geehrten Liebhaber werden ſich wundern, daß ich mir geſtatte, über einen allbekannten einheimiſchen Vogel einen Vortrag zu halten. Indeſſen ſo bekannt der Buchfink dem Namen und Ausſehen nach iſt, ſo wenig iſt er es in ſeiner Eigenſchaft als Geſangskünſtler.

Dieſer Vogel gehört wol zu denjenigen, die heutzutage jeder Landbewohner, ja ich möchte ſagen jeder Menſch überhaupt kennt, infolge ſeines zutraulichen Weſens, das er in Gärten und Anlagen in der Nähe

ihrer Geſangsweiſe eifrig abgehört und ſtudirt und manche Stunde damit verbracht. Ich konnte auch beim Buchfink beſondere Oertlichkeitsraſſen feſtſtellen.

Ich bereiſte die Schweiz; welcher Finkenliebhaber ſollte ſich nicht wundern, wenn ich ſage, daß unter den Tauſenden, welche ich dort ſingen hörte, mir nicht ein einziger Reitzugfink vorkam. Die Vögel brachten einen langgezogenen Schlag, aber ohne Schnapp. Dieſe Oertlichkeitsraſſe kommt auch in Tyrol und ebenſo im Lauſitzer Gebirge und einem Theil des Iſergebirges vor.

Im Rieſengebirge dagegen vernahm ich an vielen Orten alle Finken mit einen ſchönen abgeſetzten „Schnapp“. Auch im Kärnthnergebirge kommt häufig der „Schnapp“ vor, dagegen in Italien, Bosnien, Herzegowina konnte ich ihn wenig oder garnicht vernehmen. Der Geſang der Buchfinken in den drei letztgenannten Ländern iſt am ſtümperhafteſten, wenigſtens von allen Oertlichkeitsraſſen, die ich in Europa hörte.

Dagegen in der Tatra, wie in den Dobſchauer Waldungen, auch in den Tranſylvaniſchen Alpen kommt der „Schnapp“ häufig vor; beſonders in den letztgenannten gibt es noch einen Stamm, der hörenswerth iſt. Im Donaugebirge dagegen war der Geſang aller Finken ohne „Schnapp“, ebenſo in einem großen Theil von Rumänien. In der Bukowina und Siebenbürgen findet man verſchiedene Gegenden, in denen Vögel mit „Schnapp“ und ſolche ohne „Schnapp“ vorkommen; hier würde man ſich fragen: wie iſt die Miſchung entſtanden? Beſaßen zuerſt alle Finken den „Schnapp“ im Geſang und hat ſich dieſer ſchon theilweiſe verloren? Oder waren vielleicht vor Jahrhunderten alle Finkengeſänge ohne „Schnapp“ und iſt derſelbe entſtanden durch andere Oertlichkeitsraſſen, die dort ihr Brutgebiet geſucht und gefunden und den „Schnapp“ auf viele Vögel übertragen haben? Die Frage wird kein Finkenliebhaber löſen wollen; ich glaube, es gibt auch keinen Berufsornithologen, der ſie löſen könnte.

Auf meinen Reiſen in Dänemark, Schweden und Norwegen hörte ich ebenfalls viele Tauſende von Buchfinken ſingen. Darunter ließ kein einziger den „Schnapp“ hören. In Norwegen, wo die Finken noch an dem Eismeer vorkommen, hörte ich ſie am Kioſenfluß bei Liengien Eide bei ziemlich kühler Temperatur ihren Geſang vortragen. Meine Beobachtungen im Naeröthal habe ich bereits im vorigen Jahrgang in einem beſondern Artikel in dieſer Zeitſchrift veröffentlicht. Außerdem hörte ich noch einen zweiten ſolchen Fink ungefähr 10 Kilometer von Voſewangen entfernt bei den Moränen und einen andern bei der Gravenswand. Alle dieſe, ſowie die in Schweden und Dänemark abgehörten ließen keinen „Schnapp“ hören.

Bei uns in der Provinz Brandenburg ſind beinahe noch die beſten Geſangskünſtler unter den Buch- oder Edelfinken in ganz Mitteleuropa, wenigſtens von den hier genannten Ländern, zu vernehmen, ſogar in nächſter Umgebung von Berlin. Das kommt wol daher, weil hier niemals eine eifrige Finkengeſangsliebhaberei geblüht hat und ſomit die alten Vorſänger weniger oder garnicht weggefangen worden ſind. Wenn wir auch keine echten Reitzugfinken mehr haben, ſo iſt doch noch ein Stamm vorhanden, der einen ſchönen Geſang zum Vortrag bringt, ungefähr wie: „Rrrrrrrrrrrrreitſchar—wek“. Dieſer Stamm übertrifft beiweitem den Wildſau- oder Zirol-Geſang. Den „Schnapp“ bringen die Vögel in Brandenburg am allerſchönſten von allen genannten Raſſen.

Wenn nun die geehrten Leſer fragen: Wie iſt dennoch der echte Reitzugfink erhalten worden?, ſo iſt darauf Folgendes zu ſagen: Es ſind vielleicht fünfzig Jahre her, ſeit in einem Theil von B. noch der echte und reinſchallige Reitzugfink im Freien vorkam. Die Groß- und Urgroßväter hatten ſolche Vögel eingefangen und lange Jahre erhalten; als die beſten weggefangen waren und zuletzt bloß noch Stümper vorkamen, hatten es dieſe Liebhaber dennoch wohl verſtanden, den Stamm zu erhalten, um für ihre Kinder und Enkelkinder den kunſtvollen Sänger zu bewahren. Sie hatten ſich Neſtvögel aufgezogen und zum andern Frühjahr die jungen Männchen zu einem alten guten Sänger gehängt, ſodaß der alte Vogel den Jungen als Vorſänger dienen konnte. Vereinzelt kam es vor, daß ein junger Vogel den richtigen Reitzug-Schlag gelernt hatte, und auf dieſe Weiſe wurde der Stamm erhalten. Wie wenig junge Vögel gut gelernt haben oder noch lernen, will ich hier beweiſen. Bei mir erlernten es von vier nur einer, von achten keiner, von zweien einer und ſo ging es alle Jahre weiter; die jungen Vögel bringen in der Regel den Geſang zum Vortrag, den ihre Alten hören ließen oder wenigſtens den der Stammraſſe. Aber zum Erlernen des Reitzugſchlag zeigen ſie wenig Begabung.

Als ich zu meinen Freunden kam und fragte, wie es mit den jungen Reitzugfinken ſteht, erklärte mir einer, er wäre in dieſem Jahr ſehr zufrieden, er hätte 28 Stück Junge gehabt und darunter zwei gute fehlerfreie Sänger erzielt; alle anderen habe er wieder fliegen laſſen; er war ganz erfreut über dieſen Erfolg. In einem andern Jahr hätte er unter 14 Jungen garkeinen guten Schläger erzielt und ſie ſämmtlich fliegen laſſen. Solcher Fälle könnte ich viele anführen, in denen die Finkenliebhaber die jungen Vögel aus dem Neſt nehmen, großziehen, ein Jahr hindurch füttern — und die jungen Vögel lernen dann nichts.

Da kann man ſich denken, wie theuer ein einziger guter Reitzugfink dem Liebhaber zu ſtehen kommt. Wieviel beſſer haben es doch die Kanarienzüchter, die ſelbſt ihre minderwerthigen Vögel immer noch zu Vereins-Ausſtellungen als Verloſungsvögel für 6 bis 7 Mark für den Kopf verkaufen. Dazu kommt noch, daß nicht jeder alte Reitzugfink ſich zum Vorſänger und Lehrmeiſter eignet.

Ueber die Behandlung der jungen, anzulernenden Vögel, ſowie über zweckmäßige Fütterung und Pflege des Reitzugfink werde ich hier ſpäter berichten*).

---

*) Wir bitten darum. D. L.

* * *

Schilderungen aus der Vogelwelt Kaliforniens.

Von P. F. Reiſer.

Kalifornien, ein langer, nicht zu breiter Strich Landes, liegt an der Weſtküſte der Vereinigten Staaten Nordamerikas, unter dem 42. und 32. Breitengrad. Seine Länge beträgt etwa 800, ſeine Breite etwa 300 engl. Meilen. Vor dem unwirthlichen Klima der öſtlichen Staaten ſchon durch das Felſengebirge geſchützt, wird es nochmals durch die Sierra Nevada von den Staaten Nevada und Arizona getrennt. Auch im Innern iſt es durch langgeſtreckte, von Nord nach Süd laufende Gebirge, ſog. „Coast Ranges“ (Küſtengebirge) durchzogen. Sowol die Sierra Nevada, als die Küſtengebirge ſind reich bewaldet, meiſt mit Nadelhölzern (Coniferen), Sykomoren und Eichen. Unter erſteren ſind die kaliforniſchen Rieſentannen (Sequoia gigantea) am berühmteſten, die beſonders in Maripoſa County gefunden werden. Der Shaſta-Berg iſt berühmt durch ſeine Trauerfichten, die ſonſt nirgends in der Welt vorkommen. Andere Baumgattungen ſind: Abies (Tanne), Pinus (Kiefer), Acer (Ahorn), Pyrus (Birne), Populus (Pappel), Libocedrus (Lebensbaum), wilde Kirſchen, Pflaumen, Haſelnüſſe u. a. Der Staat iſt reich an prachtvollen Szenerien und Landſchaften, darunter das weltberühmte Yo Semite-Thal (indianiſcher Name des „Grizzly“-Bären). Dieſes Thal enthält über 200 Arten von Bäumen und Geſträuchen. Die Berge ſind durchzogen von tiefen, ſteilen, wildromantiſchen Schluchten (canons). Die Abhänge ſind mit dichtem Geſtrüpp und Kaktus bewachſen (ſog. chapparal), ebenſo viele der Hochebenen (ſog. mesas). Der Staat enthält viele fruchtbare Thäler, die von den Bergen mit Bewäſſerung verſorgt werden. Das Klima Kaliforniens iſt unvergleichlich ſchön und mild, eben ſpezifiſch „kaliforniſch“.

Die Flora und Fauna iſt ganz eigenartig und bietet dem Naturfreund viel Gelegenheit zum Studium. In den Bergen hauſen: der Puma, Wildkatzen, Luchſe, Bären (Grizzly-, brauner und Zimmt-B.), Füchſe, Hirſche, Rehe, Elenthiere; auf den Ebenen: Dachſe, Coyotes (Heulwölfe), Erdeichhörnchen, kaliforniſche Wachteln, Heher, Kaninchen u. a. Wild.

Auch dem Vogelkundigen bietet Kalifornien ein weites, neues, intereſſantes Gebiet. Viele beſondere Arten ſind dem Staat eigen und die meiſten der in den öſtlichen Staaten vorkommenden Arten ſind hier an Färbung ſo verſchieden, daß ſie eigene Abarten bilden und die Bezeichnung „weſtlich“ tragen. Fehlen uns auch manche der in den öſtlichen Staaten vorkommenden Sänger und der Farbenvögel der Süd-Staaten, ſo hat dieſer Staat nicht minder Sänger und Farbenvögel aufzuweiſen, die jenen ebenbürtig ſind. Als letztere will ich nur nennen: den blauen Kernbeißer, den Lazulifink, die Louiſiana-Tangara, den Bullock's Oriol u. ſ. w.

Zur Erforſchung der Vogelarten Kaliforniens waren Regierungsbeamte, wie Baird, Coues, Ridgway u. A., thätig, darunter auch Deutſche, wie Dr. Heermann, Steinegger, Bolle, Bendire, Gruber, die werthvolle Dienſte leiſteten. Die meiſte Arbeit aber wurde durch „Laien“, Mitglieder des „Cooper Ornithological Club“, gethan, die ſich über den ganzen Staat verzweigen und aus Aerzten, Kaufleuten, Advokaten, Landleuten u. a. m. beſtehen. Dieſe Mitglieder arbeiten ſeit Jahren an der Erforſchung der Vogelwelt. In Mußeſtunden wird weder Zeit, Mühe noch Geld für dieſen Zweck geſcheut. Sie machen weite Touren, unterziehen ſich allen Strapazen und ſammeln allerwärts Vogelbälge, Eier und Neſter. Findet ſich eine neue oder unbeſtimmte Vogelart, ſo wird der Balg nach Waſhington geſandt und dort von der Staatsbehörde des „Smithsonian Institute“ beſtimmt. Der Verein gibt monatliche Berichte heraus, legt Sammlungen an und läßt viele Beobachtungen und Beſchreibungen im Druck erſcheinen. Der uneigennützigen Thätigkeit dieſes Vereins iſt es zu verdanken, daß in den letzten Jahren wol alle Vogelarten Kaliforniens feſtgeſtellt wurden; nur unter manchen der ſich ſo ähnelnden Finkenarten ſcheint noch etwas Unklarheit zu herrſchen.

Die Vogelwelt Kaliforniens vertheilt ſich über folgende drei Gebiete: 1. die Thäler und Niederungen, 2. die Fußhügel (forthills) und „mesas“ der Sierra Nevada und der Küſtengebirge, 3. die coniferiſchen und alpinen Höhenzüge der Sierras.

Kalifornien beſitzt etwa 295 Arten Landvögel; dieſe vertheilen ſich wie folgt: 15 Arten Hühnervögel, 5 A. Tauben, 39 A. Raubvögel, 2 A. Kukuke, 18 A. Spechte, 2 A. Königsfiſcher, 2 A. Nachtſchwalben, 3 A. Segler, 8 A. Kolibris, 3 A. Königsvögel, 7 A. Schwalben, 11 A. Fliegenfänger, 2 A. Seidenſchwänze, 2 A. Würger, 2 A. Elſtern, 6 A. Heher, 1 A. Raben, 2 A. Krähen, 2 A. Tannenheher, 1 A. Bobolink, 2 A. Kuhvögel, 5 A. Stärlinge, 3 A. Oriole, 1 A. Blaukopfſtärling, 1 A. Abendkernbeißer, 1 A. Hakengimpel, 3 A. Purpurgimpel, 1 A. Kreuzſchnabel, 2 A. Roſenfinken, 1 A. Birkenzeiſig, 4 A. Zeiſige, 2 A. Ammern, 41 A. Finken und Sperlinge, 3 A. Kernknacker, 1 A. Farbenfink (Lazuli), 1 A. Lerchenammer, 3 A. Tangaren, 4 A. Hornlerchen, 1 A. Pieper, 1 A. Trauervogel, 9 A. Vireos, 19 A. Sänger, 1 A. Rothſchwänzchen, 1 A. Waſſerſchmätzer, 1 A. Salbeidroſſel, 2 A. Spottdroſſeln, 3 A. Dreſcher, 7 A. Zaunkönige, 1 A. Baumläufer, 3 A. Spechtmeiſen, 12 A. Meiſen, 2 A. Goldhähnchen, 3 A. Mückenfänger, 1 A. Klarino, 7 A. Droſſeln, 1 A. Steinſchmätzer, 2 A. Hüttenſänger. Dieſe ſind theils Stand-, theils Strich- und Zugvögel.

Von dieſer großen Liſte ſei es mir vergönnt, den werthen Leſern einige Arten vorzuführen, mit beſonderer Berückſichtigung Süd-Kaliforniens, meines jetzigen Wohnſitzes. Ich wähle zuerſt einige von den beliebten Droſſeln:

1. Der Spottvogel (Mimus polyglottus, *Linn.*). Die Spottdroſſel iſt auch in Deutſchland als Käfigvogel ſo bekannt und beliebt, daß ſie keiner weitern Beſchreibung bedarf. Ihre Geſangsleiſtungen ſtehen unübertroffen da. Dieſer Vogel findet ſich in Nord- und Mittel-Kalifornien einzeln, hingegen ſehr

zahlreich in den Thälern Süd-Kaliforniens. Hier hält er ſich mit Vorliebe in den Obſtgärten in der Nähe der Wohnungen während des ganzen Jahrs auf, findet ſich aber ebenſo häufig in den ſog. „mesa“-Regionen (mit dichtem Geſtrüpp und Kaktus bewachſene Sandflächen, Gerölle und Wüſten). Er iſt der einzige Vogel, der durch ein Staatsgeſetz geſchützt iſt. Seine Geſangszeit währt faſt das ganze Jahr hindurch, nur in den heißen Sommermonaten ſchweigt er, um im September wieder ſeine Lieder zu beginnen. Im Dezember habe ich ihn ſelten gehört, im Januar aber, wenn hier nach günſtigem Regen der Frühling einzieht, läßt er wieder von den Dächern ſein Lied erſchallen. Während der Parungszeit ſingt er häufig in mondhellen Nächten. Die Niſtzeit beginnt etwa Mitte April und dauert mit zwei bis drei Bruten oft bis zum Auguſt. Das Gelege bilden vier bis fünf Eier. Während Einige behaupten, daß der Geſang der Spottdroſſel in Texas und Louiſiana feuriger und reichhaltiger und im Nachahmen anderer Thierlaute kunſtvoller ſei, bleibt doch gewiß, daß die Spottdroſſel unſere beſte Sängerin iſt und ihr Geſang für den Kenner reichhaltig und kunſtvoll genug klingt. Doch muß ich erwähnen, daß ich im Geſang der ſüd-kaliforniſchen Spottdroſſel nur wenig Nachahmung anderer Thierſtimmen oder Vogellieder entdeckt habe. Dies mag von dem milden, gleichmäßigen Klima Kaliforniens herrühren, das den Vogel ſeeliſch ruhiger ſtimmt, aber auch davon, daß er in der Nähe der Wohnungen nur wenige hervorragende Sänger hört, die mit ihm wetteifern. Draußen in belebteren Gegenden finden ſich häufiger nachahmende Klänge.

2. Von der Sippe Harporhynchus, Sichelſchnabeldroſſeln oder Treſcher, iſt die kaliforniſche Braundroſſel (H. redivivus, *Gamb.*)[*] ein häufiger Vogel in der Küſtenregion, wo man ſie im dichten Untergebüſch und in den Dickichten der Bergabhänge bis zu 6000 Fuß Gebirgshöhe findet. Durch ihre dunkle Färbung und den langen, gebogenen Schnabel iſt ſie leicht kenntlich. Sie brütet von Anfang März bis Ende Mai in dichtem Gebüſch; Gelege zwei bis vier Eier. Der Geſang dieſer Droſſel iſt nicht ſo reichhaltig als der des Spottvogels; er beſteht aus kurzen Strofen, jedoch voller, wohllautender, jubilirender! Ich habe dieſe Droſſel oft in geſtrüpp- und kaktusreichen Gegenden beobachtet. Sie iſt ein ſcheuer Vogel, pfeilſchnell taucht ſie in's Gebüſch. Verhält man ſich aber ruhig, ſo ſitzt ſie bald wieder auf einer Zweigſpitze und läßt ihr herrliches Lied erſchallen. Ich vergleiche ſie hier etwa mit der deutſchen Singdroſſel, obwol ſie im Geſang mit letzterer ſich nicht meſſen kann. Im Käfig iſt ſie erſt ſehr ſcheu und ungeſtüm, hält aber gut aus und erfreut den Liebhaber bald mit ihrem vollen Geſang.

3. Die Sippe der eigentlichen Droſſeln (Turdidae) iſt vertreten durch folgende 4 Arten: Turdus ustulatus, *Nutt.*, T. ustulatus Swainsonii, *Cab.*, T. aonalaschkae, *Gm.* und T. aonalaschkae Auduboni, *Baird*.

Die Olivendroſſel (T. u. Swainsonii, *Cab.*) findet ſich in den Höhenzügen Nord-Kaliforniens, wo ſie in den Fichtenwäldern der Sierra Nevada brütet. Dieſe Droſſel iſt auch öſtlich der Felſengebirge im Norden der Vereinigten Staaten heimiſch. Audubon's Einſiedlerdroſſel (T. a. Auduboni, *Baird*) bewohnt die Alpenthäler im nordöſtlichen Theil unſres Staates und ſüdlich die Höhen der Sierra Madre und San Bernardino-Gebirge bis zu 9000 Fuß.

Die kleine Einſiedler- oder Zwergdroſſel (T. aonalaschkae, *Gm.*) brütet nördlich in Oregon und Britiſch-Columbia, macht aber unſern Staat zum Winterquartier. Dieſe allerliebſte kleine Droſſel findet ſich im Winter in großer Anzahl durch den ganzen Staat, wo ſie ſich im Gebüſch, entlang der Bäche, in Parks und Gartenanlagen in der Nähe der Wohnungen aufhält. In meinem Garten kann ich an jedem Tag einige dieſer Droſſeln beobachten, wie ſie hurtig über den Boden hinhuſchen, ſpielend ſich jagen und nach Nahrung (Brotkrumen u. a.) ſuchen. Von Geſang findet ſich jetzt keine Spur, nur das häufige „tack, tack“ oder „ſchack“ erinnert an die Droſſel. Neulich gelangte ich in Beſitz eines Männchens, das mir aber leider durch einen Zufall wieder entkam. Die Zwergdroſſel erreicht eine Größe von etwa 6 (engl.) Zoll. In ihrer Färbung zeigt ſie ſich ſofort als Droſſel (kurz angegeben): oberhalb graubraun, in olivengrün ſpielend; Seiten und Bauch lichtgrau, Schwanz tiefbraun, Bruſt gewöhnlich leicht gewölkt, manchmal beinahe weiß, mit großen dreieckigen, braunen Flecken. Hält ſich von Mitte Oktober bis Anfang Mai in Süd-Kalifornien auf.

Wenn die niedliche Zwergdroſſel anfangs April wieder nach den hohen Fichtenwäldern der nordiſchen Regionen zieht, kehrt vom fernen Süden eine Droſſel nach Kalifornien zurück, die ſich über den ganzen Staat verbreitet und nördlich bis über Oregon und Britiſch-Columbia zieht: die roſtrückige Droſſel (T. ustulatus, *Nutt.*). Warum H. Nehrling dieſe Droſſel „Oregon-Sängerdroſſel“ nennt in ſeinem Prachtwerk „Die nordamerikaniſche Vogelwelt“, iſt mir unverſtändlich. Denn dieſelbe verbreitet ſich nicht nur über Oregon, ſondern auch über den ganzen Staat Kalifornien, mit einem Wort über die ganze Pacificküſte, von Alaska an bis Mexiko. Sie könnte daher eher „Pacific-Sängerdroſſel“ heißen. Ob ſie noch einen andern deutſchen Namen hat, als der von H. Nehrling ihr gegebene, weiß ich nicht. Der Name „roſt- oder rothrückige Droſſel“ ſcheint mir, wenn vielleicht auch ſchwerfällig, doch bezeichnender. In Nord- und Mittelkalifornien fand ich dieſe Droſſel häufig in Parkanlagen, Gärten und Flußdickichten. Sie hält ſich ſehr gern in der Nähe des Waſſers auf. Hier in Süd-Kalifornien findet man ſie in Weidendickichten, aber auch auf Hochebenen (ſog. mesa) und in Gebirgſchluchten (canons). Wo Waſſer iſt, baut ſie ihr Neſt gern in deſſen Nähe, doch brütet ſie ebenſo häufig in Gärten. Etwa Mitte Mai legt das Weibchen drei bis vier bläulichgrüne Eier; zwei bis drei Bruten werden aufgezogen. Neſter, die ich gefunden habe, waren groß und maſſig angelegt, aus Mos, Gräſern, Baumrinde u. a. und inwendig mit Lehm ausgemauert. Die roſtrückige Droſſel erreicht eine Größe von $6_{,50}$ bis $7_{,40}$ Zoll; ihr Hauptkennzeichen iſt die rothbraune Färbung über dem Rücken, den Flügeln und dem Schwanz; die Bruſt iſt gelblichgrau und mit kleinen, engen, keilförmigen, dunklen Flecken beſät Was ich an dieſer Droſſel beſonders rühmen möchte, iſt ihr zutrauliches Weſen und beſonders ihr Geſang. Ich habe ſie in verſchiedenen Theilen Kaliforniens beobachtet und nirgends gefunden, daß ſie die Nähe der Menſchen auffallend ſcheut, oder ſich ſelten ſehen läßt, wie Nehrling berichtet. Ihr Geſang iſt unbeſchreiblich ſchön. Ich ſtelle ſie als Sängerin an die Spitze aller kaliforniſchen Vögel. Ihre Stimme beſitzt einen Wohlklang und Schmelz, der auf den Kenner geradezu berauſchend wirkt. Wenn ich ihre Stimme hörte, mußte ich immer ergriffen ſtille ſtehen. Wie oft bin ich im Morgengrauen vom Lager aufgeſprungen und lauſchte der tiefen, klaren, jubelnden Stimme dieſer Droſſel, wenn ſie die Gärten durchzog, bis ſie ſich in der Ferne verlor! In Marysville, im nördlichen Kalifornien, hatte in der Nähe des Yubafluſſes eine ſolche Droſſel ihren Stand aufgeſchlagen. Regelmäßig morgens und abends ſtreifte ſie durch die Gärten der Stadt. Vergeblich ſuchte ich ihr Neſt; durch das Schmelzen des Schnees in der Sierra Nevada war der Fluß wochenlang ſtark angeſchwollen. Als endlich das Waſſer genügend zurücktrat, etwa Ende Juli, fand ich das Neſt ler! Im Golden Gate Park bei San Franzisko hörte ich ſie oft ſingen, ebenſo in den prachtvollen Gärten und Anlagen in Alamada und Oakland, der Umgebung San Franziskos. Am beſten hatte ich Gelegenheit, dieſe hübſche Sängerin in der lieblichen Umgebung von Santa Cruz zu beobachten. Dort an den hohen Böſchungen des Ozeans entlang ſtehen hübſche Villen, von parkähnlichen, buſchreichen Anlagen umgeben; die letzteren durfte ich ungehindert beſuchen. Hier ganz ungeſtört von menſchlicher Nähe, den majeſtätiſchen Ozean zu Füßen, in milder Abendluft, war es eine Luſt, ihrem Geſang zu lauſchen. Mit einem leiſen, gezogenen Pfiff, etwa wie „huit“, lockte ich ſie in meine Nähe. Dieſem Pfiff antwortete die Droſſel ſofort und kam langſam, neugierig, durch's Gebüſch gewandert, oft ſo nahe, daß ich ſie faſt mit der Hand hätte greifen können.

---

[*] S. Abbildung in Nr. 13 v. J. D. L.

(Fortſetzung folgt).

* * *

Briefliche Mittheilungen.

... Auf einem Spaziergang von Carlshorſt nach Sadowa a. d. Oberſpree beobachtete ich heute ein Schwarzſpecht-Weibchen. Bisher hatte ich dieſen Vogel in der nähern Umgegend Berlins noch nicht zu Geſicht bekommen. Mein Weg führte mich an dem Saum eines alten Eichenbeſtands entlang, deſſen Vorholz durch jüngere Kiefern gebildet wird. In dieſem flog vor mir ein ſchwarzer Vogel von ungefähr Krähengröße auf, welchen ich für eine Satkrähe gehalten hätte, wenn mich nicht der Flug eines andern belehrt hätte. Ich ſchlich mich vorſichtig der Stelle näher, wo ſich der Vogel niedergelaſſen haben konnte, um ihn genau feſtzuſtellen, er wurde meiner jedoch früher anſichtig und flog an eine Erle, welche vereinzelt ſtand. Nun hatte ich Gelegenheit, den Vogel genau zu beobachten, und jeder vorher gehegte Zweifel ſchwand; ich hatte den Schwarzſpecht vor mir. Bis auf 15 m konnte ich mich ihm nähern, dann flog er den Eichen zu, wo ich ihn noch einige alte Stämme mit dem Schnabel bearbeiten ſah. Vorſichtig ſchaute der Vogel von Zeit zu Zeit nach mir aus, ob ich auch nicht näher gekommen ſein könnte. Als ich dann einige Schritte auf ihn zumachte, ging er nach der entgegengeſetzten Seite des Baums und verſchwand heimlich, ſodaß ich ihn nicht mehr entdecken konnte. Beim Abfliegen von der Erle, wobei ſich der Specht der Erde ſehr näherte, ſah ich, daß es ein Weibchen war, denn nur das Genick hatte die rothe Färbung.

Das „Glück, Glück, Glück“ des Schwarzſpechts hatte ich ſchon vor Monaten in dieſer Gegend vernommen, aber zu Geſicht bekam ich ihn nicht. Ich nehme an, daß der Schwarzſpecht auch hier Brutvogel ſein wird, denn alte Eichen und Kiefern ſind in Hülle und Fülle vorhanden.

In dieſem Forſt beobachtete ich von den anderen Spechten: den Grünſpecht, großen und mittleren Buntſpecht, von welchen beſonders der erſte häufig vertreten iſt.

Bei meinem Spaziergang ſah ich auch große Schwärme Goldhähnchen in Geſellſchaft von Baumläufern, Kleibern und den verſchiedenen Meiſenarten. Die Vögel flogen munter von Zweig zu Zweig und ſuchten ſich unter Rinde und zwiſchen den Nadelbüſcheln ihr kärgliches Mahl zuſammen.

In demſelben Vorholz ſtieß ich vor einigen Tagen auf eine große Kolonie Eichelheher; es waren wenigſtens 50 Stück. Sie ließen mich ſehr nahe herankommen, ergriffen auch keineswegs die Flucht, ſondern flogen nur von Baum zu Baum, wobei ſie natürlich ihren rauhen Ruf: „rräā, rräā, rräā“ häufiger, als mir lieb war, ertönen ließen. Ich wunderte mich ſehr über die Zutraulichkeit der Vögel, denn ich konnte ſie beinahe mit dem Stock erreichen, in ſo unmittelbarer Nähe hielten ſie ſich.

Bietet auch unſere Vogelwelt im Winter nichts Bemerkenswerthes, ſo lohnt es doch, zuweilen den Wald zu durchſtreifen, mitunter beobachtet man doch etwas Intereſſantes. Max Fürle.

... Einen prächtigen Morgen hatte der 21. Januar d. J. Mit rothem Schein leuchtete der Mars am Morgenhimmel, hell glänzte neben anderen weniger großen und hellen Sternen die Venus, während im Oſten bereits der Tag zu ſcheinen begann und das Morgenroth die Wolken purpurn umſäumte. Da konnte ich auch — es war morgens 7 Uhr — heuer zum erſtenmal die Amſel ihr Lied ſingen hören, und zwar mitten in der Stadt München nächſt der griechiſchen Kirche. Bald darauf ſah ich Männchen und Weibchen ſich verfolgend und lockend in derſelben Gegend auf einem Baum. Wie mir ein glaubwürdiger Bekannter mittheilte, ſoll ſchon zwei Wochen früher im Park bei der neuen Akademie eine Amſel geſungen haben. Franz Fleiſchmann.

Anfragen u. Auskunft.

Herrn **Richard Specht**: 1. Wenn Sie für Ihre Wellenſittiche ſo wenig Zeit übrig haben, dürfen Sie nicht auf Züchtungserfolge rechnen. Das Weibchen war an Legenoth geſtorben. Bieten Sie daher nur ein Stückchen Kalk von alten Wänden. 2. Wenn Ihr Kardinal alljährlich gut mauſert und fleißig ſingt, ſo iſt dies doch ein Zeichen dafür, daß er geſund iſt. Was Sie mit dem großen nackten blutrothen Fleck auf dem Unterleib vor der jedesmaligen Mauſer meinen, weiß ich nicht. 3. Bei Ihrem Futter für den Kardinal fehlt ja völlig Hanfſamen, Hafer und ungehülſter Reis. Zur Zugabe müſſen Sie ihm auch etwas Grünkraut (Vogelmiere oder Doldenrieſche) und etwas gutes reifes Obſt reichen. 4. Zuweilen ſingt auch das Weibchen vom rothen Kardinal.

F. G. St.: Wenn Ihr Doppelgelbkopf wäſſerige Entleerungen zeigt, das Futter wieder erbricht und viel ſchläft, ſo iſt dies eher ein Zeichen dafür, daß er an Darmkatarrh leidet, als daß er parungsluſtig iſt. Geben Sie alſo als Getränk den dünnen Haferſchleim weiter; laſſen Sie den Papagei aber nicht zu viel trinken, ſondern reichen Sie ihm nicht mehr davon, als täglich 3 bis 4 Theelöffel voll, die Sie nach und nach bieten. Als Futter geben Sie ihm nur ſchwach angekochten Pferdezahnmais, Hanfſamen und etwas Spitzſamen und täglich wie eine Wallnuß groß altbackenes reines Weizenbrot, in etwas Haferſchleim erweicht, dann von der Rinde befreit und die Krume gut ausgedrückt. Dabei halten Sie den Papagei in gleichmäßiger Stubenwärme von 15 Grad R. und regen Sie ihn vorläufig nicht zum Sprechen an, ſondern laſſen Sie ihn ganz ruhig ſitzen.

Herrn Diviſionspfarrer **E. Becker**: 1. Sie haben Recht darin, daß die Händler halten müßten, was ſie verſprechen. Es iſt ein übler Brauch, daß manche Geſchäftsleute zuweilen mehr verſprechen, als ſie halten können — um Geſchäfte zu machen. Die von Ihnen genannte Vogelhandlung kenne ich im übrigen als reell. Es kommt leider vor, daß auch geſund abgeſchickte Vögel unterwegs oder ſogleich nach der Ankunft ~~ſterben. 2. Der Händler~~, welcher Ihnen Finken zu etwas ~~höherem~~ Preiſe berechnete, als er ſie in einer Annonze ausgeboten, hätte vorher bei Ihnen anfragen müſſen, ob Sie die Vögel zu dieſem höheren Preiſe haben wollten. Sie hätten ohne dies das Recht gehabt, die Annahme zu verweigern. 3. In den Flugkäfig von den angegebenen Größenverhältniſſen dürften Sie wol noch ein Pärchen Amaranten ſetzen. Wenn Sie aber glückliche Züchtungserfolge erzielen wollen, ſo nehmen Sie das unverträgliche Zebrafinkenpärchen, das einzelne Goldbrüſtchen und auch die Tigerfinken heraus, wenn dieſe kein richtiges Pärchen ſind. Webervögel würden die Prachtfinken durch Fortnehmen der Neſtbauſtoffe im Niſten ſtören. 4. Zur Züchtung von ~~Kanarien-Miſchlingen gibt Ihnen mein Buch~~ „Der Kanarienvogel" die gewünſchte Anleitung, welches Sie für nur 2 Mk. durch jede Buchhandlung beziehen können.

Herrn **Joſ. Ehrlich**: 1. Die kleinen Wachtelchen ſind unter einander alle verträglich. Nur zur Niſtzeit kämpfen ſie, namentlich die Männchen, miteinander. Da Sie einen ſo großen Raum zur Verfügung haben, ſo können Sie bei entſprechender Einrichtung gut mehrere Arten halten, denn jedes Par wird ſich ſein beſtimmtes Brutgebiet abgrenzen und gegen Eindringlinge vertheidigen. Immer müſſen Sie aber beobachten, ob dieſelben einander nicht arg befehden; dann muß der Störenfried herausgefangen werden. Mehrere Pärchen von derſelben Art, alſo in Ihrem Fall chineſiſche Zwergwachteln, dürfen Sie jedoch nicht in einem Raum halten. 2. Die Wachtelchen leben parweiſe, alſo in je einem Männchen und Weibchen zuſammen. 3. Die chineſiſche Zwergwachtel macht mehrere Bruten hintereinander. 4. Die Madraswachtel iſt ungefähr um ein Drittel größer als jene. 5. Leicht züchtbare kleine Täubchen ſind: Sperlingstäubchen, blaufleckiges und grünfleckiges Täubchen, Sperbertäubchen, Senegaltäubchen u. a. m.

Herrn **E. Jacoby**: Ein unveränderter Abdruck der dritten Auflage iſt die vierte Auflage des Buchs „Die ſprechenden Papageien" nicht, ſondern zeitgemäß bearbeitet. Wir verweiſen Sie auf die Beſprechung in Nr. 39 d. J. 1898. Trotzdem iſt es nicht unbedingt nöthig, das Sie die neue Auflage auch noch anſchaffen müſſen, nachdem Sie eben erſt die dritte gekauft haben, denn im weſentlichen iſt der Inhalt derſelbe geblieben, nur manche ſeit der dritte Auflage als neu bekannt gewordene Beiſpiele von Begabung, ſowie auch neu gewonnene Erfahrungen in Bezug auf den Handel und die Verpflegung der Papageien ſind bei der Bearbeitung berückſichtigt worden. Laſſen Sie ſich in einer Buchhandlung die vierte Auflage zur Anſicht vorlegen und vergleichen ſie mit der dritten, ſo werden Sie am beſten beurtheilen können, ob für Sie die Anſchaffung der neuen Auflage erwünſcht iſt.

Herrn **Kurt Müller**: Es thut mir recht leid um die Blaumeiſe. Merken Sie es ſich einfürallemal, daß die Zwergpapageien, Sperlingspapageien, Inſeparable und Grauköpfchen, namentlich aber der Roſenpapagei, kleinen Vögeln immer, wenn ſie können, vornehmlich aber im engen Raum, die Beine entzwei beißen. Dabei gibt es nur einen guten Rath, den nämlich, daß man den beſchädigten Vogel in einen Käfig allein ſetzt und hier ſo lange in vollkommener Ruhe hält, bis in 4 bis 6 Wochen der Bruch geheilt iſt. Das Futter und Waſſer müſſen Sie dem kranken Vögelchen ſo hinſetzen, daß es bequem dazu gelangen kann, und vor jeder Erregung und Beängſtigung müſſen Sie es behüten. Wenn der Bruch zugleich eine offene Wunde bildet, dürfen Sie auch keinen Sand, ſondern nur Zeitungspapier in den Käfig geben.

Zu unſerm Bilde.

Zwei der ſchönſten fremdländiſchen Rabenvögel ſind es, die der Künſtler auf dem heutigen Bilde dargeſtellt hat. Beide ſind zugleich in weiteren Kreiſen der Vogelliebhaber mehr bekannt, als ihre Verwandten, da ſie auf alle größeren Ausſtellungen gelangen.

Ein wundervoller Vogel, hinſichtlich ſeines Gefieders, iſt die **blaugrüne Kitta** oder eigentliche Jagdelſter (Cissa sinensis, *Bodd.* s. C. venatoria, *Hamilt.*); ihre Hauptfarbe iſt ein ſchönes Blaugrün; die Federn des Oberkopfs ſind verlängert und bilden eine Haube; von den Wangen durch die Augen um den Nacken zieht ſich ein breites ſchwarzes Band, welches zugleich den untern Theil der Haube bildet; die Flügeldeckfedern ſind dunkelroth, in Rothbraun übergehend; die zweiten Schwingen an der Spitze blaß blaugrün, vor derſelben mit ſchwarzem Fleck; die beiden mittleren Schwanzfedern weiß geſpitzt, die äußeren ſchwarz und weiß geſpitzt; Schnabel und Füße roth; Augen rothbraun. Im Berliner zoologiſchen Garten wurde beobachtet, daß bei vielen Vögeln dieſer Art das Hauptgefieder anfangs rein himmelblau erſchien und ſich ſpäter regelmäßig grün färbte. Die Heimat der ſchönen Kitta iſt der gebirgige Norden Indiens, wo ſie im Himalaya ziemlich hoch hinaufſteigt. Die Reiſenden beobachteten, wie ſie von Baum zu Baum flog, um allerlei Inſekten von den Zweigen abzupicken. Im übrigen gleicht ſie in der Lebensweiſe völlig unſerer Elſter. Die wenigen Liebhaber, welche ſie im Käfig gehalten, rühmen ihr muntres, bewegliches Weſen und ihre Fähigkeit, alle möglichen Töne, angenehme wie unangenehme, nachzuahmen; ſie vermag ſchöne Akkorde nachzupfeifen, läßt aber zu anderer Zeit auch ſchrille Laute hören. Sprachbegabung iſt noch nicht feſtgeſtellt worden. Blyth berichtet, daß ſie bald zahm werde und ſich in ihrem Weſen heher- und würgerartig zeige. Sie badet gern und viel. Leider zeigt ſich dieſe ſchöne Elſter bedeutend weichlicher als alle Verwandten; ſie bleibt ſelten längere Zeit am Leben. Ihre Fütterung beſteht in der Regel in einem Gemiſch aus Ameiſenpuppen, Möre, gekochtem Rindfleiſch, eingeweichtem Weißbrot und Käſequargk, dazu allerlei guter Frucht.

Die **rothbäuchige Baumelſter** (Pica [Dendrocitta] rufa, *Scop.*), auch Wanderelſter genannt, erſcheint an Kopf und Bruſt ruß- oder ſchwärzlichbraun, am tiefſten auf Stirn und Kehle; Schultern, Rücken und Oberſchwanzdecken dunkelroſtröthlich; Flügel ſchwarz, Flügeldecken und Außenfahnen der zweiten Schwingen lichtgrau; Schwanzfedern aſchgrau, breit ſchwarz geſpitzt; Unterſeite roſtroth; Schnabel ſchwarz; Augen roth; Füße grau. Heimiſch iſt ſie in ganz Indien und China. In der Lebensweiſe gleicht ſie unſerer Elſter und iſt Allesfreſſer. Als Stubenvogel zeigt ſie dieſelben Eigenſchaften wie die vorige, doch erweiſt ſie ſich ausdauernder und kräftiger. Mit ſchwächeren Vögeln dürfen beide Arten nicht zuſammen gehalten werden.

K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Die Samen-Großhandlung

von

Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [211]

hält ſich zum Bezug ſämmtlicher **Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Mehlwurmzüchterei

empfiehlt prima Würmer ℳ 4,— ℳ [212]

F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

Ja! Ja! es iſt wahr!

Ich verſende nur ſaubere Ware. [213] Futter für: **Prachtfinken, Reisfinken, Kardinäle, Sittiche, Papageien** (große), **Dompfaff** und **Waldvögel** (als Hänfling, Stiglitz, Zeiſig, Fink) je 5 Ko. 2 ℳ. Bei Entnahme von 3 Poſtkolli füge ich eine ſelbſtthätige Trinkflaſche, ſehr praktiſch für Vögel, **gratis bei.**

H. P. Lange, Samenhdl., Gottesberg i. Schl.

Mehlwürmer,

rein reell gemeſſen, Ltr. 4,50 ℳ, Kilo 8,25 ℳ, 1000 Stck. 1,60 ℳ. Anweiſung zur Zucht **und Aufbewahrung der Mehlwürmer** 30 ₰, **Ameiſeneier**, nur feinſte, ſtaubfreie Ware, pr. Ltr. 80 ₰, Kilo 3,75, 10 Ltr. 7 ℳ, **Weißwurm** feinſter Beſchaffenheit, Ltr. 80 ₰, **Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln, Neſter, Samen** u. a. Preisliſte poſtfrei. [214]

Theodor Frank, Barmen.

1898er hochprima getrocknete und ſorgfältigſt gereinigte [215]

Ameiseneier,

1 Liter mit 85 ₰ liefert

Gottlieb Wanek, Vogelhdl.

Prag (Böhmen).

Ameiseneier,

1898er Ia geſiebte, ſandfreie Ware,	per	Kilo	ℳ 3,20
Weißwurm, prima	„	Liter	„ 1,—
Muska	„	„	„ 0,90
Univerſalfutter, extra	„	Kilo	„ 1,20
Mohnmehl, weiß	„	„	„ 0,60
Sonnenblumenk., weiße	„	„	„ 0,60
Reis in Hülſen	„	„	„ 0,60
Ossa sepia, prima	„	„	„ 3,—
Sommerrübſen, Ia großkern. ſüß			„ 0,44

Ferner Mohar-, Senegal-, Kolben-, weiße **Hirſen, Mohn** und alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [216]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Vögel.

Geſucht werden im Auftrage:

1 Graupapagei
1 Blaustirn-Amazone
1 Doppelgelbkopf.

Alle 3 Exemplare jung, garantirt fingerzahm und einige Worte ſprechend, Gefieder tadellos und keine Schreier und Rupfer. [217]

Adolf Paluka,
Constantinopel, 388 Grand' Rue de Péra.

Da ich nothwend. Geld brauche, verkaufe m. **Graupapagei,** fingerzahm und geſund, $^3/_4$ Jahr alt, mehrere Sätze ſprechend, für ℳ 65. **Gefiederte Welt,** 94. Jahrgang, wie neu, zu ℳ 3,50, **Brockhaus'** kleines Converſations-Lexikon, 2 Bände, 3. Aufl., ſ. gut gehalten, zu ℳ 3,50. Verſende per Nachnahme. [218]

A. Kuschel, Liebenthal, Bez. Liegnitz.

Harzer Kanarien-Edelroller.

Meine Kanarien gehen hervorragend in ſchönen gebogenen, auch ſchockelnden Hohlrollen, tiefen weichen Knorren, Hohlklingeln, Klingeln, Flöten u. Pfeifen u. ſ. w., Tag- und Lichtſchläger, gebe ab zu 8, 10, 12, 15, 20, 25 ℳ, übernehme jede Garanti für Werth, Geſchlecht, lebende Ankunft, 14 Tage Probezeit, nicht gefallende tauſche um oder zahle Betrag zurück. Vögel mit Geſangsfehler 5—7 ℳ, Wbch v. 1,50 ℳ an. [219

D. Schmidt, Thale a. Harz, Steinbruchsweg 3.

[220]

Sonnen-Astrilde

— tadellos ſchön. —

August Fockelmann,
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Abzugeben: Diverſe Pare: Japan. Mövchen ℳ 4, Zebrafinken ℳ 1,50, Rieſenelſterchen ℳ 7, gutſingende [illegible] u. Diukafinken aus Chile St. ℳ 6, P. ℳ 10, Wellenſittich-Weibch. ℳ 4 inkl. Packung, richt. [illegible] [221

Dr. Franken, Baden-Baden.

Suche zu kaufen:

1 Singdroſſel, guter Sänger. Probeſendung gegen Nachnahme. [222]

A. Schaub, Hauptlehrer,
Blumenthal (Hann.).

Wegen Tod meiner Mutter verkaufe oder tauſche gegen Papagei (ſprechend) ꝛc.:

1 ff. **Blaudroſſel** von M. Rauſch	20,—
1 „ ſing. **Spottdroſſel**	15,
1 laut ſing. **Schwarzplattl**	6,50
1 „ „ **Sperbergrasmücke**	6,—
1 **Nonpareil** 7, 1 **Indigofink**	5,—
1 5 **Signale pfeif. Amſel**	14,
1 ff. **Singdroſſel** u. 1 ff. **Amſel**	à 6,—

Marg. Böhlke,
[223] **Bromberg**, Roonſtr. 10 II, 1.

Harzer Kanarien,

ſehr gute Sänger, werden wegen Aufgabe der Zucht zu herabgeſetzten Preiſen abgegeben.

W. Böcker, Kontroleur, **Wetzlar.** [224

Dompfaffen,

ſelbſtdreſſirte, 2 Lieder ff. flötend u. Garantie. Beſte Referenz. [225]

Jean Schmidt, Lehrer,
Schlotzau, Kr. Hünfeld.

Verkaufe billig:

Prima **Rothbug-Amazone,** ſehr gelehrig, ohne Kette auf Ständer gewöhnt, pfeift, lacht, weint, huſtet, für 50 ℳ; eine **Albino-Amſel,** weißer Schwanz u. Flügel, feiner Waldgeſang, für's Meiſtgebot. Packung frei, Garantie f. geſ. Ankunft. [226]

Schlnninger, Wels, O.-Oeſt.

Zu kaufen geſucht:

1 Hakengimpel-Männchen
1 Karmingimpel- „

Bedingung: **kräftige, geſunde Exemplare in tadelloſem, rothem Gefieder.** Offerten mit Preisangabe an

Zimmermann,
[227] **Berlin W**, Dörnbergſtr. 6.

Sprosser

f. 18 ℳ umſtändeh. z. verk. [228]

G. Hahn, Uhrmacher,
Magdeburg-Buckau.

Goulds-Amandinen.

Suche ein Par Goulds-Amandinen (möglichſt rothköpfige) zu kaufen. [229]

Hugo Dicker,
Halle a. S., Landwehrſtraße 24.

Nachtigal,

Schwarzplättchen, Sonnenvogel, g. Säng., zuſ. 20 ℳ. Tauſche a. **Exoten.** [230

L. Höger, München, Parkſtr. 31/0.

Meine ſelbſtgezüchteten ff.

Kanarienſänger

verſende vom 1. Novbr. ab, unter Garantie des Werthes und lebender Ankunft, zu 9, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ à St. [231]

Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, 146.
NB. Bei Anfrage Rückporto erbeten.

Hochfeine

Harz. Edelroller

(Stamm Trute),

welche vorzüglich in tief. gebog. u. geraden Hohlrollen, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Klingel, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 6, 8, 10, 12 u. 15 ℳ, Dtz. 60, 72, 84 und 96 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, verſende gegen Nachn. 6 Tage Probezeit. Nichtgefallendes tauſche um, ev. Betrag zurück. [232]

Herm. Voigt, Thale a. Harz.

Harzer Kanarien-

Roller mit Nachtigaltouren zu 6, 8 ℳ, edle Roller v. 10 ℳ an, **Harzer Vogelkäfige** u. Utenſilien, Geflügelkäfige, Poſtverſandt-Kiſten u. ſ. w. Preisl. frei. [233]

Ad. Janson, Lauterberg, Harz.

Ein Dompfaff-Zuchtpar

iſt noch für ℳ 4,50 (inkl. Transportkäfig) verkäuflich bei [234]

F. Schlag, Steinbach-Hallenberg b. Schmalkald.

Feinste Kanarienſänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ. Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [235]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.
Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

Hochfeine prämirte

Harzer Edelroller

(Stamm Trute), welche vorzüglich in Hohlrolle, Knorre, Klingelrolle, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 8, 10, 12, 15, 20 ℳ. Zuchtweibchen 1,50 ℳ verſende gegen Nachn., bei achttägiger Probe. Nichtgefallende tauſche um, ev. Betrag zurück, gebe zwei St. Zuchtweibchen gratis bei. [236]

Wilh. Koye, Thale, Harz.

Anzeigen.



No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.

No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50

Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.—**

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige** für **Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc. mit sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [237]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Prima 2 Lieder pfeifende

Dompfaffen

à 30—40 ℳ offerirt u. Garantie u. 4 Tage Probe [245]

K. Diehl III.

Angersbach, Oberheſſen.

Geſucht: Granataſtrilde, Buntaſtrilde, Wiener's Aſtrilde, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen.

F. Beedzler, [246]

20, Norton Folgate, **London** (England).

Verkaufe: [247]

2 P. imp. **Wellenſittiche,** zuſ. 10 ℳ

Brummund, Cöslin, Schulſtr. 12.

1898 erhielt mein Stamm Harzer **Kanarienvögel** 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.

Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [248

!!Kanarienvögel!!

Meine weltbekannten, tieftourenreichſten 1898er Sänger ſind in großartigſter Auswahl alle wieder geſangsrein u. beſtens ſortirt. Liefere garantirt reell überallhin, ſteigend nur nach Geſangsgüte, à Stück 10, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ, Nachnahme oder Betrag vorher. [238]

Julius Häger,

St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1861. Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Gelbe Bachſtelzen

P. 5 ℳ, **rothrückiger Würger,** vorzügl. Spötter, 8 ℳ, **Hausrothſchwänze** 3 ℳ, lautpfeif. **Rothkehlchen** 3 ℳ, **Sperbergrasmücke** 5 ℳ, **Dorn- u. Müllerchen** 3,50 ℳ, **Kleiber** 3 ℳ [239]

Sager, Berlin, Andreasſtr. 39.

---

1 prima ſingende

Schamadroſſel,

tadellos befiedert, um den Spottpreis von 30 ℳ mit Verpackung zu verk. Näheres bei

[240] **Aug. Amlung.**

Ludwigshafen, Rhein, Kanalſtr. 70.

Kanarienvögel.

Empfehle meine tieftourenreichen Sänger von 8—36 ℳ. Leiſte Garantie für Werth u. leb. Ankunft, gebe 8 Tage Probezeit, tauſche um, evtl. zahle d. Betrag retour. Preisl. fr.

Wilh. Schick, St. Andreasberg i. H.

vormals W. Schwanebeck. [241]

Harzer Kanarienvögel

(Truteſche Hohlroller),

Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſich i. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel, Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis** und **franko.** Weibchen desſelb. Stammes 2,50 ℳ. [242]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Offerire:

2 prachtvolle dunkelrothe Araras, zahm u. ſprechend, 1 großen zahm. Gelbhaubenkakadu, 1 dito kleinen, 2 fingerzahme, anf. ſprechende Blauſtirn Amazonen, 1,1 Sperlingspapagei, 1,2 Roſenpapagei, Nymfen- und Wellenſittiche, graaköpfige Inſeparables, 1,1 Buntſittiche (Roſella), 1,1 Pariſer Trompeter, alles gar. Zuchtpare, 1,1 Mönchſittiche, 1,1 [illegible]baſtard, 1,1 zahme weiße Störche, 2,0 zahme Rheſus-Aeffchen, 1,1 Angora-Kaninchen. Vorerwähntes ſeit mindeſtens 1 Jahr im Garten akklimatiſirt und gezüchtet, ev. tauſche auf alles Lebende, außer kl. Groten. Bei Anfragen Rückporto erbeten. [243]

1. Frankf. Handels-Thiergarten.

C. Walter.

Frankfurt a. M.-Bockenheim.

---

1 **Schamadroſſel,** großartig im Geſang u. Gefieder, ℳ 50, 1 **Singdroſſel** do. ℳ 10, 1 **ruſſ. Sproſſer** do. ℳ 10. Alle ganz zahm. [244]

1 **Meyer's Lexikon,** 18 Bde., vorletzte Aufl., ganz neu, 1 **Brehm's Thierleben,** gr. Ausgabe nebſt Schöpfung der Thierwelt, noch in Lief., zuſ. nur ℳ 180.

K. Dischinger, Karlsruhe, Bad., Herrenſtr. 28.

Bücher-Anzeigen.

In unserem Verlage erschien:

Das Huhn als Nutzgeflügel.

Von

Dr. Karl Russ.

Zweite, reich illustrirte Auflage.

Preis M. 2.—; geb. 2.50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Bei uns erſchien:

Vogelzucht-Buch,

Stubenvogelpflege und -Zucht
zum Vergnügen, zum Erwerb und
für wiſſenſchaftliche Zwecke.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Auflage, mit 13 Tafeln u. 30 Textabbildungen.

Preis Mk. 1.50, geb. Mk. 2.—.

Creutz'ſche Verlagsbuchhdlg.
in Magdeburg.



Verkleinerte Zeichnung der Decke!

Wir haben für den 1898er Jahrgang der „Gefiederten Welt"

braune Einbanddecken

in Schwarz- und Goldpreſſung

nach Zeichnung des bekannten Malers Emil Schmidt herſtellen laſſen, welche wir unſeren geehrten Abonnenten

für nur 80 Pfg.

zur Verfügung ſtellen. Jede Buchhandlung beſorgt dieſelben! Nach Orten, in denen keine Buchhandlungen ſind, verſenden wir direct gegen Einſendung von M. 1.— (incl. Porto).

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkleinerte Zeichnung der Decke!

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Druck von August Hopfer in Burg b. M.

[illegible]

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 6. Magdeburg, den 9. Februar 1899. XXVIII. Jahrg.

Weiteres zur Züchtung der Paradis-Amandine (Spermestes erythrocephala, *L.*), **bzl. Argus-Amandine** (S. Argus, *Rchb.*).

Von Hauth, Oberleutnant z. D.

(Fortſetzung).

Wie ich ſchon im erſten Abſchnitt dieſes Berichts erwähnte, war an die Stelle des verendeten Weibchens Paradisfink mein im vierten Jahr ſtehendes Miſchlingsweibchen Paradisfink-Bandfink getreten, um die Züchtungsverſuche mit dem Männchen Argus-Amandine fortzuſetzen.

Gleich am folgenden Tag nach dem Tod des erſten Weibchens geſellte ich dem erwähnten Männchen das genannte Weibchen zu und, wie vorauszuſehen, herrſchte zwiſchen den Beiden zunächſt ein höchſt geſpanntes Verhältniß; denn die Anhänglichkeit des Paradisfink-Männchen an ſeine erſte Lebensgefährtin, nach der es faſt unausgeſetzt in immer lauteren, ängſtlichen Rufen lockte, wobei es ſich zugleich in höchſter Erregung und Unruhe flatternd und ſpringend bewegte, war keine ſo oberflächliche geweſen, um ſie ſo ſchnell vergeſſen zu können. Wiederholt ſchlüpfte es auch in's Neſt hinein, indem es dann von dort aus in ſeinen zärtlichſten, in Wirklichkeit etwas rauh piependen Tönen nach der Verſchwundenen rief. Näherte ſich dann das neue Weibchen, das wol meinen mochte, die Sehnſuchtsrufe gälten ihm, der Einflugsöffnung zum Niſtkäſtchen, ſo fuhr das Männchen wuthentbrannt auf jenes los, es zur entſetzten Flucht bis in die entfernteſte Ecke des Käfigs treibend. Trotz ſolcher ſchlimmen Erfahrungen konnte das Weibchen aber in ſeinem Liebesdrang dem Locken zum Neſt nicht widerſtehen, ſondern verſuchte immer von neuem zu ihm zu gelangen, vielleicht vorahnend, daß Beharrlichkeit ſchließlich zum Ziel führen werde. Vor der Hand aber wollte das Männchen von der ihm aufgedrungenen neuen Genoſſin nichts wiſſen. So war denn wenig Ausſicht auf eine baldige Züchtung dieſer ſchönen Amandine, auf die es mir wegen der Kürze der mir geſtellten Friſt ſehr ankam, und ſo ſann ich hin und her, wie ſich die Vögel wol ſchnell näher bringen ließen. In welcher Weiſe mir dies Schritt für Schritt in verhältnißmäßig kurzer Zeit gelang, mag vielleicht manchem der geehrten Leſer intereſſant genug erſcheinen, um es hier ſchildern zu können.

Aus meinen früheren Beobachtungen an den verſchiedenſten Vogelarten wußte ich, daß die Trennung eines der beiden Gatten eines lange aneinander gewöhnten und miteinander verparten Zuchtpärchens von dem andern in der Regel lange ſchwer empfunden wird, was am ſichtbarſten darin zu Tage tritt, daß es, mit wenigen Ausnahmen und abgeſehen von einzelnen, beſtimmten Arten, meiſtens erſt nach längerer Zeit einem andern Gatten ſeiner Art ſich wieder anſchließt; wie es ja auch manchem Vogelwirth nicht unbekannt ſein wird, daß ſolche Vogelpare ſelbſt nach jahrelanger Trennung ſich ſogleich wiedererkennen und zu einander halten, ſobald ſie die Umſtände wieder zuſammenführen.

Auch mein Paradisfink-Männchen war augenſcheinlich untröſtlich über den Verluſt ſeines bisherigen Weibchens und nach acht Tagen noch ebenſo erregt und unfreundlich gegen das andere, trotzdem es von jenem ja nichts mehr ſah und hörte, wie von Anfang an. In meinem Bemühen, die Vögel ſich ſchneller näher zu bringen, wurde ich weſentlich unterſtützt durch die ungewöhnliche Niſtluſt des Miſchlingsweibchens, das unermüdlich beſtrebt war, ſeine Zuneigung ihm, dem Männchen, erkennen zu geben. Ich hatte bemerkt, daß die beiden Vögel, die natürlich ebenfalls allein in einem Heckkäfig ſich befanden, ſtets getrennt in den Neſtern übernachteten und zwar das Männchen in dem von ihm bisher gemeinſam mit ſeinem erſten Weibchen benutzten, das neue Weibchen dagegen in dem andern vorhandenen. Daher verdeckte ich jetzt den Eingang zum Neſt des Männchens, um dieſes zu nöthigen, in dem des Weibchens mit zu übernachten. Ich traf abſichtlich dieſe Ordnung, einerſeits um das Männchen in Gedanken abzubringen von dem Neſt, in dem es mit ſeinem früheren Weibchen gehauſt und in das es das andere niemals hineinließ, andrerſeits um auch das Weibchen zu veranlaſſen, ſein vom Männchen nunmehr höchſtwahrſcheinlich zur Nachtzeit beſchlagnahmtes Neſt mit Nachdruck aufzuſuchen, falls es von ihm nicht hineingelaſſen würde. Wie vorauszuſehen, entſpann ſich dann auch am nächſten Abend ein Kampf um dieſe Schlafſtätte. Allerdings unterlag ſtets das Weibchen als der ſchwächere und furchtſamere Theil, aber die fortgeſetzten Verſuche, dennoch einzudringen, nöthigten doch auch das Männchen, ſich mehr mit ſeiner neuen Genoſſin zu beſchäftigen. Auch tagsüber pflegte das Weibchen ſich viel im Neſt aufzuhalten und das Männchen ſuchte es ebenfalls oft auf, da ſein bisheriges Neſt verſchloſſen war. So war das Männchen gezwungen, in nähere Berührung mit der neuen Gefährtin zu kommen und ſich daran zu gewöhnen, auch dieſe im ſelben Neſt ein- und ausfliegen zu ſehen. Zwar waren ſie bisher noch niemals, weder bei Nacht, noch am Tage (das Weibchen nächtigte ſeitdem draußen auf der Stange) gleichzeitig im Neſt geweſen, denn bei Annäherung des Männchens flüchtete das Weibchen ſofort aus demſelben, mit Recht ſeinem derben Schnabel mißtrauend. Dem aufmerkſamen Beobachter konnte aber dabei nicht entgehen, daß bei dieſem Thun und Treiben die beiden Vögel doch einander ſchon näher gekommen waren. Während das Weibchen anfänglich weit entfernt vom Neſt die Nacht verbringen mußte, durfte es nach einigen Tagen ſchon in der Nähe deſſelben verweilen; ſpäter unmittelbar vor dem Neſteingang, ſchließlich ſogar halb im Einflugsloch ſitzend. Somit waren alſo die ſeit faſt einer Woche allabendlich vom Weibchen, ich möchte faſt ſagen in bittenden und ſchmeichelnden Tönen und Lauten gemachten Verſuche, in das vom geſtrengen Männchen beſetzte Niſtkäſtchen eingelaſſen zu werden, nicht ganz ohne Erfolg geblieben. Desgleichen hatte ſich in dem Verhalten des männlichen Vogels am Tage ebenfalls ein Umſchwung zu Gunſten der neuen Gefährtin allmählich vollzogen. Jetzt durfte ſie bereits in ſeiner unmittelbaren Nähe ihr zärtliches, ausdrucksvolles Liebeswerben ausführen. Dieſes Liebesſpiel des Weibchens beſteht hauptſächlich darin, daß es mit gefächertem Schwanz und geſträubtem Gefieder unter allerlei Knixen und Verbeugungen und unter Hervorbringen von verſchiedenen Freudentönen das Männchen umſpringt und ſich ihm nach und nach ganz nähert, wobei es ihm gelegentlich in's Gefieder und auf den Schnabel pickt, gewiſſermaßen es hierdurch in ziemlich derber, handgreiflicher Weiſe zu gleichem Thun auffordernd. Im Ganzen blieb aber auch jetzt noch das Benehmen des Männchens ein zurückhaltendes, wenn auch nicht mehr abweichendes. Ueber dieſes Stadium der inneren Annäherung ſchienen jedoch beide Vögel nicht hinauskommen zu können, und ſo legte ich denn eines Tags, ihnen ſozuſagen einen Wink mit dem Zaunpfahl gebend, einige Eier in's Neſt, um ſie zum eigentlichen Niſten zugleich anzuregen, und dieſer Verſuch war wirklich von beſtem Erfolg begleitet. Kaum erblickte nämlich das Männchen die Eier, als es auch ein wahres Freudengeſchrei erhob; halb in's Neſt hineingebeugt, am Flugloch ſitzend, rief und lockte es in ſichtbar freudigſter Erregung nach dem Weibchen, wobei es auch in merkwürdiger Weiſe mit dem Schnabel ein knackendes Geräuſch verurſachte. Gleich darauf ſchlüpfte es hinein und wiederholte von da aus daſſelbe Spiel; es mochte wol denken, daß das Weibchen ſoeben die Eier gelegt habe und in ſeiner Freude darüber vergaß es ganz, daß dieſes ja nicht ſein früheres war. Erſtaunt und neugierig zugleich, mit lang vorgeſtrecktem Hals, kam denn auch jenes herbei und lugte vorſichtig in's Neſt hinein, nach der Urſache ſeines ſo plötzlich veränderten Weſens ſpähend. Die Sachlage mochte ihm, d. h. dem Weibchen, jetzt wol vertrauenerweckend erſcheinen; denn nach kurzem Zögern ſchlüpfte es ebenfalls Schritt für Schritt hinein, und nun verweilten beide Vögel zum erſtenmal zuſammen unter zärtlichem Gewiſper längere Zeit darin. Von dieſer Stunde an war ihr Verhalten zu einander wie umgewandelt; in vollſter Eintracht leben ſie ſeitdem ſtill und friedlich dahin, oft dicht aneinander geſchmiegt ſich im Kopfgefieder neſtelnd. Noch am ſelben Tag trug das Männchen wieder Bauſtoffe zum Neſt, die gemeinſam oder vom Weibchen allein einigermaßen geordnet wurden; im ganzen blieb es ein unordentlicher Bau, wie es bei dieſer Art und dem ihr naheverwandten Bandfink gewöhnlich der Fall iſt. Ihr Benehmen war von jetzt ab das eines zuſammengehörigen Zuchtpars und ſchon am vierten Tag nach dem geſchilderten Ereigniß legte das Weibchen am 26. Dezember v. J. früh, alſo nach erſt dreiwöchentlichem Beiſammenſein, das erſte Ei, dem am 28. Dezember ein zweites folgte, das aber erſt am Nachmittag, für gewöhnlich eine ſeltne Legezeit, gelegt wurde. Leider ſtellten ſich merkwürdigerweiſe auch bei dieſem Weibchen jetzt Zeichen von Unpaßlichkeit ein, ſodaß es zu keinem weitern Legen und auch nicht zur regelrechten Brut kam, weshalb ich genöthigt war, die Eier an japaniſche Mövchen zu geben. Da ich dieſe nicht ſtören möchte, ſo bin ich zur Zeit über einen etwaigen Erfolg noch im Ungewiſſen.

Ein eigenes Mißgeſchick verfolgte bisher meine Züchtungsverſuche mit der ſchönen Paradis-Amandine. Und wie es den Anſchein gewinnt, ſtellen ſich auch die weiteren Ausſichten für's erſte ziemlich ungünſtig. Der ſeit drei Sommern als ſo vortrefflicher Leger und Brüter bewährte Miſchling verſagte in dieſer Beziehung in dieſem Jahr bisher leider faſt vollſtändig. (Die in den vergangenen Jahren vom genannten Weibchen gemachten Bruten gingen im Beiſein von Männchen von verſchiedenen fremdländiſchen Amandinenarten vor ſich; die Gelege mit dieſen waren aber ſtets unbefruchtet geblieben, anſcheinend weil jenes keine Parung mit ihnen eingehen wollte).

Zwar legte der Vogel im Lauf des Januar in Zwiſchenräumen von etwa einer Woche noch einige Eier, die aber entweder zerbrochen wurden oder ſpurlos verſchwanden. Dabei iſt der Vogel im ganzen

läuft, klettert und fliegt ihm überall hin nach, klettert am Fuß in die Höhe, läßt mit ſich ſpielen, ſich auf den Rücken legen und bleibt auf das Kommando „tot!“ unbeweglich liegen — kurz er zeigt eine Zahmheit, wie man ſie bei Keilſchwanzſittichen ſelten findet, vielmehr von allen Sittichen ſonſt nur bei den Schmalſchnäbeln (Brotogerys, *Vig.*), zumal dem Feuerflügelſittich. Auch gegen alle Anweſenden erwies er ſich ebenſo zutraulich; allerdings thut er dies nicht immer; gegen Kinder zeigt er entſchiedene Abneigung. Er ſpricht die Worte: „Papa“ „Perry“, „Margarita“, „Arra“, „Karl“ und „à la parte“; er lacht und pfeift auch. Er wurde von einem Schiffskoch in Coſtarika als junger Vogel erworben und gezähmt, überſtand auf demſelben Schiff zweimal die Reiſe von Amerika nach Bremen und zurück. Die Heimat von Finſch's Keilſchwanzſittich erſtreckt ſich über Nicaragua, Coſtarika, Panama.

Ebenfalls aus Mittelamerika ſtammt der **Rothhalsſittich** (Conurus rubritorquis, *Scl.*). Er iſt im ganzen Gefieder grün, nur ausgezeichnet durch einen breiten dreieckigen Kehlfleck, deſſen Färbung ſchön orangeroth erſcheint (beim Weibchen ragt die grüne Färbung in der Mitte weit hinein, ſodaß der Kehlfleck kleiner erſcheint); von gleicher Farbe iſt ein ſchmaler Halsring, der indeſſen auf dem Nacken durch die grüne Färbung unterbrochen wird; auf dem Kopf zeigen ſich vereinzelte rothe Federn (Beſchreibung nach dem Pärchen im Berliner zoologiſchen Garten). Im Jahr 1886 wurde dieſe Art nach einem lebenden Vogel im Londoner zoologiſchen Garten, deſſen Heimat unbekannt war, von Sclater beſchrieben; andere Gelehrte beſtritten die Artbeſtändigkeit, doch wieſen Godman und Salvin nach, daß die Art beſtehe und ihre Heimat Nicaragua, Honduras und San Salvador ſei. Im Jahr 1897 gelangte ein Vogel dieſer Art in den zoologiſchen Garten von Hannover, wie uns der Direktor deſſelben, Herr Dr. Ernſt Schaeff, freundlichſt mittheilte; 1898 erwarb Herr Dr. Heck auch für den Berliner Garten einen Rothhalsſittich, der dort zur Vervollſtändigung der umfangreichen Keilſchwanzſittich-Sammlung dient. Die Vögel im Berliner zoologiſchen Garten zeigen ſich übrigens etwas abweichend und bedeutend ſchöner, als die Gelehrten die Art beſchrieben haben; das prächtige Orangeroth der Kehle erinnert faſt an die Färbung der Unterſeite des Mohrenkopfpapagei (P. senegalus, *L.*).

Ein dritter ſeltener Papagei wurde kürzlich im zoologiſchen Garten von Rotterdam geſehen; es iſt eine Amazonenart: Chrysotis [Androglossa] inornata, *Salvad.* Sie hat große Aehnlichkeit mit der allbekannten Müller-Amazone, unterſcheidet ſich von ihr indeſſen durch das Fehlen des gelben Flecks in der Mitte der Kopfkrone, die etwas hellere Schattirung der grünen Farbe und die etwas bedeutendere Größe, beſonders des Schnabels. Tommaſo Salvadori hat dieſen Vogel als beſondere Art aufgeſtellt und die meiſten Ornithologen erkennen ſie an. Die Heimat erſtreckt ſich von Panama bis Peru und zum Amazonenfluß. Unter den vielen alljährlich eingeführten Müller-Amazonen dürften die Händler und Liebhaber bei aufmerkſamer Nachforſchung wol bald Vögel dieſer Art finden. Einen deutſchen Namen hat ſie noch nicht; bei häufigerer Einführung wird man ſie wol **große Mülleramazone** nennen.

Engliſche Vogelliebhaberei.

Von **Albert Rettich.**

(Fortſetzung).

Es iſt nur ein geringer Troſt für den wahren Vogelfreund, daß die geſchilderten Schändlichkeiten beinahe ausſchließlich von der niederſten Klaſſe des Volkes ausgeübt werden, denn die Hoffnung, dem Uebel abzuhelfen, iſt dadurch um ſo weiter entfernt. Der Vater behandelte ſeine Vögel vor einer Generation auf die altbekannte Weiſe und die Söhne machen es heute immer noch ſo. Sie ſind darin recht beſtändig und zugleich der Mühe, ſelbſt zu „denken“, überhoben.

Aber die beſſeren Klaſſen ſind auch nicht ganz tadellos. Sei es Unwiſſenheit oder Gleichgiltigkeit, die Sorge um eine richtige, humane Pflege des Vogels läßt viel zu wünſchen übrig. Nur zu oft wird ein Dienſtbote damit beauftragt; ob aber der Napf immer ſo angehängt iſt, daß der Inſaſſe auch ſeine Nahrung erreichen kann oder nicht, wird ſelten geprüft. Die meiſten unſerer Käfige ſind ſo eingerichtet, daß der Vogel den Kopf durch eine Oeffnung ſtecken muß, die nur groß genug iſt, den Kopf, aber nicht auch den Körper durchzulaſſen, und da muß eben der Napf mit Sorgfalt angehängt werden. Sorgſame Dienſtboten ſind in dieſer Beziehung ſehr ſelten.

Im glücklichſten Fall verſieht die Hausfrau den Dienſt der Vogelpflege ſelbſt, doch iſt auch damit garnicht geſagt, daß der Vogel gegen die allnächtlich wiederkehrende Heimſuchung durch Myriaden von Milben geſchützt wird. Die gute Frau reinigt den Schieber mit großer Gewiſſenhaftigkeit zweimal in der Woche, wäſcht das Bauer hier und da auch einmal, aber wenn ſie nicht mit dem bloßen Auge die Inſekten herumkriechen ſieht, glaubt ſie doch nicht an deren Daſein, und von einer Unterſuchung nachts iſt keine Rede, denn der liebe Vogel darf nicht in ſeinem Schlaf geſtört werden.

Es wird zwar ſehr viel gegen dieſe Plage geſchrieben und gedruckt, Präparate für die Vertilgung annonzirt und verkauft, aber von einer verbeſſerten Pflege des Stubenvogels im allgemeinen ſieht man noch ſehr wenig. Zur Erläuterung der Unwiſſenheit und vielleicht auch der Gleichgiltigkeit, die ſelbſt in der beſſern Klaſſe vorherrſcht, will ich folgenden Fall anführen. Ein Mitglied unſeres beſten Vereins in den mittleren Jahren, Kaufmann, hatte mich mehrfach erſucht, ſeine Baſtard-Zucht zu beſichtigen. Ich ging hin; im Wohnzimmer hing ein hochgelber Yorkſhire-Kanarienhahn, der mir als ehemaliger ausgezeichneter Sänger geſchildert wurde; leider habe er aber ſeit dem erſten Jahr nicht mehr geſungen. „Er muß wol in der Mauſer ſein, denn Sie ſehen, wie ſtruppig er ausſieht!“ hieß es. In der That hatte er keine geſunde, anliegende oder unzerknickte Feder am Leibe. — Eine Treppe höher, im Badezimmer, waren die Hecken; ſchöne geräumige, koſtſpielige Behälter, aus Tannenholz in Kiſtenform gebaut, wo alles Bewegliche an der Drahtwand vorn angebracht war. Darin ſaßen: zwei Stiglitze, vier große Kanarien-Weibchen, die viel Geld gekoſtet hatten, und zwei junge Baſtarde. Letztere waren das Ergebniß der Jahres-Züchtung! Mein Freund war ſtolz auf die feine Ausſtattung ſeiner Zuchtanſtalt, beſchwerte ſich aber über ſein „Unglück“ mit den Vögeln. „Warum ſind die Alten ſo dick und rauhfederig?“ frug er klagend. Gegen meine leiſe Anſpielung auf die Möglichkeit des Vorhandenſeins von Milben proteſtirte er auf's Entſchiedenſte, doch beſtand ich darauf, daß wenigſtens eine der Hecken heruntergeholt werden ſollte. Dies war mit vielen Schwierigkeiten und Herbeiholen einer Stellleiter verknüpft, endigte aber damit, daß Mann und Frau förmlich errötheten, als ſie den Zuſtand der gehobenen Holzdecke erblickten, ohne erſt tiefer herunter zu gehen und ohne die Mauer und Tapete zu prüfen. Beſchämt baten ſie um Rath. Ich hatte darauf nur eine Antwort: Setzt in vollem Tageslicht Euere Vögel in inſektenfreie Käfige und ſtellt ſie in ein andres Zimmer, nicht weniger als einen Monat lang! Weiteres nach Umſtänden*).

Unter Betheuerungen tiefen Mitgefühls für ſeine mißhandelten Pfleglinge borgte mein Freund die nöthigen Käfige von mir, behielt ſie drei Monate, und jetzt ſitzen ſeine Vögel wieder ſeit drei Monaten in den alten Käfigen, aber für die Reſerven hat er noch nicht geſorgt! Dieſe Handlungsweiſe grenzt doch an Gleichgiltigkeit?

In ähnlicher Weiſe überzeugte ich eines Tags eine ſehr reiche Dame, daß ihre vier Lieblinge deshalb nicht ſängen, weil ſie von Milben, die ich ihr auf der Meſſerſpitze zeigte, gepeinigt würden und in neue Käfige geſetzt werden müßten. Aber das lehnte die Frau entſchieden ab. Sie würde die Köchin mit dem Reinigen in Zukunft beauftragen. Weiteres könnte ſie nicht unternehmen. (Fortſetzung folgt).

---

*) Ueber die Vogelmilbe und ihre Behandlung haben wir hier im vorigen Jahrgang einen ſachgemäßen Artikel gebracht. D. L.

Schilderungen aus der Vogelwelt Kaliforniens.

Von P. F. Reiſer.

(Fortſetzung).

Stand ich recht ruhig, ſo blieb die Droſſel oft minutenlang auf einem Aſt vor mir ſitzen, ließ die Flügel hängen und ſang ihr Lied, oft laut, oft ſo leiſe, daß es wie aus weiter Ferne klang oder wie das Streichen des Winds durch eine Aeolsharfe. Ihr Lied iſt nicht ſehr reichhaltig oder kunſtreich, es beſteht nur aus einer kurzen Strofe, aber von wunderbarer Tiefe und Schmelz. Er ließe ſich in Silben etwa geben durch: „toh, toh, toh, die, di, di“. Dieſe Strofe ſcheint ſie in allen Tonarten zu ſingen, bald eine Terz höher, bald tiefer, und das Ausklingen derſelben kann ich nur mit den Klängen einer Aeolsharfe vergleichen. Für den deutſchen Vogelliebhaber, der in dieſen fernen Gegenden ſeinen Wohnſitz aufgeſchlagen, kann nur dieſe Droſſel, wenigſtens einigermaßen, die Sänger der Grasmückenarten Deutſchlands erſetzen. Als ich zuerſt mich in Kalifornien niedergelaſſen, kam mir die Vogelwelt gegen die Deutſchlands armſelig an Arten und beſonders an Sängern vor und ich gab dem Dichter Lenau recht, welcher bekanntlich ſagt: „Amerika iſt ein Land, in welchem die Vögel nicht ſingen, die Blumen nicht duften und die Menſchen kein Herz haben!“ Das letztere laſſe ich dahingeſtellt ſein, was aber erſteres anbetrifft, ſo wurde ich anderer Meinung, nachdem ich die roſtrückige Droſſel, den Spottvogel, die Braundroſſel u. ſ. w. näher kennen gelernt und gehört hatte. Und beſonders die P. ustulatus hat mich am erſten mit Kalifornien verſöhnt!

4. Noch zwei andere intereſſante Arten Droſſeln, die ſich beſonders durch bunte Färbung auszeichnen, bewohnen im Winter die Thäler Kaliforniens: Die Merula migratoria propinqua, *Ridg.* und die Hesperocichla naevia, *Gmel.*

Die H. naevia oder Buntdroſſel brütet in den nordiſchen Gegenden des weſtlichen Amerika, beſucht aber im Winter Kalifornien in großen Scharen, wo ſie ſich gern in Geſellſchaft der Merula aufhält. Jedoch findet man ſie nicht ſo häufig in den Niederungen und Thälern als dieſe, da ſie mit Vorliebe die Fußhügel und mesas durchſtreift und ſich von Beren (beſonders der Stechpalme) nährt. Durch ihre auffallende Färbung, namentlich das dunkelgraue Band über die Bruſt, läßt ſie ſich leicht von der Merula unterſcheiden.

Die M. migratoria propinqua oder weſtliche Wanderdroſſel unterſcheidet ſich von ihrer öſtlichen Schweſter durch hellere Färbung des Rückens und mehr Größe; auch fehlt ihr das Weiß der Enden der äußeren Schwanzfedern. Sie beſucht die Thäler Kaliforniens von November an, beſonders zahlreich aber im Januar, wenn die Hochgebirge mit Schnee bedeckt ſind, bis Ende Februar. Zur Niſtzeit aber zieht ſie ſich ſcheu in die einſamen Wälder der Hochgebirge zurück, während ihre öſtliche Verwandte bekanntlich in Gärten und Parks, ähnlich der deutſchen Amſel, brütet. Da ſie auf ihren Streifzügen häufig bis inmitten kleiner Städte kommt und ſcharenweiſe auftritt, wird ſie häufig als Wildbret geſchoſſen.

In ihrem Weſen und ihrer Erſcheinung vertritt dieſe Droſſel hier die deutſche Amſel. Ganz ähnlich klingt ihr ſchreiender Ruf: „tak, tack, zrick, zrick, zrick“ oder ſie ſchreit auch wie „däiha“. Sitzt ſie ruhig auf einer Baumſpitze, ſo ertönt ein ſcharfes „psssp“. Unter lautem, aufgeregtem „tak, tack, tack, tack“ erhebt ſich plötzlich der Schwarm vondannen. Im Geſang ähnelt dieſe Droſſel, die übrigens bedeutend größer und plumper iſt, der Amſel nicht. Er beſteht nur aus einer Reihe laut ausgeſtoßener Rufe: „da, hi, huit, wä, huit u. a.“, die allerdings ſehr wohllautend ſind. Im Käfig wird ſie träge und zahm, ſingt aber Winters ſehr fleißig. Auch im Freien läßt ſie ſchon im Januar ihren Geſang erſchallen. In ihrem Niſtgebiet, den Hochwäldern der Sierra Nevada, hatte ich noch keine Gelegenheit, ſie zu beobachten. Durch ihre ſchöne, bunte Färbung iſt ſie jedoch einer unſerer ſchönſten Vögel. (Fortſetzung folgt).

Die Bewerthung der Kanarienvögel auf den Ausſtellungen.

Von R. Groſſe.

(Fortſetzung).

Aufklärung beanſpruchten ſchon damals die ausſtellenden Züchter und zwar belehrende Aufklärung über die Leiſtungen ihrer Sänger, damit ſie durch das Urtheil der richtenden Herren in die Lage verſetzt würden, verbeſſernd vorzugehen, und namentlich die jüngeren und zum Theil auch die ſtrebſamſten Züchter ſind es noch jetzt, die beklagen, daß es ihnen trotz regſten Eifers nicht gelingt, auch einmal höhere Preiſe auf ihre ſelbſtgezüchteten Vögel zu bekommen. Daran iſt zum Theil in erſter Linie das unverſtändliche „Punktirſyſtem“ ſchuld. Wenn auch dieſe Züchter in den Vereinsſitzungen reichliche Aufklärung über gute und verwerfliche Strofen im Kanarienvogellied bekommen, ſo erhalten ſie durch das jetzige Bewerthungsverfahren doch weder die Gewißheit, daß die in den Vereinsverſammlungen erworbenen wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe richtig verwerthet werden, noch auch werden ihnen Mittel und Wege angegeben, durch welche und auf welchen ſie zu dem erhofften Ziel gelangen können. Daß es den Züchtern nicht darum zu thun geweſen iſt und wol heute noch nicht iſt, den Werth des Preisliedes durch Zahlen feſtgeſtellt zu ſehen, dafür liefert uns der ebenfalls i. J. 1888 erfolgte Ausſpruch eines Vorkämpfers zum Beſſern den Beweis:

> „Das Punktirſyſtem erſcheint nicht nothwendig und mit den Prädikaten ſehr gut, angenehm und annehmbar kommt man vollſtändig aus. Das von einem Preisrichter zu unterſchreibende Protokoll über die Prämirungsreſultate müßte während der Ausſtellung event. in Abſchrift, zu Jedermanns Einſicht offen liegen. Sodann wäre jedem Ausſteller das Reſultat bezüglich ſeiner Vögel ſofort unter Benutzung von Formularen ſchriftlich mitzutheilen“.

Ich muß hier gleich einfügen, daß ſpäter, als auf Grund dieſer laut gewordenen Unzufriedenheiten mit dem „Punktirſyſtem“ der Vorſchlag gemacht wurde, die einzelnen Strofen des Lieds durch „Zenſuren“ zu bewerthen, es von einzelnen Preisrichtern als unmöglich hingeſtellt wurde, zur Feſtſtellung von Preiſen „Zenſuren“ anzuwenden. Aber ſchon im Jahr 1884 ſagte ein bekannter und viel begehrter Preisrichter gelegentlich des Vorſchlags zu einer vierklaſſigen Prämirung:

> „Die Prämirung iſt eine Zenſirung der Geſammtleiſtung eines Vogels . . . . .“

Es wird alſo zugegeben, daß die Geſammtleiſtung eines Vogels nach „Zenſuren“ beurtheilt werden kann und ſelbſtverſtändlich iſt, daß bei Feſtſetzung der Preiſe an Stelle dieſer Zenſuren Zahlen (oder ſagen wir Punkte) geſetzt werden. Was aber bei der Geſammtleiſtung des Vogels angängig iſt, das iſt auch bei den Einzelſtrofen möglich. Doch darüber ſpäter. In den auf das Jahr 1888 folgenden vier Jahren nun ruhte der Kampf gegen das Bewerthungsverfahren nach Punkten und während derſelbe vorher ſcharf geführt wurde, traten bis 1892 nur vereinzelte Stimmen für eine Verbeſſerung ein. Man ſoll aber nicht glauben, daß im Lauf dieſer Zeit das „Punktirſyſtem“ nun allgemein beliebt geworden und daß es als vollkommen anerkannt worden wäre. Wer Gelgenheit gehabt hat, während der genannten Zeit Ausſtellungen zu beſuchen oder in Vereinsverſammlungen zugegen zu ſein, in denen über die Bewerthung des Vogellieds geſprochen wurde, dem wird nicht entgangen ſein, daß man ebenſowenig jetzt mit dieſer Bewerthung zufrieden war, wie vorher. Es wurden jedoch Verbeſſerungsvorſchläge nicht gemacht, die Preisrichter hielten an dieſer Art, die Vögel zu bewerthen, feſt und die Vereine nahmen ſich der Sache nicht ernſtlich an; die Folge davon war, daß man ſich geduldig in das Unvermeidliche fügte.

In der zweiten Hälfte des Jahrs 1892 wurden die Erörterungen in den zuſtändigen Fachzeitſchriften wieder lebhafter und hierzu haben wol nicht in letzter Linie die Umſtände beigetragen, daß dieſelben Vögel auf verſchiedenen Ausſtellungen auch verſchiedene Preiſe davontrugen. Das gab zu denken und wenn man dieſe Verſchiedenheit in der Bewerthung auch nicht gerade auf die Art und Weiſe derſelben zurückführen wollte (dazu war man wol zu vorſichtig, denn vorläufig war kein anderer Plan da, nach welchem die Preisrichter auf den Ausſtellungen verfahren konnten), ſo ſtellte man doch den Grundſatz auf, daß die Bewerthung des Geſangs nur dann wirklichen Werth haben könne, wenn die Richter überall von denſelben, alſo gleichen Geſichtspunkten ausgingen. Hierdurch wurde gewiſſermaßen der Gefühlsduſelei der Preisrichter inſofern die Spitze abgeſchnitten, als ihnen das Recht genommen wurde, nach der bisweilen ſtark hervortretenden Voreingenommenheit für beſtimmte Geſangsſtrofen ihr Urtheil abzugeben. Es hatte bis dahin thatſächlich Preisrichter gegeben, die denjenigen Vögeln nur Preiſe zuerkannten, die ihnen beliebte Geſangsſtücke zu Gehör brachten, andernfalls wurden die Sänger niedrig bewerthet oder ſie gingen gänzlich ohne Preiſe aus. Auf die jedesmalige Geſchmacksrichtung der ausſtellenden Züchter wurde wenig, meiſt auch garnicht Rückſicht genommen. Es wird um dieſe Zeit auch das Bedürfniß der Bewerthung der einzelnen Strofen des Kanarienvogellieds inſofern anerkannt und hervorgehoben, als die um das Jahr 1880 vom Leipziger Verein aufgeſtellte „Skala“ als eine erfreuliche Errungenſchaft bezeichnet wird, die den Geſang zergliedert und die einzelnen Theile beurtheilt. Gelegentlich eines gemachten Vorſchlags, bei Veranſtaltung von Ausſtellungen inſofern auch auf die weniger geſangverſtändigen Liebhaber Rückſicht zu nehmen, als neben der Abtheilung von Zuchtvögeln auch eine Geſangsklaſſe einzurichten ſei, in der die Preisrichter weniger ſtreng vorgehen ſollten, wird ausdrücklich darauf hingewieſen, daß in der Zuchtklaſſe der Geſang des Vogels zergliedert und jede Strofe für ſich beachtet und bewerthet werden müſſe. Die Geſangsklaſſe iſt nicht allgemein zur Durchführung gelangt, obwol ſie, wie verſchiedene Vereine, die ſie eingerichtet haben, behaupten, ein hübſches Zugmittel für die Ausſtellungen bietet, es iſt alſo nur die Zuchtklaſſe geblieben, mithin beſteht nach dieſen Erörterungen die Zergliederung des Geſangs und die Einzelbewerthung der Strofen als Erforderniß für dieſe, als einzige auf den Ausſtellungen, fort und, um einen weitern Schluß aus dieſen Auseinanderſetzungen zu ziehen, iſt die Geſammtbewerthung des Vogellieds für den Züchter nicht zweckentſprechend. Wenn auf der einen Seite auch der Befürchtung Raum gegeben wird, daß durch die Einzelbewerthung der Strofen das ſachliche Urtheil der Preisrichter inſofern einer Gefahr ausgeſetzt ſei, als beſtimmte werthvolle Theile des Lieds (vielleicht dem Richter beſonders angenehme) hervorragend bewerthet würden auf Koſten der Geſammtleiſtung des Vogels (eine Befürchtung, die ich nicht zu theilen vermag) und daß einſeitige Vögel hierbei beſſer wegkämen (ich wüßte nicht, inwiefern), ſo wird auf der andern Seite doch wieder zugegeben, daß gerade dieſe einſeitigen Vögel für den Züchter recht werthvoll ſein können. Hieraus wäre alſo zu folgern, daß die Einzelbewerthung der Geſangsſtrofen für den Züchter entſchieden mehr Vortheile als Nachtheile ergeben würde und mithin würde ſie zu empfehlen ſein. (Fortſetzung folgt).

Briefliche
Mittheilungen.

... Von meinen Sängern habe ich z. Z. großen Genuß; es ſingen Schamadroſſel, Spottdroſſel, Steindroſſel, Singdroſſel, Schwarzamſel, Nachtigal, Schwarzkopf, Rothkehlchen, Sonnenvögel, Hüttenſänger u. a. Hermann Caspari.

... Am 22. Januar ſangen hier die Amſeln bis nachmittags gegen 5 Uhr; ich ſelbſt hörte vier Stück und am 24. Januar bei klarer Sonne und 8° R. Wärme einen Finken im Garten ſchirpen und halblaut ſchlagen. Karl Kullmann.



Breslau. Der Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht in Breslau hielt ſeine ſiebente Ordentliche Vereins-Verſammlung am 7. November 1898 ab. Außer 36 Mitgliedern waren auch noch eine Anzahl Gäſte erſchienen. Der Vorſitzende eröffnet den Abend mit dem Bekanntgeben verſchiedener zur Anſicht eingegangener Bücher und Schriften. Auf Verlangen hatte der Fabrikant der neuen deutſchen Reichsringe für Geflügel, Herr Hentſchel, Berlin, ſolche nebſt Preisliſte eingeſandt. Ein beſonderes Intereſſe für dieſelben war indeß nicht zu bemerken. Auch war zur Stelle der dem Verein auf der Beuthener Ausſtellung im Frühjahr 1898 zuerkannte Oettel-Wanderpreis, ein ſilberner Pokal, den der Verein aus Pietät infolge Vorſtandsbeſchluß hatte renoviren laſſen. Es wurde ferner von Herrn Schällmann dem Verein die Mittheilung gemacht, daß er den für die Ueberſchwemmten in Schleſien ſeiner Zeit ausgeworfenen Betrag von 50 Mark dem Schuhmachermeiſter Scheigert, den er nach genauen Erkundigungen als den Bedürftigſten herausgefunden hätte, übergeben habe. Nunmehr gelangt Punkt 2 zur Erledigung. Ein Antrag des Herrn Fiſcher lautet: 100 Mark für das in Görlitz zu errichtende Oettel-Denkmal zu bewilligen. Dagegen wurde aber vonſeiten der Vogelliebhaber Wiederſpruch erhoben, welche dieſe Angelegenheit gleich einer frühern behandelt wiſſen wollten. Seiner Zeit wären für den einen verdienſtvollen Ornithologen nur 10 Mark bewilligt worden. Herr Stadtrath Klettke ſtellt den Antrag, die ganze Angelegenheit dem Vorſtand zu überlaſſen, zu welchem er das Vertrauen habe, daß er nach beſtem Gewiſſen im Intereſſe des Vereins handeln werde; der Antrag wird angenommen. Herr Fiſcher bittet die Verſammlung, die Befugniſſe des Vorſtands für dieſen einen Punkt zu erweitern. Auch hiergegen hat Niemand etwas einzuwenden, ſodaß zu Punkt 3 der Tages-Ordnung, dem Vortrag des Herrn Dr. med. Königsberger über: „Vogelſchutz und -Liebhaberei“ übergegangen werden kann.

Der Vortragende glaubt, daß die Mahnung: „Schützet die Vögel“ allen Menſchen nicht oft genug an's Herz gelegt werden kann, weshalb er gerade dieſes Thema, obwol in Liebhaberkreiſen ſchon oft behandelt, zum Gegenſtand des Abends erwählt habe. Anfangs ſpricht der Herr Redner über die Nützlichkeit der Vögel im Haushalt der Natur, ſodann über den Maſſenmord der gefiederten Sänger in den ſüdlichen Ländern — beſonders in Italien — in welche und durch welche die Vögel auf ihren Herbſtwanderungen zögen. Die verſchiedenen Fangarten werden eingehend geſchildert und aus den angeführten Zahlen konnte man erſehen, welche Unmaſſen von Singvögeln alljährlich ihr Leben laſſen müſſen, um als Leckerbiſſen verſpeiſt zu werden. Zwar ſeien mit der italieniſchen Regierung Vogelſchutzgeſetze vereinbart worden, doch nützten dieſelben ſo gut wie garnichts, weil die dortige Regierung zu nachſichtig ſei, um ihren Beſtimmungen Nachdruck zu verſchaffen. Wir ſelbſt aber ſeien auch nicht unſchuldig. Den aus dem hohen Norden zu uns kommenden Vögeln, den verſchiedenen Droſſelarten, ſtellten wir in geſetzlich erlaubter Zeit Schlingen, in denen ſich auch Tauſende unſerer heimiſchen Sänger erwürgten. Das Neſterausnehmen zum Zweck des Verſpeiſens gilt überall als ein Zeichen unedler Geſinnung; dennoch ſei es überall geſtattet, die Eier der Kibitze, eines ſehr nützlichen Vogels, feilzuhalten. Hier wäre ein ſtrenges Verbot am Platze. Der Herr Vortragende kommt jetzt auf die von in ſüdlichen Ländern wohnenden Spekulanten betriebene Ausrottung unſerer Wachtel zu ſprechen. Bis zwei Millionen dieſer nützlichen Vögel würden jährlich gefangen, um nach London gebracht und dort gemäſtet und geſpeiſt zu werden. Um dieſem grauſamen Vorgehen zu ſteuern, hätte anfangs die franzöſiſche, ſpäter auch die deutſche Regierung den Transport lebender Wachteln auf ihren Bahnen verboten. Leider hätte Frankreich ſein Verbot wieder aufgehoben, ſodaß, wenn nicht Abhilfe geſchaffen würde, der ſo äußerſt nützliche Vogel dem völligen Verſchwinden preisgegeben ſei. Nicht weniger wie der Fang der Vögel zu Speiſezwecken ſei die Vernichtung derſelben zu Modezwecken mit allen erdenklichen Mitteln zu bekämpfen. Hier müßte ein Jeder ſeine Autorität in die Wagſchale werfen und in Bekanntenkreiſen die Damen auf das Grauſame, Unäſthetiſche und Schädliche ihres Beginnens aufmerkſam machen. Millionen gerade der ſchönſten und zierlichſten Vögelchen fielen der Mode zum Opfer, ganze Geſchlechter würden ausgerottet. Jeder deutſchen Frau müßte es ein Ekel und Abſcheu ſein, mit einem Vogelbalg auf dem Hut herumzulaufen. Auch auf herumlaufende, halb verwilderte Katzen ſollte Jedermann Acht geben. Dieſe zerſtörten jährlich Tauſende von Neſtern mitſammt der Brut. Unbarmherzig ſollte man dieſe Räuber töten. Nunmehr geht der Herr Vortragende zu dem zweiten Theil ſeines Themas, der „Liebhaberei“, über. Im Gegenſatz zu den Anſichten der Thierſchutzvereine vertheidigt er das Halten der Stubenvögel vonſeiten vernünftiger Liebhaber auf's Wärmſte. Es ſei keineswegs grauſam, einem jungen Männchen die Freiheit zu rauben, um es mit aller Liebe zu hegen und zu pflegen. Alte Männchen und Weibchen ließen vernünftige Vogelſteller ſtets fliegen. Der Schreck des Gefangenwerdens dürfte für den Vogel freilich kein geringer ſein, aber als Erſatz dafür hätten wir ihn für immer dem ſchweren Kampf um's Daſein, den Unbilden der Witterung entriſſen. Daß der Vogel gar bald die „goldene Freiheit“ vergeſſen und ſich bald an ſeinen treuen Pfleger gewöhnt habe, beweiſe ſein Geſang, den er in der Gefangenſchaft faſt noch eifriger als im Wald ertönen laſſe. Die meiſten Vogelwirthe ſeien auch wahre Vogelfreunde, die ſtets in Bekanntenkreiſen das Los der Gefangenen durch Belehrung über richtige Pflege u. a. zu erleichtern ſuchten. Sie gerade ſeien es, welche die freilebenden Vögel am meiſten ſchützen. Mit aller Gewißheit ſei erwieſen, daß die Vögel im Beſitz mancher Vogelwirthe ein höheres Alter erreichten, als ſie es in der Freiheit jemals erlangt haben würden. Reicher Beifall belohnte den Vortragenden, an deſſen Worte ſich eine kurze Debatte anſchloß. Eine Verloſung, zu welcher Herr Scholtz in dankenswerther Weiſe einen rothen Kardinal dem Verein zur Verfügung ſtellte, bildete den Schluß der Sitzung. **Lindner.**

Anfragen u. Auskunft

Herrn P. Mantes: Bieten Sie Ihrem Dompfaff außer Rübſamen, etwas Mohn- und Kanarienſamen auch einige Körner angequetſchten Hanf, etwas Grünkraut (Vogelmiere oder Doldenrieſche) oder Obſt: hin und wieder ein Apfelſchnittchen, eine Ebereſchen- oder Wachholderbere, ein wenig erweichtes Eierbrot, auch einen Theelöffel voll angequellte Ameiſenpuppen, mit Möre und altbacknem Weißbrot übertrieben, zur Leckerei noch friſche ſchwellende Baumknoſpen und Tannengrün. Dann wird er hoffentlich in die Mauſer kommen und ſich wieder gut befiedern. Bieten Sie ihm übrigens auch Badewaſſer.

Herrn Reg.-Sup. Drieſt: Schon oft habe ich hier davor gewarnt, tote Vögel mangelhaft verpackt mir zur Unterſuchung zu überſenden. Das iſt eine nutzloſe Zeit- und Porto-Verſchwendung. Ihr japaniſches Mövchen kam ſo zerquetſcht an, daß eine Unterſuchung nicht möglich war. Nach den Krankheitserſcheinungen der Ihnen geſtorbenen ſechs Vögel vermag ich zu ſchließen, daß dieſelben an einer Epidemie zugrunde gegangen ſind und zwar an Kalkdurchfall.

Herrn Muetlye: 1. Wenn Sie eine ſo verſchiedenartige Geſellſchaft von einheimiſchen und fremdländiſchen Vögeln und Kanarien im Flugkäfig halten, ſo geben Sie nur ſorgfältig Acht, ob die Vögel verträglich miteinander ſind, und fangen Sie jeden Störenfried ſofort heraus. Natürlich müſſen Sie ſehr mannigfaltiges Futter, jede Sämerei möglichſt in einem beſondern Napf, bieten und auch Weichfutter für die Rothkehlchen, an dem ſich hoffentlich dieſer oder jener Finkenvogel nicht zu fett freſſen wird. Geben Sie alſo: Hirſe, Kanarienſamen, Rübſamen, wenig Hanf, geſchälten Hafer, Mohnſamen; in einem Näpfchen zuſammen auch je ein wenig Waldbaum- und Nadelholzſämereien, Kletten- und Diſtelſamen, Lein- und Salatſamen. Dabei dürfen Sie es nicht an Grünkraut: Vogelmiere, Doldenrieſche, Tannengrün, ſchwellenden Baumknoſpen, Nadelholzſchößlingen, Tannen- und Kiefernzapfen, ferner an etwas Obſt: Apfel, Vogel- oder Wachholderberen, fehlen laſſen. Als Miſchfutter bieten Sie angequellte Ameiſenpuppen, überrieben mit Möre und altbacknem Weißbrot, und dazu Mehlwürmer und andere kleine lebende Kerbthiere. 2. Schließlich möchten Sie noch wiſſen, „in welcher Quantität“ Sie die verſchiedenen Futtermittel geben ſollen. Dieſe Frage zu beantworten iſt mir doch unmöglich. Sie müſſen eben täglich zuſehen, wieviel die Vögel von jeder Sämerei gefreſſen haben, die Hülſen von den zurückgebliebenen Körnern abpuſten und nach Bedarf nachfüllen. Die Ueberreſte von Obſt, Grünkraut und dem Weichfutter müſſen täglich entfernt und letzteres muß an jedem Morgen friſch bereitet werden.

Briefwechſel

Herrn L. in B. Ein Vortrag über Haus(Raſſe-)tauben würde allerdings unſere Leſer nicht intereſſiren.

Zu unſerm Bilde.

Einer der abſonderlichſten Vögel, die wir in den zoologiſchen Gärten vor uns ſehen, iſt der braſiliſche **Motmot** (Prionites brasiliensis, *Lth.*). Er gehört zur Familie Sägeraken, die den Blauraken verwandt ſind; ihr charakteriſtiſches Merkmal iſt der Umſtand, daß die Schneiden des Schnabels ſägeartig gezähnelt ſind. Der Motmot iſt dunkelgrasgrün, Stirn, Scheitelfleck, Zügel und Ohrgegend ſchwarz, erſtere vorder und hinterſeits breit ſchön blau umgrenzt; unterhalb des ſchwarzen Ohrflecks ein ſchmaler blauer Streif; Hals nebſt Kehle, Bruſt und Bauch roſtgelb; im Nacken ein roſtbrauner Fleck; Handſchwingen am Vorderrand grünlichblau; Flügel unterſeits ſchwarz; auf der Bruſtmitte zwei verlängerte ſchwarze, ſchmal himmelblau außengeſäumte Federn; Schwanz aus zwölf grünen, breit bläulich gerandeten, unterſeits ſchwarzen Federn beſtehend, die beiden äußeren jederſeits mehr zugeſpitzt, die beiden mittelſten am längſten, mit nacktem Schaft und blauer, ſchwarz gerandeter, ſpatelförmiger Fahne am Ende; Augen rothbraun; Schnabel ſchwarz; Beine hornbraungrau. Seine Heimat ſind die Waldgebiete von Nordbraſilien und Guiana. Die merkwürdige Form der beiden mittelſten Schwanzfedern, welche unſere Abbildung gut zur Darſtellung bringt, hat den Reiſenden Veranlaſſung zu wunderbaren Erzählungen gegeben. So berichtete Schomburgk: „Zum Neſtbau ſucht ſich der Motmot eine runde oder eiförmige Vertiefung an der Seite eines Hügels oder einer andern Erhöhung aus. Männchen und Weibchen wechſeln regelmäßig im Brüten ab; aber ſo gemeſſen und ernſt auch der Vogel in allen ſeinen Bewegungen iſt, ſo ſcheint ihm die Zeit auf dem Neſt doch ziemlich lang zu werden; denn kaum hat er 3 bis 4 Minuten ruhig auf den Eiern geſeſſen, ſo dreht er ſich auch ſchon mehreremal im Kreiſe darauf herum, kommt dann wieder zeitweilig zur Ruhe und beginnt ſein Herumdrehen von neuem. Dadurch kommen aber die Faſern der beiden langen Schwanzfedern in Unordnung oder werden an der Kante der Vertiefung abgerieben. Kaum iſt der ablöſende Gatte herbeigeflogen, ſo eilt der erlöſte, die Glätte ſeines Gefieders über alles liebende Vogel auf den nächſten Aſt, um die verwirrten Faſern wieder in Ordnung zu bringen. Dies aber gelingt ihm meiſtens nur durch gänzliche Vernichtung der Faſern ſelbſt. Hierdurch entſteht jene Lücke, welche zu ſo vielen Vermuthungen Anlaß gegeben hat und welche jedesmal je nach ihrer Länge das mehr oder minder vorgeſchrittene Alter des Vogels bekundet. Bei ganz alten Vögeln erſtreckt ſich dieſe kahle Stelle des Schafts ſelbſt bis zur Spitze, während der junge, jährige Vogel, der noch nicht gebrütet hat, durchgängig eine unbeſchädigte und ununterbrochene Fahne zeigt“. Prinz Wied nahm an, daß der häufige Aufenthalt des Motmot am Erdboden die Urſache der Abnutzung der Federn ſei. Im Gegenſatz zu dieſen Berichten iſt indeſſen durch Beobachtungen im Berliner zoologiſchen Garten feſtgeſtellt worden, daß, nachdem der Motmot die Mauſer durchgemacht, die Schwanzfedern bereits in der eigenthümlichen Form hervorwachſen, alſo weder abgebiſſen, noch abgeſtoßen werden. Dies beſchrieb bereits im Jahr 1885 Herr Arminius Bau (in dieſer Zeitſchrift) und neuerdings hat es Meuſel beſtätigt: „Die mittleren Schwanzfedern kommen ſogleich als Fahnenfedern hervor, mit kurzem, rauhem Kiel, ähnlich wie beim Fahnendrongo“. Als Käfigvogel iſt der Motmot wenig intereſſant, ihn empfiehlt lediglich ſein ſchönes Gefieder. Herr Meuſel theilte uns mit: „Es iſt ein ziemlich träger, fauler Vogel, der ſtundenlang auf einer Stelle ſitzen kann, ohne ſich zu bewegen. Erblickt er einen Wurm oder Käfer, ſo fliegt er ſehr ſchnell auf den erſten Aſt, bewegt den Schwanz zwei- bis dreimal quer hin und her und dann nur einmal von oben nach unten. Dieſer Punkt gab ſchon zu Brehm's Zeit Anlaß zu Streitigkeiten. Es hatten in unſerm Garten bereits zwei Vögel dieſe Schwanzbewegungen gemacht, aber Brehm blieb bei der Behauptung, nicht alle Motmots führten ſie aus. Der jetzige Vogel macht ſie nun wieder, ebenſo wie die erſten; er nickt zuerſt mit dem Kopf, ſchlägt dann quer mit dem Schwanz und ſchließlich erſt, wie eine Stelze, von oben nach unten. Als Futter erhält er Würmer, Käfer, Schaben, etwas Fleiſch, auch Ei, letztres aber ſelten. Die Würmer oder Käfer haut er, wie der Eisvogel, einmal rechts und einmal links auf. Von dem Leberfutter mit Ei und Fleiſch nimmt er nur ſehr wenig. Viel Freude kann er einem Liebhaber nicht machen“. Auf dem Vogelmarkt gehört der Motmot zu den größten Seltenheiten. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [262]

Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt). Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos).

Vögel.

Ein **gutſingender**

Sprosser oder Nachtigal

wird zu **kaufen** geſucht. Um Anſtellung mit **Preisangabe** wird erſucht in [263] **Güſtrow,** Meckl.-Schwerin, Bleicherſtr. 9.

Große Stiglitz-

Männchen Dtzd. 12 ℳ, St. 1,60 ℳ, **rothe Hänflinge** Dtzd. 12 ℳ, St. 1,60 ℳ, **Zeiſige** Dtzd. 11 ℳ, St. 1,30 ℳ, **Kreuzſchnäbel** St. 1,20 ℳ, **rothe Dompfaffen** St. 2,50 ℳ, **Buchfinken** Dtzd. 9 ℳ, St. 1,30 ℳ. Unter Gar. lebender Ankunft. **Gebr. Haas,** [264] **Hoffſtetten** b. Gemünden a. M.

Wellenſittiche 98er, eig. Zucht i. Freien, widerſtandsfäh. als imp., per Zuchtp. ℳ 7. Bei Anfr. Retourm. **Suche** 2 od. 1 **Pflaumenkopfſitt.**-Männchen. [265]
G. K. Köhler, Bensheim.

Die beſten Waldvögel.

Hochfeine Singdroſſeln à 7 ℳ, Amſel 6,50 ℳ, Schwarzkopf, prima Sänger, 7 ℳ, Lerchen 2 ℳ, 1 zahmer Star 3 ℳ, 1 halbſchwarzer Dompfaff mit weißen Schwungfedern, 1 Flügel etwas hängend, 3 ℳ, dazu gepartes Weibch. 1 ℳ; dieſe Vögel ſind 1 Jahr im Beſitz und tadellos; ferner Körnerfreſſer aller Arten, nur eingewöhnte Vögel. Viele Dankſchreiben zu Dienſten. Unter jeder Garantie. [266]

M. Bernauer,
Freiburg i. Baden, Schwarzwaldſtr. 71.

Graupapagei,

ſpricht 67 Worte deutlich wie ein Menſch, pfeift wunderſchön, 2½ Jahr alt, ſpricht den ganzen Tag fleißig, ſchreit abſolut nie, ganz edles, zahmes Thier, bin leider gezwungen, denſelben verkaufen zu müſſen, feſter Preis 75 ℳ, genaues Sprachverzeichniß, Behandlung ꝛc. gegen Marke. [267] **Otto Winter, Gelſenkirchen,** Friedrichſtr. 50.

Verk.: 2,0 Hänflinge, 2,0 Stiglitze, 1,0 Kreuzſchnabel, 1,0 Rothkehlchen à 1,50 ℳ, 2,0 Zeiſige à 1 ℳ, 1 P. Sumpfm., 0,1 Gimpel à 75 ₰, 1,0 Amſel 3,50 ℳ, ſchön i. Gef., zahm u. gute Säng., tauſche a. Kanar. od. Sproſſer. [268] **Carius, Croſſen** (Elſter).

Verkaufe, weil zu viel:

1,1 **Dompfaff** 3 ℳ, 1,0 **Erlenzeiſig** 1,50 ℳ, 1,0 **Alpenſtiglitz,** prachtvoll im Gefieder, 2,50 ℳ, 1,0 **Wiedehopf,** fingerzahm, 4 ℳ, 1,0 **Kalanderlerche** 7 ℳ [269] **Baron, Breslau 8.**

Geſucht: ♀ rothk. Pap.-Am., ♂ u. ♀ blauköpf. dito. [270] **Blume,** P., **Großeutersdorf** (Kahla).

Kaufen ſtets **Stiglitze, Hänflinge, Zeiſige** u. **Dompfaffen** in größeren Poſten bei guter Bezahlung. **Gebr. Haas,** [271] **Hoffſtetten** b. Gemünden a. M.

Gebe ab: 2 Kanarienhähne à 20 ℳ. [272] **H. Brandt jun.,** Stettin, Falkenwalderſtr. 15.

Kaufe einen **Raben.** [273] **W. Koppe, Berlin,** Wienerſtr. 25 II.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe noch **8 St. Harzer Kanarien-Zuchtweibchen** und **3 Hähne** zu verkaufen. **Wilhelm Maushaacke,** Schuhm., **Crottorf,** Prov. Sachſen. [274]

Schwarzkopf

m. echtem Doppelüberſchlag u. gute **Orpheusgrasmücke** zu kaufen geſucht. Offerten unter **A. B.** an die Exped. d. Bl. [275]

Harzer Kanarien-Edelroller.

Meine Kanarien gehen hervorragend in ſchönen gebogenen, auch ſchockelnden Hohlrollen, tiefen weichen Knorren, Hohlklingeln, Klingeln, Flöten u. Pfeifen u. ſ. w., Tag- und Lichtſchläger, gebe ab zu 8, 10, 12, 15, 20, 25 ℳ, übernehme jede Garanti für Werth, Geſchlecht, lebende Ankunft, 14 Tage Probezeit, nicht gefallende tauſche um oder zahle Betrag zurück. Vögel mit Geſangsfehler 5—7 ℳ, Wbch. v. 1,50 ℳ an. [276 **D. Schmidt,** Thale a. Harz, Steinbruchsweg 3.

1 hochf. reinſchall. echten **Reitzugfink** gibt ab **Ad. Markert,** Scheibenberg, S. [277

Zeiſige, Kreuzſchnäbel

je à St. 1,50 ℳ, Wbch. z. Hälfte, Hohlroller à 8, 10 u. 12 ℳ, Wbch. 2 ℳ [278] **Zool. Handl. Ornis, Wernigerode, Harz.**

Feinſte

Edelroller!

mit den ſchönſten Touren, zart, tief und lang, noch ein Poſten ff. Frühbrut-Heckvögel, Dutz. 90 ℳ, Probevogel 10 ℳ, 14 Tage Probe gegen Nachnahme. [279]
A. H. Pütsch, Spezial-Züchterei,
Schönhauſen a. Elbe.

Meine ſelbſtgezüchteten ff.

Kanarienſänger

verſende vom 1. Novbr. ab, unter Garantie des Werthes und lebender Ankunft, zu 9, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ à St. [280]
Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, 146.
NB. Bei Anfrage Rückporto erbeten.

Hochfeine

Harz. Edelroller

(Stamm Trute),

welche vorzüglich in tief. gebog. u. geraden Hohlrollen, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Klingel, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 6, 8, 10, 12 u. 15 ℳ, Dtz. 60, 72, 84 und 96 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, verſende gegen Nachn. 6 Tage Probezeit. Nichtgefallendes tauſche um, ev. Betrag zurück. [281]
Herm. Voigt, Thale a. Harz.

Harzer Kanarien-

Roller mit Nachtigaltouren zu 6, 8 ℳ, edle Roller v. 10 ℳ an, **Harzer Vogelkäfige** u. Utenſilien, Geflügelkäfige, Poſtverſandt-Kiſten u. ſ. w. Preisl. frei. [282]
Ad. Janson, Lauterberg, Harz.

Gebe ab: 1 P. **Gürtelgrasfinken.** **K. Schanz,** [283] **Leipzig-Plagwitz,** Ernſt Meyſtr. 22.

Harzer Kanarien,

ſehr gute Sänger, werden wegen Aufgabe der Zucht zu herabgeſetzten Preiſen abgegeben. **W. Böcker,** Kontroleur, **Wetzlar.** [28

F. Rejsek, Hamburg, Peterstr. 28

Papageien-Grosshandlung

Specialität: Papageien u. Papageienkäfige



offerirt reell und billigst: Junge, schöne **Amazonen-Papageien,** noch nicht sprech., à Stück nur 15 Mk., solche anf. zu sprech. 18 u. 20 Mk., sehr viel sprechend u. singend schon von 30 Mk. an. Junge **Graupapageien,** ½ Jahr schon hier, schön flöt. u. zu sprech. anf., recht kräftig u. gesund u. lebensfähig, Stück nur 25 Mk. **Graupapageien,** schon sehr viel, wie Menschen sprechend, schon von 50 Mk. an. **Gelbnacken-Amazonen,** anfang. sprech., 25—30 Mk., sprech. 35—50 Mk. **Brillenamazonen,** äusserst zahm u. schon sprech., 18 Mk. **Wellensittiche,** frisch import., Par 4 Mk., dito schon eingewöhnte Zuchtpare Par 6 Mk. **Grauköpfchen** (Inseparables) Par 8 Mk. **Kl. Alexandersittiche** St. 5 Mk., Par 8 Mk.

Einige besonders schöne und hochamüsante, zahme **Affen** Stück 15, 18, 20 Mk. Paviane nur 30 Mk.

Versandt nach überall und jederzeit, gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages, unter Garantie lebender und gesunder Ankunft. [285]

Alpenſtigl., rothe Hänfl. à Dtz. 12 ℳ, gelbe Zeiſige à 10 ℳ, Dompfaff. à St. 2,50 ℳ. Alle Sorten Wildvögel billigſt. Prachtfinken, Sittiche, Sonnenvögel ꝛc. billigſt. Dankſchreiben z. Dienſten. [286]
W. Wolf, Gefell i. Vogtl.

Verkaufe:

1,1 **Aurora-Aſtrilde** 13 ℳ, 1,1 **rothe Amar.** 4 ℳ, tadell. geſunde Pare, zuſ. 16 ℳ. [287]
R. Sinnemann, Braunſchweig.

Anzeigen.



No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.—
No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50

Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.—**

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige für Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc. mit sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen franco und **gratis** zu Diensten. [288]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Ein **großer, neuer**

Vogelkäfig,

ganz aus Metall (verzinnter Blechrohrkäfig) iſt, weil doppelt geſchenkt erhalten, preiswerth zu verkaufen. Derſelbe iſt ca. 100 cm hoch, ca. 100 cm lang und 35 cm tief, mit fein lackirtem, profilirtem Kaſten und ſtarkem Doppelboden verſehen und an den 4 Seiten mit 12 cm hohen gemuſterten Glaswänden umgeben. Der Käfig, welcher eine Draht weite von 12 mm hat, eignet ſich als Heck- u. Geſellſchaftskäfig. Preis 35 ℳ billigſt. [289

Otto Nessler, Zſchopau, Sachſen.

Hochfeine prämirte

Harzer Edelroller

(Stamm Trute), welche vorzüglich in Hohlrolle, Knorre, Klingelrolle, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 8, 10, 12, 15, 20 ℳ. Zuchtweibchen 1,50 ℳ verſende gegen Nachn., bei achttägiger Probe. Nichtgefallende tauſche um, ev. Betrag zurück, gebe zwei St. Zuchtweibchen gratis bei. [290]

Wilh. Koye, Thale, Harz

Feinste Kanariensänger



mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [291]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.

Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

Verk. m. ſelbſt aufgezog. **Amſel,** Somm. u. Wint. ſehr fleißig ſing. (ev. auch d. Käfig). [292]

W. Weber, Leipzig, Waldſtr. 41.

Geſucht: Granataſtrilde, Buntaſtrilde, Wiener's Aſtrilde, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen.

F. Beedzler, [293]

20, Norton Folgate, **London** (England).

---

1 **Schamadroſſel,** großartig im Geſang u. Gefieder, ℳ 50, 1 **Singdroſſel** do. ℳ 10, 1 **ruſſ. Sproſſer** do. ℳ 10. Alle ganz zahm. [294]

1 **Meyer's Lexikon,** 18 Bde., neueſte Aufl., ganz neu, 1 **Brehm's Thierleben,** gr. Ausgabe nebſt Schöpfung der Thierwelt, noch in Lief., zuſ. nur ℳ 180.

R. Dischinger, Karlsruhe, Bad., Herrenſtr. 29.

1898 erhielt mein Stamm Harzer Kanarienvögel 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10–25 ℳ. u. Gar., 8 T. Pr.

Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [295

---

1 hellſchl. Nachtigal

12 ℳ, 1 **Trauerſtelze** 2 ℳ geg. Nachn. Gar. leb. Ank. [296]

Jos. Ehrlich, Würzburg, Zellerſtr.

Harzer Kanarienvögel

(Trute'ſche Hohlroller),

Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. i. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel. Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis** und **franko.** Weibchen deſſelb. Stamms 2.50 ℳ [297]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

---

1 prima ſingende

Schamadroſſel,

tadellos befiedert, um den Spottpreis von 30 ℳ mit Verpackung zu verk. Näheres bei [298]

Aug. Amlung,

Ludwigshafen, Rhein, Kanalſtr. 70.

Verkaufe:

2 P. imp. **Wellenſittiche,** zuſ. 10 ℳ

Brummund, Cöslin, Schulſtr. 12.

[illegible] erſchien.

Vogelzucht-Buch,

Stubenvogelpflege und -Zucht
zum Vergnügen, zum Erwerb und
für wiſſenſchaftliche Zwecke.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Auflage, mit [illegible]
Preis Mk. 1.50, geb. Mk. 2.—.
Creutz'ſche Verlagsbuchhdlg.
in Magdeburg.

Für Beſitzer des

Handbuch

für

Vogelliebhaber

von **Dr. Karl Ruß**

in früheren Ausgaben ſtehen die dem Werke jetzt beigegebenen Illuſtrationen, beſtehend in

28 Vollbildern
fremdländiſcher Stubenvögel
(zu Band I), ſowie
25 Vollbildern
einheimiſcher Stubenvögel
(zu Band II)
für den Preis von je nur 1 Mark

durch jede Buchhandlung, ſowie in der unterzeichneten Verlagshandlung ſelbſt zu Dienſten.

Das **Illuſtrirte Handbuch** koſtet auch jetzt noch, wie bisher, für

Bd. I (Fremdl. Stubenv.) broch. 6.50, geb. 8 ℳ
„ II (Einh. Stubenv.) „ 6.—, „ 7.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.

Zeitſchrift für ***Elektrotechnik***
und ***Maschinenbau,*** Poſtzeitungs-liſte 8178a.
ſowie für ***Metall- und Montanindustrie.***

Abonnementspreis: **pro Monat 20 Pf.** durch jede Buchhandlung, bei der Poſt **60 Pf. für das Vierteljahr.**

Bereits erſchienene Nummern des Quartals werden koſtenlos nachgeliefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervorragendſten Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und berufen, unendlichen Nutzen zu ſtiften.

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik und dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montaninduſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt, Alles, was irgendwie für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elektrotechnik und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in fachwiſſenſchaftlicher, leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend **alle ſpeziellen Zweige** der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des **Auslandes** hat die Zeitſchrift **zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute als Mitarbeiter,** welche **von allen** neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem Gebiete der **Elektrotechnik und des Maſchinenbaues** ꝛc. ſofort Kenntnis geben und über alle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten. Jede Nummer der Zeitſchrift wird daher eine Reihe **elektrotechniſch-wiſſenſchaftlicher** und **maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel** aus der Feder erprobter Autoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten. Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl **kleiner Mitteilungen** aus dem Gebiete der **Elektrotechnik,** des **Maſchinenbaues** und der **Metall-** und **Montaninduſtrie** an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und allezeit wiſſen, welche neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die **Patentnachrichten,** die **von uns** ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den Leſern einen Überblick über die neuen Erfindungen ꝛc. zu geben. Der **techniſche Briefkaſten** erteilt über alle fachtechniſchen Fragen **Auskunft.** Dieſelben werden durch Fachmitarbeiter zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner **handelspolitiſche Leitartikel,** die energiſch für die Intereſſen der deutſchen Induſtrie eintreten. Unter dem Titel: **„Kleine Handelsinduſtrielle Mitteilungen“** wird alles dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt Metall- u. Montaninduſtrie Bezug hat. Ebenſo finden die **Submiſſionen, geſchäftlichen Mitteilungen** ꝛc. ꝛc. eine gebührende Stätte in unſerem Blatte. — Jeder Nummer iſt eine ***Unterhaltungsbeilage*** hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeitſchrift das inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt.

Nach alledem wird die **„Zeitſchrift für Elektrotechnik und Maſchinenbau, ſowie für Metall- und Montaninduſtrie“** ein **unentbehrliches Organ** nicht bloß für die **Beſitzer maſchineller** und **elektrotechniſcher Fabriken** und **Werkſtätten, Walz-** und **Hüttenwerke, Schloſſereien** und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie ꝛc., ſondern auch für alle **Ingenieure, Techniker** und **ſonſtigen techniſch Thätigen** ſein.

Probenummern koſtenlos und franko von der

Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechnik u. Maſchinenbau,
ſowie für Metall- und Montaninduſtrie, *Leipzig.*

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 7.

Beobachtungen auf einer Gebirgswanderung in Galizien, der Bukowina, Siebenbürgen und Rumänien (Fortſetzung).
Die Bewerthung der Kanarienvögel auf den Ausſtellungen (Fortſetzung).
Zur Eingewöhnung friſch eingeführter Graupapageien.
Kurze Geſchichte zweier Dompfaffen.
Brieſliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Mainz.
Anfragen und Auskunft.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen die ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Betone ausdrücklich, es kommen nur

geſunde, kräftige, akklimatiſirte

Exemplare zum Verſandt, unter Garantie lebender Ankunft, in ſorgfältig praktiſcher Verpackung. Bedienung ſtreng reell. Anfragen gegen Marke.

Mitchell's Loris, prachtvoll, Par	35 ℳ
Schuppenloris, „ „	38 „
Gebirgsloris, „ „	33 „
Citronen-Zeiſige Par	5,50 „
Gürtelgrasfinken, Zuchtpare	9,50 „
Papſtfinken (bzw. abgefiedert), Mch.	6 „
Haubenheherdroſſ., Mch., Ia Sg.,	12 „
Singſittiche, Männchen	15 „
Nandayſittiche in voller Pracht, P.	16 „
Pflaumenkopfſitt. i. voller Pr., P.	17 „
Goldſtirnſittiche Par	8,50 „
Chin. Nachtigalen, gutſchlag. Mch.	4 „
extra ausgeſ., pr. Doppelüberſchläger	5 „
do. Zuchtweibchen St.	1,50 „
Himmelbl. Hüttenſänger, Zuchtpare	9 „
Blumenauſittiche, lern. ſprech., St.	4,50 „
Chin. Zwergwachteln, reizende Zuchtp.	8 „
Calif. Schopfwachteln, Zuchtpar	15 „
Spitzſchw. Gürtelamand. Zuchtpare	16 „
Schamadroſſeln, prima Ia Säng., bei mir abgemauſerte Exemplare	33—36 „
Spottdroſſeln, prima Ia Sänger, St.	12 „
Kl. Alexanderſ., Mch., lern. ſprch., St.	5 „
Grauk. Zwergpap., P. 2,50 ℳ, 3 P.	6 „
5 Par	8,50 „
Import. Zebrafinken, Zuchtp.	5 „
Jap. Mövch., gelb- und braunbunt, P.	3 „
Indigofinken, Ia Sänger St.	4 „
Wellenſittiche, echt auſtraliſche, große, ſtarke, richt. Zuchtp., P. 6 ℳ, 3 P.	16,50 „

Junge, ſtarke **Wellenſittiche**, P.	4 ℳ
Wellenſittiche, ausgefärbte Zuchtpare	5 „
Schwefelg. Wellenſittiche, ſelt. ſchöne richtige alte Zuchtp.	26 „
Nymphenſittiche, import. Zuchtp.	10,50 „
Grüne Kardinäle, M., Ia Sänger,	13 „
do. Weibchen, St.	7 „
Amerik. Seidenſchwänze, Mch., St.	6,50 „
Braſil. Glanzſtare, Ia Sänger	5 „
Madagaskarweber, in Pracht, St.	4,50 „
Safranfinken (Goldkanarien) St.	4 „
do. Weibchen St.	2,50 „
Rothe Kardinäle, Ia Sänger, St.	8 „
do. Zuchtweibch., St.	5 „
Rothgeh. gr. Kardinäle, Männchen,	5 „
Dominik.-Kardinäle, Männchen	5 „
Schneeweiße Reisfinken, Zuchtp.	7,50 „
do. graue, prachtvoll, Par	2 „
Hartlaub-Zeiſige, Mch. 3 ℳ, P.	4,50 „
Etw. ſpr. Amazonen, Ia Ia	35—45 „
Graupapageien, garant. ſprech.,	30—50 „
Gutſprech. Graupapageien	60—150 „
Zebra- od. Sperbertäubch., Zuchtp.	4,50 „
Weiße Lachtauben, Zuchtpare	5 „
Gelbe do. „	2,50 „
Weiße Mäuſe, Zuchtpare	0,60 „
Kanarien, Ia tiefe Hohlroller	7—20 „
Dutzendweiſe zu 72, 84, 96 u.	120 „
Ia Hochedle Zuchtweibchen St.	1,50 „

In richtigen, kräftigen Zuchtparen: ☞

Schmetterlingsfinken 3 ℳ, **Broncemännchen** 2,50 ℳ, **Atlasfinken** 2 ℳ, **Aſtrilde** 2 ℳ, **kl. Elſterchen** 2 ℳ, **Muskatfinken** 2 ℳ, **Silberfaſänchen** 2 ℳ, **Bandfinken** 2 ℳ, **Helenafaſänchen** 2 ℳ, **Paradiswitwen** 3 ℳ, **Napoleonsweber** 2 ℳ, **Orangeweber** 2 ℳ, **Blutſchnabelweber** 2 ℳ, **Chineſerfinken** 1,50 ℳ, **rothe Tigerfinken** 2,50 ℳ. **Dieſe Senegalvögel**, gemiſcht nach meiner Wahl in reizendem Sortiment, 5 P. 9 ℳ, 10 P. 16 ℳ, 20 Par 30 ℳ. [299]

Georg Brühl, Vogel-Exporthaus, **Kötzſchenbroda b. Dresden.**

Käfige und Geräthſchaften.

Schädliche Inſekten im Obſt- u. Gartenbau werden am ſicherſten durch Meiſen vertilgt.

Niſtkäſten für Meiſen aus Rundholz Stück 35 ₰, 10 Stück 3 ℳ, 100 Stück 28 ℳ. [300] **Kempf, Neuſorg**, Fichtelgeb.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis. [301] **R. Schröter, Elingen-Grenizen.**

Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [302]

Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Ltr. 1 ℳ. Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112.**

☞ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämiirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Staatspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [303]

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämiirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [304]

Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [305]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in
praktiſcher
Anordnung,
großer Auswahl u. billigem Preis. [306]
☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜
Arthur Herrmann & Luther, Oschatz i. S.

☞ **Preisliſte über praktiſche**
Vogelkäfige
Aquarien, Terrarien ꝛc. (m. 100 Abb.)
Hochfeine beſt gereinigte
☞ **Vogelfutter** ☜
verſende gratis und franko. [307]
E. Göller, Köln a. Rh.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [308]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Ich bemerkte, daß die Singdroſſeln in den dortigen Forſten häufiger vorkommen, als bei uns in den Wäldern der Provinz Brandenburg; unter den Rothkehlchen gab es laute und vorzügliche Sänger, welche den beſten Geſangskenner mit ihren Trillern erfreuen konnten. Der Weg führte über den 1100 Meter hohen Berg Schumalow, der von kräftigen Fichtenſtämmen bewachſen war, vereinzelt auch von Weiden. Von Holzſchlägen und Haidebrachen hörte ich ſchon von weitem die Haidelerchen mit ihrem „Diblie, bidlie, friedl, friedl, friedl, arie, arie“. Dieſer Vogel kommt in den dortigen Gegenden häufig vor. Vereinzelt zeigte ſich die Ringdroſſel.

An der Südſeite des Berges ging es in vielen Windungen abwärts und ich erreichte das ſchon von weitem ſichtbare, unten im Thal liegende Dorf Jankopani und nach mehreren Stunden Dorna Watra. Nach längrer Wanderung erreichte ich Wiboj-Trappe; dieſer Ort beſteht nur aus drei Häuſern: Maute, Poſt und einer ganz erbärmlichen „Kneipe“. Nachdem ich in dieſer ein wenig verzehrt, ſchritt ich raſch weiter. Schon von weitem hörte ich die Töne der Droſſeln, Rothkehlchen und Schwarzplättchen aus den herrlichen Waldungen erſchallen. Je höher der Weg ſich hinaufzog, deſto häufiger konnte ich die Ringdroſſel beobachten. Endlich hatte ich die Paßhöhe von 1300 Metern erreicht. Nun ging es an der Südſeite immer bergabwärts in’s Thie-Hutza-Thal. Das Vogelleben bot an der Südſeite mehr als am nördlichen Abhang; nach mehreren Stunden erreichte ich den Ort Thie-Hutza, welcher nur aus vier Häuſern beſteht, nebſt einem kleinen Wirthshaus. In einem uralten Bauernhaus, worin ſich eine Poſtſtation befand, wollte ich übernachten, da die Dämmerung raſch hereinbrach und ein Gewitter im Anzug war. Ein junges, blühendes Mädchen von ungefähr achtzehn Jahren begrüßte mich in deutſcher Sprache mit freudeſtrahlenden Augen und meinte: „Sie ſind wol ein Reichsdeutſcher?“ und als ich bejahte, erklärte ſie ſofort, ich könne dortbleiben. Ich trat nun näher in ein großes, ſechsfenſtriges Zimmer, wo ſich die Poſtſachen auf der einen Seite befanden; in einer Ecke ſtand ein Käfig mit Holzſproſſen von ungefähr 1½ Meter Größe, in dem zwei ſchöne ausgemauſerte Eichelheher ſaßen. Nachdem ich im Kreiſe der Familie Abendbrot gegeſſen, begab ich mich zur Ruhe, die leider durch das immer heftiger ausbrechende Gewitter ſehr geſtört wurde. —

Frühmorgens klärte ſich der Himmel und zeigte an, daß es ein ſchöner Tag werden konnte. Mein Vorhaben war, den Vormittag in den Bergen und Wäldern zu verbringen und dann einen mehrſtündigen Marſch durch das herrliche Prunderthal zu unternehmen. Der erſte Vogel, der mir den Morgengruß entgegenbrachte, als ich den Berg hinaufkraxelte, war ein Reitzugfink mit einem guten, exakten Schnapp. Welche Freude wurde mir zutheil, als ich, als eifriger Reitzugfinken-Liebhaber, das Glück hatte, in ſo weiter Ferne von der Heimat einen meiner Lieblinge zu hören, und noch dazu einen ſo guten Sänger, daß er in Gefangenſchaft bei manchem Verkäufer einen Werth von 30 bis 40 Mark gehabt hätte.

Die Rothkehlchen trillerten von den Wipfeln der Fichten in förmlichem Wetteifer, die Singdroſſeln brachten wiederholt die Rufe:

Vivat vivat vivat
Vilibok villibok
Kirük kirük
Widuwat widuwat widuwat.
Ditriböj ditriböj
Wik wik wik wil
Cherek cherek.

Auch die Haidelerchen waren in verſchiedenen Sängern zu hören. Wiederholt vernahm ich gute, tiefſtimmige Schwarzplättchen mit einem langgezogenen Ueberſchlag, denſelben mehreremal wiederholend, und doch ſchien es mir, als wenn im Prunderthal noch beſſere ſein könnten, was mir ſpäter auch feſtzuſtellen gelang.

(Fortſetzung folgt).

Die Bewerthung der Kanarienvögel auf den Ausſtellungen.

Von R. Groſſe.

(Fortſetzung).

Derartige Auseinanderſetzungen in den Fachzeitſchriften, verbunden mit den ſich merkbar mehrenden Klagen der ausſtellenden Züchter über ungenügende und zum Theil ſogar ungerechte Bewerthung ihrer Vögel nach dem „Punktirſyſtem“ gab die Veranlaſſung zur Aufſtellung eines neuen Plans, nach dem eine Geſangsbewerthung möglich gemacht wurde. Das geſchah im Jahr 1893. Zu dieſem neuen Verfahren gaben folgende Beweggründe die Veranlaſſung. Zunächſt wurde aus den genannten Auseinanderſetzungen und auf Grund der mehr und mehr hervortretenden Klagen der ausſtellenden Züchter der Schluß gezogen, daß das angewendete Bewerthungsverfahren vielen Züchtern deshalb unverſtändlich ſei, weil es ſich nur auf die Geſammtleiſtung des Vogels erſtreckt, ohne die einzelnen Strofen für ſich zu berückſichtigen; dann erſchien es zweifelhaft, ob alle, ſelbſt alle erfahrenen Preisrichter unter den zu Gebote ſtehenden 30 Punkten bei jedem Vogel die richtige Anzahl Punkte treffen und dem jedesmaligen Vogel zutheilen würden. Weiter lag wol das Bedürfniß recht nahe, daß den Züchtern Gelegenheit gegeben würde, rückhaltloſen Aufſchluß über die Leiſtungen ihrer Vögel zu bekommen, denn bis jetzt geſchah das auf keiner Ausſtellung. Es iſt immer üblich geweſen und dieſe Gewohnheit iſt auch jetzt leider noch nicht vollſtändig beſeitigt, daß die Preisrichter nach beendeter Bewerthung die gemachten Vermerke in ihren Taſchen verbergen, nur auf Wunſch, ſolange ſie anweſend ſind, Aufſchluß geben, d. h. wenn ſie nicht übermäßig mit Fragen beläſtigt werden, und nach

Laufende Nr. der Geſangsſtrofen.	Benennung der bei der Bewerthung zu berückſichtigenden Geſangsſtrofen.	Von den Preisrichtern abgegebene „Zenſuren" auf Vogel:					
		Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6 u. ſ. w.
	A. Preisſtrofen:						
1	Hohlrolle	1	2	2			
2	Knorre	2	2				
3	Hohlklingel	1	1	3			
4	Klingel			2			
5	Klingelrolle						
6	Pfeifen	1	1	1			
7	Koller						
8	Glucke				u. ſ. w.		
9	Zarte Schwirrrolle	1	2				
10	Geſammteindruck des Liebs	1	2	3			
	B. Fehler u. geringe Geſangsſtrofen						
1	Naſenſtrofen						
2	Aufzug		2	2			
3	harte Schwirre			2			
4	Schnatter						
5	Zitt						
6	ſpitze Pfeifen			1			
7	heiſere Strofen						
		7	12	16			

Die dritte Abtheilung C war für die Einzelaufführung der von den Vögeln gebrachten Preisſtrofen und Fehler beſtimmt, ſie konnte wegfallen, wenn vorausgeſetzt werden durfte, daß die einzelnen „Zenſuren" allgemein bekannt und der Werth derſelben von den Vereinen und Züchtern verſtanden worden war, wozu gewiß nicht lange Zeit erforderlich geweſen wäre. Die Preisrichter hatten ihr Gutachten (die „Zenſur") in Form einer Zahl in die Liſte einzufügen und eventuell die Abtheilung C auszufüllen, während die Ausrechnung der jedesmaligen Preiſe von dem Vereinsſchriftführer vorgenommen werden konnte. Dieſe Preisfeſtſtellung erfolgte, indem die Summe der „Zenſurzahlen", die von ſämmtlichen Preisrichtern ertheilt waren, gebildet, dieſe durch die Anzahl der gebrachten Preisſtrofen und dieſes Ergebniß wieder durch die Anzahl der Preisrichter getheilt wurde, alſo bei Vogel Nr. 1: Summe der Zenſuren 7, von 3 Preisrichtern = 21, getheilt durch 6 Preisſtrofen (da die Fehler entwerthen, können ſie bei der Feſtſtellung der Preiſe nicht begünſtigend mitwirken), $21 : 6 = 3\frac{1}{2} = 3$ (Bruchtheile bis $\frac{1}{2}$ einſchl. bleiben unberückſichtigt, über $\frac{1}{2}$ zählen für voll) und $3 : 3$ (Anzahl der Preisrichter) = 1. Preis. Vogel Nr. 2: Summe der Zenſuren 12, von 3 Preisrichtern = 36, getheilt durch 6 Bewerthungsſtrofen = 6, getheilt durch 3 (Anzahl der Preisrichter) = 2. Preis. Vogel Nr. 3: $16 \times 3 = 48$ „Zenſuren", getheilt durch 5 Bewerthungsſtrofen $= 9\frac{3}{5} = 10$, getheilt durch 3 (Anzahl der Preisrichter) $= 3\frac{1}{3} = 3$. Preis u. ſ. w. Durch dieſen Vorſchlag wurde einmal eine Bewerthung der einzelnen Theile des Liedes herbeigeführt, auf der andern Seite wurde mit Zahlen gearbeitet, die vermöge der ihr beigegebenen Werthbezeichnung jedem, auch dem geringſten Züchter verſtändlich waren, und zum dritten wurde den Preisrichtern durchaus keine Mehrarbeit aufgebürdet, denn ſie hatten ſich nur mit den einzelnen Abtheilungen der Liſte vertraut zu machen, was gewiß nicht viel Zeit in Anſpruch nahm. Da die Preiſe für die Vögel durch den Vereinsſchriftführer ausgerechnet werden konnten, ſo lag den Herren Preisrichtern nur die Pflicht ob, ihr ſachliches Urtheil in die Spalten einzurücken, und es wurde auf dieſe Weiſe noch einem Uebelſtand vorgebeugt, der nach der alten Bewerthungsweiſe nach Punkten zum Theil recht weit verbreitet iſt, nämlich dem, zuerſt den Preis zu beſtimmen, den der Vogel bekommen ſoll, und danach die Punkte zu ertheilen. Daher kam es auch wol, daß dieſer Vorſchlag von verſchiedenen Seiten begrüßt wurde, und die angeſtellten Verſuche ergaben, daß er wol durchführbar ſei und noch zweckentſprechender werden dürfte, wenn er nach verſchiedenen Richtungen vervollkommnet würde, was auch durchaus nicht in Zweifel gezogen wurde; denn welche Neuerung wäre wol gleich ſo vollkommen, daß ſich nichts an ihr auszuſetzen fände? Keine. Woher kam es denn aber, daß die Bewerthungsweiſe nach „Zenſuren" nicht als die allgemein zu verwendende aufgeſtellt wurde? Einmal ließen es die Fachvereine zum großen Theil an regem Eifer fehlen, ſich mit der Sache eingehend zu befaſſen, und zum andern wurde der neue Plan in der Preſſe theilweiſe abfällig beurtheilt, welcher Umſtand wol ſehr viel dazu beigetragen hat, daß die Vereine ſich nicht weiter mit dem Vorſchlag beſchäftigt haben. Dieſe abfällige Beurtheilung der Neuerung hätte nun allerdings nicht die Veranlaſſung geben ſollen, ſo ohne weitres ihr den Rücken zu kehren; denn es war ſchon bei ihrer Einführung damals bekannt, daß alle neuen Vorſchläge von vielen Seiten ohne vorhergegangene ſachliche Prüfung verworfen wurden, einmal aus dem Grunde, um nichts Neues aufkommen zu laſſen, zum andern fühlt ſich auch ſo Mancher berufen, alles für haltlos zu erklären, was nicht von ihm ſelbſt aufgetiſcht iſt. Hierunter hatte auch das „Zenſurſyſtem" zu leiden und es wurde mehrfach angefeindet. Auch die Herren Preisrichter konnten ſich mit ihm nicht ſo recht befreunden; denn ſie wurden nun veranlaßt, gewiſſermaßen noch einmal zu lernen, und dann — das iſt wol bei verſchiedenen Herren die Hauptveranlaſſung geweſen, ſich von der neuen Bewerthungsart fern zu halten — mußten ſie, wenn ſie dieſer Bewerthung zuſtimmten, ihre bequemere Art, die Vögel zu bewerthen, das „Punktirſyſtem" verlaſſen, ſie mußten mit ihren Richterſprüchen offen vor die Ausſteller hintreten und befürchteten wol, mit Fragen noch mehr beläſtigt zu werden, mit Fragen, auf die ſie nicht, wie nach der dunklen und unverſtändlichen Preisvertheilung nach Punkten, antworten durften: „Ja, weshalb haben Ihre Vögel nicht durchgeſungen!“ oder „Ich weiß nicht, habe Geſangsſtrofen nicht vermerkt“. (Fortſetzung folgt).

Zur Eingewöhnung friſch eingeführter Graupapageien.

Von F. Anzinger.

In Nr. 45 des vorigen Jahrs bringt Herr Heinrich Vehl einen Aufſatz über die Pflege und Behandlung von Papageien und führt hierbei aus, daß unter den gegenwärtig importirten Graupapageien die außerordentlich große Sterblichkeit bedeutend nachgelaſſen habe und daß er bei einem ſehr einfachen Verfahren in der Fütterung und Tränkung ſolch' friſch erhaltener Vögel ſtets günſtige Ergebniſſe erziele.

Daß das Erſtere thatſächlich zutrifft, will ich nicht beſtreiten, doch glaube ich auch bemerken zu dürfen, daß nicht alle jene Graupapageien, welche einige Wochen oder Monate nach ihrer Einfuhr verendeten, an Sepſis eingingen, ſondern daß ein großer Theil derſelben infolge oberflächlicher oder verkehrter Behandlung, nicht minder aber auch infolge ſehr geringen Anpaſſungsvermögens ihr Leben laſſen mußten [1]. Gegenwärtig, wo viele Zeitſchriften, vor allem die „Gefiederte Welt“, aufklärend und unterweiſend wirken, hat ſich die Sache zum Beſſern gewendet. Ob die erwähnte todbringende Krankheit aber, wenn einmal vorhanden, durch das von Herrn Vehl bekannt gegebene Verfahren ſtets beſeitigt, bzl. der friſch erhaltene Vogel ſtets mit Erfolg eingewöhnt werden kann, ziehe ich in Zweifel [2]. Bereits früher haben Wiener Vogelhändler bei friſch importirten Graupapageien Verſuche mit bloßer Fütterung von Spitzſamen und in Rahm (Sahne) getauchtem Weißbrot angeſtellt, ohne einen wirklich günſtigen Erfolg zu erzielen. Die Todesfälle waren ſo häufig wie früher. Das Berliner Leitungswaſſer, welches Herr Vehl ſeinen Papageien verabreicht, dürfte wol auch nicht ausſchlaggebend geweſen ſein, es wäre denn, daß es ſehr ähnliche Eigenſchaften hätte, wie ſo manches afrikaniſche Trinkwaſſer [3].

Herr Vehl war alſo ſicherlich vom Zufall begünſtigt, indem er lauter kerngeſunde Vögel erhielt, die unter ſeiner ſorgſamen Pflege glücklich weiter gediehen [4].

Etwas bedenklicher ſcheint es im nachſtehend mitgetheilten Fall geweſen zu ſein, in welchem es mir glückte, einen Graupapagei durchzubringen, welcher in dem ſtarken Verdacht ſtand, den Keim der Sepſis bereits in ſich zu tragen.

Gelegentlich der im Mai 1898 ſtattgefundenen Vogelausſtellung in Innsbruck beſtellte ich, zur Ergänzung der Abtheilung Fremdländiſche Vögel, eine kleine Sendung von ſolchen bei Herrn A. Fockelmann in Hamburg für unſern Verein für Vogelkunde. Herr Graf K., welcher von dieſer Beſtellung Kenntniß erhielt, ließ mich erſuchen, einen bereits gut eingewöhnten Graupapagei um den Preis von 35 Mk. für ſich perſönlich mitkommen zu laſſen. Die beſtellte Sendung traf glücklich ein und ſtatt eines Graupapagei befanden ſich deren zwei beiſammen in einem Verſandtkäfig. Herr Fockelmann, welcher nach der Faſſung meiner Beſtellung der Anſicht ſein mußte, daß der Jako ebenfalls zu unſerer Beſtellung gehöre, theilte uns im Begleitſchreiben mit, daß er einen Graupapagei von der gewünſchten Eigenſchaft nicht zur Verfügung hatte, daher als Erſatz zwei ganz friſch eingeführte billigere Vögel ſende. Beide Vögel wurden, nachdem ſie ſich anſcheinend vollkommen geſund und dementſprechend lebhaft und bei regem Appetit zeigten, zuſammen in einem Papageienkäfig beherbergt und darin bis zum Schluß der dreitägigen Ausſtellung belaſſen. Nachdem Graf K. nur einen Jako kaufte und ſich für den zweiten kein Abnehmer fand, ſo kam derſelbe als Geſchenk des Vereins in den Beſitz meiner Frau.

Bis wir Auskunft von Herrn Fockelmann über ſeine Papageienfütterung erhielten [5], gaben wir die üblichen Sämereien als Futter und abgekühlten ſchwarzen Kaffe als Getränk und hatten ſomit, wie mir vom Händler mitgetheilt wurde, die frühere Verpflegung nachgeahmt.

Nach etwa einer Woche des Hierſeins ſtellten ſich bei unſerm Jako jene Erſcheinungen ein, welche an ſepſiskranken Papageien beobachtet werden und zwar: Gefiederſträuben, Schüttelfroſt, ſtumpfes Hinbrüten, zeitweiſe Appetitloſigkeit, dann wieder große Freßluſt, längeres Sitzen *auf beiden Füßen* [6] mit geſchloſſenen Augen oder in's Rückengefieder geſtecktem Kopf und ſtets dünne, wäſſerige Entleerung.

Unſere Aufmerkſamkeit verdoppelte ſich daher. Das Futter, beſtehend aus Hanf, Glanzſamen, Sonnenblumenkernen und geſchwelltem Mais (jede Sorte für ſich) wurde, um die Freßluſt zu reizen, im Tage mehrmals gewechſelt. Anſtatt des bisher gereichten Kaffe-Aufguſſes ließ ich einen Abſud von dem ſogenannten Kathreiner-Malzkaffe (geröſtete Gerſte) und einen ſtarken Eßlöffel voll zerquetſchten Hanf bereiten. Dieſes fette Getränk reichte ich in lauwarmem Zuſtand unter Beigabe einiger Tropfen guten Tiroler Rothweins. Nachdem ich mir von der zeitweiſen Fütterung fetter Koſt zur Bekämpfung der vermuthlichen Krankheit viel verſprach, bekam er jedesmal, wenn hefefreie, in friſcher Sennereibutter zubereitete Mehlſpeiſen auf unſern

---

[1] Auch an Lungenkrankheiten gehen manche ein. D. Vrſ.

[2] Herr Vehl hat ja garnicht behauptet, daß ſein Verfahren bei ſepſiskranken Papageien anzuwenden ſei. Im Uebrigen iſt es nicht ausgeſchloſſen, daß durch ſolche zweckmäßige Pflege ſelbſt ſepſiskranke Vögel ſich erholen und am Leben bleiben können. D. L.

[3] Das iſt nicht der Fall. Das Berliner Leitungswaſſer iſt ſehr rein. D. L.

[4] Selbſtverſtändlich hat ſich Herr Vehl als reich erfahrener Vogelwirth geſunde Vögel ausgeſucht. D. L.

[5] Solche Anweiſungen ſollten meiner Anſicht nach jeder Sendung eines werthvollen Vogels vom Händler beigegeben werden. D. Vrſ.

[6] Eine bei kranken Vögeln häufig vorkommende Erſcheinung. D. Vrſ.

Tiſch kamen, eine ausreichende Gabe hiervon. Später verſuchte ich es auch mit gutem, friſchem, kernigem Speck und hatte das Vergnügen, zu ſehen, daß derſelbe ſofort angenommen und ein anſehnliches Stück verzehrt wurde. Es war der erſte Biſſen, der mir unmittelbar aus der Hand genommen wurde. Das vorerwähnte Getränk reichte ich in der gleichen Zubereitung über vierzehn Tage lang, ließ dann mit der Menge der hierzu verwendeten Beſtandtheile nach, reichte dann nur mehr geſottenes, ſpäter abgeſtandenes und ſchließlich ganz friſches Waſſer vom Brunnen her. Ein ſofortiges Verabreichen des letztern an den neuangekommenen Vogel hätte ich unter keinen Umſtänden gewagt, hatte ich doch ſeinerzeit aus Unwiſſenheit ein ganzes Dutzend friſch angekommener verſchiedener Aſtrilde mit ſolch' hartem, kaltem Bergwaſſer in den Tod gejagt.

Auf ein ängſtliches Hüten des Vogels vor friſcher Außenluft ging ich nicht ein, plazirte vielmehr denſelben ſtets vor dem geöffneten, doch zugfreien Fenſter, deckte den Käfig oben zu und ließ die Sonnenſtrahlen, ſo lange ſie das Fenſter trafen, auf ihn wirken. Nur zur Nachtzeit und wenn die Temperatur tagsüber unter 10 Grad Celſ. + ſank (wir haben im Mai noch häufig Neuſchnee auf den nahen Bergen), blieb der Vogel im geſchloßnen Zimmer. Dann wurde aber der Käfig geöffnet und ihm ein ungehindertes Umherklettern geſtattet. Ich beſchäftigte mich, ſoweit es mein Beruf zuließ, ſehr viel und eingehend mit ihm, erzielte hierdurch eine große Anhänglichkeit desſelben und hatte nach etwa ſechs Wochen die Gewißheit, in meinem Jako einen kreuzfidelen Vogel und leicht lernenden Sprecher gerettet zu haben. Nach dreimonatlicher Bekanntſchaft ſaß der „Jackl“ bereits auf meiner Schulter und kramte in meinen Kopf- und Barthaaren herum. Gegenwärtig iſt er bereits „Familienmitglied“.

Einen Monat nach der erwähnten Vogel-Ausſtellung erhielt ich vom Herrn Grafen K. die briefliche Mittheilung, daß ſein Jako verendet ſei. Die vorausgegangenen Krankheits-Erſcheinungen wurden in ähnlicher Weiſe geſchildert, wie ich ſie an unſerm Vogel beobachtet hatte. Ob und wie weit der genannte Beſitzer die von mir erhaltenen Winke befolgt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls ging es ein wenig bequemer her.

Es bleibt nun die Frage offen: War der verendete Jako wirklich ſepſiskrank, oder war deſſen Leiden anderer Art? Traf das erſtere zu, ſo dürfte es auch der unſerige geweſen ſein. Zum mindeſten iſt mein Verdacht gerechtfertigt, daß durch das enge Beiſammenſein beider Vögel durch volle vier Tage eine Uebertragung der Krankheit möglich war. Ob nun der von mir angewendeten Behandlung unſeres Jako thatſächlich der hier mitgetheilte Heilerfolg zuzuſchreiben iſt, müßte erſt ein weiterer Verſuch ergeben. Würde dieſer gelingen, ſo wäre meine Freude umſo größer*).

---

*) Wir glauben, daß Ihr Vogel nicht ſepſiskrank war und daß Sie überhaupt vom Zufall begünſtigt wurden. Bei anderen Papageien hätten fette Mehlſpeiſen oder gar Speck tödlich gewirkt. Gegen die Mittel, welche Sie ſonſt gebrauchten, wäre ja in ſolchem Fall nichts einzuwenden. D. L.

Kurze Geſchichte zweier Dompfaffen.

Von F. Schlag.

Am 4. Juni 1898 bekam ich mein erſtes Neſt voll junger Dompfaffen (vier Stück), welche ich aufpäppelte. Als dieſe flügge waren, zeigten ſich zwei als Männchen, zwei als Weibchen. Sofort pfiff ich dieſen meinen zwei erſten Scholaren „Die Wacht am Rhein“ u. a. vor, wobei ſelbige aufmerkſam lauſchten. Ungefähr Ende Juli hörte ich von beiden, die weniger fleißig ſtudirten, ſchon einige Liebestöne. Somit hatte ich günſtige Ausſichten. Auf einmal ſchwiegen meine zwei Vögel vier Monate lang gänzlich ſtill. Ich kam auf den Gedanken, dieſe wären ganz ſtumm oder heiſer geworden. Letzteres konnte aber unmöglich der Fall ſein, ſonſt hätten ſie nicht ſo normal gefreſſen und ſich im allgemeinen ſo geſund gezeigt. Ich verdoppelte meinen Eifer im Vorpfeifen, indem ich lernbegierige Vögel vor mir hatte, welche doch endlich einmal wieder Töne von ſich geben und üben mußten. Der eine derſelben mauſerte regelrecht und war anfangs Oktober prächtig roth befiedert, trotzdem er nur Sommerrübſen und Kanarienſamen (Glanz) zu freſſen bekam. Der andre dagegen mauſerte nur bis an Kopf und Hals, und als die Kopffedern ausfielen, war und blieb der Kopf ganz nackt bis in die letzten Tage des Dezember (dies iſt der zweite ähnliche Fall, welcher mir im Leben vorgekommen). Am 28. Dezember gewahrte ich, daß letztgenannter endlich die Mauſer vollenden würde, indem alte Halsfederchen im Käfig herumlagen und kleine ſchwarze Federkiele auf der Kopfplatte und im Nacken ſichtbar wurden. Mitte Dezember fing der erſte endlich wieder an zu üben und hatte faſt ſämmtliche Strofen des genannten Liedes halb inne; auch übt dieſer jetzt täglich fleißiger. Der unvermauſerte dagegen blieb ſtumm bis zum 25. Dezember 1898, wo er auf einmal ſämmtliche Strofen der „Wacht am Rhein“ u. a. ganz leiſe und ſtückweiſe zum Vorſchein brachte.

Das Merkwürdige dabei iſt, daß dieſer Vogel am Tag faſt garnicht, aber ſeit einigen Tagen abends bei Licht (7—7½ Uhr) eine volle halbe Stunde an ſeinem Penſum fleißig übt. Begierig bin ich nur, ob, wie und wann dieſe beiden Vögel ihr Studium vollenden werden! Meine übrige Geſellſchaft hat bis jetzt nichts gelernt und ſomit auch nichts vergeſſen!

Briefliche Mittheilungen.

... Heute früh (11. 2.) ¾8 Uhr beobachtete ich die erſten **Stare**! Dieſelben pfeifen tüchtig darauf los und ſcheinen ſich bei dem herrlichen Frühjahrswetter ſehr wohl zu fühlen. Geſtern gegen Mittag hörte ich hoch in der Luft wiederholt Lockrufe der **Feldlerche**. **Amſeln** gibt es hier in den Gärten ſehr viel, dieſelben ſind garnicht ſcheu vor Menſchen. Auch die Amſel hörte ich ſchon Mitte Januar hier ſchön und anhaltend ſingen. **Alf. Steiner.**

... Ich habe für mein **Schwarzplättchen** Sprungſtäbe aus Kork verfertigt und zwar auf ganz leichte Art, indem ich mir Federhalter aus beſagtem Material kaufte; damit ſie nun in ihrer Länge nichts einbüßten, habe ich einen Stahldraht, z. B. aus einem alten Schirmgeſtell, dazu benutzt. Der Draht geht ohne viel Schwierigkeiten durch den Halter, wenn man das eine Ende des Drahts rothglühend macht und ſo durchbohrt; natürlich muß man die darin befindliche Blechhülſe herausnehmen. Bei meinem Bauer genügt die Länge eines Federhalters, da durch die Länge des Bauers ein gewöhnlicher Holzſtab geht. Die Futternäpfe befinden ſich vorn. Ich habe nun in den Holzſtab zwei Löcher gebohrt, in die ich die Spitzen des hervorſtehenden Drahts der Sprungſtäbe ſtecke, das andere Ende des hervorſtehenden Drahts, welcher durch das Glühen weich geworden, habe ich nach unten gebogen und durch das Bauer gehakt. Außerhalb des Bauers iſt ein kleiner drehbarer Riegel angebracht, welcher mit einem Stift befeſtigt wird, der das Drehen des Stabes verhütet. Ich habe nun ſchöne weiche Stäbe erhalten, die auch, wie der Vogel es gern haben mag, an einem Ende ſtark, an dem andern ſchwach ſind. Sollte nun die Länge eines Halters nicht ausreichen, ſo braucht man nur zwei Halter ſo, daß dieſelben mit den dicken Enden zuſammenkommen, auf den Draht zu ziehen. Dieſer Verſuch hat ſich bei mir gut bewährt. **R. Benicke.**

Aus den Vereinen.

Mainz. Der **Verein für Geflügel- und Vogelzucht** hielt geſtern Abend in dem „Kötherhof“ eine überaus zahlreich beſuchte Monatsverſammlung ab. Der ſtellvertretende Vorſitzende, Herr Fürſtenweger, eröffnete die Verſammlung mit der Mittheilung, daß die Brieftaubenſektion des Vereins auf die ſ. Z. in Ausſicht genommene deutſche Brieftaubenausſtellung verzichtet habe und daß der Straßburger Brieftaubenklub ſich zur Uebernahme der Ausſtellung gemeldet habe. Die hieſige Brieftaubenſektion werde die Beſtrebungen des Straßburger Schweſtervereins unterſtützen. Nach noch einigen weiteren Mittheilungen erhielt Herr A. Holpp von Stuttgart das Wort zu dem Vortrag über die „Wanderung der Vögel“. In ſehr anziehender, poetiſcher Weiſe leitete Herr Holpp ſeinen Vortrag ein, er verbreitete ſich über das Wandern der Vögel ſelbſt und kam zu der Anſchauung, daß der eigentliche Grund dieſes Wanderns wol immer ein Buch mit 7 Siegeln verbleiben werde. In anmuthiger Form ſchilderte er, wie ſich die verſchiedenen Vogelarten verſammelten und zum Abzug nach dem Süden rüſteten, wie ſie aber ganz beſondere Straßen einſchlügen, um zu ihrem Ziele zu gelangen, und wie ſie dann, am Mittelländiſchen Meere angekommen, diejenigen Stellen ausſuchten, welche ſie am Beſten überfliegen können, z. B. bei Gibraltar über Malta nach Tripolis u. a. Mit Entrüſtung ſchilderte darauf der Redner das Vorgehen der Italiener und Franzoſen, welche unſere armen Wandervögel, wenn ſie, ermüdet, nahe an dem Ziele ihrer Wanderung angekommen ſeien, zu Tauſenden hinmordeten. Die Vogelmorde in jenen ſüdlichen Ländern ſeien ein Verbrechen an der Ziviliſation, und das Beſtreben müſſe bei uns nie erlahmen, dieſes Verbrechen zu bekämpfen. Aber auch wir hätten die Aufgabe, in anderer Form zum Schutze unſerer Vögel aufzutreten. In der Schule müſſe ſtets und immer gelehrt werden, daß die Vögel in unſerem ureigenſten Intereſſe erhalten bleiben müſſen, ferner müſſe man ſtets und immer ſeine Stimme erheben gegen das Schmücken von Frauenhüten mit den Vogelbälgen. Mit außerordentlichem Beifall wurde der Vortrag aufgenommen und Namens des Vereins dankte der Vorſitzende, Herr Schüler, Herrn Holpp für ſeinen lehrreichen Vortrag mit dem Wunſche, er möge dem Ruf des Vereins bald wieder Folge leiſten. Es fand nunmehr eine Verſteigerung hochfeiner ſog. Vorſchläger von Kanarien ſtatt und wurden dafür bis zu 27½ Mark per Stück erlöſt. Den Schluß bildete die obligate Verloſung von Nutzgeflügel und ſonſtigen Vogelarten.

Anfragen u. Auskunſt.

Frau **Roſalie Siegmund**: 1. Für den von Ihnen freundlichſt geſandten Zeitungsausſchnitt danke ich beſtens, ſowie überhaupt für Ihre Bemühungen um die Widerlegung ſolcher Lügen-Notizen, wie ſie ja leider immer vom neuen in den Zeitungen auftauchen. Auch wir hatten ein Exemplar der Nummer 3 an die Redaktion der genannten Zeitung geſchickt. 2. Kondenſirtes Eigelb in vorzüglicher Beſchaffenheit hatte ich vor kurzem in Proben von Schiſſer & Ko. in Köln a. Rh. und von Karl Capelle in Hannover vor mir. 3. Die Ameiſenpuppen, die Sie mir zur Probe geſandt, können Sie nach meiner Ueberzeugung getroſt verwenden. Sie ſind klein, aber im übrigen von guter Beſchaffenheit. Ich habe ſie auch angequellt und ohne nachtheilige Folgen verfüttert und zwar an einen amerikaniſchen Star. 4. Ueber Ihre Rauchſchwalben wären uns nähere Mittheilungen für die „Gefiederte Welt“ erwünſcht.

Herrn **Joh. Kalibek**: Die Unterſuchung Ihres Kanarienvogels ergab eine heftige Magenentzündung. Er muß etwas gefreſſen haben, was ihm verderblich geworden iſt.

Herrn **Arthur Bariczeck**: Da Sie Ihre Kanarienvögel richtig füttern und rein halten, ſo kann ich als Grund ihres Verſtummens nur annehmen, daß ſie entweder zu vollbeleibt ſind oder an einem Katarrh der Athmungswege, infolge von zu kaltem Trinkwaſſer oder Erkältung durch Zugluft oder ſtarken Temperaturwechſel, leiden. Sie haben leider zu geringe Angaben gemacht. Unterſuchen Sie vor allen Dingen die Vögel einmal, ob ſie volle runde oder gar mit Fett belegte Bruſt oder im Gegenſatz dazu ſpitz hervorſtehenden Bruſtknochen haben. Sodann achten Sie darauf, ob die Vögel, namentlich am Abend, ſchmatzende Töne hören laſſen und ob ihr Locken heiſer klingt. Wenn Sie mir dann genaue Mittheilungen zugehen laſſen, hoffe ich Ihnen Rath ertheilen zu können. In welcher Wärme halten Sie Kanarienvögel und iſt dieſe Tag und Nacht gleichmäßig?

☞ Herrn **M. Oberhofer**: Ihre Frage, ob Sie in einen Käfig von 58 cm Länge, 55 cm Höhe und 35 cm Tiefe zu einem Pärchen Wellenſittiche noch einen Alexanderſittich ſetzen dürfen, muß ich mit nein beantworten. Erſtens iſt der Käfig zu klein und zweitens würde der Alexanderpapagei dem Wellenſittich die Beine zerbeißen. Ihr Käfig iſt ja nicht einmal als Heckbauer für das Wellenſittichpar groß genug; ein ſolches muß 78 cm lang, 64 cm hoch, 42 cm tief ſein.

Frau **Agnes Adametz**: Das Buntſpecht-Männchen muß doch wol etwas gefreſſen haben was bei ihm heftigen Magen- und Darmkatarrh verurſachte; ſolchen ergab die Unterſuchung. Jedenfalls war etwas von den Speiſenüberreſten, die Sie auf dem Futterplatz in der Veranda geben, in Verderbniß übergegangen.

Herrn **Hermann Caspari**: 1. Vier Pärchen Papageien können Sie nicht ohne weiteres zuſammen in einen Käfig ſperren und noch weniger auf Züchtungserfolge rechnen. 2. Je ein Par Wellen- und Nymfenſittiche dürfen Sie ſchon eher zuſammen halten. Wenn das eine oder andre Par aber zur Brut ſchreitet, müſſen Sie ſorgfältig beobachten, ob ſie einander befehden und ſtören. Da die beiden Pärchen Papageien mit den Prachtfinken ſchon zuſammengewöhnt ſind und da der Käfig doch recht geräumig iſt, ſo werden dieſelben wol auch zur erfolgreichen Brut ſchreiten. Beobachten müſſen Sie dabei aber natürlich immer. Die unverträglichen Gürtelgrasfinken fangen Sie heraus. Ferner würde ich empfehlen, auch das eine Pärchen Zebrafinken zu entfernen; da ich immer rathe, nur je ein Pärchen derſelben Vogelart in einem Geſellſchaftskäfig zu halten. 4. Die Singſittiche und noch mehr die Grauköpfchen verſuchen Sie je in einem beſondern Käfig zu züchten, dies Verfahren iſt für alle Papageien am rathſamſten. 5. Wenn das Grauköpfchen-Weibchen ſtets die Eier verläßt, ſo liegt dies wahrſcheinlich in irgend einer Störung begründet, die Sie zu erforſchen ſuchen und vermeiden müſſen. 6. Als gut züchtbare Papageien kann ich Ihnen noch nennen: Sperlingspapageien, Roſenpapageien, die verſchiedenen Arten Schönſittiche, Pflaumenkopf- und Roſenkopfſittich. Die erſteren fehlen aber leider augenblicklich im Handel völlig. Sie müſſen nur immer auf den Anzeigentheil achten.

Herrn Karl J. Schmidt: 1. Die von Ihnen angegebenen kleineren Maße genügen ſchon für die Nachtigal. Nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II muß ein Nachtigalkäfig 30 bis 35 cm hoch, 22 bis 25 cm tief und 45 bis 50 cm lang ſein, am rathſamſten ganz aus Metall; die Decke bildet am beſten ein ſchwacher Holzrahmen, mit grünem Tuch überſpannt. Die einſchiebbare Hinterwand aus Glanzledertuch ſoll doch wol nur zum Schutz der Zimmerwand gegen Verunreinigung dienen? Von den Sprunghölzern wird in der Regel eins jederſeits neben den Futter- und Trinkgefäßen etwa 4 cm von dieſen entfernt, eins etwa 6 cm höher in der Mitte des Käfigs und das vierte ebenfalls in der Mitte unten, unmittelbar über der Schublade, angebracht. 2. Derſelbe Käfig paßt auch für den Sproſſer und das Schwarzplättchen. 3. Ein Badehäuschen dürfen Sie für die Nachtigal anhängen. 4. Lichtgrüner Anſtrich mit harttrocknendem Lack iſt empfehlenswerth.

Frau Katharina Mankowski: Ihr Kreuzſchnabel war infolge von Darmkatarrh geſtorben, doch zeigte derſelbe keine typhöſen Erſcheinungen. Jedenfalls haben die ſechs Ihnen im Lauf von drei Wochen geſtorbenen Vögel etwas Schädliches gefreſſen oder zu kaltes Trinkwaſſer bekommen.

Frau Louiſe von Hausner-Urban: Wenn Sie Ihr Kanarienmännchen mit dem Weibchen das ganze Jahr hindurch in einem Käfig beiſammen halten, noch dazu im ſtark geheizten Zimmer, ſo iſt es doch kein Wunder, daß das Pärchen zur unnaturgemäßen Zeit zur Brut ſchreitet. In meinem Buch „Der Kanarienvogel“ ſteht ausdrücklich, daß man nach vollendeter Brut Männchen und Weibchen trennen und je beſonders überwintern müſſe, während man ſie erſt zu Ende Februar oder Anfang März in die Hecke ſetzen darf. Wenn Sie nun ſchon im November Ihren Kanarien Niſtgelegenheiten geboten haben, ſo dürfen Sie ſich nicht darüber wundern, daß aus der Brut nichts wird. Richten Sie ſich genau nach den Vorſchriften in meinem Buch, welche nach langjährigen Erfahrungen der bedeutendſten Züchter gegeben ſind, füttern und halten Sie alſo Ihre Kanarien richtig und bringen Sie ſie dann zu rechter Zeit in die Hecke, ſo werden Sie auch erfolgreiche Bruten erzielen.

Herrn Mager: Allerdings kann man Sproſſer und Schwarzplättchen auch lediglich mit getrockneten Ameiſenpuppen füttern. Beſſer aber iſt es, ſie an ein Miſchfutter zu gewöhnen, namentlich wenn ein ſolcher Vogel, wie in Ihrem Fall, die Ameiſenpuppen allein nicht gern nimmt. Das Miſchfutter, wie Sie es täglich friſch herſtellen wollen, iſt gut, doch müſſen Sie den Sproſſern und dem Rothkehlchen zur Geſangs- und Mauſerzeit je 15 bis 20 Mehlwürmer täglich geben; für das Schwarzplättchen genügen 4 bis 6 Stück. Dem letztern bieten Sie auch ein Schittchen von ſüßem Apfel, angequellte Hollunderberen oder Sultanroſinen zum Miſchfutter.

E. S. in G.: 1. Das Blaukehlchen hätten Sie anfangs nur mit kleinen Mehlwürmern und dann mit friſchen Ameiſenpuppen eingewöhnen müſſen; ſolche gibt es ja zu Ende April bereits. Danach erſt hätten Sie das Vögelchen an ein Miſchfutter aus angequellten getrockneten Ameiſenpuppen, geriebener Möre und geriebener altbackener Semmel, abwechſelnd mit Zuſatz von etwas fein zerhacktem gekochtem Fleiſch oder geriebnem hartgekochtem Hühnerei gewöhnen müſſen und zur Zugabe täglich drei bis vier, ſelbſt ſechs Mehlwürmer oder andere kleine weiche Kerbthiere und ein wenig Frucht: das fein zerſchnittene Innere von Feigen, einige friſche oder angequellte getrocknete Hollunderberen reichen ſollen. 2. Anleitung zur ſachgemäßen Fütterung und Verpflegung aller einheimiſchen inſektenfreſſenden Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (einheimiſche Vögel), dritte Auflage, Preis 6 Mk.

Herrn Jean Goebel: 1. Ganz ſichere Gewähr dafür, daß Sie von einem Pärchen reingelber Wellenſittiche nur ſolche Junge erzüchten, kann Ihnen Niemand bieten, ſondern es iſt möglich, daß Sie Rückſchläge auf die gewöhnlichen grünen Wellenſittiche erzielen. In meinem Buch „Der Wellenſittich“, vierte Auflage, habe ich Alles mitgetheilt, was bis jetzt über die Züchtung gelber Wellenſittiche zu ſagen iſt. 2. Der Roſenpapagei iſt leicht züchtbar und zugleich ein ſehr ſchöner Vogel. Wenn Sie ihn anſchaffen und Züchtungsverſuche mit ihm machen wollen, ſo ſollten Sie ſich mein kleines „Vogelzucht-Buch“ (zweite Auflage, Preis 1,50 Mk.) kaufen und ſich in demſelben über alle Bedürfniſſe unterrichten.

Herrn S. Engel: Die Meiſen bedürfen nach Angabe meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ eines Miſchfutters aus Ameiſenpuppen, geriebener Möre, geriebnem altbacknem Weißbrot, abwechſelnd mit Zuſatz von etwas gequetſchtem Hanf, etwas gehacktem hartgekochtem Hühnerei oder geriebnem gekochtem Herz, nebſt etwa zehn Mehlwürmern täglich für den Kopf oder dementſprechend verſchiedenen anderen Kerbthieren: Fliegen, Spinnen, Maden, Räupchen, Käfer u. a. m. Dazu müſſen ſie auch Sämereien: Mohn, Kanarienſamen, Hirſe, Sonnenblumenkerne und Hanf bekommen. Die Bartmeiſe muß dazu noch etwas Rohrſamen und ein wenig gehacktes Obſt erhalten und den größeren Meiſen bieten Sie auch ein Stückchen friſchen rohen Talg.

Zu unſerm Bilde.

Mit der heutigen Nummer nehmen wir die Reihe der Neſtbilder einheimiſcher Vögel wieder auf. Unſer allbekannter Dompfaff (Pyrrhula europaea, *Vll.*)*) kehrt nun bald, im nächſten Monat, ja bereits Ende dieſes, von ſeiner Wanderung zurück und bereits im April, ſpäteſtens Mai ſchreitet das Par zur erſten Brut. Daher bringen wir ſchon heute ſein Neſtbild.

Das Weibchen unterſcheidet ſich vom Männchen dadurch, daß die Bruſt nur röthlichgrau, nicht roth erſcheint; das Aſchgrau des Rückens iſt bläulich überflogen.

Durch viele Nachſtellungen gewitzigt, verfahren die Dompfaffen bei der Anlage des Neſts mit großer Vorſicht; es wird an entlegenen, ſchwer zugänglichen Orten angelegt oder wenigſtens ſo, daß man es von der Umgebung ſchwierig unterſcheiden kann. Ein Dompfaffenneſt iſt nicht leicht zu finden; es gehört ſchon bedeutende Uebung dazu. Das Neſt ſteht in der Regel im Laubwald, ſeltner im Nadelwald, in jungem Stangenholz auf freien Stellen oder in lichten Buchen-, Eichen-, Fichtenſchlägen, ſelten in Gärten und Parks. Das Neſt ſteht in hohen Büſchen oder auf kleinen Bäumen, auch in Gabelzweigen eines Buſches oder nahe am Stamm auf Seitenäſten. Die Höhe des Standorts beträgt 1 bis 4, ſelten 6 m. Es bildet eine offne Mulde, wird aus dünnen Reiſern, Halmen, zarten Wurzeln und Flechten gebaut und innen mit Thierharen, Wolle, feinen Würzelchen u. a. ausgepolſtert, in manchen Neſtern fehlen die Hare. Das Weibchen baut allein. Im Neſt findet man vier bis fünf, ſelten ſechs grünlichblaue, röthlichgrau, röthlichbraun und dunkelviolett gefleckte und gepunktete Eier, oft mit Fleckenkranz am dickern Ende; die Färbung variirt ſehr; ſie ſind in der Regel 21 mm lang und 15 mm dick. Die Brutdauer beträgt vierzehn Tage; das Weibchen brütet allein, wird nur vom Männchen gefüttert. Die Jungen ſind am ganzen Oberkörper röthlichbraungrau, mit aſchgrauem Schimmer; die Kehle und Bruſt erſcheinen röthlichgelbbraun. Sie werden anfangs mit Inſekten, dann grünen Pflanzenſchößlingen, Knoſpen und im Kropf erweichten, ſchließlich mit harten Sämereien von beiden Alten großgefüttert. Die zweite Brut findet im Juni, zuweilen noch eine dritte im Juli ſtatt. Bei dieſen Bruten enthält das Gelege meiſt nur vier Eier.

K. R.

---

*) Nicht zu verwechſeln mit dem großen Dompfaff (P. maior, *Kr.*).

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Neues Futter- und Wasser-Gefäss

für die Hecke und für kleine Volieren.

„Wer es einmal im Gebrauch hat, mag es nicht mehr entbehren“.

„Man muss es nur gesehen haben, und man wird sofort in lautes Lob ausbrechen“.

Beschreibung:

Obertheil: **Glaskugel.** Vorzüge: Man hat schon von weitem einen Ueberblick über die im Käfig vorhandene Nahrung. — Inhalt ca. 1 Liter, füllt selbstthätig nach; Beschmutzen unmöglich.

Untertheil: Glasirtes **Steingut.** Vorzüge: Solide Konstruktion; gefällige Form; bequemste Handhabung; stets reine Nahrung, frischer gesunder Trunk.

Preise: 1 Stück franko inkl. Verp. gegen Nachnahme M. 1.60.
2 „ „ „ „ „ „ „ 2.60.
6 „ „ „ „ „ „ „ 6.—

Bei Bestellungen per Postanweisung dürfen 20 Pfg. für Porto in Abzug gebracht werden. [309]

Schiffer & Co.
Vogel-Grosshandlung, Futter- und Käfig-Fabrik
Köln.
Filialen: **Nymegen** (Holland), Blumenstrasse 48, 50, 52.
Barmen, Werlestr. 21.

Futtermittel.

Vom Besten

das Beſte. 98er **Ameiſeneier Ia** Ko. 3 ℳ, Prima ſchneeweiße Tiroler Ltr. 1 ℳ, **Elbe-Weißw. Ia** Ko. 3,50, Ltr. 80 ₰, **Mehlwürmer Ia,** rein, Liter 4,50 ℳ, **Univerſalfutter** prima, f. zarte Inſektenfreſſer Ko. 2 ℳ, für Droſſeln Ko. 1,20, Papageifutter 5 Ko. 3, Prachtfinkenfutter 5 Ko. 2,50, Sittichf. 5 Ko. 2,50, Waldvogelf. 5 Ko. 3, Kanarienſingf. 5 Ko. 3, geriebenes Kraftbiskuit (Verſuch lohnt) Ko. 1,50 mit Sack, u. alle Futterſäm. in Prima-Qualit. billigſt. Niſtſtoffe, Niſtkörbchen u. ſ. w. Preisliſte gratis. Wer einm. beſt., bleibt Kunde. [310]
Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Mehlwürmer, große Futterware, ganz rein, Liter 5 ℳ, Kilo 8 ℳ, Verpack. frei. [311]
Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Ja! Ja! es ist wahr!

Ich verſende nur ſaubere Ware. [312]
Futter für: **Prachtfinken, Reisfinken, Kardinäle, Sittiche, Papageien** (große), **Dompfaff** und **Waldvögel** (als Hänfling, Stiglitz, Zeiſig, Fink) je 5 Ko. 2 ℳ. Bei Entnahme von 3 Poſtkolli füge ich eine ſelbſtthätige Trinkflaſche, ſehr praktiſch für Vögel, **gratis bei.**
H. P. Lange, Samenhdl., Gottesberg i. Schl.

Mehlwurmzüchterei

empfiehlt prima Würmer ℔ 4,— ℳ [313]
F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

Mehlwürmer,

rein reell gemeſſen, Ltr. 4,50 ℳ, Kilo 8,25 ℳ, 1000 Stck. 1,60 ℳ **Anweiſung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer** 30 ₰, **Ameiſeneier,** nur feinſte, ſtaubfreie Ware, pr. Ltr. 80 ₰, Kilo 3,75, 10 Ltr. 7 ℳ, **Weißwurm** feinſter Beſchaffenheit, Ltr. 80 ₰. **Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln, Neſter, Samen** u. a. Preisliſte poſtfrei. [314]
Theodor Frank, Barmen.

Diesjährige konkurrenzloſe

Ameiseneier,

hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, 1 Liter 95 ₰; ferner

Ameiſeneier,

prima Qualität, 1 Liter 80 ₰; [315]

Weisswurm,

hochprima, 1 Liter 90 ₰ liefert ſtets
Wenzel Petzold, Prag 394/I.

Ameiſeneier

prima, geſiebte u. ſandfreie Ware, per Ko. ℳ 3, per 5 Ko. ℳ 14. [316]
Hochprima Qual. per Liter 80 ₰.
Sommerrübſen Ia ſüß
per 5 Ko. ℳ 2,20, per 50 Ko. ℳ 18.
Weiße Silberhirſe
per 5 Ko. ℳ 2,20, per 50 Ko. ℳ 18
empfiehlt **Carl Kämpf, Mainz.**

Prima 2 Lieder pfeifende

Dompfaffen

à 30—40 ℳ offerirt u. Garantie u. 4 Tage Probe [317]
K. Diehl III,
Angersbach, Oberheſſen.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die
Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [318]
Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Geſetzl. geſchützt.

Geſetzl. geſchützt.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.
Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ
Weißwurm, 98er hochprima, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.
Muska, hochf. 98er, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.
Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr. 4½, à Ko. 8.
Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 4, 5 Ko. 19.
Bisquit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.
Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.
Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,60
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,—
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,—
do. algeriſche	„ „ „ „	2,—
do. indiſche	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	4,—

Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [319]
Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter
Poſtſack 5 Ko. no. 2,—
Ausführl. Preisliſten ſämmtl. **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.
J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

1898er hochprima getrocknete und ſorgfältigſt gereinigte [320]

Ameiseneier,

1 Liter mit 85 ₰ liefert
Gottlieb Wanek, Vogelhdl.
Prag (Böhmen).

Vögel.

!!Kanarienvögel!!

Meine weltbekannten, tieftourenreichſten 1898er Sänger ſind in großartigſter Auswahl alle wieder geſangsreif u. beſtens ſortirt. Liefere garantirt reell überallhin, ſteigend nur nach Geſangsgüte, à Stück 10, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ, Nachnahme oder Betrag vorher. [321]
Julius Häger,
St. Andreasberg (Harz).
Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864. Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Harzer Kanarien-Edelroller.

Meine Kanarien gehen hervorragend in ſchönen gebogenen, auch ſchockelnden Hohlrollen, tiefen weichen Knorren, Hohlklingeln, Klingeln, Flöten u. Pfeifen u. ſ. w., Tag- und Lichtſchläger, gebe ab zu 8, 10, 12, 15, 20, 25 ℳ, übernehme jede Garanti für Werth, Geſchlecht, lebende Ankunft, 14 Tage Probezeit, nicht gefallende tauſche um oder zahle Betrag zurück. Vögel mit Geſangsfehler 5—7 ℳ, Wbch. v. 1,50 ℳ an. [322
D. Schmidt, Thale a. Harz, Steinbruchsweg 3.

Zu kaufen geſucht:

Weiße und bunte **Hauben-, Zier-** und **Taucher-Enten.** [323]
August Ferber, Aachen-Burtſcheid.

Anzeigen.

Neuheit!
Vollständig unzerbrechliches
Vogelbadehaus

No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.—
No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50

Gegen Einsendung von **ℳ 1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ 2.—

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

☛ Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige** für **Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc.** mit **sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [324]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Vorzüglich

rein deutlich deutſch ſprechend. **Graupapagei, pracht. Süd-Vogel, kein Schreier u. Beißer, vollſtändig zahm, ſpricht weit über 100 Wörter in ganzen Sätzen, ſingt die Anfänge zweier Lieder, ein Unikum im Sprechen und ſeiner Begabtheit. Sprachverzeichniß zu Dienſten, ſehr gelehrig, lernt täglich Neues. 2 J. hier, ferngeſund und lebhaft, feſter Preis 125 Mk.**

Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Der bezogene Graupapagei für 150 Mk. entſpricht allen Erwartungen, für welche Herr Brühl Garantie übernommen hatte

Rechnungsr. **Schultze, Striesen,** Barbaroſſaſtr. 5

Der Jako ließ ſich ganz vorzüglich an und ſprach innerhalb 8 Tagen alles, was das Sprachverzeichniß enthielt, meine volle Anerkennung.

Hans Gunkel, Maler, **Stuttgart.**

Mit geſandtem Graupapagei bin ſehr zufrieden, ſpricht alles, was Sie angegeben haben.

Frau **Lang, Weiher,** Amt Bruchſal.

Der geſandte Doppelgelbkopf ſpricht wirklich vorzüglich, über mein Erwarten.

Fritz Gurgel, Stolp in Pommern.

Ihre Sendung prachtv. gelungen, alles nach einer Reiſe von 6 Tagen lebend und geſund erhalten.

Eduard Linge, Reval, Rußland

Vorſtehende Schreiben waren in unſerem Beſitz.
Die Redaktion

---

1 hochf. reinſchall echten **Reitzugfink** gibt ab Ad. Markert, Scheibenberg, S. [326]

Kanarienvögel.

Empfehle meine hochtourenreichen Sänger von 8—36 ℳ. Leiſte Garantie für Werth u. leb. Ankunft, gebe 8 Tage Probezeit, tauſche um, evtl. zahle d. Betrag retour. Preisl. fr.

Wilh. Schick, St. Andreasberg i. H.
vormals W. Schwanebeck. [327]

Wegen Aufgabe der Zucht

von **jap. Mövchen** gebe ab: 15 P. ausgeſucht ſchöne, vielfach bewährte Zuchtp., gbbt. u. brbt., à P. 6 ℳ, einzelne Weibchen à 3 ℳ Verp. frei. Außerdem gebe veränderungshalber ab: 2 Zuchtp. **Binſenaſtrilde** à 45 ℳ, 1 P. **Ringel-Gitterflügelaſtrild,** ♂ ſchwarzbürzelig, ♀ weißbürzelig, u. 1 Mnch. Miſchling **Ringelzebrafink** mit 1 Wbch. ſchwarzbürzeligen **Ringelaſtrild,** à P. 30 ℳ Alle Vögel ſind geſund u. ſchön, Verp. frei. **Geſucht:** Wbch. von Diamantf. u. Masken Grasf. u. Mnch. Zebraff. [328]

Hauth, Potsdam, Margarethenſtr. 21.

Wellenſittiche
importirt

bei Abnahme von 20 P. 2,50 ℳ, bei 10 P. 2,75 ℳ, Garantie lebender Ankunft. **Inkakakadu** 25 ℳ per St. [329]

R. Eller, Zoolog. Handlung.
Hamburg 4, Erichſtr. 55.

Rothe Kardinäle,

prachtvolle Sänger, à Mch. 8, 2 St. 15, à P. 12.

Sonnenvögel (chineſ. Nachtig.), abgeh. geſtemp. Mch., à St. 5, 3 St. 14, à Wbch. 1½.

Graue Kardinäle à P. 9, à Mch. 5.

Reisfinken grau, prachtvoll, à P. 2, 3 P. 5½.

do. weiß à P. 7½, 2 P. 14.

Amerik. Spottdroſſeln à Mch. 10, 2 St. 19.

Zebrafinken import. à P. 5½, 3 P. 15.

Japan. Mövchen brbt. à P. 3, 3 P. 8.

Blaue Gebirgsloris à P. 30.

Wellenſittiche importirt à P. 6, 3 P. 17, 10 P. 50.

Kl. Alexanderſittiche à St. 4, à P. 7½.

Pflaumenkopfſittiche à P. 8.

Blumenauſittiche à St. 6.

Schönſittiche à P. 36.

Nymfenſittiche à P. 12.

Hüttenſänger à P. 10, à Mch. 6½.

Schwarzk. Nonnen à P. 1½.

Safranfinken à Mch. 3½, à P. 5½.

Glanzkäfertauben à P. 10.

Chineſ. Zwergwachteln à P. 7½.

Dolchſtichtauben à P. 30.

Kalif. Wachteln à P. 15, à Mch. 6.

Roſenpapageien à P. 25.

Madagaskarweber i. Pr. à Mch. 4.

Graukopf. Zwergpapageien à P. 3.

Dreifarb. Nonnen à P. 3.

Gürtelgrasfinken à P. 10.

Mozambikzeiſige à P. 5, à Mch. 3½.

Edelſänger à P. 6, à Mch. 4.

Witwen à P. 3.

Amaranten, Grisbleus, Goldbrüſtchen à P. 3.

Helenafaſänchen, rothe Tiger-, Band-, Schmetterlings- u. Atlasfinken, Aſtrilde, Feuer- u. Blutſchnabelweber, Broncemännchen, Silberbecks, kl. Elſterchen à P. 2; 5 P. 9½, 10 P. 18.

Wilde Kanarien v. Südamerika à P 6.

Siebenfarb. u. rothe Tangaren à Mch. 22.

Tyrannenvögel à St. 12.

Schwarzkehl. Tangaren à Mch. 15.

Amazonenpapageien, zahm und ſprechend, à St. 30 ℳ ꝛc. ꝛc. [330]

Preiſe in Reichsmark D. W.

J. O. Rohleder,
Leipzig-Gohlis.

Kaufen ſtets **Stieglitze, Hänflinge, Zeiſige** u. **Dompfaffen** in größeren Poſten bei guter Bezahlung.

Gebr. Haas,
[331] **Hofſtetten** b. Gemünden a. M.

Kanarienvögel,

wirkl. echte, tiefe tourenr. Harzer Säng. à 8, 12, 15 ℳ u. höh. je nach Geſangsleiſtung. Weibch. à 2 ℳ Verſ. u. jed. Gar., dah. k. Riſiko. Stamm ſ. 1882 jährl. m. höchſt. Ehrenpr., ſilb. u. **gold. Med.** präm. Wiederverkäufer b. 6 St. Vorzugspreiſe.

W. Walter, Großzüchterei u. Verſ.
[332] **St. Andreasberg** i. Harz 76.

Große Stieglitz-

Männchen Dtzd. 12 ℳ, St. 1,60 ℳ, **rothe Hänflinge** Dtzd. 12 ℳ, St. 1,60 ℳ, **Zeiſige** Dtzd. 11 ℳ, St. 1,50 ℳ, **Kreuzſchnäbel** St. 1,20 ℳ, **rothe Dompfaffen** St. 2,50 ℳ, **Buchfinken** Dtzd. 9 ℳ, St. 1,30 ℳ. Unter Gar. lebender Ankunft.

Gebr. Haas,
[333] **Hofſtetten** b. Gemünden a. M.

Empf. zahme, ſchöne laut ſchlag. Schwarzdroſſel à St. 6 ℳ, gut ſing. Rothhänfl. u. Stieglitze à 2 ℳ, Erlenzeiſige à 1,25 ℳ, Dtz. 10 ℳ, reinweiße Lachtauben, garantirte gute Zuchtp., à P. 5 ℳ, 1 P. dito junge 3 ℳ, gelbe Lachtauben, Zuchtp. 2 ℳ, Harzer Kanarien-Zuchtweibch. à 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, 1,0 Stieglitz mit gelbem Kanarienweibchen, ſchon beide zuſammen Junge gezogen, 4,50 ℳ. **Mehlwürmer,** nur ff. Ware, à Pfd. 3 ℳ Garantie für gute Ankunft. [334]

Aug. Schulz, Zoolog. Handlung,
Breslau I, Altbüßerſtr. 36.

Verk.: 2 hochrothe **Gimpel** à 2 ℳ, 1 ff. **Stieglitz** 2 ℳ, 1 ff. **Rothhänfling** 1,50 ℳ, **Harzer Kanarienh.** à 8—15 ℳ, ff. Zuchtweibchen 1,50 ℳ, für Männchen u. geſunde Vögel Garantie, per Nachn. [335]

L. Loser, Slamen b. Spremberg.
Züchter edler Kanarien.

Weg. Aufg. d. Liebh. verk. m. ausgezeichn. rein. **Naturſänger,** 97 u. 98er **Wildf.,** wie man **ſchöner** ſelt. find.: 1 am. **Spottdr.** 12, 1 **Steinröthel** 12, 1 extra hochf. **Singdr.** 10, 1 **Schamadr.** 50, 1 **Kalanderlerche** 12, 1 P. **Sonnenvög.,** Doppelſchl. 8, 1 pr. ung. **Nacht.** 12, 1 **Mönch** m. herrl. Haidioh-Ueberſchl. u. prachtv. Vorſp. 12, 1 **Haidel.** 5, 1 **Feldl.** 5, 1 ſelt. echt. reinſchall. **Reitzugf.** m. **Schnapp** 30, 1 dgl. ohne **Schnapp** 10, 1 ruſſ. **Sproſſer** ohne **Ratſch.** 25 ℳ, auch ſämmtl. **Käfige** faſt **neu,** ſehr **billig.** [336]

Richter, Scheibenberg 51.

Suche zu kaufen:

2 hochf. zuchtfähige **Lizard-Kanarienweibchen** u. erbitte Offerte. [337]

F. Jünger, Landeck, Schleſ.

Gebe ab: 2 Nachtigalen, Ia, à 15 ℳ, 2 Amſeln à 5 ℳ, 1 Davidzippe 10 ℳ, 1 Blaukehlchen 6 ℳ, 2 Rothkehlchen à 2 ℳ, 2 Schwarzplättchen à 5 ℳ, chineſiſche Nachtigal à 6 ℳ, ſämmtliche Vögel im vollen Geſang u. Ia Sänger. [338]

R. Schneider, Kempten, Bayern.
Vorſtand des Geflügel- u. Vogelzuchtvereins Kempten.

Verkaufe:

1 garantirt laut ſchlagende **Zippdroſſel** u. eine dgl. **Weindroſſel** à 8 ℳ, beide Frühjahrswildfänge, ſowie 1 laut pfeifendes **Rothkehlchen** 3 ℳ, 1 fleißig ſingende **Haidelerche** 5 ℳ [339]

W. Hinz, Berlin W., Bleditſcher 31.

Offerire in Ia Qualität:

Alpenſtiegl., rothe Hänfl., Zeiſige, Buchfinken, Dompfaffen zu billigſten Preiſen per Dtzd. und einzeln. Prachtfinken, Sittiche, Sonnenvögel ꝛc. unter Garantie. Reelle Bedienung. Dankſchreiben z. Dienſten. [340]

W. Wolf, Gefell i. Vogtl.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 8.

Beobachtungen auf einer Gebirgswanderung in Galizien, der Bukowina, Siebenbürgen und Rumänien (Fortſetzung).
Die Frühlingsbotſchaft des Stars.
Die Bewerthung der Kanarienvögel auf den Ausſtellungen (Schluß).
Fremdländiſche Finken (Fortſetzung).
Aus den Vereinen: Leipzig.
Anfragen und Auskunft.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg in allen Annoncen-Expeditionen.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Importirte

echt auſtraliſche Wellenſittiche mit dunkelblauen Naſen, prachtvoll intenſivem Gefieder, richt. Zuchtp. 6 ℳ, 3 P. 16,50 ℳ, 5 P. 25 ℳ, **Wellenſittiche,** ausgefärbte Pare, 5 ℳ, 3 P. 13,50 ℳ, 5 P. 20 ℳ, **Grauköpfchen,** prachtvolle Zuchtpare, 2,50 ℳ, 3 P. 6 ℳ, 5 P. 8,50 ℳ, importirte **Zebrafinken** Zuchtpar 5 ℳ, **Chineſiſche Nachtigalen** (ſelten ſchön), extra ausgeſuchte Doppelüberſchläger, 5 ℳ und von allen in Nr. 7 ausgebotenen Vogelarten noch Vorrath. Reelle Bedienung; Garantie f. lebende und tadelloſe Ankunft. [341]

Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

Suche zu kaufen:

1 **Voliere** und einige **Weichfreſſerkäfige,** gut erhalten. Gefl. Offerten erb. unt. **T. Z.** an d. Exped. d. „Gef. Welt", Magdeburg. [342]

Ein großer, neuer **Vogelkäfig,** ganz aus Metall (verzinnter Blechrohrkäfig) iſt, weil doppelt geſchenkt erhalten, preiswerth zu verkaufen. Derſelbe iſt ca. 100 cm hoch, ca. 100 cm lang und 35 cm tief, mit fein lackirtem, profilirtem Kaſten und ſtarkem Doppelboden verſehen und an den 4 Seiten mit 12 cm hohen gemuſterten Glaswänden umgeben. Der Käfig, welcher eine Drahtweite von 12 mm hat, eignet ſich als Heck- u. Geſellſchaftskäfig. Preis 35 ℳ billigſt. [343]

Otto Nessler, Zſchopau, Sachſen.

Niſtkäſten für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis. [344] **R. Schröter,** Clingen-Greußen.

Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Netzfallen,** kleine 80 ₰, gr. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ, **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** 1 Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [345]

Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112

Illuſtrirte Preisliſte gratis.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [348]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in **praktiſcher** Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [349]

☛ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☚

Arthur Herrmann & Luther, Oschatz i. S.

☛ **Preisliſte über praktiſche**

Vogelkäfige

Aquarien, Terrarien ꝛc. (m. 100 Abb.)

Hochfeine beſt gereinigte

☛ **Vogelfutter** ☚

verſende gratis und franko. [350]

E. Göller, Köln a. Rh.

☛ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Staatspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.

Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [346]

Neues Futter- und Wasser-Gefäss

für die Hecke und für kleine Volieren.

„Wer es einmal im Gebrauch hat, mag es nicht mehr entbehren".

„Man muss es nur gesehen haben, und man wird sofort in lautes Lob ausbrechen".

Beschreibung:

Obertheil: **Glaskugel.** Vorzüge: Man hat schon von weitem einen Ueberblick über die im Käfig vorhandene Nahrung. — Inhalt ca. 1 Liter, füllt selbstthätig nach; Beschmutzen unmöglich.

Untertheil: Glasirtes **Steingut.** Vorzüge: Solide Konstruktion; gefällige Form; bequemste Handhabung; stets reine Nahrung, frischer gesunder Trunk

Preise: 1 Stück franko inkl. Verp. gegen Nachnahme M. 1.60.
2 " " " " " " " 2.60.
6 " " " " " " " 6.—.

Bei Bestellungen per Postanweisung dürfen 20 Pfg. für Porto in Abzug gebracht werden. [347]

Schiffer & Co.

Vogel-Grosshandlung, Futter- und Käfig-Fabrik

Köln.

Filialen: **Nymegen** (Holland), Blumenstrasse 48, 50, 52.
Barmen, Werlestr. 21.

C. L. Flemming

Holzwaarenfabrik

Globenſtein

Post Rittersgrün, Sachsen

empfiehlt: [351]

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.

Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.

Man verlange Preisliste.

ſpät heimkehrten, erwarteten uns ſchon alle bekannten Hermannſtädter Vogelliebhaber in einem Lokal und wir plauderten noch bis zwei Uhr nachts. Frühmorgens um fünf Uhr fuhr ich mit Herrn L. zuſammen nach Schellendorf, Dalmatſch, Dalmatſchel, Pöjga. Am Gebirge wieder angelangt, beſichtigten wir die Landeskrone, und nun ging es zu Fuß am Fluß Alt entlang; wir paſſirten den Rothenthurmpaß, Contermaty und dann das Siebenbürgiſche Zollamt. Rechts, ſowie linker Hand erhoben ſich gewaltige Berge, welche mit den ſchönſten jungen Eichen, Buchen, Haſelnußſträuchern u. a. bewachſen waren, wo man ſchon von weitem den Ueberſchlag der Schwarzplättchen vernehmen konnte, welche dort zahlreich vorkommen.

Es war mittags zwei Uhr, als ich die rumäniſche Grenze überſchritt. Für den Vogelfreund bietet dieſe Gegend an großartigen Naturſchönheiten viel; der Fluß Alt ruft an manchen Stellen durch ſein poetiſches Rauſchen ein derartiges Getöſe hervor, daß man in ſeiner Nähe die dort vorkommenden Vögel kaum zu hören vermag. Die Straße zieht ſich neben dem Fluß im Thal entlang; zu beiden Seiten des Fluſſes ſind unzählige kleine und größere Berge, welche, wie geſagt, mit Haſelnuß, Buchen, Eichengeſträuch dicht bewaldet erſcheinen.

Nach einer längern Wanderung erreichte ich den Ort Künein, wo die Straße ſich theilt; ein Weg führt nach Saladruka, der andere bis Calineſchki am Fluß Olt entlang bis Rimnig. Ich kehrte jedoch zurück, weil ich das Donaugebirge ſchon vor mehreren Jahren bereiſte, und ich als leidenſchaftlicher Touriſt ſuchte doch einige Höhenpunkte zu erreichen, um das ganze Panorama der Tranſylvaniſchen Alpen in Augenſchein zu nehmen. Als ich zurückgekehrt war, hatte ſich unterdeſſen heftiges Regenwetter eingeſtellt, was mir mein Vorhaben vereitelte; ich mußte zwei Tage warten, denn es war unmöglich, bei ſolchem Regen, Sturm und Nebel Hochtouren zu unternehmen. Ich nahm mir dann einen Träger und der Marſch ging durch's Lotirojusthal (an acht Stunden Aufſtieg), um den Höhepunkt des Berg Breske zu erreichen.

(Schluß folgt).

Die Frühlingsbotſchaft des Stars.

Von M. Dankler.

Star, Maikäfer und kleiner Fuchs bilden ein Kleeblatt, welches in jedem Frühjahr eine Gaſtreiſe durch die Spalten der Tageszeitungen antreten und die Ankunft des Frühlings verkünden muß. Alle drei aber ſind falſche Propheten, doch dürfen wir ihnen nichts vorwerfen, denn nur Unkenntniß und Oberflächlichkeit, nicht ſie ſelbſt, haben ſie dazu gemacht.

In den meiſten Jahren wäre es nun vergebens, gegen die alten eingewurzelten Vorurtheile, die ſich dazu noch in ſo vielen Naturgeſchichten gedruckt finden, anzukämpfen. Allein, wer im letzten Winter die Augen aufgemacht hat und ſie im Gegenwärtigen nicht abſichtlich zuhält, der kann ſich durch eigene Beobachtung leicht überzeugen, wie es mit der Frühlingsbotſchaft der drei Geſellen, beſonders auch des Stars beſchaffen iſt. (Mir wurden in dieſem Januar nicht nur Maikäfer und „kleine Füchſe“, ſondern auch Goldkäfer, mehrere Schwalbenſchwänze, Schwimm- und Waſſerkäfer, alle lebendig und munter, überbracht).

Vom Star aber ſchrieb am 15. Januar 1898 eine hieſige Zeitung folgendermaßen: „Geſtern wurde von vielen Perſonen ein Zug Stare, wenigſtens 50 Stück, beobachtet, welche ſchon aus dem Süden zurückgekehrt ſind. Es gilt dies als das Zeichen eines frühen Frühlings“ u. ſ. w. Die Stare waren geſehen worden, dies war Wahrheit, aber auch zugleich das einzig richtige der Notiz. Keiner der Stare, die am 14. Januar geſehen wurden, hatte den Winter im Süden verlebt, keiner hatte die heimatlichen Fluren verlaſſen. Wo waren ſie denn geweſen? Hier bei uns, in unſerer nächſten Nähe. Ihr „Erſcheinen“ war ſomit keine Frühlingsbotſchaft, denn ſie erſchienen eben nicht; ſie waren da, ſie waren nur nicht geſehen worden. Den Beweis für meine Behauptung will ich durch Beobachtungen und Notizen führen und meine eigenen Erfahrungen durch die Beobachtungen eines ausgezeichneten Naturforſchers und Sammlers, des Herrn Omar Wakerzapp, welche dieſer mir in freundlicher Weiſe überließ, vervollſtändigen und ſicherſtellen.

Unſer Star hat ſchon manchem Naturfreund und Naturforſcher „Kopfzerbrechen“ bereitet. Wie lange tobt nicht ſchon der Kampf um die Frage: Iſt der Star ein Zugvogel, ein Standvogel oder ein Strichvogel? Eine heikle Frage, aber nach meiner beſcheidenen Anſicht ein Kampf um des Kaiſers Bart. Er iſt alles und nichts; er ſucht durch die Welt zu kommen, wie es am beſten geht. An meinem Dach niſten zwei Pare, die ich unbedingt zu den Standvögeln zähle, denn ſie halten Stand, trotz der ſtandhafteſten Spatzen. Sie ſind immer da, Sommer und Winter, Frühling und Herbſt. Heute, am 27. Januar, waren ſie im Garten. Es iſt ziemlich hart gefroren. Pünklich erſcheinen ſie auch auf dem Futterplatz. Für Denjenigen, der ſie nur ſieht, wenn ſie klappernd und flügelſchlagend auf dem Dach ſitzen, ſind ſie allerdings nicht da. Im Dezember ſaßen ſie noch manchmal auf einigen wilden Kirſchbäumen, aber ſeit Eintritt der Kälte halten ſie ſich mehr in Hecken und dichtem Strauchwerk auf.

Die großen Scharen aber, die man in dieſem Winter täglich beobachten kann, wie ſie in feſtgeſchloſſenen Maſſen umherſchwärmen und ihre Flugkünſte zeigen, könnte man allerdings inſoweit zu den Strichvögeln rechnen, als ſie tagsüber weite Flüge machen, um ihre Nahrung aufzuſuchen. Dagegen kehren ſie am Abend gewöhnlich an ihre Schlafſtellen zurück. Daß dies im gegenwärtigen Winter der Fall iſt, davon kann ſich Jeder täglich überzeugen, aber in anderen Wintern iſt es gerade ſo. Einige Beobachtungen des Herrn W. in Aachen beweiſen dies vollſtändig. Derſelbe ſchreibt: „In den erſten Tagen des Dezember 1894 ſammelten

mit ſchwarzen Wolken der Vögel, die zum Theil bleiben, zum Theil nach Nordafrika ziehen, wo ſie von Kerbthieren und Würmern, zugleich aber auch von den Beren der Myrthe, des Maſtix und des wilden Olivenbaums leben“. Als Zeugen führt er Karl Zill an, der an dem ſchilfreichen See Fezzara Scharen beobachtet haben ſoll, die zwei deutſche Meilen (?) lang waren und deren Zug die Sonne verfinſtert haben ſoll. Angenommen nun, daß dieſe Beobachtungen auf Richtigkeit beruhen, daß die großen Scharen wirklich von europäiſchen Staren gebildet wurden, ſo kann noch eine zweifache Möglichkeit angenommen werden. Die erſtere, die ich in einem Aufſatz einer illuſtrirten Zeitſchrift vertreten fand, iſt die, daß ein Theil, nämlich die jungen Stare, die noch nicht geniſtet, mit Oktober, November in andere Länder ziehen. Dieſe Anſicht iſt nicht ganz zu verwerfen, doch habe ich darüber noch kein Material ſammeln können. Die zweite Möglichkeit hat ebenfalls in jedem Fall etwas Richtiges für ſich. Der Star iſt nämlich bis weit nach Rußland, ja bis Sibirien verbreitet. Dem ruſſiſchen Winter aber kann er unmöglich Stand halten, da bei der ſparſamen Bevölkerung dieſes Rieſenreichs auch die Futterbiſſen ſchmal gezählt ſind. Die Stare jener Länder mögen alſo Zugvögel ſein, die unſerigen ſind es nicht. Unſer Star hält den Winter bei uns aus, mag es noch ſo mager mit ſeiner Nahrung beſtellt ſein, mag er noch ſo ſchwer um's Daſein kämpfen müſſen. Allerdings räumt ein ſehr ſtrenger Winter fürchterlich unter den armen Vögeln auf, ſodaß manchmal von Hunderten kaum noch Dutzende übrig bleiben werden. Hunger, Ermattung, Raubvögel und rohe Menſchen lichten ihre Reihen, denn die Zahl derjenigen, die unſerer Vogelwelt nachſtellen, iſt ja leider immer größer, als die Zahl derjenigen, die ihnen nicht nachſtellen. Wenn daher mit Ende Februar oder anfangs März der Star ſich aus den ſchützenden Sträuchern und Hecken wieder auf die Dachfirſt ſchwingt und ſeine muntere Strofe erſchallen läßt, ſo können wir immerhin ſeinen Geſang als Frühlingsbotſchaft begrüßen, aber nicht den Star ſelbſt, der uns nicht verlaſſen hat.

(Man nimmt allgemein an, daß der Star bei uns Zugvogel iſt und daß nur in gelinden Wintern einzelne Schwärme hier bleiben. Es iſt beobachtet worden, daß junge Stare bereits im Juni abziehen, die alten dann im September bis November. Viele kommen bei milder Witterung bereits im Januar wieder; wenn es dann kälter wird, verſchwinden ſie u. ſ. w. Im übrigen iſt der Star ein Vogel, der ſich den verſchiedenſten Verhältniſſen anzupaſſen vermag. D. L.).

Die Bewerthung der Kanarienvögel auf den Ausſtellungen.

Von R. Groſſe.

(Schluß).

Von allen Begutachtungen dieſer neuen Einführung, die in der Preſſe laut geworden ſind, iſt eine einzige auf Grund ſachlicher Verwendung des „Zenſurſyſtems“ auf einer ziemlich umfangreichen Ausſtellung abgegeben worden, und dieſes Urtheil, welches doch entſchieden von Werth war, ſprach ſich anerkennend über die Neuerung aus und empfahl dieſelbe allen Vereinen, hielt ſie auch, wenn noch einige Verbeſſerungen vorgenommen würden, für wohl durchführbar und zweckentſprechend. Ich habe allerdings ſpäter in Erfahrung gebracht, daß dieſer Herr Preisrichter trotz ſeiner Wärme, die er für dieſe Bewerthungsart an den Tag gelegt hatte, ſie nicht wieder angewendet hat, weshalb, ich weiß es nicht, aber ich vermuthe, es iſt deshalb geſchehen, weil er nach dem Vorbild vieler ſeiner Amtsgenoſſen es für zweckmäßiger hielt, bei der alten Preisvertheilung der Bequemlichkeit halber zu verbleiben. Alle abſprechenden Urtheile ſind wie erwähnt abgegeben worden, ohne vorhergegangene Prüfung, ob die Neuerung in der That auf Ausſtellungen durchführbar war oder nicht. Zum großen Theil iſt auch der Vorſchlag falſch verſtanden und aufgefaßt worden, auch ſind ihm Aeußerungen in der Preſſe hinderlich geweſen, die ihn „als ſchon recht alt“ bezeichneten. Solche Hinweiſungen aber ſind nur zu ſehr geeignet, Vereine, Züchter und ſelbſt Preisrichter, die ſie leſen, über den ganzen Inhalt, als etwas Verbrauchtes, hinweggehen zu laſſen. Es wird bei einer derartigen geringſchätzenden Beurtheilung oft nicht berückſichtigt, daß „das Alte“, das früher vielleicht, als es neu war, nicht gut geheißen wurde, weil es den damaligen Verhältniſſen nicht angepaßt werden konnte, heute ſehr gut verwerthet werden kann. Kurz, alles mögliche wurde hervorgeſucht, um die Unzulänglichkeit des „Zenſurſyſtems“ nachzuweiſen, und ſo iſt es denn auch den Widerſachern desſelben gelungen, ihm eine weitere Verbreitung vorzuenthalten, wenigſtens iſt wol eine Zunahme der Vereine, welche es anwenden, nicht zu verzeichnen. Aber einen Vortheil hat dieſer Vorſchlag doch zu Wege gebracht, nämlich den, daß das Verlangen nach Beurtheilung der einzelnen Strofen des Vogelliebs mit dieſer Zeit immer mehr in den Vordergrund trat und daß nun die Beſprechungen in der Preſſe und in den Vereinen recht lebhafte wurden. Die Anſichten, welche für die Einzelbewerthungen laut wurden, überwogen und wurden ſelbſt von einzelnen Preisrichtern beſtätigt. Nachdem dann bis zum Jahr 1896 das „Zenſurſyſtem“ zu vielfachen Auseinanderſetzungen Veranlaſſung gegeben hatte und viel über daſſelbe hin und her geſchrieben worden war, wurde der Züchterwelt im März 1897 ein andrer Vorſchlag unterbreitet, der auch recht lebhafte Erörterungen in der Preſſe hervorrufen ſollte. Auf der einen Seite ſtanden die Vereine und Züchter mit ihren Wünſchen nach Einzelbewerthung der Geſangsſtrofen und auf der andern Seite ein großer Theil der Preisrichter, die von ihren alten Gewohnheiten nicht ablaſſen wollten und dabei blieben, das alte „Punktirſyſtem“ genüge allen Anforderungen. Sollte nun ein Ausweg gefunden werden, der geeignet war, die Wünſche nach Einzelbewerthung zu befriedigen, ſo durfte dieſer anderntheils nicht den Anſichten der Preisrichter zuwiderlaufen.

Dieſer Ausweg wurde gefunden. Gelegentlich der Beſprechungen über das „Zenſurſyſtem“ hatten die Preisrichter verſchiedentlich geäußert, daß ſie nach der alten Weiſe, den Werth des Liedes durch eine Geſammtzahl auszudrücken, auch ſchon vor dem Niederſchreiben des Ergebniſſes die einzelnen Strofen des Liedes *im Kopf* bewertheten und daß die Geſammtpunktzahl ſich aus dieſen Endzahlen zuſammenſetze. Gut, was fehlte denn nun weiter, als für alle Preisrichter eine gleiche Strofenbewerthung zu ſchaffen, als die beſtehenden 30 Punkte des alten Verfahrens auf die Geſangsſtrofen zu vertheilen und dadurch eine Handhabe herzuſtellen, mittels welcher alle Preisrichter auf gleiche Weiſe bei der Ausübung ihres Amtes verfahren konnten und durch welche der bereits im Jahr 1892 aufgeſtellte Grundſatz verwirklicht wurde, daß „die Bewerthung des Geſangs nur dann wirklichen Werth haben könne, wenn die Richter überall *von denſelben, alſo gleichen Geſichtspunkten ausgingen*“. Dieſer Arbeit unterzogen ſich zur angegebenen Zeit mehrere Männer und ſchlugen in der Fachpreſſe das nachſtehende Einzel-Bewerthungsverfahren vor. Es ſollen bewerthet werden:

Preisſtrofen:	Die Hohlrolle	bis	7	Punkte
	„ Knorre	„	5	„
	„ Hohlklingel	„	5	„
	„ Schockel	„	5	„
	„ Klingelrolle	„	2	„
	„ Klingel	„	2	„
	„ Pfeifen	„	2	„
	„ Schwirre	„	1	„
	„ Waſſerrolle, Waſſer- „ glucke, kollernde „ Waſſerrolle	„	3	„ jede einzelne.

	Die Koller	bis	4	Punkte
	„ einfachen Glucken	„	2	„
	Für Reinheit	„	8	„
	„ Verbindung u. Zug	„	4	„
Fehler:	Beiwörter, Locken	bis	4	Punkte
	Schnetter	„	12	„
	Züt	„	15	„
	Schapp	„	30	„

Schönheitsfehler, die den Geſang nicht ſtark entwerthen, alſo u. U. zuläſſig ſind, ſind bei den abzuziehenden Punkten aus dem Grunde nicht berückſichtigt worden, weil das ganze Verfahren dadurch zu weitläufig geworden wäre und der lernende Züchter mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hätte. Für dieſe Art Fehler, als Aufzug, ſpitze Pfeifen, ſpitze oder flache Klingeln, geſtoßene Pfeifen und Naſenſtrofen hat der Preisrichter ein ergibiges Bewerthungsfeld in den für Reinheit und Verbindung feſtgeſetzten 8 Punkten; innerhalb dieſer Grenze kann er dergleichen Unebenheiten berückſichtigen. Die Preisgrenzen ſollten die alten bleiben, Vögel, denen bis einſchl. 30 Punkte von drei Preisrichtern zuerkannt wurden, erhielten einen dritten Preis, ſolche bis 60 Punkte einen zweiten und über 60 bis 90 Punkte einen erſten Preis. Durch dieſe Zergliederung des alten Verfahrens wurden die Wünſche der Züchter erfüllt, ohne daß die Preisrichter von ihren bisherigen Gewohnheiten abzulaſſen brauchten. Die Bewerthung konnte durchaus keine größeren Schwierigkeiten verurſachen, als vorher; denn es wurde den Vereinen vorgeſchlagen, gedruckte Liſten anfertigen zu laſſen, in welche die Preisrichter nur die jedesmalige Punktzahl einzutragen hatten. Die Vortheile, welche die veränderte oder richtiger die zergliederte alte Bewerthungsweiſe enthielt, waren unverkennbar; erſtens wurde durch ſie eine einheitliche Bewerthung ermöglicht und andrerſeits konnten auf Grund dieſer Aenderung Preisrichter angelernt werden, was entſchieden für die Geſammtlage der Kanarienzucht von unverkennbarem Vortheil geweſen wäre. Wie ſtellten ſich denn nun die Vereine, Züchter, Preisrichter und die Preſſe zu dieſem Vorſchlag? Anfänglich ſchien es, als würde der letztere mit Freuden begrüßt, es währte jedoch nur kurze Zeit, bis auch an ihm allerhand ausgeſetzt und das alte „Punktirſyſtem“ wieder als das allein richtige hingeſtellt wurde. In welcher Weiſe das geſchah, mögen folgende Beiſpiele erläutern. Im Mai 1897 ſchrieb ein Herr, der ſich öfter in der Fachpreſſe über einſchneidende Fragen hören läßt, daß die Vorſchläge gewiß bei den Preisrichtern und Vereinen volle Anerkennung finden werden und es wäre mit Freuden zu begrüßen, wenn ſie von allen Vereinen durchführt würden. Es könne ja auch den Preisrichtern keine Schwierigkeiten verurſachen, die Vögel nach dieſen Geſichtspunkten zu bewerthen, weil ſie doch in gleicher Weiſe wie zuvor ihre Urtheile abzugeben hätten. Die Vereine, ſo ſchreibt der Herr weiter, würden hierdurch in die angenehme Lage verſetzt, jede Anfrage der Ausſteller nach den Leiſtungen ihrer Vögel eingehend beantworten zu können, kurz, der Schreiber iſt Feuer und Flamme für dieſen Vorſchlag und beglückwünſcht ihn. Das im Mai 1897. Im Oktober 1898 gibt derſelbe Herr wieder ſeine Anſichten über die Einzelbewerthung kund, aber jetzt klingen ſie ganz anders. Er hält es für überflüſſig, für jede Strofe die Punktzahl zu vermerken. Er meint, wenn der Preisrichter die Geſammtpunktzahl niederſchreibt und wenn die einzelnen Strofen niedergeſchrieben werden, ſo weiß jeder Züchter, was ſeine Vögel geleiſtet haben. Vorher macht es den Preisrichtern keine Schwierigkeiten, die Vögel nach dem gemachten Vorſchlage zu bewerthen — jetzt haben ſie ohnehin genug zu thun und ſchreiben auch die guten und fehlerhaften Strofen auf. Im folgenden Monat ſchreibt derſelbe Kenner weiter, daß er das Be- und Entwerthen jeder Strofe für eine große und anſtrengende Arbeit hält, die die Preisrichter in der ihnen zur Verfügung ſtehenden Zeit nicht zuverläſſig ausführen können — vorher iſt es deshalb keine große Arbeit, weil die Preisrichter doch in gleicher Weiſe wie früher ihre Urtheile abgeben. Um das Verfahren als unzulänglich zu kennzeichen, ſtellt er die Behauptung auf, daß bei Handhabung deſſelben ein jeder Vogel einen Preis erhalten werde, ſo z. B. ein Vogel, der folgende Strofen hören läßt:

> 1. eine Hohlrolle (ſehr gut, gebogen), 2. Hohlklingel, 3. Schockel, 4. tiefe Pfeifen, 5. runde Knorre, 6. Klingelrolle, 7. Klingel, 8. weiche Schwirre und als 9. Strofe bringt dieſer wol einzig daſtehende vielſeitige Vogel mit 9 Strofen eine breite Schnetter.

Und wie läßt der Künſtler dieſe Geſangsergüſſe hören, man vergleiche die Punkte nach dem in voriger Nummer aufgeſtellten Plan:

1. Hohlrolle	7	Punkte	(vollendet)
2. Hohlklingel	5	„	„
3. Schockel	5	„	„
4. Pfeifen	2	„	„
5. Knorre	5	„	„
6. Klingelrolle	2	„	„
7. Klingel	2	„	„
8. weiche Schwirre	1	„	(in der angenehmſten Weiſe).

Ja, was ſollen die Preisrichter thun, wenn ſie einen Sänger vor ſich haben, der ſage und ſchreibe 8 Geſangsſtrofen in der denkbar beſten Vollendung vorträgt, dem ſie außerdem noch für Verbindung und Zug 4 Punkte geben müſſen und dieſer Schlingel bringt zuletzt noch eine *breite Schnetter*. Da gibt es doch wirklich keinen andern Ausweg, als ihn der Schnetter wegen ſofort von der Bewerthung gänzlich auszuſchließen. Man höre und ſtaune: Iſt es thatſächlich möglich, durch einen Vogel, der 8 vollendete Strofen hören läßt (gibt es denn unter unſeren jetzigen Vögeln überhaupt einen ſolchen?) das vorgeſchlagene Verfahren entwerthen zu wollen? Nein, ſo wollen wir doch wol nicht urtheilen, der Vogel müßte ja einen Singmuskelapparat haben, der mindeſtens $1^{3}/_{4}$ Meter lang wäre. Aber ich meine, daß Vögel mit breiten Schnettern, Zitt und Schapp überhaupt von der Bewerthung ausgeſchloſſen ſind, und wenn ſo ein Held ja einmal auftauchen ſollte, ſo hat das vorgeſchlagene Verfahren auch dafür geſorgt, daß ihm ſoviele Punkte dafür abgeſchrieben werden, daß er eben keinen Preis erhält. Aber einen andern Zweck verfolgt die Einzelbewerthung, nämlich den, daß ſich nicht jeder Preisrichter die für jede Strofe zu vergebende Anzahl Punkte ſelbſt bildet, ſondern daß hierfür eine beſtimmte Reihenfolge feſtgeſetzt wird, eine Reihenfolge, die von tüchtigen Lehrmeiſtern gelehrt und von den heranzubildenden Preisrichtern befolgt werden ſoll. Ich habe dieſes Beiſpiel der Beurtheilung des veränderten „Punktirſyſtems" angeführt, um den Beweis zu liefern, wie kraftvoll *gegen* daſſelbe gearbeitet wird, ſelbſt wenn man vorher andrer Meinung geweſen iſt und weitere ſachliche Verſuche mit dem Verfahren nicht angeſtellt hat. Ein andrer Gegner dieſer Bewerthungsweiſe iſt der Anſicht, daß dieſelbe nicht imſtande iſt, eine Verbeſſerung im Kanariengeſang herbeizuführen. Die Punkte ſelbſt, welche den einzelnen Strofen zuerkannt werden, ſind dazu allerdings nicht geeignet, wohl aber die guten Lehren, welche jeder ausſtellende Züchter aus dem Verfahren ziehen kann. Das letztere bezeichnet die guten und ſchlechten Leiſtungen der Vögel auf das genaueſte, und ich meine, daß es für den lernenden Züchter nichts Vortheilhafteres gibt, als beſtrebt zu ſein, die ſchlechten Strofen aus ſeinem Stamm zu entfernen und das fehlende Gute ihm einzuverleiben. Wenn er den Werth jedes einzelnen Theils des Liedes auf dem Papier vor ſich hat und dieſe Urtheilsſprüche mit der Wirklichkeit vergleicht und ſie gerechtfertigt findet, ſo wird er auch auf Mittel und Wege ſinnen, etwas Vollkommeneres zu erlangen. Wenn er dagegen nur ein Geſammturtheil über die Leiſtungen ſeiner Sänger in den Händen hat, das ihm nicht ſagt, wo es fehlt, bzl. was fehlt, ſo wird ihm dieſe Möglichkeit genommen. Es tauchen auch in der Preſſe andere Vorſchläge auf, die ich aber der Kürze halber übergehen will. Ich will jedoch nicht unerwähnt laſſen, daß größere Vereine, die den vorgeſchlagenen Plan zur Durchführung gebracht haben, ſich zuſtimmend zu demſelben äußern und ſeine Annahme befürworten. So wird erörtert, daß viele ausſtellende Züchter überhaupt noch nicht wiſſen, was ihre Vögel ſingen, durch die Liſten können ſie es lernen. Das iſt richtig, es kann ihnen auch in den Vereinen klar gemacht werden, wenn in den Sitzungen Vögel nach dieſem Verfahren bewerthet werden. Falſch iſt es dagegen, wenn in Vereinen ein derartiger Vorſchlag begutachtet, bzl. verſucht werden ſoll und es wird, wie es beim „Zenſurſyſtem" geſchehen iſt, geſchrieben: „Es wurden ſämmtliche Touren, jede einzeln, in ihren Abweichungen und wie dieſelben verſchiedenartig vorgetragen werden, erläutert. *Vögel waren zwar nicht zur Stelle* u. ſ. w." Es iſt wol erklärlich, daß die Mitglieder in ſolchen Fällen einen ganz andern Begriff bekommen von einer vorgeſchlagenen Neuerung, die auf ihre Durchführbarkeit geprüft werden ſoll, wenn nicht Gegenſtände vorhanden ſind, die den Beweis für die Anwendbarkeit eines gemachten Vorſchlags liefern können. Es wird auch im weiteren Verlauf der Erörterungen von einem Preisrichter zugegeben, daß die Liſten durchaus keine Schwierigkeiten verurſachen und daß die Preisrichter ſich ſehr bald mit ihnen vertraut machen und ſie leicht handhaben können. Ich könnte noch viele Preßſtimmen anführen, die für die Einzelbewerthung der Geſangsſtrofen laut geworden ſind und ſie andrerſeits bekämpfen, ich will es aber bei dem Geſagten bewenden laſſen. Ich möchte nur noch hinzufügen, daß, wie bei dem „Zenſurſyſtem", ſo auch bei dem letzten Vorſchlage, dem veränderten Punktirſyſtem, die Stimmen, die ſich für beide Neuerungen haben hören laſſen, deshalb beſonders werthvoll ſind, weil ſie ihr Gutachten auf Grund gemachter Verſuche abgegeben haben, während die Gegner ihre abweiſenden Urtheile gefällt haben, ohne ſich vorher von der Zweckloſigkeit, bzl. von der Unbrauchbarkeit der Bewerthungsarten durch ſachliche Verſuche zu überzeugen.

Ich habe im Vorſtehenden die Geſchichte der Bewerthung des Kanarienvogelliedes auf den Ausſtellungen den geehrten Leſern gewiſſenhaft vorzuführen verſucht und glaube nachgewieſen zu haben, daß die Einzelbewerthung der Strofen für alle Züchter von Vortheil iſt und ich gebe mich deshalb der angenehmen Hoffnung hin, daß die mir gütigſt gewährte Veröffentlichung meiner Anſichten in der weit verbreiteten „Gefiederten Welt" alle Kanarienzüchtervereine veranlaſſen wird, die diesbezüglichen Vorſchläge eingehend zu prüfen und daß ſie alle zu dem Ergebniß kommen werden: „Für jeden lernenden Züchter und zur beſſern Beurtheilung des Kanariengeſanges auf den Ausſtellungen iſt erforderlich *die Einzelbewerthung der Strofen des Liedes*!"

* * *

Fremdländiſche Finken.

Von K. Ruß.

(Fortſetzung).

Zu den bekannteren fremdländiſchen Zeiſigen gehört der **Fichtenzeiſig** (Fringilla pinus, *Wils.*): oberſeits olivengrünlichbraun mit zwei weißlichen Flügelbinden, unterſeits grauweiß, jede Feder dunkel geſtrichelt; Schwanz ſtark gegabelt; Augen braun; Schnabel und Füße horngrau. Sein Brutgebiet iſt Britiſch-Nordamerika, vom Stillen bis zum Atlantiſchen Ozean, doch brütet er auch in einigen nördlichen Gebieten, zumal Gebirgsgegenden, der Vereinigten Staaten; auf dem Zuge ſtreicht er durch den größten Theil der Union, ſüdlich bis Mexiko. In der Lebensweiſe und den meiſten Eigenthümlichkeiten gleicht er dem Trauerzeiſig. Er bevorzugt Nadelhölzer (Tannen, Fichten, Wachholder, Cedern), ſucht ſie häufig als Ruhe- und Schutzplätze auf und verzehrt gern ihre Samen (außerdem auch Birken-, Erlen-, Unkrautſamen u. a.). Das Neſt, welches in der Regel ſorgfältig und feſt gewebt wird, hat man im Mai etwa zwanzig Fuß über dem Boden in den Enden horizontaler Zweige gefunden; die vier Eier des Geleges ſind grün, mit rothbraunen Flecken. Der Geſang des Fichtenzeiſigs iſt nicht ſo melodiſch, wie der des Trauerzeiſigs, indeſſen doch wohlklingend. Lebend eingeführt wurde er im Lauf der Jahre nur vereinzelt und fehlt jetzt völlig auf dem Vogelmarkt. Als Nahrung für ihn werden Kraut- und Gräſerſämereien und Nadelholzſamen empfohlen, ſowie als Zugabe weiche Kerbthiere (Blattläuſe u. a.), auch Wachholderberen und Baumknoſpen; zugleich bietet man ihm Tannen- und Kiefernzapfen an, die er gern bearbeitet.

Wenigſtens von Zeit zu Zeit kommt der **Magellanzeiſig** (F. magellanica, *Vll.*) in den Handel; er erſcheint an Kopf und Kehle ſchwarz; Oberſeite olivengrün; Flügel ſchwarz mit zwei gelben Längsflecken; Schwingen gelbgrün gerandet und fahl weiß geſpitzt; Schwanz ſchwarz; ſchmales Halsband gelb; ganze Unterſeite und Bürzel gelb; Augen braun; Schnabel und Füße dunkelbraun. Beim Weibchen iſt der Kopf nicht ſchwarz, ſondern gelbgrün, die Unterſeite graugelblich. Die Heimat erſtreckt ſich über Braſilien und Ekuador. Er ſoll in der Nähe der Anſiedlungen häufig ſein, in die Gärten kommen, ſich leicht fangen laſſen und in Käfigen gehalten werden. In den Handel gelangt er nur von Zeit zu Zeit. Die Züchtung gelang im Jahr 1883 Herrn C. Kerſack in Berlin, doch hat derſelbe leider keinen Züchtungsbericht erſtattet. Man füttert den Magellanzeiſig neben Hirſe mit Rüb- und Mohnſamen, nach der Eingewöhnung auch mit Hanf, Waldbaumſämereien, Grünkraut, ſowie etwas Weichfuttergemiſch. Zur Heckzeit werden als Zugabe kleine weiche Kerbthiere (Blattläuſe, Räupchen u. a.), ſowie ein gutes Nachtigalenfutter gereicht.

Ein Vogel, der in Chile häufig im Käfig gehalten wird, bei uns dagegen nur einmal in den Beſitz eines Liebhabers gelangte, iſt der **bärtige Zeiſig** (F. marginalis, *Bon.*, s. F. barbata, *Mln.*, s. F. campestris, *Gld.*): an Oberkopf und Kehle ſchwarz; Oberſeite düſter bräunlicholivengrün, unterſeits grünlichgelb. Es kommen auch Abänderungen in Weiß und Gelb vor. Seine Heimat erſtreckt ſich über Bolivia, ganz Chile und die Falklandinſeln. Im Benehmen ſtimmt er mit unſerm Zeiſig überein, den er hinſichtlich der Größe übertrifft. Lockton und Geſang ſind ebenfalls dem des europäiſchen Verwandten ähnlich, doch ſoll der Geſang abwechſelungsreicher und voller ſein, ohne die unſchöne Schlußſtrofe. So berichtet C. Landbeck, der ihn in Chile häufig fand. Dort lebt und brütet der Vogel in den Vorbergen der Kordilleren, auch in Wäldern und Obſtgärten; ſein zierliches Neſt ſteht in drei bis ſechs Meter Höhe und enthält vier bis ſechs hellbläuliche Eier. Im Sommer frißt er vorzugsweiſe Kerbthiere und reifende Oelſämereien; im Winter ſieht man ihn auf abgeernteten Weizenfeldern nach den Samen verſchiedener Unkräuter, wie Hederich, wilder Rübſen, ſchwarzer Raps, wilder Rettich u. a. ſuchen. Bei den Chilenen iſt er als Stubenvogel ſehr beliebt und wird in Käfigen aus geſpaltnem Rohr gehalten. Der chileniſche Name iſt Jilgero. Wenn dieſer Zeiſig einmal wieder zu uns in den Handel gelangte, wäre er ebenſo zu verpflegen, wie der vorige.

In derſelben Gegend, doch auch in Peru heimiſch iſt der **Kordillerenzeiſig** (F. uropygialis, *Sclat.*); er erſcheint an Kopf und Hals ſchwarz, oberſeits grün; Unterſeite und ein Theil des Schwanzes gelb. Er lebt im Gebirge, in Höhen von 1550 bis 3100 Meter und ernährt ſich von den öligen Samen der dort wachſenden Pflanzen. Dem Menſchen gegenüber zeigt er ſich ſcheu und vorſichtig. Sein Geſang ſoll beſſer ſein, als der des vorigen. Landbeck meint, er überlebt den Verluſt ſeiner Freiheit nicht lange. Indeſſen iſt er doch ſchon vereinzelt nach Europa gelangt.

Ebenſo vereinzelt eingeführt wurde der **Zeiſig von Kolumbien** (F. columbiana, *Lafr.*); er iſt ſchwarz, Schwingen fahler; ganze Unterſeite gelb; Schwanz bräunlichſchwarz, unterſeits dunkelgrau; Grundhälfte der ſchwarzen Federn am Bürzel weiß; Augen braun; Schnabel grau mit ſchwärzlicher Spitze; Füße grau. Das Weibchen ſoll ober- und unterſeits olivenfarbig ſein, mit ſchwarzem Schwanz und Flügeln. Die Heimat erſtreckt ſich von Coſtarika bis Venezuela und Bolivia.

Einen Vertreter dieſer Gattung aus Aſien haben wir in dem **Himalaya-Stiglitz** (F. caniceps, *Vig.*) vor uns. Er unterſcheidet ſich von unſerm Stiglitz nur dadurch, daß das Band um den Schnabel nicht karmin-, ſondern ſcharlachroth iſt, auch ſchmäler und durch kein ſchwarzes Band vom Schnabel getrennt, ſondern ſich unmittelbar um denſelben erſtreckt; die Kopfſeiten ſind nicht weiß, ſondern hellbraun; der Rücken iſt heller weißlichbraun. Seine Heimat erſtreckt ſich über den Nordweſten des Himalaya. Mein Vater hat den Vogel zweimal erhalten; leider waren die Stücke ſehr ſchlecht im Gefieder.

Damit iſt die Ueberſicht der bisher lebend eingeführten fremdländiſchen Zeiſige erſchöpft. Es gibt außerdem noch eine ganze Anzahl andere Arten in Süd- und Mittelamerika, ſowie Afrika und Aſien. Beſchrieben ſind ſie ſämmtlich in meines Vaters Werk „Die fremdländiſchen Stubenvögel“, Band I. Sie erſcheinen alle den vorbeſchriebenen ähnlich; eine auffallende Art iſt der ſchwarze Zeiſig (F. atrata, *Lfr.*) von Argentinien, der rein ſchwarz mit gelbem Unterleib und Flügelſpiegel erſcheint. (Fortſetzung folgt).

Aus den Vereinen.

Leipzig. Verein der Liebhaber einheimiſcher Vögel. Bericht über die am 11. Januar 1899 im Vereinslokal „Hotel Kranich“, Zeitzerſtr. 12, ſtattgehabte Generalverſammlung. Nachdem die Verſammlung vom 1. Vorſitzenden Herrn P. Roux eröffnet worden iſt, gibt derſelbe einen eingehenden Ueberblick über die Thätigkeit des Vereins während des verfloſſenen erſten Jahrs ſeines Beſtehens. Die Mitgliederzahl iſt von 24 auf 36 geſtiegen. Es wurden 46 Verſammlungen abgehalten, und zwar: zwei ordentliche und eine außerordentliche Generalverſammlung, fünf gemeinſame Sitzungen mit dem „Ornithologiſchen Verein zu Leipzig“ und 38 gewöhnliche Vereinsverſammlungen, die faſt immer gut beſucht waren. Es wohnten 41 Gäſte den Vereinsabenden bei. Im Lauf des Sommers wurden verſchiedene Ausflüge zum Zweck ornithologiſcher Beobachtungen in die Umgebung Leipzigs gemacht. Es wurden eine Anzahl ornithologiſcher Zeitſchriften ſtets im Vereinslokal ausgelegt. Im kommenden Jahr ſollen noch mehrere dazukommen und auch noch einige Fachwerke für die Bibliothek angeſchafft werden. Von den Verſchiedenen Vorträgen, welche gehalten wurden, ſeien erwähnt: „Der Vogel im Volksmunde“, „Sonderbare Niſtſtätten“, „Der Geſang unſerer Laubſänger“, „Meine ornithologiſchen Beobachtungen auf einer Harzreiſe“, „Beobachtungen im Thüringer Walde“, „Beſchreibung der beiden Baumläuferarten“, „Der rothrückige Würger in der Gefangenſchaft“, „Die Pflege des Gelbſpötters in der Gefangenſchaft“, „Die Bachſtelze als Käfigvogel“ und „Praktiſche Käfige für Weichfreſſer“. Von denjenigen Fragen, die aus dem an Vereinsabenden aufgeſtellten Fragekaſten entnommen wurden und über welche ſich ein lebhafter Meinungsaustauſch entſpann, ſind folgende hervorzuheben: „Welches ſind die Geſchlechtsunterſchiede bei Sproſſer, Singdroſſel, Rothkehlchen, Gartengrasmücke und Feldlerche?“ „Verdient der Spötter ſeinen Namen?“ „Gibt es mehrere Arten Hänflinge?“ „Darf man Friſchfängen bei Fütterung mit friſchen Ameiſenpuppen ohne Schaden Waſſer geben?“ „Sind lebende Mehlwürmer den Vögeln ſchädlich?“ „Welche Vogelarten zeigen Gewöllbildung?“ „Wieviel vollſtändige Geſänge kann ein rothrückiger Würger nachſpotten?“ „Wann färben ſich junge Buchfinken aus?“ „Wie füttert man ein Steinröthel?“ — Von verſchiedenen Mitgliedern wurden einige Vögel zu den Vereinsabenden mitgebracht und deren Pflege im Käfig, bzl. deren Züchtung beſprochen, z. B. Schwarzkopf, Gelbſpötter, rothrückiger Würger, Trauerfliegenſchnäpper, Wachtel, Zwergtaucher, Stiglitz-, Zeiſig- und Hänfling-Kanarienbaſtard. Der für den Vogelliebhaber ſo außerordentlich wichtigen Käfigfrage wurde gleichfalls große Aufmerkſamkeit gewidmet und die verſchiedenſten Käfige in den Verſammlungen ausgeſtellt und über ihre zweckmäßigſte Einrichtung Anſichten und Erfahrungen ausgetauſcht. — Nach dieſem Bericht des Vorſitzenden theilt der Kaſſenführer Näheres über die Kaſſenverhältniſſe mit. Es betrugen die Einnahmen $145,_{10}$ Mk., die Ausgaben $61,_{50}$ Mk., ſodaß ein barer Beſtand von $83,_{60}$ Mk. verbleibt. Nachdem die Buchungen geprüft und für richtig befunden worden ſind, wird der Kaſſirer entlaſtet und zur Neuwahl des Vorſtands geſchritten, deſſen ſämmtliche bisherigen Mitglieder wiedergewählt werden, nämlich die Herren P. Roux als erſter, W. Dietze als zweiter Vorſitzender, H. Keſtermann als erſter, J. Henniger als zweiter Schriftführer und Th. Gäſtewitz als Kaſſirer. Sodann wird beſchloſſen, die Verſammlungen im neuen Jahr an jedem erſten und dritten Montag im Monat abzuhalten, damit auch den auswärts wohnenden Mitgliedern ein regelmäßiger Beſuch der Vereinsabende möglich gemacht iſt. Der letzte Theil der Sitzung wird durch gemüthliches Beiſammenſein, das erſt nach Mitternacht ſein Ende findet, ausgefüllt.

H. K.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Friedr. Katheber: Wenn die verſchiedenen im „Handbuch für Vogelliebhaber“ II vorgeſchlagenen und von Ihnen angewendeten Heilmittel bei dem Sproſſer bisher zu garkeiner Beſſerung geführt haben, ſo möchte ich faſt annehmen, daß die Urſache der Erkältung, bzl. des Huſtens noch fortbeſteht. Achten Sie gefälligſt genau darauf, ob der Sproſſer nicht doch irgendwie Zugluft bekommt oder ob am Morgen beim Zimmerreinigen etwa kalte Luft einſtrömt. Vor beidem müſſen Sie ihn auf das ſorgfältigſte behüten. Verſuchen Sie die Anwendung von Natrum nitricum dep. aus der Apotheke, von dem Sie wie ein Hanfkorn groß in einem Schnapsgläschen voll dünnem lauwarmem Haferſchleim auflöſen und dieſes Getränk dem Vogel mehrmals im Tage ſchwach erwärmt reichen. Tritt auch hiernach im Lauf von mehreren Tagen keine Beſſerung ein, ſo unternehmen Sie, natürlich mit größter Vorſicht, die hier in Nr. 52 S. 415 beſchriebene Kur der heißen Waſſerdämpfe.

Zu unſerm Bilde.

Die fremdländiſchen Ammern erfreuen ſich, ebenſo wie die einheimiſchen Arten, keiner beſondern Beliebtheit. Eine Ausnahme bildet die Art, welche die heutige Abbildung zeigt. Sie hat in Herrn Oberleutnant Hauth einen liebevollen Beobachter gefunden, der weitere Kreiſe der Liebhaber auf ihre Vorzüge aufmerkſam machte.

Der ſiebenſtreifige Ammer (Emberiza tahapisi, *Smth.*) iſt am Kopf ſchwarz mit ſieben weißen Längsſtreifen (eine längs der Mitte des Oberkopfs und drei jederſeits auf den Seiten); Kehle grau (nicht ſchwarz); Nacken fahl bräunlichgrau; Mantel und obere Flügeldecken röthlichbraun, jede Feder mit breiter ſchwarzer Mitte; Rücken und übrige Oberſeite ebenſo, doch mehr fahlbraun; Schwingen roſtröthlichbraun und ſchwärzlichgrau; Schwanzfedern ſchwarz, braun außengeſäumt; ganze Unterſeite gelblichbraun; Oberſchnabel ſchwärzlichgrau, Unterſchnabel gelb; Augen braun, mit weißem Kranz von Perlfederchen umgeben; Füße fleiſchfarben. Dem Weibchen fehlt die ſchwarze Färbung; der Oberkopf iſt bräunlichgrau, ſchwärzlich ſchaftſtreifig; die Streifen auf dem Kopf ſind nicht weiß, ſondern fahl roſtröthlichgrau; das übrige Gefieder iſt wie beim Männchen, nur fahler. Seine Heimat erſtreckt ſich über Oſt-, Inner- und Theile von Weſtafrika; auch in Arabien ſoll er vorkommen. In Abeſſinien fand ihn Th. von Heuglin in kleinen Familien oder parweiſe bis etwa 2000 m hoch meiſtens neben Wildbächen auf Lichtungen und Felſen, doch auch in der Nähe menſchlicher Wohnungen, auf Zäunen in den Gärten und auf Weideplätzen. Seine Eigenthümlichkeiten ſind erſt durch die Züchtung in der Vogelſtube erforſcht worden. Er gehört leider zu den größten Seltenheiten im Handel und iſt erſt im letzten Jahrzehnt von Zeit zu Zeit eingeführt worden. In den achtziger Jahren erhielt nur A. F. Wiener vereinzelt ein Männchen. Im Jahr 1893 erwarb Herr Oberleutnant Hauth ein Par, deſſen Züchtung noch in demſelben Jahr gelang. Die ſiebenſtreifigen Ammern zeigten ſich in der Vogelſtube als lebhafte, zutrauliche Vögel, gewandt und zierlich in ihren Bewegungen; ihr Flug iſt leicht, lerchenartig ſchwebend, bei den Spielen des Pärchens reißend ſchnell. Der Geſang beſteht aus einer kurzen, einfachen, angenehm klingenden Strofe. Zur Brut benutzte das Pärchen ein freihängendes offenes Korbneſt hoch unter der Decke. Als Bauſtoffe wurden zunächſt allerlei gröbere Reiſer, Mos, Strohhalme und Baſtſtreifen benutzt; die daraus geformte Mulde wurde mit Faſern von Manilahanf und Kälberhaaren weich ausgelegt. Das Weibchen baut allein, wie es auch allein brütet und die Aufzucht der Jungen faſt ohne Hilfe des Männchens beſorgt. Das Gelege beſteht aus drei Eiern, die auf weißlichgrauem Grund lehmfarbig gepunktet und gefleckt ſind, am dickern Ende mit Fleckenkranz. Das Jugendkleid gleicht dem Gefieder des alten Weibchens. Herrn Hauth gelang die Züchtung dieſer Art mehrmals.

K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Futtermittel.

1898er hochprima getrocknete und ſorgfältigſt gereinigte [352]

Ameiseneier,

1 Liter mit 85 ₰ liefert

Gottlieb Wanek, Vogelhdl.

Prag (Böhmen).

Mehlwürmer, 1000 St. g. vorh. Einſend. v. 1,50 ℳ i. Briefmark. franko, verſendet [353

D. Waschinsky, Berlin N.W., Wilsnackerſtr. 63.

! Gut gereinigtes Vogelfutter !

ohne jede weitere Anpreiſung wie Ia, prima u. a., verſende nur wirkl. beſte Ware.

Sommerrübſ.	5 Ko.	1,70 ℳ,	1 Ko.	40 ₰
Glanzkorn	„ „	1,80 „	„ „	30 „
Silberhirſe	„ „	1,80 „	„ „	40 „
Schälhafer	„ „	1,80 „	„ „	40 „
Senegalhirſe	„ „	2,00 „	„ „	50 „
Sonnenroſenk.	„ „	1,80 „	„ „	50 „
Hanf	„ „	1,60 „	„ „	40 „
Carottengries	„ „	4,50 „	„ „	110 „
Droſſelfutter	„ „	4,00 „	„ „	100 „
Nachtigalfutt.	„ „	7,00 „	„ „	200 „

Ameiſeneier 1 Lit. 80 ₰, 10 Lit. 7,50 ℳ.

Alle anderen Futterſort. bill. Prsl. frei. [354]

H. P. Lange, Samenhdl., **Gottesberg** i. Schl.

Vom Besten

das Beſte. 98er **Ameiſeneier Ia** Ko. 3 ℳ, Prima ſchneeweiße Tiroler Ltr. 1 ℳ, **Elbe-Weißw. Ia** Ko. 3,50, Ltr. 80 ₰, **Mehlwürmer Ia,** rein, Liter 4,50 ℳ, **Univerſalfutter** prima, f. zarte Inſektenfreſſer Ko. 2 ℳ, für Droſſeln Ko. 1,20, Papageifutter 5 Ko. 3, Prachtfinkenfutter 5 Ko. 2,50, Sittichf. 5 Ko. 2,50, Waldvogelf. 5 Ko. 3, Kanarienſingf. 5 Ko. 3, geriebenes Kraftbiskuit (Verſuch lohnt) Ko. 1,50 mit Sack, u. alle Futterſäm. in Prima-Qualit. billigſt. Niſtſtoffe, Niſtkörbchen u. ſ. w. Preisliſte gratis. Wer einm. beſt., bleibt Kunde. [355]

Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Mehlwürmer, große Futterware, ganz rein, Liter 5 ℳ, Kilo 8 ℳ, Verpack. frei. [356]

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

= Diesjährige konkurrenzloſe =

Ameiseneier,

hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, 1 Liter 95 ₰; ferner **Ameiſeneier,** **prima Qualität,** 1 Liter 80 ₰; [357]

Weisswurm,

hochprima, 1 Liter 90 ₰ liefert ſtets

Wenzel Petzold, Prag 394/I.

Ameiſeneier

prima, geſiebte u. ſandfreie Ware, per Ko. ℳ 3, per 5 Ko. ℳ 14. [358]

Hochprima Qual. per Liter 80 ₰.

Sommerrübſen Ia ſüß

per 5 Ko. ℳ 2,20, per 50 Ko. ℳ 18.

Weiße Silberhirſe

per 5 Ko. ℳ 2,20, per 50 Ko. ℳ 18

empfiehlt **Carl Kämpf, Mainz.**

Mehlwurmzüchterei empfiehlt und verſ. **prima Würmer** nach allen Gegenden, Pfd. 4 ℳ, größere Quantitäten billigſt. [359]

H. Riedel,

Berlin O., Zorndorferſtr. 17, Quergeb. 4 Tr.

Vögel.

Geſucht: Granataſtrilde, Buntaſtrilde, **Wiener's Aſtrilde, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen.**

F. Beedzler, [360]

20, Norton Folgate, **London** (England).

Geſucht: ♀ rothk. Pap.-Amand. u. **♀ blauköpf. dito.** [361]

Blume, P., **Großeutersdorf** (Kahla).

Singender Sprachmeiſter 7 ℳ, rothrückiger Würger, vorzügl. Spötter, 8 ℳ, Kleiber 3 ℳ, lautſchlag. Fink 4 ℳ, Schwarzplättchen 7 ℳ, Dorngrasmücke 3,50 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Blau- und Sumpfmeiſen P. 2,50 ℳ, ſing. Schwarzdroſſel 7 ℳ, Rothhänfling, guter Sänger, 3 ℳ, Sperbergrasmücke 5 ℳ. [362

Säger, Berlin, Andreasſtr. 39.

Graupapagei,

ſelbſt angelernt, ſpricht faſt 500 Worte in Sätzen, wunderſchöner heller Kongovogel, ſehr lebhaft, ſpricht den ganzen Tag in einem fort, tadelloſes Gefieder, für Männer fingerzahm, gebe 14 Tage per Nachn. auf Probe. Sprachverzeichniß gegen Retourmarke. [363]

W. Isaaks, Landbriefträger,

Harburg (Elbe).

Nachſtehende Anerkennungsſchreiben ſind in meinem Beſitz:

Bin mit dem Jako ſehr zufrieden, es iſt einer, wie ich mir ſchon lange gewünſcht habe; es iſt wirklich ſtaunenswerth, was er alles leiſtet. Beſten Dank für die ausgezeichnete Bedienung.

E. Lindemeyer, Uhrm., **Ebingen** (Württ.).

Der Jako gut angekommen, bin ſehr zufrieden; hat auch ſchon geſprochen.

A. Dullin, Poſtſchaffner, **Bentſchen.**

Der letzte Jako war großartig im Sprechen und Singen, habe Sie beſtens empfohlen.

E. Dreyer, **Steele** a. d. Ruhr.

Gebe ab: 1 Schama, großartig. Spött., 40, 1 Feldlerche, fleiß. Säng., 1 Flüg. etwas häng., 3, 1 ung. Sproſſ., gut. Schläg., 15, tauſche auch letzt. auf gleichwerth. Hohlroller, geſ. Empfang garantirt. Verpack. frei. [364]

A. Nickel, Bildh., **Gleiwitz, O.-S.,** Kloppotſtr. 12.

Waldvögel.

Kreuzſchn., roth,	Dtz.	9,— ℳ,	St.	1,25-1,50
„ grün	„	8,—	„ „	0,80-1,—
„ grau	„	6,—	„ „	0,60-0,75
Alpen-Stiglitze	„	12-15	„ „	1,25-1,50
Zeiſige	„	9-10	„ „	0,80-1,—
Hänflinge, roth	„	12-15	„ „	1,25-1,50
grau	„	7-9	„ „	0,75-1,

[365] **D. Schmidt,**

Thale a. Harz, Steinbruchsweg 3.

Unentgeltlich

gebe ich Liebhabern von ferbthierfreſſenden Vögeln ab: 1 Baumpieper, 1 Sproſſerweibch., 1 Spötterweibch., 1 Droſſelweibch. [366]

General **v. Stwolinski, Wiesbaden.**

Die Samen-Großhandlung

von

Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [367]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Hochfeine prämirte

Harzer Edelroller

(Stamm Trute), welche vorzüglich in Hohlrolle, Knorre, Klingelrolle, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 8, 10, 12, 15, 20 ℳ. Zuchtweibchen 1,50 ℳ verſende gegen Nachn., bei achttägiger Probe. Nichtgefallende tauſche um, ev. Betrag zurück, gebe zwei St. Zuchtweibchen gratis bei. [368]

Wilh. Koye, Thale, Harz

Feinste Kanariensänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [369]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.

Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

Fledermäuse,

lebend, 1 Par 3 ℳ, 10 Stück 8 ℳ, **Lachtauben** 10 Par 12 ℳ, **Sommer-Fröſche** und **Schlangen.** [370]

F. Grill, Vogelhändler,

Wien, II. Bez., Haidgaſſe 12.

1898 erhielt mein Stamm **Harzer Kanarienvögel** 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.

Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [371

Harzer Kanarienvögel

(Truteſche Hohlroller),

Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. i. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel, Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis** und **franko.** Weibchen deſſelb. Stamms 2,50 ℳ [372]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Harzer Kanarien,

ſehr gute Sänger, werden wegen Aufgabe der Zucht zu herabgeſetzten Preiſen abgegeben.

W. Böcker, Kontroleur, **Wetzlar.** [373

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe noch **8 St. Harzer Kanarien-Zuchtweibchen** und **3 Hähne** zu verkaufen.

Wilhelm Maushaacke, Schuhm.,

Crottorf, Prov. Sachſen. [374]

---

1 hellſchlagende ff. Nachtigal, Garantie f. leb. Ank. u. reinen Naturſchl., à 12 ℳ, **1 ff. Schwarzdroſſel** in voll. Schlag 6 ℳ. [375]

F. Wagner, Würzburg, Domerſchulg. 17.

Wer liefert unter voller Garantie für ſtreng reelle Bedienung **prima Sänger,** parweiſe, zwecks Anſiedelung in Park-Anlagen? Offerten geeigneter Vogelarten, auch Nachtigalen und Sproſſer, erbittet **Aug. Gottlieb,**

[376] **Hersfeld** (Heſſen-Naſſa.

Gebe ab: 1 P. ſchwarzköpf. **Gouldsamandinen** 24 ℳ (♂ in Pracht, ♀ halbjährig, unausgefärbt), 1 P. ſpitzſchwänz. **Gürtelamandinen,** niſtluſt., 12 ℳ u. 1 Mnch. dreifarbige (blauköpfige) **Papageiamandine** 15 ℳ. Alle zuſammen 46 ℳ. [377]

Suche: 1 Zuchtp. weißbäckige **Gürtelamandinen** (Sperm. leucotis).

Friedrich Groh, Bankbeamter,

Karlsruhe i. B., Morgenſtr. 45.

Anzeigen.



No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ **1.–**
No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ **1.50**
Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.–**

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige für Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc. mit sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen franco und gratis zu Diensten. [378]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.



F. Rejsek,
Hamburg, Peterstr. 28.
Specialität
Papageien und Papageien-Käfige
mit Porzellannäpfen. Versandt nach überall. [379]

Holländer Kanarien.

Suche 2,4 **Prima Pariſer Trompeter,** voll und ſchön befiederte Vögel; nur tadelloſe, preiswerthe Thiere offeriren. [380]
Adolf Paluka.
Constantinopel, Grande Rue de Péra 388.

Harzer Kanarien-Edelroller.

Meine Kanarien gehen hervorragend in ſchönen gebogenen, auch ſchockelnden Hohlrollen, tiefen weichen Knorren, Hohlklingeln, Klingeln, Flöten u. Pfeifen u. ſ. w., Tag- und Lichtſchläger, gebe ab zu 8, 10, 12, 15, 20, 25 ℳ, übernehme jede Garanti für Werth, Geſchlecht, lebende Ankunft, 14 Tage Probezeit, nicht gefallende tauſche um oder zahle Betrag zurück. Vögel mit Geſangsfehler 5—7 ℳ, Wbch. v. 1,50 ℳ an. [381]
D. Schmidt, Thale a. Harz, Steinbruchsweg 3.

Waldvögel.

Stiglitze 1,30, Dtz. 12 ℳ, rothe Hänflinge 1,20, Dtz. 10 ℳ, Buchfinken 0,80, Dtz. 8 ℳ gelbe Zeiſige 1,20, Dtz. 11 ℳ, grüne Hänflinge 1,20 ℳ, rothe Dompfaffen 2,50, P. 3,50 ℳ. Garantie lebender Ankunft. [382]
Georg Mergler, Vogel-Export,
Hofſtetten b. Gemünden.

1 **Wachtel**-Männchen mit 3 Weibchen 10 ℳ, 3 ſchöne **Schwanzmeiſen** 5 ℳ, 2 P. **Goldhähnchen** à P. 4 ℳ, 1 prima **Haidelerche** 6 ℳ, 1 ſchöne **Schamadroſſel** (vorzügl. Imitator) 37 ℳ geg. Nachnahme. Zuſendung franko. [383]
Jos. Ehrlich, Würzburg, Zellerſtr.

Prima-Hohlroller,

Stamm mehrfach prämirt, flotte, lebhafte Sänger, bei Tag und Licht, gehen in Schockel, Hohlrolle, Knorren, Klingel und Dupfeifen, zu 7, 8, 10, 12, 15 ℳ, Zuchtweibchen 1,50 ℳ. Garantie f. leb. Ank. [384]
M. Franz, Kanarienzüchterei,
Pirna a. E.

Kaufen ſtets **Stiglitze, Hänflinge, Zeiſige** u. **Dompfaffen** in größeren Poſten bei guter Bezahlung.
Gebr. Haus.
[385] **Hofſtetten** b. Gemünden a. M.

Hochfeine
Harz. Edelroller
(Stamm Trute),
welche vorzüglich in tief. gebog. u. geraden Hohlrollen, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Klingel, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 6, 8, 10, 12 u. 15 ℳ, Dtz. 60, 72, 84 und 96 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, verſende gegen Nachn. 6 Tage Probezeit. Nichtgefallendes tauſche um, ev. Betrag zurück. [386]
Herm. Voigt, Thale a. Harz.

Wellenſittiche
importirt
bei Abnahme von 20 P. 2,50 ℳ, bei 10 P. 2,75 ℳ, Garantie lebender Ankunft. **Inkakakadu** 25 ℳ per St. [387]
R. Eller, Zoolog. Handlung.
Hamburg 1, Erichſtr. 55.

Kanarienvögel,
wirkl. echte, tiefe tourenr. Harzer Säng. à 8, 12, 15 ℳ u. höh. je nach Geſangsleiſtung. Weibch. à 2 ℳ. Verſ. u. jed. Gar., dah. k. Riſiko. Stammſ. 1882 jährl. m. höchſt. Ehrenpr., **ſilb. u. gold. Med.** präm. Wiederverkäufer b. 6 St. Vorzugspreiſe.
W. Walter, Großzüchterei u. Verſ.
[388] **St. Andreasberg** i. Harz 76.

Große Stiglitz-Männchen Dtzd. 12 ℳ, St. 1,60 ℳ, **rothe Hänflinge** Dtzd. 12 ℳ, St. 1,60 ℳ, **Zeiſige** Dtzd. 11 ℳ, St. 1,50 ℳ, **Kreuzſchnäbel** St. 1,20 ℳ, **rothe Dompfaffen** St. 2,50 ℳ, **Buchfinken** Dtzd. 9 ℳ, St. 1,30 ℳ. Unter Gar. lebender Ankunft.
Gebr. Haus.
[389] **Hofſtetten** b. Gemünden a. M.

Harzer Kanarien-Roller mit Nachtigaltouren zu 6, 8 ℳ, edle Roller v. 10 ℳ an, **Harzer Vogelkäfige** u. Utenſilien, Geflügelkäfige, Poſtverſandt-Kiſten u. ſ. w. Preisl. frei. [390]
Ad. Janson, Lauterberg, Harz.

Suche zu kaufen:
2 hochf. zuchtfähige **Lizard-Kanarienweibchen** u. erbitte Offerte. [391]
F. Jünger, Landeck, Schleſ.

Feinſte
Edelroller!
mit den ſchönſten Touren, zart, tief und lang, noch ein Poſten ff. Frühbrut-Heckvögel, Dutz. 90 ℳ, Probevogel 10 ℳ, 14 Tage Probe gegen Nachnahme. [392]
A. H. Pütsch, Spezial-Züchterei,
Schönhauſen a. Elbe.

Meine ſelbſtgezüchteten ff.
Kanarienſänger
verſende vom 1. Novbr. ab, unter Garantie des Werthes und lebender Ankunft, zu 9, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ à St. [393]
Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, 146.
NB. Bei Anfrage Rückporto erbeten.

Bücher-Anzeigen.

Gefiederte Welt, 94, 95 (in Originalbänden), 96 (geheftet), wie neu, vertauſche geg. **Briefmarkenſammlung.** [394]
Fritz Müller, Buchhalter, **Bruch** i. Weſtf.

Graupapagei
Von

In unſerem Verlage erſchien:
Der Graupapagei,
ſeine Naturgeſchichte, Pflege und Abrichtung.
Von
Dr. Karl Ruß.
Mit einem Aquarelldruck u. 3 Holzſchnitten im Text.
Preis: geh. M. 1,80; eleg. geb. 2,40.
Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in Magdeburg.

Für Aquarienliebhaber!
Im unterzeichneten Verlage erſcheint
Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde
herausgegeben von **Dr. E. Bade.**
(Monatlich zwei Nummern.)
Preis: halbjährlich Mk. 2.—.
Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von August Hopfer in Burg b. M.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 9. Magdeburg, den 2. März 1899. XXVIII. Jahrg.

Beobachtungen auf einer Gebirgswanderung in Galizien, der Bukowina, Siebenbürgen und Rumänien.

Von Joſef Wagner.

(Fortſetzung).

Die Wege waren durch den heftigen Regen ſehr aufgeweicht, ſodaß es an Schmutz nicht fehlte, denn es ging öfter bis über die Knöchel im Koth. Das naſſe Laub, welches auf dem ſchmalen Fußweg lag, war von den Hunderten von Schafen, welche da oben auf der Weide ſich befanden, ſehr zertreten. Dann und wann begrüßten uns ein oder mehrere Schäferhunde, welche ſich als bösartige Beſtien zeigten, ſodaß ich öfter mit dem langen Bergſtock abwehren mußte, einigemal ſogar aus dem Revolver blinde Schüſſe abgab. Auch hier überraſchte uns wieder ein kleiner Regen, aber was half es, wir mußten ruhig weitergehen, da wir uns nicht ſetzen konnten, denn es war zu naß. Mittlerweile ſchien von Zeit zu Zeit ein Sonnenſtrahl durch das Regengeſtäube, der wieder alles anmuthig machte und den Geſang der Vögel hervorrief. Finken, Rothkehlchen, Schwarzplattel, Zaunkönige, Amſeln, Baumpieper und viele andere Arten begleiteten uns auf dem Weg, welchen wir anfangs durch Halbwuchs von Buchen, Eichen und gemiſchtem Beſtand machten.

Je höher ich hinauf gelangte, deſto wärmer wurde es und deſto dichter wurde die Waldung, die ſchönſten Fichtenſtämme konnte ich bis 1600 Meter Höhe über dem Meeresſpiegel ſich erheben ſehen. Die Thäler ſind zum großen Theil mit Laubholz bewaldet, dagegen die höheren Regionen meiſt mit Nadelwald; Tauſende von Schafen konnte ich an den Bergen auf der Weide herumlaufen ſehen, welche den ganzen Sommer in Freiheit bleiben. Die Grundeigenthümer dieſer Alpen ſuchen mit Vorliebe große Theile auf den hohen Bergen abzubrennen, damit der Baumwuchs vernichtet und der Graswuchs damit erreicht, um für die Schafe und auch für Rindvieh (beſonders Jungvieh) genügend Weide zu beſchaffen. Bei allen dieſen Beobachtungen hatte ich ſo ziemlich unſer Ziel erreicht; es war die Touriſtenhütte an der Breske, die vom Siebenbürgiſchen Karpathen-Verein erbaut iſt, wo nun unſer Nachtlager aufgeſchlagen wurde.

Inzwiſchen hatte ſich der Himmel etwas aufgeklärt und ich verſuchte nun den Gipfel zu erreichen. In kleinen Wachholderſträuchern konnte ich die Ringdroſſel öfter beobachten, auch Brachpieper und, was mich am meiſten intereſſirte, Alpenflüevögel, die öfter längere Zeit ihren Geſang hören ließen. Am Gipfel angelangt, war es hell und klar geworden, ſodaß ich eine Ausſicht hatte über die ganze Tranſylvaniſche Alpenwelt. Dies herrliche Panorama wird mir in ewigem Andenken bleiben. Während ich beinahe zwei Stunden da oben verweilte, beobachtete ich auch den Steinſchmätzer.

Von weitem zeigten ſich indeſſen ſchwarze, düſtere Wolken, es kam ein großes Gewitter in der Richtung vom Porkó-Paß herüber; wenige Minuten waren vergangen, ſo kam ſchon ein heftiger Sturm, von einem Nebel begleitet. Ich war im Augenblick dermaßen von Nebel eingehüllt, daß ich auf zehn Schritt keinen Strauch zu ſehen vermochte und meine äußerſte Anſtrengung nöthig hatte, um die Touriſtenhütte wieder zu finden. Der Abend brach allmählich herein, es wurden Konſerven zum Abendbrot gekocht, die Kleidungsſtücke waren wieder trocken und die nächtliche Ruhe wurde nun in unſerer Hütte aufgeſucht; mittlerweile brachen derartige heftige Gewitter los, wie ich ſie in den Alpen noch nie erlebt habe.

Sehnſuchtsvoll erwartete ich das Tageslicht, bis endlich Regen und Sturm nachgelaſſen. Der Morgen zeigte ſich trübe, ganz in Nebel eingehüllt, gegen acht Uhr klärte ſich der Himmel, die Sonnenſtrahlen brachen durch und zeigten an, daß noch ein ſchöner Tag bevorſtand. Inzwiſchen wurde Thee zum Frühſtück gekocht und ein Stückchen altbacknes Weißbrot dazu gegeſſen; ſobald ſich der Nebel klärte, ging es ſchnell wieder in's Freie, um die herrliche Ausſicht noch einmal zu gewinnen. Leider waren alle Thäler noch mit Nebel gefüllt.

Sobald die Sonnenſtrahlen ihre Wärme zeigten, erhob ſich ein herrlicher Vogelgeſang aus den Waldungen in der Nähe der Touriſtenhütte. Es ſchien, als wollten die kleinen gefiederten Lieblinge nach einer ſo gewitterſchweren Nacht den im Anzuge befindlichen ſchönen Tag mit freudigem Jubelgeſang begrüßen; **Rothkehlchen**, **Singdroſſeln**, **Schwarzplättchen**, **Zaunkönige**, **Laubvögel**, **Finken** u. a. waren in Unmaſſen dort und das Vogelleben ein ſo reichhaltiges, wie ich es nie in dieſem Gebirge erwartet hätte. Das Erdreich iſt, wie ſchon bemerkt, ſehr gut; infolgedeſſen ſtrotzen in den Waldungen Kräuter und Sträucher bis zu den größten Bäumen vor guter Nahrung, auch Waſſerquellen und Bäche ſind genügend vorhanden. Die hohen Regionen, wie ſchon bemerkt, umgrenzen meiſt Fichtenwälder; als ich aber einige hundert Meter niedriger kam, war der ſchönſte Beſtand von Laubwald, meiſt Eichen, Buchen, Birken, Haſelnuß u. a., zu ſehen; wenn auch kein Urwald, war es doch großer Halbwuchs, ſo gerade geeignet als Niſtgebiet unſerer heimiſchen Sänger. Tauſende von Vogelgeſängen aller Arten erſchallen wetteifernd aus dieſem herrlichen Eldorado und ſo manchen Primaſänger kann man heraushören. Beſonders machten mir die **Rothkehlchen** Freude, wenn ich den dortigen Stamm inbezug auf Geſang mit den unſerigen in der Provinz Brandenburg vergleiche. Immer wieder hebe ich hervor, daß wir bei uns in den Märkiſchen Wäldern nur Stümper an Rothkehlchenſängern beſitzen, im Verhältniß zu den Oertlichkeitsraſſen.

Der Tag war wirklich ein ſchöner geworden, die Sonne glühte und trotzdem es bergabwärts ging, wurden Tauſende von Schweißtropfen verloren; nach 6 Stunden erreichten wir das Dorf Jotſch, welches einen echt rumäniſchen Charakter zeigt; der Schmutz, der infolge des großen Regens entſtanden, hatte ſich dermaßen angeſammelt, daß es bald unmöglich war, auf dem Fahrweg, der durch das Dörfchen führt, vorwärts zu kommen. In einem kleinen Wirthshaus hielt ich ein einfaches Mahl (einige Semmeln nebſt Rothwein) und der Marſch ging dann im Thale, einige kleine Ortſchaften noch berührend, immer weiter, bis wir den Ort Reſchina erreichten und dort übernachteten. Reſchina iſt ein echt rumäniſches Bauerndorf, in dem ſehr wenig oder faſt garkein deutſches Wort geſprochen wird. Ich nahm wieder einen Träger, einen Rumänier, der kein Wort Deutſch verſtand, und frühzeitig ging die Reiſe weiter. Einige Minuten, nachdem wir das Dorf verlaſſen hatten, begegneten wir Weidevieh, das augenſcheinlich von der echten Büffelart abſtammte. Der Weg führte dicht am Bergabhange neben einem rauſchenden Fluß entlang, wobei einige kleine Mehlmühlen ihr klapperndes Geräuſch hören ließen. In vielen Windungen ging es dann bergaufwärts, wobei das ſchönſte Eichengebüſch zum Vorſchein kam. Der Morgen war wieder herrlich, die Sonne ſchien ſehr warm und alle die dort vorkommenden Vögel ließen Lockrufe, Geſänge u. a. erſchallen. Beſonders häufig ließ ſich das **Schwarzplattel** hören, auch **Amſeln**. Auf ſchattigem Raſen unter einem Eichenſtrauch wurde das Frühſtück eingenommen.

Ich war infolge der Anſtrengung ſehr ermattet, und jede Quelle, jeder Waſſergraben wurde ſchon mit Sehnſucht empfangen, um den Durſt zu befriedigen. Es ging nun immer weiter und gegen zwei Uhr nachmittags hatten wir unſer Ziel erreicht, den herrlichen Flecken Baldiniſch, der ſchönſte Punkt der Tranſylvaniſchen Alpenwelt. Nebenbei will ich noch bemerken, als wir durch den freien Fleck Redina kamen, beobachtete ich die Tollkirſche in ſolchen Maſſen, wie ich ſie noch nie geſehen hatte. Baldiniſch, welches eine prächtige Lage hat, umgeben von den ſchönſten Fichtenwaldungen, gewährt eine gewaltige Ausſicht. Nach einem kleinen Genuß von Thee und trocknem Maisbrot, der infolge der Ermattung nöthig war, nahm ich mein erreichtes Ziel in Augenſchein, o, wie wundervoll zeigt ſich die Natur! (Schluß folgt).

Bilder aus dem Leben unſerer Wintervögel.

Von L. Aelbert.

Die ſchönen Herbſttage waren dahin, ein kalter Wind ſpielte mit den abgefallenen, längſt verwelkten Blättern der alten Buchen. Dieſe ſtanden wieder kahl und kalt da und ſtreckten ihre ſchwarz-naſſen Aeſte in die trübe Winterluft. Ein feiner, mit Eisſtücken vermiſchter Regen rieſelte aus den Wolken auf den Waldboden herab und brachte jenes eintönige Geräuſch hervor, welches auf den einſamen Waldgänger einen ſo eigenartigen Eindruck macht, und das ſogar bekannte Dichter zum Gegenſtand ihrer Betrachtung gemacht haben. Die ſchönen, herzerquickenden Weiſen unſerer Sommer- und Frühlings-Sänger waren längſt verſtummt; ſogar die großen Fichten dort am Rande der Eichenſchonung hatten trotz ihres grünen Kleides ein ernſtres Geſicht, als an hellen, ſonnigen Sommertagen. Ja, er macht, flüchtig betrachtet, einen überaus traurigen Eindruck, der winterliche Wald. Trotzdem wird ihn der eifrige Beobachter und wahre Naturfreund, hat er ihn erſt einmal kennen gelernt, ebenſo lieb gewinnen, wie den ſchönen, ſanges- und farbenreichen Sommerwald. Er gibt dieſem an wechſelvollen und intereſſanten Bildern der Vogel-, wie in der Thierwelt überhaupt nur wenig nach.

wiſſe Spannung nicht unterdrücken konnte und beſchloß, der Sache auf den Grund zu gehen. Auf etwa zehn Schritte herangekommen, bot ſich meinen Blicken ein intereſſantes, von mir bis dahin nie beobachtetes Schauſpiel dar. Ein Steinkauz ſaß auf einem Birkenaſte in etwa Manneshöhe feſt an den Stamm geſchmiegt und blinzelte mich verſchlafen an. Aber obwol er mit dem braunen Fleck in der ſonſt ſilberhellen Rinde wie verwachſen ſchien, hatten ihn doch die ſcharfäugigen und unternehmungsluſtigen Meiſen, die ja kein Stückchen Holz ununterſucht laſſen, endeckt und brachten ihn nun durch den großen Lärm, den ſie verurſachten, um ſeine Ruhe. Das umſtehende Gebüſch bot daher einen ſchönen Anblick; es wimmelte, wie man wol zu ſagen pflegt, von Blau-, Tannen-, Hauben-, Sumpf- und Schwanzmeiſen. Bei allen waren die Kopffedern zu einem Häubchen aufgerichtet, ſo ſehr erregte der Anblick des geängſtigten Kauzes die allerdings empfänglichen Vögel. Jedoch die obengenannten ſpielten nur eine nebenſächliche Rolle, denn ihre Verwandten, die Kohlmeiſen, gingen dem Käuzchen mit einem Muth zu Leibe, der mich in Erſtaunen verſetzte. Sie flogen an der Spitze des Birkenaſtes, auf dem die Eule ihren in der That unvorſichtig gewählten Schlafplatz genommen hatte, an und tanzten dann förmlich mit geſträubten Federn und unter beſtändigen Verbeugungen auf den nächtlichen Räuber los, bis ſie auf etwa 10 cm an ihn herangekommen waren. Dann legten ſie plötzlich die Federn an und flogen auf eine benachbarte Akazie, um von hier aus das Spiel wieder zu beginnen. Ich muß geſtehen, im Winter niemals Vögel in ähnlicher Aufregung geſehen zu haben, wie die Kohlmeiſen ſie hier verriethen. Unſer Kauz ließ jedoch alle Anſtrengungen der Meiſen völlig unbeachtet, wol in der Zuverſicht, daß es bei den Drohungen bleiben würde. Dafür beobachtete er mich aber umſo ſchärfer, auch nicht die geringſte meiner Bewegungen entging ihm. Dagegen ließen die Meiſen und von ihnen ſelbſt die ſonſt ſo vorſichtigen Kohlmeiſen ſich durch meine Anweſenheit durchaus nicht ſtören. Ihre Aufmerkſamkeit wurde offenbar durch den Kauz völlig in Anſpruch genommen, deſſen Lage wurde immer kritiſcher, denn die Zahl ſeiner Quälgeiſter wuchs mit überraſchender Schnelligkeit, ſodaß der arme Mäuſejäger nun nicht mehr wußte, von welcher Seite ihm größere Gefahr drohte, ob von der des Menſchen oder der des Meiſenvolkes. An die Stelle ſeines anfänglichen Gleichmuthes war hochgradige Aufregung getreten, die ihren Gipfel erreichte, als ſich einige Rabenkrähen unter drohendem Geſchrei in der Nähe niederließen. Aus den ängſtlichen Blicken, die er nach den Felbern hinwarf, war zu ſchließen, daß er beabſichtigte, ſein Heil in der Flucht zu ſuchen, und ſo geſchah es, unter ſanftem „ink, ink“ ſtrich er ab, natürlich gefolgt von der lärmenden Meiſenſchar. Hoffentlich hat er noch rechtzeitig einen ſicheren Unterſchlupf gefunden. Ich wünſchte es dem bedrängten Vogel von ganzem Herzen.

Ein ornithologiſcher Ausflug in den Glarner Alpen (Schweiz).

Von F. Hauſer.

Heute Nacht hatte das alte, als Touriſten-Herberge eingerichtete Stallgebäude der Rautialp wieder guten Beſuch. Eine muntere Geſellſchaft, aus allen Richtungen der Windroſe zuſammengeweht, war auf den beiden langen, reichlich mit friſchem, ſtark duftendem Alpheu belegten Pritſchen gelagert. Auf dem Tiſche, der die ſämmtlichen Möbel der Hütte präſentirte, lag ein wahrer Berg von Torniſtern Seilen, Mänteln und all der vielen verſchiedenen Gebrauchsgegenſtände aufgeſchichtet, welche die Anweſenden für die bevorſtehenden Touren zu benöthigen glaubten. Obwol die meiſten einander wildfremd waren, füllte ein frohes, ungezwungenes Geplauder den Raum, bis das Bedürfniß nach Ruhe und die gebotene Rückſicht gegenüber den Zimmergenoſſen die Stimmen nach und nach verſtummen machte.

Wie ſich's am Abend befürchten ließ, ſtellte ſich um Mitternacht ein Gewitterregen ein. Unter allen Hütteninſaſſen war ich vermuthlich der Einzige, der ſich bei dem eintönigen Getrommel der auf das Schindeldach niederfahrenden Regentropfen ganz gleichgiltig verhielt. Auf mein Programm konnte das Wetter nur geringen Einfluß üben, und ſo ſchlief ich unbeſorgt fort, während Aerger und Mißmuth über die unliebſame Beſcherung meine Nachbarn wach behielt.

Als der Hausrothſchwanz (Sylvia tithys, *Lth.*) durch ſein einfaches, wehmüthig klingendes Liedchen den anbrechenden Morgen verkündete, war das Wetter eher beſſer, als ſchlimmer geworden. Es regnete nicht mehr; doch lag der Nebel ſo dicht und froſtig, daß, mit Ausnahme einiger ganz beſonders wetterfeſter und unternehmungsluſtiger junger Leute, alle Uebrigen bis auf weiteres noch in der engen, dumpfen, immerhin aber behaglich warmen Hütte verblieben. Je weiter der Tag vorrückte, je mehr lichtete ſich der Nebel. Und wie der graue, unfreundliche Wolkenvorhang allmählich ſich hob und der Wind ihn zerriß und zerzauſte, daß bald ein Stückchen klarer Himmel, bald ein Theil der vor uns liegenden hohen Schepen-Wände ſichtbar wurde, ſo hellten ſich auch die Mienen der Hüttengäſte auf und allmählich ſah ich um mich her immer vergnügter und munterer blitzende Geſichter. Alles machte ſich reiſefertig und eine Geſellſchaft nach der andern nahm in freudigem Erwarten den Weg nach dem erſehnten Ziel auf.

Von dem entzückenden Sänger-Wettkampf, der in den Monaten April und Mai hehr und feierlich in der Morgenfrühe durch den ernſten, finſtern Hochwald ſchallte, war heute, in der zweiten Hälfte Juni, wenig mehr zu hören. Wo nicht irgend welche unglücklichen Ereigniſſe hemmend und ſtörend auf den Verlauf des Brutgeſchäftes wirkten, da war jetzt den gefiederten Alpenbewohnern die ſchwere Pflicht erwachſen, für ein Neſtchen voll hungriger Junge zu wachen und zu ſorgen. Bei meinem Marſch durch die naſſen, da und dort noch von phantaſtiſch geformten Schneefeldern überdeckten Alpentriſten vernahm ich denn auch zumeiſt nur Warn-, Lock- und Angſtrufe und nur ſelten entrang ſich einer Vogelkehle eine jubelnde Strofe, ein volltönendes, freudeſprudelndes Lied.

Nach dem einfachen, nahrhaften Frühſtück, welches mir befreundete Aelpler in der nahen Sennhütte boten, ging ich, eine baumlere, ſumpfige Weide durchquerend, wo alle par Schritte der hier häufige Waſſerpieper (Authus aquaticus, *Behst.*) aus dem Graſe flog, dem nordöſtlich die Rautialp begrenzenden und nach jener Richtung, gegen das Oberſeethal hin, in mächtigen Felswänden abſtürzenden Grate zu, deſſen öſtliches Ende die ihrer ziemlich leichten Beſteigung und günſtigen, eine prächtige Fernſicht bietenden Lage halber häufig beſuchten Rautiſpitze (2284 Meter über Meer) bildet. Als ich den Grat erreichte, war es — in dieſen Regionen — ſchon heller Tag geworden. An den Gletſcherhäuptern der Berner- und Walliſerrieſen flammte der erſte Sonnenſtrahl. In raſcher Folge hoben ſich mehr und mehrere der kühnen Kuppeln, Spitzen und Hörner, hell erleuchtet, von dem grauvioletten Morgenhimmel ab und bald lag die ganze Hochgebirgswelt, von den magiſchen Lichtfluten des auferſtehenden Tagesgeſtirnes übergoſſen, und lohend und glühend prangt Fels und Eis in gewaltiger, ſtaunende Bewunderung erzwingender Pracht. Obwol ich den Sonnenaufgang im Gebirge ſchon zu hunderten von Malen geſehen, birgt er für mich doch immer wieder einen gewaltigen Reiz. So lange das großartige Schauſpiel währte und das Firmament, dann das Gebirge den eigenen, wunderbaren Farbenzauber bot, war mein eigentlicher Plan ganz in Vergeſſenheit gerathen und ich ſchenkte meine Aufmerkſamkeit ganz anderen Dingen als der Thierwelt, zu deren Beobachtung mich der Weg in dieſe Höhen eigentlich geführt hatte.

Die wenigen, mageren, an geſchützten Stellen die Felsköpfe des Grates krönenden Nadelholzgruppen belebte die hübſche, muntere Ringamſel (Turdus torquatus, *L.*), welche hier, gleich den armſeligen, verkrüppelten Rothtannenſtämmchen, durch deren verworrenes, halb abgeſtorbenes Geäſt ſie huſchte, an ihrer oberſten Verbreitungsgrenze ſtand. Die Ringamſel wohnt in viel höheren Gebirgslagen, als alle übrigen Glieder des Droſſelgeſchlechts. Ihr Brutgebiet ſind die Wälder und Legföhren und Trosbeſtände der Alpenzone. Da zählt ſie zu den gewöhnlichſten Erſcheinungen der Vogelfauna und es iſt hauptſächlich ihr zahlreicher Chor, der in der Morgenfrühe den Wanderer entzückt. Der Ringamſelgeſang ſteht zwar an Lieblichkeit und Kraft der Töne und an Strofenreichthum weit hinter dem der Singdroſſel zurück. Von hundert und hundert Kehlen gemeinſchaftlich vorgetragen, wirkt er aber doch ganz feierlich und ergreifend ſchön. In Bewegung und Benehmen hat die Ringamſel vieles mit der Kohlamſel (Schwarzdroſſel) gemein. Doch iſt erſtre wilder, flüchtiger, ſcheuer und bildet hierin ein wahres Gegenſtück zu einem anderen Hochalpenbürger, dem Alpenflüevogel (Accentor alpinus, *Gm.*), den ich parweiſe auf den Raſenplätzen nach einem Morgenmahl herumſuchen ſah.

Der „Flüevogel", oder „Heuplüemter", wie er im Glarnerlande geheißen wird, iſt ein ruhiger, ſtiller und kein ſcheuer Charakter. Es iſt dem Vogel ein ſorgloſes, phlegmatiſches Weſen eigen, wie ſolches ganz ähnlich auch das Schneehuhn zeigt, mit dem er häufig das gleiche Gebiet bewohnt. Vor dem Menſchen flieht der Flüevogel erſt, wenn man ihm ganz nahe gekommen iſt. Weit geht auch dann ſein Flug ſelten. Hat ihn der Winter aus ſeinem Hochland fort, in die Thäler hinab getrieben, ſo ſtellt er ſich einzeln oder mit dem Weibchen zuſammen, nie aber in größerer Geſellſchaft, mit Vorliebe bei Ställen ein, ſitzt unbekümmert um das Schalten und Walten des Bauern, wie der freche Spatz auf dem Gartenzaun, auf dem Dachfirſt oder einer Dachtraufe und füllt den knurrenden Magen mit dem, was auf dem Miſtſtock und vor den Stallthüren erhältlich iſt. Bei meinen Alpenwanderungen traf ich den Flüevogel geeigneten Ortes auf rauhem, ſteinigem Terrain, auf Karren- und Grienfeldern oberhalb der Holzgrenze bis zur Schneeregion hinan, auf allen ſchweizeriſchen Gebirgsſtöcken, welche ich beſuchte. Häufig ſcheint er nirgends aufzutreten, ſondern nur in vereinzelten Paren und Familien, deren Glieder ſich aber ſchon nach voller Entwicklung der Jungen zerſtreuen.

Ungleich mehr als dieſer in Geſtalt, Färbung und Lebensweiſe gleich ſchlichte und wenig auffällige Vogel trägt die raſtloſe, geſellige Alpendohle (Pyrrhocorax alpinus, *Koch*) zur Belebung der öden, einſamen Hochalpen bei.

Durch eine ſteile Einſenkung zum Verlaſſen des Grates genöthigt, ſtieg ich auf deſſen Nordſeite in ein ſchmales Felsband ein, zu welchem in gleicher Richtung, etwa 30 Meter tiefer, ein breiteres, von Geröll, Karren und Schneefeldern bedecktes lief. Schon vorher war mir, als hörte ich den flötenden, wohltönenden Ruf der „Schneekrähe", die fälſchlich Pyrrhocorax alpinus hierzulande allgemein bezeichnet wird. Mir war aber nicht recht klar, woher die Stimme kam. Als ich kaum einige Schritte auf dem Felsbande zurückgelegt, klang, zu meiner freudigen Ueberraſchung, der wohlbekannte Pfiff mir unmittelbar zu Füßen und bald waren die prächtig tiefſchwarz befiederten, mit gelbem Schnabel und korallrothen Füßen geſchmückten Vögel inmitten eines Alpenroſenfeldes entdeckt. (Fortſetzung folgt).

* * *

Der Wiedehopf, ſeine ſachgemäße Aufzucht und Pflege vom Neſtling bis zum ausgewachſenen Vogel.

Von A. Reuter.

Die nachſtehende Schilderung ſoll über einen unſerer lieben, leider noch ſtiefmütterlich behandelten, befiederten Zimmergenoſſen geſchrieben ſein, welcher bis heute noch von den wenigſten Vogelfreunden näher gekannt und beobachtet wird, trotz ſeiner großen Zuneigung und Lieblichkeit dem Menſchen gegenüber; einerſeits wol deshalb, weil er kein Sänger iſt, andrerſeits vielleicht auch nur, weil ſich die Wenigſten an ſeine Aufpäppelung heranwagen. Allerdings iſt es nicht ſo ganz leicht und bedarf einer langjährigen Uebung im Aufpäppeln junger Vögel, bis man ſich mit dem Wiedehopf verſuchen darf; es wird auch nur Demjenigen gelingen, dieſen ſchönen und liebenswürdigen Vogel großzuziehen, welcher ſich ganz gewiſſenhaft damit beſchäftigt, denn ein einziger Mißgriff oder eine Verſäumniß kann den Verluſt des Pfleglings zur Folge haben; auch darf man ſich nicht der angenehmen Hoffnung hingeben, daß der Wiedehopf in vierzehn Tagen ſelbſt aufnimmt, wie andere junge Vögel. Nein! Da macht er eine Ausnahme, gleich wie unſer Frühlingsbote, der Kukuk; zwei Monate, ja ſelbſt ein Vierteljahr kann vergehen, bis er den erſten Biſſen ohne Beihilfe zu ſich nimmt. Dieſes iſt nicht etwa Ungeſchicklichkeit des Vogels, ſondern ſein langer, dünner Schnabel und die kurze Zunge erlauben ihm nicht, das Futter, wie andere Vögel, aufzunehmen und zu verſchlucken; er muß jeden Biſſen erſt in die Höhe werfen, um ihn mit dem Schnabel nochmals aufzufangen und dann erſt zu verſchlucken. Iſt es aber einmal ſoweit mit ihm gekommen, ſo hat man ſchon viel erreicht, ſo macht er ſeinem Pfleger mit jedem Tag mehr Freude; hat man nun noch das Glück, einen männlichen Vogel zu beſitzen, ſo wird er auch bald ſein „hup hup“ hören laſſen, anfangs leiſe und ſehr hoch, es hört ſich faſt an, als ob ein Bauchredner da wäre; allmählich wird jedoch ſein Ruf ſo laut und hohl, wie im Freien, gleichzeitig wird er auch von Tag zu Tag munterer und aufgeweckter; es ſcheint gerade, als ob er ſich ſeiner Rolle, die er ſpielt, bewußt wäre, er wird mit Recht der Harlekin unter den Vögeln genannt, denn jede ſeiner Bewegungen hat etwas Komiſches an ſich und er würde ſicher damit auch dem grämlichſten Hypochonder ein Lächeln abgewinnen.

Die Anleitungen, welche ich im Folgendem geben will, ſind auf eigener Erfahrung begründet, die ich mir ſeit beinahe dreißig Jahren in der Pflege unſerer befiederten Lieblinge geſammelt habe. Ich hoffe, daß meine Zeilen manchen Liebhaber, der es bisher noch nicht verſucht hat, dazu veranlaſſen werden, auch einmal einen Wiedehopf großzuziehen; er wird durch die Freuden, die ihm derſelbe macht, für alle gehabte Mühe reichlich belohnt werden.

Die erſten Schritte zur Erlangung eines jungen Wiedehopfs. Sobald wir unſern Frühlingsverkünder, den Kukuk, hören, ſind wir ſicher, auch ſeinen Begleiter, den Wiedehopf, anzutreffen; kommen wir nun in die Nähe von Haidefläche oder Viehweiden, auf denen etliche alte Bäume ſtehen, ſo werden wir auch bald ein „hup hup“ hören, welches uns überzeugt, daß wir unſern geſuchten Freund gefunden haben, bald wird er mit leichtem Flug an uns vorbeiſchwirren. Beobachten wir nun genau, in welcher Richtung er ſich im Flug wendet, ſo werden wir unſchwer ſeinen Lieblingsplatz herausfinden, den Baum nämlich, in deſſen hohlem Aſtloch er gedenkt mit ſeinem Weibchen ſich häuslich einzurichten; dorthin lockt er durch den Liebesruf, verbunden mit Kapriolen und Sprüngen, das Weibchen, nun geht es hurtig aus und ein in der erwählten Behauſung und in kurzer Zeit wird die Brutſtätte fertig ſein, ſodaß wir Hoffnung haben, zu Anfang oder Mitte Juni uns einen Sprößling verſchaffen zu können. Man nehme denſelben aus dem Neſt, ſobald die Schwungfedern Pinſel haben; mit dieſem Alter ſind ſie am beſten zu ätzen. Das Ausheben aus dem Neſt gehört zwar nicht zu den angenehmſten Dingen. Oft iſt mit der Leiter nicht gut beizukommen, auch iſt in der Regel die Oeffnung viel zu klein, um mit der Hand bequem hineinlangen zu können; es bleibt dann nichts anderes übrig, als mit Meißel und Hammer bewaffnet das Schlupfloch zu erweitern, und um zu dieſem zu gelangen, muß man auch im Klettern geübt ſein, denn oft befindet es ſich an einem Platz, der nicht gut zugänglich iſt und wo man keinen Aſt oder ſonſtige Stütze für die Füße findet, man iſt deshalb genöthigt, ſich mittels eines ſtarken Seils an den Baum zu befeſtigen, um vor einem Abſturz geſichert zu ſein. Iſt dies nun alles bewerkſtelligt, ſo greife man ruhig zu, nachdem man die Oeffnung ſo erweitert hat, um ungehindert mit der Hand hineinlangen zu können; man nehme nun das erſte beſte von den Jungen heraus und ſtecke es in ein Säckchen, welches man ſich von Hauſe mitgenommen; man thut gut, einige Handvoll Sägeſpähne hinein zu ſchütten, damit ſich der Vogel unterwegs nicht beſchmutzen kann, denn er gibt in ſeiner Angſt jeden Augenblick eine ſehr übelriechende Entlerung von ſich. Dies wird man ſchon gewahr, ſobald man nur ein Junges ergreift; dies ſcheint gewiſſermaßen ſeine Vertheidigungswaffe zu ſein, denn er weiß ſeinen After ſo geſchickt gegen den Angreifer zu richten, daß er ihn gerade über Geſicht und Bruſt förmlich beſpritzt. Dieſes pflegt er überhaupt noch einige Zeit lang beim Aufpäppeln zu thun, bis daß er alle Scheu und Furcht abgelegt hat; man wickle ihn deshalb aus Vorſicht bei jedesmaliger Fütterungsvornahme in ein Tuch, mit dieſem nimmt man ihn auf den Schoß, den Kopf in die linke Hand und mit Daumen und Zeigefinger öffnet man behutſam den Schnabel. Auf einem in der rechten Hund bereitgehaltenen Hölzchen gebe man ihm zwei bis drei Futtergaben hintereinander, jedoch laſſe man ihm zu jeder Gabe Zeit, dieſelbe erſt zu verſchlucken, ehe man mit der nächſten kommt. Sollte er Verſuche machen, das eingeſtopfte Futter wieder heraus zu ſchütteln, ſo halte man ihm die Schnabelſpitzen mit zwei Fingern zuſammen, bis man überzeugt iſt, daß er geſchluckt hat; natürlich darf dieſes nicht zur Quälerei ausarten. Er gewöhnt ſich im übrigen in ganz kurzer Zeit an ſeinen Pfleger und kommt zuletzt ſelbſt, ſobald er nur das Futtergeſchirr erblickt. Die Fütterung richte man ſo ein, daß man ihm alle halbe Stunde etwas reiche und zwar von morgens eine Stunde vor Sonnenaufgang an, bis abends eine Stunde nach Sonnenuntergang. Hat man ihn nun ſo etwa vierzehn Tage gefüttert, ſo verſuche man es mit lebenden Mehlwürmern, welche man ihm in den Käfig wirft, ob er ſich nicht heranwagt, um ſie mit dem Schnabel zu faſſen. Dieſes gelingt in der Regel gleich nach den erſten Verſuchen, wenngleich er die Würmer noch nicht verſchlucken kann, doch macht er damit ſeine Uebungen und Uebung macht den Meiſter. Bald wird er es dann auch fertig bekommen, die Würmer zu verſchlucken; dies iſt der erſte Schritt zur

Selbſtändigkeit. Man laſſe ſich jedoch nicht irreführen und denke, jetzt hat man ſich weiter nicht mehr um ihn zu kümmern, er braucht nicht mehr gefüttert zu werden; dem iſt nicht ſo, denn er ſpielt vorerſt noch mit den Mehlwürmern und das ihm vorgeſetzte Miſchfutter wird er ſicherlich noch lange nicht berühren; es wäre Frevel, den kleinen Pflegebefohlenen ſich von jetzt ab ſelbſt zu überlaſſen, denn er würde bei gefülltem Futtertrog verhungern. Die Fütterung iſt alſo ſolange fortzuſetzen, bis man ſich überzeugt hat, daß er ſelbſt nimmt und auch verſchluckt; hat er es aber ſoweit gebracht, ſo reiche man ihm 15 bis 20 Mehlwürmer des Tags, auch Raupen, kleine nackte Schnecken, Maden, Engerlinge und Regenwürmer, es iſt ihm alles willkommen. Hat man nicht gerade dieſes alles zur Verfügung, ſo gebe man ihm dazwiſchen feingeſchabtes mageres rohes Rindfleiſch, auch hartgeſottenes Hühnerei, in kleine Würfel geſchnitten, iſt ihm ſehr zuträglich.

Hauptbeſtandtheile des Päppelfutters. Man erweiche altbackene Semmel in friſchem Waſſer zwei Stunden lang, drücke ſie nachher gut aus, zerhacke ſie mit dem Meſſer zu kleinen Stückchen und gieße gekochte, wieder kalt gewordene Kuhmilch daran und zwar ſoviel, daß die Semmel davon ganz durchdrungen wird, ſonſt iſt es entweder zu trocken oder es wird „pappig" und wird nicht gern genommen. Unter dieſes Futter gebe man einen Kaſſelöffel voll zerhacktes hartgeſottenes Hühnerei, hat man auch friſche Ameiſenpuppen zur Verfügung, ſo nehme man zuerſt eine Gabe von eingeweichter Semmel auf das Holzſtäbchen, dann tauche man dieſes in die Ameiſenpuppen, ſodaß dieſelben an dem Eingeweichten hängen bleiben und reiche dieſes nun dem Vogel. Mit zerſchnittenen Mehlwürmern kann man ebenſo verfahren. Würde man die Ameiſenpuppen mit der Semmel gleich vermiſchen, ſo könnte man nur ſoviel Futter zurichten, als zu einer Mahlzeit nöthig wäre, weil dieſes ſehr ſchnell in Säure übergeht, was dem Vogel unbedingt ſchädlich iſt und bei wiederholten Malen ſogar tötlich ſein kann. Wird man aber dieſe meine vorgeſchriebene Futter-Methode richtig einhalten, ſo wird man ſelten einen Verluſt haben. (Fortſetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich erlaube mir, Ihnen mitzutheilen, daß in dieſem Jahr der Frühling hier in Rußland überraſchend früh eingetreten iſt. So ſind z. B. heuer in Libau in Kurland die Lerchen und Stare ſchon Ende Januar eingetroffen. Hier um Petersburg herum herrſcht ſchon lange Thauwetter und infolgedeſſen können die Satkrähen jeden Tag eintreffen. Augenblicklich iſt es jedoch im Walde noch öde, nur die Goldhähnchen und verſchiedene Meiſenarten laſſen ihre lieblichen Triller und Locktöne hören. Dann und wann gibt auch mein Lieblingsvogel, der Zaunkönig, ſeinen Geſang zum beſten, trotzdem er noch mühſam ſein Futter unterm Schnee hervorſuchen muß. Sonſt iſt es hier im nordiſchen Walde noch tot und ſtill.

Hermann Grote.

Anfragen u. Auskunft.

81. **Mödling:** Der Sommerrübſen, von dem Sie mir eine Probe zur Unterſuchung zugeſandt haben, enthält ja nicht gerade etwas Schädliches, aber die Körner ſind klein, zum Theil nicht vollreif und außerdem iſt er untermiſcht mit fremden Stoffen, Erdklöschen und einigen Unkrautſämereien.

Herrn Adolf Büchner: 1. Alle die einzelnen Vögel, welche Sie mit den Prachtfinken zuſammen in der großen Voliere halten, alſo ebenſowol Papſt- und Indigofink, wie die verſchiedenen Webervogelmännchen und die Stare, können den gezüchteten jungen Prachtfinken den Schädel aufgehackt und ſie ſo getötet haben. Wenn Sie auf glückliche Zuchterfolge rechnen wollen, ſo müſſen Sie nur Pärchen friedlicher Arten beiſammen halten. Selbſt unter dieſen gibt es ja zuweilen doch einen Störenfried, der dann ſofort herausgefangen werden muß; aber einzelne Männchen oder Weibchen namentlich der Webervögel und Stararten ſtören in der Regel die Prachtfinken am meiſten. Geſunde und kräftige ſolche vermögen ihnen ja, vornehmlich in einem ſo großen Raum, wie es Ihre Voliere iſt, und wenn dieſelbe zweckmäßig eingerichtet worden, zu entgehen, aber kleine unbeholfene Junge oder ſchwächliche und kränkliche alte Prachtfinken fallen dem Uebermuth oder der Bösartigkeit der genannten Vögel nicht ſelten zum Opfer. Könnten Sie nicht für die vielen einzelnen Vögel einen Theil der Voliere abtrennen laſſen? Uebrigens ſind auch unter Ihren Zuchtpärchen einige, die ſich in der Regel bösartig oder doch unverträglich zeigen, ſo beſonders die rothen Kardinäle und die Gürtelgrasfinken. Da Sie viele Vögel halten und züchten wollen, ſollten Sie doch mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I (Fremdländiſche Stubenvögel) oder noch beſſer mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" kaufen, um ſich darin über die Eigenthümlichkeiten und Bedürfniſſe aller Vögel, welche Sie anſchaffen wollen, unterrichten zu können. 2. Daß es mit Ihrer Schamadroſſel nach dem von mir angerathenen Futterwechſel beſſer ergeht, ſodaß ſie namentlich wieder fleißig ſingt, freut mich ſehr.

Herrn A. Dullin: Wenn Ihr Graupapagei hin und wieder ſchreiende Töne oder grelle Pfiffe hören läßt, ſo iſt er nicht gut erzogen. Sobald er ſo unangenehm kreiſcht, müſſen Sie zu ihm herantreten und ihm ein Wort, das er bereits gelernt hat oder ſprechen lernen ſoll, vorſagen, damit er vom Schreien abgelenkt wird. Ein anderes Mittel zur Abgewöhnung der Unart iſt, daß Sie den Papagei zudecken, ſobald er die häßlichen Töne erſchallen läßt, und die Decke fortnehmen, wenn er ruhig geworden. Ueberhaupt müſſen Sie ſich viel mit dem Vogel beſchäftigen und ihm ſachgemäßen Unterricht ertheilen. Wenn Sie hierin noch gar keine Kenntniß haben, ſo thun Sie am beſten daran, ſich das von mir verfaßte kleine Buch „Der Graupapagei" anzuſchaffen und darin fleißig zu leſen. 2. Allerdings können die dünnen Entleerungen davon herrühren, daß der Papagei viel Waſſer trinkt. Dies letztere ſchon iſt ein Zeichen von Verdauungsſtörung. Entziehen Sie dem Vogel jetzt das Waſſer völlig und geben Sie ihm nur täglich friſch gekochten dünnen reinen Haferſchleim (ohne Zuſatz von Salz, Zucker, Butter u. a.) mehrmals am Tage ſchwach erwärmt zu trinken. Als Zugabe zu dem ſchwach angekochten beſten Pferdezahnmais und dem Hanf bieten Sie ihm noch täglich wie eine Wallnuß groß altbackenes Weißbrot, in etwas von dem Haferſchleim erweicht, dann von der Schale befreit und gut ausgedrückt.

Herrn A. Olszewski: 1. Wenn Sie Züchtungsverſuche mit den von Ihnen genannten Vögeln machen wollen, ſo befolgen Sie nur vor allem alle Rathſchläge, welche ich in dem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, das Sie ja beſitzen, gegeben habe. Sie werden da finden, daß Sie die Spottdroſſel und den rothen Kardinal und auch den roſenbrüſtigen Kernbeißer je in einem beſonderen entſprechenden Käfig züchten müſſen, daß dagegen Sonnenvogel und Hüttenſänger in der Regel verträglich mit kleineren Vögeln, wie z. B. den Prachtfinken, ſind, namentlich wenn ſie vor Beginn der Niſtzeit an einander gewöhnt worden. 2. Inbetreff der von Ihnen genannten Papageien leſen Sie S. 169 nach. Sie werden dort erſehen, unter welchen Verhältniſſen Sie Wellenſittiche, Lori von den blauen Bergen, Bunt- und Singſittich u. a. zuſammen beherbergen dürfen und Ausſicht auf Züchtungserfolge haben. 3. Wenn Sie die Prachtfinken zur erfolgreichen Brut ſchreiten ſehen wollen, ſo dürfen Sie in den S. 364 beſchriebenen Geſellſchaftskäfig von 150 cm Höhe, 125 cm Länge und 75—80 cm Tiefe nicht mehr als 5–8 Pärchen kleinſter und kleinerer Vögel (alſo von den von Ihnen genannten Prachtfinken, mit Ausnahme der Bandfinken, nebſt einem Pärchen Masken- oder Blutſchnabelweber) und 2—3 Par größerer Vögel (Sonnenvögel, noch beſſer Hüttenſänger und ein Pärchen Schönſittiche oder Singſittiche oder der kleinſten Schmalſchnabelſittiche) ſetzen. Leſen Sie über die Bevölkerung dieſes Geſellſchaftskäfigs S. 368 ff. nach. Wollen Sie in einem ſolchen keine Züchtungverſuche machen, ſondern ſich nur an den bunten Farben und dem munteren Treiben ſeiner Bewohner erfreuen, ſo dürfen Sie ihn zahlreicher bevölkern und finden Anleitung hierzu S. 424 ff.

Herrn **Dr. Sachs**: 1. Nach meiner Ueberzeugung iſt es zum vollen Wohlbefinden unſerer einheimiſchen Sänger erforderlich, daß ſie alljährlich die naturgemäße Mauſer durchmachen. Kenntnißreiche Pfleger haben im Laufe der Jahre hier ihre Erfahrungen in dieſer Hinſicht mitgetheilt und Anleitung zur Herbeiführung einer ſachgemäßen Mauſer und zur Durchwinterung der Vögel gegeben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II S. 280 ff. und S. 319 ff. iſt eine Ueberſicht aller Erfahrungen geboten. 2. Die Feldlerche ſingt im Käfig zuweilen ſchon von Ende Dezember, in der Regel erſt vom März an und zwar bis zu Auguſt. Wenn die Ihrige nicht freiwillig badet und auch bei ſorgfältigſter Reinhaltung öfter unſaubere Füße hat, ſo dürfen Sie die im „Handbuch“ II S. 321 vorgeſchriebene Fußpflege ausführen, natürlich nur mit größter Vorſicht, ohne den Vogel dabei zu beſchädigen oder zu erkälten. Wenn derſelbe ſich ſehr dabei ängſtigt und erregt, ſo könnte dies allerdings die Urſache deſſen ſein, daß er noch nicht ſingt. 3. Der rothrückige Würger mauſert im Januar und Februar. Alſo mauſert der Ihrige zur richtigen Zeit. Die Geſangszeit währt in der Regel vom Februar bis Ende Juli. Hoffentlich haben Sie den Käfig des Vogels naturgemäß eingerichtet, namentlich in demſelben einen dornigen Zweig zum Aufſpießen von Kerbthieren angebracht. Geben Sie anſtatt der vielen Mehlwürmer zum Theil lieber andere lebende Kerbthiere, namentlich Speck- und Pelzkäferlarven, Räupchen, Fliegen, Spinnen u. a. m., zur Abwechſelung auch hin und wieder ein wenig feingeſchabtes friſches, magres, rohes Fleiſch. Dann wird die Mauſer hoffentlich gut und ſchnell vonſtatten gehen und der Vogel Sie mit ſeinem Geſang erfreuen. 4. Wenn Sie die Singdroſſel unter der Bedingung beſtellt, bzl. gekauft haben, daß der Händler für ein Männchen, Gewähr leiſten muß, und er die Verſicherung gegeben hat, Ihnen ein ſolches verkauft zu haben, ſo dürfen Sie ihn ſelbſtverſtändlich zur Verantwortung ziehen. 5. Die Singdroſſel ſingt meiſtens vom Januar bis März leiſe und dann bis zum Juli laut; bei ſehr guter Pflege und im warmen Zimmer ſingt ſie ſchon vom Herbſt an leiſe.

Herrn **Dr. Schneider**: Ihr Schwarzplättchen zeigte ſich in ganz elendem Körperzuſtande und die Unterſuchung ergab Magen- und Darmkatarrh. Entweder iſt das Univerſalfutter, welches Sie gaben, nicht in gutem Zuſtand geweſen oder der Vogel hat ſonſt etwas Schädliches gefreſſen.

Herrn **Herm. Juſt**: Die Ihnen zugeflogene Taube vermag ich nach Ihrer kurzen Beſchreibung leider nicht feſtzuſtellen.

Herrn **Hermann Sottner**: 1. Entziehen Sie Ihrem Sonnenvogel völlig das Trinkwaſſer und geben Sie ihm anſtatt deſſen täglich friſch gekochten dünnen reinen Haferſchleim (ohne Zuſatz von Butter, Zucker, Salz u. a. gekocht), mehrmals im Tage friſch erwärmt. Sie hätten mir mittheilen ſollen, wie Sie den Vogel füttern; denn jedenfalls iſt der Durchfall durch unrichtiges oder verdorbenes Futter hervorgerufen. Um die Krankheit heben zu können, muß vor allem die Urſache abgeſtellt werden. 2. Das beſte Futter für Nachtigal, Blaukehlchen und Schwarzplättchen ſind jetzt vom Frühjahr bis zum Auguſt, ſolange es ſolche gibt, friſche Ameiſenpuppen, bei der Nachtigal mit Zugabe von drei bis ſechs bis zehn Mehlwürmern, beim Blaukehlchen nebſt allerlei kleinen weichen Kerbthieren, außer Mehlwürmern: kleinen Schaben, kleinen Engerlingen, beim Schwarzplättchen nur nebſt wenigen Mehlwürmern. Zum Spätſommer hin müſſen Sie dieſe Vögel dann allmählich an ein Futtergemiſch aus angequellten getrockneten Ameiſenpuppen, geriebner Möre und geriebnem altbacknem Weißbrot gewöhnen, dem Sie abwechſelnd etwas feingehacktes hartgekochtes friſches Hühnerei, gekochtes magres Fleiſch oder Herz zuſetzen. Das Blaukehlchen und das Schwarzplattel bedürfen auch der Zugabe von Frucht; Schnittchen von ſüßem Apfel oder Birne, Wein- und Hollunderberen, auch das fein zerſchnittene Innere von Feigen.

Fräulein **Agnes Varga**: Die überſandten Vögel waren zwei gewöhnliche Stiglitze oder Diſtelfinken und ein Schneeammer.

Herrn Amtsanwalt **Kayſer**: Ihre Fütterung der Feldlerche iſt ja ganz richtig geweſen, doch vermiſſe ich die Zugabe von Grünkraut (feingehackter Vogelmiere, Kohlblättern, Salat, Spinat u. a.). Sodann geben Sie nur das Körnerfutter recht mannigfaltig: Hirſe, Kanarienſamen, Rübſen, Mohn, Hafer, wenig gequetſchten Hanf. Das beſte Mittel, um die Feldlerche in naturgemäßen Federnwechſel zu bringen, wäre Futterwechſel, den Sie namentlich durch Abwechſelung in der Zugabe von Weichfutter vornehmen müßten. Setzen Sie dem letztern einmal ein wenig fein gehacktes hartgekochtes friſches Hühnerei oder desgleichen gekochtes magres Kalbfleiſch zu und ſtatt der Mehlwürmer ſuchen Sie einmal Speck- oder Pelzkäferlarven oder andere kleine weiche Kerbthiere zu beſchaffen, und ſobald es friſche Ameiſenpuppen gibt, füttern Sie ſolche. Hoffentlich wird die Lerche ſich dann wieder gut befiedern und Sie mit ihrem Geſang erfreuen.

Zu unſerm Bilde.

Bereits Mitte dieſes Monats (März) kommt unſer allbekanntes und allbeliebtes **Rothkehlchen** (Sylvia rubecula. *L.*) vom Zuge zurück, und ſchon im April ſchreitet es zur erſten Brut.

Das Weibchen des Rothkehlchens iſt kaum bemerkbar kleiner als das Männchen, Stirn und Bruſt blaſſer und ſchmaler roth; Füße bräunlichfleiſchfarben, nicht ſchwärzlich. Der Hauptunterſchied bleibt aber das Fehlen der ſog. Spiegelflecke, d. h. das Weibchen hat auf den größeren Deckfedern der Flügel garkeine oder nur ganz kleine roſtgelbe Fleckchen.

Das Neſt ſteht in der Regel im niedrigen Gebüſch, unter Grasbüſcheln, auf bewachſenen Baumſtubben, zwiſchen Baumwurzeln, ſelbſt in Mauerlöchern oder an der Erde, auf trocknem Laub und Mos, in kleinen Erdhöhlen, Mauerlöchern u. a. Es bildet eine flache Mulde mit Ueberdachung und ſeitlichem Eingang. Wenn das Dach, bzl. die Decke, nicht von der natürlichen Umgebung des Neſts gebildet wird, ſo überwölben die Rothkehlchen das Neſt künſtlich. Als Bauſtoffe werden, auf der Unterlage von Mos und trocknem Laub, Wurzeln, Halme, Flechten u. a. verwendet und das Innere mit Grasriſpen, Haren, Wolle und Federn ausgepolſtert. Beide Gatten des Pärchens betheiligen ſich am Neſtbau. Das Gelege beſteht aus fünf bis ſechs, ſelten ſieben Eiern, die auf gelblichem, röthlichem oder auch grünlichweißem Grunde roſtfarbig geſleckt und gepunktet ſind, am ſtumpfen Ende nicht ſelten mit Fleckenkranz; ſie ſind 19 mm lang und 14 mm dick. Die Brutdauer beträgt 14 Tage. Männchen und Weibchen brüten und füttern ſpäter auch gemeinſam die Jungen. Das Jugendkleid iſt oberſeits olivenbraungrau, fahlgelb geſleckt; Bruſt und Kehle gelbbraun, dunkler geſleckt; Bauch düſterweiß; Füße fleiſchfarben. Nach der Mauſer, im Juli, erhalten die Jungen das Kleid der Alten, doch erſcheint die Bruſt heller gelbroth. Junge Männchen haben im Frühling breitere orangerothe Stirn, bemerkbare Flügelſpiegel, lebhafter aſchgraue Seiten und dunklere Füße als das alte Weibchen.

Die zweite Brut findet Ende Juni ſtatt; das Neſt wird lockerer gebaut und das Gelege enthält nur vier bis fünf Eier.

K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [408]

Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos).

Mehlwurmzüchterei

empfiehlt prima Würmer ℔ 4,— ℳ [409]

F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.

Muska, hochf. 98er, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 4½, à Ko. 8.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 4, 5 Ko. 19.

Bisquit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack	5	Ko.	no.	1,50
Hanfſat	„	„	„	„	1,60
Hafer geſchält	„	„	„	„	2,25
Mohn blau	„	„	„	„	3,75
Hirſe weiß Pa.	„	„	„	„	2,–
do. Senegal	„	„	„	„	2,25
do. do. i. Kolb.	„	„	„	„	5,—
do. algeriſche	„	„	„	„	2,—
do. indiſche	„	„	„	„	1,75
Sonnenblumen	„	„	„	„	2,
Kürbiskerne	„	„	„	„	3,25
Reis i. Hülſen	„	„	„	„	2,25
Zirbelnüſſe	„	„	„	„	4,—

Oſſa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [410]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter
Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Ja! Ja! es iſt wahr!

Ich verſende nur ſaubere Ware. [411]

Futter für: **Prachtfinken, Reisfinken, Kardinäle, Sittiche, Papageien** (große), **Dompfaff** und **Waldvögel** (als Hänfling Stiglitz, Zeiſig, Fink) je 5 Ko. 2 ℳ. Bei Entnahme von 3 Poſtkolli füge ich eine ſelbſtthätige Trinkflaſche, ſehr praktiſch für Vögel, **gratis bei.**

H. P. Lange, Samenhdl., **Gottesberg** i. Schl.

Ameiſeneier

prima, geſiebte u. ſandfreie Ware, per Ko. ℳ 3, per 5 Ko. ℳ 14. [412]

Hochprima Qual. per Liter 80 ₰.

Sommerrübſen Ia ſüß
per 5 Ko. ℳ 2,20, per 50 Ko. ℳ 18.

Weiße Silberhirſe
per 5 Ko. ℳ 2,20, per 50 Ko. ℳ 18

empfiehlt **Carl Kämpf, Mainz.**

Vögel.

Geſucht: Tadelloſes Zuchtp. **Singſittiche.** [413]

Osk. Hassmann, Hof i. Bay., Lorenzſtr. 35.

!!Kanarienvögel!!

Meine weltbekannten, tieftourenreichſten 1898er Sänger ſind in großartigſter Auswahl alle wieder geſangsreif u. beſtens ſortirt. Liefere garantirt reell überallhin, ſteigend nur nach Geſangsgüte, à Stück 10, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ, Nachnahme oder Betrag vorher. [414]

Julius Häger,
St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864. Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Reingelbe

Wellenſittiche, prachtv. geſunde, große, ſtarke, richtige Zuchtp. 30 ℳ, **importirte echt auſtraliſche Wellenſittiche** mit dunkelblauen Füßen, prachtvoll intenſivem Gefieder, richt. Zuchtp. 6 ℳ. 3 P. 16,50 ℳ, **Wellenſittiche,** ausgefärbte Pare, 5 ℳ, **Gebirgsloris,** ſelten ſchön, P. 30 ℳ, **Schuppenloris Ia** P. 38 ℳ, **Graaköpfchen,** prachtv. Zuchtp., 3 ℳ, importirte **Zebrafinken** Zuchtpar 5 ℳ, **Chineſiſche Nachtigalen** (ſelten ſchön), extra ausgeſuchte Doppelüberſchläger, 5 ℳ und von allen in Nr. 7 ausgebotenen Vogelarten noch Vorrath. Reelle Bedienung; Garantie f. lebende und tadelloſe Ankunft. [415]

Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

▬ Prima 2 Lieder pfeifende ▬

Dompfaffen

à 30—40 ℳ offerirt u. Garantie u. 4 Tage Probe [416]

K. Diehl III,
Angersbach, Oberheſſen.

Kanarienvögel.

Empfehle meine tieftourenreichen Sänger von 8—36 ℳ Leiſte Garantie für Werth u. leb. Ankunft, gebe 8 Tage Probezeit, tauſche um, evtl. zahle d. Betrag retour. Preisl. fr.

Wilh. Schick, St. Andreasberg i. H.
vormals W. Schwanebeck. [417]

Geſucht: Granataſtrilde, Buntaſtrilde, **Wiener's Aſtrilde, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen.**

F. Beedzler, [418]
20, Norton Folgate, **London** (England).

Geſucht: ♀ **rothk. Pap.-Amand.** u. ♀ **blauköpf. dito.** [419]

Blume, P., **Großeutersdorf** (Kahla).

Waldvögel.

Kreuzſchn., roth,	Dtz.	9,—	ℳ,	St.	1,25-1,50
„ grün	„	8,—	„	„	0,80-1,—
„ grau	„	6,—	„	„	0,60-0,75
Alpen-Stiglitze	„	12-15	„	„	1,25-1,50
Zeiſige	„	9-10	„	„	0,80-1,—
Hänflinge, roth	„	12-15	„	„	1,25-1,50
„ grau	„	7-9	„	„	0,75-1,

[420] **D. Schmidt,**
Thale a. Harz, Steinbruchsweg 3.

Harzer Kanarienvögel

(Trutesche Hohlroller),

Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. t. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel, Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis** und **franko.** Weibchen desſelb. Stamms 2,50 ℳ [421]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe noch **8 St. Harzer Kanarien-Zuchtweibchen** und **3 Hähne** zu verkaufen.

Wilhelm Maushacke, Schuhm.,
Crottorf, Prov. Sachſen. [422]

Dompfaffen,

ſelbſtdreſſirte, 2 Lieder ff. flötend u. Garantie. Beſte Referenz. [423]

Jean Schmidt, Lehrer,
Schlotzau, Kr. Hünfeld.

▬ **Hochfeine prämirte** ▬

Harzer Edelroller

(Stamm Trute), welche vorzüglich in Hohlrolle, Knorre, Klingelrolle, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 8, 10, 12, 15, 20 ℳ. Zuchtweibchen 1,50 ℳ verſende gegen Nachn., bei achttägiger Probe. Nichtgefallende tauſche um, ev. Betrag zurück, gebe zwei St. Zuchtweibchen gratis bei. [424]

Wilh. Keye, Thale, Harz

Feinste Kanariensänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [425]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.

Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

☞ 1898 erhielt mein Stamm Harzer **Kanarienvögel** 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ. u. Gar., 8 T. Pr.

Paul Holzky, Cöthen (**Anhalt**). [426

Suche **Männchen:** Wiener-Aſtrild. **Weibchen:** Larven-Aſtrild, Diamanttaube, Sundevallsweber, Maskenweber, Bunt-Aſtrild, weißbrüſt. Schilffink. **Pärchen:** Fledermauspapageichen, Schönſittiche.

Gebe ab: **Männchen** Diamanttaube 5 ℳ, Larven-Aſtrild 5 ℳ, weißbrüſt. Schilffink 8 ℳ, Binſen-Aſtrild 10 ℳ. **Weibchen:** Maskengrasfink 6 ℳ **Pärchen:** gelbbr. Bayaweber 5 ℳ, ſelbſtgez. ſpitzſchwänz. Grasfinken 20 ℳ. Letztere im ungeheizten Zimmer gehalten. [427]

Nagel, Apotheker, **Pritzwalk.**

Kanarienvögel, echte Harzer Roller ohne Fehler, à St. 10, 12, 15, 20 u. 25 ℳ, mit Porto u. Verpackung u. 14 Tage Probezeit, **aber nur per Nachnahme,** nicht gefallende Vögel tauſche um oder auf Wunſch zahle zurück. Rollerweibchen 1,50 ℳ. Preisliſte frei. [428]

L. G. Müller, Vogelzüchterei,
Nordhauſen a. Harz.

Finken zu verkaufen:

Ich verkaufe meine 2 St. **Reitzug-** und 3 St. **Ruhrerwildfaufinken,** das St. um 8 ℳ, rein im Schlag mit Schnapp. [429]

Kains, Wien 18, Luſtwandlgaſſe 52.

Inhalt der Nr. 10.

Pflege und Behandlung von Papageien.
Fremdländiſche Finken (Fortſetzung).
Beobachtungen auf einer Gebirgswanderung in Galizien, der Bukowina, Siebenbürgen und Rumänien (Schluß).
Der Wiedehopf, ſeine ſachgemäße Aufzucht und Pflege vom Neſtling bis zum ausgewachſenen Vogel (Fortſetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Breslau.
Anfragen und Auskunft

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Reingelbe

Wellenſittiche, prachtv. geſunde, große, ſtarke, kräftige, ſelten ſchöne Zuchtp. 30 ℳ, **importirte echt auſtraliſche Wellenſittiche** mit dunkelblauen Füßen, prachtvoll intenſivem Gefieder, richtige Zuchtp., welche ſofort zur Brut ſchreiten. 6 ℳ. 3 P. 16,50 ℳ, **Wellenſittiche,** ausgefärbte Pare, 5 ℳ, **Gebirgsloris,** ſelten ſchön. P. 30 ℳ, **Schuppenloris Ia** P. 38 ℳ. **Graukӧpfchen,** prachtv. Zuchtp., 2,50 ℳ, import. **Zebrafinken** Zuchtpar 4,50 ℳ. **Gürtelgrasfinken** Zuchtp. 7,50 ℳ. **Chineſiſche Nachtigalen** (ſelten ſchön), extra ausgeſuchte feurige Doppelüberſchläger, 5 ℳ und von allen in Nr. 7 ausgebotenen Vogelarten noch Vorrath. Reelle Bedienung; Garantie f. lebende und tadelloſe Ankunft. [445]
Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [446]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [447]

Holzwaarenfabrik.
Holzwaarenfabrik.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6.— franko.
Man verlange Preisliste.

Verkaufe ein faſt neues gr. **Vogelbauer** (1,5 × 1 × 0,5 m) für 15 ℳ und ein kleineres (80 × 30 × 25 cm) für 5 ℳ. [448]
O. Rzeppa, Schneider, Mittweida i. S.

Für alle Arten Vögel fertige ich ſachgemäße
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [449]

Preisliſte über praktiſche
Vogelkäfige
Aquarien, Terrarien ꝛc. (m. 100 Abb.)
Hochfeine bell gereinigte
Vogelfutter
verſende gratis und franko. [450]
E. Göller, Köln a. Rh.



Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in
praktiſcher
Anordnung,
großer Auswahl u. billigem Preis. [451]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
Arthur Herrmann & Luther, Oschatz i. S.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[452] **R. Schröter, Elingen-Greußen.**



Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ. **Netzfallen,** kleine 80 ₰, größ. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ. **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [453]
Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112.
Illuſtrirte Preisliſte gratis.

Eine g. neue Vol., noch n. gebr., auch a. Heckk. z. ben., m. ſmtl. Niſtutenſil., 150 cm h., 130 l., 56 t., für 32 ℳ z. verk., Werth 70 ℳ. Tauſch auf Vögel nicht ausgeſchl. [454]
A. Klupsch, Görlitz. Auguſtaſtr. 20.

Futtermittel.

Mehlwürmer, große Futterware, ganz rein, Liter 5 ℳ, Kilo 8 ℳ, Verpack. frei. [455]
Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

! Gut gereinigtes Vogelfutter !
ohne jede weitere Anpreiſung wie Ia, prima u. a., verſende nur wirkl. beſte Ware.

Sommerrübſ.	5 Ko. 1,70 ℳ,	1 Ko.	40 ₰
Glanzkorn	„ „ 1,30 „	„ „	30 „
Silberhirſe	„ „ 1,80 „	„ „	40 „
Schälhafer	„ „ 1,80 „	„ „	40 „
Senegalhirſe	„ „ 2,00 „	„ „	50 „
Sonnenroſenk.	„ „ 1,80 „	„ „	50 „
Hanf	„ „ 1,60 „	„ „	40 „
Carottengries	„ „ 4,50 „	„ „	110 „
Droſſelfutter	„ „ 4,00 „	„ „	100 „
Nachtigalfutt.	„ „ 7,00 „	„ „	200 „

Ameiſeneier 1 Lit. 80 ₰, 10 Lit. 7,50 ℳ.
Alle anderen Futterſort. bill. Prsl. frei. [456]
H.P Lange, Samenhdl., **Gottesberg** i. Schl.

Mehlwürmer,
ſtaubfrei, à Lit. ℳ 4,50, Ko. ℳ 8, **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Lit. ℳ 1, bei 10 Lit. 90 ₰; 1 bei 5 Lit. 70 ₰, bei 10 Lit. 65 ₰ empfiehlt u. verſ. geg. Nachn. [457]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Ameiſeneier
prima, geſiebte u. ſandfreie Ware, per Ko. ℳ 3, per 5 Ko ℳ 14. [458]
Hochprima Qual. per Liter 80 ₰.
Sommerrübſen Ia ſüß
per 5 Ko. ℳ 2,20, per 50 Ko. ℳ 18.
Weiße Silberhirſe
per 5 Ko. ℳ 2,20, per 50 Ko ℳ 18
empfiehlt **Carl Kämpf, Mainz.**

Mehlwürmer in guter, ſauberer Ware, das Liter 5 ℳ, Kilo 8 ℳ. Verpackung frei. [459]
Carl Bertram, Elberfeld, Brüderſtr. 8.

1898er hochprima getrocknete und ſorgfältigſt gereinigte [460]
Ameiseneier,
1 Liter mit 85 ₰ liefert
Gottlieb Wanek, Vogelhdl.
Prag (Böhmen).

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:
„Insectiverous",
Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die
Samenhandlung von **Karl Capelle,** Hannover.
Geſetzl. geſchützt.
Geſetzl. geſchützt.
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [461]
Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

den Eindruck recht kranker Vögel, obgleich dieſelben meiſtens nur verkommen und durch Entziehung von Licht und Luft entkräftet ſind.

Nachdem nun dieſe Vögel für einen ziemlich hohen Preis erſtanden, wandern ſie oft ſchon auf dem Schiffe in die zweite und dritte Hand, jeder nimmt einen beſcheidenen Nutzen; der letzte Beſitzer begibt ſich endlich mit ſeinen Papageien nach Hauſe.

Da die friſch importirten Vögel nicht ſelten den Keim zu ſchweren epidemiſch auftretenden Krankheiten in ſich tragen, ſo werden ſie vor allem iſolirt, einzeln gekäfigt, und mit aufgeweichtem Weißbrot, angekochtem Mais und Hanf verpflegt und der bedürftigen Ruhe zwei bis drei Tage lang überlaſſen.

Leider bringen die grünen Papageien häufig ungemein viel Ungeziefer mit. Dieſes zu entfernen, habe ich folgendes Verfahren angewandt. Am erſten Tage wird der meiſt ſehr ſchmutzige Vogel einer gründlichen Reinigung durch Abſpritzung mit warmem Waſſer (ohne Zuſatz von Rum oder Kognak) unterzogen. Daß er nach dieſem Verfahren zugedeckt und dem Sonnenlicht ausgeſetzt, bzl. in die Nähe des Ofens gebracht wird, iſt ſelbſtverſtändlich. Bei genauerer Beſichtigung des Vogels findet man an allen Theilen des Körpers Wunden, die er ſich ſelbſt infolge des Hautreizes zugefügt hat. Auch kann man die Schmarotzer erkennen. Es wäre nun Thierquälerei, den Vogel mit Inſektenpulver, -Tinktur u. a. zu behandeln, bevor die Wunden geheilt ſind. Vielmehr empfehle ich folgendes Verfahren. Der Papagei wird in ſeinem Käfig belaſſen, während der Unterſatz entfernt wird, jedoch das über demſelben befindliche Gitter darin bleibt. So wird der Käfig über einen Eimer geſetzt, der zur Hälfte mit heißem, ſoeben gekochten Kamillenthee gefüllt iſt, und dann von allen Seiten feſt zugedeckt. So bleibt er etwa zwei Stunden ſtehen, bis der Thee völlig erkaltet. Durch dieſes Dampfbad werden die Wunden des Vogels geheilt und die zuſammengeklebten Federn öffnen ſich; auch die oft vorhandene, im Entſtehen begriffene Augenentzündung (beſonders häufig bei Doppelgelbköpfen) wird dadurch geheilt. Solche Dampfbäder gibt man dem Vogel einen Tag um den andern, im ganzen dreimal. Sie haben zugleich den Erfolg, daß die alten abgebrochenen Federſtumpfe ausfallen.

In der nächſten Woche wird der Papagei zwei- bis dreimal (in Zwiſchenpauſen von je einem Tage) mit lauwarmem Waſſer unter Zuſatz von Glyzerin (1 : 50) abgeſpritzt. Hiernach iſt er von den Wunden und zugleich vom Ungeziefer gänzlich befreit, ſodaß eine ſpätere Behandlung mit Inſektenpulver kaum noch nöthig iſt.

Nach Anwendung dieſer Mittel und ſachgemäßen Futters (auf welches ich noch im Folgenden zu ſprechen komme) erſcheint die Amazone, die bei der Ankunft den Eindruck eines kranken, im Gefieder ſtruppigen Vogels machte, nach Verlauf von 14 Tagen glatt und ſchön im Gefieder, das grasgrüne Federkleid tritt glänzend hervor, das Gelb markirt ſich und der Vogel macht einen abſolut geſunden Eindruck. —

Auch ſpäter, wenn der Papagei völlig eingewöhnt, iſt zur Erhaltung ſeiner Geſundheit und ſeines Gefieders eine regelmäßige Gefiederpflege nothwendig. Dieſelbe beſteht in Abſpritzung mit lauwarmem Waſſer unter Zuſatz von wenig Rum, bzl. Kognak, im Sommer wöchentlich zweimal, im Winter einmal. Nach derſelben iſt der Vogel zuzudecken und vor Erkältung zu ſchützen. —

Eine Untugend, die der Vogel von der Heimat mitbringt, bzl. ſich auf dem Schiff angeeignet hat, iſt das Freſſen ſeiner eigenen Entlerung, die ſich äußert, ſobald man es verſucht, das ihm bisher im Uebermaß gereichte Weichfutter theilweiſe zu entziehen. Dagegen empfehle ich folgendes Verfahren. Der Papagei erhält zuerſt ein wenig in Milch erweichtes Weißbrot im beſonderen Napf; nachdem er dies verzehrt, reiche ich ihm Hanf, angekochten Mais und Spitzſamen. Er wird zuerſt wol nur den angekochten Mais freſſen, macht ſich dann über die Entlerungen her und geht erſt im Nothfall an Hanf und Spitzſamen. Hier heißt es nun vorſichtig aufpaſſen, die Entlerungen häufig am Tage entfernen und das Gitter über dem Boden erhöhen. Hilft dieſes nicht, nachdem man es einige Tage verſucht hat, ſo thue ich Folgendes. Die friſche Entlerung wird mit ſchwacher Lyſol-Löſung (1 : 100) mit einem Pinſel beſtrichen und im Käfig belaſſen. Der Papagei wird darüber herfallen und davon freſſen, jedoch durch den widrigen Geſchmack abgeſchreckt. Wiederholt man das Bepinſeln acht bis vierzehn Tage, ſo iſt der Vogel gezwungen, die ſcheußliche Angewohnheit zu laſſen und an das Körnerfutter zu gehen.

Eine weitere Untugend iſt das ziegenartige Meckern der Amazonen; beſonders zeichnen ſich darin die Portoriko- und Kubaamazone aus. Man kann ſicher ſein, daß die Papageien, welche die unangenehmen Laute hören laſſen, junge, mangelhaft verpflegte Vögel ſind, welche aus Kraftloſigkeit das Körnerfutter nicht zerbeißen können und infolgedeſſen aus Hunger nach Weichfutter meckern. Ich empfehle in dieſem Fall, dem Vogel normales Futter zu geben, nur morgens und mittags eine kleine Gabe Weißbrot, und ſich trotz der widerlichen, immer wiederholten Töne nicht verleiten zu laſſen, ihm mehr Weichfutter zu geben. Das übermäßige Darreichen von Weißbrot entkräftet den Vogel umſomehr, als es zuviel abführt; wird er gezwungen, Körnerfutter zu nehmen, ſo kräftigt er ſich von ſelbſt. Auch jede Gabe von Obſt iſt bei dieſen „Meckerern“ zu vermeiden. —

Das Selbſtrupfen findet man in der Regel bei älteren Vögeln, bei jungen, friſch eingeführten ſelten. In den meiſten Fällen, wo ich Selbſtrupfer vor mir hatte, waren es Papageien, die bereits zwei bis drei Jahre und länger im Käfig ſich befanden und in unnatürlicher Weiſe mit menſchlichen Nahrungsmitteln, beſonders Fleiſch (auch Speck), Gemüſe, Kartoffeln u. dergl. gefüttert wurden und ſich übermäßig gut bei Leibe befanden. Selbſtverſtändlich iſt der einzige Weg zur Heilung die Gewöhnung an naturgemäße Nahrung, gute Gefiederpflege und die genaue Behandlung nach Dr. Ruß' Buch „Die Amazonenpapageien“.“

Die fremdländiſchen Girlitze ſind, gleich dem einheimiſchen Verwandten, angenehme, anſpruchsloſe Stubenvögel. Man gewöhnt ſie mit afrikaniſcher Kolbenhirſe oder beſter weißer Hirſe ein; ſpäter nehmen ſie alle anderen Hirſen, Kanarienſamen, Mohn, Rübſen, Hanf, geſchälten Hafer u. a. Wenn ſie gut eingewöhnt ſind, bietet man ihnen als Zugabe Grünkraut und ein Gemiſch von Ameiſenpuppen und Eierbrot, zuweilen auch friſche Feigen. Als Aufzuchtfutter während der Brut reicht man kleinſte friſche Ameiſenpuppen, eingequellte oder in Milch ſtehende Sämereien, etwas hartgekochtes Eigelb, ſowie kleine weiche Kerbthiere, die ſie überhaupt zu jeder Zeit gern nehmen, oder in Ermangelung derer zerſchnittene Mehlwürmer.

In der Vogelſtube ſind ſie gegen alle anderen Vögel friedfertig. Nur zwei Pärchen derſelben Art vertragen ſich nicht und auch die verſchiedenen Girlitzarten unter einander befehden ſich in der Regel.

Das einzelne Männchen als Sänger kann man im Finkenbauer oder Kanarienvogelbauer halten. Wer ein Pärchen allein niſten laſſen will, ſetzt es in den bereits beſchriebenen Finken-Heckkäfig, in dem alle Niſtvorrichtungen innen angebracht ſind. —

Den Uebergang von den Zeiſigen zu den Girlitzen bildet der Totta-Girlitz (F. totta, *Gm.*), auch Tottazeiſig genannt; er iſt an Oberkopf, Kopf- und Halsſeiten olivenbraun; Rücken dunkelgrünlichbraun; Schwingen ſchwarzbraun, weiß geſäumt; obere Schwanzdecken grünlichgelb; Schwanzfedern ſchwarzbraun, die beiden mittleren weiß; Kehle und Oberbruſt gelbgrünlichbraun, dunkelbraun geſtrichelt; Bruſt und Bauch olivengrünlichgelb; Seiten grünlichgrau; Schnabel dunkelbraun, Unterſchnabel heller; Augen und Füße braun. Das Weibchen erſcheint oberſeits fahler graubraun und unterſeits düſter graugrünlichgelb. Die Heimat erſtreckt ſich über Südafrika. In den Handel gelangte er zweimal vereinzelt. Sein fleißig vorgetragener Geſang klingt angenehm und melodiſch. —

Obenan in der Reihe der fremdländiſchen Girlitze ſteht natürlich der wilde Kanarienvogel (F. canaria, *L.*). Ueber ihn und ſein Freileben, das Dr. Karl Bolle eingehend geſchildert, hat mein Vater ſowol in dem genannten großen Werk, wie in dem Buch „Der Kanarienvogel“ ausführlich geſchrieben und aus dem letzteren iſt die Schilderung in ſo viele populäre Bücher und Schriften übergegangen, daß ſie wol ſämmtlichen Leſern bekannt ſein dürfte und ein Eingehen darauf an dieſer Stelle überflüſſig erſcheint. Bemerkt ſei nur, daß der wilde Kanarienvogel ſeit zehn Jahren völlig im Handel fehlt. Wenn Vögel unter dieſem Namen ausgeboten werden, ſo iſt es entweder irgend eine afrikaniſche Girlitzart oder der kurzſchnäblige Girlitz von Südamerika oder der Safranfink. Der Wildling ſcheint in ſeiner Heimat ſelten geworden zu ſein. Auf den Kanaren ſelbſt hält man meiſt aus Europa eingeführte Kanarienvögel der verſchiedenſten Raſſen im Käfig.

Von den übrigen Verwandten will ich zuerſt den kurzſchnäbligen Girlitz (Fringilla brevirostris, *Gld.*) beſprechen. Er war früher der Liebhaberei völlig unbekannt, iſt aber in den letzten Jahren häufig eingeführt worden und wird gerade gegenwärtig auf dem Vogelmarkt zahlreich ausgeboten. Daher bringen wir in der heutigen Nummer ſeine Abbildung.

Sein Gefieder erſcheint an Stirn und Oberkopf gelblichgrün, breit dunkelgrüngrau längsgeſtreift; Zügel hell gelblichgrün, ebenſo ein Bartſtreif jederſeits; Kopfſeiten dunkelbräunlichgrün; Nacken, Oberrücken und Schultern ebenſo, jede Feder mit ſchwärzlicher Mitte; Schulterdecken und große Flügeldecken bräunlichſchwarz, breit fahlbraun gerandet, Schwingen bräunlichſchwarz (die erſten an der Außenfahne ſchmal gelblich, Innenfahne ſchmal hellgelb geſäumt, die zweiten Schwingen an der Außenfahne breit fahlbraun, Innenfahne fahlgrau; alle Schwingen unterſeits aſchgrau); kleine unterſeitige Flügeldecken gelb; Unterrücken und Bürzel düſter gelblicholivengrün; Schwanz fahl rußſchwarz, unterſeits aſchgrau; Kehle hell ſchwefelgelb; Bruſt- und Bauchſeiten düſter bräunlichgelb; unterſeitige Schwanzdecken weißlichgelb; Schnabel röthlichhorngrau, Oberſchnabel an Firſt ſchwärzlich, Spitze gelbgrau; Augen braun; Füße horngrau. Größe unſeres Zeiſigs. — Ich habe die Beſchreibung ſo ausführlich gegeben, weil dieſe Art in der dritten Auflage von Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nicht erwähnt worden (ſie war damals noch nicht eingeführt).

Erſt im Jahr 1889 gelangte der kurzſchnäblige Girlitz auf unſern Vogelmarkt und zwar wurde er als „wilder Kanarienvogel“ ausgeboten. Mein Vater ſtellte die Art als Crithagra s. Serinus brevirostris, *Gld.* feſt; Herr F. L. Hoëſt, Direktor des Thiergartens in Antwerpen, beſtätigte zuerſt, daß dieſe „Kanarienwildlinge“ nicht von den Kanaren, ſondern aus Argentinien ſtammten.

Die Heimat des kurzſchnäbligen Girlitz erſtreckt ſich über ganz Chile, wo er ſehr häufig iſt. Man findet ihn zumeiſt in getreidereichen Ebenen und in Weingärten; er ernährt ſich von den Körnern des reifenden Getreides, doch auch von Unkrautſämereien. In manchen Gegenden, wo er in Scharen in die Felder einfällt, richtet er Schaden an. Er iſt Zugvogel, verläßt zeitig ſeine Brutplätze und erſcheint erſt ſpäter wieder. C. Landbeck, der bereits im Jahr 1877 das Freileben dieſes Vogels in der Zeitſchrift „Der zoologiſche Garten“ beſchrieb, ſagt: „Gewöhnlich wandert er in größeren Geſellſchaften und wenn er im Frühjahr ankommt, belebt er eine ganze Gegend mit ſeinem pieperartigen Geſang. Er ſteigt ſingend in die Höhe, fliegt ebenſo von einem Baumwipfel zum andern oder läßt ſich langſam flatternd auf die Erde nieder. Im weſentlichen iſt ſein Geſang nur ein mehrfach modulirtes „ji, ſi, ſi“ und erinnert an den des deutſchen Girlitz und die leiſen Töne eines Kanarienvogels oder den des Wieſenpiepers; auch ſein Lockton, den er beim Auffliegen hören läßt, erinnert an das ſcharfe „hißt“ der Pieper. Sein ziemlich kunſtvolles Neſt findet man im Graſe; es enthält fünf bis ſechs grünliche, vielfach braungefleckte Eier. Er iſt nicht ſcheu, vielmehr zahm und zutraulich, gewöhnt ſich leicht an die Gefangenſchaft und ſingt auch im Käfig fleißig. Eine angenehme Muſik entſteht, wenn bald nach ihrer Ankunft einige Hundert dieſer Vögel zugleich ſingen. Es gibt auch gelbe Varietäten und es iſt wahrſcheinlich, daß er bei völliger Einbürgerung in ähnlicher Weiſe ſich verändern würde, wie der Kanarienvogel“.

Wenn Letzteres einträfe, ſo ſteht dem kurzſchnäbligen Girlitz vielleicht eine große Zukunft bevor. Vorläufig wollen wir hoffen, daß er ſich in den Vogelſtuben ſo einbürgern möge, wie der Grauedelfink, der Mozambik(Hartlaubs)zeiſig, gelbſtirnige Girlitz u. a.

Manche Ornithologen zählen dieſen Vogel nicht zu den Girlitzen; indeſſen hat er in ſeiner Erſcheinung, im Benehmen, in der Lebensweiſe und im Geſang größte Aehnlichkeit mit unſerm Girlitz, wie auch Landbeck ausdrücklich betont.

(Fortſetzung folgt).

Beobachtungen auf einer Gebirgswanderung in Galizien, der Bukowina, Siebenbürgen und Rumänien.

Von Joſef Wagner.

(Schluß).

Gegen Abend kam ich, nach vielleicht einer halben Stunde, zu einem kleinen Flecken, der den deutſchen Namen Eliſensruh führt. Längere Zeit ſaß ich müde auf einem großen Stein, in dieſer ſo einſamen, nur von kleinen Bächen umrauſchten Stille. Dann ging ich langſam zurück zur Touriſtenhütte; es war ein herrlicher Abend; alles zwitſcherte und brachte ſeine Melodien nach eigner Art, Singdroſſeln, Baumpieper, Laubvögel, Finken, Haidelerchen, Amſeln und am zahlreichſten Schwarzplattel und Rothkehlchen, auch Zaunkönige. Als ich an der Touriſtenhütte ſaß, mein Maisbrot trocken verzehrend, kamen die Zaunkönige dicht heran und ſetzten ſich auf die daneben befindlichen Steine, keck ihren Geſang ſchmetternd. Die Rothkehlchen waren ebenſo dreiſt und ſangen bis in die Dämmerſtunde hinein. Die Ueberſchläge der Schwarzplattel hörte man von weitem, immer ſich gegenſeitig aneifernd, als wollte jeder der beſte Künſtler ſein. Unter den Rothkehlchen gab es Primaſänger, jedoch ein- und dieſelbe Stammraſſe traf ich in dem ganzen Alpengebirge. Alle Rothkehlchen mit wenig Ausnahme hatten eine ſcharfe, klare Stimme, gut rollend, die Touren langgezogen, die Schlußſilbe meiſtens mit einem „ſchi, ſchi, wieſchie, ſii, ſiee“.

Die Schwarzplättchen waren meiſtens tiefſtimmige, jedoch mit einem ſehr langgezogenen Ueberſchlag, den Ueberſchlag wiederholend, wie man ſie wirklich nicht in allen Gegenden zu hören bekommt. Dennoch muß ich behaupten, es gab Primaſänger darunter; mit unbeſchreiblicher Kraft ertönte der tiefe melodiſche Ueberſchlag durch die Kronen der hohen Bäume hindurch und niemals werde ich es zugeben, wenn Jemand behaupten wollte, gute Schwarzplattel gibt es nicht mehr; das könnte nur von Vogelliebhabern behauptet werden, die in ihrem Leben nirgends hingekommen ſind. Ich habe in Italien im vorigen Jahr eine ganz andere Oertlichkeitsraſſe angetroffen; freilich ſollte es etwas ſchwer halten, nach den dortigen Alpen zu wandern und ſich einige Schwarzplattel zur Liebhaberei zu fangen; ſie würden wol etwas theuer kommen. Andrerſeits traf ich die hochſtimmigen Schwarzplattel mit lautem Vorgeſang, der Vorgeſang in Ueberſchlag eingehend, in den Wäldern von Koburg.

Die Nacht war mittlerweile hereingebrochen und ich begab mich zur Ruhe, einen ſchönen Morgen erwartend. Und richtig, um 3½ Uhr, als ich aufſtand, war der Morgen wirklich herrlich. Alles lebende Gethier ließ ſeine Stimmen hören. Das Vogelleben iſt dort reichhaltig und ungeſtört, bemerken will ich noch: Sproſſer gab es in den hohen Regionen nicht mehr, aber bei Hochtouren, die ich unternahm, noch häufig die Ringdroſſel und Alpenbraunelle. Gerade dieſer Ort bietet den ſchönſten Punkt zum beobachten, von wo aus man, wenn man auf mehrere Tage gut verproviantirt iſt, herrliche Gebirgstouren machen kann, auch nicht ſelten einen Bären zu Geſicht bekommt. Freilich auf Geſellſchaft oder vielleicht Touriſten auf den Bergtouren dürfte nicht viel zu rechnen ſein, da dieſe Gebirge deutſcherſeits wenig oder garnicht beſucht werden, wenigſtens habe ich nie Geſellſchaft getroffen. Und doch bietet es für den Naturfreund einen unbeſchreiblichen Reiz! Beſonders der Vogelliebhaber kann ſeine Wünſche, am Geſang der gefiederten Lieblinge ſich zu laben, befriedigen. Was den Buchfink in dieſem Gebirge anbetrifft, ſo zeigt er ſich als ein vorzüglicher Sänger; es kommt auch noch vereinzelt der Reitzugfink vor, welcher einen guten abgeſetzten Schnapp bringt.

Der Zaunkönig iſt auch als guter Sänger dort heimiſch, jedoch müßte ich von allen Zaunkönigen, welche ich ſowol in Norwegen, wie in Italien, Montenegro, Bosnien u. a. vernahm, den Vögeln in der Schweiz, wie ich ſie überall in Freiheit genau in Geſangsweiſe abgehört, den Vorzug geben. Das iſt für den Natur- und Vogelfreund gerade lehrreich, wenn man bedenkt, wie dieſer kleine Schlüpfer ſich an jedes Klima anpaßt; zum Beiſpiel bei Neapel, Pompeji, Inſel Capri, in dieſem warmen Klima, vernahm ich ihn, andrerſeits in Norwegen, bei Stahlheim im Näröthal, bei Merake (ſogar beim Schwartieſengletſcher hörte ich ihn ſingen) oder in der Schweiz beim Rhonegletſcher und Gemmipaß oder in der Gornergradſchlucht. Sehr viele ſolcher Orte könnte ich noch angeben. Anders iſt es mit dem Gartenlaubvogel und der Gartengrasmücke, die bloß zwiſchen gewiſſen Breitegraden in Europa als Brutvögel vorkommen.

Auch die Singdroſſel zeigt ſich in ihrer Geſangsweiſe beſſer dort, als in unſeren märkiſchen Wäldern. Der Dompfaff erſcheint häufiger, ſo auch Zeiſige und Kreuzſchnäbel.

Nach meinem langen Aufenthalt nebſt den ſchönen Gebirgstouren, die ich gemacht, mußte ich doch an meinen Rückmarſch denken, gern wäre ich noch eine zeitlang dageblieben, aber was half es, die Zeit verſchwand in Eile. An einem Montag früh ging nun der Rückmarſch vonſtatten und ich verließ dieſe Alpen und verabſchiedete meinen Träger, den ich ſo lange bei mir hatte. Der ſo viele Meilen weite Marſch war mit großer Anſtrengung verknüpft, zumal mich noch etwa in der Mitte des Wegs ein heftiges Gewitter überraſchte; keine Hütte, kein Haus, nichts zum Untertreten. Im erſten Dorf nahm ich mir einen Wagen, um noch rechtzeitig nach Nagiſcheben zu kommen, um die Bahn zu erreichen; in Dörvis angelangt, ging der Schnellzug nicht weiter, weil das Gewitter den Bahndamm unterwaſchen hatte, ſo wurde ein Aufenthalt von ſieben Stunden gemacht. Nach Hin- und Herberathen mit dem Stationschef, fuhren wir eine andere Linie, um nach Deweſch zu gelangen. Nun ging es mit der Bahn weiter heimwärts.

Der Wiedehopf, ſeine ſachgemäße Aufzucht und Pflege vom Neſtling bis zum ausgewachſenen Vogel.

Von A. Reuter.

(Fortſetzung).

Miſchfutter für ausgewachſene Wiedehopfe. Die Hauptbeſtandtheile ſind wieder eingeweichte und mit Milch angefeuchtete Semmel; hierunter miſche man hartgeſottenes und zerkleinertes Hühnerei, wovon der Wiedehopf das Weiße zuerſt nimmt. Geſottenes mageres Rindfleiſch fein zerſchnitten, Rinder- oder Kalbsherz, auch Kalbsleber geſotten und auf dem Reibeiſen gerieben, iſt vorzüglich zur Miſchung. Ueberhaupt ohne Fleiſch oder fleiſchähnliche Beſtandtheile iſt es nicht denkbar, den Wiedehopf dauernd zu erhalten, er würde den ganzen Tag betteln und unruhig hin- und herlaufen, nach und nach abmagern, zuletzt eingehen. Als Leckerbiſſen reiche man 10 bis 15 Mehlwürmer täglich, auch nackte Raupen, Grillen, Heuſchrecken, nackte kleine Schnecken, Maden, Engerlinge, alles Gewürm, Küchenſchaben, alle Käfer und Schmetterlinge, Fliegen und Spinnen, kurzum alles, was da kreucht und fleucht, mit Ausnahme von Stechfliegen, Weſpen, Bienen und Hummeln, ſowie giftige Inſekten, als ſpaniſche Fliegen u. a. Man hat natürlich nicht immer ſelbſt ſoviel Zeit übrig, um auf Kerſe Jagd zu machen. Dieſe werden aber von Schulknaben, denen man je nach Leiſtung ihren Fang bezahlt, leicht und gern beſchafft.

Auf dieſe Weiſe kann man ſich auch in den Beſitz von unzähligen Maikäfern ſetzen, aus welchen man ein vorzügliches Winterfutter im Vorrath bereiten kann, beſonders da die Maikäfer alle Eigenſchaften zur nöthigen Gewöllbildung der Weichfreſſer haben; ich verfahre damit auf folgende Weiſe: habe ich ein Quantum Maikäfer beiſammen, ſo ſchütte ich dieſelben in einen Kübel, welchen ich vorher zu etwa einem Drittel mit kochendem Waſſer gefüllt habe. Sind nun die Käfer in dem Kübel, ſo ſchütte ich noch ſo viel kochendes Waſſer hinzu, bis es genügt, um alle zu brühen; ſo behandelt, ſind ſie am ſchnellſten und ohne Quälerei abgetötet. Iſt dieſes geſchehen, ſo ſchütte ich dieſelben in ein bereitgehaltenes Sieb und hänge ſie etwa acht Tage an die Sonne; ſind ſie ſoweit eingetrocknet, ſo bringe ich ſie auf einem Blech in den Backofen, um ſie vollſtändig gar zu dörren, ſodaß ſie ſich mit den Fingern zerreiben laſſen; nun mahle ich ſie auf meiner ausgebrauchten Kaffeemühle herunter oder ich ſtoße ſie in einem Mörſer zu Pulver, bringe daſſelbe nochmals auf dem Blech in den Ofen, bis es untrüglich vollſtändig ausgetrocknet iſt, denn dies iſt unbedingt nöthig, da es ſonſt leicht ſchimmlich und muffig wird. Hierauf fülle ich es in Blechbüchſen oder Gasflaſchen, verſchließe dieſe gut und bewahre ſie an einem trockenen Ort auf. Von dieſem Schrot ein Kaffeelöffel voll unter das Futter gemengt, iſt vorzüglich; ich habe mit dieſem Käfermehl die ſehr empfindlichen Gartenlaubvögel ſehr gut überwintert und durch die Mauſer gebracht.

Zu dieſem Hauptfutter verlangt nun der Wiedehopf auch allerlei Leckereien und man darf ihm die von mir angeführten Futtermittel ohne alle Bedenken vorſetzen, es gereicht ihm nur zu beſſerem Wohlbefinden und Gedeihen. Er liebt z. B. alle genießbaren Berenarten, als Heidelberen, rothe und ſchwarze Hollunder-, Ebereſchen-, Preißelberen, Johannis-, Bromberen und Himberen, natürlich in gutem, nicht faulem Zuſtand. Jedoch Beren allein würden ihm nicht genügen, das Hauptfutter bleibt immer Fleiſchnahrung. Auch nimmt er gern zerkleinerte Apfel- oder Birnenſtückchen, auch Dörrobſt, vorzüglich Feigen, jedoch alles klein geſchnitten. Beren verſchluckt er nie ganz, ſondern bearbeitet dieſelben zuerſt mit dem Schnabel, indem er ſie auf den Boden ſtößt, bis er mundgerechte Stückchen hat. Zur Gewöllbildung genügen die unverdaulichen Beſtandtheile der Käfer und Würmer, außerdem reibe ich auf dem Reibeiſen friſche Mören, aber ohne Semmel darunter zu miſchen, dagegen etwas Mohnmehl und eine kleine Gabe gequetſchten Hanfſamen darunter, dies reicht vollſtändig zur Gewöllbildung aus. Guten Käſequargk nimmt er auch ſehr gern, ſowie ab und zu ein Stückchen geſottene und zerdrückte Kartoffeln; man gebe ihm jedoch letztere Futterſtoffe in ein beſonderes Geſchirr. Von menſchlicher Nahrung iſt ihm überhaupt manches zuträglich, wenn es nur nicht ſtark gewürzt oder ſehr geſalzen iſt.

Mein Wiedehopf läßt es ſich nicht nehmen, mir bei Tiſche Geſellſchaft zu leiſten; ſobald er die Teller ſieht, läßt er ſein „gääck“ hören und kommt dreiſt auf den Tiſch, um ſich ſeinen Antheil zu holen; am beſten ſchmeckt ihm da irgend eine Mehlſpeiſe, z. B. Schnittnudeln, Spätzle, alle Sorten Breikartoffeln oder Erbſen und Purree; ſelbſt Sauerkraut verſchmäht er nicht. Man gebe jedoch acht, daß alles, was man ihm bei Tiſche gibt, nicht mehr heiß iſt. Milchhaut nimmt er auch mit Vorliebe. Kann man friſche Grieben, alſo den Rückſtand von ausgelaſſenem Schweinefett, bekommen, ſo darf man ſie ihm ruhig in kleine Stückchen zerſchnitten unter das Futter miſchen, es bekommt ihm ſehr gut und er ſucht ſie ſich zu allererſt aus dem Futtertrog. Ich gebe dieſes Futter ſchon jahrelang meinem Wiederhopf; es iſt ihm überhaupt, wie allen Weichfreſſern, dienlich, ab und zu etwas Fettes zu bekommen. Waſſer trinkt der Wiedehopf ſehr wenig, deſſen ungeachtet gebe man ihm ein Trinkgeſchirr, welches tiefer ſein muß, als ſein Schnabel lang iſt, da er ſonſt nicht trinken kann, wegen ſeiner kurzen Zunge. Baden wird er nie im Waſſer, ſondern im Sande, und zwar zu öfteren Malen des Tages, weshalb man ihm in der Mitte des Käfigbodens ein größeres Häufchen feinen Sand aufſchüttet, gleichwie bei Lerchen und Wachteln; er badet nach Hühnerart, indem er ſich mit den Flügeln und Füßen den Sand unter die Federn ſtreut und mit Hilfe ſeines Schnabels den verſcharrten Sand wieder zuſammenwirft. Bei dieſer Arbeit darf man ſich ihm nicht zu ſehr nähern, wenn man ſeine Augen vor Sand bewahren will. Trockenes Futter taucht er vorerſt in's Waſſer, bevor es verzehrt wird, ein Zeichen, daß er mehr naſſes als trockenes Futter liebt.

(Fortſetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich möchte Ihnen eine intereſſante Epiſode aus dem Leben der Stare mittheilen. Als großer Vogelliebhaber hing ich im vorigen Jahr im Februar zwei Niſtkäſten für Stare aus, den einen am Schornſtein auf dem Pappdach, den andern unter das etwas überhängende Dach; bald ſtellten ſich auch die Stare ein, beide Käſten wurden durch je ein Par in Beſitz genommen. Drei Tage ſpäter wurde das Pappdach neu getheert und die Vögel wurden hierdurch etwas geſtört, indem ſie ſich, ſolange auf dem Dach gearbeitet wurde, nicht ſehen ließen, nachdem die Arbeit auf dem Dache vollendet war, ſtellten ſich auch die Stare wieder ein, aber mit ihnen auch vier andere Stare, die ebenfalls Beſitz von den Käſten nehmen wollten; es entſpann ſich nun ein heftiger Kampf auf dem Schornſtein, der ſo erbittert geführt wurde, daß zwei davon, die ſich beſonders ſtark bekriegten, vom Schornſtein herunter auf das Dach fielen. Hier erwartete ſie ein ſchreckliches Schickſal, der Theer war von der ſchon ſtark ſcheinenden Sonne erweicht, und ſo blieben beide darin mit den Füßen ſtecken; im Begriff, jetzt wegzufliegen, machten die armen Vögel auch noch mit den Flügeln Bekanntſchaft mit dem Theer, alles Zappeln half nichts, es wurde nur ſchlimmer dadurch. Das war aber auch das Zeichen für mich, den armen Staren zu helfen in ihrer Noth; da das Dach hier ziemlich ſchräg war, war es ein ziemliches Wageſtück, die Vögel dort herunterzuholen, ich zog deshalb alte Strümpfe an und wagte mich ſo ohne Schuhe auf das Dach und hatte auch das Glück, den einen gleich zu faſſen, während der andere ſich ſo weit ſelbſt befreite, daß er an den Rand des Daches kam und hier zu entkommen ſuchte, doch es half nichts, die Flügel waren verklebt; er fiel deshalb aus einer Höhe von 26 m herab auf den gepflaſterten Hof, hier wurde er nachher gefangen. Aber wie ſahen die Vögel aus! Volle zwei Stunden haben meine Frau und ich Mohrenwäſche mit Butter und grüner Seife gehalten, bis dieſelben einigermaßen wieder rein waren. Da ich ſie nun nicht gleich wieder fliegen laſſen konnte, that ich beide in meine Wellenſittichhecke, eine Boden-Kammer von 2½ m Tiefe, 3 m Länge und 2 m Höhe. Hier in dem Sand lief der eine ſich bald wieder trocken und rein, während der andere ſofort in einen Kaſten verſchwand, der für ein Nymphenſittich-Pärchen beſtimmt war. Hier fand ich ihn am andern Morgen verendet vor; er hatte ſicher beim Fallen in eine ſolche Tiefe ſich innerlich verletzt; der andere war dagegen ſehr munter und nahm die ihm angebotene Nahrung mit einer Dreiſtigkeit aus der Hand, die geradezu Staunen erregte. Ich behielt ihn nun noch drei Tage, dann gab ich ihn der Freiheit zurück; vorher hatte ich ihm jedoch einen ſogenannten Geflügelring mit der Jahreszahl 1898 am Bein befeſtigt, und hatte nun das Vergnügen, ihn ſofort auf den Kaſten zuſteuern zu ſehen. Die Stare hatten dann im Mai ſchon Junge. Dieſer Tage iſt er nun wieder zurückgekehrt vom ſüdlichen Klima, was man deutlich ſehen kann, da er den Ring nicht verloren hat.

In dieſen Tagen beobachtete ich, wie ein Elſternpar ſein durch Sturm und Wetter arg beſchädigtes Neſt wieder neu herſtellen wollte, dieſelben wurden durch ein Krähenpar daran gehindert, indem letztere ſich unmittelbar in das Neſt ſetzten und jede Annäherung der beiden Elſtern durch Schnabelhiebe vereitelten. Schließlich wurde der einen Elſter die Sache wol zu bunt, ſie ſchoß in ihrer leicht begreiflichen Wuth auf den einen Störenfried los, zog aber hierbei den Kürzeren, indem ſie durch einen ſtarken Schnabelhieb ſo ſtark getroffen wurde, daß ſie herunterfiel und erſt nach etwa fünf Minuten wieder ſo viel Kraft hatte, auf den nächſten Aſt zu fliegen. Die andere Elſter hatte inzwiſchen einen Höllenlärm gemacht und hierdurch ungefähr 18 bis 20 andere Elſtern herangelockt, die dann gemeinſchaftlich die Krähen vertrieben. Was mag wol die Urſache geweſen ſein, daß die Krähen die Elſtern im Neſtbau ſtörten? Neid kann es doch nicht ſein, da Krähen niemals in Birken und auch nicht in ſolch' ſchwankender Höhe bauen, ſondern immer dicht am Stamm auf einem ziemlich ſtarken Aſt, wenn auch in beträchtlicher Höhe.

W. Iſaaks.



Aus den Vereinen.

Breslau. Der Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht hielt am 20. Februar 1899 ſeine erſte ordentliche Verſammlung ab. In Anweſenheit von 30 Mitgliedern und eines Gaſtes eröffnet der Herr Vorſitzende um 9 Uhr die Verſammlung, welche durch das Verleſen des Protokolls der letzten General-Verſammlung eingeleitet wird. Das Protokoll wird genehmigt. Nunmehr erhält Herr Dr. med. Bohn das Wort zu ſeinem Vortrage: „Die Entwickelung der Vogelwelt“. Das weſentlichſte dieſes rein wiſſenſchaftlichen Vortrages war etwa Folgendes: Wenn die heutige techniſche Wiſſenſchaft ſich ſoviel mit der Löſung des Flugproblems beſchäftigt, ſo ſucht ſie einen Vorgang nachzubilden, den vor vielleicht Millionen von Jahren die ſchöpferiſche Natur vorgemacht hat. Die Urformen des Lebens gehörten ſicherlich dem Waſſer an und die Urgeſchichte lehrt, daß aus dem Amphibium das kriechende Reptil und daraus unſere Vogelwelt entſtanden iſt. Die ganze Entwickelung iſt im Grunde nur die Folge des Kampfes um's Daſein und des Anpaſſungsvermögens, nachdem es einmal klar geworden war, daß auch auf dem feſten Lande und auf Bäumen Nahrung in Menge vorhanden war. Der Beginn zur Löſung des Flugproblems fällt in die Jurazeit. Im lithographiſchen Schiefer zu Eichſtädt fand man im Jahr 1784 ein kleines Monſtrum von etwa Lerchengröße, in dem man ein geflügeltes Reptil ahnte. Das war der Pterodactylus, ein kleines Reptil, deſſen Kopf und Vorder-Extremitäten an den Bau der Vögel erinnern. Ebenfalls Pterodactyli, Vertreter der Flugſaurier, fand man von abnormer Größe — bis 18 Fuß Spannweite — in der amerikaniſchen Kreide; ſie alle aber verſchwanden von der Erde, ohne das Flugproblem endgiltig gelöſt zu haben. Schon neben den Flugſauriern tauchten damals neue Formen auf, denen dies vorbehalten war; es waren Vögel. Daß die Vögel von den Reptilien abſtammen, ſteht feſt. Infolge der Einathmung der atmoſphäriſchen Luft und der Anpaſſung verwandelten ſich im Lauf der Jahrtauſende Schuppen in Federn. Das Reptil iſt ein wechſelwarmes Weſen, es konnte dies bei den geringen Schwankungen der Waſſertemperatur bleiben. Nicht ſo das in der Luft lebende Thier, dies mußte ſich in ein Weſen mit eigener Wärme verwandeln, da ein Leben ſonſt unmöglich geweſen wäre; es mußte mit einem ſchlechten Wärmeleiter, dem Federkleid, umgeben werden. Die bedeutend vermehrte Bewegung, der größere Verbrauch von Sauerſtoff durch die Luftathmung, verbunden mit der Wärmeregulirung des Körpers, bedingte eine exaktere Sättigung des Bluts mit Sauerſtoff. An die Herzthätigkeit wurden größere Anforderungen geſtellt und ſo entſtand das vierkammerige Herz und das feine Lungengewebe. Das Schweben in der Luft erfordert größere Leichtigkeit des Knochengerüſts und ſo ſehen wir die Vögel mit hohlen Knochen ausgeſtattet. Der erſte vollkommene Vogel war der Urgreif (Archaeopteryx), von dem wir zwei ganze Verſteinerungen und die einer einzelnen Feder beſitzen. An der Hand von Abbildungen geht der Herr Vortragende auf den Urgreif näher ein und erklärt den Unterſchied zwiſchen den Ratiten, Vogelformen mit flachem Bruſtbein, und den Cariaten, Vogelformen mit keilförmigem Bruſtbein. Er führt mancherlei Gründe an, aus welchen die Wiſſenſchaft ſchließt, daß die Ratiten aus den Cariaten und zwar ſchon in der Kreidezeit entſtanden ſind. Der Weg der Natur vom Reptil zum Vogel bedeutet einen der wichtigſten Schritte in der Entwickelung des Geiſtes. Nichts unterſcheidet die Vögel von ihren Ahnen mehr, als die Intelligenz, welche ſich aus der vollſtändig veränderten Lebensweiſe entwickelte. Einen der wichtigſten Faktoren zu dieſer Entwickelung bildet der Trieb der Selbſterhaltung und der Arterhaltung. Der Vogel, welcher anfangs ſeine Eier auf die bloße Erde legte und deren Zeitigung der Sonne überließ, mußte ſich beim Schwanken der Temperatur dazu bequemen, die Eier ſelbſt zu erwärmen. Er ſchützte ſie mit ſeinem Federkleid und ſo entſtand das Brutgeſchäft. Nachſtellungen aller Art zwangen ihn, auch einen geeigneten Ort für die Eier aufzuſuchen, was allmählich zur Kunſtfertigkeit des Neſtbaues führte. Die ganze Art und Weiſe der Sorge um die Nachkommenſchaft führte zu einem Familienleben und wir finden bei den Vögeln feſtgeſchloſſene Ehen für's ganze Leben. In der Regel brütete das Weibchen, während das Männchen den Schutz und die Vertheidigung übernahm, daher ſtattete die Natur die Männchen in der Regel mit größerer Kraft aus und als Ausdruck dieſer mit einem farbenprächtigen Gefieder. Man ſieht alſo, welcher gewaltige Fortſchritt des Geiſtes in dem Auftreten der Vogelwelt liegt, und es iſt nicht zu verwundern, wenn wir Menſchen beſtrebt ſind, den Vögeln nachzuahmen, um auch die Lüfte zu beherrſchen. Vielleicht gelingt es uns mit Hilfe der unbelebten Natur und den Mitteln der Mechanik, das Flugproblem zu löſen; nie aber können wir in unſeren Leiſtungen denen der Natur nahekommen, welche dem Urgreif zugleich mit dem Flügel das Leben des Geiſtes, die Seele, verlieh. Der Herr Vortragende erntete überaus reichen Beifall. Den Schluß des Abends bildete eine Gratisverloſung von Wellenſittichen.

Lindner.



Anfragen u. Auskunft

Herrn Carl Potſch: Daß Ihr Indigofink ſich nicht verfärbt, liegt darin begründet, daß Sie denſelben ungenügend füttern, indem Sie ihm nur Glanzhirſe und Mehlwürmer geben. Wenn er wohl gedeihen und ſeine Prachtfarben nicht verlieren ſoll, ſo müſſen Sie ihm auch vor allen Dingen Spitzſamen, ferner geſchälten Hafer und ein wenig Hanf bieten. Dazu geben Sie ihm täglich etwas Miſchfutter aus getrockneten angequellten Ameiſenpuppen, mit friſcher Möre und altbacknem Weißbrot überrieben, ſobald aber friſche Ameiſenpuppen zu haben ſind, anſtatt des Gemiſches nur ſolche. Weitere nothwendige Zugaben ſind: ein wenig gutes Obſt (Apfel, Kirſche, Weinbere u. a.), Grünkraut (Vogelmiere oder Doldenrieſche) und friſche Zweige mit ſchwellenden Knoſpen zum Benagen; ſchließlich Mehlwürmer oder andere lebende Kerbthiere. Den lauwarmen Haferſchleim reichen Sie nur noch eine zeitlang weiter und dann verdünnen Sie ihn allmählich immer mehr mit ſtubenwarmem Waſſer

Herrn Hauptmann K. Bariczeck: Den Kanarienvogel müſſen Sie, umſomehr, da er ein Kulturvogel und in den großen Züchtereien in ziemlich hoher Wärme gezüchtet wird, in gleichmäßiger Stubenwärme von 15 bis 16 Grad R. halten. Daß bei Ihnen die Wärme bei kaltem Wetter nur 11 Grad betrug, kann wol die Urſache davon ſein, daß Ihre Kanarien in ſtockende Mauſer gerathen ſind. In ſolcher befinden ſie ſich, ſonſt würden ſie jetzt, zur beginnenden Heckzeit, nicht in die Mauſer kommen. Dies iſt eben nicht naturgemäß. Geben Sie jetzt täglich etwas Eifutter und Grünkraut nach Vorſchrift meines Buchs „Der Kanarienvogel“, das Sie ja beſitzen, und ſobald friſche Ameiſenpuppen zu erlangen ſind, füttern Sie ſolche in geringer Zugabe. Dabei halten Sie Ihre Kanarien in der oben angegebenen gleichmäßigen Wärme und wenn das Zimmer ſich zur Nacht abkühlt, bedecken Sie die Käfige mit einem leichten Tuch.

Herrn Joh. Breuninger: 1. Im Frühling gefangene Schwarzdroſſeln werden mit friſchen Ameiſenpuppen, welche man mit einigen Mehlwürmern belegt, eingewöhnt. Gibt es noch keine friſchen Ameiſenpuppen, ſo füttert man ein Gemiſch aus angequellten Ameiſenpuppen, geriebner Möre, geriebnem Eier- oder Weißbrot, gekochtem geriebnem Herz oder anderm magerem Fleiſch und legt ebenfalls einige lebende Mehlwürmer darauf. Der Käfig muß hoch hängen und zwar ſo, daß die Droſſel das ganze Zimmer frei überblicken kann. In der warmen Jahreszeit muß man reichlich allerlei Kerbthiere, beſonders Maikäfer, Engerlinge, Schmetterlinge, nackte Raupen, Fliegen, Maden, Schnecken, Regenwürmer u. a. geben, im Spätherbſt Ebereſchen- und Wachholderberen. Zum Winter hin kann man ſie auch an ein gutes Univerſalfutter gewöhnen, dem man noch Ameiſenpuppen zuſetzt. 2. In den Annonzen bedeutet 1,0 Hänfling = 1 Männchen Hänfling, 0,1 Hänfling = 1 Weibchen Hänfling, 1,2 Hänflinge = 1 Männchen und 2 Weibchen; alſo die Zahl vor dem Komma bezeichnet die Männchen, die Zahl nach dem Komma die Weibchen.

Herrn M. Kluge: 1. Einen Kardinal dürfen Sie mit kleineren Finken nicht zuſammenſetzen; ſelbſt im verhältnißmäßig großen Geſellſchaftskäfig kann es vorkommen, daß derſelbe ſich gegen die kleinen Genoſſen bösartig zeigt und auch die letzteren unter einander ſind in der Regel unverträglich. Beobachten Sie alſo ſorgfältig und fangen Sie den Störenfried ſofort heraus. Keinenfalls dürfen Sie dabei auf glückliche Züchtungserfolge rechnen. 2. Der Geſang des Trauerzeiſigs iſt dem unſeres europ. Stiglitz ähnlich und beginnt in unſerm Frühling. 3. Inbetreff des von Ihnen eingeſandten Zeitungs-Ausſchnitts bitten wir Sie, das in Nr. 42 v. J. Geſagte zu beachten.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Musca-Zecke (getrocknete Fliegen)

in größeren Poſten gegen Caſſa direct vom Importeur zu beziehen. — Anfragen mit Angabe des Jahresbedarfs unter **K. L.** an die Expedition dieſes Blattes erbeten. [462]

Vögel.

Neu eingetroffen:

Goldſtirn. Blattvögel

Schamadrosseln
Dayaldrosseln
Weisshaub. Heherlinge
Import. Zebrafinken.

August Fockelmann
Thierhandlung [463]
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Geſucht: Granataſtrilde, Buntaſtrilde, kleine Kubafinken, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen, Weibchen rothköpf. Papageiamandinen. **F. Boedzler,** [464]
20, Norton Folgate, **London** (England).

Große Stiglitz-

Männchen Dtzd. 12 ℳ, St. 1,60 ℳ, **rothe Hänflinge** Dtzd 12 ℳ, St. 1,60 ℳ, **Zeiſige** Dtzd. 11 ℳ, St. 1,50 ℳ, **Kreuzſchnäbel** St. 1,20 ℳ, **rothe Dompfaffen** St. 2,50 ℳ, **Buchfinken** Dtzd. 9 ℳ, St 1,30 ℳ, **Feldlerchen** Dtzd. 10 ℳ, St. 1,50 ℳ, **Haidelerchen** St. 2,50 ℳ, **1 Amſel,** Gebirgsv., hochf. auserleſener Sänger, 8 ℳ. Unter Gar. lebender Ank.

Gebr. Haus,
[465] **Hofſtetten** b. Gemünden a. M.

Schamadroſſel,

Wildf., 1 Jahr hier, vorzügl. Sänger und tadell. Vogel, gebe zu ℳ 40 einſchl. Packg. ab.
[466] **Adolf Thielmann,** Aachen.

2 Schwarzköpfe

mit regelrechtem Ueberſchlag und lautem Vorgeſang werden zu kaufen geſucht, desgl. **1 Sproſſer** und **Gelbſpötter.** Nur beſte Vögel. Probeſendung. Offerten unter **H. A.** an die Expedition d. Bl. [467]

Geſucht: **♀ rothk. Pap.-Amand.** u. **♀ blauköpf. dito.** [468]
Blume, P., Großeutersdorf (Kahla).

Waldvögel.

Kreuzſchn.,	roth.	Dtz.	9,	ℳ,	St.	1,25-1,50
„	grün	„	8,	„	„	0,80-1,—
„	grau	„	6,—	„	„	0,60-0,75
Alpen-Stiglitze		„	12-15	„	„	1,25-1,50
~~Zeiſige~~		„	9-10	„	„	0,80-1,—
Hänflinge,	roth	„	12-15	„	„	1,25-1,50
„	grau	„	7-9	„	„	0,75-1,—

[469] **D. Schmidt,**
Thale a. Harz, Steinbruchsweg 3.

Kanarienvögel, echte Harzer Roller ohne Fehler, à St. 10, 12, 15, 20 u. 25 ℳ, mit Porto u. Verpackung u. 14 Tage Probezeit, **aber nur per Nachnahme,** nicht gefallende Vögel tauſche um oder auf Wunſch zahle zurück. Rollerweibchen 1,50 ℳ. Preisliſte frei. [470]
L. G. Müller, Vogelzüchterei,
Nordhauſen a. Harz.

Hochfeine prämirte

Harzer Edelroller

(Stamm Trute), welche vorzüglich in Hohlrolle, Knorre, Klingelrolle, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 8, 10, 12, 15, 20 ℳ. Zuchtweibchen 1,50 ℳ verſende gegen Nachn., bei achttägiger Probe. Nichtgefallende tauſche um, ev. Betrag zurück, gebe zwei St. Zuchtweibchen gratis bei. [471]
Wilh. Keye, Thale, Harz.

Feinste Kanarienſänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [472]
R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.
Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

☞ 1898 erhielt mein Stamm Harzer Kanarienvögel 1. Staatspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10–25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.
Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [473

2 Wellenſittichmännchen

à 3,50 ℳ, verkauft [474]
P. Weber, Lehrer, **Schweina** i. Thür.

4 Schwarzplattl,

vorzügliche Sänger, à 5, 8, 10 ℳ, Haidelerche, Feldlerche à 2 ℳ, große Stiglitze, Bluthänflinge Dtz. 10 ℳ. Mehlwürmer Ltr. 4 ℳ, prachtvolle Goldfiſche 100 St. 3–6 ℳ, liefert unter Garantie [475]
G. Findeis, Wien I. Wollzeile 25.

Gelegenheitsverkauf!

1 ruſſ. David-Weidenſproſſer, Tag- und Nachtſchläger, 25 ℳ, 1 poln. Sproſſer 15 ℳ, 1 Nachtigal 12 ℳ, 1 Singdroſſel 6 ℳ, 1 Papſtfink 7 ℳ, 1 Schwarzkopf 6 ℳ, 1 Zaunkönig 5 ℳ, 1 rothrück. Würger 5 ℳ, 1 Rothkehlchen 5 ℳ, 1 Rothhänfling 2,50 ℳ. Sämmtl. Vögel im vollen Geſang, kerngeſund, 2–3 jähr. Wildfänge. Offerten unter **T.** an die Exped. d. Bl. [476]

Empf.: Edelfink u. Zeiſig à 1,50 ℳ, reinweiße Lachtauben, garantirte Zuchtp., à P. 5 ℳ, dito gelbe Zuchtp. 2 ℳ, ein gelber Täuber, gepart mit weißer Täubin, beide 3,50 ℳ. Mehlwürmer, ff. reine Ware, à Pfd. 3,50 ℳ. Garantie für gute Ank. [477]
A. Schulz, Breslau I, Altbüßerſtr. 36.

Suche zu kaufen:

Ein **Sproſſermännchen** und ein **rothrückiges Würgermännchen.** Beide Vögel müſſen zahm, gut im Gefieder, geſund und tadelloſe Sänger ſein. [478]
P. Link, Schwerin i. M.

Verkaufe: Wellenſittiche Ia, bewährte Zuchtp., à 7,50 ℳ, jüngere 5 ℳ, jap. Mövchen, Zuchtp. 3,50 ℳ, Käfig für Wellenſittiche mit 2 Niſtkäſten u. Zinkſchubl 4 ℳ. 0,1 Bandfink 1,25 ℳ. Dr. Ruß „Der Wellenſittich", broſch. 1 ℳ. Ferner gute Geige, vorzügl. eingeſpielt 18 ℳ. [479]
E. Schönlein, Paſewalk.

Harzer Kanarienvögel

(Truteſche Hohlroller), Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. i. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel, Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis** und **franko.** Weibchen desſelb. Stamms 2,50 ℳ [480]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Finken zu verkaufen:

Ich verkaufe meine 2 St. **Reitzug-** und 3 St. **Ruhrerwildſaufinken,** das St. um 8 ℳ, rein im Schlag mit Schnapp. [481]
Kains, Wien 18, Luſtwandlgaſſe 52.

Hochfeine

Harz. Edelroller

(Stamm Trute),

welche vorzüglich in tief. gebog. u. geraden Hohlrollen, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Klingel, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 6, 8, 10, 12 u. 15 ℳ, Dtz. 60, 72, 84 und 96 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, verſende gegen Nachn. 6 Tage Probezeit. Nichtgefallendes tauſche um, ev. Betrag zurück. [482]
Herm. Voigt, Thale a. Harz.

Feinſte

Edelroller!

mit den ſchönſten Touren, zart, tief und lang, noch ein Poſten ff. Frühbrut-Heckvögel, Dtz. 90 ℳ, Probevogel 10 ℳ, 14 Tage Probe gegen Nachnahme. [483]
A. H. Pütsch, Spezial-Züchterei,
Schönhauſen a. Elbe.

Meine ſelbſtgezüchteten ff.

Kanarienſänger

verſende vom 1. Novbr. ab, unter Garantie des Werthes und lebender Ankunft, zu 9, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ à St. [484]
Carl Trute, St. Andreasberg, Harz. 146.
NB. Bei Anfrage Rückporto erbeten.

Prima-Hohlroller,

Stamm mehrfach prämirt, flotte, lebhafte Sänger, bei Tag und Licht, gehen in Schockel, Hohlrolle, Knorren, Klingel und Dupfeifen, zu 7, 8, 10, 12, 15 ℳ, Zuchtweibchen 1,50 ℳ. Garantie f. leb. Ank. [485]
M. Franz, Kanarienzüchterei,
Pirna a. E.

Harzer Kanarien-Edelroller.

Meine Kanarien gehen hervorragend in ſchönen gebogenen, auch ſchockelnden Hohlrollen, tiefen weichen Knorren, Hohlklingeln, Klingeln, Flöten u. Pfeifen u. ſ. w., Tag- und Lichtſchläger, gebe ab zu 8, 10, 12, 15, 20, 25 ℳ, übernehme jede Garanti für Werth, Geſchlecht, lebende Ankunft, 14 Tage Probezeit, nicht gefallende tauſche um oder zahle Betrag zurück. Vögel mit Geſangsfehler 5–7 ℳ, Wbch. v. 1,50 ℳ an. [486
D. Schmidt, Thale a. Harz, Steinbruchsweg 3.

Anzeigen.

Vollständig unzerbrechliches
Vogelbadehaus

No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.—
No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50
Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.**—

═ ***Spezial-Artikel*** ═

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

☞ Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige für Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc. mit sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [487]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Neu eintreffen
in den nächſten Tagen:
Scharlachbruſtloris à Par 35, 2 P. 60 ℳ.
Gebirgsloris à P. 30, 2 P. 55 ℳ.
Gürtelgrasfinken à P. 9, 2 P. 16, 3 P. 22½ ℳ.
Rothhäub. od. Molukkenkakadus, zahm, à Mch. 65 ℳ.
Roſellas à P. 25, 2 P. 45 ℳ.
Zebrafinken à P. 5, 3 P. 14 ℳ.
Bartmeiſen à P. 8, 3 P. 21 ℳ.
Weiße Mövchen à P. 6 ℳ.
Mövchen, gelb- u. braunbt., à P. 3, 3 P. 8, 5 P. 12½ ℳ. [488]

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Zeiſige und **rothe Kreuzſchnäbel** à Dtz. 7 ℳ, im einzelnen à St. 1 ℳ. Verpackung von 60 ₰ bis 1,20 ℳ [489]

Richard Faulstich,
Finſterbergen b. Friedrichroda i. Th.

Waldvögel.

Stiglitze 1,30, Dtz. 12 ℳ, rothe Hänflinge 1,20, Dtz. 10 ℳ, Buchfinken 0,80, Dtz. 8 ℳ, gelbe Zeiſige 1,20, Dtz. 11 ℳ, grüne Hänflinge 1,20 ℳ, rothe Dompfaffen 2,50, P. 3,50 ℳ, grüne Stock-Finken per St. 80 ₰, Dtz. 7 ℳ. Garantie lebender Ankunft. [490]

Georg Mergler, Vogel-Export,
Hofſtetten b. Gemünden.

Kanarienvögel,
wirkl. echte, tiefe tourenr. Harzer Säng. à 8, 12, 15 ℳ u. höh. je nach Geſangsleiſtung. Weibch. à 2 ℳ Verſ. u. jed. Gar., dah. k. Riſiko. Stamm ſ. 1882 jährl. m. höchſt. Ehrenpr., **ſilb. u. gold. Med.** prämiirt. Wiederverkäufer b. 6 St. Vorzugspreiſe.

W. Walter, Großzüchterei u. Verſ.
St. Andreasberg i. Harz 76.

Zeitſchrift für **Elektrotechnik und Maſchinenbau,** Poſtzeitungsliſte 8178 a.
• ſowie für **Metall- und Montanindustrie.** •

Abonnementspreis: pro Monat 20 Pf. durch jede Buchhandlung, bei der Poſt 60 Pf. für das Vierteljahr.

Bereits erſchienene Nummern des Quartals werden koſtenlos nachgeliefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervorragendſten Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und berufen, unendlichen Nutzen zu ſtiften.

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik und dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montaninduſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt, Alles, was irgendwie für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elektrotechnik und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in fachwiſſenſchaftlicher, leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle ſpeziellen Zweige der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des **Auslandes** hat die Zeitſchrift **zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute als Mitarbeiter,** welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues ꝛc. ſofort Kenntnis geben und über alle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten. Jede Nummer der Zeitſchrift wird daher eine Reihe **elektrotechniſch-wiſſenſchaftlicher** und **maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel** aus der Feder erprobter Autoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten. Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl **kleiner Mitteilungen** aus dem Gebiete der **Elektrotechnik, des Maſchinenbaues** und der **Metall- und Montaninduſtrie** an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und allezeit wiſſen, welche **neuen** Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die **Patentnachrichten,** die **von uns** ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den Leſern einen **Überblick über die neuen Erfindungen** ꝛc. zu geben. Der **techniſche Briefkaſten** erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch Fachmitarbeiter zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner **handelspolitiſche Leitartikel,** die energiſch für die Intereſſen der deutſchen Induſtrie eintreten. Unter dem Titel: **„Kleine handelsinduſtrielle Mitteilungen“** wird **alles** dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau ſowie Metall- u. Montaninduſtrie Bezug hat. Ebenſo finden die **Submiſſionen, geſchäftlichen Mitteilungen** ꝛc. ꝛc. eine gebührende Stätte in unſerem Blatte. — Jeder Nummer iſt eine ***Unterhaltungsbeilage*** hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeitſchrift das inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt.

Nach alledem wird die **„Zeitſchrift für Elektrotechnik und Maſchinenbau, ſowie für Metall- und Montaninduſtrie“** ein unentbehrliches Organ nicht bloß für die Beſitzer maſchineller und elektrotechniſcher Fabriken und Werkſtätten, Walz- und Hüttenwerke, Schloſſereien und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie ꝛc., ſondern auch für alle Ingenieure, Techniker und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.

• Probenummern koſtenlos und franko von der
Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechnik u. Maſchinenbau,
ſowie für Metall- und Montaninduſtrie, *Leipzig.*

Für Aquarienliebhaber!

Im unterzeichneten Verlage erſcheint
Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde
herausgegeben von **Dr. E. Bade.**
(Monatlich zwei Nummern!)
Preis: halbjährlich Mk. 2.50
Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in **Magdeburg.**

Die
fremdländiſchen
Stubenvögel
von
Magdeburg
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung

Vollständig in 4 Bänden in Lexikon-Format. Illustrirt mit ca. 200 Abbild. auf 36 Farbendruck-Tafeln und vielen Holzschnitten im Text.

Inhaltsangabe:

- Bd. I. **Die körnerfressenden Vögel** (Hartfutter- oder Samenfresser), 46 Bogen Text mit 14 Tafeln in Chromolithographie mit 72 Abbild. Kart. M. 27.—, geb. M. 30.—.
- Bd. II. **Die kerbthierfressenden Vögel** (Weichfutter- und Fruchtfresser), nebst Anhang: **Tauben und Hühnervögel**; 59 Bogen Text mit 10 Tafeln in Chromolithographie mit ca. 50 Abbild. Kart. M. 33,—, geb. M. 36.—.
- Bd. III. **Die Papageien**, 56 Bogen Text mit 10 Tafeln in Chromolithographie mit 39 Abbild. Kart. M. 30.—, geb. M. 33.—.
- Bd. IV. **Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht**, 60 Bogen Text mit 1 einseitigen und 1 doppelseitigen Farbentafel nebst vielen in den Text gedruckten Holzschnitten, welche Käfige und andere Hilfsmittel der Vogelpflege u. -Züchtung darstellen. Kart. M. 25.50, geb. M. 28.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen!

Creutz'sche Verlagsbuchh., **Magdeburg.**

Im unſerm Verlage erſchien:
Naturgeſchichte der deutſchen Sumpf- u. Strandvögel
von **Dr. Curt Floericke.**
Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck.
Broch. ℳ 4.50, geb. ℳ 5.50.

Dieſes, eine höchſt intereſſante, noch wenig bekannte Vogelgruppe behandelnde Werk iſt in der Hauptſache auf Grund eigener Beobachtungen des Verfaſſers entſtanden, und ſo reizvoll geſchrieben, daß es das volle Intereſſe jedes Naturfreunds, Jägers oder Landmanns in Anſpruch nehmen muß.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 11.

Zweckmäßige Niſtkaſten für Baumläufer.
Der Wiedehopf, ſeine ſachgemäße Aufzucht und Pflege vom Neſtling bis zum ausgewachſenen Vogel (Schluß).
Fremdländiſche Finken (Fortſetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Baſel; Berlin.
Anfragen und Auskunft.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [491]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [492]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Ltr. 1 ℳ Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112.**

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [493]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Eine g. neue Vol., noch n. gebr., auch a. Heckk. z. ben., m. ſmtl. Niſtutenſil., 150 cm h., 130 l., 56 t., für 32 ℳ z. verk., Werth 70 ℳ Tauſch auf Vögel nicht ausgeſchl. [494]
A. Klupsch, Görlitz, Auguſtaſtr. 20.



Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren,
Niſtutenſilien,
unerreicht in
praktiſcher
Anordnung,
großer Auswahl u. billigem Preis. [495]
☛ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☚
Arthur Herrmann & Luther, Oschatz i. S.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [496]

Man verlange Preisliste.



Man verlange Preisliste.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Verkaufe: eine Zimmervoliere, vorwiegend Draht, Höhe 1,50 m, Breite 0,60 m, Länge 1,05 mit **Exoten,** Niſtgegenſtänden und ſehr gut erhalten, zu mäßigem Preis. [497]
Franz Huber,
Dinkelsbühl i. Bayern.

Papageienkäfig, Höhe 50 cm, Tiefe 38 cm, verzinnt, viereckig, Porzellannäpfe, 6 ℳ, Pärchen **Sonnenvögel** 6 ℳ. [498]
Fr. **A. Himpe,** Breslau, Auguſtaſtr. 73.

Betone ausdrücklich, es kommen nur
gesunde,
tadelloſe, kräftige Exemplare zum Verſandt, unter Garantie lebender Ankunft. [500]

Diamanttäubchen Zuchtpar 12.— ℳ,
Auſtraliſche Schopftäubchen Zuchtpar 15.— „
Roſenpapageichen „ 23.— „
Gebirgsloris „ 30.— „
Gürtelgrasfinken „ 7.50 „
Spitzſchw. Gürtelamandinen Zuchtpar 16.— „
Olivengrüne Aſtrilde „ 4.50 „
Reingelbe Wellenſittiche Zuchtpar 28.— „

Wellenſittiche, prachtvolle, echt auſtraliſche, große, ſtarke, ſofort zur Brut ſchreitende Zuchtpare, P. 6 ℳ, 3 P. 16.50 ℳ, 5 P. 25 ℳ, **Steinröthel,** Mch., 98er Wildfang, im vollem Geſang, vollſtändig zahm, 15 ℳ, **Chineſiſche Nachtigalen** (ſelten ſchön), extra ausgeſuchte feurige Doppelüberſchläger, 5 ℳ und von allen in Nr. 7 ausgebotenen Vogelarten noch Vorrath. Reelle Bedienung.
Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

☛ **Preisliſte über praktiſche**
Vogelkäfige
Aquarien, Terrarien ꝛc. (m. 100 Abb.)
Hochfeine beſt gereinigte
☛ **Vogelfutter** ☚
verſende gratis und franko. [501]
E. Göller, Köln a. Rh.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[502] **R. Schröter, Elingen-Greußen.**

Futtermittel.

Ameiſeneier

prima, geſiebte u. ſandfreie Ware, per Ko. ℳ 3, per 5 Ko. ℳ 14. [503]
Hochprima Qual. per Liter 80 ₰.
Sommerrübſen Ia ſüß
per 5 Ko. ℳ 2,20, per 50 Ko. ℳ 18.
Weiße Silberhirſe
per 5 Ko. ℳ 2,20, per 50 Ko. ℳ 18
empfiehlt **Carl Kämpf, Mainz.**

Mehlwürmer in guter, ſauberer Ware, das Liter 5 ℳ, Kilo 8 ℳ. Verpackung frei. [504]
Carl Bertram, Elberfeld, Brüderſtr. 8.

☛ **Mehlwürmer,** ☚
rein reell gemeſſen, Ltr. 5,— ℳ, Kilo 8,— ℳ, 1000 Stck. 1,60 ℳ. **Anweiſung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer** 30 ₰, **Ameiſeneier,** nur feinſte, ſtaubfreie Ware, pr. Ltr. 80 ₰, Kilo 3,75, 10 Ltr. 7 ℳ, **Weißwurm** feinſter Beſchaffenheit, Ltr. 80 ₰, **Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln, Neſter,** Samen u. a. Preisliſte poſtfrei. [505]
Theodor Frank, Barmen.

☛ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **fachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Staatspreis). Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [499]

Da mir nun nicht bekannt geworden, daß der Baumläufer *künſtliche Niſtkäſten* zu ſeiner Neſtanlage *bisher angenommen* und *benutzt* hätte, ſo hoffe ich den Dank aller Derjenigen zu verdienen, die ſich mit der Hegung und Pflege dieſes intereſſanten, für Wald und Obſtbau gleich nützlichen Vogels befaſſen wollen, wenn ich auf den von mir für *dieſen Vogel eigens* konſtruirten Niſtkaſten aufmerkſam mache.

Die Einrichtung iſt folgende: Der Kaſten wird durch ein breites, nach vorn mehr vorſtehendes und nach zwei Seiten abfallendes Dach vor Regen hinlänglich geſchützt, und da das Flugloch nahe unter der Dachecke angebracht iſt, ſo kann ſelbſt ſchief einfallender Regen oder Schnee kaum in's Innere gelangen. Die Seitentheile ſind deshalb nach unten und innen zu abgeſchrägt, damit etwa daranſchlagender Regen abfließen kann, ohne den Boden zu berühren. Der nach innen verſenkte, frei bewegliche und herausziehbare Boden iſt kleiner als der Innenraum und wird innen durch vier Ecken und unten durch vier Seitenleiſtchen gedeckt, bzl. gehalten, ſodaß der Brutraum möglichſt luftdicht abgeſchloſſen iſt, ohne dem Trocknen und Aufquellen des Holzes bei Dürre oder Näſſe hinderlich zu ſein. Die Oeffnung geſchieht mittels eines vorn angebrachten Thürchens, welches nicht nur ein leichtes Reinigen, ſondern auch jederzeit ein Revidiren der Käſten geſtattet, ohne das Neſt im mindeſten zu ſtören.

Die Außenflächen ſind rauh und mit einem ſchmutzigen, der Baumrinde ähnlichen Anſtrich verſehen. Die Befeſtigungsweiſe, die einfachſte und am leichteſten auszuführende, habe ich für die allein praktiſche befunden, da ſie den Niſtkaſten ebenſo gegen Wind und Wetter, wie gegen unbefugte Menſchenhände ſchützt, auch durch das Wachsthum des Baumes nicht berührt wird. Ein Sitz- oder Tritthölzchen habe ich nicht angebracht, da ich ein ſolches für ganz überflüſſig und ſelbſt nachtheilig halte, wo es gewiſſen Feinden der Höhlenbrüter Stützpunkte bietet, die der Vogel nicht bedarf, auch in der Natur nie vorfindet.

Der Wiedehopf, ſeine ſachgemäße Aufzucht und Pflege vom Neſtling bis zum ausgewachſenen Vogel.

Von A. Reuter.

(Schluß).

Einrichtung und Beſchaffenheit des Käfigs. Für den jungen Wiedehopf genügt in der erſten Zeit ein Kiſtenkäfig, am beſten mit Holzſtabgitter, da er, bis er ſich an ſeine neue Behauſung gewöhnt hat, gern mit dem Schnabel an dem Gitter herumwetzt und ſich bei Drahtgitter leicht an den Schnabelenden wundreiben würde. Hauptſache iſt eine etwa 10 cm hohe Zinkblech-Schublade, damit er beim Baden das Zimmer nicht verunreinigen kann. Der Sand muß rein ausgeſiebt ſein, damit keine größeren Sandkörner dabei ſind, welche ihm die Fußſohlen verwunden; am beſten iſt feiner Silberſand oder auch Flußſand mit Haide- oder Gartenerde gemiſcht. Da er ſich meiſt am Boden aufhält, braucht er nur eine Sitzſtange von 2 cm Durchmeſſer, aus weichem Holz, am beſten Linden- oder Pappelholz, oder mit Gyps überzogene; anzubringen iſt dieſelbe ungefähr in der Mitte des Käfigs, vom Boden an gerechnet etwa 20 cm hoch, da er, wenn dieſe zu niedrig angebracht iſt, am Laufen gehindert iſt und entweder darüber ſpringen oder darunter durchſchlüpfen muß, wobei er meiſtens ſeinen ſchönen Kopfſchmuck beſchädigt. Erker, zur Unterbringung des Futter- und Waſſergeſchirres, ſind nicht dienlich, da er dann den Kopf nicht frei genug bewegen kann und ſich jedesmal ſtoßen würde, ſo oft er Futter holen will. Daher iſt es beſſer, ihm beides auf den Boden des Käfigs zu ſetzen; es genügt alſo, wenn der Käfig mit einer Thür verſehen iſt, welche weit genug iſt, um mit den Geſchirren bequem heraus und hinein zu gelangen. Die Geſchirre ſollen von Glas oder Porzellan ſein, denn bei dem gewöhnlichen Töpfergeſchirr löſt ſich oft die Glaſur ab, welche ihm ſchädlich werden könnte. Die Decke des Käfigs kann von Holz ſein, doch iſt es gut, wenn ſie an der innern Seite mit einem Tuch überſpannt iſt und dazwiſchen Mos oder Kälberhare geſtopft werden, da er während der Zugzeit des Nachts ſehr unruhig iſt und häufig auffliegt. Ueberzieht man die Holzdecke mit einem Lammfell, ſo thut dies die gleichen Dienſte. Ich habe für dieſe Zeit meine Wiedehopfe des Abends aus dem Käfig genommen und ſie über Nacht in einem von mir eigens zu dieſem Zweck konſtruirten Beruhigungsbeutel geſteckt, was ſie ſich willig gefallen ließen; natürlich brachte ich ſie bei Tagesanbruch ſofort wieder in ihren Käfig zurück; ſie haben ſich bei dieſem Verfahren das Gefieder gut erhalten, was im andern Falle zu bezweifeln iſt; jede Gefahr iſt dabei ausgeſchloſſen, es ſtört die Vögel nicht im geringſten, denn ſobald ſie wieder in ihren Käfig zurückkommen, gehen ſie mit einem wahren Heißhunger an den Futtertrog.

Die Länge des Käfigs betrage wegen der Lebhaftigkeit des Wiedehopfes mindeſtens 80 cm, die Höhe 40 cm, die Tiefe 35 cm. Dieſer Käfig wird auch für einen erwachſenen Wiedehopf genügen, jedoch wenn man mit den Wohnungsräumlichkeiten nicht zu ſehr beſchränkt iſt, ſo gönne man ihm einen entſprechend größern, oder auch eine Voliere. Die übrige Ausſtattung ſei aber die gleiche, wie bei vorigem. Kann man ihn frei in einem Zimmer oder einer Dachkammer laufen laſſen, ſo iſt ja eine beſſere Ausſtattung zu ſeinem Wohlbefinden möglich. Man kann ihm Bäumchen in Kübeln, Epheuranken, auch alte Baumſtümpfe oder Kopfweiden hineinſtellen, womöglich ausgehöhlt, er wird dann ſicher darin ein- und ausſchlüpfen. Auch gebe man ihm ein Stück grünen Raſen hinein; denſelben wird er tagsüber oft beſuchen und mit ſeinem Schnabel durchlöchern; es gewährt viel Vergnügen, ihm bei dieſer Thätigkeit zuzuſchauen.

oder Olivenöl taucht, aus den Naſenlöchern entfernen muß, ſonſt wird er wieder trocken und erſchwert dem Vogel das Athemholen ungemein. Die Zunge und der Rachen ſind ebenfalls mit Alaunauflöſung oder Olivenöl zu beſtreichen; auch kleine Gaben eines Gemiſchs von Honig mit ausgelaſſener Butter oder Schweinefett zugeſetzt und an der Ofenwärme innig verrührt, des Tags drei- bis viermal in den Schlund geſtrichen, nehmen die Hitze fort. Auch kann man eine Abkochung von Eibiſchwurzel an das eingeweichte Futter thun; in das Trinkwaſſer gemiſcht hat es wenig Werth, da der Vogel ohnedies ſelten trinkt. Will man ihm den Eibiſchthee ſo einflößen, ſo tauche man einen kleinen Malerpinſel in den Thee und öffne ihm den Schnabel, führe den Pinſel in den Schlund, ſodaß der Thee tropfenweiſe verſchluckt werden kann. Bei ſehr ſchwerem Athem wickle man den Vogel in den Flanell und gebe ihm Dampfbäder von Salz, jedoch wickle man ihn ſorgfältig nach dem Dampfbad in trocknen Flanell und laſſe ihn mindeſtens eine halbe Stunde darinnen. Oft nimmt dieſe Krankheit noch einen andern Verlauf, es werden die Augen verſchwollen und über den Kopf und Hals verbreitet ſich eine entzündliche Röthe, deren Ende in einen Hautausſchlag übergeht, jedoch nur ſoweit, als die Entzündung geht; nach etwa zwölf bis vierzehn Tagen häutet ſich der hiervon ergriffene Theil vollſtändig ab, ſodaß Kopf und Hals mit einemmal ganz kahl ſind, es verurſacht ihm ein heftiges Jucken, weshalb er ſich den ganzen Tag reibt, wo er nur kann.

Zur Beſchleunigung des Verlaufs der Häutung beſtreiche man die ergriffenen Theile mit Olivenöl, welches ihm Kühlung bringt und den Nachwuchs der neuen Federn befördert, welche in der Regel nach Beendigung der Häutung ſofort wieder hervortreten. Dieſer Hautausſchlag iſt als günſtiges Zeichen des Krankheitsverlaufs zu betrachten; nur halte man den Vogel dabei immer warm.

Die zweite Krankheit erſtreckt ſich auf die Füße, und es können ihr verſchiedene Urſachen zu Grunde liegen: 1. Sitzſtangen von hartem Holz, 2. grobkörniger Sand, 3. Schmutz an den Füßen. Da ſich der Wiedehopf meiſtens am Boden aufhält, ſo iſt die peinlichſte Reinlichkeit anzuempfehlen, da ſonſt leicht Koth und Sand an ſeinen Fußſohlen und Zehen anklebt. Wird dieſer Schmutz nicht durch ein warmes Fußbad entfernt, ſo entſtehen Verhärtungen, welche dem Vogel große Schmerzen verurſachen, er beißt dabei fortwährend nach den Füßen, ohne daß es ihm gelingt, dieſes läſtige Anhängſel zu beſeitigen. Dieſe Verhärtungen gehen zuletzt in Eiterung über, ja es können ſich krebsartige Geſchwüre bilden; es empfehlen ſich dabei warme Fußbäder von Seiſe und Salz; danach beſtreiche man die harten Stellen mit Oliven- oder Kürbiskernöl. Nach zwei bis drei ſolche Fußbäder wird man gewahr werden, daß ſich die oberſte Verhärtung ablöſt; ſollte dieſe jedoch an einer Stelle noch feſthängen, ſo ſchneide man ſie mit ſcharfer Schere ab, waſche die Wunde, welche in ihrer Höhlung Blut und Eiter enthält, gut aus, trockne ſie ab, ſtreiche Schweinefett, Oliven- oder Kürbiskernöl darauf und bringen den Vogel wieder in den Käfig, nachdem man denſelben vorher gereinigt hat und, anſtatt mit Sand beſtreut, nur trocknes Mos hineinlegt, damit der Vogel weich auftritt und ſich kein Schmutz mehr an die Wunde hängt. So behandelt iſt er in acht bis vierzehn Tagen vollſtändig geheilt. Soweit meine Erfahrungen und bewährten Heilmittel bei den am häufigſten vorkommenden Krankheiten des Wiedehopfs.

Noch Einiges über Benehmen und Gewohnheiten des Wiedehopfs in der Gefangenſchaft. Zum Schluß will ich den geehrten Leſern noch etwas über das Benehmen unſeres Lieblings im Verkehr mit ſeinem Herrn vor Augen führen. Der Wiedehopf gewöhnt ſich an den Menſchen wie ſelten ein anderer Vogel, außer Raben, Krähen, Dohlen, Elſtern u. a. Man erſieht aus ſeinem Benehmen, daß er nicht, wie andere Vögel, im Käfig mit ſich allein zufrieden iſt, er will die menſchliche Geſellſchaft. Sobald er an ſeinen Beſitzer gewöhnt iſt, wird er ihm überall folgen, falls er frei laufen darf; iſt er im Käfig, ſo läuft er unruhig am Gitter hin und her und will die Thür des Käfigs öffnen, um ſein Verlangen zu ſtillen. Gibt man ihm einen beſtimmten Namen von Jugend an, ſo kommt er ſofort, wenn man ihn ruft, und gibt auch Antwort, mit einem heiſeren „gäck, gäck“. Ich beſitze gegenwärtig einen Wiedehopf, den ich im vorigen Sommer erhalten, und gab ihm den Namen „Hans“; öffne ich die Thür ſeines Käfigs und rufe ihn beim Namen, ſo zögert er keinen Augenblick, zu mir zu kommen. Natürlich weiß er auch ganz gut, daß er einen Leckerbiſſen bekommt; verſtecke ich mich und rufe ihm zu, ſo läßt er nicht ab, bis er mich gefunden. Gehe ich an ſeinen Käfig und halte ihm den Kopf hin, ſo zauſt er mich an den Haren. Die Zubereitung ſeines Futters kennt er ganz genau, da iſt er kaum noch zu halten; ſtelle ich ihm dann ſeinen Trog in den Käfig, ſo kommt er heran und ſchüttelt mich am Finger, als wollte er ſagen: warum kommt mein Futter nicht ſchneller? Man muß ihn lieb gewinnen; er iſt wie geſchaffen für die menſchliche Geſellſchaft. Ich hatte im letzten Winter ein Huhn bekommen, für welches ich keinen geeigneten Platz hatte. Da daſſelbe fleißig Eier legte, konnte ich mich nicht dazu verſtehen, es zu ſchlachten, und machte ihm eine große Kiſte zurecht und ſtellte dieſelbe in das Zimmer. Oben auf dieſe ſtellte ich den Käfig meines Wiedehopfs. Wer weiß zu ſagen, wie es geſchah: eines ſchönen Tags ſteckten die beiden die Köpfe zuſammen; er ſagte „gäck, gäck“ und ſie ſagte „gack, gack, gack“ und der Freundſchaftsbund ward geſchloſſen; wol hundertmal des Tags ſtreckte die Henne den Kopf aus ihrer Kiſte hervor und ſah zu ihm hinauf und er kam ſogleich geſprungen und langte mit ſeinem Schnabel nach dem ſchönen rothen Kamm der Henne; ob ihm dieſer ſo gut gefiel oder die Henne ſelbſt? Eines Tags ſah ich einen noch ſchönern Zug dieſer beiden Nachbarn; da brachte der Wiedehopf einen Schnabel voll um den andern ſeines Futters und reichte es durch das Gitter ſeiner geliebten Henne. Nun iſt die Henne ſeit April vorigen Jahrs in einem Stall, wo ſie auch frei ausgehen kann, untergebracht; ſo oft ich ſie in das Zimmer bringe, kommt er und zupft ſie am Kamm, was ſie ſich gefallen läßt; demnach kennen ſie ſich noch. Heißt es da nicht in wahrem Sinn des Worts: Alte Liebe roſtet nicht?

Der Wiedehopf verträgt ſich auch mit anderen kleineren Vögeln zuſammen ſehr gut; er hat eher Furcht vor jenen, als daß er ſie anzugreifen wagt. Mit ſeinesgleichen ihn zuſammenzuſetzen iſt weniger rathſam, d. h. wenn man zwei Männchen zuſammenthut. Ein Pärchen würde wol auch im geeigneten Raum, wenn man ihnen alles bieten würde, was nöthig, zur Brut ſchreiten. Zum freien Aus- und Einfliegen iſt er, jung aufgezogen, gut zu gewöhnen, gleich wie Stare, Rothkehlchen u. a., jedoch vom Monat Auguſt an iſt es nicht mehr rathſam, da dann der Wandertrieb beginnt; man könnte den Vogel ſonſt leicht verlieren.

Während des Winters muß er unbedingt im geheizten Zimmer gehalten werden, er kann Kälte nicht vertragen. Das Zimmer, bzl. der Käfig ſoll von morgens 7 Uhr an, bis es Tag wird, beleuchtet ſein, ebenſo abends, wenn es dunkel wird, bis 10 Uhr, damit er genügend Futter zu ſich nehmen kann. Bei ſtrenger Kälte decke man den Käfig, ehe man ſchlafen geht, mit einer wollenen Decke zu, denn ſein Gefieder iſt ſehr ſpärlich. Der üble Geruch, der dem jungen Wiedehopf anhaftet, verſchwindet bei täglicher Käfigreinigung in drei bis vier Tagen vollſtändig und kommt nur davon her, weil die Alten nicht, wie andere Vögel, den Koth der Jungen mit wegtragen, ſodaß das Neſt einem Abort gleicht. Ich habe meine jungen Wiedehopfe ſofort nach der Ankunft zu Hauſe mit kölniſchem Waſſer beſprengt und der üble Geruch war verſchwunden. Wegen dieſes Geruchs iſt der Wiedehopf in üblem Ruf und heißt an vielen Orten Stinkhahn; der Name gebührt ihm aber nicht, denn jeder andere größere Höhlenbrüter, wie z. B. Star, Specht u. a., würde bei ungenügender Reinigung auch keinen Wohlgeruch verbreiten.

Im Ganzen genommen iſt der Wiedehopf werth, daß man ſich näher mit ihm befaßt und ſeine Gewohnheiten kennen lernt, und ich bin feſt überzeugt, daß die wenigen Vogelliebhaber, welche ſich ſchon mit ihm abgegeben haben, mir beiſtimmen werden. Einen Wiedehopf zu ſchießen, um ihn auszuſtopfen, bezeichne ich als Aasjägerei und ich habe dieſes in meiner früheren Eigenſchaft als Revierjäger nie geduldet.

Fremdländiſche Finken.

Von K. Ruß.

(Fortſetzung).

In den Kreiſen der Vogelliebhaber allbekannt und allbeliebt iſt der **Grauedelfink** oder Grauedelſänger (Fringilla musica, *Vll.*) von Mittelafrika. Er gehört zu den hervorragendſten fremdländiſchen Sängern. Sein lauter, voller, wohlklingender Schlag, der beſonders in den Morgen- und Abendſtunden ertönt, läßt Anklänge an das zarte Lied der Haidelerche, ebenſo wie an den kräftigen Schlag des Kanarienvogels erkennen, doch auch an den Geſang der Garten- und Sperbergrasmücke.

Der Grauedelfink iſt ein guter Sänger, anſpruchslos hinſichtlich der Verpflegung und ſchreitet unſchwer zur Brut. Er zeigt ſich als Zierde jeder Vogelſtube, in welcher der Geſang beſonders ſchön erklingt, und iſt gegen kleinere Vögel friedlich; nur mit ſeinesgleichen und anderen Girlitzarten verträgt er ſich nicht. Einzelne Pärchen zur Zucht werden im Finkenheckkäfig, einzelne Männchen als Sänger im Kanarienvogelbauer gehalten.

Ein Uebelſtand in der Haltung des Grauedelfink liegt darin, daß er unmittelbar nach der Eingewöhnung vielfach ſich hinfällig zeigt. Daher iſt es am beſten, ihm anfangs nur verſchiedene Hirſen, weiße, Senegalhirſe, ſowie Kanarienſamen zu reichen. Erſt ſpäter gibt man auch Mohn und Rübſen; jedoch ſind dieſe nur dann nothwendig, wenn der Vogel beim Händler daran gewöhnt war und man kann ſie allmählich entziehen. Statt deſſen reicht Herr H. Jacobſen, dem im vorigen Jahr eine glückliche Zucht gelang, zur Niſtzeit ein täglich friſch zubereitetes Eifutter (gekochtes, geriebenes Ei $^{2}/_{3}$, von hartgetrocknetem fein zerſtoßenem Weißbrot $^{1}/_{8}$ Th.), täglich zweimal. Zur Aufzucht der Jungen werden die Hirſen und der Kanarienſamen auch eingeweicht gereicht*).

Die erſte Züchtung gelang A. Dorpmüller, nachdem ſchon vorher Dr. Ruß und Andere Miſchlinge mit Kanarienweibchen u. a. erzielt hatten.

Die Grauedelfinken benutzen ſowol offene wie geſchloſſene Niſtkörbchen und verwenden als Bauſtoffe Charpie (Wundfäden), Grashalme, Baſt, Agavefaſern, Papierſchnitzel u. a. Als Grundlage für die genannten Stoffe werden zuweilen Hanffäden verwandt. Die Mulde wird mit Pferdehaaren, Pflanzenwolle und kurzen Leinenfäden geglättet. Ueber Gelege, Neſtflaum, Jugendkleid iſt hier im Jahrgang 1896 Nr. 52 ausführlich geſprochen. Bemerkt ſei noch, daß die Brutdauer 13 Tage beträgt und das Weibchen allein brütet; die Verfärbung der Jungen zum Alterskleid tritt mit der erſten Mauſer ein. Die Mauſer des Grauedelfink fällt in unſere Frühlingsmonate. —

Dem vorigen nahe verwandt und ſehr ähnlich iſt der **gelbbürzelige Graugirlitz** (F. angolensis, *Gm.*), auch Angolahänfling genannt. Er ſtimmt in Geſtalt und Größe mit dem vorigen überein; die Färbung iſt etwas heller fahlbräunlich; Kehle dunkelgrau; Bürzel und obere Schwanzdecken lebhaft **gelb**; ganze Unterſeite düſter gelblichweiß; Schnabel dunkelhorngrau; Augen braun; Füße hellbraun. Er gleicht dem Grauedelſänger in vielen Eigenthümlichkeiten, unterſcheidet ſich aber weſentlich dadurch von ihm, daß er nur einen unbedeutenden, leiſen, girlitzartigen Geſang hören läßt. Die Heimat erſtreckt ſich über Weſtafrika von Angola bis Kapland. In der Vogelſtube zeigt er ſich ruhig und friedlich. Dr. Franken züchtete Miſchlinge mit der vorigen Art.

---

*) Andere Fütterungsweiſen während der Brut ſind in Dr. Ruß' „Die fremdländiſchen Stubenvögel“, Band I, beſchrieben.

Für die Liebhaberei trefflich geeignet, leider zu ſelten eingeführt wird der Kapkanarienvogel oder graukehlige Girlitz (F. canicollis, *Sws.*). Er erſcheint oberſeits gelblich olivengrün, dunkel ſchaftſtreifig; Stirn gelbgrün, Oberkopf grün, Nacken und Kehle aſchgrau; Schwingen ſchwarzbraun, grüngelb außengeſäumt; Schwanzfedern olivengrün, ſchwarz geſchäftet; Hals, Bruſt und Bauchſeiten gelblichgraugrün; Bauch grauweiß; Augen braun; Schnabel bleigrau. Füße braun. Das Weibchen iſt in den Hauptfarben graugrün. Die Heimat erſtreckt ſich über Kapland und Inſel Mauritius. Er hat einen angenehmen, lerchenartigen Geſang, der fleißig vorgetragen wird. Als Stubenvogel zeigt er ſich ſehr anſpruchslos. In der Kapkolonie wird er viel gehalten; zu uns gelangt er leider ſelten. Baſtarde mit dem gelbſtirnigen Girlitz und mit Kanarienweibchen ſind bereits gezüchtet.

Ein guter Sänger, der faſt mit dem Grauedelfink verglichen werden darf, iſt der weißkehlige Girlitz (F. Selbyi, *Smth.*), ebenfalls von Südafrika. Er erſcheint am größten unter ſeinen Verwandten, iſt oberſeits dunkel bräunlichgrau, ſchwärzlich ſchaftſtreifig; Kopf wenig heller; Zügelſtreif ſchwärzlich, Augenſtreif ſchmal fahlweiß; Backenſtreif weißlich; Flügel und Schwanzfedern dunkelbraun, ſchmal fahl außengeſäumt; Bürzel und obere Schwanzdecken hellgelb; Kehle, Unterbruſt, Bauch und Unterſchwanzdecken rein weiß; Oberbruſt und Seiten fahl bräunlichgrau; Schnabel hornfarben, Unterſchnabel heller; Augen dunkelbraun; Füße braungrau. Seine Heimat iſt Südafrika. Leider gelangt er nur ſelten in den Handel. In der Vogelſtube läßt er am Abend, ſelbſt um Mitternacht, wenn alle anderen Vögel ruhen, ſeinen harmoniſchen, wechſelvollen Geſang ertönen, der kräftig und weit vernehmlich, doch niemals gellend erklingt. Ein Pärchen im Beſitz meines Vaters baute im Harzer Bauerchen aus Wurzeln und Faſern ein großes, nicht beſonders künſtliches Neſt mit einer flachen, aus feinen Kokosfaſern und Pferdeharen gebildeten und ſauber geglätteten Mulde. Weiter brachten ſie es nicht. In Frankreich ſoll im Jahre 1886 eine erfolgreiche Brut gelungen ſein.

(Fortſetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . In einem „Illuſtrirten Unterhaltungsblatt“ leſe ich heute einen Artikel, der die Ueberſchrift trägt: Schutz den gefiederten Sängern. Der Verfaſſer dieſes Aufſatzes beginnt mit der Frage, was wol der Leſer ſagen würde, wenn Jemand ein kleines unſchuldiges Geſchöpf, das uns Menſchen in jeder Hinſicht erfreut, entweder ſeiner Freiheit beraubte, um es für ſein ganzes Leben in einen engen Käfig zu ſperren, oder es gar grauſam hinmorden würde. Er beantwortet ſich die Frage ſelbſt, indem er vom Standpunkt der Leſer — hoffentlich nur recht weniger ſolcher Geſinnungsgenoſſen — ſagt, daß dieſer „Jemand“ entweder in eine Beſſerungsanſtalt oder in ein Irrenhaus gehöre. Er ſagt weiter: „Werden nicht alljährlich viele, viele Tauſende von den kleinen gefiederten Freunden ihrer Freiheit beraubt oder hingemordet, um eitler menſchlicher Gelüſte willen? Die Zahl der Beſſerungsanſtalten und Irrenhäuſer würde garnicht ausreichen, um alle die Frevler aufzunehmen, die ſich an den gefiederten Sängern verſündigen“. Der Verfaſſer bildet drei Theile und zwar ſpricht er 1. über den Fang für den Käfig, 2. über den Fang für die Tafel der Feinſchmecker, 3. über den Fang für die Hüte der Damenwelt. Für Punkt 3 iſt ſein Strafgericht wol durchaus berechtigt, in Nr. 2 geißelt er lediglich den Fang im Dohnenſtieg, aber bei Abſchnitt 1 krampft ſich das Herz eines echten Vogelfreundes zuſammen, wenn er lieſt, wie der Vogelfänger und mit ihm auch er ſelbſt von der gegneriſchen Partei verurtheilt wird. Es heißt da unter Anderem beim Fang — — — — „Und ſchnell muß das alles gehen, denn die Polizei ſieht den ſauberen Herren Vogelſtellern gar genau auf die Finger. Aber was nützt das Alles? Werden ſie nicht bei der That überraſcht, ſo können ſie wegen ihres verbrecheriſchen Gewerbes niemals belangt werden, und die Vogelſtellerei wird ſo lange in Blüte ſtehen, als nicht von Obrigkeitswegen der Verkauf lebender einheimiſcher Vögel verboten iſt. Sache der Volksvertreter wird es alſo ſein, auf dem Wege der Geſetzgebung den Burſchen das Handwerk zu legen“.

Iſt das nicht geradezu empörend? Es wird jetzt ernſtlich Zeit, daß ein Zuſammenthun der Vogelliebhaber ſtattfindet, um energiſch gegen die Anfeindungen unſerer herrlichen Liebhaberei vorzugehen. Hoffentlich gehen wir erfolgreich aus dem Kampfe hervor.

Fritz Schneider.

. . . Die in dieſem Jahre hier bei Poppelsdorf außergewöhnlich milde Witterung verſetzte uns ſchon zu Anfang Februar in den Frühling. Seit vierzehn Tagen grünen im Freien alle Sträucher, ſogar der Hollunder treibt ſchon Blätter. Ein Mandelbaum im botaniſchen Garten hat bereits abgeblüht. Kein Wunder, wenn ſich auch die gefiederte Welt einige Wochen früher wie ſonſt hören läßt. Seit vierzehn Tagen ſchlagen die zahlreich vorhandenen Schwarzdroſſeln im Freien, die Baumpieper ſenden ihre kanarienvogelartigen Triller zum Himmel, die Ammern laſſen ihren Ruf erſchallen und die Hunderte von Buchfinken, die in den alten Roßkaſtanienbäumen der Poppelsdorfer Allee niſten, ſtudiren ihren Schlag ein. Nebenbei bemerkt, befinden ſich unter dieſen Buchfinken vorzügliche Schläger. Möchte kein kalter Witterungsumſchlag den Frühlingszauber zerſtören.

Th. Bauer.

. . . Mit großem Intereſſe habe ich in den briefl. Mittheilungen von Nr. 7 der „Gefiederten Welt“ geleſen, daß Herr Benicke für ſein Schwarzplättchen Sprunghölzer aus Kork verfertigt hat. Ich habe ſeit ½ Jahr etwa daſſelbe gethan, nur auf etwas andere Weiſe. In einer hieſigen Naturalienhandlung habe ich mir ein Stück Kork gekauft, daſſelbe etwa 10 Minuten lang ausgekocht und aus dieſem Stück vermittelſt eines ſcharfen Meſſers und einer Feile Sprunghölzer geſchnitzt. Dieſen kann man mit Hilfe der Feile jede beliebige Form geben, z. B. die runde, die ovale u. a., auch beliebige Stärke. Sodann habe ich dieſe Sitzſtangen mit Sandpapier glatt gerieben und tüchtig mit Inſektenpulver eingeſtäubt. Die Stangen ſelbſt wurden an die hintere Wand meines Kiſtenkäfigs angeſchraubt, ſodaß dieſelben frei in den Käfig hineinragen und beim Sprung des Vogels etwas federn. Mein Schwarzplättchen hat alſo nicht nur weiche, ſondern ovale federnde Sprunghölzer von verſchiedener Stärke.

W. Limberger.

Aus den Vereinen.

Baſel. Unſere einheimiſchen Vögel. Anſichts der ſeit einigen Jahren zum Durchbruch gekommenen Einſicht, daß durch den ſpürbar empfundenen Rückgang der Vogelwelt hauptſächlich der Landwirthſchaft und Kultur großer Schaden erwächſt, hat ſich die öffentliche Meinung der ganzen ziviliſirten Welt durch Verordnungen und Geſetze für den Vogelſchutz Geltung zu verſchaffen geſucht. Sowol die verſchiedenen Auslegungen derſelben, als auch menſchlicher Eigennutz und eingewurzelte Gewohnheiten hinderten den erhofften Erfolg, weshalb ſich das Bedürfniß immer mehr aufdrängte, den erſehnten Zweck durch Belehrung zu erreichen. Dieſer Aufgabe unterzog ſich, nach jahrelangen Beobachtungen und gründlichem Studium, Herr Apotheker Th. Bühler-Lindenmeyer, Kommiſſionsmitglied der Ornithologiſchen Geſellſchaft, in ganz vorzüglicher Weiſe. Nicht nur wußte der Vortragende bei dieſem Thema die wiſſenſchaftlichen und wirthſchaftlichen, ſondern auch die ethiſchen Momente hervorzuheben und auch dem bisher der Sache Fernſtehenden Intereſſe beizubringen. Am 14. Februar fand der letzte Vortrag des öffentlichen Kurſes „Ueber unſere einheimiſchen Vögel“ im großen Sal des Bernoullianums ſtatt. Dieſer Kurs, vom hieſigen Erziehungsdepartement eingeſetzt und vom eidgen. Landwirthſchaftsdepartement befürwortet, wurde auf Wunſch einer Anzahl Lehrer abgehalten. Für dieſes große Thema zeigte ſich die zubemeſſene Zeit von nur ſechs Abenden beinahe als eine zu knappe und war der Vortragende genöthigt, meiſtens mehr als eine Stunde in Anſpruch zu nehmen. Im erſten Vortrag gab Herr Th. B.-L. nach einer kurzen Einleitung einen Ueberblick über die Geſchichte und über die reichhaltige Literatur, die dieſem Zweig der Naturwiſſenſchaft zur Seite ſteht, und eine Wegleitung zum weitern Selbſtſtudium. Hierauf wurde in großen Zügen der Vogel im allgemeinen beſprochen, ſeine Stellung im Thierreich, ſeine Anatomie und ſein Bau, ſeine Biologie und die jetzt gebräuchliche Syſtematik. Große, meiſterhaft von den Herren Prof. Dr. R. Burckhardt und Gottlieb Imhof gezeichnete Tafeln, ſowie Präparate, Skelette und Projektionsbilder veranſchaulichten dieſen erſten Theil der Vorträge, jedoch erſt bei der Beſprechung der einzelnen Vogelarten war ein reiches Material ſtets ausgeſtellt, indem alle behandelten Vögel ſich in ausgeſtopftem Zuſtand vorfanden, viele in verſchiedenen Alters- und Geſchlechtskleidern; auch eine große Sammlung Neſter und eine Sammlung Eier war zur nähern Erläuterung der Biologie, und eine Schädelſammlung, die die Hauptrepräſentanten der einzelnen Vogelgattungen enthielt, lehrte die Theilnehmer, auch den innern Bau zu berückſichtigen. Ungemein gefielen und intereſſirten die Projektionsbilder, die auf etwa 70 Tafeln 180 Vögel zeigten und von Hrn. H. Beſſon nach dem vortrefflichen ornithologiſchen Werk des alten Naumann angefertigt waren und die, wenn auch ohne Farben, in großem Maßſtab den Habitus des Vogels auf's Deutlichſte zeigten. Im ganzen wurden 216 verſchiedene Vogelarten durchgenommen und nachdem zuerſt die Gattungsmerkmale angegeben wurden, fand eine eingehende Beſprechung des einzelnen Vogels ſtatt, mit Angaben über ſeine Biologie, ſeinem Nutzen und Schaden, und wie und wo er in unſerer Gegend zu treffen iſt. Das reiche Demonſtrationsmaterial war zum größten Theil Eigenthum des Vortragenden, eine Anzahl ausgeſtopfter Vögel ſtammten aus dem hieſigen Naturhiſtoriſchen Muſeum und von einigen Privatperſonen her. Die Ornithologiſche Geſellſchaft Baſel ermöglichte es durch kräftige Mithilfe in Rath und That, vorhandene Lücken auszufüllen, und die Koſten für die Projektionsbilder übernahm das Tit. Erziehungsdepartement. Nach der Beſprechung der einzelnen Vogelarten gab Herr Th. B.-L. noch eine Anleitung, wie die Vögel im Freien zu beobachten ſeien, welch' reiche Hilfsmittel auf dieſem Gebiet dem Naturfreunde in Baſel zu Gebote ſtehen und daß die hieſige Ornithologiſche Geſellſchaft ihre Hauptaufgabe darauf richte, in belehrendem Sinne für die Kenntniß der einheimiſchen Vögel einzutreten, und nicht nur durch Vorträge und Ausſtellungen, ſondern auch durch Ausflüge dieſes Ziel zu erreichen ſucht. Jede Jahreszeit bietet dem beobachtenden Naturfreund auf dieſem Gebiet Neues, es findet ein fortwährendes Kommen und Gehen ſtatt, und es hilft dieſer Zweig der Naturwiſſenſchaften dem in der freien Natur Erholung Suchenden, ſeine Ausflüge im hohen Maß zu verſchönern. Mit einem warmen Aufruf, für den Schutz unſerer einheimiſchen nützlichen Vögel energiſch mitzuwirken, wurde dieſer Cyklus in ſechs Vorträgen beendigt und es iſt zu hoffen, daß die gegebenen Anregungen auf fruchtbaren Boden gefallen ſind. Und führwahr: es gab wol keinen beſſern Weg, dieſe theoretiſchen Lehren praktiſch und fruchtbringend zu geſtalten, als ſie zuerſt den Herren Lehrern und durch ihre Vermittlung der Jugend vorzutragen. Dem Vortragenden, Herrn Th. Bühler, ſei aber an dieſer Stelle der wohlverdiente Dank für die ausgezeichnete Behandlung ſeiner ſchönen Aufgabe ausgeſprochen.

Nach den „Baſeler Nachrichten“.

Berlin. Deutſche Ornithologiſche Geſellſchaft, Sitzung vom 6. März d. J. Vor dem Eintritt in die Tagesordnung widmete der Vorſitzende, Herr Schalow, einem am 5. Februar dahingeſchiedenen alten und treuen Mitgliede, dem Kunſtmaler Adolf Walter, einen ehrenden Nachruf. Walter iſt faſt 82 Jahre alt geworden und hat eine große Anzahl von wichtigen Arbeiten über die Lebensweiſe, den Neſtbau und die Eier unſerer märkiſchen Vögel veröffentlicht. Namentlich hat er die Kenntniß der Naturgeſchichte des Kukuks weſentlich gefördert. Alsdann erhielt Herr Dr. Heinroth das Wort zu einem Vortrag: Balzſpiele der Entenvögel. Der Redner ſchilderte in ſehr anſchaulicher Weiſe die Sitten und Gebräuche, die ſich bei den Schwänen, Enten, Gänſen und Sägern herausgebildet haben zu der Zeit, wo die Pärchen ſich zuſammenfinden und während der Begattungszeit. Wenn die jungen Höckerſchwäne im erſten Winter noch graues Gefieder tragen, aber ſchon von den Eltern ſich getrennt haben, machen ſie ſich ſchon gegenſeitig Liebesanträge. Mit gerade getragenem Halſe und geſträubten Kopf- und Oberhalsfedern nähert ſich der männliche Schwan dem Weibchen und legt ſeine Wange an ihre Wange. Dann tauchen beide die Hälſe in das Waſſer und berühren ſich wieder mit den Wangen. Nach dieſer Liebkoſung entfernen ſie ſich von einander. Die alten Schwäne verſchlingen ihre Hälſe vor dem Parungsakt und erheben ſich, ehe ſie von einander ſchwimmen, Bruſt an Bruſt gegeneinander, indem ſie ſich lange anſchnarren. Wenn ſich zwei Schwäne begegnen, begrüßen ſie ſich dadurch, daß ſie wiederholt die Schnabelſpitze in's Waſſer ſtecken und dann den Kopf erheben, als ob ſie tränken. Dieſes „Antrinken“ iſt immer ein Zeichen dafür, daß ſie einander freundlich geſinnt ſind. Der ſchwarze Schwan taucht im Gegenſatz zum Höckerſchwan gern und kommt nach dem Tauchen mit ganz geradem Halſe aus der Tiefe herauf. Alle Schwimmvögel baden gern und dies geſchieht immer mittags zwiſchen 11 und 1 Uhr. Während bei den Schwänen die Stimme während der Liebesſpiele niemals zur Geltung kommt, haben die Gänſe und Enten ſämmtlich eigenthümliche Balztöne. Die Graugänſe tauchen vor der Parung abwechſelnd die Köpfe in's Waſſer, nach derſelben richtet ſich das Männchen ſteil auf und hebt die Flügel wie ein Schwan. Eigenthümlich iſt das Triumphgeſchrei, welches die Gänſe erheben, wenn ſie einen wirklichen oder vermeintlichen Gegner angeziſcht haben, ohne daß dieſer Widerſtand leiſtet. Wird eine brütende Gans angegriffen, ſo duckt ſie den Hals horizontal mit geſträubten Federn und ſchüttelt ſich, um den

Feind zu erſchrecken. Alle Gänſe leben in ſtrenger Ehe auch dann zuſammen, wenn ſie Junge haben. Die **Fuchsgänſe** (Casarca) haben eine ſonderbare Weiſe, ſich zu unterhalten. Nach einem Scheinangriff des Männchens auf das Weibchen erheben beide ein lang anhaltendes Geſchrei, dann fahren ſie wüthend auf einander los, prügeln ſich entſetzlich, laſſen abermals ihr Triumphgeſchnatter erſchallen und putzen ſich ſorgfältig das Gefieder. (Schluß folgt).

Anfragen u. Auskunft

Frau Louiſe v. Hausner-Urban: 1. Es freut mich, daß Sie nun, da Sie die Kanarienhecke nach Anleitung meines Buchs „Der Kanarienvogel“ eingerichtet, Ausſicht auf Erfolg haben. 2. Es kommt vor, daß auch die Kanarienweibchen ſingen, wenn ſchon höchſt ſelten ſo kräftig und anhaltend, wie ein Männchen. Ob Ihr ſingender Vogel nun wirklich ein Weibchen oder ein Männchen iſt, vermag ich Ihnen nicht zu ſagen, ſondern Sie müſſen dies durch ſorgfältige Beobachtung feſtſtellen.

Herrn Karl J. Schmidt: 1. Zur Eingewöhnung einer Nachtigal braucht nur die Decke des Käfigs elaſtiſch zu ſein, nicht aber die Hinterwand; dieſe braucht nur aus Drahtgitter zu beſtehen. 2. Der Käfig für die Schamadroſſel iſt ausreichend groß. 3. Für die Druckfehler-Berichtigungen danke ich beſtens.

Herrn Ludwig Laboda: 1. Die Einfuhr lebender Schmuckvögel aus Deutſchland nach Oeſterreich-Ungarn iſt zollfrei. 2. Der Unterſchied zwiſchen einem Alpen- und Waldſtiglitz beſteht darin, daß der erſtere im ganzen Gefieder lebhafter erſcheint; beſonders auf den Flügel- und Steuerfedern iſt der Alpenſtiglitz tief ſammtartig; die Flügelbinden ſind faſt orangegelb; das Roth im Geſicht iſt ſeidenartig glänzend; die Bruſtflecke ſind dunkelbraun, nicht nur mit lebhaft gelblichgrünem Grund, ſondern ebenſo matt geſäumt; ſämmtliche Schwingen und Steuerfedern reinweiß geſpitzt; erſte zwei Federn auf beiden Schwanzſeiten mit großen ovalförmigen reinweißen Spiegeln.

Herrn Karl Ballentin: Ihr Graupapagei muß heftig erkältet worden ſein. Geben Sie ihm durchaus kein Waſſer zu trinken, ſondern nur täglich friſch gekochten dünnen Haferſchleim, drei- bis viermal im Tage ſchwach erwärmt. Sodann verſuchen Sie es einmal mit heißen Dämpfen. Stellen Sie neben oder, wenn der Boden abnehmbar iſt, unter den Käfig eine Schüſſel voll heißes Waſſer, das Sie etwa alle zwei Stunden erneuern müſſen. Dabei bedecken Sie den Käfig ſo, daß der Papagei die warmen Dämpfe bekommt und ſich keinenfalls erkältet. Dies ſetzen Sie je nach Bedürfniß ein bis zwei Wochen fort.

Herrn Georg Stahl: Ihr Sproſſer befindet ſich nicht allein in ſchlechtem Ernährungszuſtande, ſondern leidet auch an Verdauungsſtörungen und jedenfalls noch an Kehlkopf- oder Lungenkatarrh. Nehmen Sie vor allen Dingen einen Futterwechſel vor. Laſſen Sie das Univerſalfutter fort und bereiten Sie täglich friſch ein Miſchfutter aus angequellten getrockneten Ameiſenpuppen, überrieben mit Möre und altbacknem Weißbrot. Zur Zugabe reichen Sie abwechſelnd ein wenig feingeſchabtes magres rohes Fleiſch oder etwas feingehacktes hartgekochtes friſches Hühnerei. Anſtatt der Mehlwürmer geben Sie Speck- und Pelzkäferlarven u. a. kleine Kerbthiere. Zum Trinken reichen Sie nur täglich friſch gekochten dünnen reinen Haferſchleim, mehrmals im Tage ſchwach erwärmt. Die Zimmerwärme muß Tag und Nacht gleichmäßig 15 bis 16 Grad R. betragen. Sobald friſche Ameiſenpuppen zu haben ſind, füttern Sie nur ſolche.

Herrn J. C. Claſen: Der Wellenſittich hatte ſich allerdings an dem Weichfutter überfreſſen, mit dem der Magen pfropfenvoll gefüllt war. Mit der Darreichung des Weichfutters muß man immer vorſichtig ſein. Es thut mir leid, daß Ihre Wellenſittiche ſo häufig eingehen. Aber füttern Sie ſie denn auch genau nach den Anleitungen meines Buches? Andernfalls müßte eine Degeneration in dieſem Stamme liegen.

Herrn Franz Fleiſchmann: Ihr Wellenſittich war an Herzſchlag geſtorben. Daß die Trauer um das verlorene Weibchen zu ſeinem Ende beigetragen, glauben wir nicht.

Herrn M. Schuchardt: 1. Der überſandte Kardinal war an Abzehrung geſtorben. 2. Je ein Par grauer und rother Kardinäle in der genannten Voliere können Sie wol halten, aber zum erfolgreichen Niſten dürften ſie kaum gelangen, da ſie ſich gegenſeitig dann heftig befehden und ſtören würden. 3. Sie müſſen den Kardinälen außer dem genannten Körnerfutter auch ein Weichfuttergemiſch nebſt Mehlwürmern bieten.

Herrn Generalmajor v. Stwolinski: 1. Kleine weiche Kerbthiere, wie Räupchen, Blattläuſe, Spinnen u. a. müſſen Sie ſich in einer Gärtnerei beſchaffen oder auf Spaziergängen ſelbſt ſammeln. Außerdem ſollten Sie ſich eine Speck- und Pelzkäfer-Hecke nach den hier im vorigen Jahr gegebenen Anleitungen des Herrn Kullmann einrichten, damit Sie die Speck- und Pelzkäferlarven erlangen. 2. Vogelmiere iſt überall käuflich zu haben, doch können Sie dieſelbe, ſowie die übrigen in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, ſowie im „Handbuch für Vogelliebhaber“ aufgezählten Pflanzen auch ſelbſt auf Spaziergängen ſammeln. Außerdem können Sie die als Grünkraut vortrefflich geeignete Dolbenrieſche oder Tradeskantia, von welcher in jeder Gärtnerei das Töpfchen für 25 Pf. zu kaufen iſt, im Zimmer halten. Die Pflanze bedarf keiner beſondern Pflege und wächſt ſehr üppig. 3. Welcher von Ihren Vögeln das Meckern hören läßt, vermag ich Ihnen nicht zu ſagen. Das müſſen Sie eben ſelbſt durch genaue Beobachtung feſtzuſtellen ſuchen. Im Nothfall müſſen Sie einen der betreffenden Vögel nach dem andern einen oder ſelbſt zwei Tage in ein anderes Zimmer nehmen, damit Sie es herausbekommen.

Herrn Adolf Bühler: Die Züchtung der rothköpfigen Gould's Amandine iſt bisher noch nicht geglückt, die der ſchwarzköpfigen dagegen ſchon mehrfach. Im allgemeinen iſt die Pflege und Behandlung dieſer Prachtfinken von der anderer Arten nicht abweichend. Das Neſt baut das Pärchen in einem Wellenſittich-Niſtkaſten, in einer Kokusnußſchale oder einem Harzer Bauerchen aus Agava- und Kokosfaſern, ſchmalen Baſtſtreifen, trockenen und friſchen Grashalmen und Mos. Zur Aufzucht der Jungen und während des Federnwechſels empfiehlt Oberleutnant Hauth die Zugabe eines Miſchfutters aus kleingehacktem, hartgekochtem Hühnerei (weiß und gelb), mit aufgebrühten Ameiſenpuppen zu gleichen Theilen, das Ganze mit feingeſtoßenem Potsdamer Zwiebacl oder altbacknem reinem Weißbrot (ohne Zuſatz von Zucker, Butter, Milch gebacken) zu einem krümligen Gemenge bereitet. Alle inbetreff der Gould's Amandinen bisher gewonnenen Erfahrungen finden Sie in meinem Buch „Die Prachtfinken“, zweite Auflage (1898) mitgetheilt. Daſſelbe iſt für nur 2 Mk. durch die Creutz'ſche Buchhandlung zu beziehen.

Anfrage. Ich möchte Sie höflichſt erſuchen, nachſtehende Frage in nächſter Nummer veröffentlichen und zur allgemeinen Beſprechung ſtellen zu wollen: Beſitze eine **Schamadroſſel**, die nach dem Freſſen noch längere Zeit ſchluckt. Woran liegt dies, und wie iſt dieſe Krankheit zu heilen? Vor Jahren habe ich bereits zwei Sperbergrasmücken durch dieſes Uebel eingebüßt.

Zu unſerm Bilde.

Im Lauf des nächſten Monats kehrt einer unſerer anmuthigſten und ſchönſten heimiſchen Vögel, die **Schafſtelze** (Motacilla flava, *L.*) vom Zuge zurück. Das Gefieder des Männchens iſt bekannt, beim Weibchen erſcheint der Rücken mehr grau als grün, Bauch und Afterl nicht ſo ſchön gelb, die Kehle ockergelblichweiß; Unterleib blaßgelb. Zu Anfang April bis Anfang Mai kommen ſie vom Zuge zurück und Ende Mai oder Anfang Juni ſchreiten ſie zur Brut. Das Neſt ſteht in kleinen Vertiefungen, zwiſchen hohem Gras, Sumpfpflanzen, Wurzeln in verfallenen Gräbern, im Klee und Raps u. dergl., immer am Boden. Es wird aus kleinen Wurzeln, Blättern, Faſern, Halmen, Moos gebaut und mit Haren, Pflanzenwolle und Federn ausgerundet. Das Gelege beſteht aus vier bis ſechs rundlichen Eiern von 17,5 mm Länge und 14 mm Dicke, die auf düſterweißem Grunde röthlich und braungrau gepunktet und marmorirt ſind und ziemlich bedeutend variiren. Die Brutdauer beträgt 13 Tage. Das Weibchen brütet allein. Das Jugendkleid iſt oberſeits fahlgrau, dunkler geſchuppt, unterſeits ſchmutziggelb, Oberbruſt mit rundlichen ſchwarzbraunen Flecken, vom Schnabel bis zur Kehle an jeder Seite ein ſchwarzbrauner Streif; Schnabel und Füße heller. Beide Alten füttern die Jungen auf.

K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Musca-Zecke (getrocknete Fliegen)

in größeren Poſten gegen Caſſa direct vom Importeur zu beziehen. — Anfragen mit Angabe des Jahresbedarfs unter **K. L.** an die Expedition dieſes Blattes erbeten. [506]

Die Samen-Großhandlung

von

Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [507]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Mehlwürmer, große Futterware, ganz rein, Liter 5 ℳ, Kilo 8 ℳ, Verpack. frei. [508]

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Ja! Ja! es ist wahr!

Ich verſende nur ſaubere Ware. [509]

Futter für: **Prachtfinken, Reisfinken, Kardinäle, Sittiche, Papageien** (große), **Dompfaff** und **Waldvögel** (als Hänfling, Stiglitz, Zeiſig, Fink) je 5 Ko. 2 ℳ. Bei Entnahme von 3 Poſtkolli füge ich eine ſelbſtthätige Trinkflaſche, ſehr praktiſch für Vögel, **gratis bei.**

H. P. Lange, Samenhdl., **Gottesberg i. Schl.**

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.

Muska, hochf. 98er, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 4½, à Ko. 8.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 4, 5 Ko. 19.

Bisquit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,60
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,—
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,—
do. algeriſche	„ „ „ „	2,—
do. indiſche	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	4,—

Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [510]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und **Waldvogelfutter** Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. Vogelfutterarten gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,

Vogelfutter-Großhandlung.

Drosselfutter,

extra ℳ 1,20 per Ko., Ia ℳ 1 per Ko. **Nachtigalenfutter** Ko. ℳ 1,50, Packet 50 ₰; ſämmtliche Vogelfutter in geeignet. Qualitäten, für Finken, Lerchen, Meiſen, Sproſſen, Papageien, Prachtfinken ꝛc. Ko. 60 ₰. Preisliſten über Vogelbauer mit 100 Abbild. an Beſteller gratis. [511]

E. Göller, Köln a. Rhein.

Mehlwurmzüchterei

empfiehlt prima Würmer ℓ 4,— ℳ [512]

F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

Vögel.

Wegzugshalber gebe ich einen **vorzüglichen Gabſ.-Sproſſer** billigſt ab. [513]

C. Kuibbe, Prokuriſt, Lommatzſch i. Sachſ.

Wer liefert

auf's Frühjahr Stein- und Blaudroſſeln, echte ruſſiſche Weidenſproſſer, ſowie alle übrigen Raſſen. Ferner Gebirgsſchwarzköpfe, Garten-, Dorn-, Sperber-, Zaun- u. Orpheusgrasmücken, Gelbſpötter und kleine Sumpfrohrſänger, Roth- und Blaukehlchen. In größeren und kleineren Poſten. Erbitten Offerten mit Preisangabe. [514]

Gebrüder Haas,

Hofſtetten b. Gemünden a. M

Harzer Edelroller,

tieftourenreich u. weltbekannt, liefere überall hin. Der Preis richtet ſich nach Geſangsleiſtung, à St. 7, 8, 10, 12, 15 bis 30 ℳ. Verſandt unter Nachnahme. Garantie für geſundes Ankommen. [515]

Joh. Wink, Dresden-A., Marſchallſtr. 37.

Züchterei hochedler Kanarien, gegr. 1885. Goldene u. ſilberne Medaillen. Viele Dankſchreiben.

Finſch's Keilſchwanzſittich (Conurus Finschi, Salv.), **größte Seltenh.,** noch **niemals leb. eingef., außerordentl. zahm,** fliegt a. **Auf d. mehr. Zimmer,** ſpr. verſch. Worte, iſt i. ſchönſt. Gef., macht „tot" ꝛc., für d. bill. Preis v. 80 ℳ abzugeb.; **d. Vogel muß d. verwöhnteſt. Liebhab. durch ſ. Anhänglichk.** erfr. (ſ. „Gefied. Welt" Nr. 6 d. J.), **Graupapag.,** i. zweijähr., **f. begabt., klug. Papag.,** an **Hanf, Spitzſam.** u. **Waſſ.** gew., **ſpricht ſ. viel, ſingt, pfeift Sign. u. Lied.,** lernt mit Leichtigk. zu, i. b. Gef., 80 ℳ (ſ. Nr. 45 „Gefied. Welt" 1898), beide Vög. 150 ℳ fr., inkl. Verp. 1 Pärch. **Diukaſperl.,** Süd-Amer., 1 dito **Kehlſperl.** (Fr. dentata), Oſt-Afr., beide P. 10 ℳ, 9 verſch. Weberv. (m. d. Sperl. zuſammengeb.), 16 ℳ, ca. 20 theils größ. u. kl. **Käfige, 28 Antilopengehörne,** aufgez. (Kudu-, Elen-, Säbel-, Spring- u. Waſſerbock), dito hochf. **Muſcheln** (Seltenh.), **Rarität. v. Afr. u. Süd-Amer.,** wegen Wohnungsveränderung ſ. billig. Bei Anfragen erbitte Rückporto. [516]

Heinrich Vehl, Berlin SW.,

Deſſauerſtr. 9. Fernſprecher 6, 2231.

Als Dekorationsſtücke

verkaufe: **1 ausgeſtopften rothen Arara** 20 ℳ und **1 Schwan** 15 ℳ. Beide tadellos, ſelten herrliche Schauſtücke.

Emma Herberg, Berlin,

[517] Gleditſchſtr. 31.

Gelbnacken-Amazone,

ſchöner gr. Vogel, fingerz., a. Mais, Hanf, Waſſer gewöhnt, ca. 3 Monate hier, ſpricht bereits unter Garantie: Lorita, Papa da, Mamma, Anna, 1, 2, 3, Hurrah, komm mein Junge; fängt an, ein Lied zu flöten, läßt ſich Köpfchen krauen, gibt Pfote, weint und lacht, lernt leicht mehr, Garantie für Werth und lebende Ankunft. Preis 55 ℳ, p. Nachnahme. [518]

H. Metzendorff, Beamter,

Hamburg, Streſowſtr. 61, II.

C. L. Flemming,

Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen, empfiehlt **Kanarienvögel,** Männchen 5 ℳ Weibchen 1 ℳ. [519]

Gebe ab:

gut ſchlagende **Nachtigalen,** Frühjahrsſänger, à 7 ℳ, ferner **Sproſſer,** à 12 ℳ, auch 2 Stück **kaukaſiſche prima Sproſſer,** à 20 ℳ. Garantie für gute Ankunft. Nehme auch für April und Mai Beſtellungen an auf Nachtigalen u. Sproſſer, im großen und im kleinen. [520]

Franz Trügel,

Temesvár-Joſefſtadt, Ungarn.

Verkaufe:

Nachtigal, rothr. Würger, 2 Gelbſpötter, à 10 ℳ. **Schwarzplattl,** 2mal überw., 6 ℳ. Auch Käfige nach Tauſch. [521]

Carl Herz, Staßfurt.

Zoologiſche Handlung

von

Franz Holzberg,

Eſſen-Ruhr, Kaſtanien-Allee 100

empfiehlt blau- u. gelbbr. Araras 60 ℳ, desgl. zahm u. ſprechend 70 ℳ, 1 P. gute eingewöhnte Loris v. d. bl. Bergen 40 ℳ, 1 Zuchtpar gut eingewöhnte Roſenkopfpapageien 30 ℳ, 1 P. Nandayſittiche 20 ℳ, Wellenſittiche P. 7 ℳ, 5 P. 30 ℳ, graue Reisvögel P. 2 ℳ, 5 P. 7,50 ℳ, japan. Mövchen P. 3,50 ℳ, 5 P. 15 ℳ, Buchfinken, gut eingewöhnt, Dtz. 8 ℳ, Meerſchweinchen P. 3 ℳ, Goldfiſche per 100 St. 5, 7, 9 ℳ, Univerſalfutter für Nachtigalen Ko. 1,60 ℳ, 5 Ko. 7 ℳ, desgl. für Droſſeln Ko. 1 ℳ, 5 Ko. 4 ℳ. [522]

---

1 ff. Singdroſſel

10 ℳ, **1 Gartengrasmücke** nur für Kenner, prima ff. 10 ℳ. Garantie für lebende Ankunft. [523]

F. Wagner, Würzburg,

Domerſchulg. Nr. 17, III.

Graupapagei,

1½ Jahr alter, prachtvoller Vogel, vieles ſprechend, äußerſt gelehrig und ſehr zahm, für 100 ℳ, ſowie 1,3 Plymouth-Rock-Hühner, dunkel geſperbert, ca. 8 Pfd. ſchwer, mehrmals prämirt, für 50 ℳ abzugeben. [524]

Weber, Ingenieur, **Zittau.**

Digitized by Google

Neuheit
vollständig unzerbrechliches
Vogelbadehaus

No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.—
No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50

Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.—**

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige für Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc. mit sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [525]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.



F. Rejsek,

Hamburg, Peterstr. 28.

Specialität

Papageien und Papageien-Käfige.

Versandt nach überall hin und jederzeit. [526]

Schwarzkopf.

Suche ein **Schwarzplättchen** mit lautem Vorgeſang und langem Ueberſchlag bei tiefer Stimme; gebe dafür ruſſiſchen Sproſſer. [527]

Friedr. Köhler,
Aſchersleben, Bergſtr. 5.

Graupapagei,

vollſt. fingerzahm, ſehr ſchön befiedert, ein Pracht-Exemplar, großartig ſprechend und flötend, iſt unter Garantie für Verzeichniß, ſowie lebender Ankunft für 90 ℳ abzugeben, desgl. eine grüne Blauſtirn-Amazone, anfangend zu ſprechen, ſpricht ſchon 10 bis 12 Worte ſehr deutlich, ein wunderhübſcher Vogel, taubenzahm, für 35 ℳ, beide Vögel zuſammen 115 ℳ. [528]

W. Menk, Harburg a. d. E., Brockſtr. 65.

Verkaufe wegen Aufgabe

der Liebhaberei per Nachnahme: [529

1 ſſ. lautſchl. ung. **Nachtigal** 10 ℳ.
1 „ „ „ Schwarzplättch. 4 „
2 „ **Garten-Grasmücken** à 4 „

Verpackung frei; für ſich. Mnch. leiſte Gar.

J. Pleyer, Beamter, **Eger,** Junkerſtr. 11.

Suche gute Reitzug- od. R. Wildſaufinken. **Gebe a. liebſten in Tauſch** (verkaufe auch): vorzügl. ſchw. od. weiße Malteſer (97 er u. 98 er), 1,0 ſchw. Türken, 0,1 gelbe, 1,0 chineſ. Mövch., 0,1 Mohrenk. (97 er), ſehr fleiß. Rothkehlch., ſelbſtthät. Trink- u. Freßgeſchirre f. Tauben. Vom „Nordpol zum Aequator“ (Brehm). Naumann, Naturgeſch. d. Vög. Mitteleuropas (Dr. Hennicke), II., V., VI. Band. Anerb. an
530] **Günther,** Lehrer, **Lommatzſch.**

Verkaufe:

1 Mch. u. 2 Wbch. **Bartmeiſen** zuſ. 7 ℳ, 1 Pärchen **Kleiber** 3,50 ℳ, 1 Mch. **Haubenmeiſe** 2 ℳ, 1 **Blaumeiſe** 1 ℳ, 2 **Sumpfmeiſen** 2 ℳ, 1 Mch. **Tannenmeiſe** 1,25 ℳ. L. A. g. Sämmtliche Vögel ſind ſchon 1 Jahr im Käfig und zuſammengewöhnt. **F. Weber,** Chemiker,
[531] **Göttingen,** Reinhäuſerchauſſee 26.

Finken zu verkaufen:

Ich verkaufe meine 2 St. **Reitzug-** und 3 St. **Ruhrerwildſaufinken,** das St. nur 8 ℳ, rein im Schlag mit Schnapp. [532

Kains, Wien 18, Lummandlgaſſe 52.

!!Kanarienvögel!!

Meine weltbekannten, tieftourenreichſten 1898er Sänger ſind in großartigſter Auswahl alle wieder geſangsreif u. beſtens ſortirt. Liefere garantirt reell überallhin, ſteigend nur nach Geſangsgüte, à Stück 10, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ, Nachnahme oder Betrag vorher. [533]

Julius Häger,
St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864. Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Kanarienvögel.

Empfehle meine tieftourenreichen Sänger von 8—36 ℳ Leiſte Garantie für Werth u. leb. Ankunft, gebe 8 Tage Probezeit, tauſche um, evtl. zahle d. Betrag retour. Preisl. fr.

Wilh. Schick, St. Andreasberg i. H.
vormals W. Schwanebeck. [534]

Geſucht: **Granataſtrilde, Buntaſtrilde, kleine Kubafinken, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen, Weibchen rothköpf. Papageiamandinen.**

F. Beedzler, [535]
20, Norton Folgate, **London** (England).

Große Stiglitz-Männchen Dtzd. 12 ℳ, St. 1,60 ℳ, **rothe Hänflinge** Dtzd 12 ℳ, St. 1,60 ℳ, **Zeiſige** Dtzd. 11 ℳ, St. 1,50 ℳ, **Kreuzſchnäbel** St. 1,20 ℳ, **rothe Dompfaffen** St. 2,50 ℳ, **Buchfinken** Dtzd. 9 ℳ, St. 1,30 ℳ, **Feldlerchen** Dtzd. 10 ℳ, St. 1,50 ℳ, **Haidelerchen** St. 2,50 ℳ, **1 Amſel,** Gebirgsv., hochf. auserleſener Sänger; 8 ℳ. Unter Gar. lebender Ank.

Gebr. Haas,
[536] **Hofſtetten** b. Gemünden a. M.

Kanarienvögel, echte Harzer Roller ohne Fehler, à St. 10, 12, 15, 20 u. 25 ℳ, mit Porto u. Verpackung u. 14 Tage Probezeit, **aber nur per Nachnahme,** nicht gefallende Vögel tauſche um oder auf Wunſch zahle zurück. Rollerweibchen 1,50 ℳ. Preisliſte frei. [537]

L. G. Müller, Vogelzüchterei,
Nordhauſen a. Harz.

Prima 2 Lieder pfeifende

Dompfaffen

à 30—40 ℳ offerirt u. Garantie u. 4 Tage Probe [538]

K. Diehl III,
Angersbach, Oberheſſen.

Hochfeine prämirte

Harzer Edelroller

(Stamm Trute), welche vorzüglich in Hohlrolle, Knorre, Klingelrolle, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 8, 10, 12, 15, 20 ℳ. Zuchtweibchen 1,50 ℳ verſende gegen Nachn., bei achttägiger Probe. Nichtgefallende tauſche um, ev. Betrag zurück, gebe zwei St. Zuchtweibchen gratis bei. [539]

Wilh. Keye, Thale, Harz.

Feinste Kanariensänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [540]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.

Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

1898 erhielt mein Stamm **Harzer Kanarienvögel** 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel **à 10—25 ℳ** u. Gar., 8 T. Pr.

Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [541

Harzer Kanarienvögel

(Trute'ſche Hohlroller),

Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. i. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel, Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis** und **franko.** Weibchen desſelb. Stamms 2.50 ℳ [542]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Hochfeine

Harz. Edelroller

(Stamm Trute),

welche vorzüglich in tief. gebog. u. geraden Hohlrollen, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Klingel, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 6, 8, 10, 12 u. 15 ℳ, Dtz. 60, 72, 84 und 96 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, verſende gegen Nachn. 6 Tage Probezeit. Nichtgefallendes tauſche um, ev. Betrag zurück. [543]

Herm. Voigt, Thale a. Harz.

Feinſte

Edelroller!

mit den ſchönſten Touren, zart, tief und lang, noch ein Poſten ſſ. Frühbrut-Heckvögel, Dutz. 90 ℳ, Probevogel 10 ℳ, 14 Tage Probe gegen Nachnahme. [544]

A. H. Pütsch, Spezial-Züchterei,
Schönhauſen a. Elbe.

Prima-Hohlroller,

Stamm mehrfach prämirt, flotte, lebhafte Sänger, bei Tag und Licht, gehen in Schockel, Hohlrolle, Knorren, Klingel und Dupfeifen, zu 7, 8, 10, 12, 15 ℳ, Zuchtweibchen 1,50 ℳ. Garantie f. leb. Ank. [545]

M. Franz, Kanarienzüchterei,
Pirna a. E.

Reichenow, Vogelbilder aus fernen Zonen (Papageien mit 30 Tafeln, gut erhalten), verk. für 15 ℳ [546]

Carl Bartels, Jena.

[illegible] buchhandlung in Magdeburg. — Druck von August Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 12.

Engliſche Vogelliebhaberei (Fortſetzung).
Ein ornithologiſcher Ausflug in den Glarner Alpen (Schweiz) (Fortſetzung).
Zur Ueberwinterung einheimiſcher Kleinvögel im Freien.
Die Haltung, Wartung und Pflege, Fütterung auf billigſte und doch vollſtändig genügende Art, ſowie die Eingewöhnung der Wildfänge droſſelartiger Vögel.
Aus den Vereinen: Berlin (Schluß).
Anfragen und Auskunft.
Zu unſerm Bilde.

Anzeigen.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenſtein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [547]

Man verlange Preisliste.



Man verlange Preisliste.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Der beſte Fangapparat für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags [518]
K. E. A. Müller. Schlotheim i. Th.

Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Netzfallen,** kleine 80 ₰, größ. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ, **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** i. Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [519]
Gebr. Janſen, M.-Gladbach 112
Illuſtrirte Preisliſte gratis.

Schädliche Inſekten im Obſt- u. Gartenbau werden am ſicherſten durch Meiſen vertilgt.
Niſtkäſten für Meiſen aus Rundholz Stück 35 ₰, 10 Stück 3 ℳ, 100 Stück 28 ℳ. [550] **Kempf, Neuſorg,** Fichtelgeb.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis [551] **R. Schröter, Elingen-Grentzen.**



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [552]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
Arthur Herrmann & Luther, Oschatz i. S.

Futtermittel.

! Gut gereinigtes Vogelfutter ! ohne jede weitere Anpreiſung wie Ia, prima u. a., verſende nur wirkl. beſte Ware.

Sommerrübſ.	5 Ko.	1,70 ℳ,	1 Ko.	40 ₰
Glanzkorn	„ „	1,30	„ „ „	30 „
Silberhirſe	„ „	1,80	„ „ „	40 „
Schälhafer	„ „	1,80	„ „ „	40 „
Senegalhirſe	„ „	2,00	„ „ „	50 „
Sonnenroſenk.	„ „	1,80	„ „ „	50 „
Hanf	„ „	1,60	„ „ „	40 „
Carottengries	„ „	4,50	„ „ „	110 „
Droſſelfutter	„ „	4,00	„ „ „	100 „
Nachtigalfutt.	„ „	7,00	„ „ „	200 „

Ameiſeneier 1 Lit. 80 ₰, 10 Lit. 7,50 ℳ.
Alle anderen Futterſort. bill. Prsl. frei. [553]
H. P. Lange, Samenhdl., **Gottesberg** i. Schl.

Drosselfutter, extra ℳ 1,20 per Ko., Ia ℳ 1 per Ko. **Nachtigalenfutter** Ko. ℳ 1,50, Packet 50 ₰; ſämmtliche Vogelfutter in geeignet. Qualitäten, für Finken, Lerchen, Meiſen, Groten, Papageien, Prachtfinken 2c. Ko. 60 ₰. Preisliſten über Vogelbauer mit 100 Abbild. an Beſteller gratis. [554]
E. Göller. Köln a. Rhein.

Mehlwürmer, große Futterware, ganz rein, Liter 5 ℳ, Kilo 8 ℳ, Verpack. frei. [555]
Louis Conrad, Elberfeld, Diſtr. 45.

Für alle Arten Vögel fertige ich **fachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämiirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Kä[illegible] den Staatspreis). Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag [illegible]vergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [556]

Mehlwürmer, ſtaubfrei, à Lit. ℳ 4,50, Ko. ℳ 8, **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Lit. ℳ 1, bei 10 Lit. 90 ₰; I bei 5 Lit. 70 ₰, bei 10 Lit. 65 ₰ empfiehlt u. verſ. geg. Nachn. [557]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Wer liefert
garantirt gebrannte Auſternſchalen zur Vogelfütterung?
Bemuſterte Offerte an [558]
C. Schmidt,
Altona, Poſtſtraße 3, II.

Vögel.

Harzer Edelroller, tieftourenreich u. weltbekannt, liefere überall hin. Der Preis richtet ſich nach Geſangsleiſtung, à St. 7, 8, 10, 12, 15 bis 30 ℳ. Verſandt unter Nachnahme. Garantie für geſundes Ankommen. [559]
Joh. Wink, Dresden-A., Marſchallſtr. 37.
Züchterei hochedler Kanarien, gegr. 1885. Goldene u. ſilberne Medaillen. Viele Dankſchreiben.

Neu eingetroffen:
Helmkakadu,
Bankskakadu,
langſchwänzige Glanzelſtern, weißhaub. Häherdroſſeln, Dayaldroſſeln, Goldſtirn. Blattvögel.
August Fockelmann,
Thierhandlung, [560]
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Siebenbürger
Gebirgs-Lerchen
aus den Tranſylvaniſchen Alpen, ſofort ſingende Männchen, mit angenehmem, abwechſelungsreichem Geſange, **Singlerchen** à 1 ℳ, **Haide- od. Dudellerchen** à 2 ℳ per Stück mit Verpack., liefert ſofort direkt vom Fangorte
[561] **„Ornis“ in Prag.**

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Allianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 12. Magdeburg, den 23. März 1899. XXVIII. Jahrg.

Engliſche Vogelliebhaberei.

Von Albert Rettich.

(Fortſetzung).

In der vorigen Woche hatten wir wieder eine Vogelſchau, wofür nicht weniger als 2424 Anmeldungen eingereicht und Einſtandsgelder bezahlt waren. Es war nicht gerade die allergrößte, aber ſie war doch nur zweimal übertroffen worden. Vor einigen Jahren gab es einmal eine Ausſtellung mit 100 Anmeldungen mehr und dieſe war auch noch nicht die größte, denn wir hatten vorher die bedeutendſte und nie wieder erreichte gehabt, wo die Geſammtſumme über 2600 Anmeldungen betragen hatte.

Die Haupturſache des Rückſchritts wird mehreren Raſſen der engliſchen Kanarien zur Laſt gelegt, die, wie es ſcheint, ihre Glanzperiode erreicht hatten und ſich nicht länger auf der höchſten Stufe der Vollkommenheit erhalten konnten. So klagten z. B. die Züchter von gehäubten Norwich über zu häufig eintretende Blindheit ihrer ſchönſten Vögel; dies tritt ſo übermäßig auf, daß die hochgelben jetzt die blaßgelben ſchlagen, nicht, weil die erſteren beſſer geworden ſind, ſondern weil die blaſſen, die doch bekanntlich in allen Raſſen immer die ſtärkſten und länger befiederten ſind, ſo arg zurückgehen. Ebenſo haben die Iſabellen oder Zimmtfarbigen ihre frühere intenſive Iſabellfarbe verloren und fallen allzu häufig zu gelb oder zu grün aus, wodurch das richtige Braun verdrängt wird.

Die ſchönen geſtreckten Yorkſhire-Arten leiden jetzt an Schwanzkürze. Dieſer Theil des Gefieders, der ſoviel zur Hebung des Ausſehens beitrug und durch ſeine eigene Länge beim Meſſen des Vogels ſo richtig war — der ſchmale gerade Schweif wächſt jetzt nicht mehr ſo lang wie früher. Der hübſche grüne Lizard mit ſeiner ovalen, reingelben Kappe und mit den gleichmäßig geſäten weißen Halbmonden am ganzen Körper eignet ſich auch nicht mehr ſo recht zur Prämirung und die intenſivgelben London-Fancy-Kanarien mit ſchwarzen Schwingen und Schwänzen, die nach einer oder zwei Mauſern nicht mehr ſchwarz, ſondern gelb nachwachſen, werden jetzt ſo wenig gezüchtet, daß ſie diesmal alle: hoch- und blaßgelbe Männchen und Weibchen, in eine einzige Klaſſe geſtellt wurden.

Die übrigen Raſſen mögen etwas zugenommen haben; z. B. Scotch-Fancy, der lange, dürre, in Schottland herangezüchtete Vogel, der wie ein Achtel der Mondſcheibe ausſehen muß, ehe er ſich auf einer Ausſtellung blicken laſſen darf; dieſer ſcheint immer noch magerer und gebogener zu werden.

Dann der Lancaſhire-Fancy, der jetzt oft acht engliſche Zoll Länge erreicht und dabei ſchön geſtellt und proportionirt gebaut iſt, bleibt vorerſt noch normal.

Ferner die Brüſſeler oder Belgien-Fancy, die in unſerm Norden ſehr veredelt wurden, auch die neueſte Raſſe: Borda-Fancy, die einem glatten deutſchen Landkanarienvogel ſehr ähneln — alle dieſe Klaſſen waren von großartiger Schönheit.

In dieſem Jahr hatten wir eine Neuheit, nämlich zum erſtenmal eine Klaſſe für Harzer Sänger. Aus 24 Anmeldungen erhielten die vier erſtgedruckten Nummern die Geldpreiſe, wie folgt: Erſter Preis Nr. 1104, 15 Mk., zweiter Preis Nr. 1105, 10 Mk., dritter Preis Nr. 1106, 5 Mk., vierter Preis Nr. 1107, $2_{,50}$ Mk., Nr. 1108—1128 erhielten nichts, mit Ausnahme von Nr. 1111: eine milde Belobungskarte. Man hört Klagen über dieſe Prämirung. Nr. 1146 ſchloß die Kanarien-Sektion und zugleich die 76. Klaſſe.

Dann kamen 11 für alle möglichen Baſtarde, welche mit der Katalog-Nummer 1326 endigten. Waldvögel fingen an mit 75 Dompfaffen, 83 Stiglitzen, 34 Buchfinken, 93 Hänflingen. Drei Klaſſen Finken und Ammern brachten die laufende Nummer auf 1689.

Lerchen, Rothkehlchen, Amſeln, Singdroſſeln, Stare, je eine Klaſſe, fügten wieder 107 Stück dazu. Elſtern, Dohlen, Heher, Albinos und einheimiſche Weichfreſſer, in vier Klaſſen vertheilt, ergaben nur etliche 60 Meldungen. Gleich darauf kamen die Wandervögel: 11 Nachtigalen und Schwarzköpfe (wie gewöhnlich zuſammen in einer Klaſſe) und 24 Stück andere Arten in der nächſten; z. B. Schafſtelzen, graue Fliegenſchnäpper, Garten-Rothſchwänzchen, drei Arten Droſſeln u. ſ. w.

Noch im Jahr 1887 hörte die Sektion einheimiſcher Singvögel hier auf, aber man ſucht die Ausſtellungen ſtets reichhaltiger zu machen.

Die letzte Klaſſe dieſer Abtheilung war für europäiſche, nicht in England einheimiſche Sommervögel beſtimmt. Nur ſieben Stück kamen zur Prämirung. Erſter Preis: Blaukehlchen; zweiter: Orpheusgrasmücke; dritter: ein Steindroſſelweibchen und vier andere importirte.

Mit Nr. 1925 fingen die Fremdländer an: z. B. Witwen, Weber u. ſ. w. 26 Klaſſen führten uns alles erdenkliche, vom hyazinthblauen Arara bis zum Goldbrüſtchen herab, vor und hörten mit Nr. 2241 auf.

Die 184. Klaſſe war für verkäufliche Vögel, die nicht prämirt werden, nur die Hälfte des Einſtandgeldes bezahlen und dem Komitee eine bedeutende Summe durch die Verkaufs-Preiſe abwerfen.

Ich will bei dieſer Vertheilung der 2424 Käfige nicht die Klaſſen übergehen, in denen Zuchtpare ausgeſtellt werden. Dies betrifft nicht nur die Sittiche, Reisvögel u. a. kleine Fremdländer, ſondern auch verſchiedene Kanarienraſſen, hauptſächlich die gehäubten Norwich. Natürlich müſſen in ſolchen Fällen beide Theile ſehr verdienſtlich ſein, denn ein eventueller Käufer rechnet mehr auf gute Nachzucht, als auf individuellen Werth.

Dann gibt es immer einige Klaſſen, die von Geſchäftsleuten garantirt werden. Dies ſind meiſtens die bedeutenden Futterhändler, welche ihren Kunden Geldpreiſe anbieten. Es iſt einerlei, welche Vögel konkurriren, vorausgeſetzt, daß dieſelben durch das vorgeſchriebene Futter ſo ſchön geworden ſind, um Geldpreiſe zu gewinnen. Dieſe Reklame treibt viele Liebhaber zu dem Unternehmer einer ſolchen Klaſſe. Daß die Zuſammenſtellung oft ſehr wunderbar ausfällt, läßt ſich wol denken, denn wo alle Arten zugelaſſen werden, wird auch ſehr Verſchiedenes eingeſandt. Klaſſifikation iſt nicht nöthig, ſo lange die Thiere Mr. Soundſo's Vogelfutter gefreſſen hatten. So ſah man in dieſem Jahr unter 20 Konkurrenten eine Blaudroſſel, einen indiſchen Barivogel, einen Wüſtentrompeter, fünf Yorkſhire-Kanarien, eine Elſter, zwei Amſeln, einen Kakadu, einen Königsſittich u. a. m. Solche Zuſammenſtellungen müſſen ſchwer zu prämiren ſein.

(Fortſetzung folgt).

Ein ornithologiſcher Ausflug in den Glarner Alpen (Schweiz).

Von F. Hauſer.

(Fortſetzung).

Es waren beide Eltern mit vier flüggen Sprößlingen. Ich hatte mein helles Vergnügen an dem anmuthigen allerliebſten Familienleben, das hier vor meinen Augen ſich entwickelte. Hatte eines der Alten glücklich ein Kerbthier oder eine Bere erhaſcht, gleich war die ganze hungrige Sippſchaft, alle vier Jungen mit weit geſperrten Schnäbeln, ſpringend und flatternd hinter ihm drein und oftmals fiel es recht ſchwer, den Biſſen demjenigen zuzuſtecken, dem er zugedacht war. Abwechſelungsweiſe wurden Flugübungen vorgenommen. Hierin zeigten die Schwarzſchnäbelchen[*] ſcheinbar vielmehr Fertigkeit, als bei der Erwerbung ihres Unterhalts. Nachdem die Dohlen kurze Zeit in großen Kreiſen den Wänden entlang geflogen, kehrten ſie jeweils wieder auf das Band unter mir zurück und da begann das alte, hübſche Spiel von neuem.

Einmal war mir um die ſchönen Vögel recht bange. Ein fahlrother, ziemlich großer Vierfüßler kam durch's Geſtrüpp ihnen zugeſchlichen. Ich dachte, es ſei Herra Reinecke's ſauberer Nachkommenſchaft Einer, vor deren Schelmenſtreichen ſelbſt die Bewohner der Schneezone nicht ſicher ſind. Der vermeintliche Uebelthäter entpuppte ſich aber als ehrſamer, harmloſer Mungg (Murmelthier), der, aus mir unerklärlichem Grund, den Alpendohlen ſich zu nähern ſuchte. Selbſtverſtändlich wichen dieſe dem ſonderbaren Kauze ſtets aus und, verdroſſen ob der verſchmähten Freundſchaft, kroch er endlich wieder in ſeinen unterirdiſchen Palaſt zurück.

Früher trat, als ſporadiſche Erſcheinung, die der Alpendohle ſehr nahe verwandte Stein- oder Schneekrähe, welche ſich durch prachtvoll purpurglänzendes, auf Flügel und Schwanz grün ſchillerndes Gefieder und langen, ſanft gebogenen, brennend karminrothen Schnabel auszeichnet, in den Glarner Bergen

---

[*] Im Jugendkleid hat Pyrrhocorax alpinus ſchieferſchwarzen Ober- und ganz blaßgelben Unterſchnabel.

die Hörner und Köpfe pfeift, den Schneeſtaub in die Lüfte wirbelnd, daß Grat und Spitze „rauchen“ und der rieſelnde Waſſerfall zur Eisſäule erſtarrt, ſucht er tiefere, mildere und geſchütztere Lagen und macht ſich da gleich gern am Gemäuer der Bergdörfer, wie am Gefels zu ſchaffen.

Der vorgeſchrittene Tag und die — nun das Wetter wieder klar geworden — unbarmherzig warm niederſcheinende Sonne, bewogen mich, von der geplanten Beſteigung des noch ziemlich entfernten und nur auf anſtrengendem, nicht ungefährlichem Weg erreichbaren Auernhorns und dem Abſtieg über die Auernalp, abzuſtehen. Der ſenkrechten, gleich einem ungeheuren, mit vielen Zinnen und Thürmen gekrönten Feſtungswall aufragenden, ſüdſeits die Nautialp ihrer ganzen Länge nach begrenzenden Schepenwand folgend, machte ich mich, dem Salzthal zu, auf den Heimweg

Außer einem Eichhörnchen, das ſich in den erſten Arvengruppen, zu denen ich kam, herumtrieb, ſowie einer flüchtenden Gemſe, welche das Geklapper meiner ſchwerbenagelten Schuhe und des Bergſtocks jäh im Nachmittagsſchläfchen ſtörte, begegneten mir geraume Zeit keine höheren Thierformen mehr. Ringsum brütende Stille; nur ab und zu durch das dumpfe, ſurrende Rauſchen vom Gewände abſtürzenden Geſteins oder dem gellenden Pfiff eines Murmelthiers unterbrochen. Nirgends ward eine Vogelſtimme laut und ler und tot lagen die unter der ſengenden Hitze flimmernden Geröllhalden und Triften.

Gleichwie auf die geſammte Thierwelt übte die drückend ſchwüle Atmoſphäre auch auf meinen Körper ihre ermüdende und ermattende Wirkung, ſodaß ich mich entſchloß, ein Stündchen auszuruhen. Ein bequemes Lager fand ſich bald in einem an die Schattenſeite eines Steinblocks angelehnten Mospolſter. In dem kühlen, lauſchigen Winkelchen war's herrlich zu ruhen und, träumend das Auge zum wolkenloſen, tiefblauen Himmel gerichtet, in deſſen lichtklaren Höhen kreiſend ein Thurmfalk (Falco tinnunculus) ſchwebte, ſäumte ich mich bis ſpät in den Nachmittag hinein.

Gegen 4 Uhr kam wieder einiges Leben in die Landſchaft. Zuerſt meldete ſich der Tannenheher (Nucifraga caryocatactes) durch ſein langweiliges, rauhes Geſchrei; dann tönte tiefer aus dem Wald herauf das helle Jauchzen eines Schwarzſpechts (Picus martius) und, zu einer Kolonie mächtiger Wettertannen gekommen, ſah ich das winzige Goldhähnchen (Sylvia flavicapilla), die Alpenſumpfmeiſe (Parus borealis) und Tannen- und Haubenmeiſe (Parus ater et P. cristatus) im flechtenbehangenen Geäſt der altersgrauen Rieſen nach einem Abendimbiß ſuchen, während der Zitronfink (Fringilla citrinella) die am Gemäuer einer verfallenen Sennhütte wuchernden Neſſeln und Gräſer nach einem ſolchen durchmuſterte. Bei Verfolgung einer grauen Bachſtelze (Motacilla sulphurea), welche am ſogenannten Stichbrunnen, einer unterhalb der Saſtenwand entſpringenden Quelle, umhertrippelte, überraſchte ich im Erlengeſtrüpp einen Birkhahn (Tetrao tetrix). Lange konnte ich mich aber des Anblicks des prächtigen Vogels nicht erfreuen; bald ward er des unerhofften Beſuchs gewahr und machte ſich, ſo raſch als möglich, auf und davon.

Statt den durch oftmaliges Befahren mit Viehherden zu einer wahren Kothgrube umgewandelten Alpweg zu gehen, ſtieg ich, von dem durch die verſchiedenen Meiſenarten, Goldhähnchen, Spechte, die Singdroſſel (Turdus musicus), den Gimpel (Loxia pyrrhula) und das Haſelhuhn (Tetrao bonasia) belebten Nautiwalde aus über die Felsköpfe und theils mit wild verworrenen Trom und trügeriſchen Mosdecken überwachſenen, unheimlich ſteilen Felsplatten direkt zu den Wildheuſtällen von Vorder-Salz hinab.

Ueber dem modernden Unterholz und dem mit Farnen und Mos bedeckten felſigen Grund der Nadelholzwälder des ſchluchtähnlich zwiſchen den faſt ſenkrecht aufſteigenden Flüen und Wänden des Brünneltſtocks und den Abſtürzen der Nautialp gebetteten Salzthals grauten bereits düſtere nächtliche Schatten, als ich den Thalboden erreichte. Aus dieſem Grund ließ ich die freundliche Einladung der behaglich um das unter dampfendem Keſſel lodernde Hüttenfeuer gelagerten Wildheuer zur Einkehr unbeachtet und ſetzte ohne Aufenthalt meinen Heimweg auf der gut in Stand gehaltenen Bergſtraße fort, der entlang der Singdroſſel und des Rothkehlchens (Sylvia rubecula) melodiſches Abendgebet noch erklang, als bereits die Fledermaus ihr geiſterhaftes Weſen trieb und das dumpfe „Buhuu, huh“ des Königs der Nacht (Bubo maximus) und das Bellen des Fuchs den armen, wehrloſen Haſen erzittern ließ. (Fortſetzung folgt).

Zur Ueberwinterung einheimiſcher Kleinvögel im Freien.

Von L. Aelbert.

Es iſt heute wol nicht mehr eine allzu gewagte Ausſage, wenn man behauptet, daß die meiſten unſerer Zugvögel ihre heimatlichen Gaue aus Nahrungsmangel verlaſſen, und nicht etwa, weil ſie, wie lange geglaubt wurde und in weiten Kreiſen noch jetzt geglaubt wird, nicht im Stande ſein ſollen, die winterliche Kälte zu ertragen. Auch iſt es dem geehrten Leſer ſicherlich nicht neu, daß unſere Standvögel im Freien der Kälte allein wol nie erliegen, da die hohe Temperatur ihres Blutes ſie vor dem Tode des Erfrierens ſchützt. Die Opfer, die der Winter unter der gefiederten Welt fordert, ſind größtentheils entweder verhungert oder in der infolge des Hungers eingetretenen Erſchlaffung dem nur zu häufigen Raubzeug zur Beute gefallen. Mit der Erſchlaffung der Körperkräfte iſt naturgemäß eine ſolche des ſogenannten Inſtinkts verbunden, die zuweilen einen Grad erreicht, der dem Neuling und Nicht-Vogelliebhaber unbegreiflich erſcheint. So hatte ich vor drei Jahren im Winter Gelegenheit, zu beobachten, wie ein Sperber ſich von einem Park aus aus einem Fluge von Bluthänflingen, Bergfinken und Haubenlerchen, die augenſcheinlich ſehr erſchöpft waren, zwei Tage lang einen Vogel nach dem andern wegholte, ohne die Uebrigbleibenden von ihrem Futterplatz, einem mit trockenen Nachtkerzen und ſonſtigem Unkraut überwucherten Felde, endgültig zu vertreiben. Erſt am dritten Tage bereitete eine derbe Schrotbriſe des Gärtners dem von unſerem Standpunkte aus verbrecheriſchen Treiben des Raubvogels ein jähes und wohlverdientes Ende.

Am wenigſten haben nach meinen Beobachtungen die ausgeſprochenen Baumvögel und neben dieſen natürlich die Schlüpfer, wie Heckenbraunelle, Zaunkönig u. a., unter den vielſeitigen Gefahren des Winters zu leiden. Sie finden einerſeits ſelbſt bei dem tiefſten Schnee vermöge ihrer Gewandtheit immer noch verſteckte Sämereien und Inſekten, die ſie vor großem Hunger ſchützen, und andererſeits macht es ihnen bei der Ankunft irgenwelchen Raubzeuges keine Schwierigkeiten, ſich vor dieſem in dichtes Strauchwerk, Baumhöhlen, Mauerritzen u. ſ. w. zu flüchten. Und ſtellt ſich bei ihnen wirklich einmal der Hunger ein, ſo finden ſie im Wald wie überhaupt an Bäumen vor der Kälte, die dann ja allerdings ihre Wirkung nicht verfehlen würde, ohne Zweifel wärmere und geſchütztere Plätzchen, als die Vögel, die, durch andere Lebensbedingungen gedrängt, ſich zu Scharen zuſammen gethan haben, um auf den Feldern ihren nagenden Hunger zu ſtillen, wobei dann ein großer Theil auf dieſe oder jene Weiſe zu Grunde geht. Glücklicherweiſe werden dieſe traurigen Zuſtände durch hohen und Wochen hindurch andauernden Schnee bedingt, der hier zu Lande (Nieder-Rhein) nicht ſehr häufig iſt. (Der letzte andauernde Schneefall datirt vom Winter 1895/96).

Obgleich die Schneegeſtöber als ſolche keinen ſchädlichen Einfluß auf die Vogelwelt ausüben und von den meiſten unſerer Lieblinge garnicht berückſichtigt werden, gehen zartere Inſektenfreſſer ihnen doch möglichſt aus dem Wege, und zwar kann der aufmerkſame Spaziergänger dies beſonders bei Goldhähnchen wahrnehmen. Erſt unlängſt beobachtete mein Freund Ch., ein warmer Liebhaber und bewährter Kenner aller einheimiſchen Vögel, bei Moers eine Anzahl dieſer niedlichen Vogelzwerge während eines Schneeſturmes. Sie hatten ihr Element, die Zweige, verlaſſen, ein Wagniß, das ſie nur in Ausnahmefällen unternehmen, und erwarteten auf dem Erdboden unter einem überhängenden Tannenzweig ruhig das Ende des Unwetters, während die Meiſen, denen ſie ſich vorher wahrſcheinlich angeſchloſſen hatten, unbekümmert um die kalten Wintergrüße in ihrer, man möchte ſagen unverwüſtlichen Munterkeit und Neugier auf der Futterſuche das umſtehende Gebüſch eingehenden Prüfungen unterzogen.

Auch ich habe beſonders in den letzten beiden Wintern tagtäglich Beobachtungen gemacht, die von unzweifelhaftem Wohlbefinden unſerer gefiederten Freunde zeugten. So bereitete mir in dieſem Winter vor allem ein Zaunkönig dadurch großes Vergnügen, daß er während eines ſtarken Schneefalles ſein Lied ebenſo laut und hell in den Wald hineinſchmetterte, wie an den ſchönſten Frühlingstagen, gewiß ein Zeichen ſeines beſten Wohlbefindens. Die Inſaſſen meiner Voliere habe ich ſtets, auch in den kälteſten Wintern, im Freien gehalten und ſogar übernachten laſſen, ohne daß ſelbſt die Inſektenfreſſer wie Rothkehlchen, Braunelle und Bachſtelze, jemals auch nur den geringſten Schaden dadurch genommen hätten; auch ein Belag dafür, wie widerſtandsfähig unſere Kleinvögel gegen Kälte ſind, ſolange ſich ihr nicht, wie bereits oben betont, der Hunger als Verbündeter zugeſellt.

Sehr intereſſant war mir ſtets die Art und Weiſe, wie die Stare ſich vor den Drangſalen des Winters zu ſchützen wiſſen. Da hiermit die Punkte berührt werden, welche Herr Dankelmann in Nummer 8 des gegenwärtigen Jahrganges erörtert, möchte ich nicht verfehlen, an dieſer Stelle meine diesbezüglichen Beobachtungen mitzutheilen. Für Düſſeldorf und ſeine Umgebung iſt der Star unbedingter Standvogel, und es war mir vollſtändig neu, daß der drollige Schwätzer noch heute an verſchiedenen Stellen Deutſchlands Zugvogel iſt. Hier treibt er ſich im Winter ebenſo vergnügt auf den Dächern umher wie im Sommer, ſchlägt ſich auch wol mit Dohlen und Krähen zuſammen und ſucht mit ihnen den Acker ab, kehrt jedoch am Abend immer wieder zu ſeinen Schlupfwinkeln in den Dächern oder Kirchthürmen zurück. Bei Tage wählt er ſeinen Sitzplatz gern in der Nähe eines Schorſteins und zwar immer ſo, daß er vor etwaigem ſcharfem Wind oder kalten Niederſchlägen geſchützt iſt. Zeitweiliges, vollſtändiges Verſchwinden der Stare habe ich niemals beobachtet, auch hört man trotz grimmigſter Kälte ihr „zirir“ ununterbrochen von den Dächern herniederſchallen.

Eine ſehr eigenartige und in jeder Hinſicht glücklich verlaufene Ueberwinterung konnte man hier in der Nähe des Grafenberg (Waldung im Oſten Düſſeldorfs) in den Wintern 1895/96 und 1896/97 an einer Bachſtelze beobachten. Was zunächſt die zierliche Waſſerelſe bewogen oder gezwungen hat, nicht mit ihren Genoſſinnen den Süden aufzuſuchen, war mir zu erforſchen leider nicht vergönnt. Zu ihrem Tummelplatz hatte ſie ſich einen Waſſertümpel auserwählt, in den das warme, gebrauchte Keſſelwaſſer eines in der Nähe liegenden Maſchinenwerks abfloß; das Waſſer gefror infolgedeſſen nie. Hier trippelte ſie am Rande geſchäftig auf und nieder, hier und da ein Würmchen oder ein von der Wärme angelocktes und bethörtes Kerbthier erhaſchend. Natürlich ſuchte ich feſtzuſtellen, wo der doch immerhin zarte Vogel die kalten Nächte verbrachte, eine Frage, die nicht ſehr ſchwer zu beantworten war, denn das Gefieder unſerer Freundin hatte am Morgen ſtets einen eben nicht hübſchen ſchwarzen Anſtrich, aus dem zu entnehmen war, daß ſie in den zwar unſauberen, aber warmen Fabrikräumen nächtigte. Zuweilen verließ ſie auch das trübe Waſſer, um in dem nahe vorüberfließenden klaren Düſſelbach ein Bad zu nehmen, wozu ſie den Tümpel niemals benutzte. Hin und wieder erfreute ſie ſich der Geſellſchaft eines an und in der Düſſel hauſenden Eisvogels, der dann am Ufer in dem Strauchwerk ſaß und ſcheinbar verächtlich auf die warme Brühe niederſchaute.

Ich glaube nicht, daß er jemals in dem trüben Waſſer ſeine Künſte geübt hat, geſehen habe ich es wenigſtens nie. Weniger zurückhaltend war eine Sturmmöve, die in dem erſten Winter mehrmals vom Rhein herüberkam; ſie ſchwamm vergnügt auf dem Waſſer umher, jedoch zum Tauchen hat auch ſie ſich nicht verſtanden.

Leider erſchien unſer Bachſtelzchen im verfloſſenen Winter nicht wieder, und obwol ihre im Lauf der Zeit entſtandenen Freunde hoffen, daß ſie im Sommer 1898 von der Krankheit, die ſie zwei Winter hindurch an den rauhen Norden gefeſſelt hat, geneſen und im Herbſt mit ihren Schweſtern nach dem Süden gezogen iſt, ſo hat ſie doch gewiß in dieſem Winter mancher vermißt, war ſie doch ein Stück Frühling in dem ſtarren Winter-Panorama der Natur.

Die Haltung, Wartung und Pflege, Fütterung auf billigſte und doch vollſtändig genügende Art, ſowie die Eingewöhnung der Wildfänge droſſelartiger Vögel.

Von A. Reuter.

Es wurde ja ſchon zur Genüge in ornithologiſchen Büchern über die Pflege einheimiſcher Vögel geſchrieben, jedoch nachdem wir alle geleſen haben, werden wir finden, daß jeder Autor hierin ſeine eigenen Anſichten hat, und warum? weil jeder Vogelwirth mit dieſer oder jener Gattung ſeine eigenen Erfahrungen macht, deshalb auch die verſchiedentlichſten Anſichten, welche jedoch in der Hauptſache ſich wieder vereinigen, und ſomit ein großes Ganze bilden, aus dem wir uns, je nach Bedarf, das uns Paſſendſte herrausnehmen, wollen wir ſagen, vom Beſten das Beſte. Ich für meinen Theil habe in der Fütterung, bzl. den Futterbeſtandtheilen nie eine große Auswahl gehabt, ſondern ich war ſtets darauf angewieſen, meine Vögel auf die billigſte und einfachſte Weiſe zu ernähren, trotzdem habe ich geradezu großartige Reſultate erzielt, gegenüber mir bekannter Vogelfreunde, welche ſich anſcheinend der vorzüglichſten und theuerſten Futterſtoffe bedienten, und trotzdem ſehr viele und oft ſchnell und unerwartete Verluſte ihrer Vögel hatten. Ich will damit nun durchaus nicht ſagen, daß gerade das Futter ſelbſt Schuld daran war, denn ein gutes Futtergemiſch kann gewiß nicht ſchaden und iſt dem gewöhnlichen vorzuziehen, wenn anders man in der Lage iſt, ſich daſſelbe zu beſchaffen oder zu kaufen, ich glaube vielmehr, daß der Hauptgrund nur in der richtigen Eintheilung zu ſuchen ſei, ſowie in der Behandlung und gewiſſenhaften Pflege der Vögel. Es gibt Vogelwirthe, die wol den Geſang ihrer Gefangenen gern hören und ſich des Lobes ihrer Sänger nicht genug ausſprechen können, jedoch in der eigenhändigen Pflege und Fütterung da hapert es bedeutend, warum? weil es eine zu große Mühe verurſacht, ſeine Thiere ſelbſt zu füttern, es wird ſomit einer Magd oder Kindern übertragen, ohne Ueberlegung, ob dieſe Perſonen Verſtändniß dafür beſitzen oder nicht, es wird dabei oft ſchwer geſündigt, wenn dieſe edlen Thiere ähnlich wie ein Volk Hühner gefüttert werden; abgeſehen davon, daß ſchon die Eintheilung der Futterſtoffe eine ganz verkehrte iſt, wird aber mit der Reinlichkeit der Futter- und Trinkgeſchirre erſt recht geſündigt, was kümmert ſich auch eine Perſon, die ohne eigenes Intereſſe die Vögel zu beſorgen hat, ob der Reſt des Futters vom Tage vorher herauskommt oder nicht, in der Regel bleibt dieſer im Futtergeſchirr liegen, und das friſche Futter kommt oben darauf, womöglich noch hübſch angedrückt, damit es ja ausreicht und man nicht ein zweitesmal des Tags nachſehen muß; zu was denn dieſe unnütze Arbeit, ſie werden ſchon freſſen, wenn ſie Hunger haben, ſolche und ähnliche Aeußerungen hörte ich ſchon zu öſteren Malen. In dieſen alten Futterreſten, welche nun ſchon in mehr wie ſaure Gährung übergegangen ſind, bildet ſich ein Heer von Krankheitsſtoffen, die unſeren bedauernswerthen Stubengenoſſen mit allen möglichen Krankheiten befallen, ſodaß einer nach dem andern rapid ſchnell das Zeitliche ſegnet, und darüber wundern ſich dann ſolche leichtſinnigen Vogelwirthe, und geben dieſem und jenem die Schuld, nur ſich ſelbſt klagen ſie nicht an und ſpielen den Unſchuldigen. Wer Vögel im Käfig hält, der hat die moraliſche Verpflichtung, ſeine Thiere, wenn irgend möglich, ſelbſt mit den nöthigen Lebensbedürfniſſen zu verſehen und ehre den Schöpfer im Geſchöpfe; vorausgeſetzt, daß er überhaupt dieſe edle Liebhaberei theoretiſch ſtudirt hat, dann fange er erſt mit weniger heiklen Vögeln an, vielleicht mit einer Dohle oder Krähe, dann gehe er zu den dauerhaften Körnerfreſſern über und erſt zuletzt zu Weichfreſſern. Auf dieſe Weiſe bildet ſich ein firmer Vogelwirth heran. Die Futter- und Trinkgeſchirre ſollen jeden Tag, im Sommer ſogar zweimal des Tags, in friſchem Waſſer ausgewaſchen und wieder ausgetrocknet werden, bevor man wieder anderes Futter oder Waſſer gibt, denn auch im Trinkgeſchirr gibt es Krankheitserzeuger, das Waſſer wird durch Futtertheilchen oder durch zufällig hineingefallene Exkremente des Vogels verunreinigt und geht ſomit im geheizten Zimmer oder in der Hitze des Sommers ſchnell in Fäulniß über, wovon man ſich am beſten überzeugen kann, wenn man hineinriecht, alſo fort mit dieſem Waſſer, und friſches gereicht. Hat man im Käfig keine eigenen Badegeſchirre, ſo iſt es überhaupt Bedingung, dem Vogel mindeſtens zweimal des Tags friſches Waſſer zu geben, denn abgeſehen davon, daß das Waſſer durch das Baden ſehr verunreinigt wird, wird daſſelbe oft bis auf die Neige verſpritzt, ſodaß zuletzt der Vogel nicht mehr trinken kann, denn dazu muß mindeſtens noch ſoviel Waſſer vorhanden ſein, daß der ganze Schnabel noch eingetaucht werden kann; mit der Schnabelſpitze allein iſt kein Vogel imſtande, Waſſer zu ſchöpfen. Die übrige Behandlung ſei, ſtets ruhig und langſam an den Käfig zu gehen, bei friſch gekäfigten Vögeln iſt dies beſonders zu empfehlen, damit ſie die angeborene Furcht und Scheu ablegen und ihren Beſitzer nicht als Feind, ſondern als Freund kennen lernen, und dies werden ſie auch, gewöhnlich ſchon nach etwa 14 Tagen wird auch der ungeſtümſte Wildfang ruhiger werden und bald die Hand erkennen, die ihm ſein Futter ſpendet, beſonders ſind die droſſelartigen Vögel durch Darreichung von Mehlwürmern am leichteſten zu zähmen. Ich habe einen Amſelwildfang in 14 Tagen ſoweit gebracht, daß er mir die Mehlwürmer vom Finger nahm, die erſten par Tage war er wol ſehr ungeſtüm, jedoch deckte ich den Käfig ſchon nach 3 Tagen halb auf, und ſo jeden Tag ein Stückchen mehr, bis ich nach 8 Tagen das Tuch ganz entfernte, nach weiteren 8 Tagen ſang er ſchon leiſe und wurde bis zu Weihnachten ganz laut, wo er dann fortſang bis zur Mauſer im Monat September; während der Mauſer ſang er leiſe, aber jeden Tag. Dieſes gilt jedoch nicht als Regel für alle Wildfänge, ſondern es kommt ſehr auf das Alter der Vögel, in welchem ſie gefangen werden, an. Ich erkannte an dieſem, daß es noch ein junger Vogel war, er hatte auf jedem Flügel deutlich zu ſehende braune Striche, ſog. Neſt-Spiegel, welche jedoch nach der erſten Mauſer nicht mehr zum Vorſchein kommen; dieſe Beobachtung habe ich ſchon zu wiederholten Malen gemacht. Einen ältern Wildfang hatte ich ebenfalls, dieſer ließ mich ein ganzes Jahr auf den erſten Geſangslaut warten, hingegen ſtieß er den Warnruf ſehr oft hervor. Der Geſang war bei beiden Vögeln tadellos, man durfte ſich dem Käfig vollſtändig nähern, ſie ließen ſich nicht irre machen. Wer alſo Amſel-Liebhaber iſt, der verſchaffe ſich einen Herbſt- oder Frühjahrswildfang, es iſt lohnender als dieſe jung aufzuziehen, da ſich der Geſang bei Jungen nie ſchön ausbildet, es gibt immer Mißtöne dazwiſchen, die für ein Kennerohr nichts Angenehmes bilden. Hat man vielleicht eine gutſingende Dorngrasmücke, Schwarzplattl, Rothkehlchen oder Nachtigal dabei, ſo will ich nicht in Abrede ſtellen, daß bei der Gelehrigkeit der Amſel doch ein leiblich guter Geſang zuſtande kommt, ſie lernt ſicher die beſten Strofen aus angeführten Vogelgeſängen und bringt dieſelben flötenartig zum Vortrag, für das Ohr ſehr angenehm, beſonders im hohen Zimmer oder Korridor, oder auch vor dem Fenſter. Es empfiehlt ſich jedoch, wenn er vor das Feſter geſtellt wird, den Käfig in eine hierzu paſſende Kiſte zu ſtellen und an der Lichtſeite grüne Drahtgaze anzubringen, damit ſie durch nichts im Geſang beeinträchtigt wird, auch bringe man den Käfig nicht auf der Südſeite an, ſondern nach Oſten zu gelegen. Der Schnabel verfärbt ſich bei der Amſel im Herbſt und wird bräunlichſchwarz, wird aber im Januar wieder gelb; hier im Schwarzwald unterſcheiden die Landleute irrthümlich zweierlei Amſelarten, und nennen dieſe mit gelbem Schnabel, im Frühjahr, Märzenamſel, es iſt natürlich ein und dieſelbe.

Die Singdroſſel gewöhnt ſich faſt noch leichter an den Käfig als wie die Amſel, da ſie ein ruhiges und nicht ſo ungeſtümes Weſen, ausgenommen während der Zugzeit, an den Tag legt, ſie geht auch bald an das Futter, jedoch iſt ſie bei Annäherung etwas ſcheuer, und es bedarf längerer Zeit, bis man ſich ihr nähern darf, ohne daß ſie unruhig hin und her flattert; doch einmal an ihren Pfleger gewöhnt, wird ſie auch dreiſter, nur mit dem Unterſchied erſterer gegenüber, daß Jahre vergehen, bis ſie ſo keck wird, einen Mehlwurm von der Hand zu nehmen, ſie kommt wol heran, kehrt aber ſogleich wieder um, wenn ihr der Mehlwurm nicht in den Käfig geworfen wird, geſchieht dieſes aber, ſo kann ſie der Lockſpeiſe nicht widerſtehen. Lauten Geſang wird man im erſten Jahr nicht vernehmen bei der Droſſel, jedoch ſingt ſie nach einem Jahr ſehr fleißig, leiſe oder halblaut, das folgende Frühjahr jedoch ſchon vom Februar oder März ab, ſo laut und ſchön als wie im Wald, und gibt der Geſang einer Droſſel, einer Amſel und eines Rothkehlchens zuſammen ein prachtvolles Konzert.

(Fortſetzung folgt).



Berlin. Deutſche Ornithologiſche Geſellſchaft, Sitzung vom 6. März d. J. (Schluß.) Ein Pärchen von Nilgänſen hatte im zoologiſchen Garten vier Junge, das Weibchen wurde mit den Kleinen auf einen beſonderen Teich gebracht. Während dieſer Trennungszeit machte ſich ein anderes Nilgansweibchen an den Strohwitwer und beide hielten zuſammen. Als nun die Ehefrau wieder auf dem Teich erſchien, begrüßte das Männchen ſie ſehr erfreut, das zweite Weibchen ſchwamm mit lauten Rufen ebenfalls heran, kehrte aber ſofort um und ſuchte das Ufer auf, nachdem das Männchen ſie von der Seite angeſehen hatte. Daß die Schwäne übrigens ſich am Geſicht erkennen, lehrt eine hübſche Beobachtung. Mehrere Schwäne gründelten; ein vorwitziger Artgenoſſe macht ſich ein Vergnügen daraus, dieſelben am Gefieder zu zupfen und ſie zu ſtoßen. Als er nun eine Schwanenjungfrau, die den Hals unter dem Waſſer hatte, ſo gezerrt hatte, fährt dieſe mit dem Kopfe hoch. Er weicht entſetzt zurück, erkennt diejenige, um deren Gunſt er ſich beworben hat und ſchnattert ſie an, wie um ſich zu entſchuldigen. — Sehr intereſſant ſind die Liebesſpiele unſerer Stockente, welche man im Thiergarten zur Winterszeit gut beobachten kann. Auf einem freien Waſſer innerhalb der Eisfläche ſchwimmen 5 bis 6 Pare. Sie begrüßen ſich mit dem ſchon bei den Schwänen geſchilderten Antrinken. Dann ziehen ſich alle Männchen nahe zuſammen. Ein Weibchen ſchwimmt ſchnell durch ſie hindurch. Hierauf ſchnellen die Männchen im Takt in die Höhe, biegen dann den Schnabel gegen die Bauchmitte und pfeifen zugleich. Verpaßt einer den Anſchluß, ſo richtet er die Kräuſelfedern in die Höhe und ruft „Raep“. Der Redner berichtete weiter über die Liebesſpiele der Brautenten, der Mandarinenten, der Tauchenten. An den Vortrag ſchloß ſich eine rege Beſprechung. Herr Dr. Heinroth berichtete weiter noch über das Benehmen des im zoologiſchen Garten lebenden Baßtölpels (Sula bassana) und des vom Fürſten Hohenlohe-Oehringen geſchenkten Auerhahns. Der letztere kommt, ſobald ſich ein Beſucher nach Anbruch der Dämmerung ſeinem Gehege nähert, mit geſchleiſten Flügeln und Rad ſchlagend, den Kinnbart nach vorn bis zur Schnabelſpitze vorbiegend, mit geſträubten Nackenfedern wüthend gegen das Gitter getrippelt und läßt dann ein lautes, huſtenartiges Grunzen ertönen. Herr Schillings theilte zum Schluß mit, daß ſein Bruder im Jahre 1896 eine Elfenbeinmöve bei Düren geſchoſſen hat.

P. M. in der „Voſſiſchen Zeitung“.

Anfragen u. Auskunft.

Herrn Burkhardt in Eichſtetten: 1. Da von mehreren Seiten Anfragen inbetreff des **Einſammelns, Trocknens und Aufbewahrens von Ameiſenpuppen** eingegangen ſind, ſo gebe ich im Nachſtehenden die Anleitung dazu nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“: „Man ſcharrt eine Stelle, nicht zu nahe an einem Ameiſenhaufen, von allem Laub, Reiſig u. drgl. frei, entfernt auch den Raſen bis auf den Sand, glättet dieſen und bereitet darüber eine hohle Lage von trocknem Reiſig, deckt über letztre ein leinenes oder baumwollnes Tuch und ſchüttet darauf einige tief aus dem Ameiſenhaufen herausgeholte Schaufeln voll Spreu nebſt den Ameiſen und ihren Puppen. Während man nach und nach immer mehr und tiefer aus dem Haufen nimmt und loſe darauf ſchüttet, ſuchen die geängſtigten Ameiſen ihre Brut zu retten und ſchleppen die Puppen unterhalb des Tuchs auf eine Stelle zuſammen, von der man ſie dann bequem aufleſen kann. Dieſe Ameiſenpuppen-Ernte darf man nur bei warmem, trocknem Wetter fortnehmen und zugleich ſollte man immer durch das Zurückſchütten der Spreu nebſt den Ameiſen für die Erhaltung des Haufens Sorge tragen. Wenn man dieſe Vorſicht beachtet, ſo kann man von einem ſolchen wol bis dreimal in einem Sommer die Puppen gewinnen. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß man bei dieſer Arbeit die Hände und auch andere Körpertheile gegen das Andringen der gereizten Kerbthiere ſichern muß. Anleitung dazu, „um ſich vom Mai an leicht Ameiſeneier zu verſchaffen“, gibt Friderich: „Man ſtülpt auf einen Ameiſenhaufen einen oder mehrere Blumentöpfe, in welchen die Ameiſen ihre Brut unterbringen. Sie füllen dieſelben mit lockerer Erde aus und tragen in die Höhlungen zwiſchen derſelben ihre Larven und Puppen. Nach wenigen Tagen iſt jeder Blumentopf gefüllt; man hebt ihn mit ſeinem Inhalt vorſichtig ab und kann nun die darin enthaltenen Ameiſenpuppen nebſt lebenden Ameiſen nach Ermeſſen verwenden. Auf dieſem Weg läßt ſich ein Ameiſenhaufen jährlich mehrmals ausbeuten“. Da die friſchen Ameiſenpuppen ſich leider nur kurze Zeit unverdorben aufbewahren laſſen, zumal wenn ſie bei feuchtem Wetter eingeſammelt ſind und bei Hitze in Haufen liegen, ſo muß ich noch folgende Rathſchläge geben. Zunächſt ſuche man den ganzen Vorrath, welchen man braucht, ſchon in den beſten, vor Johanni eingeſammelten Puppen anzuſchaffen und zwar, indem man dieſelben friſch kauft und ſelber trocknet oder indem man ſolche beſtgeſammelten und getrockneten bezieht. Iſt man gezwungen, ſpäterhin zu kaufen, ſo vermeide man ſoweit als möglich die blau gewordenen Puppen, denn in denſelben iſt die Brut, die Ameiſe, abgeſtorben und faſt alle Vögel laſſen ſie unberührt, ſelbſt wenn ſie hungern müſſen. Im übrigen achte man beim Einkauf friſcher A. auf folgende Merkzeichen. Sie müſſen möglichſt trocken, nicht zuſammenklebend oder gar ſchmierig, nicht irgendwie verunreinigt ſein und keinen fauligen oder ſcharfſauren Geruch haben; die kleinſten, gleichmäßigen, reinen und weißen ſind natürlich die beſten. Um die friſchen A. möglichſt lange zu haben, macht man ſie durch gelindes Röſten haltbar. Man wirft immer eine Handvoll in eine über Kohlen erhitzte Pfanne, rührt ſie darin um, bis ſie welk zu werden beginnen und ſchüttet ſie dann dünn ausgebreitet auf Papierbogen zum Abkühlen. Beſſer noch werden ſie auf einem über einen Topf mit ſiedendem Waſſer geſtellten Teller, unter beſtändigem Umrühren vermittelſt eines Löffels, ſo zubereitet. Loffhagen trocknete ſie in den Sonnenſtrahlen auf dem Dach aus, ſo daß er faſt das ganze Jahr hindurch derartige halbfriſche A. hatte. In dieſer Weiſe haltbar gemacht, nennt man ſie „abgeſchreckt“ oder „geſchwelkt“, und unter dieſen Bezeichnungen ſind ſie auch im Handel, natürlich zu etwas höherm Preiſe, käuflich. Andere haben mitgetheilt, daß man ſie im Eiskeller oder in einem Eisſpind lange Zeit friſch erhalten könne. Zum Vorrath für den Winter werden ſie ſchärfer gedörrt und in großen Maſſen in einen Backofen gebracht. Gute getrocknete Ameiſenpuppen müſſen einen angenehmen, friſchen, würzigen, nicht faulen oder dumpfen Geruch haben, dürfen nicht feucht ſein oder gar zuſammenkleben; ſodann müſſen ſie hell, nicht bräunlich oder gar ſchwärzlich ausſehen, auch nicht mit Spreu, Sand, Steinchen, Harzkörnchen u. drgl. verunreinigt ſein, ferner dürfen ſie nicht mit Milben, Motten, Speckkäferlarven u. a. Schmarotzern beſetzt ſein; ſchließlich kommt es vor, daß unreine und ſchlecht geſammelte, insbeſondre die ruſſiſchen, an ſich reinweiß erſcheinen, dies iſt dann durch Schwefeln hervorgebracht, und ſie können infolgedeſſen für zarte Vögel ſehr ſchädlich werden. Wenn eine Probe eingeweicht wird, darf ſie das Waſſer nicht tief dunkel färben, weil ſie dann verbrannt ſind. Als Fälſchungen zur Vermehrung ihres Gewichts oder Maßes kommen außer den genannten Beimiſchungen, auch Weizen- und Roggenkörner, grob geſchroteter Hafer, Gerſtengrütze u. a. vor. Man ermittelt drgl., indem man einen Eßlöffel voll von den fraglichen A. in ein großes Glas Waſſer ſchüttet, tüchtig umrührt, etwa eine halbe Stunde lang ſtehen läßt, dann die oben ſchwimmenden A. abſchöpft und den Bodenſatz, theils noch naß, theils getrocknet auf weißem Papier ausbreitet und unterſucht. Zur Aufbewahrung ſchüttet man ſie am beſten in einen Leinwandbeutel und hängt dieſen an einem ſehr trocknen Ort auf. Gedörrt werden ſie an ſich nur von wenigen Vögeln gefreſſen, in den verſchiedenen feuchten Gemiſchen dagegen oder allein angequellt, ſo wie die getrockneten Beren behandelt, ſind ſie für die meiſten Vögel beinahe ebenſo zuträglich und faſt gleicherweiſe willkommen wie im friſchen Zuſtand. 2. Jedenfalls iſt Ihr Hänfling ein noch nicht völlig zum Frühlingskleid ausgefärbtes Männchen. Sobald er das Prachtkleid angelegt hat, wird er hoffentlich ſingen. Sobald es friſche Ameiſenpuppen gibt, bieten Sie ihm etwas von ſolchen und zur Erquickung geben Sie ihm noch verſchiedene Sämereien, die er in der Freiheit verzehrt. Salat-, Wegerich-, Diſtel-, Kletten-, Erlen- u. a. Samen.

Herrn Joſef Freiherr Hruby: 1. Vor allen Dingen füttern Sie Ihren Graupapagei nicht ganz richtig. Eins ſeiner hauptſächlichſten Nahrungsmittel muß ja beſter ſchwach angekochter Pferdezahnmais ſein und dieſen haben Sie bisher garnicht gegeben. Holen Sie dies nun nach und reichen Sie ihm zu dem Mais nur noch beſten Hanf und täglich ein etwa wallnußgroßes Stückchen altbacknes Weißbrot, in Waſſer erweicht, von der Rinde befreit und gut ausgedrückt. Die Sonnenblumenkerne entziehen Sie ihm jetzt bis auf weiteres. 2. Wodurch die Krämpfe verurſacht worden, vermag ich hier aus der Entfernung nicht zu ermeſſen. Dieſelben können infolge von Schreck oder Beängſtigung, aber auch infolge von irgend einem innern Leiden herrühren. Der einzige Rath, den ich Ihnen da geben kann, iſt der, daß Sie den Papagei aufmerkſam beobachten und ihn, wie oben angegeben, ſachgemäß füttern und verpflegen. Achten Sie dabei auf die Entlerungen und unterſuchen Sie den Vogel einmal, ob er gut bei Leibe iſt, alſo eine volle runde Bruſt hat oder ob er abgemagert erſcheint. Wenn die Entlerungen von normaler Beſchaffenheit (weiß und dunkelgrün, in Würſtchenform) ſind, ſo dürfen Sie dem Papagei auch täglich ein Scheibchen guten Apfel reichen; werden dieſelben danach aber dünn und wäſſerig, ſo laſſen Sie das Obſt fort. Sollten die Entlerungen jetzt überhaupt dünn, breiig oder ſchleimig, mißfarbig oder übelriechend ſein, ſo geben Sie garkein Trinkwaſſer, ſondern anſtatt deſſen täglich friſch gekochten dünnen reinen Haferſchleim.

◆

Zu unſerm Bilde.

Goffins Kakadu (Psittacus Goffini, *Fnsch.*) gehört zu den lieblichſten der kleinen Kakaduarten; er erſcheint an Stirn und Zügel weiß; Haubenfedern weiß, am Grunde roſa, unterſeits hellgelb; Schwingen an der Innenfahne gelblichweiß, unterſeits Innenfahne ſchwefelgelb; Schwanzfedern unterſeits an der Innenfahne gelb; ganzer übriger Körper weiß, an Kopf, Hals und Bruſt jede Feder mit roſafarbnem Flaum; Schnabel horngrauweiß, Wachshaut und Naſenlöcher mit weißen Federchen bedeckt; Augen ſchwarzbraun, dunkelbraun bis kirſchroth, breiter Augenkreis bläulichweiß; Füße ſchwärzlichgrau mit ſchwarzen Schildchen und Krallen. Seine Heimat erſtreckt ſich über Nordoſtauſtralien und die Salomonsinſeln. Im Freileben ſtimmt er mit den Verwandten überein. Er iſt ſelten im Handel, zeigt ſich in der Regel ſanft und friedlich und wird leicht zahm. Ueber ſeine Sprachbegabung iſt bisher wenig berichtet worden. Herr Apotheker Nagel zeigte auf der „Ornis“-Ausſtellung i. J. 1890 einen allerliebſten Vogel dieſer Art. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

F. Rejsek, Hamburg, Peterstr. 28

Specialität: Papageien u. Papageienkäfige

offerirt in schönsten, gesundesten Exemplaren: Junge **Graupapageien,** à 18 Mk., solche schon völlig acclimatis., schön flöt. u. anf. schön zu sprechen, 30—35 Mk., einige schon sehr viel sprech., Lieder sing. u. flöt., 65, 85, 100, 120 bis 150 Mk. **Junge Amazonen** im Prachtgefieder à 20 Mk., schon sehr viel sprech., Lieder sing. u. flöt., 80, 100, 120 bis 150 Mk. Grosse **Gelbhaubenkakadus,** zahm. 20 Mk., fingerzahm 25 Mk. **Molukkenkakadus** mit rother Haube 65 Mk., **1 sprechender** 100 Mk., 1 grosser **Alexandersittich,** sprech. 20 Mk., kleine **Alexandersittiche** St. 4 Mk., Par 6 Mk., junge, gelehrige, St. 5 Mk., Par 8 Mk., rothe **Cardinäle,** Männchen im Gesang, St. 8 Mk. **Amerikanische Spottdrosseln,** garantirte Männchen, St. 10—12 Mk., **Wellensittiche** Par 4 Mk., importirte Zuchtpare, Par 6 Mk. **Zwerg-Papageien** Par 2 Mk. Versandt nach überall. Lebende Ankunft garantirt. [562]

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [563]

Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos).

Feinste Kanariensänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [564]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.

Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

☛ 1898 erhielt mein Stamm Harzer **Kanarienvögel** 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr. **Paul Holzky,** Cöthen (Anhalt). [565

Betone ausdrücklich, es kommen nur

gesunde,

tadelloſe, kräftige Exemplare zum Verſandt, unter Garantie lebender Ankunft. [566]

Diamanttäubchen Zuchtpar 12.— ℳ,
Auſtr. Schopftäubchen Zchtp. 15. „
Gebirgsloris „ 30.— „
Gürtelgrasfinken „ 7.50 „
Spitzſchw. Gürtelamand. „ 16.— „
Grauedelſänger St. 3.50 ℳ

Wellenſittiche, prachtvolle, echt auſtraliſche, große, ſtarke, ſofort zur Brut ſchreitende Zuchtpare, P. 6 ℳ, 2 P. 11 ℳ, 3 P. 16 ℳ, 5 P. 25 ℳ, **Steinröthel,** Mch., 98er Wildfang, im vollen Geſang, vollſtändig zahm, 15 ℳ, **Chineſiſche Nachtigalen** (ſelten ſchön), extra ausgeſuchte feurige Doppelüberſchläger, 5 ℳ und von allen in Nr. 7 ausgebotenen Vogelarten noch Vorrath. Preisliſte über ſonſtigen Beſtand gratis. Reelle Bedienung.

Georg Brühl, Kötzſchenbroda.
Größtes Spezialgeſchäft dieſer Branche.
Wiederverkäufer erhalten Vorzugspreiſe.

Blaudrossel,

junger Herbſtvogel, 7 ℳ, **Amſel** 3 ℳ, beide gut i. Geſ. u. Gefied. Tauſche and. Vögel u. Mehlwürmer. [567]

M. Zierer, München, Parkſtr. 31 I.

Diamantfinken

à P. 9, **Gürtelgrasfinken** à P. 7½, **Aſtrilde, Orangebäcks, Atlasfinken, Blutſchnabel-, Orangeweber, Cordonbleus, Bandfinken** à P. 2, **kl. Elſterchen** à P. 2, **ſchwarzk. Nonnen** à P. 1½, **Gebirgslori** à P. 30, **Schuppenloris** à P. 36, **Bartmeiſen** à P. 6 ℳ, ſowie alle früher angezeigten Vogelarten. [568]

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

1898er Legehühner,

anerkannt tägl. Eierleger, große zuchtkräftige Thiere, ital. Raſſe, verſende in ſichtbarer Verpackung unter Garantie lebender und geſunder Ankunft, fracht- und zollfrei per Nachnahme. Je 1 Stamm = 11 Hühner und 1 Hahn ℳ 23. [569]

Hermann Neumann,
Monaſterzyska, M.-Oeſterr.

---

1 hochf. reinſch. echt. **Reitzugfink** m. Schnapp. giebt ab **Markert,** Scheibenberg, S. [570]

☛ Verſende ſüdungariſche ☚

Nachtigalen,

die beſte Raſſe, 1 Dtz. 21 ℳ, vom 15 April ab. Garantie für lebende Ankunft. Ferner verſende 1899er **Ameiſeneier** vom 5. April ab.

Frau Varga Agnes, Vogelſendung,
Lugos (Ungarn). [571]

Verkaufe gute Sänger:

1 amerik. Spottdrossel 12 ℳ,
1 Star 4 ℳ, **1 schw. Amsel** 5 ℳ,
1 Hänfling 3 ℳ, ff. Sänger.

H. Becker,
[572] **Egeln i. S.,** Breiteweg 66.

Harzer Kanarienvögel

(Truteſche Hohlroller), Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. l. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel, Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis** und **franko.** Weibchen deſſelb. Stamms 2,50 ℳ [573]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Feinſte

Edelroller!

mit den ſchönſten Touren, zart, tief und lang, noch ein Poſten ff. Frühbrut-Heckvögel, Dtz. 90 ℳ, Probevogel 10 ℳ, 14 Tage Probe gegen Nachnahme. [574]

A. H. Pütsch, Spezial-Züchterei,
Schönhauſen a. Elbe.

Hochfeine

Harz. Edelroller

(Stamm Trute),

welche vorzüglich in tief. gebog. u. geraden Hohlrollen, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Klingel, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 6, 8, 10, 12 u. 15 ℳ, Dtz. 60, 72, 84 und 96 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, verſende gegen Nachn. 6 Tage Probezeit. Nichtgefallendes tauſche um, ev. Betrag zurück. [575]

Herm. Voigt, Thale a. Harz.

Geſucht: **Granataſtrilde, Buntaſtrilde, kleine Kubafinken, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen, Weibchen rothköpf. Papageiamandinen.**

F. Beedzler, [576]
20, Norton Folgate, **London** (England).

Prima-Hohlroller,

Stamm mehrfach prämirt, flotte, lebhafte Sänger, bei Tag und Licht, gehen in Schockel, Hohlrolle, Knorren, Klingel und Dupfeifen, zu 7, 8, 10, 12, 15 ℳ, Zuchtweibchen 1,50 ℳ. Garantie f. leb. Ank. [577]

M. Franz, Kanarienzüchterei,
Pirna a. E.

Habe noch abzugeben:

Mozambikzeiſige (Afrika), goldgelb, fleißige Sänger, 3 ℳ per Stck.
Grauköpfige Zwergpapageien P. 5, 2 P. 9,40 ℳ. [578]
Wellenſittiche, Zuchtpar, ff. im Gefieder, P. 6 ℳ.

Grauer Kardinal

m. rother Haube, abgehörter Sänger, ff. im Gefieder, Stck. 5,50 ℳ.
Lachtauben, Zuchtpar, ſchön rufend, P. 3,50 ℳ.
Sonnenvögel oder **chineſiſche Nachtigalen,** abgehörte Männchen, St. 5 ℳ.
Blaue Hüttenſänger, Männchen 6,25, Weibchen 1,25 ℳ.
Blaue Indigovögel, himmelblau, ff. Sänger, 5,50 ℳ.
Zebrafinken, Zuchtpare, P. 5 ℳ.
ff. Kanarienvögel, je nach Geſang, v. 6—20 ℳ.

Heinrich Eckhoff,
Emden (Oſtfriesland), Bismarkſtr. 7.

Wer liefert unter voller Garantie für ſtreng reelle Bedienung **prima Sänger,** parweiſe, zwecks Anſiedelung in Park-Anlagen? Offerten geeigneter Vogelarten, auch Nachtigalen und Sproſſer, erbittet **Aug. Gottlieb.**
[579] **Hersfeld** (Heſſen-Naſſau).

Inhalt der Nr. 13.

Vogelhändler-Verband und Vogelſchutz!
Die Haltung, Wartung und Pflege, Fütterung auf billigſte und doch vollſtändig genügende Art, ſowie die Eingewöhnung der Wildfänge droſſelartiger Vögel (Fortſetzung).
Großvögel als Stubengenoſſen.
Vorfrühling.
Anfragen und Auskunft.
Brieſliche Mittheilungen.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag-früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Bitte um Beachtung!

Der Nr. 14 der „Gefiederten Welt“ legen wir wieder eine Extra-Prämie in Schwarzdruck,

Drei Hochgebirgsbürger

(Alpenmauerläufer, Alpenflühevogel, Schneehuhn) darſtellend, bei.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Käfige und Geräthſchaften.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [589]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [590]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[591] **R. Schröter, Elingen-Greußen.**

Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [592]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Ltr. 1 ℳ Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen, M.-Gladbach** 112.

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [593]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Neſteier von Milchglas,

per Dutzend 60 Pfennige, offerirt
Heinrich Nolte,
Glaswerke Marſchallshagen
[594] b. Lichtenau i. Weſtfalen.
P. S. Wiederverkäufer entſprechender Rabatt.

Betone ausdrücklich, es kommen nur

gesunde,

kräftige, tadelloſe, ſchöne Vögel zum Verſandt, unter Garantie lebender Ankunft und abſolut gewiſſenhafter Bedienung.

Diamanttäubchen,	Zuchtpar	12.—	ℳ
Auſt. Schopftauben,	„	15.—	„
Gebirgs-Loris, prachtvolle	„	30.—	„
Aurora-Aſtrilde,	„	12.—	„
Larven-Aſtrilde,	„	12.—	„
Gürtelgrasfinken, prachtv.	„	7.50	„
Spitzſchw. Gürtelamand.,	„	16.—	„
Olivengrüne Aſtrilde,	„	4.50	„
Braſil. blauhalſige Elſter,	St.	15.—	„
Singſittiche, ausgeſ. Mch.,	„	15.—	„
Nandayſittiche, in v. Pracht,	„	6.—	„
Pflaumenkopfſittiche, i. v. Pr.,	P.	16.—	„
Goldſtirnſittiche,	Par	8.50	„
Chin. Nachtigalen, gutſchlg.,	Mch.	4.—	„
Extra ausgeſ., feur. Doppelüberſchl.		5.—	„
do. Zuchtweibchen,	St.	1.80	„
Himmelblaue Hüttenſäng.,	Zchtp.	9.50	„
Blumenauſittiche, lern. ſprech.	St.	4.50	„
Chin. Zwergwachteln,	Zuchtpar	8.—	„
Schamadroſſeln, pr. Ia Sänger, bei mir abgemauſerte Exempl.,		36—40	„
Spottdroſſeln, abgeh. Ia Sg.,	St.	12.—	„
Halsbandſittiche, Mch., lern. ſpr.,	St.	4.50	„
Grauk. Zwergpapag.,	Par	2.50	„
Imp. Zebrafinken,	Zuchtpar	4.50	„
Jap. Mövchen, gelb- u. braunb.	P.	3.—	„

Wellenſittiche, prachtvolle, echt auſtraliſche, große, ſtarke, ſofort zur Brut ſchreitende Zuchtpare, P. 6 ℳ, 2 P. 11 ℳ, 3 P. 16 ℳ, 5 P. 25 ℳ.

Wellenſittiche, ausgſ., angp.	Zchtp.	4.—	„
Wellenſ.-Naturniſtkäſten,	Stück	1.50	„
Nymphenſittiche, imp.	Zuchtp.	10.50	„
Amerik. Seidenſchwänze,	Mch.	5.50	„
Braſil. Glanzſtare, Ia Säng.,		5.—	„
Madagaskarweber in Pracht,	St.	4.50	„
Indigofinken, Mch., in Pracht,	„	4.50	„
Safranfinken, (Goldkanarien)	„	8.50	„
do. Weibchen,	„	2.50	„
Feuerrothe Kardinäle, Ia Säng.,		7.50	„
do. Zuchtweibchen,		5.—	„
Rothgehäubte gr. Kardinäle, Mch.		5.—	„
Dominikaner-Kardinäle,	„	4.50	„
Schneewß. Reisfinken,	Zuchtpar	6.50	„
do. graue, prachtvoll,	„	1.50	„
Hartlaub-Zeiſige, Mch. 3,	Par	4.50	„
Etw. ſprech. Amazon., Ia Ia,		35—45	„
Gutſprech. Graupapageien		50—150	„
Auſtral. Sperbertäubch.,	Zuchtp.	4.—	„
Zahme weiße Mäuſe,	„	—.60	„
Kanarien, Ia tiefe Hohlroller,		7—20	„
Ia Hochedle Zuchtweibchen	St.	2.—	„

In richtigen, kräftigen Zuchtparen: Schmetterlingsfinken 2.50, Atlasfinken 2, Aſtrilde 2, kl. Elſterchen 2, Muskatfinken 2, Silberfaſänchen 2, Bandfinken 2, Helenafaſänchen 2, Paradiswittwen 3, Napoleonsweber 2, Orangeweber 2, Blutſchnabelweb. 2, Chineſerfinken 1.50, Tigerfinken 2.25 ℳ. Dieſe Senegalvögel, gemiſcht nach meiner Wahl in reizendem Sortiment, 5 P. 9 ℳ, 10 P. 16 ℳ, 20 P. 30 ℳ. [596]

Alle Sorten pr. Vogelfutter. Preisl. gratis.

Goldfiſche, pr. hochroth, abſolut haltbare Ware, kl. u. mittlere 5.50, große 8.50, drei Sort. gem., 7.50, per 100 franko m. Kanne.

Georg Brühl, Vogel-Exporthaus,
Kötzſchenbroda b. Dresden.
Größtes Spezialgeſchäft dieſer Branche.

Für alle Arten Vögel fertige ich fachgemäße

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Freimarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [595]

überhaupt keinen Vogel ſingen hören und wenn darauf aufmerkſam gemacht, ſie überhaupt nicht wiſſen, was für ein Vogel es iſt.

Wie mir ſo oft vorkommt, und ich zur Zeit jede Minute beweiſen kann, halten ſolche Nichtliebhaber einen Finkenſchlag, einen Lerchen- oder Grasmückengeſang, beſonders dieſen, meiſtens für Nachtigalenſchlag.

Gerade ſo geht es den Nichtblumenliebhabern; ſie werden nie eine ſchöne Blume im Wald, Feld oder Garten entdecken oder ſehen, und warum? Einfach, weil kein Intereſſe dafür da iſt, ſie gehen achtlos an der ſchönſten, ſeltenſten Blume vorüber. Es iſt alſo ganz berechtigt, was der Volksmund ſagt: „Die Blumen ſind nur für die Blumenliebhaber, ebenſo nur die Vögel für den Vogelliebhaber.“ Andere haben kein Verſtändniß dafür! Möge nur der Vogelmaſſenmord, für Gaumen und Putz, von den Regierungen ſtrengſtens unterdrückt werden, hingegen das Fangen der Vögel für Liebhaberzwecke vor dem Einparen auf dem Zug im Frühjahr und auf dem Zug im Herbſt ungehindert geſtattet und die Liebhaber in Ruhe gelaſſen werden, ſo wäre es genug des Vogelſchutzes! Weiter würden ſich die Liebhaber ihre Lieblinge ſchon ſelbſt ſchützen! Andere verſtehen es ſo nicht, wie ſchon geſagt, beim beſten Willen nicht; übrigens ſind durch die gegenwärtige Zeit und Kulturverhältniſſe die Vögel gezwungen, auszuwandern, andere Wohnſitze, wo ſie Ruhe, Schutz und Futter finden, aufzuſuchen, und an ſolchen Orten wird man über Verminderung unſerer Lieblinge nicht ſprechen können.

Jetzt wird jedes Geſträuch an Feldwegrändern umgehauen, der Stoppelacker nach der Ernte ſofort umgefahren, was früher nicht war, der Stoppel blieb ſtehen bis zum Frühjahr und bot, infolge der ausgefallenen Körner und des Unkrautſamens, den Geſiederten reichliche Nahrung; ferner wird von Seiten des Forſtmanns in einem wohl kultivirten Forſt kein Unterholz mehr geduldet; Buſchwald wird umgehauen und durch Nadelholz erſetzt, wodurch den Vögeln, beſonders den Erdſängern, die liebſten Wohnſitze und Futterkammern benommen ſind; auf den Landſtraßen werden die Ebereſchen-Bäume und Weiden, die man früher allgemein fand und außer Nahrung, beſonders im Winter, den Vögeln ſo reichlichen Schutz boten, umgehauen und durch ſpärliche, kümmerliche Obſtbäume erſetzt, die den Menſchen meiſt nicht viel und den Vögeln garnichts bieten!

Was war es früher für ein Vergnügen auf Landſtraßen zu gehen! Man ſah und hörte Grasmücken, Droſſeln, Spechte, Finken, überhaupt eine ganze Menge Vögel jeder Art rechts und links zur Seite der Straße, jetzt nicht einmal Sperlinge!! Es iſt Thatſache! Ferner, Schatten ſpendeten dieſe Bäume in reichlichem Maß dem müden Wanderer, was die kümmerlichen kleinen Obſtbäume nicht thun! Dieſe elenden Obſtbäume bieten eben nichts! Im Winter konnte man in den Straßen auf Ebereſchenbäumen: Amſeln, Gimpel und die bei uns ſo ſeltenen Seidenſchwänze beobachten, jetzt ſieht man hier letztere beiden Arten garnicht mehr, weil die Ebereſchen mangeln, aus keinem andern Grund!

Unſere Vögel ſind eben gezwungen auszuwandern! Noch ein Raubthier will ich erwähnen, welches die Vögel ſehr zehntet, das iſt die Hauskatze! Ihr wird das Morden in den lichten Beſtänden, wo jedes Neſt gleich zu entdecken iſt, ſehr leicht gemacht. Ich las jüngſt einen Aufſatz, in welchem jede Katze durchſchnittlich täglich der Plünderung wenigſtens eines Vogelneſtes geziehen wird und der Mann hat Recht! Wie oft ſehe ich Katzen auf unſerm Hof mit Rothſchwänzchen, Finken, Bachſtelzen und Schwalben im Maul ſtolziren; alle Neſter auf dem Hof werden nur von ihnen geplündert ſammt den Alten! Leider kann und darf ich dieſen Katzen nichts anthun, ſonſt wären ſie ſchon alle weg. (Schluß folgt.)

Die Haltung, Wartung und Pflege, Fütterung auf billigſte und doch vollſtändig genügende Art, ſowie die Eingewöhnung der Wildfänge droſſelartiger Vögel.

Von A. Reuter.

(Fortſetzung).

Endlich möchte ich noch die Miſteldroſſel anführen, deren eigentliches Weſen als Käfigvogel ich erſt hier im Schwarzwald kennen lernte und ſtudirte; man hat mir früher oft erzählt von dieſem Koloß aller Droſſeln, daß ſie nicht werth ſei, im Käfig gehalten zu werden, ſie ſei äußerſt wild und ſcheu, kaum zu zähmen. Ich möchte nun gerade das Gegentheil behaupten, denn ich hatte einige Jahre hintereinander mehrere Miſteldroſſeln gehalten, und bei allen die gleichen Beobachtungen gemacht; man glaubt wol die erſten par Tage, ſie ſtößt ſich den Kopf ein, da ſie mit aller Vehemenz flügelſchlagend in allen vier Ecken des Käfigs herumfährt, abwechſelnd auf den Sprunghölzern, einem Gummiball gleich, elaſtiſch in die Höhe ſchnellt, und dabei ihre ſignalartigen Töne hervorſtößt, zuerſt klingt es wie aus einer Trompete, wenn beim Manöver zum Sammeln geblaſen wird, dann geht es auf das Wirbeln einer Trommel über; wer dieſes noch nicht gehört hat, und in ein Zimmer kommt, woſelbſt ſich eine Miſteldroſſel befindet, der iſt im erſten Moment höchſt überraſcht von dieſen gewaltigen Tönen. Ihr Geſang, den ſie ebenfalls nicht vor dem zweiten Jahr hören läßt, iſt als ganz hübſch zu bezeichnen und paßt ſehr gut zu den beiden erſt angeführten Arten. Ihre ungeſtüme Wildheit legt ſie ſchon nach einigen Tagen ab, ſodaß man ſie in Kürze ganz aufdecken kann, und nach der erſten Mauſer iſt ſie vollſtändig fingerzahm, ſodaß ſie nicht nur die Würmer von der Hand nimmt, ſondern ſie läßt ſich ſogar bei langſamer Annäherung mit der Hand ſtreicheln, wenigſtens die

Jäger über den Haufen und geht nach Hauſe, als wenn nichts geſchehen wäre. Es wäre wirklich ſehr wünſchenswerth, wenn die Jugend, insbeſondere in ſolchen Gegenden, wo die Natur den Hang zu dieſem verwerflichen Treiben durch günſtige Lage bietet, von den Herren Geiſtlichen und Lehrern auf dieſe ſittenverderbende Beſchäftigung aufmerkſam gemacht und der ländlichen Jugend der Nutzen unſerer einheimiſchen Vögel eingeprägt werden würde, damit ſie endlich einmal den Wahn, der ſich vom Vater auf den Sohn fortpflanzt, aufgeben würden, ſolche Vögel, die ſich im Herbſt erlauben, einige Beren oder ſonſtiges Obſt zu verzehren, um ihren Hunger zu ſtillen, in die Acht zu erklären, denn in dieſer Jahreszeit, wo feuchtkalte Nebel die Gelände überziehen, bergen ſich die Kerbthiere im ſchützenden Mos und ſind die Vögel angewieſen, anderes Futter zu ſuchen. Dieſes Alles könnte verbeſſert werden durch Anſchaffung von naturgeſchichtlichen Werken, wie ſie uns durch eine unbeſtrittene erſte Autorität, wie von Herrn Dr. Ruß, geboten werden, nur je ein Exemplar für jede Gemeinde und dieſes könnten die Herren Geiſtlichen und die Herren Lehrer am beſten anregen und wöchentlich eine Lehrſtunde vonſeiten der Herren Lehrer könnte damit unſäglichen Nutzen ſtiften.

Die Futterbereitung für droſſelartige Vögel kann auf mannigfache Weiſe geſchehen und will ich hier ſolche Futterſtoffe anführen, die faſt Jedem zugänglich ſind. Das altherkömmlichſte Futter iſt gelbe Morrübe, auf dem Reibeiſen gerieben, mit altbackener Semmel ebenfalls gerieben und darunter gemiſcht und zwar ſoviel, daß das Futter mehr trocken als naß erſcheint, auch miſche man hierunter Mohnmehl, ſonſt werden die Exkremente des Vogels zu naß und verbreiten üblen Geruch, da dieſe Vögel ſehr viel zu ſich nehmen. Dieſes wird jedoch vermindert, wenn man gutes Fleiſch in klein zerhackten Stückchen oder gemahlen darunter miſcht. Es iſt auch unbedingt nöthig, dieſen Vögeln Fleiſch zu reichen, da ſie bei vegetabiliſcher Koſt allein ihren Hunger kaum zu ſtillen vermögen. Für dieſe Sorte Vögel hat man nun in dem zu reichenden Fleiſch eine große Auswahl; ſelbſt das billigſte iſt noch verwendbar. Hat man nur einen Vogel, ſo bleibt ja immer von der Mahlzeit ein Stückchen Fleiſch übrig, welches ausreichend iſt; hat man jedoch mehrere, ſo wird man gut thun, ſich nach billigerem Fleiſch umzuſehen, wenn anders man nicht das präparirte Droſſelfutter kaufen will oder kann. Es iſt in der Hauptſache egal, ob Rind-, Schweine-, Hammel-, Kalb- oder Pferdefleiſch gefüttert wird, wenn es nur weich gekocht iſt. Daſſelbe wird fein zerſchnitten und im Ofen gedörrt, hernach gemahlen oder im Mörſer zu Mehl geſtoßen, nochmals gedörrt, in Blechbüchſen oder Glasflaſchen gut verſchloſſen und an trockenem Orte aufbewahrt; hiervon täglich einen Kaffeelöffel voll pro Kopf unter das Miſchfutter gethan, iſt hinreichend. Die fettigen und häutigen Theile dörre man nicht mit, ſondern ſchneide ſie in kleine Stücke und gebe ſie den Vögeln friſch, ſie verdauen es leicht und es bekommt ihnen ſehr gut; man ſei alſo hierin nicht ſentimental und allzu ängſtlich, d. h. bei oben erwähnten Vögeln, bei den feineren Inſektenfreſſern iſt die Sache anders, worauf ich ſpäter noch zurückkommen werde. Nun will ich die Leber und das Herz von allen weiter oben erwähnten Vierfüßlern noch empfehlen, dieſes wird gekocht, auf dem Reibeiſen gerieben und entweder in friſchem Zuſtand verfüttert oder ebenſo behandelt wie das übrige Fleiſch, denn lange iſt es nicht friſch zu erhalten, es wird leicht muffig, man darf es deshalb nicht in tiefen Gefäßen und zugedeckt im friſchen Zuſtand aufbewahren, und ſollte es auch nur für ein par Tage ſein, ſondern man ſchütte es auf einen Teller oder auf reines Papier, ja nicht auf Zeitungen oder auf mit Tinte oder Bleiſtift beſchriebenes Papier, dies könnte gefährlich werden. Man gehe mit dem Vogelfutter überhaupt ſo reinlich um, als wie mit unſeren eigenen Speiſen, dann wird es wenig Verluſte geben.

(Schluß folgt).

Großvögel als Stubengenoſſen.

Von M. Dankler.

Schon ſeit uralten Zeiten fühlt ſich der Menſch zu den gefiederten Bewohnern des unendlichen Luftmeers hingezogen, und von den älteſten Kulturvölkern wiſſen wir, daß ſie bereits Vögel als Haus- und Stubengenoſſen hegten.

Die Auswahl der Arten, welche beſonders bevorzugt werden, wechſelt nach den Völkern und Zeiten, nach Geſchmack und Liebhaberei, wechſelt bis auf den heutigen Tag.

Der eine freut ſich am ſchmetternden Sange des Kanarienvogels, jener zieht den Schlag des Finken vor, dieſer ſchätzt den Flötenton der Amſel am höchſten und andere lieben die Vögel ihres muntern Treibens, ihres prachtvollen Gefieders wegen, ohne ſich viel um Geſang zu kümmern. Zu den letzteren gehöre ich ſelbſt. So gern ich dem Konzert der gefiederten Sänger im Walde lauſche, ſo gern ich auch vor einem Fenſter ſtehen bleibe, aus dem eine hübſche Vogelſtimme irgendwelcher Art erſchallt, ſo würde doch z. B. der andauernde, ſchmetternde Geſang eines Kanarienvogels mich aus dem Hauſe treiben. Für meine Umgebung ziehe ich daher Vögel, die nur zwitſchern oder einen ganz leiſen Geſang haben, den beſten Sängern vor.

Daher mag es auch kommen, daß ich faſt ſtets eine Anzahl größerer Vögel habe und hatte. Am liebſten waren mir ſtets ſolche, die ich frei in der Stube und mit geſtutzten Flügeln im eingefriedigten Hofe herum laufen laſſen konnte.

Schon in früher Jugend hatte ich faſt ſtets eine oder zwei Dohlen, die ſehr ſchnell zahm wurden und ſich ſo an das Haus gewöhnten, daß ſie frei umherlaufen durften. Sie ſchliefen im Heuloch einer Scheune;

Digitized by Google

aber morgens, wenn die Sonne aufging, ſaßen ſie bereits vor den Fenſtern und pickten ſo energiſch gegen die Scheiben, daß man froh war, ſchnell zu öffnen. Beide konnten ein par Worte ſprechen, ohne daß ſich jemand Mühe darum gegeben hatte. So rief einer: „Bod, Bod“ (Brot) und der andere ſagte für jeden Biſſen: „Dankir“ (danke). Beide aber ſchrien ſir „Spetzbov“ (Spitzbube), dies hatten ſie von einem alten Invaliden, der ihr erbitterter Feind war, weil ſie ihm mehrmals durch's Fenſter ein Stück Fleiſch geſtohlen und der deshalb ſtets über ſie ſchimpfte. Hörten die beiden Schelme nur ſeine Thür knarren, ſo ſaßen ſie ſofort auf einem naheſtehenden Kirſchbaum und ſobald der Alte heraustrat, begann das Gefecht. „Spetzbov, Spetzbov“ rief der eine, worauf der Geſcholtene ſofort nach Steinen griff und zu werfen begann. Dadurch aber wurde das Geſchrei in dem Baum noch größer und meiſtens mußte der Invalide das Feld räumen, ohne die beiden vertrieben zu haben, worauf helles Hohngeſchrei folgte. Anfangs hatten ſie viel von den Hühnern zu leiden, aber ſpäter ſetzten ſie ſich flügelſchlagend zur Wehr und erkämpften ſich die Gleichberechtigung.

Ein ſehr intereſſanter Stubengenoſſe iſt der Rabe. Ich hatte einen jungen Neſtvogel aufgezogen, welcher zu einer ganz ungewöhnlichen Größe und Stärke heranwuchs. Ernſter Natur, ſpazierte er graviſtätiſch durch alle Zimmer, über den Hof und durch den Garten. Er genoß vollſte Freiheit, ohne ſie jemals zu mißbrauchen. Er war der erſte Beherrſcher des Hühnerhofs, deſſen Autorität ſelbſt der Hahn anerkannte. Dafür ſtand aber auch alles, was da kreucht und fleucht unter ſeinem Schutz. Sobald der Warnungsſchrei des Hahns den Habicht verkündete, ſchoß er herbei und umkreiſte mit rauhem zornigem Geſchrei den Hof. Fremde Katzen und Hunde verfolgte er mit Eifer, wogegen er mit einem kleinen Teckel Freundſchaft ſchloß und ihn ſtundenweit begleitete. Auf Befehl, wozu ein einfacher Fingerzeig ausreichte, vertrieb er die Spatzen und Krähen von den Kirſchbäumen. Im Zimmer ſaß er ſtets auf der Fenſterſtange und ſah mit großem Intereſſe allen Arbeiten zu. Sehr merkwürdig war ſein Benehmen bei Fremdenbeſuch. Alle wurden kritiſch beſehen, wobei er gewöhnlich auf einer Stuhllehne Poſto faßte und mit ſchief gehaltenem Kopf und halbgeſchloſſenen Augen den Fremden fixirte. Wollte ein ſolcher ihn anfaſſen, ſo hackte er mit dem Schnabel, wogegen er ſich von Bekannten, die er ſchnell unterſchied und freudig begrüßte, gern ſtreicheln ließ. Wollte einer hinaus, ſo flog er auf's Thürſchloß und ſchrie. Die ſeltſamſten Stubengenoſſen aber hatte ein alter invalider Förſter, der in ſeinen letzten Jahren nur wenige Stunden der Nacht ſchlief und ſich nun fürchterlich langweilte. Alles, was ihn am Tag erfreute, ſchlief in der Nacht, ſelbſt ſein treuer Waldmann. Da kam ihm ein guter Einfall. Er zog ſich mehrere Eulen als Stubengenoſſen heran, wovon ein rieſenhafter Uhu bald ſein Liebling wurde, dem er ſpäter noch ein Weibchen zugeſellte. Wenn nun alles ſchlief, ſo begann in ſeiner Stube ein rühriges Leben, da flogen zuerſt die kleinen Eulen heraus und begannen durch's Zimmer zu huſchen und zu ſpielen. Erſt nach 10—11 Uhr kam auch Herr Uhu heraus, umſchwirrte mit ſeinen prächtigen, ſeidenweichen Schwingen ein par mal den Tiſch und ließ ſich dann vor dem alten Jäger nieder. Er war ein außerordentlich drolliger Kauz. Zuerſt begann große Wäſche, wobei er derart merkwürdige und lächerliche Stellungen einnahm, daß der alte Naturfreund nicht aus dem Lachen herauskam. Dabei gähnte er ſo gewaltig, wie ein ſchlaftrunkener Menſch am Morgen und reckte bald den rechten, bald den linken Flügel. Der brennenden Lampe ſchnitt er die gräulichſten Grimaſſen. Bald kugelte er ſich wie ein Ball zuſammen, dann puſtete er ſich dick auf, krachte mit dem Schnabel, riß die Augen weit auf, drückte ſie wieder halb zu u. drgl. mehr. Mit den kleineren Eulen, einigen Käuzchen und einer großen prächtigen Schleiereule lebte er in beſtem Einverſtändniß, während er jeden andern Vogel in mörderiſcher Weiſe angriff. An ſeinen Herrn zeigte er große Anhänglichkeit und konnte derſelbe ihm ſeine Nahrung aus dem Schnabel und den Krallen nehmen, was keinem andern zu rathen geweſen wäre. Auch ertrug er es, zwar puſtend und fauchend, daß dieſer ihm Tabaksdampf in's Geſicht blies, derſelbe Verſuch wäre aber einem zu Beſuch weilenden jungen Verwandten des Förſters bald theuer zu ſtehen gekommen. Derſelbe hatte den Uhu bald den ganzen Abend geneckt und gefiel ſich ſchließlich darin, dem Thier ſcharfen Zigarrendampf in's Geſicht zu blaſen. Aber nicht lange, plötzlich ſtieß das mächtige Thier ein lautes, grimmiges „Huu, hu“ aus, ging in die Höhe und ſtieß nun mit geöffnetem Schnabel, geſpreizten Federn, die mächtigen Krallen griffbereit, mit voller Stoßkraft gegen den Zänker. Mit einem Ruck riß der Förſter dieſen auf die Seite, doch hatte ein Fang des Thiers, welcher ihn nur ſtreifte, ihm eine beinahe fingerlange und einen halben Centimeter tiefe Wunde am Hinterkopf geriſſen. Sofort erneuerte dann das Thier den Angriff und ohne den Förſter würde es dem jungen Mann übel ergangen ſein, beſonders, wenn das wüthende Thier, welches im Zorn keine Furcht kennt, in ſein Geſicht gekommen wäre. Beim erſten Angriffsſchrei hatten ſich die kleinen Eulen, die ſonſt mit dem Uhu ſpielten, zitternd in die Winkel geflüchtet, ein Zeichen, daß ſie inſtinktiv die Gefährlichkeit des gereizten „Königs der Nacht“ kannten.

Von einem Vogelliebhaber wurden dem alten Mann hundert Mark für ſeinen Uhu geboten, aber der anſpruchsloſe Mann, der mit ſeinem Ruhegehalt mehr als zu viel hatte, hätte ihn für tauſend nicht verkauft. Nach ſeinem Tod hat ſein Sohn, ein Förſter im Oſtpreußiſchen, ihn mitgenommen, um dem treuen Freund ſeines Vaters das Gnadenbrot zu geben, ſo lange er lebe. Auch dieſer lehnte jeden Verkauf ab. Ich ſchrieb vor einem Jahr noch einmal an dieſen Sohn, doch war meine Adreſſe wol nicht richtig, ſodaß mein Brief als unbeſtellbar zurückkam. Die kleineren Eulen wurden freigelaſſen, doch niſteten ſie ſich alle in der Nähe des alten Heims ein und kamen ohne Furcht in's Innere, um Mäuſe und Inſekten wegzufangen. Der Uhu hatte außer Fleiſch nur wenig Nahrung genommen, am liebſten nahm er friſchgeſchoſſene Krähen.

Ein Bekannter, der ein kleines Verkaufsgeſchäft hatte, zog mehrere Jahre lang kleinere Vögel mit beſtem Erfolg. Obſchon Liebhaber mit Leib und Seele, brachte ſeine Zucht ihm auch bald klingende Erfolge, als plötzlich alle Vögel zu kränkeln begannen und viele eingingen. Er verkaufte, ſo ſchnell er konnte; die verkauften Vögel erholten ſich auch nach einigen Tagen, aber den Reſt fand er eines Morgens tot. Leider hatte er mir zu ſpät Beſcheid geſchickt, denn ich fand ſofort die Quelle des Uebels in einer riſſigen Kaminmauer, welche, wenn der Ofen einer unten wohnenden Familie geheizt wurde, größere Mengen des giftigen Kohlengaſes eintreten ließ. Kleinere Vögel wollte er nun nicht mehr halten, dagegen führte er nun einen längſt gehegten Plan aus, nämlich Raubvögel zu zähmen und als Material verſchaffte er ſich ein Pärchen junger Hühnerhabichte (Astur palumbarius), die er mit großer Sorgfalt aufzog. Dieſe Jungen waren beinahe leberfarben und mit dunklen Schaftſtellen geziert, ſahen aber einſtweilen allem andern als ſtolzen Falken ähnlich. Vor allem entwickelten ſie einen ungeheuren Appetit, der mit jedem Tag größer wurde und die Leiſtungsfähigkeit ihres Pflegers auf ſtarke Probe ſetzte. Da derſelbe keine anderen Vögel für ſie ſchießen konnte und wollte, ſo mußte für anderes Fleiſch geſorgt werden, aber ſchon nach einem halben Jahr waren ſie mit je einem Pfund Rindfleiſch pro Tag nicht geſättigt. Ihr ferneres Halten wurde nur dadurch ermöglicht, daß ihr Pfleger mit einem Metzger einen Vertrag ſchloß, wonach dieſer ihm für eine Kleinigkeit die beim Schlachten und Zubereiten des Fleiſchs entſtehenden, unbrauchbaren Abfälle überließ und ſo die Magenfrage löſte. Beide Thiere blieben vollſtändig zahm, doch ging das kleinere Männchen ſchon nach einem Jahr ein. Das Weibchen dagegen gedieh vortrefflich. Es folgte ſeinem Herrn auf Schritt und Tritt. Auf ſein Pfeifen kam es ſofort herbei und nahm das dargereichte Futter. Nach dem dritten Jahr nahm er dasſelbe ſogar mit in's Freie. Es flog auf's Dach, auf einen Baum, kam aber auf's Pfeifen wieder zurück. So ging es längere Zeit, bis das Thier eines Tags unvermuthet auf eine Taube ſtieß, ſie erwürgte und ſich damit auf's Dach zum Fraß niederließ. Da blieb jeder Befehl, jedes Pfeifen unbeachtet und nach gethaner Mahlzeit ſtieg der Habicht auf, umkreiſte einigemale das Haus und verſchwand. Der wilde Charakter war zum Durchbruch gekommen und die Liebe zur Freiheit hatte über die Anhänglichkeit an ſeinen Pfleger geſiegt. Höchſt intereſſant war eine Beobachtung, die dieſer Bekannte nach einem Jahr machte. Als er in ſeinem Garten ſaß, ſchoß plötzlich ein Habicht in einen nebenſtehenden Birnbaum, deſſen gelbes, ſcharfes Auge ihn anfunkelte und in welchem er ſeinen frühern Pflegling zu erkennen vermeinte. Er ſtieß ſeinen bekannten Pfiff aus und das Thier kam auch näher und näher. Als er aber dem Baum näher trat, flog der Habicht auf, flog aber nicht ſogleich davon, ſondern umkreiſte ihn in engerm und weiterm Bogen mehreremale, ſtieß ein helles „gü, gü, gi“ aus und ſtieg dann pfeilſchnell in die Luft. Herr S. war feſt überzeugt, daß dieſes ſein Habicht geweſen, der ihm in dieſer Weiſe gleichſam einen Beſuch abſtattete. Ein anderesmal umkreiſte ihn ein Habicht mit hellem Geſchrei auf offnem Felde und zwar ſo nahe, daß ihn faſt die Flügelſpitzen ſtreiften. Dieſe Anhänglichkeit hat ihn vollſtändig mit der Flucht ausgeſöhnt. Jetzt hat er ſich aus dem Norden ein Par echte Jagdfalken (Falco candicans) verſchrieben, die er gleichfalls zähmen und dann zur Jagd abrichten will. Allerdings wird er ſich da zuerſt nach einem Jagdſchein umſehen und ſich mit dem Jagdpächter ſeines Orts in Verbindung ſetzen müſſen. Dieſe par Beiſpiele, die ich noch vermehren könnte, zeigen, daß auch die Großvögel angenehme und intereſſante Geſellſchafter und Stubengenoſſen des Menſchen werden können, daß auch Raubvögel ſich jung leicht zähmen laſſen und ihrem Pfleger anhänglich werden. Für den Vogelfreund aber, dem dieſe zu groß ſind und der auch keine kleinen Sänger halten will, halte ich ein Par Stare für die angenehmſten Stubengenoſſen; doch entwickeln dieſe Thiere ihr unterhaltendes Weſen am beſten, wenn ſie frei in der Stube umherlaufen. Dann aber ſind es auch unverwüſtliche, ſtets luſtige, ſtets bewegliche und amüſante Unterhalter.

Vorfrühling.

Plauderei von L. Aelbert.

„Daß ich wieder ſingen und jauchzen kann,
Daß alle Lieder gerathen,
Verdank ich nur dem Streifen im Tann,
Den ſtillen Hochwaldpfaden.“

So gab einſt der große Scheffel ſeinen Dankbarkeitsgefühlen gegen den Wald Ausdruck, der ihm nach ſtürmiſchen Tagen den Seelenfrieden wiedergegeben hatte. Wieviele Menſchen, die unter rauſchenden Eichen das gefunden haben, was ſie ſuchten und in den ſtrahlenden Sälen der großen Geſellſchaft nicht finden konnten, mögen dem Meiſter beim Leſen obiger Verſe nachgefühlt haben! Denn es gibt, Gott ſei Dank, trotz der immer wachſenden Zahl der aufreibenden Großſtadtsgenüſſe, immer noch Menſchen, die ſich noch an der großen, freien Gottes-Natur zu freuen und zu erquicken vermögen. Daß ein derartig dankbarer Genuß, der, ohne ſchlimme Nachwirkungen im Gefolge zu haben, dem Menſchen ſo unvergleichlich ſchöne Stunden zu bereiten vermag, verhältnißmäßig ſo wenig gewürdigt wird, iſt eben nur in Berückſichtigung der gegenwärtigen Verhältniſſe zu verſtehen. Derjenige jedoch, deſſen Gemüth empfänglich iſt für die großen und kleinen Vorgänge in der ſchönen Natur, zehrt zeitlebens davon. Ihn faßt es bei dem erſten Frühlingszug, der Wald und Feld durchzieht, mit magiſcher Gewalt; er muß hinaus; ſei es, die Auferſtehung des Ganzen zu bewundern, ſei es, um als Vogelfreund zu beobachten, wie das Frühlingsahnen bei ſeinen Lieblingen die kleine Bruſt durchbebt und ſich bei den verſchiedenen Arten verſchieden offenbart. Alljährlich wiederholt ſich dieſes großartige Erwachen der Thier- und Pflanzenwelt, und beſonders der Vogelfreund iſt es, der eben dann am beſten Gelegenheit hat, ſeine ſchöne Liebhaberei in ihren Glanzpunkten zu bewundern.

Dies letztre war auch die Abſicht des Erzählers, als er mit einem Geſinnungsgenoſſen an einem warmen Märztage dieſes Jahres aus dem lärmenden Straßengetriebe hinaus und den Schonplätzen der im Entſtehen begriffenen Frühlingspracht zuwanderte. Die Märzſonne ſchien eigentlich wärmer, als es dem Wanderer lieb ſein mochte, auf ſeinen Weg, und an den mit Gras bewachſenen Böſchungen zirpten Grillen und Heuſchrecken um die Wette. Aehnliche Töne entlockte die Frühlingsluft den Grauammern, die in den Uferweiden der „Düſſelthaler Wieſen“ miteinander wetteiferten. Die wunderbaren Bewegungen, welche dieſer am Niederrhein häufige Vogel zur Zeit der Parung zeigt, vermögen wol das Auge des Beobachters zu feſſeln. Auch heute leiſtete ein beſonders erregtes Männchen in dieſer Beziehung wieder Auffälliges. Es „ſchnickerte“ zuerſt auf der Weide ſitzend ſeine Strofen, die man, wenn man ſie einmal gehört hat, nur ſchwerlich vergeſſen wird, verließ dann ſeinen Sitz, um den Baum mit aufgeblähtem Gefieder einigemal zu umkreiſen und flog hierauf zu einer von der erſtgenannten etwa zehn Meter entfernten Weide hinüber, wobei es ein Bein ſchlaff vom Körper herunterhängen ließ, was ihm ein merkwürdiges Ausſehen verlieh, das ſchlecht zu dem Ernſt und der Würde paßte, womit es um die Gunſt des Weibchens buhlte. Sein vornehmer Verwandter hingegen, der Goldammer, brachte ſeine Werbung in vollendeter Wichtigkeit vor; hoch von dem Gipfel einer Pappel klang ſeine echt ſommerliche Weiſe hernieder und machte den Lauſcher faſt vergeſſen, daß eben erſt die Vorboten des Frühlings erſchienen waren. Die beiden beſcheidenen Ammerlieder traten jedoch vor dem jubelnden Geſang einer himmelanſteigenden Feldlerche in den Hintergrund; freudeſprudelnd und klar wie ein Glockenſpiel hoben die Strofen dieſer Sängerfürſtin die Reize des lachenden Lenztages. So hatten wir unter wechſelnden Eindrücken den Waldesrand erreicht, wo die Kohlmeiſen uns mit ihrem Frühjahrsruf begrüßten, den der Volksmund treffend zu überſetzen verſtanden hat durch die Worte „Nix in't Für“, d. h. Nichts in's Feuer (weil die Sonnenwärme jetzt das Feuer erſetzen könne).

Kurze Zeit darauf umfingen die Waldrieſen uns mit ihrem mächtigen Geäſt, und nur hie und da fand ein Sonnenſtrahl den Weg durch die Tannenzweige und tänzelte, ohne ein feſtes Bild erwirken zu können, auf dem Boden umher. Traute Waldeinſamkeit hatte uns aufgenommen. Hier hatte die Frühlingsgöttin noch nicht in dem Maße walten können wie draußen in Feld und Wieſe. Nur vereinzelt und beſcheiden ſchauten grüne Blatt- oder Halmſpitzchen hervor, wurden aber deshalb umſo beſſer gewürdigt, jedes einzelne ein Stück Poeſie des anrückenden Lenzes.

Auch unſeren gefiederten Sängern hatte ſich der allenthalben zu bemerkende Drang nach Leben, nach Freude und Luſt mitgetheilt. Melodiſch und ſanft, wie ein murmelndes Bächlein und doch ſo haſtig ſandte ein Rothkehlchen ſein Lied durch den weiten Forſt. Dazwiſchen erſchallte Meiſen- und Zeiſigſchlag und aus weiter Ferne, kaum hörbar, jubelnder Lerchengeſang. Doch dies alles wurde zuweilen übertönt von den herrlichen, markigen Strofen feuriger Edelfinken, dieſer, wegen ihrer Allgemeinheit oft zu wenig gewürdigten Sänger. Sie bildeten eine förmliche Kette, die ſich weit durch den Wald dahinzog; der eine wetteiferte mit dem andern, jedoch zu jenen der Parung oft vorausgehenden heftigen Raufereien kam es in unſerm Beiſein nicht. An einer Stelle fand das energiſche „würzgebühr“ eines Finken Fortſetzung in dem lauten, fröhlichen Lied eines Zaunkönigs, der die nach dem „würzgebühr“ entſtehende kurze Pauſe ſchleunigſt dazu benutzte, die Welt von ſeiner Gegenwart zu überzeugen. Leider mußten wir die Wahrnehmung machen, daß die ſich auf Wald und Feld niederſenkenden Abendſchatten das lebensfrohe Getriebe unſerer Gefiederten immer mehr lähmten, und als wir ſchließlich an einer größern, grasbewachſenen Lichtung ankamen, vernahmen wir nichts mehr, als den eigenartigen Geſang eines hier anſäſſigen ſchwarzkehligen Wieſenſchmätzers. Er machte zwar der letzten Hälfte ſeines Namens beſondre Ehre, jedoch der Vogelfreund nimmt auf ſeinen Spaziergängen die Vögel wie ſie kommen, und weiß jeden in ſeiner Art zu ſchätzen. Aber auch der Schmätzer verſtummte bald. Dann eine kurze Zeit tiefe Stille. Da ertönt in dem Tannengehölz laut die Warnung einer Amſel. Sichernd tritt ein Rehbock auf die Lichtung, verhofft nach allen Seiten und gibt ſich dann ruhig der Aeſung hin, die ihn unſeren Blicken allmählich wieder entzieht. Jetzt regt ſich nichts mehr. „Ueber allen Gipfeln iſt Ruh.“

Nur zu früh war die Dämmerung hereingebrochen, und wir rüſteten uns zum Heimweg. Doch halt, was war das? Ein ſanfter uns wohlbekannter lieber Flötenton ließ uns lauſchen. „Last not least“ flüſterte mein Begleiter und wir nahmen auf dem Stamm einer gefällten Föhre Platz, um auch noch dieſes Abendlied der Amſel mitzunehmen. Die letzten Strahlen der ſinkenden Sonne ſpielten in den Wipfeln der Tannen, und kein Lüftchen regte ſich weit und breit. Die dunkle, ſchlanke Geſtalt der Schwarzdroſſel auf der Tannenſpitze hob ſich ſcharf von dem noch in tiefem Blau erſtrahlenden Himmel ab, und klar ſchlug ihr bezauberndes Lied an unſer Ohr, bald rein und feierlich wie ein Choral, bald ſprudelnd vor Lenzes-Seligkeit und Luſt und dann wieder gedämpft, ein Schlummerlied für die ſich mehr und mehr zur Ruhe rüſtende Natur. Selten habe ich Töne aus Vogelkehlen ſo andächtig und bewundernd gelauſcht, wie denen der Amſel in der Dämmerung jenes Frühlingsabends. Erſt als die letzten Strofen des wundervollen Droſſelliedes verklungen waren und nichts mehr die hehre Ruhe der anbrechenden Frühlingsnacht unterbrach, merkten wir, daß uns die Dunkelheit im Forſt überraſcht hatte. „Die iſt Meiſterin unter ihresgleichen“, meinte mein Freund. Ich nickte, und ſchweigend, noch unter dem Eindruck dieſes letzten und ſchönſten Genuſſes, traten wir den Heimweg an.

Anfragen u. Auskunft

Herrn F. Figel: 1. Die von Ihnen genannten 3 Pärchen Prachtfinken nebſt je ein Par Paradiswidas und Maskenweber können Sie in den Geſellſchaftskäfig von den angegebenen Größenverhältniſſe ſetzen. 2. Die genannte Thierhandlung können wir nicht mit gutem Gewiſſen empfehlen. 3. Wenn Ihre beiden Sonnenvögel Männchen ſind und fleißig ſingen ſollen, ſo müſſen Sie jedes für ſich im beſonderen Käfig halten. 4. Das Futter für Sonnenvögel muß in Folgendem beſtehen: Gemiſch aus friſchen oder getrockneten Ameiſenpuppen oder Weißwurm, überrieben mit friſcher Möre und altbacknem Weiß- oder Eierbrot, dazu Mehlwürmer (für gewöhnlich täglich 2—3 Stück, zur Mauſer und Geſangszeit 5—8 Stück oder dementſprechend andere Kerbthiere, kleine Fliegen, Spinnen, Engerlinge, Schmetterlinge, Schaben, Heuſchrecken, auch kleine Regenwürmer u. a. Außerdem muß auch immer etwas erweichtes, gut ausgedrücktes Eierbrot, friſcher Quargkäſe, etwas gute Frucht je nach der Jahreszeit, Grünkraut (Doldenrieſche oder Vogelmiere) und auch Sämereien: Hirſe, Kanarien- und Mohnſamen) geboten werden. 5. Der rothe Kardinal muß bekommen: Hanf, Hafer und ungehülſten Reis, und zur Zugabe: hartgekochtes Ei und 2—4 Mehlwürmer täglich. Dem einzelnen Sänger gibt man dazu auch ſüße Frucht und Grünkraut, halbreife Sämereien, namentlich allerlei Kerbthiere und wenig Eierbrot.

Herrn K. J. Schmidt: Die Gabe von phosphorſaurem Kalk zur Eiſchalenbildung kann ich nach meinen Erfahrungen nicht empfehlen. Ich rathe vielmehr, daß Sie Ihren Heckvögeln ein Stück Sepia oder Tintenfiſchbein oder ein Stück Kalk von alten Wänden oder Kreide bieten.

Herrn Göbel: 1. Leſen Sie die Auskunft an Herrn Figel, ſo werden Sie erſehen, daß Sie Ihre Sonnenvögel nicht ganz richtig gefüttert haben. Dies allein kann jedoch nicht die Urſache des ſo ſchnellen Eingehens der Vögel geweſen, ſondern dieſelben müſſen bereits krankhaft in Ihren Beſitz gelangt oder bei Ihnen noch anderen ſchädlichen Einflüſſen ausgeſetzt geweſen ſein. Sie hätten mir einen derſelben zur Unterſuchung zuſenden ſollen. 2. Unter den amerikaniſchen Spottdroſſeln gibt es vorzügliche, aber auch minder gute Sänger. 3. Die Verpflegung aller Weichfutterfreſſer iſt ſchwieriger als die der Körnerfreſſer, ſowol hinſichtlich der Zubereitung des Futters als auch der Gefahr, daß daſſelbe leicht in Verderbniß übergeht und dann den Vögeln gefährlich werden würde, wenn man es nicht beizeiten entfernt und durch friſches erſetzt. 4. Die von Ihnen genannte Vogelhandlung in Wien iſt reell. 5. Der rothe Kardinal badet in der Regel gern; das Badewaſſer muß natürlich, wie das Trinkwaſſer, immer ſtubenwarm gegeben werden. 6. Die Spottdroſſel ſingt bei uns in der Regel vom Mai bis zur Mauſer zu Ende September, bei beſter Pflege ſchon vom Februar oder ſogar bereits von Weihnachten an, alſo außer der Mauſerzeit das ganze Jahr hindurch. 7. Mit der Geſangszeit des Sproſſers verhält es ſich ähnlich. 8. Da Sie ja mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und II beſitzen, ſo können Sie ſich leicht inbetreff aller von Ihnen geſtellten Fragen noch genauer unterrichten.

Herrn Anton Klein: Den mit einer Ausſchlags- (Pilz-) Krankheit behafteten Goldfiſch müſſen Sie von den übrigen Bewohnern des Aquarium abſondern und dafür ſorgen, daß derſelbe ſich ſtets in reinem (filtrirtem, dem Aquarium entnommenen) Waſſer befinde. Vielfach iſt auch das Bepinſeln der kranken Stellen mit fünfprozentiger Karbollöſung oder mit einer ſchwachen Löſung von Pottaſche und Soda mit Erfolg angewendet worden. Der bekannte Fiſchzüchter Matte brachte einen derartig erkrankten Fiſch an einen dunklen Standort in einem Aquarium, das reichlich mit Hornkraut beſetzt war; er behauptete, man müſſe dem Pilz das Licht entziehen, um ihn zu ertöten.

Herrn Joſ. Porzelt: 1. Das Sämereien-Gemiſch, welches Sie bisher für die Singſittiche gegeben haben, iſt gut. Vor zu reichlicher Hanffütterung warne ich. 2. Daſſelbe Gemiſch, ohne den Hanf, eignet ſich gut für Wellenſittiche. 3. Die Fütterung für Reisvögel iſt richtig.



Briefliche Mittheilungen

Frau Oberſt von **Schweizerbarth** ſchreibt mir Folgendes über ein Männchen **gemeiner Organiſt** (Euphonia violacea, *L.*), das Sie gewiß ſehr intereſſiren wird, und jedenfalls auch den Leſerkreis Ihrer „Gefiederten Welt“. „Ich bekam das Männchen vor 2 Jahren direkt von einem Privaten, der es von Braſilien einführte. Der Vogel iſt ungemein lebhaft und prachtvoll im Gefieder und ſo brütluſtig, daß er ſich ein Neſtchen baute und einen Tigerfinken zwang, mit ihm dort zu hauſen; auch wollte er ihn ätzen und erſt als meine Dioch wieder Junge hatten, ließ er den Tigerfink in Ruh ließ und nicht nach, bis die Weber ihm die Aufzucht überließen und nun ſind ſeine Ziehkinder gierig auf Honig und Früchte, aus denen ſich die alten Blutſchnäbel garnichts machen. Meine **Hüttenſänger** haben dreimal gebrütet, 12 Eier, es iſt ein wunderliebes Par. Von zwei Par Wellenſittichen hatte ich 30 Junge. **Chr. Hagenbeck.**

... Hier oben im Gebirge zu Pungelſcheid angelangt, habe ich am einſamen Gebirgsbach inmitten der prächtigen Winterlandſchaft ſoeben eine luſtig ſingende Waſſeramſel angetroffen. Zu Anfang Januar waren in unſeren ſauerländiſchen Bergen auch Seidenſchwänze. W. **Hennemann**, Lehrer.

◆

Zu unſerm Bilde.

Als Ergänzung zu der Schilderung des Herrn Albert Rettich in Nr. 12 des Jahrs bringen wir heute die Abbildung des reingelben Yorkſhire-Kanarienvogels, der früher in England ſehr beliebt war und auch von Zeit zu Zeit nach Deutſchland herübergebracht wurde und hier gern Abnehmer fand. Yorkſhireraſſe unterſcheidet ſich vor allen andern durch den überaus ſchlanken Körper. Sie hat die Eigenthümlichkeit, bei ſonſt reingelber oder reinfahler Farbe nur folgende dunkle Abzeichen zu tragen. Von der Schnabelſperre über beide Augen muß ein dunkler Strich ſein. Iſt er 1 cm lang und einigermaßen breit, ſo iſt der Strich mehr beliebt, als ein kürzerer oder feinerer. Erweitert ſich der Strich hinten und wird zum Fleck oder ſind beide ungleichmäßig in Länge oder Dicke, ſo iſt der Träger zwar noch als Zuchtvogel nützlich, aber nicht zum Ausſtellen geeignet. Außer dieſem Schnabelſtrich muß dieſe Spielart von Yorkſhires noch geſchwälbte Flügel haben, genau den römiſchen Buchſtaben V darſtellend. Dieſe dunklen Federn dürfen nun nicht zu tief oder zu hoch auf dem Rücken ſitzen. Wenigſtens fünf der längeren Schwungfedern ſollten hell ſein und dann eine ähnliche Anzahl dunkel; damit wird der Buchſtabe ſchön hergeſtellt. Wie ſchwer dies iſt, was für unſägliche Geduld dazu gehört, einige ganz genau gleichmäßig gezeichnete Stücke zu züchten, die in der Meinung der Preisrichter der Auszeichnung würdig ſind, iſt ſchwer zu faſſen. Die Ruderfedern ſind mitunter eine weitre Zierde, wenn auf jeder Seite eine gleiche Anzahl auch dunkel kommt, doch fällt letztrer Umſtand beim Richten weniger in die Wagſchale, denn die Augenſtriche ſind am allerſchwerſten herzuſtellen. Welche Täuſchung muß es ſein, wenn ein Züchter eine Brut ſchöner Yorkſhires ausfliegen ſieht und gerade der, welcher die ſchönſte Flügel- und Schwanzzeichnung zeigt, hat ein halb- oder ungezeichnetes Auge! Oder bei den ſchönſten Augenſtrichen iſt ein Flügel zu leicht, der andre zu ſchwer gezeichnet. Wie oft kommt es vor, daß die Körperfedern auch einige dunkle zeigen, daß die Wurzel der Ruderfedern dunkel eingefaßt iſt. Jahrelanges Studium, Geduld und großer Geldaufwand bringen den eifrigen Züchter beinahe an's Ziel, aber durch ein widerwärtiges Spiel der Natur iſt das vollſtändige Erreichen des Wunſches vereitelt.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.



Vogelkäfige

aller Art,
Zuchtvolieren,
Niſtutenſilien,
unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [597]

Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!

Arthur Herrmann & Luther, Oschatz i. S.

Futtermittel.

Drosselfutter,

extra ℳ 1,20 per Ko., Ia ℳ 1 per Ko. **Nachtigalenfutter** Ko. ℳ 1,50, Packet 50 ₰; ſämmtliche Vogelfutter in geeignet. Qualitäten, für Finken, Lerchen, Meiſen, Exoten, Papageien, Prachtfinken ꝛc. Ko. 60 ₰. Preisliſten über Vogelbauer mit 100 Abbild. an Beſteller gratis. [598]

E. Göller, Köln a. Rhein.

Mehlwürmer, große Futterware, ganz rein, Liter 5 ℳ, Kilo 8 ℳ, Verpack. frei. [599]

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.

Muska, hochf. 98er, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 4½, à Ko. 8.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 4, 5 Ko. 19.

Bisquit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,60
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,—
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,—
do. algeriſche	„ „ „ „	2,—
do. indiſche	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	4,—
Ossa Sepia (Fiſchſchuppe)	100 St.	3½, Dtz. 45 ₰.

[600]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Mehlwurmzüchterei

empfiehlt prima Würmer ℔ 4,— ℳ [601]

F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

Mehlwürmer,

rein reell gemeſſen, Ltr. 5,— ℳ, Kilo 8,— ℳ, 1000 Stck. 1,60 ℳ **Anweiſung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer** 30 ₰, **Ameiſeneier**, nur feinſte, ſtaubfreie Ware, pr. Ltr. 80 ₰, Kilo 3,75, 10 Ltr. 7 ℳ, **Weißwurm** feinſter Beſchaffenheit, Ltr. 80 ₰, **Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln, Neſter, Samen** u. a. Preisliſte poſtfrei. [602]

Theodor Frank, Barmen.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen **inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel** pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpaketen franko, garantirt ſandfrei. [603]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Mehlwürmer, 1000 St. geg. Einſendung v. 1,50 ℳ in Marken, verſendet [604]

D. Waschinsky, Berlin NW., Wilsnackerſtr. 63.

Ja! Ja! es ist wahr!

Ich verſende nur ſaubere Ware. [605]

Futter für: **Prachtfinken, Reisfinken, Kardinäle, Sittiche, Papageien** (große), **Dompfaff** und **Waldvögel** (als Hänſling, Stiglitz, Zeiſig, Fink) je 5 Ko. 2 ℳ. Bei Entnahme von 3 Poſtkolli füge ich eine ſelbſtthätige Trinkflaſche, ſehr praktiſch für Vögel, **gratis bei.**

H. P. Lange, Samenhdl., **Gottesberg** i. Schl.

Vögel.

Harzer Edelroller,

tieftourenreich u. weltbekannt, liefere überall hin. Der Preis richtet ſich nach Geſangsleiſtung, à St. 7, 8, 10, 12, 15 bis 30 ℳ. Verſandt unter Nachnahme. Garantie für geſundes Ankommen. [606]

Joh. Wink, Dresden-A., Marſchallſtr. 87.

Züchterei hochedler Kanarien, gegr. 1885. **Goldene u. ſilberne Medaillen. Viele Dankſchreiben.**

Rothe Dompfaffen

(Spezialität), **mundgelernt,** auf **Kommando** Lieder ſchön wie ein Menſch pfeifend. Verſand unter Garantie, wie bekannt, reell. [607]

Maler **Roth, Schönfeld** b. Carlsbad.

!!Kanarienvögel!!

Meine weltbekannten, tieftourenreichſten 1898er Sänger ſind in großartigſter Auswahl alle wieder geſangsreif u. beſtens ſortirt. Liefere garantirt reell überallhin, ſteigend nur nach Geſangsgüte, à Stück 10, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ, Nachnahme oder Betrag vorher. [609]

Julius Häger,
St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864. Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Offerire in geſunden Exemplaren:

Dunkelrothe Araras,

Gebirgslori	Par	28	ℳ
Pennant-Sittiche	„	28	„
Roſella- „	„	20	„
Sing- „	„	26	„
Roſenkopfpapageien	„	25	„
Afrikaniſche Glanzſtare (Sturnus chalybaeus)	à	24	ℳ
Langſchwänzige afrikaniſche Glanzſtare	„	24	„
Chin. Zwergwachteln	Par	8	„
Purpur-Tangaren	à	16	„

[610] u. ſ. w.

H. Fockelmann,
Hamburg, Herrengraben 1.

S. Risius, Bremerhaven

empfiehlt: **Sonnenaſtrilde** Mnch. 14 ℳ, **Spitzſchwanz-Gürtelamandinen** P. 16 ℳ, **Zebrafinken,** imp., P. 5 ℳ, **grüne Kardinäle** P. 20 ℳ, **rothe dto.** P. 15 ℳ, **graue rothgehäubte dto.** St. 5 ℳ, **Sonnenvögel** Mnch. 5 ℳ, **Sperlingspapag.** Wbch. 4 ℳ, **Wellenſittiche,** imp., P. 7 ℳ, **Nymphenſittiche** Wbch. 6 ℳ, **Roſellas** P. 25 ℳ, **Gebirgsloris** Wbch., zahm, 20 ℳ, **Königsſittiche,** prachtvoll ausgefärbt, P. 60 u. 65 ℳ, große **Alexanderſittiche** P. 25 ℳ, kleine **dto.** St. 4 ℳ, **Mönchsſittiche** St. 4 ℳ, **Grasſittiche** P. 8 ℳ

Goldflügel-Arara,

zahm, etwas ſprechend, 85 ℳ, große **Gelbhaubenkakadus,** fingerz., 25 ℳ, kleiner **dto.,** etwas ſprechend, zahm, 25 ℳ, prachtvolle **Inkakakadus,** abgemauſerte Vögel, St. 35 ℳ, **Nacktaugenkakadu** 25 ℳ, **Graupapagei,** gut ſprechend, 85 ℳ, junge **dto.,** gut eingewöhnt, anf. z. ſprechen, St. 35 ℳ, prachtvoller **Doppelgelbkopf** 40 ℳ, **Surinam,** ſehr zahm u. ſprechend, 45 ℳ, **rother Halmahera** (Edelpapagei), überwintert und zahm, 40 ℳ, **Blauſtirn-Amazonen** 25—60 ℳ je nach Leiſtung, 1 **dto.,** ſingt 8 Lieder in Worten, ſpricht ſehr viel in Sätzen, lernt außergewöhnlich leicht, 275 ℳ. Sprachverzeichniß gegen 10 ₰ Marke. [611]

Nur eine Annonce!

1 gelernte **Amſel,** 4 St. w. ein Menſch fleiß. pfeifend, nur 10 ℳ, dopp. Werth, 1 fleiß. ſing. **Lerche** nur 5 ℳ, 97er Wildf., beide vollſt. im Geſang, 2 P. **Dompfaffen,** tadellos, à P. 2,50 ℳ, 1 P. **do.,** im Geſ. etw. beſtß., 1,50 ℳ, 1 **Zeiſig,** 1 **Spötter,** 1 **Kernbeißer** à 80 ₰, 1 **Singammer,** 1 **Grünhänfling,** 1 **Blaumüller,** 1 **Kohlmeiſe** à 50 ₰. Verp. Selbſtkoſtenpreis. Verk. nur, weil Kanarien zücht. will. Anfr. Rückporto erb., bei [612]

P. Pella, Schedewitz b. Zwickau i. S.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

Geſetzl. geſchützt.

„Insectiverous“,

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die

Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Geſetzl. geſchützt.

Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [608]

Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Anzeigen.

vollſtändig unzerbrechliches
Vogelbadehaus.

No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.—

No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50

Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.—**

=== *Spezial-Artikel* ===

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

☞ Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige** für **Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc.** mit **sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [613]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Zeiſige 1,25 ℳ, **Alpenſtiglitze** 1,80 ℳ, **Rothhänflinge** 2 ℳ, **rothe Kreuzſchnäbel** 1,50 ℳ, **Schneeammern** 3 ℳ, **Kappenammern** 3 ℳ, **ff. Haidelerchen** 4 ℳ, auch Weibchen, **Rothkehlchen** 1,50 ℳ, **Blaukehlchen** 5 ℳ, **ff. Amerik. Spottdroſſeln** 12 ℳ, **Sonnenvögel** 5—6 ℳ, **Importirte Zebrafinken**, Par 5 ℳ, **Imp. Wellenſittiche**, Par 7—8,50 ℳ, **Japaniſche Mövchen**, Par 4 ℳ, **Sperbertäubchen, Grünflügeltauben, Senegalfinken, Reisfinken, graue und weiße Weber, Papageien, Kanarienvögel, Eichhörnchen. Specialitäten in Vogelfutter** ꝛc. ꝛc. Alles ſichtbar verpackt. Preisliſte franko.

Jos. Beck's Vogelverſandtgeſchäft,
[614] **Stuttgart,** Telephon Nr. 4104.

▬ Prima 2 Lieder pfeifende ▬

Dompfaffen

à 30—40 ℳ offerirt u. Garantie u. 4 Tage Probe [615]

K. Diehl III,
Angersbach, Oberheſſen.

Empf.: Rothe Dompfaffen à Hahn 3, Zuchtp. 4,50, Erlenzeiſige à 1,25, hochrothe Kreuzſchnäbel u. Edelfinken à 1,50, zahme Perlſtare u. 4 St. Seidenſchwänze à St. 2, 1,0 Rothkehlchen, ff. Sänger 2, reinweiße Lachtauben Zuchtpar 4,50, dito gelbe Zuchtpare 2, 1,0 laut ſchlag. Amſel 5, Mehlwürmer, ff. Ware, à Pfd. 3,50 ℳ. Garantie für reelle Ware u. gute Ank. [616]

Aug. Schultz, Breslau I, Altbüßerſtr. 36.

Kaufen ſtets jeden Poſten **Weichfreſſer,** Frühjahrsfänge.

Gebr. Haas,
[617] **Hoffstetten** b. Gemünden a. M.

Zoologiſche Handlung

von

Franz Holzberg,

Eſſen-Ruhr, Kaſtanien-Allee 100 empfiehlt blau- u. gelbbr. Araras 60 ℳ, desgl. zahm u. ſprechend 70 ℳ, 1 P. gute eingewöhnte Loris v. d. bl. Bergen 40 ℳ, 1 Zuchtpar gut eingewöhnte Roſenkopfpapageien 30 ℳ, 1 P. Nandanſittiche 20 ℳ, Wellenſittiche P. 7 ℳ, 5 P. 30 ℳ, graue Reisvögel P. 2 ℳ, 5 P. 7,50 ℳ, japan. Mövchen P. 3,50 ℳ, 5 P. 15 ℳ, Buchfinken, gut eingewöhnt, Dtz. 8 ℳ, Meerſchweinchen P. 3 ℳ, Goldfiſche per 100 St. 5, 7, 9 ℳ, Univerſalfutter für Nachtigalen Ko. 1,60 ℳ, 5 Ko. 7 ℳ, desgl. für Droſſeln Ko. 1 ℳ, 5 Ko. 4 ℳ. [618]

Kanarienvögel, echte Harzer Roller ohne Fehler, à St. 10, 12, 15, 20 u. 25 ℳ, mit Porto u. Verpackung u. 14 Tage Probezeit, **aber nur per Nachnahme,** nicht gefallende Vögel tauſche um oder auf Wunſch zahle zurück. Rollerweibchen 1,50 ℳ. Preisliſte frei. [619]

L. G. Müller, Vogelzüchterei,
Nordhauſen a. Harz.

Große Stiglitze

und **rothe Hänflinge** Dtzd. 12 ℳ, St. 1,30 ℳ, **Zeiſige,** gelb, Dtzd. 11 ℳ, St. 1,20 ℳ, **Kreuzſchnäbel** St. 1 ℳ, **Dompfaffen,** roth, St. 3 ℳ, **ungar. Edelfinken** Dtzd. 8 ℳ, St. 1 ℳ, **Lerchen** von den Tranſylvaniſchen Alpen, ſofort ſing. Mnch., abwechſelungsreiche Geſänge, **Singlerchen** St. 1,50 ℳ, 6 St. 7 ℳ, **Haidelerchen** St. 2,50 ℳ, 6 St. 12 ℳ, **Rothkehlchen** St. 1—2 ℳ, **Schwarzdroſſeln,** Gebirgsvögel im Geſang, St. 5—7 ℳ, 2 **Blau-** u. 3 **Tannenmeiſen** zuſ. 3,50 ℳ Verſenden nur gut eingewöhnte Vögel.

Gebr. Haas,
[620] **Hoffstetten** b. Gemünden a. M.

C. L. Flemming,

Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen, empfiehlt **Kanarienvögel,** Männchen 5 ℳ Weibchen 1 ℳ. [621]

Feinſte

Edelroller!

mit den ſchönſten Touren, zart, tief und lang, noch ein Poſten ff. Frühbrut-Heckvögel, Dtz. 90 ℳ, Probevogel 10 ℳ, 14 Tage Probe gegen Nachnahme. [622]

A. H. Pütsch, Spezial-Züchterei,
Schönhauſen a. Elbe.

Hochfeine

Harz. Edelroller

(Stamm Trute),

welche vorzüglich in tief. gebog. u. geraden Hohlrollen, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Klingel, Flöten u. Du-Pfeifen gehen, à 6, 8, 10, 12 u. 15 ℳ, Dtz. 60, 72, 84 und 96 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Dtz. 12 ℳ, verſende gegen Nachn. 6 Tage Probezeit. Nichtgefallendes tauſche um, ev. Betrag zurück. [623]

Herm. Voigt, Thale a. Harz.

Geſucht: Granataſtrilde, Buntaſtrilde, kleine Kubafinken, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen, Weibchen rothköpf. Papageiamandinen.

F. Beedzler, [624]
20, Norton Folgate. **London** (England).

Feinſte Kanarienſänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [625]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.

Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

☞ 1898 erhielt mein Stamm **Harzer Kanarienvögel** 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ, u. Gar., 8 T. Pr.

Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [626

---

1 hochf. reinſch. echt. **Reitzugfink** m. Schnapp. giebt ab **Markert, Scheibenberg,** S. [627]

Geſucht: Tadelloſes Weibchen **Hakengimpel,** event. auch ganzes Par.

Friedrich Veltin,
[628] **Baſel** (Schweiz), Feldbergſtr. 89.

Suche ſofort zu kaufen:

2 Stück **Silberfaſänchen,** Weibchen, nur kräftige, geſunde Vögel. [629]

W. Wedekind, Kahla, S.-A.

Wellenſittiche, z. Zt. brütende Pare, ſind nach Beendigung der Brut à 7 ℳ zu verkaufen; Weibchen 4,50 ℳ Paſſende Käfige dazu billig.

Bernhard, Lehrer,
[630] **Mauenberg** bei Heidelberg.

Verkaufe:

Rothe Kreuzſchnäbel à Dtz. 7 ℳ mit Verpackung, **Zeiſig** mit rother Platte à St. 50 ₰. Tauſche auch Nachtlerchen und andres. [631]

Oskar Schott,
Sigmundsburg b. Alsbach-Limbach, Thür.

☞ 2 P. **chineſiſche Zwergwachteln,** à P. m. **Heckkäfig,** 77 cm lang, 8 ℳ, 1,1 ſchöne **Gürtelgrasfinken** 6 ℳ, 9 **Mövchen** zuſ. 8 ℳ. Verpack. frei geg. Nachn. [632]

Jos. Ehrlich, Würzburg, Weißenburgerſtr.

Schöner, echter **Amazonen-Papagei,** fingerzahm, für 40 ℳ zu verkaufen. Offert. z. richten an d. Exped. d. Bl. [633]

0,1 Diamantfink 6,50 ℳ, **1,1 Schopfwachtel** 15 ℳ, **0,1 dto.** 12 ℳ zu verkaufen. **Suche 1,0 Roſenpapagei.** [634]

Dolff, Meckenheim b. Bonn.

Harzer Kanarienvögel

(Truteſche Hohlroller),

Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. i. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel, Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis** und **franko.** Weibchen deſſelb. Stamms 2,50 ℳ [635]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Umſtändehalber

vergebe bill. **1 lautſchl. Donauſproſſ** m. ſchön. Tour., 20 ℳ, **1 do. Nachtiga** 12 ℳ, **1 Hochwaldzippe,** tour. Waldgeſang, 8 ℳ. Nur gegen Vorherſendu des Betrags. Porto u. Emb. frei. [63

Hohnel, Chemnitz, Salzſtr.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 14.

Bedürfen die Prachtfinken zur guten Lebenserhaltung unter anderem der Frucht bzl. Beren?
Selten gehaltene einheimiſche Vögel.
Vogelhändler-Verband und Vogelſchutz (Schluß)!
Die Haltung, Wartung und Pflege, Fütterung auf billigſte und doch vollſtändig genügende Art, ſowie die Eingewöhnung der Wildfänge droſſelartiger Vögel (Schluß).
Anſichten über das Käfigen unſerer Meiſen.
Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen.
Zu unſeren Bildern.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.

C. L. Flemming

Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [637]

Holzwaarenfabrik.

Holzwaarenfabrik.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Neſteier von Milchglas,

per Dutzend 60 Pfennige, offerirt
Heinrich Nolte,
Glaswerke Marſchallshagen
[638] b. Lichtenau i. Weſtfalen.
P. S. Wiederverkäufer entſprechender Rabatt.



Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren,
Niſtutenſilien,
unerreicht in
praktiſcher
Anordnung.
Große Auswahl z. billigem Preis. [639]
☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜
Arthur Herrmann & Luther, Oschatz i. S.

Die Samen-Großhandlung

von

Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [640]
hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Pre

Niſtkäſten für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[641] **R. Schröter, Elingen-Greußen.**

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [642]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.



Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Netzfallen,** kleine 80 ₰, größ. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ, **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [643]
Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112.
Illuſtrirte Preisliſte gratis.

Futtermittel.

! Gut gereinigtes Vogelfutter !
ohne jede weitere Anpreiſung wie Ia, prima u. a., verſende nur wirkl. beſte Ware.

Sommerrübſ.	5 Ko.	1,70 ℳ,	1 Ko.	40 ₰
Glanzkorn	„ „	1,30 „	„ „	30 „
Silberhirſe	„ „	1,80 „	„ „	40 „
Schälhafer	„ „	1,80 „	„ „	40 „
Senegalhirſe	„ „	2,00 „	„ „	50 „
Sonnenroſenk.	„ „	1,86 „	„ „	50 „
Hanf	„ „	1,60 „	„ „	40 „
Carottengries	„ „	4,50 „	„ „	110 „
Droſſelfutter	„ „	4,00 „	„ „	100 „
Nachtigalfutt.	„ „	7,00 „	„ „	200 „

Ameiſeneier 1 Lit. 80 ₰, 10 Lit. 7,50 ℳ.
Alle anderen Futterſort. bill. Prsl. frei. [644]
H. P. Lange, Samenhdl., **Gottesberg** i. Schlſ.

Mehlwürmer,

ſtaubfrei, à Lit. ℳ 4,50, Ko. ℳ 8, **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Lit. ℳ 1, bei 10 Lit. 90 ₰; I bei 5 Lit. 70 ₰, bei 10 Lit. 65 ₰ empfiehlt u. verſ. geg. Nachn. [645]
C. O. Streckenbach, Breslau.

☞ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [646]

Droſſelfutter,

extra ℳ 1,20 per Ko., Ia ℳ 1 per Ko. **Nachtigalenfutter** Ko. ℳ 1,50, Packet 50 ₰; ſämmtliche Vogelfutter in geeignet. Qualitäten, für Finken, Lerchen, Meiſen, Exoten, Papageien, Prachtfinken ꝛc. Ko. 60 ₰. Preisliſten über Vogelbauer mit 100 Abbild. an Beſteller gratis. [647]
E. Göller, Köln a. Rhein.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen **inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel** pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt
[648] ſandfrei.
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Vögel.

Harzer Edelroller,

tieftourenreich u. weltbekannt, liefere überall hin. Der Preis richtet ſich nach Geſangsleiſtung, à St. 7, 8, 10, 12, 15 bis 30 ℳ. Verſandt unter Nachnahme. Garantie für geſundes Ankommen. [649]
Joh. Wink, Dresden-A., Marſchallſtr. 37.
Züchterei hochedler Kanarien, gegr. 1885. Goldene u. ſilberne Medaillen. Viele Dankſchreiben.

Große Stiglitze

und **rothe Hänflinge** Dtzd. 12 ℳ, St. 1,50 ℳ, **Zeiſige,** gelb, Dtzd. 11 ℳ, St. 1,20 ℳ, **Kreuzſchnäbel** St. 1 ℳ, **Dompfaffen,** roth, St. 3 ℳ, **ungar. Edelfinken** Dtzd. 8 ℳ, St. 1 ℳ, **Lerchen** von den Tranſylvaniſchen Alpen, ſofort ſing. Mnch., abwechſelungsreiche Geſänge, **Singlerchen** St. 1,50 ℳ, 6 St. 7 ℳ, **Haidelerchen** St. 2,50 ℳ, 6 St. 12 ℳ, **Rothkehlchen** St. 1—2 ℳ, **Schwarzdroſſeln,** Gebirgsvögel im Geſang, St. 5—7 ℳ
Verſenden nur gut eingewöhnte Vögel.
Gebr. Haas,
[650] **Hofſtetten** b. Gemünden a. M.

daß die Prachtfinken bei der durch die Gefangenſchaft bedingten und veränderten allgemeinen Lebensweiſe der Frucht, bzl. Beren nicht bedürfen.

Aber auch aus dem eigenen Verhalten der in Rede ſtehenden Gruppe fremdländiſcher Finkenvögel iſt zu entnehmen, daß ihnen Obſt und Beren entbehrlich ſind, vielleicht mit einziger Ausnahme der dreifarbigen und der eigentlichen Papageiamandinen, die gern Apfel- und Birnenſtückchen nahmen. Die übrigen berührten niemals, wenigſtens ſoweit es meine Beobachtungen betrifft, weder Früchte noch Beren, wozu ihnen reichlich Gelegenheit geboten war, namentlich während eines fünfjährigen Zeitraums, in welchem ich wegen der Fledermauspapageichen und Sittiche und mancher anderen obiger Zugaben benöthigten Vögel mannigfache Früchte und Beren reichte; von den zahlreichen und verſchiedenſten Aſtrilde- und Amandinenarten, die mit jenen gemeinſam den Flugraum theilten, nahmen, wie ſchon geſagt, nur die oben genannten zwei Papagei-Amandinenarten ſüßen Apfel, ſelten Birne, niemals Beren an. Und nicht anders verhielt es ſich während der übrigen Jahre meiner langen praktiſchen Vogelliebhaberei und ich glaube, daß auch andere Vogelwirthe, wenn auf genaue Beobachtungen begründete Erfahrung geſtützt, zu gleichem Ergebniß, inbetreff der eigentlichen Prachtfinken, gelangen werden.

Selten gehaltene einheimiſche Vögel.

Von A. N.

I. Die gelbe Bachſtelze oder Gebirgsſtelze.

Nicht allein des Geſangs halber werden allenthalben Vögel im Käfig gehalten, ſondern auch um der Schönheit und Anmuth willen wird ſich mancher Naturfreund der Mühe unterziehen, ſolche Vögel zu halten, um deren Weſen zu ſtudiren und ſomit zur Vogelkunde auch ſein Scherflein beizutragen. Es gibt vielleicht bis heute unter hundert Vogelfreunden noch nicht einen*), der gerade die Gebirgsſtelze näher kennt oder ſchon im Käfig gehalten hat. Sie iſt auch nicht überall zu Hauſe, ſondern hält ſich meiſt nur in gebirgigen Gegenden des ſüdlichen Deutſchlands auf, wo ſie dann allerdings keine ſeltene Erſcheinung iſt. Sie bleibt auch über Winter da und hält ſich dann an Gebirgsbächen, die ſelten ganz zufrieren und an warmen Quellen auf, wo ſie ſich verhältnißmäßig gut durchbringt; denn an offenen Gewäſſern fehlt es nicht. Hier ſucht ſie nach kleinen Würmchen und allerlei Waſſerinſekten, die wir mit bloßem Auge gar nicht wahrnehmen; aber auch die größten, vier bis fünf Centimeter langen Libellenlarven, die in der Regel an unter Waſſer befindlichen Steinen hängen, holt ſie heraus und ſchießt pfeilſchnell auf ihre Beute los und erhaſcht dieſelbe meiſt im Fluge, indem ſie einigemale an ſolchen offenen Stellen auf- und abfliegt, bis ſie nichts Lebendiges mehr entdeckt. Dann geht es weiter, um die nächſte Station zu revidiren. An Stellen, wo ſie im Flug nichts erhaſchen kann, z. B. an überhängenden Felſen oder Geſträuchen, läßt ſie ſich ſchwanzwippend auf einem aus dem Waſſer hervorragenden Stein nieder, umheräugend, ob es nichts zu fangen gibt; hat ſie etwas gefunden, ſo geht ſie auch ohne Bedenken in das Waſſer und watet am Ufer entlang. Hier oben im Schwarzwald iſt ſie ſehr häufig, und ich habe ſie ſeit fünf Jahren beobachtet. Jeden Winter halten ſich einige Pärchen ganz in der Nähe meiner Wohnung auf und durchwaten den Gebirgsbach von früh bis abends, oft werden ſie dabei vom Waſſer ein Stück mit fort geſchwemmt; die Gebirgsſtelze ſcheint jedoch das naſſe Element nicht zu fürchten, denn im Nu iſt ſie wieder in der Luft, wo ſie in Geſellſchaft ihrer Sippe, einer hinter dem andern, bogenförmig dahin ſchwirrt. Oftmals ſitzen die Vögel auch auf dem Firſt eines Hauſes und laſſen dabei fortwährend ihr „ſiſſri, ſiſſri" hören, beſonders am frühen Morgen, wenn es über Nacht friſch geſchneit hat. Oft ſieht man ſie wochenlang garnicht, ſind ſie aber wieder angerückt, ſo kann man ſie ſicher eine Woche lang beobachten. Bei ſtarkem Froſt und hohem Schnee leiden ſie allerdiags auch Noth, und ich habe ſie in ſolchen Zeiten oftmals gefüttert, meiſt mit Regenwürmern, welche ich zu dieſem Zweck im Herbſt beim Umgraben des Gartens ſammle, mit Erde vermiſcht in eine große Kiſte bringe und in den Keller ſtelle; obenauf lege ich eine Lage grünen Raſen, welchen ich über Winter etliche Male begieße. Ich entferne nun vor der Fütterung an einigen Stellen am Bachesufer den Schnee, ſodaß die Erde zum Vorſchein kommt, mache eine tellergroße Vertiefung und ſtreue eine Hand voll Regenwürmer hinein; die Bachſtelzen beſuchen dieſe Futterplätze ohne jegliche Scheu und nehmen die Würmer gern an; es iſt ihnen auch keiner zu dick oder zu lang.

Im Käfig ſind ſie ſehr leicht an das Futter zu bringen; ich zerſchnitt ihnen die Regenwürmer in kurze Stückchen, in den erſten Tagen reichte ich nichts anderes, erſt nach und nach gab ich Mehlwürmer, Ameiſenpuppen und gelbe Morrübe dazu, was ſie ohne Schwierigkeit nahmen. Als weitre Fütterung gab ich in Milch erweichte Semmel, Milchhaut, Quargk-Käſe und hartgekochtes geriebnes Hühnerei; wenn ſie dieſes Futter einmal gekoſtet haben, bzl. daran gewöhnt ſind, verſchmähen ſie die Regenwürmer, höchſtens nehmen ſie noch ganz kleine dünne an. Anfangs ſind ſie auch ſtarke Freſſer, und man darf ihnen, wenn ſie bei ſtrenger Kälte gefangen, nicht zu viel des Guten geben, ſonſt iſt es ihr ſicherer Tod; auch müſſen ſie, ſolange die ſtrenge Kälte andauert, wenn ſie während derſelben gefangen wurden, in einem nicht geheizten Raum untergebracht werden, da ſie ſonſt durch zu plötzlichen Temperaturwechſel, in Verbindung mit zu ſtarker Sättigung, wozu die Bachſtelze geneigt iſt, leicht an Durchfall und Kalkſchicht zu Grunde gehen. Wartet man jedoch gelinde Witterung ab, ſo kann man ſie in ein geheiztes Zimmer bringen, wo

---

*) Das iſt etwas übertrieben. D. L.

[illegible]

[illegible]

Vogelhändler-Verband und Vogelſchutz!

Von L. Aelbert.

(Schluß).

Indeſſen kommen trotz alledem noch immer bei uns ſo maſſenhafte, ungeheure Züge und Schwärme, vor zwei Jahren z. B. Erlenzeiſige und im vorigen Jahr Stieglitze, vor, daß es Wunder nimmt, über Verminderung der Vogelwelt ſprechen zu hören. Man hat eben in Nichtliebhaberkreiſen kein Auge, ſo etwas zu ſehen!

Jeder Liebhaber rettet jährlich mehr Vögel durch ſein Intereſſe und ſeine Sachkenntniß vor ſicherm Untergang, als ſein Beſtand ſich beläuft. Wo bleibt alſo der Vorwurf, daß durch die Liebhaberei der Beſtand vermindert wird? Solche Behauptung iſt geradezu lächerlich und unbegründet! Ich habe es erlebt, daß bei einem plötzlich eingetretenen, ſtrengen Nachwinter, als unſere Zugvögel ſchon da waren, dieſelben infolge hohen Neu-Schnees und Kälte vielfach in die Häuſer flüchteten, um Schutz vor Kälte und Hunger zu ſuchen; ſo waren meiſt Haus für Haus Finken, Lerchen, Bachſtelzen, Rothkehlchen und Stare einquartirt. Aber wie elend wurden dieſe armen Geſchöpfe von den Nichtliebhabern verpflegt! In vielen Häuſern wurde ihnen Gaſtfreundſchaft verſagt, weil man es unter ſeiner Würde hielt, ſich mit einem Vogel zu befaſſen; wo man ſie hielt, wurde ihnen Hanf und Kanarienſamen und unzweckmäßige Käfige gegeben und man glaubte, damit genug gethan zu haben, weil man ihre Bedürfniſſe nie kannte, nie ahnte! Wo Belehrung zur Hand bzl. angenommen und geſucht war, fehlte es an paſſendem Futter, Käfigen u. a., und ſo mußten die meiſten der armen Schutzſuchenden ihr Vertrauen auf den Menſchen mit dem Tode büßen.

Nur wir wenigen Vogelliebhaber brachten unſere Schutzbefohlenen über die 14 Tage Nachwinter ſpielend durch, um ihnen nach Beſſerung der Verhältniſſe die Freiheit wieder zu ſchenken. So hatte Verfaſſer dieſes unter vielen anderen eine Stelze, die mit Gewalt hinausgejagt werden mußte; ſie wollte und wollte nicht den gaſtfreundlichen Ort verlaſſen; während des ganzen Sommers hielt ſie ſich in der Nähe meiner Wohnung auf.

Daß das Halten der Stubenvögel, die ebenſo Hausthiere ſind, wie alle übrigen, keine Thierquälerei iſt, wie von überſchwänglichen Gemüthern uns oft vorgeworfen wird, iſt ſchon ſo oft bewieſen und erörtert worden, daß jedes weitre Wort darüber geſpart werden kann.

Gehe der Gegner unſrer Liebhaberei nur zu einem ordentlichen Liebhaber und ſehe und höre ſeinen Vögeln zu, dann wird er belehrt werden.

Die löblichen Thierſchutzvereine in ihrem Uebereifer mögen uns nur ganz in Ruhe laſſen, wir geben ihnen kein Feld für ihre Thätigkeit; ſie mögen ein ſolches in jedem Haushalt, jeder Wirthſchaft u. a. ſuchen und werden es auch ſicher finden. Hier ſollen und können ſie erſprießlich thätig ſein. Ich verweiſe nur auf das Mäſten der Gänſe, Enten, Berupfen derſelben jährlich zwei bis drei mal bei lebendigem Leibe, ſo ſchrecklich, daß ſie mit hängenden Flügeln und blutigem Körper zum Erbarmen herumlaufen, und auf das Wegnehmen der Eier der Hühner. Wir dürfen uns nicht einbilden, daß das Huhn die Eier für uns legt, es hat die Hoffnung, daß die Eier doch ihm einmal bleiben und es zum Brüten kommen wird, wenngleich es das ganze Jahr ſo irregeführt wird. Ferner das Ausnehmen der Taubenneſter; die Alten verſpüren den Schmerz um den Verluſt ihrer Jungen gerade ſo heftig, wie die Singvögel, bei denen eine Neſtausnahme als Rohheit gilt und ſtreng beſtraft wird. Weiter das Anlernen der Fohlen zum Ziehen, Kaſtriren der Hausthiere, des Geflügels (beſonders eines eingebildeten, beſſern Biſſens wegen), Anbinden des Rindviehs an kurze Ketten für Lebenszeit; Schinden der Pferde, bis ſie liegen bleiben und der Tod ſie erlöſt u. a. Die Ziege, welche der Menſch von den Bergen ſich holte und einzähmte, wird ſich jedenfalls in dem meiſt dumpfen, finſtern Stall an der kurzen Kette, an der ſie für Lebenszeit meiſtens gefeſſelt iſt, auch nicht beſonders wohl befinden. Alle dieſe Thiere pflegt Gewinnſucht, den Vogel die Liebe! Wer iſt beſſer daran?

Alſo, Liebhaber, rafft Euch auf! Es iſt, wie Herr Forſtaſſeſſor Hildebrand richtig ſagt, die allerhöchſte Zeit, daß die Liebhaber zum Kampf für ihre gerechte, edle, ſo ſchöne, den Menſchen veredelnde, ich möchte ſagen, auch verjüngende Sache ſchreiten, wollen ſie nicht, daß ſie derſelben am Ende verluſtig werden! Was ſollte dann aus unſeren gefiederten Lieblingen werden? Das Intereſſe für dieſelben würde ſich von Generation zu Generation allmählich ſchwächen, bis ein ſolches für ſie überhaupt nicht mehr vorhanden wäre, dann würde aber auch jeglicher verſtändnißvolle Schutz aufhören und die Vogelwelt erſt recht gezehntet werden!!

Aber, wo ſich finden und wie vorgehen!? Viele Liebhaber gehören keinem Verein an, haben auch vielfach keine Gelegenheit dazu, einem ſolchen beizutreten. Einem ſolchen in einem fremden, vom Wohnort oft weit entfernten Ort anzugehören, hätte keinen Sinn, da in dieſem Fall ein Beſuchen der Verſammlungen ausgeſchloſſen wäre.

Von einem tüchtigen Fachmann müßten Petitionen, wenigſtens vor der Hand für Deutſchland und Oeſterreich, ausgefertigt werden und die Liebhaber durch unſre liebe Fachzeitung „Die gefiederte Welt“, auch andere Blätter, ſtark geleſene politiſche Zeitungen Deutſchlands und Oeſterreichs verſtändigt werden, bis zu einem gewiſſen Termin ihre ſchriftliche Einwilligung behufs Beiſetzung ihres Namens auf dieſe Petitionen einzuſenden.

Die Petitionen ſelbſt könnten ja durch Veröffentlichungen in den genannten Blättern den Liebhabern zur Kenntniß gelangen.

Uebrigens iſt dies nur meine beſcheidene, durchaus nicht maßgebende Meinung, die eigentlich nur Anregung zu etwas Beſſerem ſein ſoll!

Jedenfalls werden von unſeren allbeliebten, hochverehrten Altmeiſtern Deutſchlands und Oeſterreichs, auf die wir mit vollem Vertrauen blicken, auch die richtigen einzuſchlagenden Wege gegen die Bedrückung und Erſchwerung unſrer Liebhaberei erfolgreich gefunden werden! Das walte Gott!

* * *

Die Haltung, Wartung und Pflege, Fütterung auf billigſte und doch vollſtändig genügende Art, ſowie die Eingewöhnung der Wildfänge droſſelartiger Vögel.

Von A. Reuter.

(Schluß).

Friſche Rinderkutteln, weich gekocht und fein zerſchnitten, geben ebenfalls ein kräftiges Fleiſchfutter für Droſſeln u. ſ. w. Nun will ich noch die Rinds- und Kalbslungen erwähnen, welche von dieſen Vögeln leidenſchaftlich gern angenommen werden, dieſelben werden gargekocht und in kleine Stücke zerſchnitten; ſie freſſen dieſe mit Vorliebe. Endlich möchte ich an ein äußerſt billiges Fleiſchfutter erinnern, deſſen ich mich ſchon ſeit 15 Jahren für meine großen Vögel bediene, und dieſes dürfte wol das billigſte ſein, bei gleicher Güte oder Werth für erwähnte Vogelarten. Es iſt dies der Rückſtand von ausgeſottenem Schweinefett und Rindernierenfett, alſo die ſogenannten Grieben. Dieſe werden in kleine ſchnabelgerechte Stücke geſchnitten und unter das übrige Futter gemiſcht, etwa 2 Kaffeelöffel voll täglich pro Kopf; dieſes iſt billig, hat Fleiſch- und Fettbeſtand, und bekommt den Vögeln vorzüglich, ſie freſſen es leidenſchaftlich gern, dabei brauchen ſie auch weniger Wurmfütterung, ſie ſingen trotzdem ſehr fleißig. Ich empfehle daher jedem Droſſel- oder Amſel-Liebhaber, eine Probe damit zu machen, und er wird es ſicher für immer beibehalten. Gequetſchter Hanfſamen reizt dieſe Vögel auch zum Geſang, man gebe alle zwei oder drei Tage etwa einen Kaffeelöffel voll für eine Amſel unter das Futter, den Droſſeln gebe man jedoch nicht zu häufig davon, weil dieſe viel ſitzen und dann leicht zu fett werden und infolgedeſſen nicht ſingen, ſondern den ganzen Tag ſchlafen. Als weitere Fütterung weiche man Weiß- oder Schwarzbrod in friſchem Waſſer einige Stunden vor Gebrauch ein, drücke daſſelbe gut aus, hacke es fein, gieße etwas gekochte Kuhmilch daran und miſche Mohnmehl, Fleiſch und Hanf darunter. Läßt man die Milch weg, ſo kann man abwechslungsweiſe etwas geriebene Möre, auch Quargkäſe hinzuthun, ab und zu auch geſottene kalte Kartoffel darunter reiben. Ferner gebe man alle Sorten von genießbaren Beren, ſowie friſches, zerkleinertes Obſt: Aepfel oder Birnen, auch gedörrte Apfelſchnitte oder Birnenhutzel fein gewiegt. Wenn möglich, ſo reiche man ihnen auch dazwiſchen Ameiſeneier, im Sommer friſche, im Winter gedörrte, auch Weißwurm und des Tags 5 bis 6 Mehlwürmer. Lebende Inſekten gebe man ſoviel als möglich, vom kleinſten bis zum größten Käfer, Regenwürmer und Raupen, nackte Schnecken, auch die kleinen in den braun und gelb geſtreiften Häuschen. Die letzteren verzehren ſie ſammt der äußeren Hülle. Man füttere dieſe hauptſächlich in der Mauſerzeit, weil die Schale der Schnecke kalkhaltig iſt und den Federwuchs befördert. Ich habe ſie ſchon im Ofen ausgeglüht und zu Pulver gerieben, davon meinen Vögeln eine kleine Meſſerſpitze voll unter das Futter gemengt, es beſchleunigt die Mauſer ungemein. Auf die Zubereitung der großen Weinbergsſchnecke zu Vogelfutter, ſowie verſchiedener anderer, werthvoller, billiger und leicht zu beſchaffender Futtermittel, hauptſächlich zum Aufbewahren beſtimmter, werde ich ſpäter noch zurückkommen.

Endlich möchte ich noch Einiges in betreff der Käfiggröße erwähnen. Der einfachſte, praktiſchſte und billigſte Käfig iſt der Kiſtenkäfig, der jedoch als Mindeſtmaß 60 cm lang, 40 cm hoch und 35 cm tief ſein ſoll. Er ſei mit 3 Sprunghölzern von 1 cm Durchmeſſer verſehen. Futter- und Trinkgeſchirr kann auf der Seite durch Schieberchen oder Klappthürchen, oder auch an der Lichtſeite durch drehbare, runde Erker angebracht ſein. Das Badehäuschen iſt an der Lichtſeite anzubringen. Die Decke ſei entweder aus Leinen oder Wachstuch, oder man befeſtige an der Holzdecke Leinwand und ſtopfe dieſe mit Mos oder Kälberharen aus. Die Schublade zum Reinigen des Käfigs ſei 10 bis 15 cm hoch und beſtehe aus Zinkblech. Der ſchönſte Aufenthalt für große Vögel iſt jedoch die Voliere. Wer die Räumlichkeiten hat, der bringe im Wohnzimmer an einer von der Sonne am häufigſten beſchienenen Seitenwand für jeden einzelnen Vogel eine Voliere von 1 m Länge, 1 m Höhe und 60 cm Tiefe an, darin fühlen ſich die Vögel wie im Freien und es nimmt ſich ſehr ſchön aus, beſonders, da man das Innere mit allen möglichen Baumſtümpfen und Geäſt ausſtatten kann. Man hat ſomit die Natur im Haus, und die Vögel empfinden ſichtliches Wohlbehagen, da ſie ſich freier bewegen können. Je größer der Käfig, deſto mehr Luſt zeigt der Vogel, ſich zu bewegen, und dieſes iſt gewiß für ſeine Geſundheit, längre Lebensdauer und Wohlbehagen zuträglicher, als wenn er in engem Käfig eingepfercht iſt. Wir dürfen ja nur ein Beiſpiel an uns ſelbſt nehmen; nun bedenke man aber, daß der Vogel auch Flügel hat, die wir nicht haben, um wie viel mehr muß er ſich nach freierer Bewegung ſehnen. Woher kommt es, daß oft Vögel, die einige Jahre im Käfig ſind, dicke, geſchwollene und gichtiſch veranlagte Ständer bekommen? Nur der zu kleine Käfig iſt Schuld daran, denn der Vogel gewöhnt ſich nach und nach ſelbſt daran, viel zu ſitzen, da er an freier Bewegung gehemmt iſt. Es wird ja oft behauptet, daß ein Vogel im geräumigen

Käfig nicht ſo fleißig ſinge; dies iſt jedoch ein Irrthum, den ich mir entſchieden zu widerlegen erlaube, und ich behaupte aus eigener, zu wiederholter Malen gemachten Erfahrung, daß ein Vogel nur dann fleißig ſingt, wenn er ſich in allem wohl befindet. Es gehört ihm ein Käfig, der ſo weit und hoch iſt, um ſeine Flügel, die durch die Flugunthätigkeit krämpfig werden, ausſchwingen zu können; ich glaube, daß mir in dieſer Behauptung jeder aufmerkſame Vogelliebhaber Recht geben wird. Ich möchte hier noch ein kleines Beiſpiel dafür anführen, was es ausmacht, wenn ein Vogel ſeine Flügel auch im Käfig frei bewegen kann, und wenn nicht. Es ließen ſich etliche Bekannte von mir vor Jahren mehrere Nachtigalen ſchicken, wenn ich nicht irre aus Berlin, die Vögel kamen an, alle zuſammen in einem Verſandtkäfig. Die Eigenthümer theilten ſie nun und brachten jeden in ihren für ſie beſtimmten Käfig, ohne die Thiere vorher einer nähern Unterſuchung zu unterziehen. Die Nachtigalen gingen gleich an das Futter, es hatte alſo keine Noth, und die glücklichen Beſitzer freuten ſich ſchon im Voraus im Geiſte auf den Geſang. So vergingen einige Tage in ungetrübtem Glück. Auf einmal begann große Sterblichkeit unter den bewunderten, hoffnungsvollen Sängern, bis zuletzt nur noch einer im Beſitz ſeines Vogels war. Ich kam zufällig in ſein Haus und er klagte mir nun, daß ſeine Nachtigal ſeit 2 Tagen kein Futter mehr anrühre und ganz traurig am Käfigboden ſitze. Auf meine Frage, ob er den Vogel noch nicht herausgenommen hätte, um ihn näher zu beſichtigen, gab er eine verneinende Antwort. Ich ließ nun den Käfig herunter nehmen, griff den Vogel heraus, und entdeckte ſofort bei der erſten Berührung, daß ihm die Flügel gebunden waren. Nun war der Mann ganz verblüfft über dieſe Entdeckung. Ich ſchnitt den Bindfaden durch und ſetzte den Vogel in ſeinen Käfig, worauf er ſogleich anfing, die Flügel in die Luft zu ſtrecken und ſich mehrere Male tüchtig auszuſchwingen. Gegen Abend ging er wieder an ſein Futter und war gerettet; er entpuppte ſich ſpäter als vorzüglicher Schläger. Es iſt ſehr zu tadeln, daß der betreffende Händler die Leute nicht hiervon in Kenntniß ſetzte, er dachte wol nicht daran, daß ſie es nicht wüßten.

Anſichten über das Käfigen unſerer Meiſen.

Von Unterländer.

Als langjähriger Abonnent der „Gefiederten Welt" finde ich, daß gerade unſere kleinſten, ſchönſten Vögel, nämlich die Meiſen, nicht die Aufmerkſamkeit geſchenkt bekommen, die ſie eigentlich verdienen, inſofern ſie zu einer Gattung gehören, über deren Haltung und Pflege die Meinungen ſehr getheilt ſind. Oft findet man gerade entgegengeſetzte Meinungen, ſo z. B. hält der eine die Meiſen für ausdauernd, während der andre das Gegentheil behauptet.

Ich mache mir nun zur Aufgabe, die Sache von einem andern Standpunkt aus zu betrachten, den ich für den richtigen halte und welcher meines Wiſſens nur im Jahrgang 1896 von Karl Neunzig vertreten wurde.

Kein Vogel bietet uns ſo viel Intereſſantes wie die Meiſe, und deshalb iſt ſie mit Recht der Liebling von Alt und Jung.

Meiſtens iſt es die „Kohlmeiſe", im Volksmund „Frühlingsbote" genannt; fortwährend läßt ſie im Frühjahr, von Aſt zu Aſt fliegend, den Jedermann bekannten Ruf „Si zi da, Si zi da, Stiti ſtiti" erſchallen. Dieſes iſt aber diejenige Meiſe, welche wegen ihrer Mordluſt und Unverträglichkeit gegen andere Vögel als Geſellſchaftsvogel nicht in Betracht kommen kann.

Die ſchönſten und kleinſten Meiſen, welchen meine Worte gelten ſollten, ſind meiſtens unbekannt, weil ſie im Sommer durch das Blättermeer der Bäume unſeren Augen entzogen werden. Den ganzen Sommer hindurch ziehen ſie fortwährend, immer ſcharenweiſe, von einer Waldparzelle zur andern und nur ihr leiſer Lockruf verräth ihr geheimes Hauſen. Im ſtrengen Winter ziehen ſie ſich, durch Hunger getrieben, bis an die Gehöfte heran, um ihre Nahrung aus den Futterkäſten zu holen. Sobald das erſte Thauwetter eintritt, ſind ſie verſchwunden, und man trifft ſie wieder in ihrem alten Heim an.

Nun ſtelle ich an den Leſer die Frage: „Iſt die Meiſe als Stubenvogel zu betrachten und kann man dieſelbe für die Dauer im Käfig erhalten?"

Nach meiner Anſicht muß ich, obwohl ich weiß, daß ich mit manchem Liebhaber in Widerſpruch gerathe, die Antwort verneinen. — Einer Schar Meiſen, welcher ſich meiſtens noch einige Artsverwandte hinzugeſellen, muß man nur einmal zuſehen. Stundenlang, ohne daß unſere Augen ermüden würden, könnte man dieſer Vogelſchar zuſchauen, doch zu bald wird man von ihnen entdeckt, und mit ſpöttiſchem, leiſem „Zit zi ärrr" entziehen ſie ſich alsbald in den nächſten Zweigen unſeren Augen.

Gerade in dem ſprichwörtlich gewordenen nie ruhenden Weſen und ihrer Keckheit liegt ihre Zier! Bald haben ſie ſich, den Kopf nach unten, an den dünnſten Zweigen angehäkelt, bald bearbeiten ſie mit kräftigen Schnabelhieben einen Nuß- oder Samenkern, welchen ſie mit den Füßen feſthalten.

Wer vermag nun einem ſolchen kleinen Vogel einen Käfig herzurichten, welcher ſeinen Anforderungen genügt? Mag nun derſelbe noch ſo phantaſievoll, mit ſchwankenden Aeſten, lebenden Pflanzen eingerichtet ſein, dies trägt alles nur zur augenblicklichen Unterdrückung der Freiheitsluſt bei und verlängert das Leben höchſtens ein par Monate.

Als großer Vogelliebhaber war es mein Ideal, Meiſen als Stubenvögel heranzuziehen, und ich werde mir erlauben, meine Erfahrungen darüber in einem meiner nächſten Berichte, welcher von meiner Vogelſtube handeln wird, zu ſchildern.

Die brennendſte Frage iſt der Verſandt. Nach eigner Erfahrung ſetzt keinem Vogel die Reiſe ſchlimmer zu als der Meiſe. Man ſtelle ſich einen ſolchen kleinen, nie ruhenden Vogel in einem Verſandtkäfig vor. Jeder andre Vogel bleibt nach einer ſolchen Manipulation vor Angſt auf dem Käfigboden ſitzen. Dies iſt eben bei der Meiſe nicht der Fall; jeder Stab, jede Spalte wird mit Schnabelhieben bearbeitet, um die Freiheit zu erlangen. Während dieſer Zeit nimmt ſie vor Aufregung kein Futter an. Am Ziele der Reiſe angelangt, iſt ſie dann ſo ausgehungert, daß ſie wie toll über das dargereichte Futter herfällt, doch es iſt zu ſpät. Der Körper iſt ſchon ſo ſehr ermattet, daß er das aufgenommene Futter nicht mehr verdauen kann. Dieſe ſchlimme Erfahrung habe ich bei vielen Meiſen, namentlich bei der Tannenmeiſe, gemacht.

Unbegreiflich iſt es mir, wie man nur Körner (Hanf) als Futter auf der Reiſe geben kann; dies habe ich leider bei verſchiedenen Sendungen beobachtet. Kann z. B. eine Schwanz- oder Haubenmeiſe ein Korn abhülſen, wenn ſie nicht einmal einen großen Mehlwurm zerkleinern kann! Die Meiſen werden oft für Körnerfreſſer gehalten, welches eben nicht der Fall iſt, ſondern ſie ſind Körner- und Weichfreſſer.

Hatte ich nun nach vielen Umſtänden einige Meiſen glücklich am Leben erhalten, ſo wurden dieſe mit „Schiffer's Nachtigalsfutter“ mit ziemlich großem Zuſatz von Ameiſeneiern, zerkleinerten Mehlwürmern, kleinen Kerbthierchen gefüttert. Auch ſtellte ich Pflanzen, welche mit Ungeziefer behaftet waren, in den Käfig hinein, überhaupt alles, was ich nur erhalten konnte, um die Nahrung möglichſt der natürlichen anzupaſſen. Alles dies wurde mit dem größten Wohlbehagen angenommen.

Ich glaube, daß ich am richtigen Punkt angelangt bin, um der Frage näher treten zu können:

Wie lange muß eine Meiſe herumſtreichen, um ihren Hunger zu ſtillen, und wie oft muß ſie ſich mit hungrigem Magen zur Ruhe begeben? Jedes Aeſtchen, jede Ritze in der Rinde wird nach Larven, kleinen Käfern u. a. abgeſucht, und welche Menge findet ſie vor? — Deshalb iſt in keinem Vogel der Naturtrieb nach Bewegung und Abwechſelung im Futter ſo ausgeprägt, wie bei der Meiſe.

Im Käfig dagegen wird ihnen die nöthige Bewegung erſpart; ſie brauchen nur an den Napf zu fliegen, wo ſie Futter in „Hülle und Fülle“ vorfinden. Hier liegt die Urſache, warum im Käfig eingegangene Meiſen ſelten abgezehrt ſind, ſondern im Gegentheil an Fettſucht ſtarben. Letztere iſt diejenige Krankheit, von welcher hauptſächlich die Bewohner enger Käfige befallen werden. Von dieſem einen Umſtand hängt alſo die Ausdauer der Meiſen in der Gefangenſchaft ab.

Man macht ſich Vorwürfe, Meiſen zu käfigen; daß dies öfter der Fall iſt, kann man aus den eingeſandten Berichten erſehen. So z. B. führt uns Karl Neunzig im Jahrgang 1896 die Lebensdauer dieſer Vögel ſehr trefflich vor Augen. Warum ſollte man denn Meiſen käfigen, wenn man ſicher weiß, daß ſie die Gefangenſchaft nicht ertragen und wir doch gewiß genug ſchöne Vögel haben, die ſich als Stubenvögel viel beſſer eignen! —

Ihrer Keckheit fallen ſie zum Opfer; kein Vogel iſt leichter zu fangen, als die Meiſe. Dies iſt die Urſache, warum der Vogelmarkt, beſonders im Frühjahr und Herbſt, mit unzähligen Angeboten überhäuft iſt. — Mit den Worten „eingewöhnt und futterfeſt“ muß ſehr vorſichtig verfahren werden. Wenn dieſe Redensart überhaupt paßt, iſt ſie hier ſehr ſchlecht angewendet, denn nach eigner Erfahrung nimmt jede Meiſe in einem geräumigen Käfig ſofort das Futter an. Ob ſie es auf die Dauer verträgt, das iſt die Frage! Daß man eine ſolche Meiſe nicht um einen niedern Preis feilbieten kann, iſt ſelbſtverſtändlich. —

Mögen dieſe Zeilen, wenn ſie auch noch ſo peſſimiſtiſch aufgefaßt werden können, doch dem maſſenhaften Fang Abbruch thun, zumal die Meiſen zu den nützlichſten Vögeln, die wir haben, gehören.

(Wir ſind mit dem Herrn Verfaſſer nicht ganz einverſtanden und werden unſere Meinung in der nächſten Nummer auseinanderſetzen. D. L.)

Anfragen u. Auskunft

Herrn Fr. Mangelsdorff: 1. Der rothrückige Würger iſt nicht beſonders ſchwierig einzugewöhnen und bei ſorgfältiger Pflege dauert er jahrelang gut aus. Seine Eingewöhnung geſchieht im leicht verhüllten Nachtigalkäfig mit friſchen Ameiſenpuppen, Mehlwürmern, Mehlkäfern und anderen größeren Kerbthieren: Maikäfer, Heuſchrecken, dickleibigen Schmetterlingen u. a. m. Wenn man einen Vogel bekommt, der bei Tag und Nacht im Käfig umhertobt, ſo iſt dies in der Regel ein alter Würger und nicht ſelten ein großer Künſtler im Geſang, dem man dann die Spitzen der längſten Schwingen mit ſtarkem Zwirn feſt zuſammenbindet. Er wird bald nicht mehr gegen die Decke des Käfigs ſpringen, ſondern ſeinen Pfleger kennen lernen. Selbſtverſtändlich darf aber weder dieſer, noch eine andre Perſon ihn ſtören, nur beim Füttern beſchäftige man ſich ein wenig mit ihm. Bereits nach einigen Wochen darf man mit der allmählichen Gewöhnung des Würgers an ein Miſch- und Univerſalfutter beginnen, indem man unter ſolches friſche und auch einige getrocknete Ameiſenpuppen gibt und letztere von Tag zu Tag vermehrt, bis erſtere ganz fortfallen. Das Miſchfutter muß beſtehen aus getrockneten Ameiſenpuppen, geriebener, nicht zu ſaftiger Möre, geriebnem altbacknem Weißbrot und etwas Weißwurm, ſodaß das Ganze eine lockre, zarte Maſſe bildet. Dazu geben Sie täglich 10–15 Mehlwürmer und abwechſend etwas rohes oder gekochtes magres Rindfleiſch oder Herz, in kleine Würfel geſchnitten, nach Herrn Kullmann's Vorſchlag als beſondere Leckerei auch ein wenig Rahm oder Haut von abgekochter Milch. Die Sitzſtangen für den Würger müſſen von verſchiedener Dicke ſein. 2. Der Würger hat keinen nennenswerthen eigenen Naturgeſang, ſondern er iſt ein vorzüglicher Spötter, der alle anderen Vogelgeſänge, alſo von Nachtigal, Feld- und Haidelerche, den verſchiedenen Grasmücken und Laubſängern und vielen anderen mehr mit ſeinem eigenen Liede vermiſcht und zum harmoniſchen Ganzen vereinigt. Herr Karl Kullmann ſchrieb hier i. J. 1893: ... Die Kunſt des rothrückigen Würgers, deſſen Gedächtniß einfach ſtaunenerregend iſt, richtet ſich ſelbſtverſtändlich nach der Oertlichkeit, wo er mehr oder weniger viele und gute Vogelgeſänge zu hören bekommt und dies erklärt die Thatſache, daß man manchmal wirklich ſchlechte, einſeitig ſingende Vögel dieſer Art bekommt, woran nur der Niſtort, nicht der Vogel ſelbſt, die Schuld trägt ... Ich ſelbſt beſitze einen ſehr guten Vogel, der etwa zwanzig Vogelgeſänge treu nachahmt, ebenſo Lock- und Warnrufe derſelben, jedoch nur einzelne Geſänge vollſtändig, andere bruchſtückweiſe". Der Genannte erwähnt noch den Würger eines Freundes, der die Geſänge und Rufe von 23 verſchiedenen Vögeln tadellos nachahmte. 3. Natürlich kann nur ein Wildfang derartiges leiſten. Aus dem Neſt genommene und aufgepäppelte Würger können nur dann bedeutende Geſangskünſtler werden, wenn ſie viele gute Sänger in ihrer Nähe haben. Dann muß der Würger ſo aufgehängt werden, daß die anderen Vögel ihn nicht ſehen können, weil ſie ſich vor ihm fürchten.

Herrn Dr. P. **Kronthal**: Durchgreifende Veränderungen im Gefieder der Vögel durch Verfütterung von Farbkörpern ſind ſeit Jahrzehnten vornehmlich in England erzielt worden und zwar mit Kanarienvögeln durch Fütterung mit Kayennepfeffer. Sodann hat vor etwa zehn Jahren Herr Chemiker Dr. Sauermann in Dahme ähnliche Verſuche mit verſchiedenen Vögeln, auch Hühnern und mit verſchiedenen Farbſtoffen gemacht. Seine dabei gewonnenen Erfahrungen hat er hier in den Jahrgängen 1887, 1888, 1889 und 1890 mitgetheilt.

◆

Briefliche Mittheilungen.

... Am 12. März hatte ich Gelegenheit, in Steglitz bei Berlin, bei dem ſogenannten Fichteberg Abends 6¾ Uhr eine Schleiereule zu beobachten. Ich ſah ſie von dem benachbarten Felde, wo ſie wahrſcheinlich der Mäuſejagd obgelegen hatte, aufſteigen. Nachdem ſie einige Male über die Straße, die menſchenleer und in jenem Theil noch wenig bebaut iſt, hin- und hergeflogen war, verſchwand ſie geräuſchlos in den Kronen der Kiefern. Schon vor etwa 7 Jahren hatte ich Gelegenheit, in Friedenau Abends eine Schleiereule zu ſehen und aus dieſen beiden Fällen geht doch hervor, daß dieſer Vogel hin und wieder auch in unmittelbarſter Nähe Berlins vorkommt, was ich bisher nicht geglaubt hatte. — Können Sie die von Berlepſch'ſchen Niſtkäſten für Stare empfehlen. Mir erſcheinen ſie ohne Sitzpflock etwas zu tief und eng. Aber ich habe in unſerm Garten einen aufgehängt und harre der Dinge, die da kommen ſollen. Hoffentlich wird er bezogen werden, ſowie theilweiſe die vielen anderen Käſten, die unſern Garten zieren. **Otto Büſing**.

(1. Weshalb ſollte die Schleiereule nicht in den Vororten von Berlin vorkommen? Sogar im Weichbilde unſerer Hauptſtadt ſind Eulen im Lauf der Jahre mehrfach beobachtet. In Friedrichshagen bei Berlin fing vor einigen Jahren ein mir bekannter Herr einen Waldkauz, der im Zimmer lange Zeit gehalten und zahm wurde und Nachts ſeinen Ruf erſchallen ließ. 2. Die von Berlepſch'ſchen Niſtkäſten werden von allen Autoritäten auf dem Gebiet des Vogelſchutzes für praktiſch anerkannt und auch ich bin dieſer Anſicht. Dr. R.)

◆

Zu unſeren Bildern.

Drei Hochgebirgsbewohner, Bürger der deutſchen Alpen ſind es, die uns der Künſtler auf dem heutigen Bilde vorführt. Es iſt uns nur ſelten vergönnt, ſie aus eigner Anſchauung kennen zu lernen, wenn ſie in unſere zoologiſchen Gärten gelangen. Der ſchönſte Schmuck des Gebirges iſt der **Alpenmauerläufer** (Certhia muraria, *L.*), deſſen Heimat ſich über die felſigen Hochgebirge Mittel- und Südeuropas ſowie Mittelaſiens erſtreckt. Nur auf dem höchſten Gebirge an ſenkrechten Felswänden kann man ihn beobachten, wie er gewandt und unruhig mit gelüfteten Flügeln und geſpreiztem Schwanz umherklettert, wobei er ſich der Flügel, niemals des weichfedrigen Schwanzes als Stütze bedient. Mit ſeinem langen Schnabel holt er Fliegen, Spinnen, Ameiſen u. a. Inſekten zwiſchen den Fugen und Ritzen des Geſteins hervor. Er niſtet in Löchern und Spalten hoher Felſenwände. Sein Geſang iſt kurz, aber melodiſch und von einem Beobachter ſogar in Noten geſetzt worden. Obwol dieſer Vogel ſich auf den erſten Blick nicht zum Stubengenoſſen eignet, iſt er dennoch von zwei ſchweizeriſchen Ornithologen Dr. Girtanner und Präparator Zollikofer im zweckentſprechenden Käfig gehalten worden. Der Käfig des Erſtern war 120 cm hoch und 90 cm breit und tief, an Rückenwand Seitenwänden mit knorrigen Rindenſtücken überzogen, auch mit einem tiefem Verſteck als Nachtlager ausgeſtattet. Alles war mit dickem Leim überſtrichen und ſtark mit grobem Sand, ſtellenweiſe auch mit kleingeſchittenem Mos beworfen; die obre Käfigdecke bildete ein Gitter. Die Fütterung beſtand aus friſchen Ameiſenpuppen, ſpäter Mehlwürmern; im Winter wurden die Vögel an gekochtes, in kleine Streifen zerſchnittenes Kalbsherz gewöhnt. — Im übrigen iſt der Mauerläufer natürlich nur ausnahmsweiſe als Stubenvogel anzuſehen und höchſtens für zoologiſche Gärten zu empfehlen, wo man ihn im großen Betriebe, in ausreichendem Raum ſo verpflegen kann, daß er den Mangel der Freiheit nicht empfindet.

Dem Liebhaber bekannter, auf Ausſtellungen zu ſehen und in Gefangenſchaft öfter zu finden iſt die **Alpen-Braunelle** (Accentor alpinus, *Gm.*), auch **Alpenflüevogel** genannt. Ihre Heimat iſt dieſelbe wie die des Mauerläufers; in Deutſchland ſoll ſie noch im Rieſengebirge vorkommen, jedoch nur vereinzelt. Sie hat einen hüpfenden Gang, ſchnellen wogenden Flug und hält ſich meiſt auf Felſen oder auf dem Erdboden auf; ſelten ſetzt ſie ſich auf einen Strauch oder gar Baum. Sie niſtet in Steinritzen oder niedrigem Geſträuch. Die Nahrung beſteht aus Kerbthieren und Sämereien. Der Geſang iſt flötend und wechſelvoll, dem der Haubenlerche ähnlich. Als Stubenvogel iſt ſie zu empfehlen, da ſie ſich ausdauernd und friedlich zeigt. Als Futter bietet man ihr ein Ameiſenpuppengemiſch nebſt einigen Mehlwürmern u. a. Inſekten, unter Zugabe von zerquetſchtem Hanf- und Mohnſamen, alles durcheinander gemengt, dazu auch etwas Grünkraut (Vogelmiere u. a.).

Die Heimat des **Alpenſchneehuhns** (Tetrao alpinus, *L.*) erſtreckt ſich über den hohen Norden von Europa, Aſien und Amerika, ſowie über die hohen Gebirge dieſer Erdtheile. Sein Aufenthalt iſt die Grenze des ewigen Schnees, in einer Höhe von 6000 Fuß und mehr über der Meeresfläche, wo der Holzwuchs aufhört; nur im Herbſt geht es tiefer hinab. Es iſt Stand- und Strichvogel. Die ſtrengſte Kälte ſoll auf dieſe Vögel nicht den mindeſten Einfluß ausüben, da ihr dichtes Gefieder ſie ſchützt, auch vermögen ſie mit Leichtigkeit den Schnee ſo tief aufzuſcharren, bis ſie an die Pflanzendecke des Bodens gelangen, wo ſie Nahrung finden. Letztere beſteht in allerlei Pflanzenſtoffen, ſowie Inſekten. Seinen Neſtplatz wählt das Schneehuhn unter Steinen, Geröll oder kleinen Gebüſchen. Zollikofer hatte in einem Zimmer, deſſen Boden mit Raſen belegt war, ein Schneehuhn, welches ſich bei der Fütterung mit Heidelberen, friſchen Ameiſenpuppen, Mehlwürmern und verſchiedenen Sämereien gut erhielt.

* * *

Zu den anmuthigſten und beliebteſten Vögeln unſerer Heimat gehört der **Gartenlaubvogel** oder **Gelbſpötter** (Sylvia hypolaïs, *L.*), deſſen lieblichen Geſang der Naturfreund ſowol im Freien, wie in der Häuslichkeit gern lauſcht. Die heutige Abbildung veranlaßt uns, einen Blick auf ſeine Naturgeſchichte zu werfen, indem ſie uns Weibchen, Neſt, Ei und Jugendkleid vorführt. Männchen und Weibchen ſind ſchwer zu unterſcheiden; das Gelb des Unterleibs iſt beim Männchen lebhafter, ebenſo der lichte Streif über den Augen; bei friſch gefangenen Männchen zeigen ſich am Scheitel, wenn die Kopffedern gegen die Schnabelſpitze aufgeblaſen werden, drei borſtenartige, ganz feine Federchen, welche die übrigen Scheitelfedern überragen. Zur Brut ſchreitet das Par nur einmal im Jahr, gegen Ende Mai. Das Neſt ſteht 1 bis 4 m hoch in Flieder-, Hollunder-, Haſel-, Faulbaum- und ähnlichem Gebüſch, in dichten Wipfeln einzelner Bäumchen, auch auf den unteren Aeſten hoher Bäume oder in jungen Nadelholzſtämmen. Es wird ſehr künſtlich aus trocknen Halmen und Faſern gefilzt. mit Pflanzenwolle und Kerbthiergeſpinnſten ausgelegt und mit Haren und Federn ausgerundet; es iſt offen und hat eine ſpitzbeutelförmige Geſtalt. Das Gelege beſteht aus 4 bis 6 Eiern von 17 mm Länge und 13 mm Dicke, die auf roſaröthlichem Grunde mit röthlichſchwarzen Punkten gezeichnet ſind. Sie werden 13 Tage zumeiſt vom Weibchen bebrütet, das nur in den Mittagsſtunden vom Männchen abgelöſt wird. Das Jugendkleid iſt düſter gelblichgrüngrau, oberſeits dunkler. Schnabelwinkel und Rachen ſind rothgelb. Die Jungen verlaſſen frühzeitig das Neſt. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Das ſeit vielen Jahren allſeitig bekannte, ſtets fachmänniſch beſtens bewährte und abſolut reelle

Special-Geſchäft
für die
Liebhaberei
der
beſten
Singvögel
(Inh.: Mathias Rausch),
Schriftſteller für Stubenvogelkunde,
Mitglied der Ornithologiſchen Section
der k. k. zool.-botaniſch. Geſellſchaft ꝛc.
Wien,
VII/3. Bezirk, Schottenfeldgaſſe 95,

wird hiermit allen Vogelfreunden und wirklichen Kennern des guten Vogelgeſangs in empfehlende Erinnerung gebracht. — **Preisliſten** koſtenlos und poſtfrei **bei genauer Angabe über welche Vogelart.** Zahlreiche Anerkennungen der hohen Herrſchaften und der erſten Vogelkundigen der Welt.

Die beſten
Käfige für Weichfreſſer,
einzig brauchbar in ihrer Art.
[651]

Zeiſige 1,25 ℳ, **Alpenſtiglitze** 1,80 ℳ, **Rothhänflinge** 2 ℳ, **rothe Kreuzſchnäbel** 1,50 ℳ, **Schneeammern** 3 ℳ, **Kappenammern** 3 ℳ, **ff. Haidelerchen** 4 ℳ, auch Weibchen, **Rothkehlchen** 1,50 ℳ, **Blaukehlchen** 5 ℳ, **ff. Amerik. Spottdroſſeln** 12 ℳ, **Sonnenvögel** 5—6 ℳ, **Importirte Zebrafinken,** Par 5 ℳ, **Imp. Wellenſittiche,** Par 7—8,50 ℳ, **Japaniſche Mövchen,** Par 4 ℳ, **Sperbertäubchen, Grünflügeltauben, Senegalfinken, Reisfinken, graue und weiße Weber, Papageien, Kanarienvögel, Eichhörnchen. Specialitäten in Vogelfutter** ꝛc. ꝛc. Alles ſichtbar verpackt. Preisliſte franko.

Jos. Beck's Vogelversandtgeschäft,
Stuttgart, Telephon Nr. 4104.
[652]

Kanarienvögel, echte Harzer Roller ohne Fehler, à St. 10, 12, 15, 20 u. 25 ℳ, mit Porto u. Verpackung u. 14 Tage Probezeit, **aber nur per Nachnahme,** nicht gefallende Vögel tauſche um oder auf Wunſch zahle zurück. Rollerweibchen 1,50 ℳ. Preisliſte frei. [653]

L. G. Müller, Vogelzüchterei,
Nordhauſen a. Harz.

C. L. Flemming,

Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen, empfiehlt **Kanarienvögel,** Männchen 5 ℳ Weibchen 1 ℳ. [654]

Feinſte

Edelroller!

mit den ſchönſten Touren, zart, tief und lang, noch ein Poſten ff. Frühbrut-Heckvögel, Dutz. 90 ℳ, Probevogel 10 ℳ, 14 Tage Probe gegen Nachnahme. [655]

A. H. Pütsch, Spezial-Züchterei,
Schönhauſen a. Elbe.

1898 erhielt mein Stamm **Harzer Kanarienvögel** 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ. u. Gar., 8 T. Pr.
Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [656

Geſucht: Granataſtrilde, Buntaſtrilde, kleine Kubafinken, gemalte Aſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen, Weibchen rothköpf. Papageiamandinen.

F. Beedzler, [657]
20, Norton Folgate, **London** (England).

Feinſte Kanarienſänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [658]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.

Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

Große gelbe Tannenzeiſige,

à Dtzd. 8 ℳ, Stck. 1 ℳ. **Rothe und gelbe Kreuzſchnäbel,** à Dtzd. 6 ℳ, Stck. 1 ℳ. **Edelfinken,** à Dtzd. 6 ℳ, im einzeln 1 ℳ. **Gelehrte Dompfaffen,** bei denen etwas an den Liedern fehlt, 10, 12 und 15 ℳ. In 8—14 Tagen auch **Stiglitze** abzugeben. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Verpackung von 60 ₰ bis 1,20 ℳ. Verſende gegen Nachnahme bei garantirt lebender Ankunft.

[659] **Rich. Faulstich,**
Finſterbergen b. Friedrichsroda i. Th.

Dompfaffen,

ſelbſtdreſſirte, 2 Lieder ff. flötend u. Garantie. Beſte Referenz. [660]

Jean Schmidt, Lehrer,
Schlotzau, Kr. Hünfeld.

Verkaufe:

1 Pärchen **Orangebäckchen** 3 ℳ, 1 Pärchen **Goldbrüſtchen** 4 ℳ, 1 Mnch. **Silberfaſänchen,** angepart, mit 1 Wbch. **Malabarfaſänchen** 3 ℳ. Die Vögel ſind geſund und brutluſtig und ſchon über ein Jahr in meinem Beſitz. Verpackung nur bei Entnahme von den drei Pärchen frei.

Frau Profeſſor **Hoppe, Göttingen,**
Geismar-Chauſſee 31. [661]

Harzer Kanarienvögel

(Trutesche Hohlroller), Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. i. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel. Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis** und **franko.** Weibchen desſelb. Stamms 2.50 ℳ [662]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Weg. Aufgabe d. Liebhaberei:

Eine **Schamadroſſel,** vorzügl. Spötter, ſelten guter u. fleißiger Sänger, 50 ℳ, eine **dito,** fleißiger Sänger, 35 ℳ, 5 St. **Goldhähnchen** à 4 ℳ, dieſelben habe über 1 Jahr, ſind ſelten zahm, kommen alle auf den Finger, 1 **China-Nachtigal** 7 ℳ, 1 **Wieſenſchmätzer,** ſelten ſchön im Geſang, 6 ℳ. Ich garantire für tadelloſe, geſunde Exemplare. [663]

C. Liebmann, Pankow b. Berl., Nordbahnſtr. 9.

---

3 Singdroſſeln, Davidzippe, prima Sänger, à 10 ℳ. **3 Schwarzdroſſeln,** rein Waldgeſ. à 8 ℳ **2 Schwarzplättchen,** Doppelüberſchl. à 7 ℳ. **2 Rothkehlchen,** Lichtſänger à 4 ℳ. **1 Steinröthel,** mit reiz. Geſang, à 14 ℳ.

Sämmtliche Vögel ſind kerngeſund, über 1 Jahr im Käfig und im vollen Geſang.

Verſandt per Nachnahme, leb. Ankunft garantirt. [664]

Heinr. Jost, St. Ingbert, Rheinpfalz.

Offerire in ſchönen Exemplaren:

Zaunkönige, Par 8 ℳ, Bartmeiſen, Par 10 ℳ, Tannenmeiſen, Par 3 ℳ, Blaumeiſen, Par 2 ℳ, Spechtmeiſen, Par 4 ℳ, Gartenammern (Ortolan), Par 5 ℳ, Rohrammern, Par 3 ℳ, Golbammern, Buch-, Tannen- und Grünfinken, Zeiſige, Girlitze, Par 2 ℳ, Haide- und Feldlerchen, Braunellen, Rothkehlchen, Stare, Stück 2 ℳ, Kalanderlerche 6 ℳ, Baumpieper 3 ℳ, Grau- u. Schwarzdroſſel Stck. 6 ℳ, 2 Stck. rothrückige Würger, ausgezeichnete Spötter, Stck. 8 ℳ, gut ſingende Hänflinge, Stiglitze und Edelfinken, St. 1 ℳ u. 1 ℳ.

W. Hiltmann,
[665] **Berlin S,** Dresdenerſtraße 23.

Da ich verſetzt werde,

muß ich meine Vögel umgehend verkaufen. **2 prachtvolle Pariſer Trompeter-Hähne,** Ausſtellungsthiere (Figurenkanarien), **2 Reitzugfinken,** ſowie meine **Kanarienhecke** (2 Hähne und 10 Weibchen) an Liebhaber billig. [666]

A. Osthenner,
Berlin W, Blumenthalſtraße 17, III



No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.—
No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50

Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.—**

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige für Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc. mit sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [667]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

F. Rejsek, Hamburg, Peterstr. 28

Specialität Papageien u. Papageienkäfige mit Porzellannäpfen.

Prämirt auf allen beschickten Ausstellungen,



offerirt ganz vorzüglich rein, deutlich und viel sprechende, Lieder singende und flötende, vollkommen acclimatisirte **Graupapageien,** à 60, 80, 100, 150, 200 Mk. Junge, à 18 Mk., solche schon ½ Jahr in Europa, anfang. zu sprech., à 25 bis 30 Mk., **Blaustirn-** und **Surynam-Amazonen,** à 20 Mk., schon sprech. 30, 35, 50, 60 Mk., **viel sprech., Lieder sing. und pfeifend,** 80, 100, 150, 200 Mk., je nach Leistung, grosse **Doppelgelbköpfe,** schon gut sprech., 45, 60 bis 150 Mk., grosse **Gelbnacken,** im Prachtgefieder, anf. schön zu sprech., à 25 bis 30 Mk., schon sehr gut sprechend und täglich neues lernend, 50 bis 80 Mk., **Venezuela-Amazonen,** schön im Gefieder, anf. sprech., 18 Mk., kleine und grosse **Gelbhaubenkakadus** 15, 20 Mk., **Alexanderpapageien** (Sittiche), Stück 4 Mk., Par 7 Mk., echte, frisch import. **Wellensittiche** Par 4 Mk., schon acclimatisirte Par 6 Mk. u. gr. hochamüsante zahme **Affen,** bildschöne Thiere, à 18, 20, 25 Mk. Best. **Papageienfutter** 5 Kilo mit Sack nur 2,50 Mk.

Versandt nach überall hin gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages, unter Garantie lebender und gesunder Ankunft. [668]

Bedienung sehr streng reell! Umtausch gestattet!

Verkaufe **1 Schama,** g. zahm, f. g. Sänger, 36, 1 Schwarzkopf, f. Sänger Ueberſchl., 6, 1 Singdroſſel 5, 1 Lerche 3 ℳ. D. Vögel ſ. a. tadellos i. Gef. u. 1½ Jahr i. Käfig. Verpack. fr. [669] **A. Nickel,** Bildhauer, **Gleiwitz,** O.-S., Kloppotſtraße 12.

Jene P. T. Herren

Vogelliebhaber,

welche für verhältnißmäßig wenig Geld **wirklich gute und ſeltene Sproſſer, Nachtigalen, Schwarzköpfe** und andere edle Stubenvögel zu erwerben wünſchen, belieben ihre genauen Adreſſen unter „**Vogelfreund**“ an die Expedition der „Gefiederten Welt“ einzuſenden. [670]

Sehr ſchöne Kappenammern, Männchen 4 ℳ, Par 7 ℳ; **2 Blaudroſſeln,** Männchen, St. 15 ℳ, empfiehlt unter Gewähr für lebende Ankunft [671]
Johann Rohracher, Lienz, Tirol.

---

[672] **Abzugeben**

oder umzutauſchen **ein dreijähriger, ſchwarzer Pudel,** Rüde, kl. Raſſe, ſehr klug, gelehrig, wachſam u. treu. Näheres unter **A. B. 20** durch die Expedition.

Kaufen [illegible] jeden Poſten Weichfreſſer, [illegible]
Gebr. Haas,
Hoffſtetten b. Gemünden a. M.

Bücher-Anzeigen.

In unſerm Verlage erſchien:

Naturgeſchichte der deutſchen
Sumpf- u. Strandvögel
von **Dr. Curt Floericke.**
Mit 41 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck.
Broch. ℳ 4.50, geb. ℳ 5.50.

Dieſes, eine höchſt intereſſante, noch wenig bekannte Vogelgruppe behandelnde Werk iſt in der Hauptſache auf Grund eigener Beobachtungen des Verfaſſers entſtanden, und ſo reizvoll geſchrieben, daß es das volle Intereſſe jedes Naturfreunds, Jägers oder Landmanns in Anſpruch nehmen muß.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Für Aquarienliebhaber!

Im unterzeichneten Verlage erſcheint
Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde
herausgegeben von **Dr. E. Bade.**
(Monatlich [illegible])
Preis: halbjährlich Mk. 2.50
Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in Magdeburg.

Bei uns erschien:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von **Dr. Karl Russ.**

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhdlg.
in Magdeburg.

Für Beſitzer des

Handbuch für Vogelliebhaber

von **Dr. Karl Ruß**

in früheren Ausgaben ſtehen die dem Werke jetzt beigegebenen Illuſtrationen, beſtehend in
28 Vollbildern fremdländiſcher Stubenvögel
(zu Band I), ſowie
25 Vollbildern einheimiſcher Stubenvögel
(zu Band II)
für den Preis von je nur 1 Mark
durch jede Buchhandlung, ſowie in der unterzeichneten Verlagshandlung ſelbſt zu Dienſten.

Das **Illuſtrirte Handbuch** koſtet auch jetzt noch, wie bisher, für
Bd. I (Fremdl. Stubenv.) broch. 6.50, geb. 8 ℳ
„ II (Einh. Stubenv.) „ 6.—, „ 7.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.



In unſerem Verlage erſchien:

Der Graupapagei,

ſeine Naturgeſchichte, Pflege und Abrichtung.

Von

Dr. Karl Ruß.

Mit einem Aquarelldruck u. 3 Holzſchnitten im Text.
Preis: geh. M. 1,80; eleg. geb. 2,10.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. – Druck von Auguſt [illegible]

Die gefiederte Welt
Wochenschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler
von
Dr. Karl Ruß

Inhalt der Nr. 15.

Einbürgerung fremdländiſcher Vögel in unſeren Fluren.
Fremdländiſche Finken (Fortſetzung).
Selten gehaltene einheimiſche Vögel (Fortſetzung).
Liebe und Ehe im Leben der Vögel.
Anfragen und Auskunft. — Aufruf.
Zu unſerem Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [673]

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten. Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko. Man verlange Preisliste.

Neſteier von Milchglas,
per Dutzend 60 Pfennige, offerirt
Heinrich Nolte,
Glaswerke Marſchallshagen
[674] b. Lichtenau i. Weſtfalen.
P. S. Wiederverkäufer entſprechender Rabatt.

Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [675]
☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜
Arthur Herrmann & Luther, Oschatz i. S.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[676] **R. Schröter,** Clingen-Greußen.

Der beſte Fangapparat
für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [677]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Schädliche Inſekten im Obſt- u. Gartenbau
werden am ſicherſten durch Meiſen vertilgt.
Niſtkäſten für Meiſen aus Rundholz Stück 35 ₰, 10 Stück 3 ℳ, 100 Stück 28 ℳ.
[678] **Kempf, Neuforg,** Fichtelgeb.

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,
mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [679]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [680]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Ltr. 1 ℳ. Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen,** M.-Gladbach 112.

Kaufe gr. Zim.-Voliere f. Exot. Off. m. Beſchr. a. **Breuel, Leipzig-R., Commeniusſtr. 1.** [681]

Futtermittel.

Drosselfutter,
extra ℳ 1,20 per Ko., Ia ℳ 1 per Ko. **Nachtigalenfutter** Ko. ℳ 1,50, Packet 50 ₰; ſämmtliche Vogelfutter in geeignet. Qualitäten, für Finken, Lerchen, Meiſen, Exoten, Papageien, Prachtfinken ꝛc. Ko. 60 ₰. Preisliſten über Vogelbauer mit 100 Abbild. an Beſteller gratis. [682]
E. Göller, Köln a. Rhein.

Mehlwürmer in guter ſauberer Ware, das Liter 4 ℳ, Kilo 7,50, Verpackung frei. Adreſſen unter **R. K.** an die Exped. der Gefiederten Welt. [683]

Mehlwurmzüchterei
empfiehlt prima Würmer à 4,— ℳ [684]
F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

☞ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **ſachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [685]

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter
für inſektenfreſſende Singvögel.
Wegen Erkrankung unterbleibt der Verſandt des Miſchfutters von heute ab. — Die Wiederaufnahme des Verſandes wird angezeigt.
Otterberg (Pfalz), 5. April 1899.
Max Kruel,
[686] **Apotheker.**

Mehlwürmer,
rein reell gemeſſen, nur prachtvolle große Futterwürmer, Ltr. 5,— ℳ, Kilo 8,— ℳ, 1000 Std. 1,60 ℳ. **Anweiſung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer** 30 ₰, **Ameiſeneier,** nur feinſte, ſtaubfreie Ware, pr. Ltr. 70 ₰, Kilo 3,—, 10 Ltr. 6,50 ℳ, **Weißwurm** feinſter Beſchaffenheit, Ltr. 80 ₰, **Vogelleim, Netzfallen, Neſter,** Samen u. a. Preisliſte poſtfrei. **Verpackung frei.** [687]
Theodor Frank, Barmen.

Frische Ameiseneier
liefere von Ausgangs April bis Auguſt à Ltr. 1 ℳ **Joseph Böning,**
[688] Braunſchweig, Klint Nr. 3.

Universalfutter
für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt
[689] ſandfrei.
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Ja! Ja! es ist wahr!
Ich verſende nur ſaubere Ware. [690]
Futter für: **Prachtfinken, Reisfinken, Kardinäle, Sittiche, Papageien** (große), **Dompfaff** und **Waldvögel** (als Hänfling, Stieglitz, Zeiſig, Fink) je 5 Ko. 2 ℳ. Bei Entnahme von 3 Poſtkolli füge ich eine ſelbſtthätige Trinkflaſche, ſehr praktiſch für Vögel, gratis bei.
H. P. Lange, Samenhdl., Gottesberg i. Schl.

Vögel.

Verk. 2,2 jap. **Mövchen,** Par 3,50 ℳ, m. Verp. zuſ. 6 ℳ. [691]
K. Rusch, Rieſa, Schloßſtr. 8.

Die gefiederte Welt.

Wochenschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

[illegible]

[illegible]

Fremdländiſche Finken.

Von K. Ruß.

(Fortſetzung).

Der allbekannte Hartlaubs- oder Mozambikzeiſig (Fringilla butyracea, var. Hartlaubi, *Bll.*), deſſen Heimat ſich von Senegambien bis zum Kapland und bis nach Abeſſinien, ſowie über Madagaskar erſtreckt, iſt bei allen Vogelwirthen beliebt, da er ſich ausdauernd und gegen kleinere Vögel friedlich zeigt, auch leicht zur Brut ſchreitet. Er niſtet meiſt im Harzer Bauerchen, auch im offenen Neſtkörbchen, ſelten oder niemals frei im Gebüſch. Das Neſt wird aus feinen Gräſern, Baſt und Papierſtreifen, Baumwoll- und anderen Fäden, Pferdeharen u. a. geformt, im Innern mit zarten Gräſern und Würzelchen glatt ausgerundet. Das Gelege beſteht aus vier gelblichweißen, fahlgelb gefleckten Eiern, die in 13 Tagen erbrütet werden. Auch als Sänger iſt der Hartlaubszeiſig bei anſpruchsloſen Liebhabern geſchätzt, da er einen wohlklingenden Lockruf nebſt ſchmetterndem Schlag, wechſelnd mit lautem, melodiſchem Flötenton hören läßt.

Der nächſte Verwandte iſt der gelbſtirnige Girlitz (Fringilla flaviventris, *Gml.*); er unterſcheidet ſich vom vorigen durch beträchtlichere Größe, einen breiten und langen Streif über der Stirn und dem Auge hinweg bis zum Hinterkopf, ſowie durch die olivengrüne Färbung an Wangen und Bürzel. Heimiſch iſt er in Südafrika und auf der Inſel St. Helena. Er gehört zu den beſten Sängern unter den fremdländiſchen Finken. Gleich dem Hartlaubszeiſig iſt er friedlich, ausdauernd und leicht züchtbar. Das Neſt wird im dichten Gebüſch nicht hoch über der Erde erbaut und bildet eine große offne Mulde, außen von feinen Reiſern, innen aus Faſern, Würzelchen, Wolle geformt und mit Pferdeharen zierlich ausgerundet. Das Gelege beſteht aus vier bis fünf grünlichweißen, zart roth und braun ringförmig gefleckten, zuweilen abändernden Eiern.

Seltener im Handel, wol auch öfter mit dem vorigen verwechſelt, iſt der ſchwefelgelbe Girlitz (F. sulfurata, *L.*): oberſeits olivengrünlichgelb, bräunlich ſchaftſtreifig; Zügel-, Kopf- und Halsſeiten nebſt Rücken olivengrün; Augenbrauenſtreif bis Kopfſeiten, Backenſtreif und Kehle zitrongelb; Flügel braunſchwarz mit zwei gelblicholivengrünen Binden; Bürzel und obere Schwanzdecken grüngelb; Schwanzfedern braunſchwarz, ſchmal olivengrünlich geſäumt; Oberbruſt und Seiten olivengrünlichgelb, übrige Unterſeite zitrongelb; Schnabel hell hornbraun, Unterſchnabel heller gelblichweiß; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichgrau. Weibchen düſtrer bräunlichgrün. Die Heimat iſt Südafrika. Als Stubenvogel zeigt er dieſelben Eigenſchaften, wie die Verwandten.

Neuerdings häufiger eingeführt wurde der Bartgirlitz (F. barbata, *Heugl.*): dem Hartlaubszeiſig ſehr ähnlich, aber mit gelbgrünem Scheitel und Mantel, mit deutlichen ſchwärzlichen Schaftſtrichen, ohne Beimiſchung von Grau; Wangen gelb, Ohrgegend gelbgrün, Backenſtreif ſcharf begrenzt ſchwarz; Weibchen blaſſer, oberſeits mehr olivengelbgrünlich mit ſchmälerm gelbem Stirnband, weißem Kehlfleck und ſchwärzlicholivenfarbnem Augenbrauenſtreif; über dem Kropf eine aus ſchwärzlichen Flecken gebildete, theilweiſe doppelte Querbinde. Sein Verbreitungsgebiet iſt der Sudan, nebſt Abeſſinien, bis nach Britiſch-Oſtafrika hinein. (In Deutſch-Oſtafrika hat man ihn nicht gefunden.) Er gelangte erſt vor wenigen Jahren in größerer Zahl in den Handel und hat ſich als empfehlenswerther Stubenvogel bewährt.

Nur einmal im Jahr 1877 lebend eingeführt wurde Hagenbecks gelbköpfiger Girlitz (F. imberbis, *Cab.*): goldgelb, Rücken auf düſter gelbem Grunde braunſchwarz geſtrichelt; Flügel- und Schwanzfedern braunſchwarz mit gelben Außenſäumen. Heimat: Deutſch-Oſtafrika.

Zwei nahe verwandte, ebenfalls in Abeſſinien und Deutſch-Oſtafrika heimiſche Arten, die den vorigen ſehr ähnlich und vielleicht ſchon öfter in den Handel gelangt ſind, ohne als neue Art erkannt worden zu ſein, haben wir in dem gelbrückigen Girlitz (F. flavivertex, *Blanf.*) und dem braungeſtreiften Girlitz (F. dorsostriata, *Rchw.*) vor uns. Erſterer iſt an Stirn und Scheitel goldgelb; Hinterkopf, Nacken und Rücken ſind olivengrün, dunkel geſtrichelt, Bürzel und Unterſeite düſter gelb; der Zügel iſt ſchwärzlich; Flügel- und Schwanzfedern ſind braunſchwarz mit breiten gelben Außenſäumen. Letztrer erſcheint oberſeits auf fahl gelbgrünlichem Grunde dunkelbraun geſtrichelt; Stirn und Bürzel ſind rein gelb, ebenſo Augenbrauen, Wangenſtrich und Unterſeite, die Weichen braun geſtrichelt, Bauchmitte weiß. Das Weibchen iſt blaſſer.

Den Beſchluß dieſer Gruppe macht der Alariofink (F. alario, *L.*, s. bistrigata, *Sws.*), auch ſchwarzköpfiger Rothgirlitz genannt. Er iſt an Kopf, Kehle und Oberbruſt ſchwarz; Oberkörper, Flügeldecken und Schwanz braun, Schwingen ſchwarzbraun, mit ſchmalen fahlen Spitzenſäumen, Hals und Bruſtſeiten weiß, der übrige Unterkörper bräunlich weiß; das Weibchen iſt oberſeits fahlgrün, fein dunkel geſtreift; Bürzel und Flügel bräunlichgrau, letztere mit zwei gelbbraunen Binden; Schwanzfedern braun, ſchwarz geſäumt; ganze Unterſeite gelb. Im Kaplande ſoll er weit verbreitet ſein, familienweiſe in niedrigen, dornigen Gebüſchen leben, ſich von Gräſerſämereien ernähren und mit Prachtfinken (Grauaſtrilden und Helenafaſänchen) gemeinſchaftlich in größeren Schwärmen umherſchweifen. (Letzteres wird wol die Veranlaſſung dazu ſein, daß ihn manche Reiſende für einen Verwandten der Prachtfinken anſehen.) Im Handel iſt er ſelten. Als Stubenvogel zeigt er ſich friedlich und harmlos und läßt fleißig einen ſanft flötenartigen, leiſen Geſang hören. Miſchlinge mit Kanarienweibchen ſind bereits öfter gezüchtet. (Fortſetzung folgt.)

* * *

[illegible]

[illegible]

III. Die Sumpfmeiſe.

Sie iſt einer unſerer nützlichſten Baumbeſchützer, der unermüdlich den ganzen Tag über an den Ritzen der Baumrinde und an wurmſtichigen Aeſten herumhämmert und ſich dabei oft fette Biſſen verſchafft; jedoch hat er in ſtrengen Wintern auch ſeine liebe Noth um's tägliche Brot, beſonders wenn die Bäume mit Glatteis überzogen oder von dichtem Schnee bedeckt ſind. Jedoch weiß ſich der kleine Vogel im grauen Mäntelchen und ſammetſchwarzer Kappe zu helfen, er kommt dann dicht an menſchliche Wohnungen heran und klopft mit ſeinem unermüdlichen Schnäbelchen an's Fenſter, und wer könnte es da über's Herz bringen, ihm eine kleine Gabe abzuſchlagen? Er nimmt ja mit allem fürlieb, beſonders gern aber hat er Nüſſe, die in Hälften getheilt ſind. Er fliegt mit ſeinem Theil auf den nächſten Baumaſt, hebt die Nußſchale gleich einer Schüſſel mit ſeinen geſchickten Zehen und läßt ſich deren Inhalt köſtlich munden, um gleich darauf wieder an den Freitiſch zurückzukehren, um eine weitere Gabe zu holen. Mein Kind füttert jedes Jahr eine ganze Schar ron hungrigen Gäſten mit ſeinen in goldene Hüllen gekleideten Chriſtbaum-Nüſſen, auf einem vor dem Fenſter angebrachten Futterbrette, welches ich mit 5 cm hohen Leiſten verſehen habe, damit nicht zuviel vom dargereichten Futter durch den plötzlichen Andrang aller möglichen Koſtgänger im Schnee verloren gehe. Man füttere außer Nüſſen auch Hanfſamen, Mohn, Sonnenblumenkerne, Kürbis-, und Gurkenkerne, ſowie auch Haſelnüſſe; ferner Talg und rohen Speck, in Milch geweichtes Weißbrot und Kartoffelſtückchen. Es finden ſich da nebſt der Sumpfmeiſe auch Kohl- und Blaumeiſen, ſowie der Kleiber, Finken, ſelten auch Ammern und Sperlinge ein. Im Zimmer gehalten, füttere man die Sumpfmeiſe mit allen hier erwähnten Futterſorten, außerdem gibt man auch Morrübe mit Semmel untermiſcht, Ameiſeneier oder das käuflich fertige Miſchfutter. Auch vergeſſe man nicht, ihm des Tags einige Mehlwürmer zu reichen, damit er recht lebhaft und munter bleibe. Dieſe verſpeiſt er nicht ganz. ſondern hebt dieſelben mit den Zehen, die er ſo gut wie wir unſere Finger zu gebrauchen verſteht, und beißt ſchnell nacheinander kleine Stückchen herunter. Sehr geſchickt weiß er die runden Hanfkörner zu drehen und mit dem Schnäbelchen zu bearbeiten. Er macht ein ganz kleines rundes Löchlein in die Schale und höhlt dieſelbe dann kunſtgerecht aus, ohne ſie zu zerbrechen; er erinnert uns dabei durch ſeine drolligen Gebärden an das Eichhörnchen. Hat er ſich nun für einige Zeit ſatt gegeſſen, ſo geht es an das Hämmern; wo er nur herankommen kann, zimmert er am Holz herum und macht Spähne weshalb für ihn am beſten ein Kiſtenkäfig mit Drahtgitter paßt. Bei Holzſtäben hat er ſich in kurzer Zeit einen Ausgang gemeißelt; es hat dann den Anſchein, als hätte eine Maus ein rundes Loch hineingenagt. Ich ſelbſt wurde eine Zeit lang ſo getäuſcht, bis ich einmal Zeit fand, den kleinen Zimmermann genauer zu beobachten. Er iſt ein allerliebſter kleiner Kerl, nimmt ſchon nach drei bis vier Tagen die Mehlwürmer aus der Hand und iſt viel leichter einzugewöhnen als die Kohlmeiſe. Sein Geſang iſt ein liebliches Flöten und ſogar wechſelvoll. Er pflegt während des Tages ſich zu öfteren Malen in ein lauſchiges Winkelchen zurückzuziehen und ein Schläfchen zu halten; es iſt aber auch nicht zu verwundern, er muß ja bei ſeiner anſtrengenden Arbeit müde werden. Ich gab ihm als Schlafſtelle einen ausgehöhlten Melonenkürbis in ſein Häuschen, befeſtigte denſelben mittels Draht in einer Ecke, ließ ein rundes Loch von der Größe eines Zweimarkſtücks und füllte den Kürbis bis zu einem Drittheil mit weichem, trocknem Mos aus. Dort ſchlief er wie ein Fürſt. Ich machte oft meine Betrachtungen des Abends mit dem Licht, er ließ ſich jedoch garnicht in ſeiner Ruhe ſtören. Er ſah mich wol fragend an, jedoch im nächſten Augenblick ſteckte er ſein Köpfchen wieder in die Federn und träumte weiter. Ein Pärchen liebt ſich gegenſeitig auf das zärtlichſte; ſie ätzen ſich, wie die Alten ihre Jungen, und rufen einander beſtändig zu. Sie ſind in Gefangenſchaft auch zum Niſten zu bringen und gewähren dem Liebhaber von Meiſen viel Vergnügen. Einzeln halte man ſie nur während des Winters gefangen, denn im Frühjahr ſind ſie, ſobald ſich der Geſchlechtstrieb einſtellt und nicht befriedigt werden kann, wie alle übrigen Meiſenarten der Epilepſie unterworfen. Man laſſe ſie deshalb, ſowie ſich dieſe Symptome zeigen, was leicht zu erkennen iſt (ſie fallen plötzlich vom Sprungholz herunter, federnaufſträubend und flügelſchlagend, verbunden mit ängſtlichem Kreiſchen, werden auch wol raſch hintereinander in die Höhe geworfen), lieber wieder frei. Während des Ausbruchs der Krankheit hüte man ſich, ſie zu berühren, weil ſich ſonſt häufig ein Starrkrampf dazu geſellt und ein Schlagfluß ihrem Leben ein Ende macht. Iſt jedoch der Krampf vorbei, der in der Regel kaum länger als eine Viertelſtunde andauert, ſo gebe man dem davon Befallenen ſofort die Freiheit. Bei Pärchen zeigt ſich dieſe Krankheit nur in den ſeltenſten Fällen, weshalb man ſie alſo nur gepart während des Sommers halten ſoll.

IV. Der Kleiber (auch Baumrutſcher und Blauſpecht genannt).

Der Kleiber, deſſen Aufenthalt Obſtgärten und Vorhölzer ſind, kommt im Winter auch zu den Menſchen, um ſich eine Gabe zu holen. Daß er ein ſehr nützlicher und eifriger Vertilger aller Baumſchädlinge iſt, die er aus der Rinde hiervon befallener Bäume herausmeißelt, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. Seine Brut hat er in hohlen Bäumen. Er trägt für den Winter in die Vorrathskammern, deren er verſchiedene beſitzt, und von denen er alle unbefugten Eindringlinge verjagt. Im Winter vor dem Fenſter gefüttert, verzehrt er nichts ſofort, ſondern trägt alles in ſeine Behauſung, aber nicht etwa Stück für Stück, ſondern ſoviel wie er nur tragen kann. Dabei kommen ſeine nahen Verwandten, die Meiſen, am Futterbrett ſchlecht weg, denn er duldet, während er da iſt, keinen Nebenbuhler, es muß ihm alles ausweichen. Er nimmt zehn bis fünfzehn Hanfkörner in ſeinen Schnabel, welchen er alſo gleichſam als Taſche gebraucht. Nach meiner Beobachtung trägt er in einer Viertelſtunde eine ganze Handvoll Hanfkörner in ſeine Höhle, und kommt nach jedesmaligem Abflug in wenigen Sekunden wieder zurück. Am Futterbrett iſt er leicht mit Roßharſchlingen oder im Meiſenſchlag zu fangen, da er nicht im geringſten mißtrauiſch iſt. Im Kiſtenkäfig iſt er ohne Schwierigkeit zu halten. Man ſtelle ihm jedoch einige morſche Baumſtümpfe hinein, an denen er meiſterhaft auf und ab rutſcht. Dies iſt überhaupt für ſeine Naturbeſchaffenheit unbedingt nöthig, da er das Futter nicht wie die Meiſen in den Zehen hält, ſondern nach Art der Spechte in eine von ihm ſelbſt gemeißelte oder ſchon vorhandene Ritze zwängt und dann davon kleine Stückchen abhackt. Zu füttern iſt er im Käfig mit Nüſſen, die er ſelbſt öffnet, Bucheckern, Eicheln, Kaſtanien, Hanfkernen, Kürbiskernen und allerlei Sämereien, auch mit Talg- und Speckſtücken, rohem und gekochtem, klein zerſchnittenem Fleiſch und Morrübe (gerieben und mit Semmel gemiſcht, oder auch gekocht, klein zerſchnitten und mit Mohnmehl untermengt). In Milch geweichte Semmel, Quargkäſe und Kartoffelſtückchen nimmt er ſehr gern, ebenſo das Weiße vom hartgekochten Hühnerei, in längliche Streifen geſchnitten, ſodaß es wurmähnlich erſcheint. Auch liebt er Ameiſenpuppen ſehr, entweder friſche oder getrocknete und wieder aufgequellte oder angebrühte. Eine Delikateſſe für ihn ſind die Mehlwürmer und die Engerlinge, ſowie auch die in faulem Holz vorkommenden Holzwürmer. Hat er einmal dieſe Leckerbiſſen gekoſtet, ſo kommt er ohne Scheu heran und nimmt ſie von der Hand ſeines Pflegers. Er iſt ſogar an einen beſtimmten Lockton zu gewöhnen, welchen er jedesmal erwidert. Im Ganzen genommen iſt er als Stubenvogel angenehm und unterhaltend. Sein Geſang iſt zwar unbedeutend und leiſe, mit Ausnahme ſeines Lockrufes, den er dazwiſchen hören läßt. Einzeln gehalten, gebe man ihm im Frühling auch die Freiheit wieder, da auch er der Epilepſie unterworfen iſt. Ein Pärchen niſtet leicht im entſprechend ausgeſtatteten Käfig. Im Freien muß er überall geſchont und gehegt werden.

V. Der Zaunkönig.

Der Zaunkönig, auch Schneekönig genannt, dieſer Gnom unter unſerm heimiſchen gefiederten Volk, iſt ein allerliebſter Vogel. Er läßt ſein muntres Liedchen mitten im Winter, wenn alle anderen Vögel mit aufgeblähtem Gefieder in Baumkronen und Gebüſchen verſteckt ſitzen, erſchallen. Er kennt keine Nahrungsſorgen, denn überall findet er gedeckten Tiſch. Sein Aufenthalt im Winter iſt immer in der Nähe unſerer Wohnſtätten, wo er an Dachgiebeln, ſelbſt auf Heuböden, in Schweineſtällen, Holzſchuppen, Reiſighaufen u. a. Spinnen, Fliegen, Raupen und Puppen hervorſucht. An manchen Orten kommt er nur vereinzelt vor. Jedoch hier im Schwarzwald iſt er ſehr häufig in größerer Zahl anzutreffen, und es finden ſich in unſerm Garten alltäglich drei bis vier Männchen, deren Zahl im Allgemeinen überhaupt ſtärker vertreten iſt als die der Weibchen, ein, um ſich gegenſeitig herauszufordern und zu bekämpfen. Sie haben wirklich etwas Ritterliches im Kampf mit ihresgleichen an ſich und führen dieſe Kämpfe oft ſo lange fort, bis durch ihren Lärm eine Katze angelockt wird. Dann ſtieben ſie auseinander und flüchten ſich auf den nächſten Baum, um ihren Feind noch längere Zeit zu necken. Sie brüten hier meiſtens an den Ufern der Bäche, in natürlichen, vom Waſſer ausgeſpülten Höhlungen, auch unter kleinen Brücken, in den Mauerſpalten der Weinberge, woſelbſt die Jungen aber nur zu oft von Schlangen und andrem Ungeziefer heimgeſucht werden. In zerklüfteten Hohlwegen ſind ſie ſicherer. Man findet die Neſter immer ſehr geſchickt angebracht, ſodaß man oftmals vorbeigeht, ohne ſie wahrzunehmen; man entdeckt ſie oft nur durch Zufall. An den reißenden Gebirgsbächen werden ſie leider auch oft das Opfer eines Gewitters, da die Waſſer in nicht ſelten ſehr kurzer Zeit zu Strömen anſchwellen und dann Alles mit ſich fortreißen. Will man den Zaunkönig als Stubenvogel halten, ſo bedarf es allerdings einer ſehr guten Verpflegung, bzl. großer Aufmerkſamkeit, Umſicht und Erfahrung bei der Eingewöhnung, ſonſt würde er bald eingehen. Jedoch einmal eingewöhnt, finde ich ihn ſehr dauerhaft. Er belebt mit ſeiner Munterkeit alle übrigen im Zimmer gehaltenen Vögel und reizt dieſelben im Winter zum Geſang. Es ſollten ſich jedoch nur ganz erfahrene und bewährte Vogelwirthe mit ihm befaſſen, denn wie geſagt, er will verſtändig behandelt ſein. Als Käfig nehme man ein mittelgroßes, mit engmaſchigem Drahtgeflecht verſehenes Kiſtchen. Das Drahtgeflecht muß, wie ſchon geſagt, engmaſchig ſein, ſonſt geht es einem, wie einem mir bekannten Vogelfreund. Er ließ ſich ein Zaunkönigpar ſchicken und brachte es aus dem Verſandtkäfig in den für ihn beſtimmten großen Käfig: zur Thür hinein, durchs Gitter heraus und zum Fenſter hinaus, war das Werk eines Augenblicks! Er hatte die Vögel alſo kaum geſehen. In der Kiſte mache man dem Zaunkönig verſchiedene Schlupfwinkel zurecht, kleine Käſtchen in Form eines Starkaſtens, mit 3 cm weitem Schlupfloch verſehen und innen mit Mos ausgepolſtert. Das Aus- und Einſchlüpfen iſt ſeine zweite Natur und für ihn Lebensbedingung. Sein Futter beſtehe aus geriebenem Kalbsherz mit etwas Möre vermengt, hartgekochtem und geriebenem Hühnerei, Ameiſenpuppen, kleinen Mehlwürmern, Spinnen und Fliegen, ſowie auch gemahlenem Hanfſamen, oder man gebe ihm das ſchon fertig zu kaufende Goldhähnchenfutter. Einzelne Männchen bauen ſich eigene Vergnügungsneſter, welche ſie auch als Schlafſtelle benutzen. Ich ſtelle ein ſolches Freudenneſt der Leitung der „Gefiederten Welt“ zur gefälligen Verfügung, um es den ſich hierfür intereſſirenden Naturfreunden in Originalzeichnung vor Augen zu führen. Daſſelbe iſt aus feinen Grasriſpen dünnwandig zuſammengeflochten, mit einem kleinen Schlupfloch verſehen und an ſogenannten Pfriemen- oder Beſenſtrauchſtengeln befeſtigt. Man findet Neſter auch nur in ſeltenen Fällen, da ſie ſehr geſchickt verborgen angebracht werden. In der Regel verrathen die Inwohner ihr Neſt aber ſelbſt, wenn man ſehr nahe daran vorbeigeht oder das betreffende Gebüſch ſtreift, und der Zaunkönig dann herausfliegt. Hier in der Gegend und im Kappler Thale heißt der Zaunkönig im Volksmunde Maus- oder Muskönig.

(Fortſetzung folgt.)

* * *

Liebe und Ehe im Leben der Vögel.

Vortrag, gehalten im Verein der Liebhaber einheimiſcher Vögel zu Berlin
von Hermann Schramm.

Unwiderſtehlich, als zwingendes Naturgeſetz bewegt alle lebenden Weſen der Trieb, das andere Geſchlecht derſelben Art an ſich zu feſſeln, ein zweites Sein mit dem eigenen zu verbinden, durch willenloſe Hingabe gleiche Gefühle zu wecken und ſo das innigſte Band zu ſchließen, welches Weſen an Weſen, Leben an Leben kettet. Keine Macht iſt ſo gewaltig, daß ſie dieſes Geſetz aufheben könnte. Liebe heißt dieſe Gewalt in Bezug auf ihren Einfluß auf den Menſchen, Trieb, wenn wir von ihrer Wirkung auf die Thiere reden. Liebe und Trieb iſt jedoch nichts anderes als ein Wortſpiel. Menſch und Thier ſind dieſem Geſetze unterthan, das Thier unterwirſt ſich gehorſamer, während der Menſch nicht ſelten verſucht, ſich dieſem Geſetz zu entziehen.

Wer jedoch von vornherein die Zuſtändigkeit des Menſchen zum Thierreich in Abrede ſtellt, das Thier als eine lebende Maſchine anſieht, dem Thier Verſtand abſpricht, jegliches Gefühlsleben des Thieres leugnet, wird nie zu der Erkenntniß gelangen, daß die geiſtige Thätigkeit aller thieriſchen Weſen, ſo verſchieden ſie ſich auch äußern möge, auf ein und denſelben Geſetzen beruht, er wird nicht einſehen, wie gleichartig im Weſentlichen die Lebensäußerungen des Menſchen und der Thiere ſind. Menſch und Vogel, welche weite Kluft liegt zwiſchen ihnen, zwiſchen beider Leben; wie groß ſind die Unterſchiede zwiſchen beider Thun und Handeln. Gibt es wol eine Macht, jene Kluft zu überbrücken? Wir wollen an der Hand von Beiſpielen dieſes verſuchen.

Rückhaltsloſer als der Menſch unterwerfen ſich die Vögel dem Wechſel der Jahreszeiten, da ſie nicht ſäen, ernten u. ſ. w. Sie würden elend zu Grunde gehen, wollten ſie dieſem eiſernen Naturgeſetz nicht Folge leiſten. Der Menſch iſt viel eher im Stande, ſich dem Einfluß der Jahreszeiten zu entziehen; beneiden wir aber nicht den Vogel um die Freiheit, die er dadurch genießt, daß er ſich dem Naturgeſetze beugt? Welchen Eindruck macht auf uns der Frühling mit ſeiner Pracht und welchen der Winter mit Froſt und Kälte?

In dieſer Hinſicht ſind die Vögel gebunden, in anderer bewahren ſie ſich jedoch Freiheit und Willkür.

Kein Vogel entſagt freiwillig den Freuden der Liebe; nur wenige entziehen ſich den Ehebanden, jeder ſucht Liebe ſobald als möglich zu erlangen und zu genießen. Schon im Jugendkleid kämpft das junge Männchen mit ſeinesgleichen; ich erinnere nur an die jungen Hähnchen auf dem Hühnerhof, ehe noch bei ihnen der Kamm hervorbricht. Kein Vogelmännchen bleibt aus eigenem Antrieb Hageſtolz, kein Vogelweibchen gibt einem würdigen Bewerber einen Korb. Das Männchen tritt des Weibchens willen die weite Reiſe über das Meer an. Das Weibchen wiederum vergißt eines würdigen Männchens halber gar bald erlittenen Schmerz und tiefe Trauer. Ja vielleicht wird das Weibchen gar zur Ehebrecherin, wenn ihm ein werbendes Männchen noch würdiger ſcheint als der augenblickliche Gatte.

9.1.2

Jedes Vogelweibchen kommt beſtimmt in Beſitz eines Gatten, alte Jungfern gibt es nicht. Dagegen wird es dem Vogelmännchen nicht ſo leicht, ſo hohes Gut zu erwerben, es koſtet Mühe und harte Kämpfe, denn es gibt durchſchnittlich weit mehr Männchen als Weibchen und viele ſind daher genöthigt, wenn auch nur zeitweiſe, Junggeſellen zu bleiben. Aber gerade wie bei den Menſchen, ſo ziehen auch dieſe fortwährend auf Freiersfüßen durch das Land und ſuchen nach einer Gattin, gleichviel, ob ſie ihre dreiſten Werbungen bei einem unbenannten, benannten oder bei einer trauernden Wittwe anbringen. Jedenfalls haben ihre Freierfahrten Erfolg, ſonſt würden ſie wol nicht ſo regelmäßig umherſtreichen.

Bei der Werbung um das Weibchen verwendet das Männchen alle ihm von der Natur verliehenen Mittel. Je nach der Art verſucht jedes Männchen, ſich von der beſtechendſten Seite zu zeigen, alle Liebenswürdigkeit an den Tag zu legen, zu glänzen, um andere Freier ſeines Geſchlechts aus dem Felde zu ſchlagen. Je älter es iſt, deſto auffallender iſt ſein Betragen, deſto ſelbſtbewußter tritt es auf, um ſo ſtürmiſcher kriegt es nach der Minne Sold. Das Sprichwort: „Alter ſchützt vor Thorheit nicht“, läßt ſich nicht auf ſie anwenden, denn je älter der Vogel iſt, um ſo mehr iſt er im Beſitz der ihm beſchiedenen Fähigkeiten und wol nur in den ſeltenſten Fällen verdammt ihn das Alter zu Schwäche und Unfähigkeit. Deshalb braucht es uns auch nicht Wunder zu nehmen, wenn ein altes Männchen in ſeinem vollſtändig ausgefärbten Hochzeitskleid bei einem jungen Weibchen vielmehr Ausſichten hat als ein junges Männchen und demzufolge auch viel zuverſichtlicher um die Gunſt des Weibchens wirbt.

Die Mittel nun, durch welche ſeitens des Männchens die „Liebeserklärung“ erfolgt, ſind verſchiedenartig. Der eine wirbt mit ſeinem Geſang, der andre mit den Flügeln, dieſer durch Schnabelgeklapper, dieſer mit den Füßen; der zeigt alle Pracht ſeines Gefieders, der andre nur ein einzelnes Schmuckzeichen, ein dritter bringt Fertigkeiten zur Schau, die er ſonſt nicht übt. Auch die Gemüthsſtimmung wird eine ganz andre: ernſte Vögel treiben Spiel und Scherz, ſchweigſame werden zu Schwätzern, ruhige beweglich, ſanftmüthige wild und ſtreitſüchtig, furchtſame werden kühn und vergeſſen alle Vorſicht. Kurz, ein jeder zeigt ſich während dieſer Zeit von einer ganz andern Seite, alle Bewegungen ſind haſtiger und ihr ganzes Weſen ſcheint daher verändert. Selbſt der Schlaf wird auf das äußerſte beſchränkt und doch ſcheinen ihre Kräfte deshalb nicht zu erſchlaffen. Alle ſtimmbegabten Vögel werben mit klar verſtändlichen Tönen und ihr Geſang iſt nichts als Jauchzen und Flehen um Liebe. Singend zieht der Vogel auf die Brautfahrt, durch Geſang lockt er ſein erſcheinendes Weibchen und ladet es ein, ſich zu ihm zu geſellen. Dann kündet der Geſang ſein Glück und ſeine Seligkeit. In Geſang kleidet er ſein Begehren, Sehnen und Hoffen.

Digitized by Google

Nur während des Rauſches der Liebe ſingt der Vogel begeiſtert und mit vollem Feuer; ſingt er ſpäter noch, ſo gilt ſein Geſang nur der Erinnerung an das vergangene Glück. Von der Liebe berauſcht, ſingt, pfeift und ſchwatzt der Heher, ahmt andere Thierſtimmen nach, die Elſter ſchwatzt beſonders viel, ſogar der krächzende Rabe wandelt die rauhen Laute zu weichen Tönen um. Viele Vögel, die ſonſt ſchweigſam ſind, laſſen fleißig ihre Stimme hören, z. B. der Steißfuß, beſonders auffallend der Wendehals und Wiedehopf. Die Rohrdommel ſteckt den Schnabel in das Waſſer, um den einzig ihr zu Gebote ſtehenden Schrei in Brüllen zu verwandeln. Der Vogel ſingt nur zu einer beſtimmten Zeit; er könnte ebenſo gut auch zur andern Zeit ſingen, aber er hat dann keine Veranlaſſung mehr zu ſeinem Geſang. Den deutlichſten Beweis für die Richtigkeit dieſer Behauptung liefert uns der Kuckuck. Nur zur Parungszeit läßt er ſeinen Ruf erſchallen, aber er verſtummt viel eher im Süden als im Norden, in der Ebene eher als im Gebirge. Das Brutgeſchäft der Pflegeeltern ſeiner Kinder iſt eben im Süden und in der Ebene weit eher beendet als im Norden und im Gebirge.

Viele Vögel, die durch Geſang oder durch eigenartige Stimmlaute werben, unterſtützen die Werbung noch durch gefällige Bewegung, ſei es, daß ſie dieſelbe mit den Schwingen oder den Füßen bewerkſtelligen, andere durch eigenthümliche Stellungen, in denen ſie ſich zeigen oder vor dem Weibchen einherſtolziren, z. B. der Pfau.

Einzelne Falken und Eulen drücken ihr Verlangen vorzugsweiſe durch laute Rufe aus (Uhu), während z. B. die Adler, Buſſarde, Wanderfalken einander ſtundenlang umkreiſen und ſich dann bis zu unermeßlichen Höhen hinaufſchrauben, von Zeit zu Zeit gellende Schreie ausſtoßend und dabei alle Flugkünſte übend. Milane und Weihen ſtürzen ſich mit halb angezogenen Flügeln bis zur Erde oder der Waſſerfläche herab und ſteigen dann wieder ſenkrecht empor, überſtürzen ſich und wiederholen dieſe Flugſpiele öfters. Alle dieſe ſoll jedoch, wie Brehm erzählt, ein in den Steppen Innerafrikas vorkommender Schlangenadler übertreffen, deſſen Flug jederzeit wundervoll iſt und dem Reiſenden ſofort auffällt, der aber während der Parungszeit ein unvergleichliches Poſſenſpiel in der Luft ausführt, da er alle Flugkünſte der Raubvögel in ſich vereint. Er führt deshalb den bezeichnenden Namen „der Gaukler“.

Baumpieper, Dorngrasmücken ſteigen kerzengerade in die Höhe, ihre Liebeslieder ſingend; allerliebſt ſieht es aus, wenn der Waldlaubſänger ſich von der Höhe eines Baums in die Tiefe ſtürzt, faſt ohne Flügelſchlag, ohne den Geſang zu unterbrechen, und von hier aus wieder daſſelbe Flugſpiel wiederholt. Ebenſo fliegt die Blaumeiſe ganz langſam mit ausgeſtreckten Flügeln, ſodaß man glaubt, einen kranken Vogel vor ſich zu haben. Grünhänflinge und Ammern taumeln von Liebe begeiſtert durch die Luft, daß es ausſieht, als ob ſie ihrer Schwingen nicht mächtig wären.

Der Girlitz hat während der Parungszeit einen fledermausartigen Flug. Ganz allerliebſt ſieht es aus, wenn ein Bachſtelzenmännchen ſeine erwählte oder zu erwählende Gattin umtrippelt, mit dem Schwanz wippend und fortwährend zwitſchernd. Er beugt dabei etwas den Kopf nieder, breitet die Flügel aus, ſenkt den Schwanz, verneigt ſich und nähert ſich, bald entfernt es ſich, bis ſchließlich alle Liebkoſungen geſtattet werden.

Ganz in demſelben Liebesrauſch befinden ſich ſolche Vögel, welche durch Tänze ihre Bewerbung ausführen. Dieſelben vergeſſen während des Tanzens alle ihre ſonſtigen Gewohnheiten, gerathen in Verzückung, ſodaß ſie von der Außenwelt faſt garnichts mehr zu wiſſen ſcheinen. Dabei ſtoßen ſie abſonderliche Rufe aus, entfalten ihr Gefieder, um den vollen Schmuck zu zeigen.

Beſonders eifrige Tänzer ſind mehrere Hühnerarten. Unſer Haushahn hat das Tanzen nicht mehr nöthig, er kräht nur noch und ſchlägt mit den Flügeln; ſchon der Pfau und der Truthahn, ſeine Hofgenoſſen, leiſten in dieſer Beziehung mehr, indem ſie balzen. Den balzenden Auerhahn und den kollernden, ſchleifenden Birkhahn will ich nur kurz erwähnen, ebenſo den Kranich. Noch eigenartiger ſollen ſich die in Oſtaſien lebenden Hornfaſanen und die Felſenhühner in Mittelamerika bei ihren Tänzen benehmen; ſogar ein Vogel, der ſonſt nur im Reich der Lüfte, in unermeßlichen Höhen ſeine Kreiſe zieht, von dem man glauben ſollte, daß nur durch die Schwinge die Werbung ausgeführt wurde, ſchwingt zur Parungszeit das Tanzbein und dreht ſich mit auf die Bruſt herabgeſenktem Kopf und ausgebreiteten Flügeln, dabei eigenthümlich trommelnd und murmelnd, um ſeine Auserkorene. Der Kondor iſt dieſer Tanzkünſtler.

Andere Vögel ſpringen, anſtatt zu tanzen, ungeſtüm auf und nieder und hüpfen in den Zweigen umher, ihre Pracht entfaltend; hierher gehören die Paradisvögel. Wieder andere erbauen laubenartige Gebäude, welche ſie mit glitzernden Steinen, mit gebleichten Knochen u. a. verzieren, und führen in dieſen Gängen Tänze auf.

Einige Vögel endlich, welche weder Sänger, Flug- oder Tanzkünſtler ſind, bedienen ſich des Schnabels zur Werbung. Die Störche z. B. Alle Spechte hämmern mit dem Schnabel ſchnell gegen einen dürren Aſt oder Spahn, wodurch das Holz in Schwingungen geräth und auf dieſe Weiſe das ſogenannte Trommeln entſteht.

(Fortſetzung folgt.)

Anfragen u.
Auskunft

Herrn L. Kattow: 1. Ueber das Singen der Papageien, d. h. über den Naturgeſang einiger Arten, ebenſo wie über die Fähigkeit anderer, menſchliche Lieder naturgetreu wiederzugeben, bringen wir demnächſt einen Artikel. 2. Auch über den Diukaſperling (Fringilla diuca, *Mol.*) und ſeinen Geſang werden wir Näheres berichten.

Herrn Lehrer Steigner: Erfolge in der Einbürgerung von Nachtigalen hat namentlich Herr Th. Koeppen in Koburg, indem er Heckpärchen in große Volieren im Freien ſetzte und ſie hier züchtete. Als ſie Junge hatten, gewährte er ihnen freien Ein- und Ausflug, bot aber ſelbſtverſtändlich im Heckkäfig das geeignete Futter weiter oder er ließ nur die flügge gewordenen frei und behielt die Alten im Heckkäfig. Seine Erfahrungen hat der Genannte in ſeinem Buch „Anleitungen zur Züchtung und Anſiedelung von Nachtigalen auf Grund eigener Erfahrunen“ (Berlin, zweite Auflage) veröffentlicht. Auch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg, 3. Auflage) finden Sie Anleitung zur Wieder-Anſiedlung und Einbürgerung von Nachtigalen S. 292.

Frau E. S.: Den Hänfling müſſen Sie für den Zweck, daß Sie ihm die Freiheit ſchenken wollen, zunächſt ſo in einer Stube frei umherfliegen laſſen, daß er ſich das Futter, welches Sie ihm hinſtreuen, ſelber zu ſuchen hat, und dies muß einige Wochen hindurch geſchehen ſein, ehe Sie das Fenſter zum Freifliegen öffnen.

Herrn W. Golli: Bieten Sie dem Kardinal jetzt anſtatt des Trinkwaſſers ganz dünn gekochten Haferſchleim (Hafergrütze, ohne Zuſatz von Salz, Zucker, Gewürz u. a., ganz dünn gekocht). Halten Sie ihn in gleichmäßiger Wärme und behüten ihn vor Temperaturſchwankungen. Laſſen Sie ihn vorläufig nicht frei im Zimmer herumfliegen.

Herrn F. Burkhardt: Reichen auch Sie Ihrem Vogel als Getränk Haferſchleim, wie oben angegeben, und darin etwa drei bis vier Tropfen Rothwein. Als Futtter geben Sie ihm verſchiedene Hirſen, Kanarienſamen, geſchälten Hafer und dazu ein Ameiſenpuppengemiſch mit wenigen Mehlwürmern.

Herrn Otto Hoffmann: Wenn in Ihrem Wohnort noch eine ſog. Nachtigalſteuer beſteht, ſo müſſen Sie der Behörde eben nachweiſen, daß der Sproſſer ein andrer Vogel iſt. Garantiren dafür, daß Sie nicht dennoch „herangezogen“ werden, können wir Ihnen aber nicht.

Aufruf.

Vogelſchutz und -Liebhaberei.

Da vor kurzem im Reichstag wieder über Vogelſchutzgeſetze geſprochen worden iſt, ſo dürfte es wol an der Zeit ſein, das Publikum darüber aufzuklären, in welcher Weiſe ein wirkſamer Vogelſchutz auszuüben iſt.

Man kann nämlich in letzter Zeit wieder einmal von mancher Seite zu hören bekommen, daß das Halten der Vögel im Käfig als durchaus „nicht thierſchützleriſch“ zu betrachten ſei, eine Anſicht, die bekanntlich von den bedeutendſten Ornithologen, die je gelebt haben, ſchon ſo oft in ſchlagendſter Weiſe widerlegt worden iſt. Sehr treffend ſind auch die Worte des Forſtaſſeſſors H. (in Nr. 5 der „Gefiederten Welt“ d. J.), welcher ſeine Meinung über dieſen Punkt etwa in folgendem kundgibt: Man ſolle doch demjenigen, welcher an's Zimmer gefeſſelt iſt, die einzige Freude, welche er ſo indirekt mit der Natur hat, nicht zu ſchmälern ſuchen. Er habe als Forſtmann reichlich Gelegenheit gehabt, die Vogelliebhaberei kennen und beurtheilen zu lernen und geſehen, mit welcher Anhänglichkeit der Liebhaber ſeinem Vogel zugethan ſei. Man möge in gewiſſen Kreiſen darüber denken wie man wolle, er ſei zu der Ueberzeugung gekommen, daß das Halten einheimiſcher Vögel ſehr gute Seiten habe. Es gereiche nicht nur dem Liebhaber zur Freude und wirke erzieheriſch auf ihn, ſondern diene auch dem Vogelſchutz ſelbſt. Denn man könne doch ſo oft die Wahrnehmung machen, daß gerade diejenigen, welche Stubenvögel halten, auch den befiederten Sängern in der freien Natur ein reges Intereſſe entgegenbrächten, denſelben nach Möglichkeit Niſtkäſten verſchafften und ſie zur kälteren Jahreszeit fütterten und pflegten. Daß ferner durch das Halten der Vögel im Käfig, reſp. der Männchen, um die es ſich doch faſt ausnahmslos handelt, eine nur ganz geringe, kaum nennenswerthe Verminderung derſelben im großen Haushalt der Natur einträte, dürfte wol jeder, der einigermaßen einen Einblick in's Vogelleben bekommen und nicht von Haus aus ein Vorurtheil hat, einſehen. Desgleichen können ſich alle Vogelliebhaber gegen den Vorwurf der Thierquälerei mit gutem Gewiſſen verwahren. Die in Gefangenſchaft lebenden Vögel befänden ſich, wie das unzählige Beiſpiele lehrten, bei entſprechender Abwartung außerordentlich wohl. Sonſt würde nicht der Fall eintreten, daß ſie nach erlangter Freiheit wieder in ihren Käfig am Fenſter zurückkehrten, bzl. wochenlang aus- und einflögen, wie dies der Verfaſſer ſelbſt aus eigner Erfahrung beſtätigen könne. So habe die Vogelliebhaberei eine nicht abzuleugnende Berechtigung, umſomehr als ſie Charakter und Gemüth des Menſchen zweifellos auf's vortheilhafteſte beeinfluſſe. Die Vogelliebhaber aber ſollten nicht immer nur die Gegner handeln laſſen, ſondern Vereine und alsdann Verbände bilden, die die Intereſſen der Liebhaberei zu wahren hätten und endlich einmal den ungerechtfertigten Anſchuldigungen entgegentreten.

Dieſen Worten des Forſtaſſeſſors H. möchten wir aber noch zur Ergänzung nachfolgende Punkte, die zweifellos die allerwichtigſten für den Vogelſchutz ſind, hinzufügen, nämlich daß wir Geſetze ſchaffen: 1) Gegen den Maſſenfang im Süden, 2) gegen das Tragen von Vogelbälgen auf Damenhüten, 3) gegen die Ausrottung der Wachtel, 4) gegen den Krammetsvogelfang, 5) für alle die Fälle, bei denen es ſich um das Verſpeiſen unſerer Singvögel handelt, wie beiſpielsweiſe der Singdroſſeln, die ja, wie ſich jeder überzeugen kann, unter dem Namen „Krammetsvögel“ leider recht oft in den Wildprethandlungen feilgeboten werden. Außerdem wollen wir dafür ſorgen, für unſere Höhlenbrüter Niſtkäſten aufzuhängen, für die Offenniſter Einfriedigungen und Vogelſchutzgehölze zu ſchaffen, ſowie die Vögel zur Winterszeit im Freien zu füttern.

Jedenfalls wird in alledem ein geeigneterer und richtigerer Vogelſchutz beſtehen, als wenn wir denjenigen, welche Tag aus und Tag ein an's Zimmer gefeſſelt ſind, ihre beſcheidene Freude zu ſchmälern ſuchen.

Verein der Liebhaber einheimiſcher Vögel
in Leipzig.

Um recht weite Verbreitung dieſes Aufrufs wird gebeten!

Zu unſerm Bilde.

Einer der ſchönſten unter den farbenprächtigen Plattſchweifſittichen iſt es, den die heutige Abbildung darſtellt. Es iſt der gelbſchultrige Plattſchweifſittich (Psittacus chrysopterygius, *Gld.*); er vereinigt in ſeinem Gefieder die Abzeichen des Paradiesſittich mit denen des vielfarbigen Singſittich (P. multicolor, *Tmm.*, et P. haematonotus, *Gld.*), ſodaß ihn mein Vater nach den Beſchreibungen und vor der erſten Einführung für einen Baſtard zwiſchen beiden hielt. Nachdem er im Jahr 1896 zuerſt den Vogel im Berliner zoologiſchen Garten vor ſich ſah, mußte dieſe Anſicht aufgegeben werden. Es zeigt ſich auch in dieſem Fall, wie mannigfaltig, ſchöpferiſch und abwechslungsreich die Natur an Formen iſt. Der Gelbſchulterſittich erſcheint an Stirnrand und Augengegend hellgelb, Oberkopf ſchwarzbraun, übriger Kopf, Oberhals, Hinterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken hellblau, Nacken grünlichbraungrau; Oberrücken und Schulterdecken bräunlichgrau; obere Flügeldecken gelb, kleine Flügeldecken unterſeits blau, Schwingen ſchwärzlich mit blauer Außenfahne; die beiden mittelſten Schwanzfedern am Grunde dunkelgrün, am Ende dunkelblau, an der Spitze ſchwarz, übrige Schwanzfedern grün, in der Mitte mit bläulichſchwarzem Querband; Wangen grünlichblau, Kehle und Bruſt hellblau; Bauch und untere Schwanzdecken ſcharlachroth, Federn grüngelb geſäumt; Schnabel hornfarben, Augen braun, Füße graubraun. Die Heimat erſtreckt ſich über Nordweſtauſtralien. In der Lebensweiſe gleicht er den Verwandten. Es iſt ſehr bedauerlich, daß dieſer herrlich ſchöne Vogel nicht häufiger in den Handel gelangt. Er würde ein Schmuck jeder Vogelſtube ſein. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [692]

Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos).

Das ſeit vielen Jahren allſeitig bekannte, ſtets fachmänniſch beſtens bewährte und abſolut reelle

Special-Geſchäft

für die

Liebhaberei

der

beſten

Singvögel

(Inh.: Mathias Rausch),

Schriftſteller für Stubenvogelkunde,
Mitglied der Ornithologiſchen Section
der k. k. zool.-botaniſch. Geſellſchaft 2c.

Wien,

VII/3. Bezirk, Schottenfeldgaſſe 95,

wird hiermit allen Vogelfreunden und wirklichen Kennern des guten Vogelgeſangs in empfehlende Erinnerung gebracht. — **Preisliſten** koſtenlos und poſtfrei **bei genauer Angabe über welche Vogelart.** Zahlreiche Anerkennungen der hohen Herrſchaften und der erſten Vogelkundigen der Welt.

Die beſten

Käfige für Weichfreſſer,

einzig brauchbar in ihrer Art.

[693]

Zur Lieferung ihrer Lieblinge empfiehlt ſich den P. T. Herren

Vogelliebhabern

die beſtbewährteſte, ſtreng reelle Vogelhandlung von [694]

Gottlieb Wanek, Prag 411, I.

Offerire:

Einige ganz beſonders ſchöne, äußerſt zahme, ganz vorzüglich und viel ſprechende, Lieder ſingende **Grau-Papageien** (Jakos), vollkommen acclimatiſirt, à 80, 100—150 Mk., dito ebenſolche **Amazonen und Goldnacken-Amazonen,** à 60, 80, 100—150 Mk., große **Gelbhaubenkakadus,** ſehr zahm, à 20 Mk., beſonders ſchöne rothe **Cardinäle,** Männchen, ff. Sänger, Stück 8 Mk., echt import. **Wellenſittiche,** richtige Zuchtpare, Par nur 4 Mk., **graue Reisfinken,** Par 2 Mk. Verſandt gegen Nachnahme. Lebende Ankunft ſtets garantirt.

F. Rejsek, Papageien-Grosshandlung,
Hamburg, Peterſtraße 28. [695]

Harzer Edelroller,

tieftourenreich u. weltbekannt, liefere überall hin. Der Preis richtet ſich nach Geſangsleiſtung, à St. 7, 8, 10, 12, 15 bis 30 ℳ. Verſandt unter Nachnahme. Garantie für geſundes Ankommen. [696]

Joh. Wink, Dresden-A., Marſchallſtr. 37.
Züchterei hochedler Kanarien, gegr. 1885. Goldene u. ſilberne Medaillen. Viele Dankſchreiben.

Kanarienvögel, echte Harzer Roller ohne Fehler, à St. 10, 12, 15, 20 u. 25 ℳ, mit Porto u. Verpackung u. 14 Tage Probezeit, **aber nur per Nachnahme,** nicht gefallende Vögel tauſche um oder auf Wunſch zahle zurück. Rollerweibchen 1,50 ℳ. Preisliſte frei. [697]

L. G. Müller, Vogelzüchterei,
Nordhauſen a. Harz.

C. L. Flemming,

Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen, empfiehlt **Kanarienvögel,** Männchen 5 ℳ Weibchen 1 ℳ. [698]

Jene P. T. Herren

Vogelliebhaber,

welche für verhältnißmäßig wenig Geld **wirklich gute und ſeltene Sproſſer, Nachtigalen, Schwarzköpfe** und andere edle Stubenvögel zu erwerben wünſchen, belieben ihre genauen Adreſſen unter „**Vogelfreund**" an die Expedition der „Gefiederten Welt" einzuſenden. [699]

Feinſte Kanarienſänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [700]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.
Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

Harzer Kanarienvögel

(Trute'ſche Hohlroller), Zuchtvögel, auf d. größt. Ausſtellungen mit höchſten Preiſen prämirt, verſende v. d. Nachzucht, welche ſch. i. Hohlrollen, Schockelhohlrollen, Hohlklingel, Klingelrollen, Knorren, Pfeifen u. du-Flöten arbeiten, v. 10 ℳ an nach allen Gegenden unter Nachn. Ausführliche Preisliſte **gratis und franko.** Weibchen deſſelb. Stamms 2,50 ℳ [701]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Große gelbe Tannenzeiſige,

à Dtzd. 8 ℳ, Stck. 1 ℳ. **Rothe und gelbe Kreuzſchnäbel,** à Dtzd. 6 ℳ, Stck. 1 ℳ. **Edelfinken,** die auf Schlag ſind, Stck. 1 ℳ. Noch einige **gelehrte Dompfaffen,** die eine Kleinigkeit an ihren Liedern fehlen laſſen, Stck. 10, 12 u. 15 ℳ. In den nächſten Tagen auch **Stiglitze** u. **Hänflinge** abzugeben. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Verſende gegen Nachnahme und reelle Bedienung. Verſandkäfig von 60 ₰ bis 1,20 ℳ.

[702] **Rich. Faulstich,**
Finſterbergen b. Friedrichsroda i. Th.

Weg. Aufg. d. Liebhab. verk. bill.: u. auserw. ſelt. Sänger, 1 **Schamadroſſel,** 25 ℳ, 1 **Sproſſer,** 15 ℳ, 1 echt reinw., j. g. Reitzugfink, 10 ℳ, 1 ſ. g. **David-Zippe,** j. Tour u. 2mal vortrag., m. rein. Waldgeſ. u. tief. Stim., 12 ℳ, 1 **Schwarzplattel,** m. t. l. u. rein. Vorgeſ. u. herrl. **Huidloh-Ueberſchl.** u. rein. Stimme, 12 ℳ. Off. u. **B. 1888 B.** m. **Marke** bef. d. Exped. [703]

Neuheit
Vollständig unzerbrechliches
Vogelbadehaus

No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.—
No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50

Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.—**

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige** für **Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc.** mit **sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [704]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Weiße Reisfinken,

à Par 7 ℳ,

Diamantfinken	à Par	8	ℳ
Gürtelgrasfinken	„ „	7	„
Schuppenloris	„ „	33	„
Gebirgsloris	„ „	28	„
Zebrafinken	„ „	4	„
Grüne Aſtrilde	„ „	3½	„
Singſittiche	„ „	24	„
Vielfarb. Prachtſittiche	„ „	70	„

ſowie alle anderen Vogelarten preiswerth. [705]

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Sproſſer,

aus der **Bukowina,** mit tiefſchalligem Geſange, 1 Dtz. 90 ℳ, ½ Dtz. 48 ℳ, ¼ Dtz. 35 ℳ. Einzelne Exemplare à 10 ℳ. Verſandt vom 1. Mai an.

Nachtigalen,

ungariſche, mit vorzügl. Geſange, 1 Dtz. 45 ℳ, ½ Dtz. 24 ℳ. Einzelne à 5 ℳ Verſandt vom circa 24. April an.

Steinröthel,

ungariſche Wildfänge, beſonders gute Sänger, à 9 ℳ.

Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, gelbe Spötter,

per Stück 3 ℳ. Letztere vier Gattungen von Ende April an lieferbar. Emballage berechne ich billigſt. Für lebendes Eintreffen und ſichere Männchen leiſte ich **jede Garantie.** Um den verſchiedenen Aufträgen meiner geehrten Kunden vollkommen nachkommen zu können, erbitte ich mir **möglichſt frühzeitige Beſtellung.** [706]

Carl Aumeyer, Vogelhandlg.
in **Linz** a. Donau, Landſtraße 42.

---

3 Singdroſſeln, Davidzippe, prima Sänger, à 10 ℳ. **3 Schwarzdroſſeln,** rein Waldgeſ. à 8 ℳ. **2 Schwarzplättchen,** Doppelüberſchl. à 7 ℳ. **2 Rothkehlchen,** Lichtſänger à 4 ℳ. **1 Steinröthel,** mit reiz. Geſang, à 14 ℳ.

Sämmtliche Vögel ſind kerngeſund, über 1 Jahr im Käfig und im vollen Geſang.

Verſandt per Nachnahme, leb. Ankunft garantirt. [707]

Heinr. Joſt, St. Ingbert, Rheinpfalz.

1898 erhielt mein Stamm Harzer Kanarienvögel 1 Staatspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. [illegible] à 10 [illegible] ℳ u. [illegible]

Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [708]

Nachtigalen,

ungariſche mit vorzüglichem Geſang, 1 Dtzd. 45 ℳ, ½ Dtzd. 24 ℳ, einzeln 5 ℳ.

Schwarzköpfe,

Tiroler, mit hochfeinem Doppelüberſchlag, Dtzd. 36 ℳ, ½ Dtzd. 20 ℳ, einzeln 4.50 ℳ Für lebende Ankunft und ſichere Männchen leiſten volle Garantie. Um den Aufträgen unſerer geehrten Kunden vollſtändig nachkommen zu können, erbitten wir frühzeitige Beſtellung. Verſandt von Ende April an. Ferner Stieglitze, Hänflinge, Zeiſige u. Buchfinken à Stck. 1.50 ℳ. Von den früher ausgebotenen Lerchen noch Vorrath. Haidelerchen Stck. 2,50 ℳ, Feldlerchen 1,50 ℳ.

Gebr. Haas,
[709] **Hoffstetten** b. Gemünden a. M.

Stiglitze,

große, prachtvolle Männchen, **Bluthänflinge,** [illegible] 10 ℳ, **goldgelbe Girlitze,** [illegible] ℳ, **Heidelerchen** à 1,50, **Schwarzplattl, Nachtigalen** à 24 ℳ, **Mehlwürmer,** Liter 4 ℳ, **Laubfröſche** 100 St. 5 ℳ, **Sumpfſchildkröten** 100 St. 15 ℳ, **Scheltopuſik, Smaragdechſen** à 1 ℳ, **Aeskulap-, Zorn-, Eidechſen-, Gruben-, Leopards-, Katzen- und Schlingnattern** à 1,50 bis 2 ℳ, **Peitſchennatter** 2½—3 ℳ, **Sandviper,** giftig, 3 ℳ, **Rieſenſalamander** 40 ℳ, **Spitzkopf- u. Mauerechſen,** à 20 ₰, **prachtvolle Goldfiſche,** 100 Stck. 3—6 ℳ, **Goldorfen,** 100 Stck. 12 ℳ, **Zwergwelſe,** 10 Stck. 5 ℳ, **Steinbraſche,** 10 Stck. 3 ℳ, **Importirte Schleierſchwanzfiſche,** Stck. 2—5 ℳ, liefert unter Garantie [710]

G. Findeis, Wien I, Wollzeile 25.

Abſolut geſunde

Vielfarben-Sittiche, Zuchtp.,		45,00	ℳ
Echt imp. Singſittiche	„	28,00	„
Gebirgs-Lori	„	28,00	„
Rothbrüſt. Edelſittiche	„	12,00	„
Roſella-Sittiche	„	22,00	„
Ringel-Aſtrilde	„	16,00	„
Ceres-Aſtrilde	„	10,50	„
Diamantfinken	„	9,00	„
Hahnſchweif-Wittwe i. voll. Pracht		30,00	„
Kappen-Ammer, Mch. i. Prcht., St.		4,00	„

Wellenſittiche, prachtvolle, echt auſtraliſche, große, ſtarke, ſofort zur Brut ſchreitende Zuchtpare, 1 P. 6 ℳ, 2 P. 11 ℳ, 3 P. 16 ℳ, 5 P. 25 ℳ. Wellenſittiche, ausgſ., ungp. Schtp. 5.— „ und von allen in Nr. 18 ausgebotenen Vogelarten noch Vorrath. Garantie für leb. u. tadelloſe Ankunft. [711]

Brühl's Vogelexporthaus,
Kötzſchenbroda.
Größtes Spezialgeſchäft dieſer Branche.

Hiermit gebe ich meinen verehrten Kunden bekannt, daß ich den Vogelhandel aufgebe, und erſuche, Korreſpondenzen an A. Zeman, Temesvár [illegible] zu richten.

[712] Hochachtend **Fr. Trügel.**

Feinſte

Edelroller!

mit den ſchönſten Touren, zart, tief und lang, noch ein Poſten ff. Frühbrut-Heckvögel. Dutz. 90 ℳ, Probevogel 10 ℳ. 14 Tage Probe gegen Nachnahme. [713]

A. H. Pütsch, Spezial-Züchterei,
Schönhauſen a. Elbe.

Wellensittiche.

Weg. Aufg. d. Zucht: 2 imp. Pare, von denen ich 30 Junge i. J. 98 zog, à Par 10 ℳ Ein jung. ausgeſ. P. à 5 Mk.

[714] Frau **Fritsch,**
Straßburg, Kellermannſtaden 8.

Offerire:

1 Par tadelloſe Moſchusloris,

prachtvoll im Gefieder, 45,00 ℳ

Diamantfinken, tadellos im Gefieder, ſo lange Vorrath reicht, Par nur 9,00 ℳ [715]

Gustav Voss, Hoflieferant,
Köln a. Rh.

Prima 2 Lieder pfeifende

Dompfaffen

à 30—40 ℳ offerirt u. Garantie u. 4 Tage Probe [716]

K. Diehl III,
Angersbach, Oberheſſen.

!! Kanarienvögel !!

Meine weltbekannten, tieftourenreichſten 1898er Sänger ſind in großartigſter Auswahl alle wieder geſangsreif u. beſtens ſortirt. Liefere garantirt reell überallhin, ſteigend nur nach Geſangsgüte, à Stück 10, 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ. Nachnahme oder Betrag vorher. [717]

Julius Häger,
St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864. Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Verk. **1 Amſel,** vorz. Sänger, r. Wildf., ſchön bef., pfeift d. gze. Jahr. 10 ℳ **2 Rothkehlchen,** ff. Sänger, zuſ. 3,50 Mk. Offert. unt. G. W. 99 poſtl. Auerbach i. V. erb. [718]

Da ich verſetzt werde,

muß ich meine Vögel umgehend verkaufen. **2 prachtvolle Pariſer Trompeter-Hähne,** Ausſtellungsthiere (Figurenkanarien), **2 Reitzugfinken,** ſowie meine **Kanarienhecke** (2 Hähne und 10 Weibchen) an Liebhaber billig.

A. Osthenner,
Berlin W., Blumenthalſtraße 17, III

Geſucht

für eine größere Vogel-Handlung Hamburgs ein

Ladenmädchen,

welches ſchon in einem derartigen Geſchäft thätig war, bei gutem Gehalt. Offerten mit Photographie und Gehaltsforderung unter A. H. an die Expedition d. Bl. [719]

Strengſte Diskretion zugeſichert.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von August Hopfer in Burg b. M.

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 16.

Die gefiederte Welt

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler

von

Dr. Karl Ruß.

Preis: vierteljährlich
(13 Nummern mit Abbildungen)
M. 1.50.

Magdeburg
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
(R. & M. Kretſchmann).

Einzelpreis der Nummer
20 Pfg.

Anzeigen.

[illegible]

Brut-Apparate

[illegible]

C. L. Flemming

[illegible]

Man verlange Preisliste.

[illegible]

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Allianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 16. Magdeburg, den 20. April 1899. XXVIII. Jahrg.

Die Brut des Blutſchnabelwebers.

Von Frau E. von S.

Oſtern 1897 erhielt ich ein Par Blutſchnabelweber, welches ich, nach kurzer Beobachtung auf Geſundheit, im Mai in mein im Freien ſtehendes Vogelhaus überſiedelte. Sie vertrugen ſich gut mit den anderen Vögeln: Wellenſittiche, Sonnenvögel, Weber, Amandinen und Aſtrilde und waren weit weniger zänkiſch als früher in meinem Beſitz geweſene Vögel dieſer Art. Schon im Juni fingen ſie eifrig an zu weben, wurden aber von den anderen Artgenoſſen, beſonders einem wunderſchönen, aber bitterböſen Orangeweber auf's Empörendſte geſtört. Ich fing daher den Miſſethäter heraus und verſchnitt ihm die Flügel; da ich ihn wegen ſeiner Schönheit nicht entfernen mochte. Dies half und bald entſtand ein wunderhübſches Kugelneſt, beinahe nur aus Ried und Waldgras erbaut und dann mit Faſern verdichtet, mit Hundehar und feinen Federn gepolſtert, jedoch immer noch durchſichtig, ſo daß ich gegen das Licht die eifrig arbeitenden Vögel gut beobachten konnte. So entſtanden einige Probeneſter, bis endlich dem Weibchen eines davon beſonders gefiel und es ſich nun ausſchließlich in dieſem, welches in der Gabel eines Weidenzweigs angebracht war, aufhielt. Dieſes Heim wurde auf's Energiſchſte vertheidigt. Das Weibchen wurde bald mein Liebling wegen des Muths und der Intelligenz, mit der es mir Mehlwürmer und Niſtmaterial abbettelte, dabei mit den Flügeln ſchlagend und einen eigenthümlichen Schrei ausſtoßend. Das Männchen, inzwiſchen ſehr ſchön roſa verfärbt, war weder energiſch in Vertheidigung ſeines Hausrechts, noch anhänglich an ſeine Pflegerin. Die Aufregung der Vögel wuchs; unter Schreien und Flügelſchlag wechſelten ſie beim Bauen ab und am 29. Juni 1897 konnte ich durch die Neſtwand ein Ei ſchimmern ſehen. Die Farbe war blaßblau (wenn gewünſcht, gebe Eiſchale ab; das ganze Ei gab ich dem hieſigen Naturalienkabinet). Am 30. Juni war wieder ein Ei da, am 1. Juli das dritte, am 2. Juli das vierte Ei und am 13. hörte ich das Piepſen des erſten jungen Vogels. An den folgenden Tagen fand ich zerbrochene Eiſchalen, hörte aber keine weiteren Stimmchen und fand am 25. Juli ein nacktes totes Vögelchen unter dem Neſt liegen.

Die Alten verließen das Neſt und bauten zu meiner großen Freude in die für kleine Vögel beſtimmte Remiſe an einem Südfenſter. Ueberraſchend ſchnell entſtand in einer dürren Cichorienſtaude ein neues ſchönes Neſt und am 9. Juli fand ich drei Eier vor. Am 2. Auguſt kam ein flügger Weber heraus, ein gar „häßliches Entlein“. Ein gemeiner Hausſpatz kann ſich im Vergleich damit für eine Schönheit halten: großer Kopf mit enormem Schnabel, Füße, wie wenn es ein Waſſerhuhn geben ſollte, und dabei unſelbſtſtändig und ewig kreiſchend und bettelnd.

Die Eltern fanden ihren Sprößling recht und pflegten ihn mit unermüdlicher Sorgfalt. Wo mich die Mutter zu Geſicht bekam, bettelte ſie um Mehlwürmer.

Am 6. September, veranlaßt durch die Aufregung der Alten und die gänzliche Stille im Neſt, ſah ich nach und fand zwei Junge offenbar erfroren, denn es war unverhältnißmäßig kalt. Am 7. September ſchon wurde das Neſt ausgebeſſert und bereits am nächſten Tag ſaß die Alte zum dritten Mal. Am 20. hörte ich zwei Stimmchen (der Bettelruf der Jungen iſt ſo hell und kreiſchend, daß ich ſie mit Leichtigkeit aus den anderen „Kinderſtimmen“ heraushörte). Am 21. September hörte ich ſie wieder; ſie ſchienen weiter zu gedeihen. Aber die Witterung wurde rauher und rauher, am 6. Oktober mußten wir einheizen und im Vogelhaus fand ich die zwei Dioche tot. Ich konnte erſt Mitte Oktober die Winterſtellung beziehen, da Wellenpapagei und Bandfinken noch Junge hatten. Alſo Zuchtergebniß von 1897: ein Junges, ein Männchen, kerngeſund, frech wie ein Spatz und Schreier erſter Güte.

Der alte Blutſchnabel war tiefroſa bis weinroth verfärbt, ein ſelten ſchöner Vogel, auch muthig und zutraulich.

Im April 1898 mußte ich, da ich eine Kur brauchen ſollte, meine Vögel ſchon Ende April ins Vogelhaus überſiedeln. Mai und Juni war ich abweſend. Am 2. Juli konnte ich das erſte Ei im Weberneſt entdecken; vom 17. ab ſaß die brave Alte feſt und am 27. ſchlüpfte das erſte Junge aus ſeiner Heimatkugel aus, zwei andere folgten. Dieſe wurden ſämmtlich von meinem Organiſten mit größtem Pflichteifer geätzt und keine noch ſo grobe Behandlung der Alten konnten das liebevolle Vögelchen verhindern, von früh bis ſpät die langbeinigen Schreier zu füttern, die ſich um ihre Alten, die ein neues Neſt bauten, wenig kümmerten, dagegen durch ihr Ungeſtüm den armen Organiſten faſt vom Aſt ſtießen. Dieſe Jungen freſſen mit Vorliebe Honig und Obſt, während die Alten erſteren nicht und letzteres nicht beſonders lieben. Das letzte Geniſt haben wol meine Sonnenvögel oder der bösartige Orangeweber zerſtört, denn ich fand zerbrochene Eier unter dem Neſt. Dieſe drei wurden dafür und wegen ſonſtiger Bosheit jetzt abgeſchafft.

Alſo Zuchtergebniß 1898: zwei geſunde Junge, Geſchlecht noch nicht beſtimmbar; wahrſcheinlich Weibchen. Ende des Monats will ich umziehen und ich hoffe in dieſer Zucht und in beſſeren Ergebniſſen meiner Hüttenſänger (die von zwölf Eiern kein einziges Junges durchbrachten), wie mit der Zucht des Organiſten, der ja der geborene „Kindervater“ zu ſein ſcheint, auf Glück und günſtige Witterung.

Selten gehaltene einheimiſche Vögel.

Von A. Reuter.

VI. Der Weidenlaubvogel oder das Weidenzeislein.

Dieſer kleinſte unter den grasmückenartigen Vögeln iſt einer unſerer zierlichſten Weichfreſſer. Schon ſeine grünlich gelbe Farbe, die je nach Wendung ſeines Körperchens mehr oder weniger zum Vorſchein kommt, hat etwas Anziehendes. Er klettert nach Meiſenart und ſucht die Blattläuſe und Räupchen unter den Blättern der Obſtbäume ab, indem er ſich dabei, ähnlich wie die Grasmücken und Schwarzplättchen, um zu ſeiner Nahrung zu gelangen, an die dünnen Zweige hängt. Sein munteres Weſen hat für den Vogelfreund etwas Reizvolles, ſodaß wol mancher den Wunſch hegt, dieſes Vögelchen zu beſitzen. Es iſt ſehr leicht einzugewöhnen, beſonders wenn es zur Zeit, da es Junge im Neſt hat (hier im Renchthal meiſt von Ende Mai bis Juni) gefangen und mit den Jungen in einen Käfig geſetzt wird. Mit nur friſchen Ameiſeneiern ätzen die Alten die Jungen vorzüglich auf, die dann ſchon nach acht bis zehn Tagen das Neſt verlaſſen, auch ſehr bald ihr Futter ſelbſt aufnehmen lernen und ſehr zahm werden. Man kann ſie bei den Alten im gleichen Käfig, wenn dieſer groß genug iſt, bis zum nächſten Frühjahr laſſen. Von da an müſſen ſie jedoch getrennt werden, ſonſt beißen ſich die Männchen gegenſeitig tot. Ihr Geſang, wenn ich es ſo nennen kann, iſt zwar ſehr einfach und beſteht nur aus einigen Strofen. Er klingt wie die Worte zilp, zelp, zalp, öftere Male wiederholt und hört ſich hier im Gebirge melancholiſch an. Von den Landleuten hieſiger Gegend wird der Weidenlaubvogel nach ſeinem Geſang nur mit dem Namen Zilpzalp bezeichnet, da der Landmann in der Regel den zoologiſchen Namen nicht kennt. Dieſer einfache Geſang klingt dennoch ſehr hübſch und wird oft von dem noch einfacheren eines Goldammers begleitet. Ich wurde oft ſtundenlang in der Einſamkeit von dieſen Sängern gefeſſelt und hörte ſie ab bis zur einbrechenden Nacht. Während der Brutzeit ſieht man die Weidenlaubvögel ſelten. Sie bauen ihre Neſter ſo verſteckt wie die Grasmücken, hier meiſt in undurchdringlichen Bromber- und Himberhecken. Es iſt ihnen daher ſchwer beizukommen; oft glaubt man, das Neſt entdeckt zu haben, wenn einer der Alten mit der Aetzung herangeflogen kommt, doch täuſcht man ſich in dieſer Annahme, denn ſie führen den Beſchauer irre, gerade wie die Grasmücken. Man darf alſo einem alten Vogel nicht nachgehen, wenn man das Neſt finden will, ſondern ſuche auf's Geratewohl das Gebüſch oder die Hecke ab; iſt man dann dem Neſte nahe, ſo eilen die beiden alten Vögel herbei und umflattern den Eindringling mit ängſtlichem Schreien. Es iſt nun ein Leichtes, das Neſt mit den Jungen zu finden und die Alten entweder im Schlaggärnchen oder im Flugbauer auf den Jungen zu fangen. Man gebe ihnen zur Eingewöhnung, beſonders ſo lange ſie die Jungen füttern und auch ſpäter noch eine Zeitlang, nichts anderes als friſche Ameiſenpuppen. Dann gewöhne man ſie an ein Miſchfutter, beſtehend aus ein Drittel Möre und zwei Drittel Ameiſenpuppen, und an mageres Rindfleiſch oder Kalbsherz und hartgeſottenes Hühnerei; dazu gebe man auch täglich einige Mehlwürmer. Außerdem kann man ſie auch an das Univerſalfutter für Spötter gewöhnen. Sie ſind dauerhaft und viele Jahre zu erhalten.

Gegen den Herbſt kommen dieſe Vögel in die Obſtgärten und ſuchen alle Bäume emſig nach vorhandenen nackten Raupen und anderen Baumverderbern ab, gehen auch ab und zu auf den Boden, um Kohl und Krautſtauden ebenfalls zu revidiren, wodurch ſie äußerſt nützlich ſind; ſie werden auch von den Landleuten darob ſehr geſchätzt. Der Weidenlaubvogel iſt als Stubenvogel ſehr zu empfehlen,

Digitized by Google

[illegible]

[illegible]

auch ſpäter, da ſie nicht gern an etwas anderes gingen. Sie wurden ſehr zahm. Ich ließ ihnen jedoch, als ſie ſelbſtſtändig Futter aufnehmen konnten, und ſich im Fliegenfangen, wozu ſie in ländlichen Wohnungen hinlänglich Gelegenheit haben, geübt hatten, die Freiheit. Sie kamen jedoch noch oft durch's Fenſter in die Wohnung hinein und bezeugten keinerlei Furcht. Des Nachts ruhten ſie auf einem ſchön verſchlungen gewachſenen Geäſt, welches ich in einer Zimmerecke möglichſt hoch oben anbrachte. Leider ſteht der Fliegenſchnäpper in hieſiger Gegend nicht nur bei Bauersleuten, ſondern auch bei den gebildeten Klaſſen in ſehr üblem Ruf, jedoch mit Unrecht. Man iſt nämlich der Anſicht, er ſei ein Vertilger der Bienen, und knallt ihn deshalb vielfach mit dem Flobert oder mit Vogeldunſt aus einer alten Flinte, in der Regel gerade in der Zeit, da er emſig nach Futter für die junge Brut ausfliegt, aus der Luft. Dieſes Gebahren halte ich für ſehr unrecht, und ich würde mich freuen, über dieſes Thema in der „Gefiederten Welt" Anſichten von Herren zu leſen, die ſich ſchon der Mühe unterzogen haben, den Fliegenſchnäpper, bzl. deſſen Thun und Treiben zu beobachten. Nach dem, was ich geſehen, kann ich mich der Anſicht, daß er inbezug auf die Bienen ſchädlich ſei, durchaus nicht anſchließen, es ſei denn, ich würde von wirklichen Autoritäten auf dieſem Gebiete überführt. Es kann ja wol ſein, daß er ſich einmal an einer Biene vergreift; das Gleiche könnte man am Ende auch von der Schwalbe behaupten oder von der Kohlmeiſe, die ſich manchmal im Frühjahr vor das Flugloch eines Bienenſtocks ſetzt und ein Bienchen wegnimmt, oder erſtarrte, welche nicht mehr in den Stock zurückkehren konnten, vom Boden auflieſt und verzehrt; doch kommt dies nur gelegentlich einmal vor. Als Regel kann es keinenfalls gelten, weshalb ſich auch jene Heißſporne nicht gleich gegen das ganze Vogelgeſchlecht mit Pulver und Blei in Poſitur ſtellen ſollten, wie ſie es meiſtens thun, ohne ſich vorher genügend zu überzeugen, ob ihre Annahme auf Thatſachen beruht. (Fortſetzung folgt).

Liebe und Ehe im Leben der Vögel.

Vortrag, gehalten im Verein der Liebhaber einheimiſcher Vögel zu Berlin
von Hermann Schramm.

(Fortſetzung).

Sie werden nun fragen: „Wie verhält ſich das Weibchen gegenüber dem Werber?" Anfänglich ſcheint es, als ob es gleichgültig wäre gegen die herrlichſten Liebeslieder, gegen die ſchönſten Flugſpiele und Tänze und ſonſtigen Ehrenbezeugungen. Es ſtellt ſich ſpröde, geht ruhig ſeinen Tagesgeſchäften, um dieſe Zeit wol nur Nahrungserwerb und Toilettenfrage, d. h. Ordnen des Gefieders, nach. Es kommt zwar herbei, wenn ihm Huldigungen, welcher Art ſie auch ſein mögen, dargebracht werden, zeigt ſich aber durchaus noch lange nicht willfährig. Wird der Bewerber zudringlich, ſo ergreift es die Flucht. Dadurch wird der erſtere aber nur noch mehr entflammt, er folgt ihm und ſteigert ſeine Huldigungen.

Jedes Vogelweibchen würde wol leichter die Werbung annehmen, wenn es nur einen einzigen Bewerber hätte. Aber es gibt bekanntlich durchſchnittlich mehr Männchen als Weibchen; daher hat jedes Weibchen das Glück der Wahlfreiheit. Mehrere Männchen bringen zugleich ihre Huldigung dar und das Weibchen ſucht ſich ſelbſtredend den in jeder Beziehung ausgezeichnetſten Bewerber aus. Durch Aufmerkſamkeiten, die nun das Weibchen dem Erkorenen erweiſt, entſteht Eiferſucht, die oft zu Kämpfen auf Leben und Tod führen. Selbſt der harmloſeſte Vogel wird im Kampf ums Weibchen ein Held, ein jeder benutzt die ihm je nach der Art, der er angehört, verliehenen Waffen. Der Schnabel, die Füße mit Krallen und Sporen werden gebraucht, um den Rivalen aus dem Felde zu ſchlagen, und wol in vielen Fällen ruht der Kampf nicht eher, bis einer der Kämpfenden auf dem Platze bleibt.

Je nach der Art des Vogels werden derartige Kämpfe auf der Erde, in der Luft, in den Zweigen oder im Waſſer ausgefochten. Adler und wol alle Raubvögel verſuchen, ihren Gegner mit der Klaue oder dem Schnabel in der Luft zu beſiegen. Prachtvolle Wendungen werden ausgeführt; der eine ſtößt nach dem Gegner, der andere parirt glänzend den Stoß; gegenſeitiges Verfolgen und muthiges Standhalten kennzeichnen derartige Kämpfe. Sie ſchlagen ſich gegenſeitig die harſcharfen Fänge in die Bruſt und ſtürzen, da ſie ſich nun ihrer Schwingen nicht bedienen können, wirbelnd auf die Erde nieder, nicht um hier den Kampf auszufechten, ſondern um ſich ſofort zu erheben, und in ihrem Element, der Luft, den Kampf von Neuem zu beginnen. Ausgeriſſene, mit Blut beſpritzte Federn zeigen den Fleck an, wo ſie mit Mutter Erde in Berührung gekommen ſind. Ermattet der eine nun vielleicht infolge erhaltener Wunden, ſo zieht er ſich, von dem Sieger ingrimmig und frohlockend verfolgt, ohne Widerſtand über die Grenzen des vom Weibchen erwählten Niſtgebiets zurück, um trotz aller erlittenen Niederlagen den Kampf baldigſt zu erneuern, bis das Weibchen ſich ſelbſt beſtimmt für den Sieger entſchieden hat. Ein ſolcher Kampf hat nicht ſelten einen tötlichen Ausgang, denn der Adler, von Liebe und Eiferſucht gereizt, kennt kein Erbarmen dem Beſiegten gegenüber und mordet den kampf- und fluchtunfähigen Gegner. Selbſt die ſonſt ſo harmloſen Thurmſegler ſchlagen dem Gegner die harſcharfen Krallen, nach Art der Adler und Falken kämpfend, in die Bruſt, zerfleiſchen ſie, ſodaß nicht ſelten der Tod infolgedeſſen eintritt.

Bei den Sängern geht dem Kampf eine förmliche Herausforderung voraus. Das Lied iſt die Waffe, mit welcher, obwohl ohne Blutvergießen, gekämpft und geſiegt werden kann. Der Parungsruf, welcher wol die eigentliche Werbung ausdrückt, erzeugt ſtets Eiferſucht. Der Kuckuck kommt immer bis auf den Baum, unter welchem man ſteht, falls man ſeinen Ruf deutlich nachahmen kann; ebenſo der Pirol. Auch die ſonſt ſo ſcheuen Waldtauben laſſen ſich herbeilocken, indem man das Ruckſen, Spechte, indem man

Digitized by Google

das Trommeln durch Klopfen gegen den Gewehrkolben nachahmt. Hat ſich der Nebenbuhler nun eingefunden, ſo beginnt er ſofort ebenfalls zu rufen oder zu ſingen, was immer eifriger wird, bis es ſchließlich in Thätlichkeiten ausartet. Schreiend, zuweilen ſingend (Haidelerche), jagt einer hinter dem andern her und während dieſer Jagereien reizen ſich die beiden Nebenbuhler noch mehr durch herausfordernde Stimmlaute, Entfaltung der Schmuckzeichen und ähnliche höhnende Gebärden bis zur höchſten Wuth. Sobald der Verfolger den fliehenden Gegner erreicht, verſetzt er ihm einen Stoß, daß die Federn ſtieben; läßt er von ihm ab, ſo dreht ſich im Nu das Blättchen um und beide zauſen ſich tüchtig im Gezweig, in der Luft und auf dem Boden (Finken). Das Weibchen führt die Entſcheidung des Kampfes herbei.

Der Kampf der Erdvögel wird ſtets auf dem Boden, der der Schwimmvögel nur auf dem Waſſer ausgefochten. Ein jeder von Ihnen hat gewiß ſchon zwei Hähne kämpfen ſehen. Strauße kämpfen auch und brauchen ihre ſtarken Beine, um im Vorbeiſtürmen dem Nebenbuhler mit den ſcharfen Zehen den Bauch oder die nackten Schenkel aufzureißen. Vor dem Angriff ſtellen ſie ſich einander gegenüber auf, wedeln mit den Flügeln, bewegen die langen Hälſe bald nach der Seite, bald nach vorn und ſtoßen tiefe, heiſere, bald an Trommeln, bald an das Gebrüll des Löwen erinnernde Laute aus. Sie ſtarren ſich gegenſeitig an wie Hähne auf dem Hof, laſſen ſich auf die Fußwurzeln nieder, und dann erfolgt der vorhin erwähnte Angriff wie beim Turnier.

Trappen bedienen ſich beim Kampfe mit dem Nebenbuhler des Schnabels; Strandläufer und Strandvögel, beſonders die wegen der geringſten Kleinigkeit kämpfenden Kampfſtrandläufer, rennen mit ihrem Schnabel, gleichſam wie die alten Ritter es mit eingelegter Lanze thaten, gegeneinander und pariren die Stöße in ihren Bruſtfedern, die bei dem Kampfläufer einen förmlichen Schild bilden.

Die kleinen Teichhühner bedienen ſich der Beine, mit welchen ſie ſich auf der ſchwankenden Decke grüner Waſſerpflanzen tüchtig prügeln. Gänſe, Schwäne, Enten verfolgen einander, bis es dem einen Kämpen gelingt, den andern am Schopf zu faſſen; er taucht ihn dann ſo lange unter Waſſer, bis er Gefahr läuft zu erſticken und benimmt ihm ſo alle weitere Luſt zur Fortſetzung des Kampfes.

Das Weibchen verhält ſich, ſo lange es noch keinen Bewerber angenommen hat, vollſtändig neutral bei dem Kampf, beobachtet indeß alle Vorgänge genau, da es ſich in der Regel für den Sieger entſcheidet. In welcher Weiſe die Erklärung oder Entſcheidung erfolgt, hat ſich bis jetzt noch nicht feſtſtellen laſſen.

Noch bevor die Kämpfe der Bewerber beendet ſind, hat das Vogelweibchen bereits den zukünftigen Gemahl erwählt und gibt ſich ihm ohne Rückhalt hin, nimmt mit ſichtlichem Vergnügen deſſen Liebeserklärungen an und erwidert zärtlich die Liebkoſungen. Sehnſüchtig ruft es nach dem Gatten, begrüßt ihn jubelnd und fügt ſich ohne Widerſtand ſeinen Wünſchen und Handlungen. So ſitzen geparte Papageien Leib an Leib geſchmiegt nebeneinander; vollkommenſte Harmonie zeigt ſich in beider Thun; nur ein Wille ſcheint beide zu beſeelen. Nimmt der Gatte Nahrung, gleich thut es auch die Gattin; wechſelt er ſeinen Sitz, ſofort folgt ihm das Weibchen. Ebenſo iſt es auch umgekehrt der Fall. Wenn auch nicht immer in ſo in die Augen fallender Weiſe, ſo erwidert doch jedes Vogelweibchen die ihm geſpendeten Liebkoſungen. Es kennt keine Verſtimmung, kein Schmollen (wie es ſo häufig bei Weibchen der Menſchen ſich zeigen ſoll), es kennt keine Launen, kein Schelten und Zanken, noch Mißvergnügen und Unzufriedenheit, ſondern nur aufrichtige Liebe und Zärtlichkeit, der Gatte dagegen nur Glück und Seligkeit. Ebenſo wie er anordnet und beſtimmt, ebenſo folgt er den Wünſchen des Weibchens. Verläßt dieſes den Sitz, ſo folgt er ihm, begleitet es im Herbſt in die Winterherberge und kehrt mit ihm im Frühling wieder zurück. Die Ehe der Vögel darf man daher wol mit Recht eine glückliche, vollkommene nennen. Wenn auch die Gatten, die für die ganze Lebenszeit verbunden ſind, altern, ihre Liebe altert nicht, ſondern treibt im Frühjahr immer wieder neue Blüten und die längſte Ehe verurſacht keine Gleichgültigkeit. Getreulich erfüllen ſie ihre Elternpflichten beim Neſtbau, Bebrütung der Eier und bei Aufzucht der Jungen. Das Männchen unterſtützt mit Selbſtaufopferung das Weibchen bei der Mühewaltung, welche die Jungen verurſachen; es vertheidigt ohne Bedenken das Weibchen und gibt ſich Gefahren und ſogar dem Tode willig preis, um jenes zu retten. Sie theilen als brave Eheleute Freud und Leid und der innige Bund dauert für das ganze Leben, falls er nicht mit Gewalt zerriſſen wird.

Daß dies wirklich der Fall iſt, haben ſcharfblickende Forſcher öfter bewieſen, indem ſie einzelne Vögel jahrelang nacheinander beobachteten, ſodaß ſie dieſelben mit Leichtigkeit von anderen Vögeln derſelben Art unterſcheiden konnten. Aber auch jeder andre aufmerkſame Beobachter wird zu dem Ergebniß gelangen, wenn er beſonders auffallende Vögel zum Gegenſtand ſeiner Beobachtung macht. Z. B. die Störche. Er wird ſehr bald Männchen und Weibchen, die auf dem Dach brüten, von einander zu unterſcheiden wiſſen und bald genug erfahren, daß immer ein und daſſelbe Par zum Neſt zurückkehrt, ſo lange beide leben. Während des Zuges wurden ſehr oft von Forſchern zwei Vögel derſelben Art, welche ſich immer zuſammenhielten, erlegt und man fand ſtets, daß es Männchen und Weibchen waren. Brehm erzählte, daß er oft während ſeiner Reiſen in Afrika wandernden Vogelparen begegnet ſei, die in Gemeinſchaft lebten und unzertrennlich waren, wie in der Heimat am Horſte. Daß beide Gatten auch gemeinſam in der Winterherberge oder überhaupt während der Wanderung dulden, davon erzählt Brehm ebenfalls eine rührende Epiſode. In Südnubien traf er in einem Tümpel ein Storchpar an, das ihm umſomehr auffiel, da um dieſe Zeit die andern Störche im Innern Afrikas, alſo in ihren Winterquartieren ſich aufhielten. Er ließ beide erlegen, um die Urſache des Aufenthalts zu erforſchen; das Männchen war kerngeſund, das Weibchen hingegen flügellahm. Das Männchen war demnach zur Liebe und Geſellſchaft bei dem Weibchen geblieben. Den treuen und innigen Bund aller in geſchloſſener Ehe lebenden Vögel ſcheidet nur der Tod. (Schluß folgt).

Ein Frühlingstag im märkiſchen Hochwald.

Von H. Hocke.

Ein prächtiger Frühlingstag war es, den wir in einem märkiſchen Hochwald verlebt. Wenngleich noch frühzeitig im Jahr und nach einem milden Winter ſondergleichen, iſt es weithin in der Forſt leicht grün geworden und ein weiteres Grün demnächſt zu erwarten. Huflattich am Bach, Farrenkraut und Neſſel grünen ſogar freudig, weithin leuchten die friſchen Triebſpitzen der Kiefern und Fichten, ſeit mehreren Wochen prangen die Blüthen. Kätzchen des Haſelnußſtrauchs, die der Weiden und Birken, der Pappeln und Erlen. Wie wir dieſe Pflanzen als das erſte Zeichen des endlich vollendeten Winterſchlafs der Natur begrüßen, ſo können wir auch heute die Vorboten des Frühlings, ganz beſtimmte Vögel, erkennen.

Eine Reihe ſchöner Tage im Februar, deſſen letzte Hälfte wie Frühlingswetter war, einige ſonnige Tage im März haben den günſtigſten Einfluß auf die ganze Natur deutlich erkennbar geübt.

Für den Zeitpunkt der Ankunft der Zugvögel gibt es längſt gewiſſe Angaben, es gilt auch im allgemeinen, daß diejenigen Vögel, welche uns früh beſuchen, ſpät von uns fortziehen werden (wir erinnern an die Lerche einerſeits, an den Pirol, Segler und die Nachtſchwalbe andrerſeits). Die erſtgenannten Vögel kommen früh, weil ſie nur bis an die Grenzen Südeuropas zogen, die anderen kommen nicht ſobald zurück, ſie beſuchten Afrika.

Früher wie ſonſt iſt die Natur im Begriff, ihr Hochzeitskleid anzulegen und früher wie ſonſt ſind die Vögel wieder zurückgekehrt. Die belebende Sonne hat es ihnen, gleich den frühblühenden und grünenden Pflanzen, angethan. Würden die Vögel, die wir in der erſten Hälfte des März ſahen, alle bei uns verbleiben, ſie fänden nicht genügende Nahrung. In langen Zügen ſahen wir nicht wenige Arten weiter ziehen, hin nach ihrer Heimat, dem Norden Europas.

Erſchienen bei uns und vertraut geworden mit den gewohnten Verhältniſſen, wie der Geſang der Vögel deutlich bewies, waren im letzten Drittel des Februar Miſteldroſſeln, die weggezogenen Finken, Hänflinge und ihre Verwandten, Stare, Feld- und Haidelerchen; vom Jagdwild Ringel- und Holztauben, Schnepfen; vom Raubzeug Buſſarde und Wanderfalken, von letzteren genug, die ſich den ganzen Winter hier ſehen ließen, während nordiſche Gäſte, die Rauhfußbuſſarde uns längſt verlaſſen hatten; Merline oder Steinfalken konnten diesmal garnicht beobachtet werden. In großen Scharen ſahen wir am 12. März*) Rothkehlchen, vereinzelte Rothſchwänzchen und weiße Bachſtelzen; im frohen Geſang hörten wir Grau- und Goldammer, Fink, Hänfling und Braunelle, faſt ſämmtliche Meiſenarten; im vollen Geſang Sing- und Miſteldroſſel, ſowie die Amſel des Waldes; die Amſeln der Stadt hörten wir bereits mehrere Wochen vorher.

Kurz vor Mittag (die Sonne ſtrahlte, wie ſie im März es nur ſelten thut) wurde das Vogelleben im Hochwald ſehr intereſſant. Wir ſahen hintereinander eilige Züge Wildenten, unter denen deutlich auch Märzenten erkannt wurden, die weiter nach Norden zogen, die erſten Kranichflüge, im Flug ſich drehende und bewerbende Buſſarde, in Paren Hohl- und Ringeltauben. Weithin wurde der Geſang der Haidelerche, ganz nachbarlich das Lied der Sing- und Miſteldroſſeln vernommen, vom Jauchzen der Grün- und Schwarzſpechte, die ſich gegenſeitig anriefen und antworteten, allzu oft unterbrochen. Schwarzſpechte werden ſo oft beobachtet, ſei es hier durch ihr Klettern oder Trommeln an den Bäumen, dort durch ihr auffälliges Geſchrei, daß einer unſerer Begleiter faſt unwillig äußerte: „Zu oft Schwarzſpechte“. Er habe keine Ahnung davon, daß einſt, ſelbſt von Männern der Wiſſenſchaft, von Kennern unſerer heimatlichen Thiere, ſehnlichſt gewünſcht wurde, einmal Schwarzſpechte aus eignem Anſchauen betrachten zu können. Uns war die Gegenwart der vielen Spechte, Krähen, Holzheher, herab bis zu den kleinen Vögeln, den Meiſen, Braunellen, vor allen den Baumläufern, nichts Neues, denn den Wald verderbenbringende Inſekten hatten ſich in großer Anzahl eingefunden.

Auch die abgelegeneren Theile des großen Waldes wurden von uns aufgeſucht. Um einen uns ſeit Jahren bekannten Horſt kreiſten hoch in den Lüften prächtig gefärbte Buſſarde, wol im Bewerben um ein Weibchen und den günſtig gelegenen Standhorſt; um einen zweiten Horſt, der bereits in feſten neuen Beſitz übergegangen iſt, macht ſich ein Buſſardpar ängſtlich bemerkbar, freudig miaut es, als wir den Platz verlaſſen. Ein Viertelſtündchen ſpäter – wir ſtehen dem alten Standhorſt eines Hühnerhabichtspares gegenüber — meldet ſich das von der ganzen ſchwächern Vogelwelt mit Recht gehaßte und gefürchtete Räuberpar, die beiden Hühnerhabichte. Mit dem Mißtrauen, das dieſen Vögeln allen Menſchen gegenüber, die ihrem Horſt nahen, innewohnt, hatten ſie gerechnet und ſich frühzeitig aus dem Staube gemacht, hoffend, nicht bemerkt zu werden. Nun ſchreien ſie aus vollem Halſe. Der dem Grünſpechtſchrei ſo täuſchend ähnliche gellende Ruf wird gegen dreißigmal hintereinander vernommen. Hat das Par unſere Abſichten für die Zukunft erkannt? Haben beide ihr Unheil, das wir ihnen im vergangenen Jahr zufügten, noch in Erinnerung?

Auch des Hehers froher Tag iſt heute, wie ſein Verhalten deutlich bekundet. In kleineren Scharen noch vereinigt fühlen ſie ſich durch die Strahlen der Sonne wohler wie vordem und ſie ahmen im Uebermuth die Rufe nachbarlicher Vögel nach, deren Bekanntſchaft ſie machen konnten. Sie äffen die heiſeren Rufe der Krähen und Dohlen nach, was ihnen nicht ſchwer fällt, den wohlklingenden Ruf des Schwarz- und Grünſpechts, den Schrei der Buſſarde, Hühnerhabichte und des Wanderfalken.

Die Lehre, die uns der Ruf des einen Hehers, der den Wanderfalken täuſchend ſtimmlich nachahmte, nun befolgen ließ, wurde zur eifrigſten Suche nach dem Horſt des Wanderfalken. Nicht umſonſt wurde der Weg zum nahen See eingeſchlagen und hier hörten wir den echten Lockruf eines wirklichen Wanderfalken, des geſuchteſten Vogels unſerer märkiſchen Forſten. In geſchützter Deckung befindlich, machten wir uns den Aufenthalt ſo bequem wie möglich, um Weiteres betreffs des Wanderfalken zu erſpähen. Wol zehnmal lockte der Falk, dann flog er, von uns deutlich erkannt, davon. Der bereits von ihm erwählte Standhorſt, erkennbar durch das am Boden liegende Geſchmeiß, durch einige ſeiner Federn, konnten wir einige Minuten darauf feſtſtellen. Wenige Wochen ſpäter werden wir euch beide, Wanderfalk und Hühnerhabicht, mit einem unangenehmen Beſuch überraſchen, inzwiſchen ſollt ihr durch uns nicht mehr beläſtigt werden.

---

*) Der Tag dieſer Schilderung

Wir hatten die Beobachtungen über den Wanderfalken noch nicht geſchloſſen, da nahten zwei Forſtmänner, von welchen der eine, höchſt modern, ein Zweirad führte. Wol hatten wir mit ihnen ein Geſpräch, wenn auch ein kurzes, über das frühe diesjährige Balzen der Faſanen und Birkhühner, dann über Schnepfen, denen es heute Abend gelten ſollte, doch das verlangende laute Rufen des Wanderfalken, wenige hundert Schritte von uns, hörten ſie nicht, beachteten ſie nicht, weil ſie es nicht kannten!

Wieder zogen Enten- und Kranichzüge vorüber nach Norden, Krähen und Dohlen krächzten, Hohltauben girrten, da vernahmen wir in großer Nähe den erſten Ruf eines Waldkauzes. Wir wußten, ein Pärchen dieſer Art hat in einer alten Eiche, welche oben ohne jegliche Verzweigung endet, ſeit Jahren einen ſichern Brutplatz, der wegen ſeiner tiefen Lage von Menſchenhand nicht erreicht werden kann, weil die Höhlung zu weit nach unten ſich erſtreckt. Der Waldesboden um den Stamm wird beſonders von uns beachtet, dabei werden einige geköpfte Finken und eine Singdroſſel gefunden. Noch vor Beginn der Dämmerung hörten wir den Ruf eines zweiten Kauzes, das Pfeifen einer Ohreule; beim Beginn der Frühdämmerung — noch brannte die untergehende Sonne im prächtigen Feuerglanz — den letzten Geſang der Singdroſſeln, und zuletzt, als der bleiche Schein des Abendſterns funkelte, den quarrenden Laut einer, dann noch einer Waldſchnepfe. Wir befanden uns auf dem Schnittpunkt der Geſtelle, rechts und links neben dem hohen Kiefernholz, vor einem jungen Eichenbeſtand; hier ſtrichen die langſchnäbligen Schnepfen hinüber, die ſich zu einem Brutpar vereinigen werden.

Im Waldesdunkel weiter wandernd, hörten wir noch mehrere Schüſſe fallen, hörten noch eine Haldelerche und — wir trauten kaum unſeren Ohren — im Dunkel der Nacht, in der Nähe des Bahnhofs, das frohe Liebeslied einer Feldlerche.

An Ort und Stelle das Frühlingsleben unſerer erſten Vögel zu beobachten, iſt ſehr ſchön, doch das Leben zu ſchildern, ſehr ſchwer. Welcher gewaltige Unterſchied liegt im Beobachten der Natur und in ihrer Beſchreibung.

Uebertragungen von Papageienkrankheiten.

Die beunruhigenden Nachrichten, die ſchon wieder durch alle Zeitungen laufen, über Krankheitsübertragungen durch Papageien in Köln (manche Tagesblätter ſcheinen eine wahre Wonne darin zu finden, die alte Geſchichte immer wieder aufzuwärmen), veranlaſſen uns, zunächſt die Leſer auf die Erklärung hinzuweiſen, welche hier in dieſem Jahr ein bekannter Mediziner, Prof. A. Fraenkel, im Krankenhaus am Urban in Berlin abgegeben, nach welcher es ſich bei dem letzten Berliner „Fall“ um Influenza und Lungenentzündung der betreffenden Perſonen handelte, ſodann bringen wir hier von den vielen Zeitungsnotizen die korrekteſte nochmals zum Abdruck, aus der hervorgeht, daß Profeſſor Dr. Leichtenſtern, der die Kölner Fälle vor ſich gehabt hat, nicht zu dem ſicheren Beweis der Uebertragung gelangt iſt. Nähere Erkundigungen werden wir noch an Ort und Stelle einziehen.

Die Leitung der „Gefiederten Welt“.

„Eine Familie an der Straße Unter Goldſchmied in Köln hielt ſeit längrer Zeit einen Papagei, der vor etwa zwei Monaten unter typhöſen Erſcheinungen erkrankte und von der Familie ſorgfältig gepflegt wurde. Ein zu Rathe gezogener Vogelhändler rieth, das Thier zu töten. Die Familie pflegte es jedoch weiter, bis es nach einigen Tagen verendete. Nicht lange nachher erkrankte auch die Beſitzerin des Vogels, ihre Töchter, ein Sohn und die Dienſtmagd der Familie unter den Erſcheinungen typhöſer Lungenentzündung. Der behandelnde Hausarzt ging den Urſachen der Krankheit nach und war der Anſicht, daß ein Zuſammenhang zwiſchen ihr und der des inzwiſchen verendeten Papageis beſtände. Bald darauf erkrankte auch der Arzt ſelbſt unter denſelben Erſcheinungen ſo ſchwer, daß drei ſeiner Kollegen, die ihn behandelten, längre Zeit für ſein Leben fürchteten. Leider iſt eine verheiratete Tochter der Hausfrau inzwiſchen an der hartnäckigen Krankheit geſtorben, und auch der Zuſtand eines Bruders der Verſtorbenen hat eine ſo ſchlimme Wendung genommen, daß er in's Auguſtahoſpital gebracht werden mußte. Dagegen ſind ſowol der Arzt als die übrigen erkrankten Perſonen auf dem Wege der Beſſerung. Geheimrath Profeſſor Dr. Leichtenſtern, der den vorhin erwähnten Arzt behandelt hat und der der eigenthümlichen Erſcheinung, die eine Wiederholung ſchon früher beobachteter Fälle muthmaßlicher Krankheitsübertragungen durch Papageien bildet, nachgegangen iſt, wird demnächſt eine Denkſchrift veröffentlichen, die die ganze Frage der Anſteckung durch Papageien umfaßt und die dort vor Jahresfriſt vorgekommenen Erkrankungen mehrerer Perſonen in der Quirinſtraße, ſowie die jüngſten Vorfälle in der Straße Unter Goldſchmied erörtert. Der Verfaſſer ſtellt es als wahrſcheinlich dar, daß jene Erkrankungen durch übertragenen Krankheitsſtoff von Papageien hervorgerufen ſeien; doch gelangt das Ergebniß ſeiner Unterſuchung inſofern nicht zu dem ſichren Beweis einer ſolchen Uebertragung, als der Pilz, der den erkrankten Papageien eigenthümlich ſei, ſich bei den erkrankten Perſonen nicht vorgefunden habe.“ (Straßburger Poſt“). — Die letzten Zeilen, welche gerade das Weſentliche ſind, ſind in den meiſten Zeitungen einfach fortgelaſſen worden, ſodaß ein ganz anderer Sinn herauskommt.

Briefliche Mittheilungen.

... Heute am zweiten Oſterfeiertag (3. April) hörte ich hier bei Saarbrücken zuerſt den Kuckuck. Sie ſcheinen ſich ziemlich zahlreich eingefunden zu haben. Auf einer Wegſtrecke von ungefähr einer Stunde hörte ich drei bis vier verſchiedene. Auch ſonſt war das Waldkonzert heute ganz prächtig. Rothkehlchen, Zaunkönige, Buchfinken, Droſſeln aller Art wetteiferten bis zum ſpäten Abend. Dr. Meyer.

... Zu dem Aufſatze des Herrn Oberleutnants z. D. Hauth in Nr. 14 der „Gefiederten Welt“ kann ich Ihnen mittheilen, daß meine Zebrafinken, kleine Elſterchen, japaniſche Mövchen, ſowie auch andere Exoten (z. B. Wellenſittiche, Graugirlitze) ſeit Jahren mit Vorliebe Apfelſchnittchen verzehren — nämlich durch Abpicken davon, wenn ſie ihnen ins Käfiggitter geſteckt werden.

P. Emmeram Heindl O. S. B.

... Als Beſitzer Ihres „Handbuchs für Vogelliebhaber“ und Abonnent der von Ihnen herausgegebenen Zeitſchrift beehre ich mich Ihnen folgende Mittheilung zu machen, welche vielleicht für die Leſer Ihres Blattes nicht ohne Intereſſe iſt. Ich halte in einem großen Geſellſchaftskäfig etwa zwanzig der gewöhnlicheren Amandinen und Aſtrilde. Vor einigen Wochen gab ich den Vögeln Niſtgelegenheit; je ein Pärchen Elſterchen, Bandfinken und Silberfaſänchen begannen alsbald zu bauen; leider ſtarben faſt unmittelbar nach Fertigſtellung der Neſter das Bandfink- und das Elſterweibchen, wie ich vermuthe, an Legenoth. Während nun das Bandfink-Männchen ſeitdem das Neſt nicht wieder aufgeſucht hat, ſondern nachts auf der Stange ſitzt, bezog das Elſterchen-Männchen allnächtlich allein ſein Neſt. Vor einiger Zeit war mir ein Broncemännchen-Weibchen eingegangen und durch ein Verſehen des Vogelhändlers empfing ich ſtatt eines andern Weibchens ein zweites Männchen, ſodaß mein Käfig nun zwei männliche Broncemänchen beherbergt. Seit einigen Tagen nun ſchlüpfen dieſe beiden Broncemännchen allabendlich zu dem Elſterchen in das Neſt und anſcheinend vertragen ſich die drei Inſaſſen des Nachts recht gut miteinander, was bei Tage bei dem tyranniſchen Charakter des Elſterchen keineswegs immer der Fall iſt. Beiläufig beſuchen dieſe drei das Neſt nur nachts zum Schlafen, bei Tage ſchlägt ein Pärchen Tigerfinken darin Quartier auf. Ich bemerke noch, daß über das Geſchlecht der drei Vögel kein Zweifel obwalten kann.

Fr. G. Merten, Dr. jur.

... Geſtern Nachmittag habe ich hier (Südhannover) die erſten Schwalben geſehen. Es waren etwa zwanzig Stück, welche ſich fidel in der Luft tummelten. Alfred Steiner.

Aus den Vereinen.

Landau (Pfalz), 12. April. In der geſtrigen Sitzung des hieſigen ornithologiſchen Vereins „Vogelfreund“ vormals „Canaria“ wurde an Stelle des ſeitherigen Vorſtandes Kollmar Herr Stadtſchreiber Keſſer als 1. Vorſtand gewählt und alle Briefe und Sendungen ſind nur an den genannten Herrn zu richten.

Anfragen u. Auskunft

Herrn R. E. P.: Die weiße Lachtaube (Columba risoria alba, *Temm.*) iſt kein Albino (Kakerlak), vielmehr nur eine Abänderung der gelben Lachtaube. Kakerlaken kommen ſelten vor. Die Behauptung, daß die weißen Lachtauben ſich nicht fortpflanzen, iſt irrthümlich. Allerdings iſt ihre Züchtung ſchwerer als die der gelben.

Herrn Conrad Kramer: In meinem Buch „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ Band I (Die körnerfreſſenden Vögel) finden Sie 14 Farbentafeln mit den bekannteſten und beliebteſten Vögeln. Im Text iſt angegeben, welche von ihnen verträglich ſind und ſich für die Vogelſtube eignen. Empfehlen würde ich Ihnen zunächſt nur die bekannteſten Prachtfinken, die kleineren und friedlichen Webervögel, die Widafinken, ferner Kuba-, Papſt- und Indigofink, den Grauedelſänger, Hartlaubszeiſig und Safranfink. Die Schilderung der eigentlichen Finken haben Sie ja jetzt in der „Gefiederten Welt“ vor ſich, über alle übrigen finden Sie Näheres in dem genannten Buch. Vorläufig übervölkern Sie die Vogelſtube nicht. Begnügen Sie ſich zunächſt mit Prachtfinken und wenigen größeren friedlichen Vögeln.

Herrn Carl Böhlert: Da der Vogel ſich augenſcheinlich erkältet hat, ſo reichen Sie ihm jetzt ſtatt des Trinkwaſſers ganz dünn gekochten Haferſchleim und halten ihn in gleichmäßiger Wärme. Die Zahl der Mehlwürmer beſchränken Sie vorläufig auf die Hälfte, laſſen Sie den Hanf weg und bieten Sie ihm reichlich ein gutes Ameiſenpuppengemiſch. Dann wird er hoffentlich in die Mauſer kommen, und während derſelben müſſen Sie ihn natürlich gut und nahrhaft verpflegen. Entſchuldigen Sie bitte die Verzögerung der Antwort, die durch einen unglücklichen Zufall herbeigeführt worden iſt.

◆

Zu unſerm Bilde.

Die Abbildung zeigt den Waldſchwalbenwürger (Artamus sordidus, *Lth.*) von Auſtralien. Er iſt rauchbraun, oberſeits dunkler; Zügel, Ober- und Unterſchwanzdecken braunſchwarz; Flügel ſchwarz, zweite bis vierte Schwinge mit breitem, weißem Außenrand; Unterflügeldecken weiß; Schwanzfedern ſchwarz, mit Ausnahme der beiden mittelſten und der Außenfahne der äußerſten breit weiß gerandet; Augen braun; Schnabel bleigrau, an der Spitze ſchwarz; Füße ſchwarzgrau. In Tasmania iſt er Zugvogel; er kommt hier im Oktober an, und nachdem er wenigſtens zwei Bruten aufgezogen hat, zieht er in nördlicher Richtung wieder fort. Auf dem Feſtland von Auſtralien trifft er ein wenig früher ein und verläßt es ſpäter. Einige wenige dieſer Vögel bleiben während des ganzen Jahres in all den Oertlichkeiten, die ihren Gewohnheiten günſtig ſind, und ihre Menge wird durch den Reichthum an Inſekten, der für ihren Lebensunterhalt erforderlich iſt, bedingt. Der Schwalbenwürger iſt ein allgemeiner Liebling der Auſtralier und zwar nicht allein wegen ſeines ſeltſamen und muntern Weſens, ſondern auch weil er häufig in der Nähe der Häuſer niſtet, beſonders ſolcher, die von Gehegen und offenem, von großen Bäumen eingefaßtem Weideland umgeben ſind. „Es war in ſolcher Umgebung in Tasmania“, ſagt Gould, „da hatte ich zu Anfang des Frühlings zuerſt Gelegenheit, dieſe Vogelart zu beobachten. Sie war auf allen Grundſtücken nördlich vom Derwent ſehr zahlreich; acht oder zehn Stück ungefähr ſah ich auf einem trocknen Zweig eines Baumes ſich zuſammendrängen, aber nicht in ſolcher Zahl, daß ſie die Bezeichnung „Schar“ verdienten; jeder Vogel ſchien unabhängig von dem andern zu handeln; jeder machte, wie das Verlangen nach Nahrung ihn reizte, von dem Zweige einen Ausfall, um ein vorüberfliegendes Inſekt zu fangen oder um den Baum zu ſchweben, und kehrte wieder auf denſelben Fleck zurück. Beim Niederlaſſen wirft er wiederholt eine ſeiner Schwingen auf und breitet er ſeinen Schwanz ſchräg aus. Zu andrer Zeit ſah ich ein Par auf der Umzäunung, die die Gehege umgibt, ſitzen, wo ſie ſich häufig wie Stare niederlaſſen, um Käfer und andere Inſekten zu ſuchen. Die Form der Schwingen des Waldſchwalbenwürgers zeigt ſogleich an, daß die Luft ſein eigentliches Reich iſt. Hier entfaltet dieſe Art, mit der Verfolgung der Inſekten beſchäftigt, welche die Reinheit und Wärme des Wetters aus ihren Schlupfwinkeln zwiſchen dem Laube gelockt hat, ihre größte Gewandtheit. Aber die größte Abſonderlichkeit in den Gewohnheiten dieſer Vögel iſt ihre Art, ſich vom Zweig eines Baumes herab wie ein Bienenſchwarm in Mengen aneinander zu hängen.“

Die Zeit der Brut iſt vom September bis zum Dezember. Die Lage des Neſtes iſt ſehr verſchieden. Oft iſt es auf einem dichtbelaubten Zweig nahe dem Boden angebracht, oft in einer kahlen Gabel, neben dem Stamm eines Baumes, in einer Niſche, die durch vom Stamm abgelöſte Rinde gebildet iſt, u. a. Das Neſt iſt ziemlich ſeicht, von runder Form, hat ungefähr fünf Zoll im Durchmeſſer, iſt aus zarten Zweigen gebildet und mit faſerigen Wurzeln gefüttert. Das Gelege beſteht gewöhnlich aus vier Eiern. Ihre Grundfarbe iſt ein trübes Weiß, das mit umberbraunen Flecken überſäet iſt; bei einigen erſcheint eine Reihe von grauen Punkten gleichſam unter der Oberfläche der Schale. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von August Hopfer in Burg b. M.

Geſetzl. geſchützt.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die

Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [732]

Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Geſetzl. geſchützt.

Mehlwürmer,

ſtaubfrei, à Lit. ℳ 4,50, Ko. ℳ 8, **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Lit. ℳ 1, bei 10 Lit. 90 ₰; l bei 5 Lit. 70 ₰, bei 10 Lit. 65 ₰ empfiehlt u. verſ. geg. Nachn. [733]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Vögel.

Die beſten

orientaliſchen Wildfänge, ſofort ſingend: [734]

Sproſſer	à 7—12	ℳ
Nachtigalen	„ 3—5	„
Schwarzblattel	„ 3,50	„
Steinröthel	„ 10,—	„
Blaudroſſeln	„ 15,—	„
Gartengrasmücken	„ 3,—	„
Sperbergrasmücken	„ 3,—	„
Gelbe Spötter	„ 4,—	„
Sumpfrohrſänger	„ 4,—	„
Rothrück. Würger	„ 2,—	„
Schwarzſtirn. Würger	3,—	„
Pirole	à 5,—	„

einſchl. Verpackung, liefert direkt vom Fangort, die reellſte weltbekannte Firma

„Ornis“ in Prag.

Jede Sorte edler

Weichfutter-Vögel

in geſanglich erprobten ſeltenen Exemplaren empfiehlt direkt von Ort und Stelle reellſt und fachkundigſt unter üblicher Gewähr

Mathias Rauſch,

Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten Singvögel,

Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95. [785]

Preisliſte gratis bei Angabe über welche Vogelart.

Eine graue Grasmücke und ein Rothkehlchen,

beide laut ſingend, 5 ℳ. [736]

Georg Stahl,
Dietlingen bei Pforzheim.

Achtung!

Nur abgehörte Sänger.

Sproſſer ff.,	p. St.	14,—	ℳ
„ mind. Säng.	„ „	5,—	„
Nachtigalen ff.,	„ „	8,—	„
„ mind. Säng.	„ „	2,50	„
Steinröthel ff.,	„ „	14,—	„
Schwarzplatte	1,50, 3 bis	5,—	„
Grasmücken	2 bis	5,—	„
Blaukehlchen, futterfeſt		10,—	„
Rothkehlchen, ff. Säng.		3,—	„

Außerdem

Sproſſer- u. Nachtigalenfutter

zum Selbſtkoſtenpreiſe.

Die Preiſe ſind wohl höher wie in anderen Inſeraten angegeben, dafür ſind aber alle zum Verſandt kommende Vögel prima Sänger.

Jeder Liebhaber ſuche ſofort zu beſtellen, damit ich in der Lage bin, allen Anſprüchen gerecht zu werden. [737]

Robert Feix,
Gablonz a. N. (Deutſch-Böhmen).

Sproſſer,

aus der **Bukowina,** mit tiefſchalligem Geſange, 1 Dtz. 90 ℳ, ½ Dtz. 48 ℳ, ⅓ Dtz. 35 ℳ. Einzelne Exemplare à 10 ℳ. Verſandt vom 1. Mai an.

Nachtigalen,

ungariſche, mit vorzügl. Geſange, 1 Dtz. 45 ℳ, ½ Dtz. 24 ℳ. Einzelne à 5 ℳ Verſandt vom circa 24. April an.

Steinröthel,

ungariſche Wildfänge, beſonders gute Sänger, à 9 ℳ.

Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, gelbe Spötter,

per Stück 3 ℳ. Letztere vier Gattungen von Ende April an lieferbar. Emballage berechne ich billigſt. Für lebendes Eintreffen und ſichere Männchen leiſte ich **jede Garantie.** Um den verſchiedenen Aufträgen meiner geehrten Kunden vollkommen nachkommen zu können, erbitte ich mir **möglichſt frühzeitige Beſtellung.** [738]

Carl Aumeyer, Vogelhandlg.
in **Linz** a. Donau, Landſtraße 42.

Ausgezeichnete **Harzer Kanarienſänger** hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [739]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Iª Sprosser für Kenner,

Baß-Polacken und Woyakvögel, tief und langſam gehend, exiſtiren noch wie vor 50 Jahren, und bringt dieſe in den Handel nur allein [740]

„Ornis“ in Prag.

Nachtigalen,

ungariſche mit vorzüglichem Geſang, 1 Dtzd. 45 ℳ, ½ Dtzd. 24 ℳ, einzeln 5 ℳ.

Schwarzköpfe,

Tiroler, mit hochfeinem Doppelüberſchlag, Dtzd. 36 ℳ, ½ Dtzd. 20 ℳ, einzeln 4,50 ℳ Für lebende Ankunft und ſichere Männchen leiſten volle Garantie. Um den Aufträgen unſerer geehrten Kunden vollſtändig nachkommen zu können, erbitten wir frühzeitige Beſtellung. Verſandt von Ende April an. ~~Ferner Stiglitze, Hänflinge, Zeiſige u. Buchfinken à Stck. 1,50 ℳ.~~ Von den früher ausgebotenen Lerchen noch Vorrath. Haidelerchen Stck. 2,50 ℳ, Feldlerchen 1,50 ℳ, Blaukehlchen, fleißige Sänger. Stck. 3,50 ℳ.

Gebr. Hans,
[741] **Hofſtetten** b. Gemünden a. M.

Zur Hälfte des reellen Werthes

verk. Zeitmangels halber die für mich zur Hecke beſtimmt., ſehr gut., aus 1. Züchterei ſtammenden **Hohl- u. Knorrvögel,** Stamm Trute, und zwar: 3 Hähne à 10 ℳ und 8 Weibchen à 1,25 ℳ, zuſammen 35 ℳ. Verpackung und 6 neue Einſatzbauer gratis, Nachnahme. [742]

W. Hilbert, Forſt i. L., Schützenſtr. 5.

Orpheusgrasmücken

alte Frühjahrsfänge, mit gelben Augenringen, mit vorzüglichem Geſang, à 10 ℳ per Stück, liefert nur [743]

„Ornis“ in Prag.

Wegen längerer Reiſe

gebe ſofort folg. gut bef. u. **ausgeſuchte** Sänger **billig** in gute Hände: **1 Blaukehlchen, 1 Schwarzplättchen, 1 Sperbergrasm.,** à 5 ℳ, je 1 Zuchtpar **Moſambikz.** u. **Grau-Edelſänger,** à Par 4 ℳ,

1 Steinröthel, Wildf., Männch., vorz. Spötter u. fl. Sänger, kommt f. Pfleger auf d. Hand, 14 ℳ u. prakt. Käfig v. Voß, wie neu. Alles zuſ. nach Uebereink. Vögel ſind 1—2 J. in m. Beſitz. Leiſte **jede** Garantie. Offert. unt. **„Th.“** a. d. Exped. d. „Gef. Welt“ erbeten. [744]

1,1 Turteltauben

mit 1 Jungen von 98, 7 ℳ, ~~1,1 Dompfaffen 3,50 ℳ, **Stiglitz** 2 ℳ, **Zeiſig** 1,50 ℳ,~~ **Rothhänfling** 2 ℳ, **Buchfinken** 1,50 ℳ, alle im Geſang. **1 Eichelheher** 2 ℳ, **2 Eichkatzen** à 2 ℳ, alle im Freien überwintert. [745]

F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

Geſucht:

Kleine Kubafinken, Männchen. Offert. u. „Kuba“ an die Exped. d. Bl. [746]



No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.

No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50

Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.–**

═ ***Spezial-Artikel*** ═

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

☛ Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige** für **Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc.** mit **sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [747]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

☛ Zur Lieferung ihrer Lieblinge empfiehlt ſich den P. T. Herren

Vogelliebhabern

die beſtbewährteſte, ſtreng reelle Vogelhandlung von [748]

Gottlieb Wanek, Prag 411, I.

Sehr ſeltene ruſſiſche

Weiden-Sproſſer

aus den Uferpflanzungen verſchiedener großer Stromgebiete des fernen europäiſchen Nordoſtens und Nordweſtens zu 20 bis 35 ℳ;

☛ **feine** ☚

Au- u. Wald-Sprosser

verſchiedener Gebiete u. Länder zu 12 bis 18 ℳ, ſowie **gewöhnliche Sproſſer** zu 7 bis 10 ℳ, direkt von Ort und Stelle durch den ſeit vielen Jahren allſeitig als ſtreng reell bekannten und ſtets fachmänniſch bewährten Spezialiſten

Mathias Rausch,

[749] **Wien VII/3,**

Schottenfeldgaſſe Nr. 95.

☛ **Zaunkönige** ☚

à 3 ℳ, **Sumpfmeiſen** Par 2 ℳ, **Blaumeiſen** Par 1,50 ℳ, **Tannenmeiſen** Par 2 ℳ, **Rothkehlchen** à 1 ℳ, **Zeiſige** à 1,25 ℳ, **Stieglitze** à 1 ℳ, **Rothhänflinge** à 2,50 ℳ, **rothe Dompfaffen** à 4 ℳ, **Buchfinken** à 1 ℳ, eine laut ſingende **Schwarzdroſſel** 8 ℳ, eine **Graudroſſel** 6 ℳ, **Rohrammern** à 1,50 ℳ, **Kanarienhähne** von 7 bis 10 ℳ an, je nach Leiſtung. Verſandt per Nachnahme, Garantie Männchen u. lebende Ankunft. [750]

Rud. Meier,
Vogelverſandt, Neuendorf b. Potsd.

☛ 1898 erhielt mein Stamm Harzer **Kanarienvögel** 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10–25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.
Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [751]

☛ **3 Singdroſſeln,** Davidzippe, prima Sänger, à 10 ℳ. **3 Schwarzdroſſeln,** rein Waldgeſ. à 8 ℳ. **2 Schwarzplättchen,** Doppelüberſchl. à 7 ℳ. **2 Rothkehlchen,** Lichtſänger à 4 ℳ. **1 Steinröthel,** mit reiz. Geſang, à 14 ℳ.

Sämmtliche Vögel ſind kerngeſund, über 1 Jahr im Käfig und im vollen Geſang.

Verſandt per Nachnahme, leb. Ankunft garantirt. [752]

Heinr. Jost, St. Jngbert, Rheinpfalz.

Jene P. T. Herren

Vogelliebhaber,

welche für verhältnißmäßig wenig Geld **wirklich gute und ſeltene Sproſſer, Nachtigalen, Schwarzköpfe** und andere edle Stubenvögel zu erwerben wünſchen, belieben ihre genauen Adreſſen unter **„Vogelfreund“** an die Expedition der „Gefiederten Welt“ einzuſenden. [753]

Feinste Kanariensänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [754]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.

Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

Kanarienvögel, echte Harzer Roller ohne Fehler, à St. 10, 12, 15, 20 u. 25 ℳ, mit Porto u. Verpackung u. 14 Tage Probezeit, **aber nur per Nachnahme,** nicht gefallende Vögel tauſche um oder auf Wunſch zahle zurück. Rollerweibchen 1,50 ℳ. Preisliſte frei. [755]

L. G. Müller, Vogelzüchterei,
Nordhauſen a. Harz.

Rothk. Papagei-Amandine

(Männchen) ſofort zu kaufen geſucht [756]
C. Nebel, Leipzig, Hospitalſtr. 13.

Verk. f. bill. 1 Gebirgsſpr., vorz. S., 1 e. reinſch. Reitzugfink. Lehrer Günther, Lommatzſch. [757

Zwei Par Gimpel

(Zuchtpare), mehrere Weibchen **Wellenſittiche** habe abzugeben, tauſche auch auf Zuchtpar **Diamant-** und **Gürtelgrasfinken,** auch kaufe ſolche. [758]

Gg. Heublein, Coburg.

Harzer Edelroller,

tieftourenreich u. weltbekannt, liefere überall hin. Der Preis richtet ſich nach Geſangsleiſtung, à St. 7, 8, 10, 12, 15 bis 30 ℳ. Verſandt unter Nachnahme. Garantie für geſundes Ankommen. [759]

Joh. Wink, Dresden-A., Marſchallſtr. 37.
Züchterei hochedler Kanarien, gegr. 1885.
Goldene u. ſilberne Medaillen. Viele Dankſchreiben.

Feinſte

Edelroller!

mit den ſchönſten Touren, zart, tief und lang, noch ein Poſten ff. Frühbrut-Heckvögel, Dtz. 90 ℳ, Probevogel 10 ℳ, 14 Tage Probe gegen Nachnahme. [760]

A. H. Pütsch, Spezial-Züchterei,
Schönhauſen a. Elbe.

Bücher-Anzeigen.

Für Aquarienliebhaber!

Im unterzeichneten Verlage erſcheint

Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde

herausgegeben von **Dr. E. Bade.**
(Monatlich zwei Nummern!)
Preis: halbjährlich Mk. 2.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in **Magdeburg.**

In unserem Verlage erschien:

Das Huhn als Nutzgeflügel.

Von
Dr. Karl Russ.

Zweite, reich illustrirte Auflage.
Preis M. 2.—; geb. 2.50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung.
in Magdeburg.

In unſerm Verlage erſchien:

Naturgeſchichte der deutſchen Sumpf- u. Strandvögel

von **Dr. Curt Floericke.**

Mit 41 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck.

Broch. ℳ 4.50, geb. ℳ 5.50.

Dieſes, eine höchſt intereſſante, noch wenig bekannte Vogelgruppe behandelnde Werk iſt in der Hauptſache auf Grund eigener Beobachtungen des Verfaſſers entſtanden, und ſo reizvoll geſchrieben, daß es das volle Intereſſe jedes Naturfreunds, Jägers oder Landmanns in Anſpruch nehmen muß.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Die gefiederte Welt
Wochenschrift für
Vogelliebhaber,
Züchter und Händler
von
Dr. Karl Ruß.

[illegible] [illegible] [illegible]

Inhalt der Nr. 17.

Fremdländiſche Finken (Fortſetzung).
Der Gelbſpötter (Sylvia hypolaïs, L.) und ſeine Behandlung als Stubenvogel. (Schluß aus Nr. 1 d. J.)
Liebe und Ehe im Leben der Vögel (Schluß ſtatt Fortſ.).
Reiſen und Forſchungen.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [761]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [762]

Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!

Arthur Herrmann & Luther, Oſchatz i. S.

C. L. Flemming

Holzwaarenfabrik

Globenſtein

Post Rittersgrün, Sachsen

empfiehlt: [763]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.

Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.

Man verlange Preisliste.

Neu! **Senſationell!**

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, ohne Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [764] **Edmund Schiewick**, Zittau, Sachſen.

Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

Hermann Schramm's mechaniſche Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [765]

Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Schädliche Inſekten im Obſt- u. Gartenbau werden am ſicherſten durch Meiſen vertilgt.

Niſtkäſten für Meiſen aus Rundholz Stück 35 ₰, 10 Stück 3 ℳ, 100 Stück 28 ℳ.
[766] **Kempf, Neuforg,** Fichtelgeb.

Natur-Schlafkaſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ. [767]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Ltr. 1 ℳ Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen,** M.-Gladbach 112.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[768] **R. Schröter,** Elingen-Greußen.

Käfige

für Sproſſer,

Nachtigalen und alle übrigen Weichfreſſer, wie ſie das gute Gedeihen dieſer edlen Vögel **unbedingt** erheiſchen, werden, ſoweit der Vorrath reicht, als **Muſter-Käfige** zu den üblichen Preiſen auch jetzt abgegeben, und deren **genaue Nachahmung** im Intereſſe der Vogelliebhaberei allen wirklich Sachverſtändigen empfohlen.

Mathias Rausch,
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der
[769] beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Futtermittel.

Mehlwürmer,

rein reell gemeſſen, nur prachtvolle große Futterwürmer, Ltr. 5,— ℳ, Kilo 8,— ℳ, 1000 Stck. 1,60 ℳ **Anweiſung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer** 40 ₰, **Ameiſeneier**, nur feinſte, ſtaubfreie Ware, pr. Ltr. 70 ₰, Kilo 3,—, 10 Ltr. 6,50 ℳ, **Weißwurm** feinſter Beſchaffenheit, Ltr. 80 ₰, **Vogelleim, Netzfallen, Neſter,** Samen u. a. Preisliſte poſtfrei. Verpackung frei. [771]

Theodor Frank, Barmen.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko 3½, à Ltr. 80 ₰

Muska, hochſ. 98er, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 4½, à Ko. 8.

Prävar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 4, 5 Ko. 19.

Bisquit u. Eierbrot, beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 18.

Glanzſat	Poſtſack	5	Ko.	no.	1,50
Hanfſat	„	„	„	„	1,60
Hafer geſchält	„	„	„	„	2,25
Mohn blau	„	„	„	„	3,75
Hirſe weiß Pa.	„	„	„	„	2,—
do. Senegal	„	„	„	„	2,25
do. do. i. Kolb.	„	„	„	„	5,—
do. algeriſche	„	„	„	„	2,—
do. indiſche	„	„	„	„	1,75
Sonnenblumen	„	„	„	„	2,—
Kürbiskerne	„	„	„	„	3,25
Reis i. Hülſen	„	„	„	„	2,25
Zirbelnüſſe	„	„	„	„	4,—

Oſſa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [772]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. Vogelfutterarten gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Ja! Ja! es ist wahr!

Ich verſende nur ſaubere Ware. [773]
Futter für: **Prachtfinken, Reisfinken, Kardinäle, Sittiche, Papageien** (große), **Dompfaff** und **Waldvögel** (als Hänfling, Stiglitz, Zeiſig, Fink) je 5 Ko. 2 ℳ. Bei Entnahme von 3 Poſtkolli füge ich eine ſelbſtthätige Trinkflaſche, ſehr praktiſch für Vögel, gratis bei.

H. P. Lange, Samenhdl., Gottesberg i. Schl.

Frische Ameiseneier

liefere den ganzen Sommer hindurch, nur friſche Ware, à Ltr. 1 ℳ **Joseph Böning,**
[774] Braunſchweig, Klint Nr. 3.

Für alle Arten Vögel fertige ich **ſachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [770]

Die gefiederte Welt.

Wochenschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

[illegible]

Ihm nahe verwandt iſt **Caſſins Purpurgimpel** (P. Cassini, *Brd.*): oberſeits graubraun, jede Feder mit dunkler Mitte, hier und da röthlich angeflogen; Kopfkrone karminroth; Bürzel, Kehle und Bruſt roſaroth; übrige Unterſeite weißlich. Das Weibchen iſt olivengrau, dunkler geſtrichelt, Unterſeite weißlich. Er iſt über Colorado, Nevada, Mexiko verbreitet. Eingeführt iſt er noch nicht.

Ein intereſſanter, bei uns wenig bekannter, bei den amerikaniſchen Vogelfreunden ſehr beliebter Vogel iſt der **Hausgimpel** (P. frontalis, *Say*); er erſcheint an Kopf, Hals, Bruſt und Bürzel karminſcharlach- oder erdbeerroth; das Roth erſtreckt ſich manchmal auch über die ganze Unterſeite, mit Ausnahme des weißlichen Bauches und der dunkel gefleckten Seiten; Rücken und Kopfkrone dunkelbräunlich, roth verwaſchen; Flügel und Schwanz bräunlichgrau. Dem Weibchen fehlt das Roth. Seine Heimat iſt der Weſten der Vereinigten Staaten, beſonders Neumexiko und Kalifornien. Den Namen führt er daher, daß er die Nähe des Menſchen mit Vorliebe aufſucht und nicht nur in Gärten und Höfen, ſondern ſogar in bewohnten Gebäuden niſtet; er ſoll ſelbſt in die Wohnungen kommen, um Nahrung zu holen. Selbſtverſtändlich findet man ihn ebenſo in Gärten und Weinbergen. Auch von Menſchen ausgelegte Niſtgelegenheiten benutzen dieſe Vögel, wie ſie denn überhaupt vor dem Menſchen keinerlei Scheu haben. Das Neſt ſteht ſowol auf vorſpringenden Balken an den Häuſern, an Dachrinnen, unter Thorwegen, in Scheunen u. a., wie im Garten auf wagerechten Zweigen der Bäume; es beſteht meiſt aus kleinen Reiſern und Pflanzenſtengeln und wird mit Federn, Baumwolle, Gras u. a. ausgelegt. Das Neſt enthält fünf bläulichweiße, braun getüpfelte und geſtrichelte Eier.

Den Geſang des Hausgimpels bezeichnet Gambel als melodiſcher, wie den anderer Finken. Oberſt Mac Call vergleicht ihn mit den ſanften Tönen des Hauszaunkönigs und dem hellen Schmettern des Kanarienvogels. H. Nehrling nennt ihn ein hervorragendes melodiſches Tonſtück. W. Zimmermann in Chicago, der für Nehrlings Prachtwerk werthvolle Mittheilungen über dieſen Vogel machte, bezeichnet den Geſang als nicht beſonders kunſtvoll, aber ungemein waldfriſch und melodiſch, an den Schlag des deutſchen Buch- und Diſtelfink erinnernd.

In Amerika wird der Hausgimpel wenig als Stubenvogel gehalten, da man ſich unſchwer an ſeinem Lied im Freien erfreuen kann. Nach Europa gelangt er leider ſelten. Im Berliner zoologiſchen Garten iſt gegenwärtig ein Vogel dieſer Art; man findet ihn unter dem deutſchen Namen Rothkopfgimpel.

Der **Roſengimpel** (F. rosea, *Pall.*) iſt an Kopf, Hals, Bruſt, Weichen und Bürzel roſenroth; Stirn und Kehlfedern ſilberweiß mit roſigen Säumen; Rücken auf roſigem Grunde ſchwarzbraun geſtrichelt; Bauchmitte und Unterleib roſig weiß; Flügelfedern ſchwarzbraun mit weißen oder, wie die Schwanzfedern, blaßroſa Säumen; das Weibchen erſcheint einfach lerchenfarbig. Seine Heimat erſtreckt ſich über das nördliche Aſien, beſonders Oſtſibirien; im Winter erſcheint er in Rußland und Ungarn; zuweilen verfliegt er ſich nach Deutſchland. Sein Hauptaufenthalt ſind die lichten Laubwaldungen Sibiriens, welche aus Kiefern und Birken beſtehen, ſowie buſchreiche Flußufer. Er nährt ſich von Sämereien und Beren. In den Beſitz des Liebhabers dürfte er ſelten gelangen. Man füttert ihn wie den Hakengimpel: mit Rübſen, Hafer und wenig Hanf, nebſt Ebereſchen- und Wachholderberen, Mehlwürmern und Ameiſenpuppen. Als Leckerei bietet man ihm Knoſpen von Fichten u. a. Nadelholzbäumen. Im Sommer ſind viel Kerbthiere zu reichen: Blattläuſe, Raupen, Schaben u. a.; im Winter genügt die Fütterung von Hanf nebſt Ebereſchenberen und mannigfaltigem Grünkraut, bzl. Baumknoſpen. (Fortſetzung folgt.)

Der Gelbſpötter (Sylvia hypolaïs, *L.*) und ſeine Behandlung als Stubenvogel.

Von Karl Kullmann.

(Schluß aus Nr. 1 d. J.).

Nachdem man ſeinen Gelbſpötter ungefähr vier bis fünf Wochen mit blanken Ameiſenpuppen und Mehlwürmern gefüttert hat — wobei ich ausdrücklich bemerke, daß ſtets Trinkwaſſer dazu gereicht werden muß —, fängt man langſam an, den Vogel an ein ſelbſtbereitetes Miſchfutter überzugewöhnen. Zu dieſem Behuf nimmt man geriebene, abgewelkte Gelbrübe, mit etwas gemahlenem Weißwurm, Eierbrot und Quarkkäſe gemiſcht, ſättigt das Ganze mit halb friſchen und halb trocknen Ameiſenpuppen, an den erſten Tagen legt man auf vorſtehend präparirtes Gemiſch eine dünne Schicht friſcher Ameiſenpuppen, letztere nach und nach vermindernd, bis der Vogel, ohne es viel zu merken, an ſein Zukunftsfutter gewöhnt iſt. Man beachte jedoch, daß das Futter ſtets flaumig und ganz locker ſein muß; dies iſt für den Vogelmagen leichter verdaulich. Zu naſſes Futter macht den Vogel, gleichviel ob Spötter oder wie er ſonſt heißen mag, ſtets faul und träge, die erſte Bedingung zur ſtillen Zeit ſich in's Fettpolſter zu legen, was beim Abtreiben deſſelben häufig den Tod des Vogels im Gefolge hat. Aus dieſem Grund bin ich ein abgeſagter Feind von ſogenanntem Univerſalfutter, und in den vielen Jahren meiner Liebhaberei habe ich niemals ſolches gefüttert, von dem Grundſatz ausgehend: „Eines ſchickt ſich nicht für Alle“. Man muß eben, um ſich richtiger Vogelpfleger zu nennen, das Naturell und die Individualität eines jeden Vogels gleichſam ſtudiren, danach ſeine Behandlung treffen und als Hauptſache das richtige Futter für jeden einzelnen Vogel, ſo wie er es gern hat, zuzubereiten verſtehen. Iſt dies der Fall, dann iſt man aber auch ſicher, daß ſich jeder Vogel als dankbarer Sänger ſeinem Pfleger gegenüber erkenntlich zeigt und ihn beim Herantreten an den Käfig ſchon durch Geſang oder Lockrufe begrüßt, denn daß Menſch und Vogel ſich kennen und gegenſeitig

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oder nicht, gut bekommt; das Sepia hat als Pulver zerrieben obendrein noch das Gute, das Futter ungemein locker und flaumig, alſo leicht verdaulich zu machen. Als weitere Zugabe reiche ich ab und zu klein zerſchnittenes gekochtes Rindfleiſch, etwas Milchhaut jetzt täglich, ſeltener hartgekochtes Ei und noch weniger rohes Fleiſch. Von Letzterm bin ich, ſelbſt beim rothrückigen Würger, nicht allzugroßer Freund, weil ich gefunden habe, daß zu häufiges Füttern mit demſelben ſcharfes Blut erzeugt. Die Folgen davon ſind die ſo häufigen Fußkrankheiten der Vögel, welche alsdann auf unrichtige Sprunghölzer u. a. zurückgeführt werden, deren Urſachen jedoch ganz wo anders, als äußerlich, nämlich im Blut zu ſuchen ſind.

Meine ſämtlichen Futtergefäße ſind doppeltheilig aus glaſirtem Ton; in die eine Hälfte erhält der Spötter das bereitete Miſchfutter und in die andere einen ſchwachen Eßlöffel guter trockner Ameiſenpuppen. Der Vogel kann ſich das eine oder andere Futter ſelbſt auswählen und die dürren Ameiſenpuppen können ruhig im Napf verbleiben, wenn der Spötter nicht alle verzehrt hat. Dies hat den Vortheil, daß, wenn der Vogel bei den langen Winterabenden im November und Dezember, wo es oft bereits um vier Uhr dunkel wird, vom Miſchfutter des Abends vielleicht nichts mehr im Napf hätte, er beim Gaslicht ſich noch ſeinen Magen mit Ameiſenpuppen ordentlich füllen kann. Ich habe ſchon manchen Spötter durchwintert, der es umgekehrt machte und das beſtbereitete Miſchfutter dann erſt annahm, wenn er vor Allem die trockenen Ameiſenpuppen gänzlich vertilgt hatte. Mehlwürmer reiche ich dem Gelbſpötter während des ganzen Jahrs nicht, wie überhaupt keinem überwinterten Vogel des Sommers über, da ich ihm ganz blanke friſche Ameiſenpuppen reiche, ſondern ich thue nur ſtets einige unter mein Miſchfutter, trotzdem ich dieſelben ſtets gut und billig beziehen könnte; ſechs bis zwölf Stück Mehlwürmer je nach Beſchaffenheit des Vogels und nach der Jahreszeit in zwei Rationen täglich und als Hauptdelikateſſe einige Speck- und Pelzkäferlarven während der Monate Januar und Februar, ſind nach meiner Ueberzeugung ausreichend.

Vom Baden des Gelbſpötters halte ich ſehr viel, beſonders wenn er, wie dies bei uns hier in der Gegend Mode iſt, in einem Käfig von 50 bis 60 cm Länge gehalten wird, wo der Vogel ſich nachher richtig ausfliegen und ſich Bewegung verſchaffen kann. Erſtens iſt das Baden zur Mauſer und zum Stoffwechſel nothwendig und zweitens verhindert es beim Gelbſpötter, welcher an ſich ſehr weiche Fußballen hat, die häufig entſtehenden Hühneraugen und die Schienen an den Beinen des Vogels.

Was nun die mehrerwähnte Drehſucht des Spötters anbetrifft, wovon in der „Gefiederten Welt“ im letzten Jahr ſoviel geſprochen wurde, ſo kann ich mich keines Falls weder bei meinen Freunden, die dieſen Vogel ſtets pflegen, noch bei mir entſinnen, daß ich ſolches gerade beim Spötter gefunden hätte; bei Nachtigalen und Grasmücken iſt es mir ſchon vorgekommen, jedoch war dies nur eine leidige Angewohnheit des Vogels und keine Krankheit. Dem habe ich aber ſchnell abgeholfen, indem ich die Vorderſeite des Käfigs mit einem Streifen grüner Gaze oder Leinwand bis zu den oberſten Sprungſtäben auf einige Wochen verdunkelt habe und der Vogel hat ſich dieſe Unart bald wieder abgewöhnt. Es ſind beſonders bei Nachtigalen ſtets feurige, raſſige Vögel, welche ſpät eingefangen waren und ihre Freiheit bzl. das Weibchen nicht ſo leicht vergeſſen können; anfänglich ſitzt ein ſolcher Vogel, ſtets nach der Käfigsecke ſchauend, wie träumend, rutſcht nach hinten, die Balanze verlierend ab und gewöhnt ſich das Drehen auf dieſe Weiſe an; ſolche Nachtigalen bezeichnen wir mit dem Beinamen „Sternengucker“. Aber wie geſagt, beim Gelbſpötter iſt mir dies nie vorgekommen und durch ein kürzeres oder längeres Verdunkeln des Bauers dürfte dies demſelben genau ſo leicht abzugewöhnen ſein, wie einem andern Vogel.

Wenn vielfach angenommen wird, der Gelbſpötter müſſe in einem ſehr warmen Raum während des Winters gehalten werden, um in die Mauſer zu kommen, ſo iſt dieſe Annahme nicht allein irrig, ſondern auch unrichtig im Intereſſe des Vogels, denn bei Holz- und Kohlenfeuer iſt die Zimmerluft bei weitem trockner, als in einem weniger geheizten Raum und nichts iſt dem Spötterchen ſchädlicher als gerade die trockne Hitze. In meinem Vogelzimmer wird nicht direkt, ſondern im Nebenzimmer gefeuert; dabei habe ich meinen Spötter anſtatt tief im Zimmer, wo es doch um 1 bis 2 Grad wärmer als am Fenſter iſt, gerade an letzterm Platz hängen. Wie ich außerdem gefunden, verblaßt das ſchöne Gefieder in einem ſehr warmen Zimmer weit eher, als in einem kühlern Zimmer. Will man dem Spötter einen wahren Genuß bereiten, ſo ſetze man ihn der erſten Januarſonne täglich ſo viel als es nur möglich iſt aus; der Vogel badet ſich regelmäßig vorher und läßt alsdann die Sonnenſtrahlen, auch wenn dieſelben noch ſo ſchwach ſind, auf ſeinen Körper einwirken, was ungemein zur leichten und raſchen Mauſer beiträgt.

Ich käme nun ſchließlich zum Hauptpunkt, und zwar zu dem des Geſangs. Ein wirklicher Künſtler kann ſtets nur ein Wildfang ſein; aufgepäppelte Spötter, und wenn ſie die beſten Lehrmeiſter ihrer Art oder andere Vögel vor ſich haben, werden ſtets Stümper bleiben, die für den Geſangskenner nicht den geringſten Werth beſitzen, weil ihnen vor allem die Hauptſache, „der edle Ton“ des Wildfangs, im Käfig niemals zu eigen wird, und dann der Geſang ſtets ein unzuſammenhängendes Gemiſch von allerlei Tönen bildet. Ein direkter Charakterſänger, ebenſowenig ein ausgeſprochener Imitator, wie es unſer rothrückiger Würger und der Sumpfrohrſänger ſind, iſt der Gelbſpötter nicht, ſondern er flicht in ſein Lied die Geſänge der in ſeiner Nähe niſtenden, jeweiligen Vögel zu einem Ganzen zuſammen.

Ein vollendeter Spötter muß eine volle und dabei weiche Stimme haben; der Vortrag muß langſam und in ſchleifenden Tönen vorgebracht werden, gleichſam als ob der Endton jedesmal in ein andre Lage übergehen wollte. Der Geſang darf nicht zu ſehr von dem charakteriſtiſchen Gäh, gäh, gäih, detrri, detrri des Spötters untermiſcht ſein. Wol kann er ſeinen Geſang, wie es die Meiſen thun, damit beginnen, aber zuviel davon gebracht entwerthet den Spötter geſanglich. Als ſchöne wohllautende Einleitungen nenne ich das Amſellied, den Pirolruf, welcher dem Spötter ſehr nahe liegt und wunderbar wirkt, ebenſo das

Gurgeln der Gartengrasmücke, den Wachtelſchlag, welchen er, beſonders im feurigen Geſang, täuſchend wiederzugeben weiß; ja ſelbſt das monotone düj, düj, düj des Wendehalſes klingt im Spöttergeſang edel und wohllautend, wie auch das Lied der Schwalbe durch ihn eine angenehme Wirkung auf das Ohr des Geſangskenners ausübt. Von der Nachtigal kann der ſcharfhörige Vogelpfleger wol auch einige Strofen heraushören, beſonders die tiefen Strofen gelingen dem Sprachmeiſter beſſer als die übrigen, welche nichts weniger als wohlthuend wirken, weil ſie, zu haſtig hervorgebracht, dadurch ſehr an Werth verlieren. Das Nachahmen des Grünſpechts, das ſogenannte Schellen, erinnert im Spöttergeſang vielmehr an das Lachen eines Menſchen als an eine Vogelſtimme. Von minderwerthigen Einflechtungen in ſeinem Geſang nenne ich vor allem den des Teichrohrſängers, des Hausſperlings, des Weidenlaubvogels, das Krähen- und Rabengeſchrei u. a.; dies ſind hauptſächlich Vögel, die inmitten einer Stadt in Gärten das Licht der Welt erblickt haben, wo ſie wenig gute Vögel zu hören Gelegenheit hatten. In unſerer nähern Umgebung, wo der Spötter ziemlich viel vorkommt, gibt es leider wenig Künſtler unter ihnen, eine Stunde von Frankfurt aber, an der Bergſtraße, kann man ganz bedeutende Sänger abhören, da die meiſten Gärten daſelbſt, wo unſer Vogel ſich eingeniſtet hat, umittelbar an Wald und Feld grenzen, und ihm hier alle Arten Vögel zu hören Gelegenheit ſich bietet. Um Berlin herum, ſchon in Tegel, ebenſo nach Oſten zu, wie Erkner, Rahnsdorf, Straußberg, kommen, wie in Potsdam, feine Spötter vor; das beſte und edelſte, was ich jedoch auf meinen vielen ornithologiſchen Streifzügen zu hören bekam, ſind die Spottvögel, wie der Hypolais daſelbſt genannt wird, im Erzgebirge; man hört da dreißig Stück in kleinem Terrain und nur hervorragende Künſtler mit einem Wohllaut im Ton und einer Abwechslung im Geſang, wie ich ſolche im ganzen Deutſchen Reich noch nicht abhören konnte. Den Grund hierfür kann ich mir leicht erklären: die Vögel wechſeln daſelbſt in den Gebirgsſtädtchen und Dörfern in den nahen Tannen- und Laubwald, wo ſie viel feine Vögel hören können, und außerdem werden dort von Liebhabern keine Spötter gekäfigt, deshalb auch keine gefangen und der gute Stamm von alten Vorſchlägern bleibt dem jungen Nachwuchs ſtets erhalten. —

Die Zeit des Eintreffens unſers Hypolais iſt ja nicht mehr fern, und wenn alſo meine Zeilen ihren Zweck, dem Spötter die denkbar beſte Pflege dadurch zu Theil werden zu laſſen, erfüllt haben, ſo iſt meinem Wunſch Genüge geſchehen, und allen Liebhabern unſers Gartenlaubvogels rufe ich von Herzen ein „Gut Geſang“ zu. —

Liebe und Ehe im Leben der Vögel.

Vortrag, gehalten im Verein der Liebhaber einheimiſcher Vögel zu Berlin
von Hermann Schramm.

(Schluß ſtatt Fortſetzung).

Doch keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt auch Vogelehen, in denen das gute Einvernehmen und das Eheglück öfter geſtört ſind. Hierher gehört die Straußenehe, welche wol die einzige ſein dürfte, in welcher es zu Thätlichkeiten und Schlägen zwiſchen den beiden Gatten kommt. Denn das Straußenmännchen iſt kein Pantoffelheld; kaum hat er das Weibchen im Kampf gegen den Nebenbuhler errungen, ſo geht es dem letztern nicht beſſer als dem eben beſiegten Gegner, er mißhandelt es durch herriſches Benehmen und ſogar durch Schläge. Ob er ein oder mehrere Weibchen hat, iſt bis jetzt bei der großen Scheu und Vorſicht, die der Vogel im wilden Zuſtand an den Tag legt, noch nicht feſtgeſtellt. Der Grund für die ſchlechte Behandlung des Weibchens dürfte wol darin zu ſuchen ſein, daß das Männchen nicht allein zum größten Theil das Brutgeſchäft, ſondern auch die Erziehung und Pflege der Jungen, ſelbſtredend vom Weibchen unterſtützt, übernimmt und auch ſpäterhin bei Führung der Jungen mehr Aengſtlichkeit und Sorgfalt bekundet, als das Weibchen, welches eine mehr paſſive Rolle ſpielt.

Aber auch Untreue kommt ſelbſt bei den in Einehe lebenden Vögeln, wenn auch nur ſelten, vor. So treu auch die Weibchen an ihren Gatten hängen, ſo wenig ſie nach anderen Gatten ſchielen oder gar einen aufdringlichen Hausfreund annehmen: ein Meiſterſänger derſelben Art, der im Geſang mehr leiſtet, oder bei Raubvögeln Einer, der bedeutend ſtärker iſt, als der erwählte Gatte, iſt oft der Störer des Eheglücks, ja er iſt vielleicht imſtande, die Gattin dem Gatten abwendig zu machen. Hierfür ſind die vielen Junggeſellen, die im Land fortwährend umherſtreichen und vor oder noch während der Brutzeit frech und dreiſt um die Gunſt des angeparten Weibchens werben, der beſte Beweis. Das beweiſen auch die Kämpfe, die zwiſchen dem rechtmäßigen Gatten und dem Eindringling ſofort ſich entſpinnen, ohne daß die Gattin ſich auch jetzt dabei betheiligt. Hierfür ſpricht auch der Umſtand, daß das zur Wittwe gewordene Vogelweibchen ſich ſofort wieder durch einen neuen Ehebund zu tröſten weiß, ja vielleicht ſogar dem Mörder ihres Gatten die Hand reicht.

Vater Brehm erzählt eine kleine Epiſode, welche die Richtigkeit der letzten Behauptung beweiſt. In einem Dorf bei Erfurt brütete ein Storchpar. Beide lebten glücklich und in beſter Eintracht, hatten jedoch viel von Eindringlingen zu leiden. In einem Frühjahr erſchien wieder ein ſolcher Eindringling, der an Ausdauer, Frechheit und Dreiſtigkeit alle früheren Bewerber überbot und unter allen Umſtänden das Storchweibchen beſitzen wollte. Aber alle Angriffe wurden ſiegreich abgeſchlagen. Da ſtand eines Tags, vom Kampf ermüdet, das Männchen auf dem Neſt, das es in dieſer Zeit nur ſelten verlaſſen konnte, und hatte den Kopf unter den Flügel geſteckt; dies benutzte der Eindringling, ſtieß aus der Höhe herab und durchbohrte den Nichtsahnenden mit dem Schnabel, ſodaß er leblos auf den Hof herabfiel. Und was that die treue Gattin? Sie ſtieß den Meuchelmörder von ſich, werden Sie glauben. Nein, das Geſchäft ging ruhig weiter. Doch dürfte es wol nur wenige Ausnahmen von der Regel geben, die die Weibchen der Untreue und geringen Anhänglichkeit an den Gatten zu beſchuldigen imſtande ſind; weit eher machen ſich die Männchen ſchuldig, die doch wahrhaftig allen Grund zur ehelichen Treue den, in der Regel in der Minderzahl vorhandenen, Weibchen gegenüber hätten. Schon die Alten ſtellten, obwol mit Unrecht, die Tauben als Sinnbild aller möglichen Tugenden hin; doch ihre Treue iſt nicht echt und ihre Zärtlichkeit gegen Gattin und Kinder erheuchelt. Denn nicht ſelten benutzen die Täuber, während die Gattin zu Hauſe auf dem Neſt ſitzt und dieſes nicht verlaſſen kann, dieſe Gelegenheit, um mit anderen Täubinnen Liebſchaften anzuknüpfen. Noch ſchlimmer ſind die Enteriche in dieſer Beziehung. Während die alte Ente auf dem Neſt ſitzt, ſchlagen ſich die Eheherren in Geſellſchaften zuſammen, allerlei Kurzweil treibend; ſie laſſen ihre Gattinen ſich allein plagen und für die zahlreiche Nachkommenſchaft ſorgen. Erſt ſpäter, wenn die Jungen groß und ſelbſtſtändig geworden ſind, laſſen ſie ſich wieder ſehen und oftmals auch nicht einmal bei den treuen Gattinen. Die Rothhähne, eine in Spanien vorkommende, unſerm Rebhuhn ähnliche Vogelart, und jedenfalls letztere auch, ſind noch berüchtigter. Im Frühjahr zur Parungszeit erſcheint auf den Ruf des Rothhahns ſofort ein andrer. Der Spanier macht ſich dies bei der Jagd zunutze; er ſtellt im Frühjahr in einem Käfig einen Rothhahn auf das Feld, verbirgt ſich und erlegt dann den auf den Ruf des im Korb befindlichen Rothhahns herbeigekommenen Nebenbuhler. Zur Brütezeit des Weibchens, da das Männchen zum Zweikampf keine Luſt mehr hat, iſt es umgekehrt; es wird ein Weibchen im Käfig ausgeſtellt und der geile Rothhahn erſcheint, um dieſe Gelegenheit zu benutzen und wird ſo ebenfalls eine Beute des Jägers. Doch wie geſagt, es ſind dies auch nur Ausnahmen von der Regel. Ganz anders verhält es ſich mit den in Vielehe lebenden Vögeln, z. B. den Kuhvögeln, den Kuckucken, Faſanen, Wachteln und verſchiedenen anderen. Man hat bis jetzt noch nicht entdecken können, weshalb der Kuckuck und ſeine Verwandten nicht brüten; die Annahme, daß er ſtets gerüſtet ſein müſſe, um dem irgendwo aufgetretenen Raupenfraß zu ſteuern, hat ſich nicht bewährt, da auch die Kuhvögel, die doch ihren Aufenthalt nicht ändern, ihre Brut der Pflege anderer Vögel anvertrauen. Man vermuthete auch, daß z. B. bei Hühnervögeln, die der Verfolgung ſehr ausgeſetzt ſind, die Vielehe eine zahlreichere Nachkommenſchaft hervorbringe; aber es war ein Irrthum. Auch in der Einehe lebende Hühnervögel ſtehen in Hinſicht der Nachkommenſchaft den Anderen um nichts nach. Fälſchlich findet man öfter anſtatt des Ausdrucks Vielehigkeit den Ausdruck Vielweiberei in ornithologiſchen Werken. Das Kuckucksweibchen z. B. hält es heute mit dieſem, morgen mit jenem Männchen, es zeigt ſich vielleicht in einer Stunde mehreren willfährig. Unſrer Haushenne iſt auch des Nachbars und jeder andre Hahn angenehm. Von einer eigentlichen Ehe kann bei dieſen Vögeln wol gar nicht die Rede ſein, denn die Männchen kümmern ſich nur zeitweilig um das Weibchen, ſondern ſich, wenn die Parungszeit vorüber, von einander ab; jedes geht ſeinen Weg, Freud und Leid wird nicht von ihnen zuſammen getheilt. Grenzenloſe Eiferſucht der Männchen, tolles Fordern und demüthiges Gewähren, dann aber vollſtändige Gleichgültigkeit kennzeichnen dieſe Ehen. Daher kommt es auch, daß unter ihnen ſehr leicht Mißbündniſſe entſtehen, aus denen Baſtarde ohne Nachkommenſchaft hervorgehen. Es kommt zwar auch vor, daß unter den in Einehigkeit lebenden Vögeln Miſchehen geſchloſſen werden, aber nur dann, wenn der Mangel eines Gatten derſelben Art die Urſache iſt, z. B. Auerhahn und Birkhuhn, während bei den vorher erwähnten (Kuckuck) der Zufall oder die verlockende Gelegenheit die Hauptrolle ſpielt.

Was iſt es nun aber, was die Vogelweibchen veranlaßt, ſo ſehr ſchnell den Verluſt des Gatten durch ein neues Ehebündniß zu vergeſſen? Es iſt die Noth und die Sorge um die Nachkommenſchaft, ſei es, daß ſich dieſelbe noch im Ei befindet, ſei es, daß ſie die hungrigen Schnäbel aufſperrend nach Futter verlangen. Ob die Trauer einer Vogelwittwe nicht ebenſo tief ſein kann, wie die eines Vogelwittwers, wollen wir nicht bezweifeln. Denn nicht anders wie jene Störchin, die den Gattenmörder annahm, machen es auch andere Vögel. Brehm erzählt von einem Elſterpar, das in ſeinem Garten niſtete und welches der in den Garten zahlreich vorhandenen Singvögel halber getödtet werden ſollte, folgende Beobachtung. Früh 7 Uhr wurde das Männchen erlegt, zwei Stunden ſpäter hatte das Weibchen ſchon wieder einen andern Gatten, welcher um 10 Uhr erlegt wurde; um 11 Uhr war ſchon wieder Erſatz da und die Hochzeiten hätten nicht aufgehört, wenn das Weibchen nicht mit dem dritten Gatten ausgewandert wäre. Daſſelbe iſt auch bei Rebhühnern beobachtet worden. Ein glaubwürdiger Beobachter fing vom Neſt eines Hausrothſchwanzes binnen 8 Tagen nicht weniger als 20 Männchen weg und erſt dann geſtattete er der 20 mal in Trauer um den verlorenen Gatten verſetzten aber ebenſo oft auch getröſteten Wittwe der Ehe Glück und Freuden.

Ganz anders verhalten ſich die Vogelmännchen, welche die treue Gattin verloren haben. Sie ſchreien laut, ihre Trauer durch Gebahren und Stimme zu erkennen gebend, umfliegen die Leiche der Gattin, berühren dieſelbe vielleicht auch mit dem Schnabel, um ſie aufrichten zu helfen und mit ihr davon zu fliegen und erheben, die Erfolgloſigkeit ihrer Bemühung einſehend, von neuem laute, auch dem Menſchen verſtändliche Klage, durchfliegen raſtlos ihr Brutgebiet, immer lockend und rufend, beſuchen alle Lieblingsplätze, nehmen nur die allernothwendigſte Menge von Nahrung zu ſich, ſtürzen ſich auf andere Männchen ihrer Art, gleichſam als ob ſie dieſelben um ihre Gattin beneideten. So treiben ſie es tage- ja wochenlang, immer am Unglücksorte verweilend, ohne daß ſie kleinere Ausflüge unternehmen, um ſich vielleicht nach einer andern Gattin umzuſehen. Einzelne Arten, nicht allein die ſo bezeichnend „Unzertrennliche“ genannte Papageien, ſondern auch Finken, ſelbſt der ſo grieſsgrämig dreinſchauende Uhu, verlieren infolge des ſo ſchweren Schickſalsſchlages die Freude und Luſt am Leben, ſich ſo lange grämend, bis der Tod ſie von ihrem Leiden erlöſt. Die Bekundung großer Trauer um die verlorene Gattin iſt beſonders bei ſolchen Vögeln beobachtet worden, welche anſcheinend das einzige Par ihrer Art in der betreffenden Gegend waren; die Folge davon war, daß das Männchen im Frühjahr nicht wieder an der Stelle, wo es ſo glücklich aber auch ſo unglücklich geworden war, erſchien.

Aus dem Angeführten geht hervor, daß die Trauer der Männchen eine tiefere iſt als die der Weibchen, und was dürfte wol die Urſache dazu ſein? Es iſt die große Schwierigkeit, oft ſogar die Unmöglichkeit, ein Weibchen zu bekommen. Das verwittwete Weibchen dagegen hat gar keine Zeit zur Trauer, denn früher oder ſpäter, manchmal ſogar ſofort iſt Erſatz für das verlorene Männchen da, und die trauernde Wittwe muß ſich wohl oder übel tröſten, zumal auch die Sorge um die zahlreiche Nachkommenſchaft mit in den Vordergrund tritt, ſodaß ein andauernder Kummer keine Macht gewinnen kann. Findet es ebenfalls keinen Erſatz für den verlorenen Gatten, ſo trauert es wol ebenſo lebhaft wie das Männchen, ja es thut vielleicht noch mehr, indem es freiwillig einem Ehebund entſagt, wie dies bei einem Sperlingsweibchen beobachtet wurde. Es brütete allein die Eier und zog mit unſäglicher Mühe die Jungen groß. Eugen von Homeyer verbürgt ein weiteres Beiſpiel von Wittwentrauer. Auf dem Dache dieſes Forſchers brütete ein Storchpar. Das Männchen kam beim Futterſuchen ſchändlich um's Leben. Die Mutter zog allein die Kinder groß und zog mit ihnen und anderen derſelben Art im Herbſt nach Afrika. Im Frühjahr erſcheint ſie wieder — aber allein. Sie ward viel umworben, weiſt aber alle Freier ab; ſie beſſert ihren Horſt aus, aber nur um ſich als Eigenthümerin zu zeigen. Sie zieht im Herbſt wieder fort, kehrt im Frühjahr wieder zurück. So treibt ſie es 11 Jahre. Im zwölften Jahr kommt ein anderes Storchpar und verſucht, in den Beſitz des Neſtes zu kommen. Es koſtet ſchwere Kämpfe um das Eigenthum, das ſie durch Eingehung einer Ehe leicht behalten könnte. Aber ſie bleibt ehelos und das Neſt wird ihr genommen. Sie verſchwindet anſcheinend aus der Gegend, aber nur, um ſich zwei Meilen entfernt den ganzen Sommer hindurch aufzuhalten. Iſt das Storchpar nach dem Süden gezogen, welches ihren Horſt geraubt hat, ſo erſcheint ſie auf demſelben und hält ſich kurze Zeit dort auf, um dann auch nach Süden zu ziehen. Sie war in der ganzen Gegend unter dem Namen die „Einſiedlerin“ bekannt, und ihr Geſchick und ihre Handlungsweiſe erwarben ihr große Theilnahme. —

Schließlich bemerke ich noch, daß die Vögel erſt dann zur Schließung einer Ehe ſchreiten, wenn ſie ausgewachſen, d. h. wenn ſie ihr vollſtändig ausgefärbtes Kleid erhalten haben. Nur bei Raubvögeln und bei großen Möven hat man noch nicht ausgefärbte Weibchen brütend gefunden, ein Umſtand, der wol auf die überwiegende Anzahl von Männchen zurückzuführen ſein dürfte.

Am Anfang meines Vortrages ſagte ich: gibt es wol eine Macht, die Kluft, die zwiſchen Vogel und Menſch beſteht, zu überbrücken? Sind Verhältniſſe denkbar, welche dieſelben zu weſentlich gleichen Lebensäußerungen veranlaſſen können? Dieſe Fragen müſſen wir mit einem entſchiedenen Ja beantworten. Die Vogelehe iſt die treueſte aller Ehen, denn nur der Tod kann ſie ſcheiden. Wirkliche Ehen gibt es nur unter den Vögeln und beneidenswerth erſcheint uns das Glück der Vogelliebe und Vogelehe.

Reiſen und Forſchungen.

Mit einem Dampfer der Hamburg-Südamerikaniſchen Dampfſchiffahrts-Geſellſchaft komme ich von Braſilien. Ich treffe mit meinem Transport lebender Thiere im Mai in Hamburg ein; es befinden ſich in demſelben vorausſichtlich nachſtehend aufgeführte Thierarten, welche von mir eingewöhnt wurden und von Hamburg bzl. Berlin zum Verſandt kommen: Säugethiere: Brüllaffe, Kapuzineraffe, Vampyr, Jaguar (Felis onza), Mbaracay (F. mitis), Tigerkatze (F. macrura et F. trigina); Silberlöwe, Yaguarundi, Hyrare, Griſon, Fiſchotter, Naſenbär, Beutelratte, Schwimmbeutler, Rohrbeutler, Zwergbeutler, Eichhörnchen, Ferkelmaus, Greifſtachler, Apaca, Goldhaſe, Waſſerſchwein, Aperea, Faulthier, Gürtelthier 9 B., Gürtelthier 12 B., Yurumi, Ameiſenbär, Kl. Ameiſenbär, Spießhirſch, Peccari, Wildſchwein, Tapir (T. terrestris); Vögel: Königsgeier, Truthahngeier, Rabengeier, Harpie, Tyrannadler, Schwalbenweih, Schleiereule u. a. Raubvögel. Zwergararas, Araras, blau, gelb, roth, Blumenauſittiche, Braunohrſittiche, Mönchſittiche, Goldſtirnſittiche, Weinrothamazonen, Gelbſchnabelpapageien, Blauſtirnamazonen, Sperlingspapageien, Tukane (R. discolorus), Pteroglossus maculirostris, Pt. Bailloni, Spechte, Kukuke, Glockenvögel (Ch. nudicollis), Tyrannen, Droſſeln, Honigſauger, Tangaren, Kardinäle, Morgenfinken, Safranfinken, Trupiale, Kuhſtare, Blauraben, Sperlingstauben, Erdtauben, Schuppentäubchen, Inambu, Schahu, Straußhühner, Zahnhühner, Jacutingas, Jucubembas, Teichhühner, Wildenten, Moſchusenten; Reptilien: Schildkröten, Echſen, Krokodile, Rieſenſchlangen (Boa constrictor), Fröſche; Fiſche: Chanchitos (Heros facetus), Panzerwelſe (Callichtys callichtys), Aal (Symbranchus marmoratus) u. A.; Pflanzen: Lebende Pflanzen als Cycas und Fächerpalmen, Orchideen, Bromelien, Kakteen und Farne und Samen.

Außerdem empfehle meine Beſtände in Naturalien der braſilianiſchen Fauna, als Säugethierbälge, Felle, Schädel, Skelette, Embryonen, Vogelbälge, Reptilien und Fiſche in Spiritus, Käfer, Schmetterlinge, Vogelſpinnen und andere Inſekten; getrocknete Urwaldfrüchte, Lianen, Hölzer, Landesprodukte und Fruchtkonſerven ſowie ethnographiſche Waffen und Geräthe der Botokudos. Die Preiſe der lebenden Thiere ſchwanken und richten ſich nach den Verluſten und auch nach Alter, Zahmheit, Schönheit und Geſchlecht. Gefällige Aufträge erbitte mir baldigſt nach Blumenau, Braſilien, oder Berlin-Karlshorſt, Auguſta Victoria-Straße 48. Wegen weiterer Auskunft ſtehe zu Dienſten. Sie wollen ſich p. Adr. Deutſches Konſulat Sao Paulo wenden. Carl Lehl, Naturaliſt.

Briefliche Mittheilungen.

... Die im Jahr 1896 mit ſechs und im vorigen Jahr mit drei überzähligen Männchen hier von mir ausgeſetzten Girlitze ſind, wie es ſcheint, bereits gegen Mitte März zurückgekommen, ihr ſcharfes Schwirren haben die Männchen aber zum erſten Mal am Oſtermontag, den 3. d. M., an den alten Standplätzen vernehmen laſſen. Es ſcheint eine gewiſſe Vermehrung des Beſtandes eingetreten zu ſein, trotzdem dieſe Vögelchen auf ihrer Reiſe nach dem Süden ſo vielen Verfolgungen ausgeſetzt ſind, und es leider hier auch nicht an den der Brut gefährlichen wildernden Katzen fehlt. Ihre Streifzüge ſcheinen ſie noch bereits bis zu dem eine halbe Stunde entfernten Bad Neuenahr ausgedehnt zu haben.

Die gelbe Bachſtelze ſoll hierorts, nach der mir zu Theil gewordenen Mittheilung des Sohnes eines vor längeren Jahren bereits verſtorbenen Vogelſtellers, des Meſſerſchmieds K., zuerſt in den Jahren 1872 oder 1873 aufgetreten ſein, während bis dahin nur die weiße bekannt war. Ob die ſeither vorgenommene Regulirung der vordem ſehr ungebärdigen Ahr und die Verwandlung eines größern verſumpften Areals in obſtbaumbeſtandene, fruchtbare Wieſen den Vogel zur Niederlaſſung beſtimmt hat?

Ueber die Kohlmeiſe habe ich eine eigenthümliche Wahrnehmung zu berichten. Ich habe im vorigen Sommer und Herbſt beſtändig Nelkenſtöcke vor dem Fenſter ſtehen gehabt, und nun fiel es mir auf, daß ich regelmäßig die morgens abgeblühten Blumenkelche, und nur dieſe, gänzlich zerbiſſen und ſtreifig zerſchliſſen vorfand. Ich wüßte nicht, welches Geſchöpf, außer den Kohlmeiſen, die ſich gern in der vor meinem Fenſter ſtehenden hohen Rüſter tummeln, dem Nelkenſamen als Leckerei nachſtellen ſollte. Mäuſe können es ſchwerlich geweſen ſein, denn ich habe ſolche nie wahrgenommen, und die ſchwanken, hohen Stengel dürften auch zu ſchwach ſein, um das Gewicht einer Maus zu tragen.

Eisvögel ſind hier ſtändig vertreten, und es wäre mir ſehr erwünſcht, wenn Sie, hochgeehrter Herr Doktor, mir gütigſt angeben wollten, wie ich mich in den Beſitz eines Neſtes derſelben ſetzen könnte, namentlich auch, wie tief etwa die Röhre iſt, die ſich dieſe Vögel graben. R. Laufs, Referendar.

Anfragen u.
Auskunft

Herrn Guſtav Schulz: 1. Der von Ihnen erfragte Vogel iſt durchſchnittlich 33—36 cm lang; die längſte Schwanzfeder beträgt 13—22 cm. 2. 42 cm Höhe, 33 cm Tiefe, Flugloch 11 cm. 3. Die Verpflegung iſt auf S. 409 des Handbuchs, das Sie ja beſitzen, genau angegeben. 4. Die beiden genannten Vogelhandlungen halte ich für durchaus reell.

Herrn W. Iſaaks: Wir werden in der Angelegenheit nähere Erkundigungen einziehen.

Herrn Joſef Böhm: 1. In dem Käfig von angegebener Größe könnten Sie im Nothfall zwei Par Zwergpapageien mit einem Paar Wellenſittiche zuſammen halten, doch müſſen Sie für jedes Pärchen in andrer Ecke einen Niſtkaſten anbringen, in den es zur Nacht ſchlüpfen kann und auch an verſchiedenen Seiten des Käfigs Futter- und Waſſernäpfe anbringen. 2. Das Sperbertäubchen (Columba striata, *L.*) erreicht kaum Droſſelgröße, das Sperlingstäubchen (C. passerina, *L.*) nur Lerchengröße. Letzteres iſt ſchöner gefärbt. Erſteres zeigt ſich ausdauernder, nur gegen Kälte empfindlich, während letzteres vor der Eingewöhnung ungemein ſcheu und überhaupt zarter iſt.

Fräulein W. v. Daum, Stiftsdame: 1. Zum Kennzeichnen der Wellenſittiche werden allgemein Anilinfarben verwendet, welche man nebſt Stempel in jeder großen Droguen- und Farbenwarenhandlung bekommen kann. Die alten Heckpärchen werden vor Beginn der Zucht an der unteren Flügel- und Schwanzſeite abgeſtempelt. 2. Sie können die Wellenſittiche ohne Bedenken aus den Käfigen laſſen. Die Sonnenvögel ſind flink genug, um unter deren etwaigen Angriffen nicht zu leiden. 3. Um Vögel, gleichviel welcher Art, aus einer Vogelſtube oder einem andern Zuchtraum herauszufangen, verwendet man das ſog. Fangbauer, wie es bei jedem Käfigfabrikanten, alſo hier in Berlin bei V. Schindler, Elſaſſerſtraße 78 (am Koppenplatz), zu haben iſt. Verweiſen Sie den Fabrikanten nur auf die Abbildung auf S. 87 im Vogelzuchtbuch von Dr. Ruß. 4. In unheizbarer Kammer züchten ließe ſich wol noch eine ganze Anzahl fremdländiſcher Vögel, indeſſen haben Sie nicht geſagt, ob Sie dieſelben mit den Wellenſittichen und Sonnenvögeln zuſammen halten wollen. In dieſem Fall wäre die Auswahl recht ſchwierig. Verſuchen Sie es mit einem Pärchen rother Kardinäle, ferner mit einem Par Singſittichen und einem Par Blumenauſittichen, oder Sie laſſen die Sing- und Blumenauſittiche weg und wählen dafür Mönchsſittiche.

Herrn Franz Kudela: Am beſten fängt man Goldhähnchen (wenn man ſie überhaupt in der Häuslichkeit halten will) nur im Herbſt und gewöhnt ſie gleich an getrocknete, angequellte Ameiſenpuppen. Dazu gibt man weiche Spinnen, Blattläuſe von Blumenſtöcken, kleine Mehlwürmer u. a., auch geriebenes, hartgekochtes Ei und kleingehacktes Rinderherz.

Herrn F. Schalandek: Bieten Sie den Wellenſittichen jetzt weiße Hirſe, Kanarienſamen und Hafer, alle drei Sämereien eingequellt. Dazu ein Ameiſenpuppengemiſch und erweichtes Eierbrot, ſowie auch allerlei Gräſer- und Haferriſpen mit „milchigen“ Samen. Wenn die Vögel das Miſchfutter durchaus nicht nehmen wollen, ſo laſſen Sie ihnen nur ruhig den Willen. Dann genügen die eingequellten Sämereien.

Frau Poſtdirektor Himpe: 1. Sie können nach ſo langer Zeit ohne Bedenken in dem Niſtkaſten nachſehen, ob faule Eier darin ſind oder nicht. 2. Gute Erdberen können den Sittichen jedenfalls nicht ſchädlich werden, und ich würde Ihnen nach meiner Ueberzeugung nicht abrathen, dieſelben mit Vorſicht zu reichen. 3. Der Geſang der Steindroſſel oder des Steinröthels wird von Kennern allgemein gerühmt. Er iſt reich und abwechſelnd laut, voll, dabei ſanft und flötend, zuweilen mit den Strofen anderer Sänger verwebt. Freilich iſt die Begabung des einzelnen Vogels je nach der Gegend, aus welcher er ſtammt, ſehr verſchieden. Den meiſten wird indeſſen eine leichte Auffaſſungsgabe und die Fähigkeit, Strofen aus dem Geſang anderer Vögel nachzuahmen und mit dem eigenen Geſang zu verflechten, nachgerühmt. Ich würde Ihnen dann rathen, den Vogel im Mai zu beziehen.

Herrn Friedrich Starzengruber: Bei der Baſtardzucht zwiſchen einheimiſchen Finken und Kanarienweibchen haben Sie ganz ebenſo zu verfahren, wie bei der Kanarienhecke überhaupt, indeſſen können Sie die Vögel auch jetzt noch zuſammenſetzen. Bieten Sie ihnen Niſtgelegenheiten wie für Kanarienvögel.

◆

Zu unſerm Bilde.

Die Sumpfmeiſe (Parus palustris, *L.*) iſt dem Ausſehen nach wol allen Vogelfreunden bekannt: oberſeits erſcheint ſie röthlich braungrau, unterſeits grauweiß; Kopf bis Nacken ſind rein ſchwarz, Oberkehle etwas heller ſchwarzgrau, Hals, Bruſt und Bauchſeiten röthlichweiß, Schnabel ſchwarz, Augen dunkelbraun, Füße bleigrau. Das Weibchen iſt vom Männchen kaum zu unterſcheiden; die Oberkehle zeigt einen kleinen ſchwarzen Fleck; das Schwarz am Nacken iſt kleiner und nicht ſo tief. Zur Brut ſchreitet das Pärchen zweimal im Jahr, einmal im April, das zweite Mal im Juni. Das Neſt ſteht meiſt in niedrigen Aſtlöchern mit engem Schlupfloch, oft im hohlen Weidenkopf, in mürbem Holz wie gedrechſelt ausgemeißelt; ausnahmsweiſe findet man es in einem Erdloch. Es iſt in der Regel kein ſehr künſtlicher Bau und wird aus Mos, Flechten und Faſern geformt, mit Haren und Federn gerundet. Das Gelege beſteht aus ſechs bis zehn weißen oder blaß grünlichblauen Eiern, die roſtroth oder grau gepunktet ſind. Sie werden in dreizehn Tagen von beiden Alten gemeinſam erbrütet. Die Jungen gleichen dem alten Weibchen, ſind nur fahler in Schwarz und Braungrau. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Die Samen-Großhandlung
von
Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [775]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Sonnenblumenkerne,

per 5 Kilo 2,50 ℳ, per 50 Kilo 20,— ℳ

☞ **Ameiſeneier Ia,** ☜

per 5 Kilo 14,— ℳ, per Kilo 3,— ℳ

[776] **Sommerrübſen Ia, ſüß,**

per 5 Kilo 2,20 ℳ, per 50 Kilo 18,— ℳ

empfiehlt **Carl Kämpf, Mainz.**

Mehlwurmzüchterei

empfiehlt prima Würmer ℔ 4,— ℳ [777]

F. Wulfram, Mölln i. Lbg

Universalfutter

für alle **feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel** pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [778]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)

Vogel- und Hundefutterhandlung.

Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Vögel.

Sprosser!

[779]

feine tourenreiche Vögel,

offerirt in Kürze eintreffend à Stück 9 ℳ, 2 Stck. 17 ℳ, 3 Stck. 24 ℳ.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Alpenſtiglitze

u. **Rothhänflinge,** große prachtv. Mnch., per Dtzd. 15 ℳ incl. Porto u. Verp., laut ſingende **Rothkehlchen** Stck. 3 ℳ, ſchlagd. **Nachtigalen** Stck. 4–6 ℳ, **rothrück. Würger,** ausgezeichneter **Spötter,** ahmt Nachtigal, Droſſel, Lerche und Grasmücke täuſchend nach, 15 ℳ, **Schwarz- u. Graudroſſel** im Geſang Stck. 6 ℳ, **Buch- u. Grünfinken, Stiglitze, Hänflinge, Zeiſige, Ammern** u. **Meiſen** à Par 2 ℳ liefert unter Garantie [780]

W. Hiltmann, Berlin, Dresdenerſtraße 23.

Abzugeben:

Roſenpapageien, eig. Zucht, à Zuchtpar 25 ℳ.

Suche: Männch.: Blauköpf. Papagei-Amandine, Maskengrasfink. Weibch.: Sonnenaſtrild, Pünktchen-Amaranth, Larvenaſtrild, Schwarzkehl. Laufhühnchen, Madagaskarw. **Blankenburg,**

[781] Sundhauſen b. Langenſalza.

Verkaufe: 3 Dompfaffen, 1 Grünfink, 1 Stiglitz, großartig. Sänger, u. **1 Zeiſig,** alles tadelloſe u. geſunde Vögel, zum feſten Preiſe von 6 ℳ. [782]

Arthur Gobiet, Düſſeldorf, Feldſtr. 31.

Gelegenheitsverkauf
wegen Aufgabe meiner Vogelſtube.

Verpackung frei.

Zuchtpärchen: 1 P. weiße Reisvögel 6 ℳ, 1 P. chineſiſche Zwergwachteln 6 ℳ, 1 P. Malabarfaſänchen 2 ℳ, 1 P. Paradiswittwen 2,50 ℳ, 1 P. Orangeweber (grau) 2 ℳ, 1 P. Mövchen (M. weiß, Wbch. brbt) 3,50 ℳ, 2 P. Schmetterlingsfinken à 2,50 ℳ, 2 P. Tigerfinken à 2,50 ℳ.

Einzelne Vögel: Grauer Kardinal mit rother Haube 4,50 ℳ. Wbch. Roſenkopfſittich 5 ℳ, kl. Amaranthen 3,0 à 1 ℳ, Auroraaſtrilde 1,0 4 ℳ, Schmetterlingsf. 1,0 1 ℳ, Ceresaſtrild 1,0 2 ℳ, Grisbleu 1,0 1 ℳ, Goldbrüſtchen 0,1 1 ℳ, Madagaskarweber in Pracht 3 ℳ, Dottergelber Weber 2 ℳ, 2 junge Reisvögel zuſ. 1,50 ℳ, reinweiſſe Mövchen 2,0 à 2,50 ℳ, glbbte. Mövchen 2,1 à 1,50 ℳ.

Unter der Hälfte des Einkaufspreiſes.

Verpackung frei.

Heckkäfig, 80 × 70 × 55, ganz Metall, zuſammenlegbar, von Hähnel, Berlin, mit Futter-, Trinkgefäßen und Badehäuschen, 15 ℳ.

Fangkäfig, Metall, 50 × 40 × 30. Mit Zinkunterſatz 80 × 60 und Badegefäß. Von Schindler, Berlin, 8 ℳ.

Droſſelkäfig, Metall, 60 × 30 × 32 mit hohem Metallunterſatz und Wachstuchdecke, 6 ℳ.

Zinkdrahtgewebe, ca. 10 □m. Maſchenweite 12 mm. Genügend für 1 Thür und 2 Fenſter von innen und theilweiſe von außen, 10 ℳ.

Nitardy, Konrektor,

[783] **Rügenwalde.**

Jede Sorte edler

Weichfutter-Vögel

in geſanglich erprobten ſeltenen Exemplaren empfiehlt direkt von Ort und Stelle reellſt und fachkundigſt unter üblicher Gewähr

Mathias Rausch,

Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten Singvögel,

Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

[784]

Preisliſte gratis bei Angabe über welche Vogelart.

Orpheusgrasmücken

alte Frühjahrsfänge, mit gelben Augenringen, mit vorzüglichem Geſang, à 10 ℳ per Stück, liefert nur [785]

„Ornis“ in Prag.

☞ Sproſſer ☜

aus verſchiedenen Gebieten Stck. 7–12 ℳ,

Nachtigalen

aus verſchiedenen Gebieten Stck. 4–6 ℳ, 6 Stck. 20 ℳ.

Schwarzblättchen,

Tiroler, Stck. 3,50 ℳ, 6 Stck. 18 ℳ,

Sperbergrasmücken,

Stck. 3,50 ℳ, 6 Stck. 15 ℳ,

Gartengrasmücken

Stck. 3,50 ℳ, 6 Stck. 18 ℳ,

☞ Wachteln ☜

Stck. 1,50 ℳ, 6 Stck. 7 ℳ,

☞ Steinröthel ☜

Stck. 10 ℳ,

Gelbſpötter und Sumpfrohrſänger

Stck. 5 ℳ, unter Garantie für lebende Ankunft und nur Männchen. Preisliſte gratis.

[786] **Gebr. Haas,** Vogelexportgeſchäft, **Hofſtetten** b. Gemünden a. M. (Bayern).

Die besten

orientaliſchen Wildfänge, ſofort ſingend: [787]

Sproſſer	à	7—12	ℳ
Nachtigalen	„	3—5	„
Schwarzblattel	„	3,50	„
Steinröthel	„	10,—	„
Blaudroſſeln	„	15,—	„
Gartengrasmücken	„	3,—	„
Sperbergrasmücken	„	3,—	„
Gelbe Spötter	„	4,—	„
Sumpfrohrſänger	„	4,—	„
Rothrück. Würger	„	2,—	„
Schwarzſtirn. Würger		3,—	„
Pirole	à	5,—	„

einſchl. Verpackung, liefert direkt vom Fangort, die reellſte weltbekannte Firma

„Ornis“ in Prag.

Kanarienvögel, echte Harzer Roller ohne Fehler, à St. 10, 12, 15, 20 u. 25 ℳ, mit Porto u. Verpackung u. 14 Tage Probezeit, **aber nur per Nachnahme,** nicht gefallende Vögel tauſche um oder auf Wunſch zahle zurück. Rollerweibchen 1,50 ℳ. Preisliſte frei. [788]

L. G. Müller, Vogelzüchterei, **Nordhauſen** a. Harz.

Waldvögel.

Ich verſende vom 24. April an: **Ungariſche Nachtigalen, Steiriſche Schwarzplatteln,** à Stück 4 ℳ, **Ruſſiſche Sproſſer,** à Stück 10 ℳ, unter Garantie für ſichere Männchen u. lebende Ankunft, gegen Nachnahme. [789]

Georg Hahn, Vogelhändler, **Wien IV.,** Naſchmarkt.

Verkaufe

1 lautpfeifende Schwarzamſel zu 6 ℳ, **1 zahmen Star** zu 3 ℳ. [790]

Alfred Hartung, Herne, Mittelſtr. 11.



No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.–
No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50
Gegen Einsendung von ℳ **1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen ℳ **2.–**

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige für Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc. mit sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [791]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Zur Lieferung ihrer Lieblinge empfiehlt ſich den P. T. Herren

Vogelliebhabern

die beſtbewährteſte, ſtreng reelle Vogelhandlung von [792]

Gottlieb Wanek, Prag 411, I.

Sehr ſeltene ruſſiſche

Weiden-Sproſſer

aus den Uferpflanzungen verſchiedener großer Stromgebiete des fernen europäiſchen Nordoſtens und Nordweſtens zu 20 bis 35 ℳ;

feine

Au- u. Wald-Sprosser

verſchiedener Gebiete u. Länder zu 12 bis 18 ℳ, ſowie **gewöhnliche Sproſſer** zu 7 bis 10 ℳ, direkt von Ort und Stelle durch den ſeit vielen Jahren allſeitig als ſtreng reell bekannten und ſtets fachmänniſch bewährten Spezialiſten

Mathias Rausch,
[793] **Wien VII.3,**
Schottenfeldgaſſe Nr. 95.

Feinste Kanariensänger

mit prachtvoll. Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Pfeifen und Hohlflöten in langen, tief., ſanft. Touren à 7, 8, 9, 10, 12, 15 ℳ (Garantie: vorzügl. Sänger, geſunde Ankunft, verſendet [794]

R. Buhl, Hirſchfelde, Sachſen.
Präm. goldene Medaillen. Tauſende Dankſchreiben. Illuſtr. Katalog gratis u. franko.

Geſucht:

Kleine Kubafinken, Männchen. Offert. u. „Kuba“ an die Exped. d. Bl. [795]

1898 erhielt mein Stamm **Harzer Kanarienvögel** 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10–25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.
Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [796]

Iª Sprosser für Kenner,

Baß-Polacken und Woyakvögel, tief und langſam gehend, exiſtiren noch wie vor 50 Jahren, und bringt dieſe in den Handel nur allein [797]

„Ornis“ in Prag.

Harzer Edelroller,

tieftourenreich u. weltbekannt, liefere überall hin. Der Preis richtet ſich nach Geſangsleiſtung, à St. 7, 8, 10, 12, 15 bis 30 ℳ. Verſandt unter Nachnahme. Garantie für geſundes Ankommen. [798]

Joh. Wink, Dresden-A., Marſchallſtr. 37.
Züchterei hochedler Kanarien, gegr. 1885.
Goldene u. ſilberne Medaillen. Viele Dankſchreiben.

Feinſte

Edelroller!

mit den ſchönſten Touren, zart, tief und lang, noch ein Poſten ff. Frühbrut-Heckvögel, Dtz. 90 ℳ, Probevogel 10 ℳ, 14 Tage Probe gegen Nachnahme. [799]

A. H. Pütsch, Spezial-Züchterei, **Schönhauſen** a. Elbe.

Sproſſer und Steinröthel

à Stck. 9 ℳ, **Nachtigalen** à Stck. 5 ℳ, **Schwarzköpfe, Gartengrasmücken** u. **gelbe Spötter** à Stck. 3 ℳ, bei größerer Abnahme billigere Preiſe, für ſichere Männchen u. lebende u. geſunde Ankunft leiſte Garantie. [800]

M. Völkl,
Vogelhandlung, **Linz** a. d. Donau.

Ausgezeichnete **Harzer Kanarienſänger** hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [801]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

1,1 eingewöhnte Zaunkönige,

Männch. fleiß. Säng., m. Verp. 7 ℳ geg. Nachn.
[802] **Jos. Ehrlich, Würzburg,** Weißenburgerſtr.

Gelegenheitsverkauf:

1 Donau-Sproſſer 20 ℳ, **1 Bukowina Sproſſer** 16 ℳ, **1 rothrück. Würger, groszart. Spötter** 12 ℳ, ahmt 15 verſchiedene Vogelgeſänge nach, **1 Gelbſpötter** 10 ℳ, **1 Gartengrasmücke** 5 ℳ, **1 Gebirgs-Rothkehlchen** 3 ℳ, **1 roſenbrüſt. Kernbeißer** 15 ℳ, **1 Papſtfink** 7 ℳ, **1 Grauedelſänger** 4 ℳ. Sämmtl. Vögel Hochſ. I. Säng., kerngeſund, 2 bis 3 jähr. Wildfänge. Offert. unter M. an die Expedition dieſes Blattes. [803]

Scharlachbruſtloris à Par 50 ℳ
Gebirgsloris à P. 30, 2 P. 55 ℳ
Schuppenloris à P. 35 ℳ
Blutbauchſittiche à P. 80 ℳ
Vielfarb. Prachtſittiche à P. 60, 2 P. 110
Singſittiche à P. 24, 2 P. 45 ℳ
Nymfenſittiche à P. 12 ℳ
Inkakakadus à St. 40 ℳ
Grasſittiche à St. 5 ℳ
Gr. Alexanderſittiche, jg., à St. 10 ℳ
Diamanttäubchen à P. 18 ℳ
Import. Zebrafinken à P. 4,50, 3 P. 12 ℳ.
Diamantfinken à P. 9 ℳ
Weiße Reisfinken à P. 7,50 ℳ
Tiger-, Band-, Muskat-, Atlas- u. Schmetterlingsfinken, Feuer- u. Blutſchnabelweber, Orangebäcks, Aſtrilde, Silberbäcks, Goldbrüſtchen à P. 2, 5 P. 9 ℳ
Amaranthen, Grisbleus, Goldbrüſtchen, Mövchen, Oliven-Aſtrilde ältere 8 ℳ
10 P. gemiſcht n. m. Wahl 20 ℳ
Edelſänger à P. 6, à Mch. 4 ℳ
Mozambikzeiſige à P. 4,50, à Mch. 3 ℳ
Rothe Kardinäle à Mch. 8, à P. 13,50 ℳ
Safranfinken à Mch. 3 ℳ
Weißohr. Heherdroſſeln à St. 15 ℳ
Ausgefärbte Roſenſtare à St. 10 ℳ
ſowie alle anderen Vogelarten preiswerth. [804]

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Wachteln,

Mnch. u. Wbch. à 2 ℳ, **Stiglitze, Rothhänflinge** u. **Eichelheher** à 1,50 ℳ, **Buchfinken** à 1 ℳ, **Feldlerchen** à 1,50 ℳ, **Grünlinge, Goldammern, Bergfinken** à 50 ₰, Weibchen von Stiglitz à 75 ₰, von Buchfink, Grünling u. Goldammer à 25 ₰. [805]

August Dietz,
Vogelhandlung, **Burg** b. Magdeburg.
Nächſte Zeit alle Arten Inſektenvögel.

Rothk. Papagei-Amandine

(Männchen) ſofort zu kaufen geſucht
C. Nebel, Leipzig, Hoſpitalſtr. 13.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. – Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 18.

Die gefiederte Welt

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler

von

Dr Karl Ruß.

Preis: vierteljährlich
(13 Nummern mit Abbildungen)
M. 1.50.

Magdeburg
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretſchmann).

Einzelpreis der Nummer
20 Pfg.

Inhalt der Nr. 18.

Ergebniß der Verpflegung meines Gelbſpötters.
Selten gehaltene einheimiſche Vögel (Fortſetzung)
Meiſenliebhaberei in Innsbruck und Umgegend.
Zur Frage der Uebertragung von Papageienkrankheiten auf Menſchen.
Plauderei über meine Nordlandreiſe.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Berichtigung.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Ohne Sportspreiſe

empfehle garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende, echte **Bukowiner- und Donau-David-**

Sprosser

aus den **Weidenpflanzungen der Donaugebiete die beſten, lauteſten tiefſchalligſt. Vogler, welche exiſtiren,** wirkliche ſeltene **Tag- u. Nachtſchläger,** Stck. 9,50 ℳ, 2 St. 18 ℳ, 3 St. 25 ℳ, **Steinröthel** aus Dalmatien und dem Karpathengebirge mit **entzückend wundervoll reizendem** Geſange, per Hahn 12 ℳ, beide Sorten bezw **bedeutend** billiger. Ich liefere, wie allſeitig bekannt, unter **weitgehendſter Garantie für lebende und geſunde Ankunft, abſolut tadelloſe, ſtarke, gewiſſenhaft abgehörte Hähne,** elegante u. praktiſche **Weichfreſſerkaſtenkäfige,** mit Zinkſchubkaſten und weicher Decke, 53×30×38, St. 5 ℳ Büchlein über **Behandlung, Fütterung und Pflege gratis. Friſche Ameiſeneier** zum Tagespreis können jeder Sendung beigefügt werden. [806]

Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

Brut-Apparate mit Wärmeregulatoren.



Größte Vollkommenheit. Sicherer Erfolg. Bisher noch nicht erreichtes Brutreſultat: 90%. — **Brut-Eier. Küchlein.**

General-Katalog franko.

J. Philippe, Chevalier du Mérite Agricole u. Fabrikant in **Houdan** (Seine & Oise) bei Paris, Frankreich. [807]

Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Netzfallen,** kleine 80 ₰, größ. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ, **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [808]

Gebr. Jansen, M.-Gladbach. Illuſtrirte Preisliſte gratis.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [809]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in **praktiſcher** Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [810]

☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜

August Hermann Luther, Oschatz i. S.

C. L. Flemming

Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen

empfiehlt: [811]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Neu! **Senſationell!**

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [812] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis. [813] **R. Schröter,** Clingen-Greußen.

☞ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis) — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [814]

Käfige

für Sproſſer,

Nachtigalen und alle übrigen Weichfreſſer, wie ſie das gute Gedeihen dieſer edlen Vögel **unbedingt** erheiſchen, werden, ſoweit der Vorrath reicht, als **Muſter-Käfige** zu den üblichen Preiſen auch jetzt abgegeben, und deren **genaue Nachahmung** im Intereſſe der Vogelliebhaberei allen wirklich Sachverſtändigen empfohlen.

Mathias Rausch,
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der
[815] beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Futtermittel.

Mehlwürmer,

ſtaubfrei, à Lit. ℳ 4,50, Ko. ℳ 8, **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Lit. 90 ₰, bei 10 Lit. 85 ₰; I bei 5 Lit. 70 ₰, bei 10 Lit. 65 ₰ empfiehlt u. verſ. geg. Nachn. [816]

O. O. Streckenbach, Breslau.

Universalfutter

für alle **feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel** pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpaketen franko, garantirt [817] ſandfrei.

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Sonnenblumenkerne,

per 5 Kilo 2,50 ℳ, per 50 Kilo 20,— ℳ
☞ **Ameiſeneier Ia,** ☜
per 5 Kilo 14,— ℳ, per Kilo 3,— ℳ
[818] **Sommerrübſen Ia, ſüß,**
per 5 Kilo 2,20 ℳ, per 50 Kilo 18,— ℳ
empfiehlt **Carl Kämpf, Mainz.**

Vögel.

Zu verkaufen:

Nachtigal 12 ℳ, **Sproſſer** (eine Klaue defekt) 8 ℳ; beide tadellos befiedert, geſund, 2 Jahre im Beſitz, gegenwärtig in vollem Schlag. Tauſch geg. Groten nicht ausgeſchloſſ. [819] **C. Häcker,** München, Hans Sachsſtr. 13.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Allianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 18. **Magdeburg, den 4. Mai 1899.** **XXVIII. Jahrg.**

Ergebniß der Verpflegung meines Gelbſpötters.*)

Von Fr. Mangelsdorff.

Um einem vorjährigen Verſprechen nachzukommen, theile ich hier das Verpflegungsverfahren, das ich mit meinem Gelbſpötter machte, mit. Ich erhielt denſelben im vorigen Frühjahr als Wildfang und fütterte ihn mit Ameiſenpuppen, Mehlwürmern, Fliegen, kleinen Raupen u. a. Beſonders gern fraß er kleine Maden, die ich auf folgende Weiſe (durch Zufall darauf gekommen) züchtete. Etwas übrig gebliebenes Miſchfutter (Morrübe und Weißbrod) legte ich in kleinen Haufen auf ein Brettchen, ſtellte es an die Sonne, und da es bald ſauer geworden, ſtellten ſich Schmeißfliegen ein. In kurzer Zeit wimmelte das Futter von kleinen Maden**). Nun nahm ich das Brettchen, ſtellte es dem Vogel in den Käfig, wo ſich der Spötter mit größtem Wohlbehagen an das Ausleſen der Maden machte. Als der herannahende Herbſt dieſer Fütterungsart ein Ende machte, gab ich ihm Miſchfutter (Morrübe und Weißbrod), welches er aber nicht nahm. Nach langen Verſuchen gewöhnte ich ihn an folgendes Futter. Abends vorher Schiffers Nachtigalenfutter, Ameiſenpuppen, Weißwurm und pulveriſirtes Rindsherz zu gleichen Theilen gemiſcht und mit heißer Milch angefeuchtet. Ferner früh und mittags fünf und wegen der langen Winternächte abends zehn Mehlwürmer. Dieſes genannte Futter frißt er ſehr gern. Auch hin und wieder eine Kellerſpinne, die ſich ja im warmen Keller auch im Winter lebend hält, war ihm ſehr angenehm. In den Sommermonaten badete der Vogel täglich, unterließ es aber in den Wintermonaten ganz oder badete nur ſelten. Vom Januar fing ich die Mauſerkur mit ihm an und nahm ihn täglich um die Mittagszeit, wenn das Zimmer ſchön durchheizt war, aus dem Käfig und begoß ihn mit 30 bis 32° warmem Waſſer, bis er völlig durchnäßt war. Nun ſteckte ich den Vogel in den Käfig und hing ihn über den geheizten Ofen, was ihm wahrſcheinlich ſehr wohl that, da er dieſes durch munteres Herumſpringen und Hörenlaſſen des Lockrufes verkündete. Die fünf Mehlwürmer, welche der Spötter früh bekam, ſchnitt ich in der Mitte durch und tauchte den herausfließenden Saft in pulveriſirte Sepiaſchale. Anfangs Februar fing er, ohne jeden Eingriff meinerſeits, die Mauſer an, welche er in kurzer Zeit glücklich beendete. Anfangs leiſe, fing der Vogel am 15. März laut zu ſingen an, was mir nun reichlich die Mühe lohnt.

Folgendes will ich noch bemerken: Als der Spötter in einem kleinen Käfig war, machte er einen traurigen Eindruck. Deshalb gab ich ihm einen Käfig von 53 cm Länge, 33 cm Höhe und 27 cm Tiefe mit Dreiſprung und der Vogel gab durch ſeine Munterkeit ſeinem Wohlbehagen Ausdruck. Es wäre mir eine große Genugthuung, wenn der Inhalt dieſer Zeilen anderen Vogelliebhabern zu Nutzen käme.

---

*) Dieſer Artikel iſt unmittelbar nach dem des Herrn Kullmann eingetroffen und wir reihen ihn daher hier an.

**) Wir können zu der Fütterung von Fliegenmaden nicht rathen, da dabei immer die Gefahr herrſcht, daß die Fliegen vorher von fauligen, bzl. für die Vögel giftigen Stoffen gefreſſen haben. Bieten Sie lieber Blattläuſe von Zimmer- und Aquarienpflanzen, weiche Spinnen, kleine ganz junge Mehlwürmer, vor allem aber die weichen Speckkäfer- und Pelzkäferlarven, welche doch ein vorzügliches Futter ſind u. dgl. D. L.

Selten gehaltene einheimiſche Vögel.

Von A. Reuter.

(Fortſetzung).

Ich möchte die Bienenväter auf viel ſchlimmere Feinde und Räuber ihrer Honigvögelchen aufmerkſam machen. Es ſind dies die Horniſſen, welche nicht allein die in den Bau heimkehrenden Bienen vom Flugloch wegfangen, ſondern auch die auf der Weide befindlichen zu Hunderten mit ihren ſtarken Freßzangen ergreifen und mit ihnen auf den nächſten Baumaſt fliegen, ihre Beute gleich einem Raubvogel mit den Füßen halten, den Bienenkörper mit ihrer Zange zertheilen und die Honigblaſe verzehren. Ich ſah dieſem Treiben dieſer wirklichen Bienenräuber ſchon vielmals zu und fand unter dem betreffenden Baum ein ganzes Häufchen zerſchnittener Bienenkörper. Die Horniſſe weiß ſehr genau, wo ſie zu ihrer Beute kommt. Sie fängt die Bienen auch an der Tränke weg. Außer durch dieſe Feinde gehen viele Bienen auch infolge eines plötzlichen Witterungsumſchlags zu Grunde. Oft ſind ſie mit Beute und ihre Höschen mit Blumenſtaub ſchwer beladen; nun darf nur ein rauher Wind oder ein plötzlicher Regenſchauer kommen, ſo vermag ſich eine ſolche Biene nicht mehr zu erheben, bleibt im Graſe liegen, erſtarrt und geht zu Grunde. Man darf alſo die Verminderung der Bienen nicht nur den Vögeln anrechnen und infolgedeſſen den Vernichtungskrieg gegen ſie beginnen, abgeſehen noch davon, daß ein ſolches widerrechtliches Verfahren ſtrafbar iſt, wenn es zur Anzeige kommt. Ich appellire deshalb an die verehrten Herren Bienenväter, etwas erbarmungsvoller und nicht ſo herzlos mit den armen Vögeln zu verfahren und ſie wegen eines Bienleins nicht ſogleich zum Tode zu verurtheilen, ſondern ſie durch andere Mittel vom Bienenſtock fern zu halten. Wenn es dann aber gerade geſchoſſen ſein muß, ſo thut ein Schreckſchuß dieſelben Dienſte. Alſo gründliche Beſſerung in dieſer Sache, Ihr Herren Bienenzüchter, und befaßt Euch nebenbei auch etwas mit der Vogelkunde, ſo bleiben Euch ſolche Vernichtungsgedanken fern, und Ihr werdet Euch mit der Zeit überzeugen, daß dieſe Mahnung eine gerechte war. Ich möchte an das oben Geſagte noch einen Beweis für die Unſchädlichkeit des Fliegenſchnäppers anreihen und glaube, daß ich gewiß unter der großen Zahl der Vogelkenner Gläubige und Gleichgeſinnte finden werde. Betrachten wir den Fliegenſchnäpper, wie er ſeine Beute aufnimmt und verzehrt! Er fängt dieſelbe im Flug und verſchluckt ſie unmittelbar darauf. Sollte ihn denn da nicht der Bienenſtachel verletzen? Wir wiſſen, was der Stich einer Biene für eine Wirkung bei uns Menſchen hat; bei weniger empfindlichen Perſonen verurſacht er eine mehr oder weniger große Geſchwulſt, welche ohne weiteren Nachtheil für die Geſundheit verläuft, nervöſe und ſchwächliche dagegen werden krank, wenigſtens ohnmächtig, unter Umſtänden bekommen ſie Fieber. Wenn der Stich der Biene nun bei Menſchen ſchon eine ſolche Wirkung hervorbringen kann, um wieviel mehr müßte dies aber bei einem ſo kleinen Vogel der Fall ſein! Oder ſollte da etwa die Biene nicht mehr im Stande ſein, zu ſtechen? Oder iſt der Fliegenſchnäpper vielleicht gegen Bienenſtiche gefeit, wie der Igel gegen den Schlangenbiß? Nein! Dies iſt alles nicht; derjenige Vogel, der von einer Biene beim Verſchlucken in den Hals geſtochen wird, iſt des Todes, das weiß ich aus Erfahrung. Ich hatte ſeinerzeit mehrere junge Grasmücken am Fenſter ſtehen; durch Zufall kam eine Biene durch's Fenſter herein und wurde von einer meiner Grasmücken erhaſcht, einigemal auf dem Sprungholz aufgeſtaucht und hinuntergeſchluckt; ich ahnte nichts Gutes, konnte jedoch nicht ſchnell genug die Käfigthür öffnen, um dem Vogel die Biene wegzunehmen, ſie war verſchluckt. Einige Minuten darauf ſetzte ſich der bedauernswerthe Vogel ſchon auf den Boden des Käfigs, das Gefieder aufblähend und den Schnabel aufſperrend, ab und zu auch Schmerzenslaute von ſich gebend. War das etwa nicht die Wirkung des Bienenſtichs? Ich gab ihm nun Schmalz und kühlende Subſtanzen ein, ohne jedoch im Benehmen des Vogels eine Beſſerung zu bemerken. Am andern Morgen war er tot. Sollte dies etwa bei einem andern Vogel nicht auch der Fall ſein? Ja, eine Kohlmeiſe weiß ſich da beſſer zu helfen; ſie reißt, wie ich ſchon ſelbſt geſehen habe, den Hinterleib der Biene ab, läßt ihn fallen, und verzehrt den Vorderleib Stück für Stück. Die oben genannten Vögel ſchlucken aber alles, was ſie fangen, ganz, folglich werden ſie auch von Bienen geſtochen, und der Bienenſtachel kann noch verletzen, wenn ſelbſt der Hinterleib der Biene vom Vorderleib getrennt iſt. Ich werde nun, ſobald ich wieder in den Beſitz eines Fliegenſchnäppers komme, den Verſuch wagen und demſelben Bienen reichen, und über das Ergebniß ſ. Z. in der „Gefiederten Welt“ Bericht erſtatten.

VIII. Die Dorngrasmücke.

In Bayern wird ſie einfach Grasmücke genannt, mit Ausnahme des Allgäu, wo ſie Zeltſpatz heißt. Dieſer, einer der vorzüglichſten Sänger unter den Grasmücken, verdient mit Recht unter allen Singvögeln einen hohen Rang einzunehmen, insbeſondre auch deshalb, weil er ſein eigenes Lied behauptet und keinerlei fremde Töne aufnimmt. Auch iſt er einer der dankbarſten Sänger, denn er ſingt, einmal eingewöhnt, faſt das ganze Jahr hindurch, wenn auch nicht andauernd laut, ſo doch leiſe, ſogar während der Mauſer, wenn dieſe ohne Schwierigkeit beginnt, und dies iſt in der Regel der Fall. Man ſieht wol der erſten Mauſer in Gefangenſchaft immer mit Bangen entgegen, gleichviel ob bei alten Wildfängen oder bei jung Aufgezogenen, und dieſes mit Recht, denn ſie dauern oft nicht lange aus. Meiſt gehen ſie an Verfettung ein. Man füttere ſie deshalb von Weihnachten an zwar kräftig, aber mager. In der Regel überſtehen jedoch die meiſten ohne Nachtheil die ſo gefürchtete Mauſer, nach meiner Erfahrung gingen nur die zu maſtig gefütterten ein. Damit meine ich ſolche, welche meiſtens mit in Milch geweichter Semmel und mit zu ſaftreichen Gelbrüben gefüttert werden. Die Grasmücke hat einen großen Appetit, weshalb man ihr vom

[illegible]

welchen man nur nach oben hin von den Reiſern frei läßt. Man bringe an Stelle dieſer die Leimruthen an; hört man nun eine Grasmücke ſingen oder locken, ſo ſtellt man den Lockvogel in's Gebüſch, ſtellt das Fangbauer fängiſch, oder richtet die Leimruthen. Der Lockvogel beginnt zu ſingen und in kurzer Zeit wird der Wildfang gefangen ſein. Iſt dieſer mit Leimruthen gefangen, ſo beſtreue man die verklebten Federn mit Holzaſche, oder ſchneide ſie, wenn es angeht, mit der Schrere ab, der übrige Leim muß zu Hauſe mit warmem Seifwaſſer abgewaſchen werden. Dieſe Wildfänge ſollen, ſo lange es angeht, mit nur friſchen Ameiſenpuppen gefüttert werden, und man beginne mit dem Erſatzfutter erſt im Monat September. Am beſten ſind ſie zuerſt an gelbe Rüben mit Semmel und Ameiſenpuppen zu bringen, nachher gehen ſie an alle ſchon angeführten Miſchungen und zeigen ſich als ſehr dankbare und ausdauernde Vögel. Der zweite Fang iſt im Juni oder Juli auf den Jungen vorzunehmen, entweder mit dem Fangbauer, in welches man die Jungen ſammt dem Neſt ſetzt, oder mit dem Schlaggärnchen. Zu dieſem Fang macht man eine Grube in der Größe des Neſtes, ſetzt dieſes ſammt den Jungen hinein, doch dürfen dieſe nicht zu klein ſein, ſonſt locken ſie den alten Vogel nicht und dieſer kommt nicht herbei; ſind die Jungen jedoch ſchon zu groß, ſo bleiben ſie nicht mehr im Neſt ſitzen, und man kann ſie dann auf dieſe Weiſe nicht gut zum Fangen der Alten verwenden. Im Fangbauer jedoch hat es keine Noth, da ſind ſie nicht zu groß. Man ſei auch vorſichtig bei der Annäherung an das Neſt, denn wenn nur ein einziges Junges heraushüpft, ſo verſchlüpft ſich dieſes im Gebüſch, iſt nicht mehr zu erlangen, und die alten Vögel ätzen nur dies eine. Man würde umſonſt warten, daß ſie zu den Jungen im Fangbauer kämen. Hat man nun einen Alten gefangen und iſt nicht ſicher, das Männchen zu haben, ſo muß man auch den zweiten zu erlangen ſuchen; in der Regel fängt ſich das Weibchen zuerſt.

(Fortſetzung folgt.)

Meiſenliebhaberei in Innsbruck und Umgebung.

Von F. Anzinger.

I.

Die hieſigen oft ſehr engzuſammengerückten, alſo nur durch ſchmale Thäler getrennten Mittelgebirge ſind faſt ausſchließlich mit Nadelholz beſtanden und bieten dem munteren Meiſenvolk die entſprechendſten Aufenthaltsorte. Daſſelbe iſt daher auch in erfreulich großer Menge und in allen mitteleuropäiſchen Arten vorhanden; nämlich: Parus major, Volksname: Spieg'lmoaſ'n; P. ater, Volksname: Tannameasl; P. fruticeti und P. palustris var. alpestris, Volksname für beide: Kohlmeasl, auch Dreckpatzl; P. cristatus, Volksname: Schopf- oder Tſchaupmeasl; P. caeruleus, Volksname: Blobmeasl und Acredula caudata, Volksname: Pfannaſtiel- oder Schneemeasl, auch Todtenköpfl. Die Kohl-, Sumpf-, Blau-, Hauben- und Schwanzmeiſen werden nur von beſonderen Liebhabern und dann meiſt in Geſellſchaft miteinander und gewöhnlich unter Ausſchluß der erſteren gehalten, während die Tannenmeiſe ſo hoch geſchätzt und dementſprechend ſo häufig gepflegt wird, wie das Rothkehlchen und der Kreuzſchnabel.

Dieſe drei Vögel zuſammen bilden zumeiſt auch jenes zünftige Kleeblatt, welches faſt bei jedem hieſigen Vogelliebhaber ältern Schlags zu finden iſt; und nicht nur der beſcheidene und einfache, ſondern auch der gutſituirte und in den Anſprüchen an guten Vogelgeſang oft ſehr verwöhnte Liebhaber hält dieſes hübſche Vögelchen nicht bloß ſeiner Munterkeit und Zutraulichkeit, ſondern hauptſächlich ſeines Geſangs halber. Dieſes herkömmliche Halten der Tannenmeiſe als Stubenvogel durch mehr als ein Jahrhundert hindurch hat denn auch das Verſtändniß für den Geſang dieſes Vogels ganz beſonders erhöht, bzl. das Gehör für die verſchiedenen, einem Laien kaum auffallenden, feinen Unterſchiede in demſelben geſchärft. Es werden daher an einen gut ſein ſollenden Sänger ebenſolche Anſprüche geſtellt, wie an viele andere in der Neuzeit bekannte Sportvögel.

Eine Tannenmeiſe, welche dem Geſchmack eines Kenners ihres Geſangs entſprechen ſoll, muß von den nachſtehend angeführten Geſangsſätzen mindeſtens zwei Drittel bringen:

1. Zi-dää,
2. We-zi-dää,
3. Zi-wui-doo,
4. Bi-zi-vidoo,
5. Wi-zio,
6. We-te-la,
7. Wu-izl,
8. Zo-bo-bi-zioo,
9. Dal-zi-wier,
10. Zi-zl-woi,
11. Hia-zo-ze.

Dieſe Geſangsſätze (im Fachausdruck: Waldſchalle genannt) ſind dem Klangbild entſprechend getauft und dem Gedächtniß des Liebhabers ſehr gut eingeprägt. Mit kritiſchem Ohr lauſcht er, ob, wie oft und mit welcher Tonhöhe dieſelben gebracht werden. Von den zweiſilbigen, daher minderwerthigen Waldſchallen, wie Nr. 1, 5 und 7, wird eine oftmalige Wiederholung, ſowol hintereinander, als auch in der „Schallreihe“ ſelbſt nicht verlangt; dagegen ſollen die dreiſilbigen Waldſchalle, namentlich aber Nr. 2: „Der doppelte Wetzer“ (Nr. 1 iſt der einfache Wetzer), mindeſtens ſechs Mal hintereinander wiederholt werden. Hierbei wird auch darauf geſehen, ob der Sänger ſtets die gleiche Tonhöhe und das gleiche Tempo beibehält, oder ob er in denſelben wechſelt. Trifft das letztere zu, ſo iſt der Geſang umſo werthvoller. Hauptſächlich wird aber verlangt, daß die Stimme des Sängers nicht zu hoch und ſpitz töne, ſondern ſie ſoll einen möglichſt weichen, aber doch kräftigen Klang beſitzen.

Auch in der Beurtheilung des Tannenmeiſengeſangs herrſcht ein verſchiedener Geſchmack, und der eine Liebhaber gibt dieſen, der andere Liebhaber jenen Waldſchallen den Vorzug. Merkwürdigerweiſe ſoll nach dem Urtheil ſolcher Kenner auch der Tannenmeiſengeſang in den letzten Jahrzehnten an ſeiner Vielſeitigkeit bedeutend abgenommen haben. Die Liebhaber müſſen ſich daher meiſtens mit ſolchen Sängern begnügen, welche wenigſtens drei bis vier verſchiedene Waldſchalle bringen, während ſie ſich in früheren Jahren mit der vorangeführten Zahl der Geſangsſätze noch nicht zufrieden gegeben haben ſollen. Auserleſene Sänger ſind daher ſehr geſucht und die Thatſache iſt verbürgt, daß für ſolche einzelne Vögel fünf bis ſechs Gulden bezahlt oder eine flott ſchlagende Nachtigal hierfür abgegeben wurde.

Die Suche nach guten Vögeln geſchieht im Frühjahr, wenn der volle Balzgeſang begonnen hat und der Fang erfolgt mit dem Stecher. Der gefangene Vogel wird ſofort am Fangplatz mit einigen Mehlwürmern geſtopft, zu Hauſe angelangt, wieder, und wird dann im verhüllten Käfig ebenſo eingewöhnt und an das hier übliche Nachtigalenmiſchfutter gebracht, wie jeder andere Edelſänger.

Welche Anſtrengungen oft gemacht werden, um eine gutſingende Tannenmeiſe zu ergattern, mögen folgende zwei Fälle beweiſen:

Ein Innsbrucker hörte gelegentlich eines Ausflugs ins Stubaithal nächſt dem Dorf Telfes eine Tannenmeiſe neun Mal hintereinander doppelt wetzen. Er verſtändigte ſeine Sportskollegen hiervon und ſie machten den nahezu 3½ ſtündigen Weg zweimal hintereinander, ohne des Vogels habhaft zu werden. Das dritte Mal, als ſie Ausſicht auf Erfolg hatten, verriethen ſie ſich den Telfeſer Meiſenliebhabern, dieſelben wurden hierdurch aufmerkſam, nahmen eine drohende Haltung an und die Innsbrucker, in der Minderzahl, mußten unter Verwünſchungen abziehen.

Ein hieſiger Gepäckträger beſteckte einmal, nachdem alle früheren Mittel erfolglos geblieben waren, eine junge ungefähr 2½ Meter hohe Förde über und über mit Leimruthen, hing ſeinen Locker ins Gezweig und hatte nach fünfſtündiger ſaurer Arbeit die Freude, die ins Auge gefaßte Tannenmeiſe ſein Eigen nennen zu können.

Weil beſonders gute Sänger gegenwärtig ſelten mehr zu erhalten ſind, ſo verlegen ſich einige opferwillige Liebhaber auf das Ausnehmen der Neſter, Aufpäppeln der Jungen und Ausbildung derſelben durch Vorpfeifen mit dem Munde. Als ich vor einigen Jahren einen ſolchen Liebhaber, den hieſigen Kohlenhändler M., auf ſeine Einladung hin beſuchte, hatte er nicht weniger als 22 junge Tannenmeiſen in der Singſchule. Wie ich ſpäter erfuhr, hatten von dieſen 22 Hochſchülern nur 5 das Examen beſtanden; die übrigen wurden aus der Anſtalt als unbrauchbar entlaſſen, d. h. in Freiheit geſetzt.

Die Frage, warum gerade die Tannenmeiſe ſich hier einer ſolchen Beliebtheit erfreut, kann damit beantwortet werden, daß dieſelbe neben der Kohlmeiſe (Parus major) die beſte Sängerin unter allen Meiſen iſt und ſich überdies durch Gutmüthigkeit, Anſpruchsloſigkeit und beſondere Ausdauer im Käfig von allen Familienverwandten ganz beſonders auszeichnet.

Zur Frage der Uebertragung von Papageienkrankheiten auf Menſchen.

Von F. Fleiſchmann.

Es iſt die alte Geſchichte, doch ewig bleibt ſie neu — dieſe Heine'ſchen Worte könnten paſſend dieſen Zeilen als Motto vorangeſtellt werden, die von der bekannten Geſchichte handeln, daß ſo und ſo viele Menſchen von Papageien angeſteckt worden und ſchnell geſtorben ſeien, die ſo alt iſt und doch immer wieder neu aufgelegt wird. Von Zeit zu Zeit taucht ſie in den Zeitungen auf, zu deren „eiſernem Beſtand" ſie nunmehr zu gehören ſcheint wie die „Seeſchlange", wie der alljährlich in Konſtantinopel bzl. im Schwarzen Meer auftretende Rieſenhai mit ſeinem gemiſchten Mageninhalt, vom Menſchenarm bis zum roſtigen Schiffsbohrer, oder wie die in einem weltfernen polniſchen Fleck lebendig begrabene Frau. Sonſt in der ſog. „Saurengurkenzeit" auftretend, hat ſie ſich diesmal etwas verſpätet, erſt Mitte November tauchte ſie auf. In der Morgennummer 535 der Münchener Neueſten Nachrichten vom 19. XI. 98 war die folgende Mär zu leſen:

> Von Papageien angeſteckt. Italieniſche Blätter erzählen: Im Dorfe Rivolto bei Udine erkrankten in der vergangenen Woche in einem und demſelben Haus drei Perſonen an Pneumonie, von denen zwei ſtarben. Zu gleicher Zeit gingen in demſelben Haus zwei aus Südamerika mitgebrachte Papageien ein. Da es nun erſt im vorigen Jahr in Genua vorgekommen iſt, daß Menſchen von Papageien angeſteckt wurden, erhielt der Gerichtsarzt Dr. Rovere von den Behörden den Auftrag, die Angelegenheit zu unterſuchen Dieſer ſtellte nun bald feſt, daß auch diesmal die Papageien die Krankheit eingeſchleppt hatten. Infolgedeſſen wurden die noch im Haus befindlichen Papageien getödtet, das Haus ſelbſt jedoch in allen ſeinen Räumlichkeiten desinfizirt. Die Inwohner des Hauſes dagegen wurden iſolirt und befinden ſich noch jetzt unter Beobachtung.

Alſo wieder einmal, und wieder in Italien! Es iſt doch merkwürdig, daß alle dieſe „Fälle" ſich in Frankreich oder Italien ereignen! Vor zwei Jahren ſchon machte Dr. Ruß in der „Gefiederten Welt" (Jhrg. XXV. S. 113 u. 114) darauf aufmerkſam, daß ſeit zwei Jahrzehnten von Zeit zu Zeit von Frankreich her und auch von Italien, darf man hinzufügen, die Mär von Krankheitsübertragung durch Papageien auftaucht, die ſich bis jetzt eben immer als Erfindung herausſtellte, wenn man nähere Nachforſchungen anſtellte. Könnte es hierfür noch einen eklatanteren Beweis geben, als die Geſchichte von Kreuzlingen in der Schweiz? Für Leſer, welchen die Sache nicht mehr in Erinnerung ſein, oder welchen der Jahrgang XXV (S. 176 bis 178) der „Gefiederten Welt“ nicht zu Händen ſein ſollte, ſei erwähnt, daß im Sommer 1896 auf einer Geflügelausſtellung zu Kreuzlingen ein kranker Papagei eine derartige Anſteckung verbreitet haben ſollte, daß ſechs ſtarke, vorher ganz geſunde Männer erkrankten und ſtarben, ihre Leichen ſogar ganz ſchwarz wurden, während andere Komiteemitglieder zwar erkrankten, aber wieder genaſen. Auf Grund der Nachforſchungen des Herrn Dr. Ruß-Berlin und Dr. B. Stange-Leipzig, die ſich dankenswerther Weiſe die Aufklärung dieſer Schand- und Schauermär angelegen ſein ließen, ſtellte ſich die Geſchichte als purer Schwindel heraus! Im genannten Bande der „Gefiederten Welt“ ſind die offiziellen Schriftſtücke veröffentlicht.

Auffallend und übereinſtimmend an dieſen Geſchichten iſt, daß die Vögel jedesmal ganze Familien oder mehrere Perſonen anſtecken und letztere ſchnell ſterben, ſchließlich den Fall durch einen Arzt unterſuchen laſſen. Bezeichnenderweiſe trifft dies bei dem neuen „Fall“ in Rivolto auch wieder zu. Das allein ſchon ſollte zu denken geben, nicht weniger die „ſchnelle“ Wirkung des von den Papageien auf „mehrere“ Menſchen zugleich übertragenen Gifts, wie ſie analog bei keinen andern Krankheits- bzl. Anſteckungsgeſchichten zu finden iſt. Nicht einmal der Peſtbazillus kürzlich in Wien hat ſo raſch und tödtlich gewirkt! Da dürfte es angezeigt ſein, wieder auf einen Bericht der Deutſchen Ornithologiſchen Geſellſchaft in Berlin hinzuweiſen, welche ſich vor zwei Jahren mit derſelben Geſchichte befaßte, als nach einer franzöſiſchen Zeitſchrift alle Angehörigen einer Familie an Tuberkuloſe, von einem kranken Papagei übertragen, binnen weniger Tage geſtorben ſein ſollten; in demſelben heißt es: „Die Wahrheit dieſer Angabe wurde mit Recht angezweifelt, und von den anweſenden hervorragenden Aerzten wurde eine derartige, ſo ſchnell tödtlich wirkende Uebertragung von Tuberkelbazillen überhaupt für unmöglich erklärt.“ Iſt es nicht die beſte Widerlegung dieſer thörichten Aufſtellung, mag ſie nun kommen, woher ſie wolle, von Laien oder Wiſſenſchaftlern, daß die von Dr. Ruß vor 2½ Jahren in der „Gefiederten Welt“ an alle Aerzte erlaſſene Aufforderung, in dieſer Zeitſchrift öffentlich Auskunft darüber zu geben, wenn eine Uebertragung einer ſcheußlichen Krankheit vom Vogel auf den Menſchen nach ihrer Behauptung ſtattgefunden, — bis jetzt unbeantwortet geblieben iſt?

Allein was helfen alle Klarſtellungen in ornithologiſchen Zeitſchriften und Organen der Vogelliebhaber, wenn die ſenſationslüſterne Tagespreſſe immer wieder der ausländiſchen das dumme Zeug nachdruckt und die weniger unterrichteten Vogelfreunde und zahlreiche Familien in Unruhe verſetzt?

Daß derartige Zeitungsenten jedoch nicht gänzlich ohne Widerſpruch ſeitens des Publikums hingenommen werden, bewies ein weiterer Artikel in den „Neueſten Nachrichten“, der wenige Tage darauf in Nr. 539 vom 22. XI. zu leſen war:

> Von Papageien angeſteckt. Mit Bezug auf die von uns gebrachte Notiz, daß im Dorf Rivolto bei Udine mehrere Perſonen von kranken Papageien angeſteckt worden und geſtorben ſeien, wird eine Aeußerung des berühmten Ornithologen Dr. Karl Ruß mitgetheilt, nach der eine Anſteckung durch erkrankte Stubenvögel völlig ausgeſchloſſen ſei. Dr. Ruß erklärt in ſeinem Werk „Die ſprechenden Papageien“: „Nach meiner Ueberzeugung, die auf zwanzigjähriger Erfahrung in der Haltung und Pflege von fremdländiſchen Vögeln, insbeſondere Papageien, beruht, iſt der Uebergang einer Krankheit von Stubenvögeln auf Menſchen und auch umgekehrt überhaupt nicht möglich. Im Lauf der Jahre habe ich Hunderte kranker Vögel beherbergt, verpflegt und behandelt, ohne daß ich oder ein Mitglied meines Hausſtands jemals angeſteckt worden; ich habe vielfach aus London große Papageien erhalten, die durch und durch krank waren, binnen Kurzem unter den Erkrankungszeichen des Faulfiebers ſtarben und bei der Oeffnung und Unterſuchung typhöſe Blutvergiftung zeigten. Trotzdem iſt, wie geſagt, bei uns und bei meinen weiten Bekanntenkreiſen noch niemals eine Krankheitsübertragung durch derartige Vögel (Papageien) vorgekommen.

Dieſe Einſendung war wohlgemeint aber weniger glücklich. Seit der Zeit, da dieſe Worte niedergeſchrieben wurden, iſt bereits wieder ein Jahrzehnt verſtrichen, ohne daß ſie in ihrem hier zutreffenden weſentlichen Inhalt widerlegt wurden; im Gegentheil wurden mehrere derartige Geſchichten als Erfindungen und Zeitungsfabeln aufgeklärt und insbeſondere durch eine Reihe wiſſenſchaftlicher Unterſuchungen ſeitens hervorragender Gelehrter und bedeutender Praktiker erwieſen, daß die bei Menſchen und Vögeln mit übereinſtimmender Bezeichnung belegten Krankheiten, wie Hühnercholera, Geflügeltyphoid, Diphtherie, -Tuberkuloſe und andere mehr, doch durchaus verſchiedene Krankheitsformen und ganz und gar abweichend von einander ſind. Selbſt durch die Unterſuchungen Dr. Robert Kochs und Dr. Esmarchs konnte die Uebertragbarkeit jener Vogelkrankheiten auf Menſchen nicht nachgewieſen werden. Das hätte eine richtige und wirkſame Entgegnung und insbeſondere die verſchiedenen bereits als Zeitungsenten erwieſenen Fälle, hauptſächlich den Fall in Kreuzlingen, anzuführen nicht unterlaſſen ſollen. (Fortſetzung folgt).

* * *

Plauderei von meiner Nordlandreiſe.

Von Joſef Wagner.

I. Am Svartiſengletſcher.

Als ich nach einem fünftägigen Aufenthalt Trontheim verließ, beſtieg ich am Fjord gleichen Namens den der Bergiſchen Dampfſchiffsgeſellſchaft gehörenden, muſterhaft eingerichteten Touriſtendampfer „Konko Harold“, und gegen 10 Uhr abends ging die Abfahrt vor ſich. Es hatte im Lauf des Nachmittags ſehr gewittert und geregnet, wobei ſich das Wetter ſehr abgekühlt hatte. Heftiger Wind hatte ſich erhoben, ſodaß ich vor Kälte nur bis 1 Uhr nachts auf Deck ſein konnte. Alles war geſpannt, den großen Fjord und deſſen Ausfahrt ſehen zu können.

Früh war ich als eifriger Naturfreund der Erſte auf Deck, um die Fahrt zwiſchen den Inſeln und Schären bewundern zu können. Felſen und Geſteine zeigten ſich kahl; die erſte Station war Torgarten, eine kleine Inſel, beſtehend aus einem großen Felſen, welcher in der Mitte eine Oeffnung hat, die eine herrliche Durchſicht nach dem gegenüberliegenden Meeresſpiegel gewährt. Wir wurden ausgebotet und ſtiegen nach 1½ Stunden auf ſteinigem ſchlechtem Weg zu dem von der Natur geſchaffenen Rieſentunnel in die Höhe. Unmaſſen niſtender Krähen waren dort, welche ein entſetzliches Geſchrei erhoben, als ſie uns zu Geſicht bekamen. Ein kleiner zehnjähriger Fiſcherjunge zeigte uns den Weg. Als beim Aufſtieg die Krähen immer näher an uns herankamen, um uns vielleicht von den Neſtern und Jungen abzulenken, ſetzte ſich eine Krähe in dichter Nähe auf einen Stein; der kleine Bube ergriff einen Kieſel und traf mit großer Geſchicklichkeit die Krähe. Sie purzelte vom Stein herunter und verendete nach einigem Flattern. Auf dieſer Inſel zeigten ſich noch Waſſerpieper, und in einer Schlucht, wo noch kleine Birken nebſt Geſträuch vorhanden waren, ſangen Fitislaubvögel.

Zurückgekehrt an Bord, ging unſere Fahrt wieder weiter an der Mündung des Wölffjord vorbei, wir erblickten dann die Inſel Väpen im Weſten, deren höchſte Erhebung an 700 m erreicht. Das Schiff nahm ſeinen Kurs zwiſchen den Inſeln Vegen und Havne hindurch auf die gewaltigen „Sieben Schweſtern“ zu. Im Oſten erblickten wir das hochaufragende Finkenfeld und den kleinen, röthlich ſcheinenden Gabroberg, durchfuhren das Störgaard, und im Weſten tauchte nun die 170 Kilometer lange und 1500 Einwohner zählende Inſel Alſten mit ihren 800 bis 1000 m hohen ſchönen Bergſpitzen, den „Sieben Schweſtern“, auf. Ich erkannte zuerſt nur ſechs einzelne Spitzen, die ſiebente theilte ſich etwas ſpäter tiefer ab und machte den Eindruck, als wenn es „die jüngſte Schweſter“ wäre. Dann paſſirten wir die Inſel Lekten, deren Bewohner durch künſtliche Anlagen den Eiderenten Verſteckplätze und gute Brutplätze geben, da die Eier als Nahrungsmittel geſammelt werden.

Weiter ging es bei Cöbberthal vorbei, angeſichts der Einfahrt in den Rannenfjord, weiter bei Vipholmen und mehreren kleinen Inſeln, wo ich große Scharen von Lummen, eine Taucherart, ſah. Die Brutplätze, welche die Vögel zum größten Theil an unzugänglichen Felſenwänden haben, werden von den Skandinaviern häufig abgeerntet, nicht bloß die Eier, auch die Jungen werden verwerthet, nämlich eingepökelt.

Etwas ſüdlich folgt die Inſelgruppe Heſtmande; dann paſſirten wir den Polarkreis, welcher beim Paſſiren durch Böllerſchüſſe angezeigt wird. Wir ſahen den pyramidenförmigen Berggipfel Lure, fuhren jedoch weiter und erreichten den ſo erſehnten Swartierengletſcher. Dieſer iſt ein ungeheures Schneefeld, das eine ziemliche Länge nebſt Breite beſitzt. Die Spitze (1200 m Höhe) iſt mit Schnee bedeckt nach Art des Folgevond oder Joſtalsbree-Gletſcher, aus dem ſich einzelne Anhöhen emporheben, während nach den in's Land einſchneidenden Fjorden allenthalben Gletſcher herabſteigen.

Es war gegen Abend, als wir dort anlangten und uns ausboten ließen; dann ging die Wanderung weiter zum Gletſcher, um auf den Eisblöcken Photographien von der Geſellſchaft aufzunehmen. Das kümmerte mich ſehr wenig, denn mein Wunſch richtete ſich nach den Abhängen, die die nordöſtlichen Höhenzüge bildeten, welche meiſtens mit kleinem Geſträuch und Zwergbirken bewaldet waren. Ich wollte womöglich Singvögel belauſchen und noch ſingen hören. Und richtig! Ich war erſtaunt, als ich in der einſamen Stille noch über dem unterſten Gletſcher ſchon ſpät gegen Abend Rothkehlchen und Singdroſſeln kräftig ſingen hörte. Während ich den Vögeln lauſchte, amüſirten ſich die anderen Perſonen am Waſſer an den ſchlüpfrigen Steinen; ich zog mich jedoch ganz allein zurück, da ich genügend Zeit hatte, und verſuchte Notizen zu machen, um den Geſang einer Droſſel aufzunehmen. Es waren mindeſtens zehn Droſſeln, welche von weit und breit ihre Strofen hören ließen, und dies erſchwerte mir mein Vorhaben ungeheuer, zumal die Rothkehlchen mit kräftiger Stimme immer dazwiſchen trillerten. Und doch gelang es mir, den Geſang einer Droſſel am Swartierengletſcher aufzuzeichnen und ich gebe denſelben in Worten hier wieder:

Tara, tara, tara,
Witlat, witlat, witlat,
Wojtj, vojtj, vojtj, vojtj,
Zitlip, zitlip,
Kirj, kirj, kirj, kirj,
Dratit, dratit, dratit,

Schirip, ſchirip,
Batiwat, batiwat, batiwat,
Ki, ki, ki, ki, ki,
Dotrot, dotrot, dotrot, dotrot,
Filip, vilip, vilip,
Klip, klip, lip, lip.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Endlich iſt der Frühling hier in Petersburg in ſeine Rechte getreten. Von den gefiederten Gäſten ſind eingetroffen: Finken, Rothkehlchen, Braunellen, weiße und gelbe (Schaf-) Bachſtelzen, Lerchen, Stare u. a. Da das Wetter jetzt dem Anflug der Zugvögel ſehr günſtig iſt, ſo dürften in den nächſten Tagen die Gartenröthlinge, Blaukehlchen, Weidenlaubvogel u. a. eintreffen. Der Sproſſer kommt hier in den letzten Tagen des April oder in den erſten des Mai ruſſiſchen

Stils an. Nicht nur draußen im Wald, ſondern auch in den Vogelſtuben kann man dem ſchönſten Vogelkonzert lauſchen. So ſingen z. B. bei meinem Freunde, Herrn Morawitz, einem tüchtigen Vogelpfleger: Sproſſer, Gartenrothſchwanz, Mönch, Zaungrasmücke, Fitis- und Weidenlaubſänger, Schilfrohrſänger, Heckenbraunelle, rothrückiger und Raubwürger, Zwergfliegenſchnäpper, Fink, Hakengimpel u. a. In der That ein ſchönes Frühlingskonzert. Die Vögel ſind alle wenigſtens einmal überwintert. Wenn es die Leſer unſerer geſchätzten „Gefiederten Welt“ etwa intereſſiren ſollte, über das Gefangenleben des einen oder des andern dieſer Vögel etwas zu erfahren, ſo wird mein Freund, meiner Ueberzeugung nach, nicht verfehlen, Ihnen davon zu berichten.

Anfragen u. Auskunft

Herrn H. Hoeſte: 1. Die Fütterung für die Roſella beſteht in Kanarienſamen, Hirſe, Hafer, etwas Hanf und Sonnenblumenſamen. Wenn die Vögel gut eingewöhnt ſind, gibt man auch Gräſerriſpen, Getreideähren u. a. Grünkraut, ſowie Ebereſchen- und trockne Wachholderberen, zum Benagen grüne Baumzweige. Doch hat man in der Darreichung all' dieſer letztgenannten Beigaben ſehr vorſichtig zu ſein. 2. Zweckmäßige Badevorrichtungen für dieſe Vögel (die bekannten Glashäuschen) bekommen Sie bei jedem Vogelhändler.

Herrn M. Schuchardt: 1. Ihr Kardinal hat ſich, als er ſo plötzlich in die Mauſer kam, eine heftige Erkältung zugezogen und iſt infolge derſelben geſtorben. Suchen Sie die übrigen Kardinäle vor Temperaturſchwankungen zu bewahren. 2. Die Fütterung Ihrer Kardinäle iſt richtig. In der Voliere von angegebener Größe können Sie das Pärchen grüne und das Pärchen rothe Kardinäle mit den Wellenſittichen zuſammen halten und überwintern und können auch im Sommer auf Züchtungserfolge rechnen.

Fräulein Paula Enke: Der Dompfaff hatte ſich in der That zu fett gefreſſen und war infolge eines Schlaganfalls geſtorben. Laſſen Sie jetzt bei dem andern Vogel vorläufig aus der angegebenen Fütterung Hanf, Leinſamen und Mohn weg und geben Sie dafür von den anderen Sämereien mehr. Sonnenblumenſamen iſt bei der Fütterung ebenſo zu vermeiden. Als Grünkraut darf er nur wenig beſte Vogelmiere, ſowie grüne Tradescantia erhalten. Das Einreiben der Füße mit warmem Oel ſetzen Sie fort und halten ihn auch wie bisher abgeſondert im kleinen Käfig in gleichmäßiger Wärme.

Herrn Dr Fr. Schmidt: Ihre beiden Stieglitze haben ſich augenſcheinlich eine heftige Erkältung beim Temperaturwechſel zugezogen und ſind infolge derſelben eingegangen. Man muß ſelbſt bei derberen Vögeln in ſolchen Fällen immer ſehr vorſichtig ſein.

Frau H. Burchard: Die heftigen Krämpfe können nur Folge der heftigen Regung des Parungstriebs ſein, wie er in ſolcher Erregung bei Papageien allerdings nur ſelten auftritt. Infolgedeſſen iſt der Vogel vom Schlag gerührt worden.

Herrn Carl Beberich: 1. Unter dem thörichten Namen „Chineſerfink“ wird die allbekannte ſchwarzköpfige Nonne im Handel ausgeboten. Zur Abwechslung nennt man ſie auch „Kapuziner“. Sie iſt ein hübſcher, dauerhafter Vogel, aber bisher noch nicht gezüchtet. 2. Die eingeſandten Vögel müſſen irgend etwas Schädliches gefreſſen haben (obgleich die von Ihnen genannten Sämereien und das übrige Futter durchaus ſachgemäß ſind) oder es iſt ein Futterbeſtandtheil von ſchlechter Beſchaffenheit geweſen. Vielleicht beziehen Sie das Futter einmal kurze Zeit aus andrer Quelle.

Frau Clara Jung: Das von dem amerikaniſchen Vogelfreund empfohlene Mittel gegen das Selbſtrupfen großer ſprechender Papageien (Schießpulver und Schweinefett) hat ſich in den meiſten Fällen bewährt. Wollen Sie es nicht anwenden, ſo bringen Sie den Selbſtrupfer mit ſeinem Käfig in die Nähe des warmen Ofens und beſpritzen ihn vermittelſt des Rafraichiſſeurs vollſtändig durch mit einer Miſchung von Rum (bzl. Cognak) und lauwarmem Waſſer zu gleichen Theilen. Nach der Abſpritzung muß der Käfig feſt verhüllt werden, damit der Vogel ſich nicht erkältet. Erſt nach einer halben Stunde etwa entfernt man den Käfig nebſt Vogel allmählich vom Ofen, läßt ihn aber jedenfalls noch in demſelben Zimmer.

Herrn Paul Lehmigk: Wir würden Ihnen rathen, in dieſer Sache einen Rechtsanwalt zu konſultiren, der Ihnen ſagen wird, ob Sie jetzt noch verpflichtet ſind, Erſatz zu leiſten. Eigentlich hätte ſich ja der Käufer eher melden müſſen. Vielleicht können Sie ſich noch in Güte mit ihm einigen.

Herrn Edm. Eckhart: Wenn die Hühner ſonſt geſund und ihre Eier gut ſind, ſo würde ich an der Färbung der Eier keinen Anſtoß nehmen. Es liegen augenſcheinlich chemiſche Einwirkungen vor, welche die plötzliche Aenderung der Farbe hervorgerufen haben. Vielleicht iſt die Ernährung der Hühner im Freien jetzt auch eine andre.

Berichtigung.

In dem Artikel: „Der Gelbſpötter und ſeine Behandlung als Stubenvogel“, Schluß, Nr. 17, S. 132, Zeile 16 bis 21 haben ſich einige ſtörende Druckfehler eingeſchlichen. Der Abſatz muß in korrekter Form folgendermaßen lauten: „Mehlwürmer reiche ich dem Spötter während des ganzen Jahres, da demſelben, wie überhaupt keinem einmal überwinterten Vogel, während des Sommers ganz blanke, friſche Ameiſenpuppen gebe, ſondern nur ſtets einige hiervon unter das Miſchfutter thue, trotzdem ich friſche Ameiſenpuppen ſtets gut und billig beziehen kann. Der Spötter erhält durchſchnittlich 6—12 Mehlwürmer in zwei Rationen täglich, außerdem im Januar und Februar als Hauptdelikateſſe einige Speck- und Pelzkäferlarven.

Zu unſerm Bilde.

Der Inkakakadu (Psittacus Leadbeateri, *Vgrs.*), auch Leadbeater's Kakadu genannt, gehört zu den bekannteſten und ſchönſten aller Arten. Er iſt in folgender Weiſe gefärbt: ſchmaler Stirnrand dunkelroſenroth, Stirn- und Vorderkopffedern weiß, am Grunde hellroſenroth, Haube aus ſechszehn ſpitz zulaufenden, an der Spitze nach vorn gebogenen Federn gebildet, die am Grunde zinnoberroth, dann breit gelb, darauf wieder roſenroth und am Ende weiß ſind, ſodaß die zugeklappte Haube weiß und nur die in der Erregung geſträubte Haube prachtvoll dreifarbig erſcheint; Hinterkopf, Kopfſeiten, Unterrücken und ganze Unterſeite hellroſaroth; Oberrücken und Flügel weiß; Schwingen an der Innenfahne und unterſeits dunkelroſenroth; Schwanz oberſeits weiß, unterſeits an der Grundhälfte roſenroth; Schnabel gelblichgrauweiß, Wachshaut und Naſenlöcher von roſafarbenen Federchen verdeckt; Auge ſchwarz, tiefbraun bis rothbraun, ſchmaler Augenkreis gelblichweiß; Füße bräunlichgrau, Schildchen und Krallen ſchwarz. Er hat etwa Krähengröße. Die Heimat erſtreckt ſich über Süd- und Weſtauſtralien. Die Urtheile über die einzelnen Vögel dieſer Art ſind weit auseinandergehend. Während er im allgemeinen als ſanftmüthig, auch friedlich mit anderen Vögeln geſchildert wird, zeigt er ſich in anderen Fällen unbeſchreiblich unbändig, ſodaß jeder Zähmungsverſuch fehlgeſchlagen ſei. Manche werden indeß ohne Bemühung des Pflegers bald zahm und gewöhnen ſich auch das läſtige Geſchrei bald ab und lernen einiges ſprechen. Ganz fingerzahm werden wenige.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von August Hopfer in Burg b. M.

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [820]

Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos).

Grau-Papageien,

(Jakos), besonders schöne, gute, recht gesunde und garantirt junge, tadellos befiederte Thiere, an Hanf und Wasser gewöhnt, à Stück **nur 18 und 20 ℳ**, dito, einige ¾ Jahr in Europa, nur 35 ℳ, dito **Blaustirn-, Rothbug-Amazonen,** schon sehr gut sprechend, nur 30, 35—40 ℳ, je nach Leistung bis 150 ℳ, einige viel sprechende Jakos 60, 80, 100—200 ℳ.

Affen,

ganz besonders schöne, recht gesunde, hoch amüsante Thiere, Stück nur 15 ℳ, solche schon ganz zahm, nur 20 ℳ, in Grösse einer Hauskatze.

Versandt gegen Nachnahme, lebende Ankunft garantirt.

F. Rejsek, Papageien-Grosshandlung,
[821] Hamburg, Peterstrasse 28.

Zur Lieferung ihrer Lieblinge empfiehlt ſich den P. T. Herren

Vogelliebhabern

die beſtbewährteſte, ſtreng reelle Vogelhandlung von [822]

Gottlieb Wanek, Prag 411, I.

Empf. in nur tadelloſen, gut eingewöhnten Exemplaren

Nachtigalen,

ff. Schläg., à 4 ℳ, 3 Stck. 10 ℳ, Schwarzplättchen à 4 ℳ, Rothkehlchen u. Gartenrothſchwänze à 1,50 ℳ, Grasmücken à 2 ℳ, hochrothe Schnäbel, Edelfinken, Erlen- u. Leinzeiſig à 1,50 ℳ, Grün~~fink à 1 ℳ, Girlitz à 1 ℳ,~~ Dtzd. 8 ℳ, Singlerchen à 2 ℳ, reinweiße Lachtauben, Zuchtp. 4 ℳ, dito gelbe 2 ℳ. Garantie für Hähne u. leb. Ank. Praktiſche Käfige, komplett für Nachtigalen u. a. 2 Stck. 3,50 ℳ. Mehlwürmer, ff. Waare, à Pfd. 4 ℳ, friſche Ameiſeneier zum Tagespreiſe. [823]

Aug. Schulz,
Breslau I, Altbüßerſtr. 36.

Ein gegen 40 Worte u. Sätze gutſprech. **Amazonen-Papagei,** mit neuem hochf. Salonkäfig, 70 ℳ, Sprachverz. z. Dienſten, 1 ff. Am. **Spottdroſſel** 20 ℳ, 1 hochf. **Steinröthel** 12 ℳ, 1 echt. f. g. **David-Sproſſer** 15 ℳ, 1 echt. reinſchall. **Reitzugfink** mit „Schnapp“ 20 ℳ, 1 hochf. 2mal ſch. vermauſ. **Gelbſpötter,** Wildf. m. d. f. Tour. 12 ℳ, 1 ff. **David-Zippe** m. r. Waldgſ. 10 ℳ. **Ad. Markert, Scheibenberg, Erzgeb.** [824

Verk. 1,0 Stieglitz, 1,0 Zeiſig, 0,1 Dompfaff, 1,1 Blaumeiſen, 0,1 Wellenſittich, 0,1 Zwergpapagei, zuſ. 5,50 ℳ, tauſche auch.

H. Geisthardt,
[825] **Koburg,** Leopoldſtraße 37.

---

1 Sumpfrohrsänger

10 ℳ, 1 Sumpfrohrſänger 6 ℳ, 1 Rothkehlchen 1,50 ℳ, 1 Par Zaunkönige 6 ℳ, 1 Steinkauz 3 ℳ, habe abzugeben. [826]

Otto Salzmann, Zſchöllau b. Oſchatz.

Sproſſer

aus verſchiedenen Gebieten Stck. 7—12 ℳ,

Nachtigalen

aus verſchiedenen Gebieten Stck. 4—6 ℳ, 6 Stck. 20 ℳ,

Schwarzblättchen,

Tiroler, Stck. 3,50 ℳ, 6 Stck. 18 ℳ,

Sperbergrasmücken,

Stck. 3,50 ℳ, 6 Stck. 15 ℳ,

Gartengrasmücken

Stck. 3,50 ℳ, 6 Stck. 18 ℳ,

Wachteln

Stck. 1,50 ℳ, 6 Stck. 7 ℳ,

Steinröthel

Stck. 10 ℳ,

Gelbſpötter und Sumpfrohrſänger

Stck. 5 ℳ, unter Garantie für lebende Ankunft und nur Männchen. Preisliſte gratis.

[827] **Gebr. Haas,** Vogelexportgeſchäft,
Hoffſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Harzer Edelroller,

tieftourenreich u. weltbekannt, liefere überall hin. Der Preis richtet ſich nach Geſangsleiſtung, à St. 7, 8, 10, 12, 15 bis 30 ℳ. Verſandt unter Nachnahme. Garantie für geſundes Ankommen. [828]

Joh. Wink, Dresden-A., Marſchallſtr. 37.
Züchterei hochedler Kanarien, gegr. 1885.
Goldene u. ſilberne Medaillen. Viele Dankſchreiben.

Gelegenheitsverkauf wegen Aufgabe meiner Vogelſtube.

Verpackung frei.

Zuchtpärchen: 1 P. weiße Reisvögel 6 ℳ, 1 P. chineſiſche Zwergwachteln 6 ℳ, 1 P. Malabarfaſänchen 2 ℳ, 1 P. Paradiswittwen 2,50 ℳ, 1 P. Orangeweber (grau) 2 ℳ, 1 P. Mövchen (M. weiß, Wbch. brbt) 3,50 ℳ, 2 P. Schmetterlingsfinken à 2,50 ℳ, 2 P. Tigerfinken à 2,50 ℳ.

Einzelne Vögel: Grauer Kardinal mit rother Haube 4,50 ℳ, Wbch. Roſenkopfſittich 5 ℳ, kl. Amaranthen 3,0 à 1 ℳ, Auroraaſtrilde 1,0 4 ℳ, Schmetterlingsf. 1,0 1 ℳ, CereSaſtrild 1,0 2 ℳ, Grisbleu 1,0 1 ℳ, Goldbrüſtchen 0,1 1 ℳ, Madagaskarweber in Pracht 3 ℳ, Dottergelber Weber 2 ℳ, 2 junge Reisvögel zuſ. 1,50 ℳ, reinweiſe Mövchen 2,0 à 2,50 ℳ, glbbte. Mövchen 2,1 à 1,50 ℳ.

Unter der Hälfte des Einkaufspreiſes.

Verpackung frei.

Heckkäfig, 80 × 70 × 55, ganz Metall, zuſammenlegbar, von Hähnel, Berlin, mit Futter-, Trinkgefäßen und Badehäuschen, 15 ℳ.

Fangkäfig, Metall, 50 × 40 × 30. Mit Zinkunterſatz 80 × 60 und Badegefäß. Von Schindler, Berlin, 8 ℳ.

Droſſelkäfig, Metall, 60 × 30 × 32 mit hohem Metallunterſatz und Wachstuchdecke, 6 ℳ.

Zinkdrahtgewebe, ca. 10 □m. Maſchenweite 12 mm. Genügend für 1 Thür und 2 Fenſter von innen und theilweiſe von außen, 10 ℳ.

Nitardy, Konrektor,
[829] **Rügenwalde.**

Jede Sorte edler

Weichfutter-Vögel

in geſanglich erprobten ſeltenen Exemplaren empfiehlt direkt von Ort und Stelle reellſt und fachkundigſt unter üblicher Gewähr

Mathias Rausch,

Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten Singvögel,

Wien VII/3, Schottenfeld-
[830] gaſſe 95.

Preisliſte gratis bei Angabe über welche Vogelart.

Sprosser! [831]

feine tourenreiche Vögel,

offerirt in Kürze eintreffend à Stück 9 ℳ, 2 Stck. 17 ℳ, 3 Stck. 24 ℳ.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Für ſofort geſucht:

Tadelloſes Weibchen oder Par **Hakengimpel,** Kiefernkreuzſchnabel, große nordiſche Gimpel, Roſen-, Karmingimpel.

[832] **Friedrich Veltin,**
Baſel (Schweiz), Feldbergſtraße 89.

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg

Edelroller!

Nachtigalen

[illegible]

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 19.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

von

Dr Karl Ruß.

Preis: vierteljährlich
(13 Nummern mit Abbildungen)
M. 1.50.

Magdeburg
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretſchmann).

Einzelpreis der Nummer
20 Pfg.

[illegible]

Nachtigallen,

Sprosser

[illegible]

Edelfalter!

[illegible]

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 19.

Die gefiederte Welt

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler

von

Dr. Karl Ruß.

Preis: vierteljährlich
(13 Nummern mit Abbildungen)
M. 1.50.

Magdeburg
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretſchmann).

Einzelpreis der Nummer
20 Pfg.

Inhalt der Nr. 19.

Fremdländiſche Finken (Fortſetzung).
Zur Frage der Uebertragung von Papageienkrankheiten auf Menſchen (Schluß ſtatt Fortſetzung).
Beobachtungen aus der freilebenden Vogelwelt.
Plauderei über meine Nordlandreiſe (Schluß).
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenſchau.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Ohne Sportspreiſe

empfehle garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende, echte **Bukowiner-** und **Donau-David-**

Sprosser

aus den **Weidenpflanzungen der Donaugebiete die beſten, lauteſten tiefſchalligſt. Kogler,** welche exiſtiren, wirkliche ſeltene **Tag- u. Nachtſchläger,** Stck. 9,50 ℳ, 2 St. 18 ℳ, 3 St. 25 ℳ, **Steinröthel** aus Dalmatien und dem Karpathengebirge mit **entzückend wundervoll reizendem** Geſange, per Hahn 12 ℳ, beide Sorten bzhw. **bedeutend billiger.** Ich liefere, wie allſeitig bekannt, unter **weitgehendſter Garantie für lebende und geſunde Ankunft, abſolut tadelloſe, ſtarke, gewiſſenhaft abgehörte Hähne,** elegante u. praktiſche **Weichfreſſerkaſtenkäfige,** mit Zinkſchubkaſten und weicher Decke, 53×30×38, St. 5 ℳ Büchlein über **Behandlung, Fütterung und Pflege gratis. Friſche Ameiſeneier** zum Tagespreis können jeder Sendung beigefügt werden. [855]

Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [859]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

☞ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Staatspreis). – Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [860]

Holzwaarenfabrik.

C. L. Flemming

Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen

empfiehlt: [861]

Flug- und Heckbauer, Einſatzbauer, Geſangskaſten.
Muſterpackete 9 St. ſort. f. Kanarienzüchter M. 6 franko.

Holzwaarenfabrik.



Man verlange Preisliste.

Käfige und Geräthſchaften.

Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [856]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Ltr. 1 ℳ Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen,** M.-Gladbach 112.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in **praktiſcher** Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [857]

☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜

August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Neu! Senſationell!

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben. D. R. G. M. 108181. **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Ka[illegible]
[858] **Edmund Schlewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ſ. Ref. zu dienen.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [862]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Collier-Rüde,

2 Jahre, prima Stammbaum, fuchsroth m. weißem Kragen, g. Pfoten, verkaufe für 40 ℳ. Tauſche auch auf Vögel. Offerten u. **B. S.** an d. Exp. d. Gef. Welt. [863]

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Alliancestraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 19. Magdeburg, den 11. Mai 1899. XXVIII. Jahrg.

Fremdländiſche Finken.

Von K. Ruß.

(Fortſetzung).

Zu den fremdländiſchen Finken nur bedingungsweiſe zu zählen iſt der Karmingimpel (Pyrrhula erythrina, *Pall.*); er bewohnt außer Mittelaſien auch Oſteuropa; doch wollen wir ihn als Hauptvertreter der Gattung hier mitzählen, zumal er häufig im Käfig gehalten wird. Seinen Aufenthalt bilden nach der Schilderung der Reiſenden hauptſächlich feuchte Wälder, ſowie buſchreiche Flußufer mit Weiden und Röhricht. Er iſt ein muntrer, lebhafter Vogel, fliegt ſchnurrend, flach bogenlinig und geht nicht ungeſchickt auf der Erde. Im Frühling und Sommer ſieht man ihn parweiſe, im Herbſt und Winter in großen Scharen umherſtreichen. Die Nahrung beſteht hauptſächlich in allerlei Sämereien, beſonders ölhaltigen, ſowie Knoſpen und jungen Baumſprößlingen; durch Verwüſtung von Flachsfeldern oder Blüthenknoſpen werthvoller Obſtbäume wird er hier und da ſchädlich. Er ſoll nur einmal im Jahr brüten, Ende Mai oder Juni. Das Neſt ſteht im dichten Nadelholz- und Dorngebüſch, höchſtens 2 m hoch, beſonders in Bromberranken, Geisblatt, Johannisberbüſchen, Erlen, Schwarzdorn, wilden Pflaumen, auch Wachholder, meiſt nahe am Waſſer, und wird aus langen dürren Grashalmen und Würzelchen locker gewebt und mit Grashalmen, Wurzeln und Pferdeharen ausgerundet. Das Gelege beſteht aus fünf bis ſechs blaugrünen, purpurbraun und ſchwärzlich fein gepunkteten Eiern. Den Geſang hat am ausführlichſten Ernſt Hartert (ein deutſcher, in England lebender Ornithologe) ſ. Z. geſchildert: „Die laute, weithin hörbare, flötende Stimme des Männchens verräth den Vogel leicht und fällt auch Leuten, die ſonſt nicht auf Vogelſtimmen achten, häufig genug auf. Wer ſie einmal gehört hat, wird ſie nie mit einer andern verwechſeln können. Sie iſt verſchiedentlich durch Silben veranſchaulicht worden und von allen derartigen Verſuchen ſcheint mir der von Taczanowski mit am meiſten gelungen zu ſein, der mit den Silben „tiu, tiu, fi, tiu“ und „tiu, tiu, fi, tiu, tiu“ wiedergibt, wobei der Ton am ſtärkſten auf das „fi“ fallen muß. Dieſe Strofe iſt der einzige Geſang des Karmingimpels. In mehreren Büchern iſt zwar angegeben worden, daß er auch einen hänflingsartigen, zwitſchernden Geſang habe, und der oben beſchriebene herrliche Pfiff iſt nur als Ruf bezeichnet, aber das iſt augenſcheinlich ein Irrthum. Jener weithin tönende Pfiff iſt ſein Geſang, gerade wie die oft damit verglichene Strofe des Pirols der Geſang jenes Vogels iſt. Außerdem hat der Karmingimpel nur noch einen kurzen Lockton und einen zirpenden Angſtruf, die man aber beide nur in der Nähe vernimmt.“

Im Vogelhandel erſcheint der Karmingimpel leider ſelten. Die Eingewöhnung bietet keine Schwierigkeit. Man füttert ihn mit Rübſen, abwechſelnd mit Hanf-, Kanarien- und Leinſamen, nebſt Grünkraut und Weichfutter aus Ameiſenpuppen, geriebener Möre, eingeweichtem Weißbrot und Mohn, ſowie zeitweiſe allerlei weichen Kerbthieren; als Leckerei erhält er hin und wieder ein Apfelſchnittchen. Gegen andere Vögel zeigt er ſich verträglich. Seine Züchtung gelang zuerſt Dr. Ruß. Das Neſt ſtand in einem Gebüſch ziemlich hoch, unmittelbar an der Wand, und war im äußern Bau aus Grasriſpen, Rohrfahnen, weichen Papierſtreifen und Fäden geformt und innen zierlich und mit langen Pferdeharen ausgerundet. Das Gelege beſtand aus drei blaugrünen, hell- und dunkelrothbraun, auch ſchwärzlich gefleckten Eiern, die in zwölf Tagen erbrütet wurden; die Jungen erſchienen in ſchwachem bläulichem Flaum.

Der Hakengimpel (Pyrrhula [s. Carpodacus s. Corythus] enucleator, *L.*) iſt nicht allein im hohen Norden von Europa und Aſien, ſondern auch in Nordamerika heimiſch; im Winter zieht er nach Süden, doch geht er nur in kalten ſchneereichen Wintern tiefer ſüdwärts hinab. Seinen Aufenthalt bilden hauptſächlich die Nadelholzwälder der Ebenen, ſeltener gebirgige und gemiſchte, niemals reine Laubholzwaldungen. Der Flug iſt ſchnell, wellenlinig, vor dem Niederſetzen ſchwebend; auf dem Boden ſpringt der Vogel ungeſchickt, in den Zweigen zeigt er ſich hurtig und gewandt. Sein Geſang klingt angenehm und wechſelreich.

Als Stubenvogel iſt der Hakengimpel ſehr empfehlenswerth, da er ſich bei zweckmäßiger Pflege, d. h. vor allem abwechſelungsreicher Nahrung, jahrelang gut erhält. Zwei eifrige Vogelwirthe, Rektor B. Marquardt und Major A. von Homeyer haben den Hakengimpel mit Erfolg in der Vogelſtube gezüchtet und die Züchtung hier geſchildert. Erſterer fütterte ſeine Vögel im Winter hauptſächlich mit Knoſpen von Fichten u. a. Bäumen, ferner Hanf, Ebereſchenberen, dazu recht mannigfaltiges Grünkraut; im Sommer erhielten ſie ſoviele Kerbthiere wie möglich, und zwar aller Art: Raupen, Fliegen, Schaben, Blattläuſe u. a., (auch Waſſerſpinnen und Libellenlarven im Waſſer). Homeyer gab zur Eingewöhnung und in der erſten Zeit Ebereſchenberen, Hanf, Leinſamen und ein Weichfutter, beſtehend aus $^1/_3$ getrockneten Ameiſenpuppen, $^1/_3$ Eierbrot, $^1/_3$ geriebener Möre. Im Lauf des Sommers reichte er beſonders gedörrte Ameiſenpuppen, dann Johannisberen, ſüße Birnen, Vogelmiere; im Herbſt wieder Ebereſchenberen, im Winter auch Aepfel. Gelegentlich erhielten die Vögel friſche Kiefernzweige zum Beknabbern. Zur Brut ſchritt das Pärchen bei letzterem Vogelwirth in einem Zimmerflugkäfig (Voliere) von 2 m Länge, 2 m Höhe und 1 m Breite; in dieſem wurde ein großer Kiefernbaum angebracht und darin dicht am Stamm ein größerer Drahtkorb befeſtigt und zur Hälfte mit Mos gefüllt und dann ein Wachholderdroſſelneſt hineingeſetzt. Das Pärchen brütete bei guter Pflege bald und brachte drei Junge auf. Sobald Junge vorhanden waren, wurde klein gehacktes Ei, Grünes, Sommerrübſen, Hanf, Leinſamen und trockene Ameiſenpuppen gereicht.

So kann der Hakengimpel in jeder Beziehung als Stubenvogel empfohlen werden. Er iſt leicht einzugewöhnen und zu erhalten, ſingt angenehm und ſchreitet leicht zur Brut.

Intereſſante Beobachtungen hat B. Marquardt über die Nahrung des Hakengimpels gemacht, den er in Livland regelmäßig beobachtete. Danach beſteht ſeine Nahrung hauptſächlich in Fichtenknoſpen, nicht in Fichtenſamen, wie oft angegeben wird. Wo ſich eine Schar einige Tage hindurch aufgehalten, iſt der Schnee rings umher mit den Hüllblättchen der Knoſpen beſtreut. „Niemals habe ich bemerkt, daß der Hakenſchnabel zum Hervorziehen des Samens aus den Zapfen diene; auch bei meinen Gefangenen ſah ich dies nie; der Same mochte noch ſo verlockend zwiſchen den Schuppen hervorſtehen. Sie warfen die Zapfen wol ſpielend hin und her, wie ſie es mit anderen Gegenſtänden auch thun; fiel der Same heraus, ſo fraßen ſie ihn garnicht einmal. Arbeiteten ſie wirklich mit Ernſt an einem Zapfen, ſo geſchah dies regelmäßig, um eine kleine braune Wanze zwiſchen den Schuppen hervorzuziehen, welche dort Winterherberge gefunden hatte. Brachte ich ihnen dagegen eine knoſpenreiche Fichte ins Zimmer, ſo gingen alle mit größtem Eifer ans Werk, und in unglaublich kurzer Zeit war ſelbſt die kleinſte und verſteckteſte Knoſpe verzehrt.“ Später reichte ihnen der Vogelwirth Diſteln, die mit ſchwarzen Blattläuſen bedeckt waren und fütterte ſie wochenlang mit den grünen Afterraupen der Stachelberweſpe. Trotzdem der Hakengimpel ein hochnordiſcher Vogel iſt, kann er im Nothfall (im Winter im geheizten Zimmer) hohe Temperatur vertragen. (Fortſetzung folgt.)

Zur Frage der Uebertragung von Papageienkrankheiten auf Menſchen.

Von F. Fleiſchmann.

(Schluß ſtatt Fortſetzung).

Damit war aber die Sache noch nicht erledigt. In Nr. 548 desſelben Blattes vom 27. XI. kam die entgegengeſetzte Meinung wieder zum Ausdruck, die folgendermaßen lautete:

> Von Papageien angeſteckt. Mit Bezug auf die im Morgenblatt vom 22. November gebrachte Notiz über die Uebertragungsfähigkeit von Vogelkrankheiten auf Menſchen und umgekehrt, wird uns vom hieſigen ornithologiſchen Verein, in dem dieſes Thema ſchon öfter zur Sprache kam, Folgendes mitgetheilt: „Das aus einem Werke von Dr. Ruß angeführte Zitat, das die Unmöglichkeit der Anſteckung darlegen ſoll, iſt keineswegs als beweiſend anzuſehen; hier können nur die Ergebniſſe der neueſten Forſchungen auf dieſem Gebiet, beſonders experimentelle kliniſche Unterſuchungen den nöthigen Aufſchluß geben. Wenn bei der Pflege kranker Vögel Niemand im Hauſe erkrankt, ſo iſt damit kein Gegenbeweis der Uebertragungsfähigkeit erbracht. Es ſind in der Litteratur viele Fälle bekannt, wo Krankheiten von Menſchen auf Vögel übergingen und umgekehrt. So iſt z. B. die Tuberkuloſe des Menſchen ſehr leicht auf Vögel, beſonders Papageien, übertragbar und ſchon öfter durch Vorkauen von Biſſen thatſächlich übertragen worden. Der Vogeltuberkuloſe-Bazillus wächſt auf gleichen Nährböden, wie der des Menſchen, läßt ſich nach gleicher Methode färben und liefert ebenſo wirkſames Tuberkulin. Bei der Uebertragung auf den Vogel muß ſich nur das Kleinlebeweſen der höheren Eigentemperatur des Vogels anpaſſen. Von Profeſſor Nocard, dem franzöſiſchen Forſcher auf dieſem Gebiet, wurde auch experimentell nachgewieſen, daß ſich die Vogeltuberkuloſe auf Säugethiere übertragen läßt, warum ſollte dies beim Menſchen, in Sonderheit bei Kindern, nicht der Fall ſein können? Es handelt ſich hier allerdings wie bei allen Infektionskrankheiten, einmal um die individuelle Reſiſtenz des betreffenden Organismus (Dispoſition) und dann um die jeweilige Virulenz des Anſteckungsſtoffs. Durch Ignorirung oder Anzweiflung wiſſenſchaftlicher Forſchungsreſultate dürfte weder den Vogelhaltern noch den Pfleg-

> lingen ſelbſt ein Dienſt erwieſen werden. Thatſachen, die zudem auch durch mehrfache Beobachtungen von Seite erfahrener Züchter Beſtätigung gefunden haben, können nicht einfach durch die in dieſer Richtung gemachten Erfahrungen von Dr. Ruß aus der Welt geſchafft werden.“

Die Einleitung dieſes Artikels iſt jedenfalls dahin aufzufaſſen, daß nicht der Ornithologiſche Verein München als ſolcher, ſondern nur ein Mitglied deſſelben als Einſender deſſelben und Verfechter der darin aufgeſtellten Behauptungen zu gelten hat.

In der neueren Litteratur erſcheinen allerdings Fälle, die von Krankheitsübertragungen von Menſchen auf Vögel ſprechen, das ſoll hier nicht beſtritten werden; umgekehrt aber iſt bis jetzt noch kein einziger thatſächlicher Beweis der Uebertragung einer Krankheit von Papageien bzl. Vögeln auf Menſchen in der Litteratur zu finden. Nur Hypotheſen und „kliniſche Experimente“, die ſich aber zur Praxis, und auf die kommt es doch an, verhalten, wie Dichtung zur Wahrheit. In der Nummer 45 der „Münchener Mediziniſchen Wochenſchrift“ 1896, S. 1122 wird über eine Sitzung der Académie de Médecine zu Paris vom 20. Oktober 1896 berichtet, in welcher derartige Experimente zur Sprache kamen. Man hat ſogar einen eigenen Namen für eine angeblich von Papageien übertragene Krankheit gefunden: „Psittacosis“ (Papageienkrankheit), und will darunter eine ſpezifiſche Krankheit verſtanden wiſſen, „welche direkt vom Papagei auf den Menſchen übertragen wird und kliniſch ähnlich einer typhöſen Septichämie verläuft.“ Im Anſchluß an eine derartige Familienepidemie (wahrſcheinlich dieſelbe, von welcher oben die Rede war) machten Gilbert und L. Fournier bakteriologiſche Studien und fanden in den Eingeweiden und im Knochenmark eines der Krankheit erlegenen Papageis — ich zitire wörtlich nach genannter Zeitſchrift — und im Herzblut einer an Psittacosis verſtorbenen (?) Frau einen dem Eberth'ſchen durch gewiſſe Eigenſchaften ähnlichen Bazillus. Derſelbe unterſcheidet ſich jedoch von dem Typhuserreger durch das Ausſehen ſeiner Kulturen auf Gelatine und Kartoffeln und beſonders durch ſeine Virulenz nicht nur für Papageien, ſondern auch für Verſuchsthiere, wie Mäuſe, Meerſchweinchen, Kaninchen, Tauben. Mit einer erſchreckenden Leichtigkeit auf den Menſchen übertragbar (wie erwieſen?) „halten“ die Unterſucher die Krankheit für weit häufiger als gewöhnlich angenommen wird und „glauben“ (nicht beweiſen!), daß ſie mit anderen Infektionskrankheiten verwechſelt werde. . . . Als prophylaktiſche Maßregeln ergeben ſich von ſelbſt: Ueberwachung der Papageienſendungen, Inſtruktionen für die Händler und die Papageienbeſitzer inbezug auf krankhafte Erſcheinungen bei dieſen Thieren.



Seidenreiher (Ardea garzetta, *L.*)
Schwarzer Storch (Ciconia nigra, *L.*)
Weißer Storch (C. alba, *Schäff.*)

Man ſieht nur Vermuthungen, nur „halten“ und „glauben“, keine erwieſenen, vollwichtigen Thatſachen! Das Zuſammentreffen deſſelben Bazillus in einem verendeten Papagei und im Herzblut einer an „Psittacosis“ verſtorbenen Frau kann doch unmöglich hierfür ausgeſchlachtet werden, und wenn — kann nicht die Anſteckung von der Frau ausgegangen und auf den Vogel übergegangen ſein, ſtatt umgekehrt? Uebrigens iſt erwieſen, daß verſchiedene Bazillen, die als ſpezifiſche Krankheitserreger erklärt ſind, z. B. der Löffler'ſche Diphtheriebazillus, der Tuberkuloſebazillus u. a., ſich auch gelegentlich bei anderen Krankheiten zeigen, warum nicht auch der neue Psittacosis-Bazillus? Die franzöſiſchen Forſcher fordern neben einer Ueberwachung der Papageienſendungen auch Inſtruktionen für die Händler. Nun iſt aber gerade bei dieſen noch niemals eine Anſteckung vorgekommen, obwol gerade, wenn eine ſolche möglich wäre, ſie in erſter Linie betroffen werden könnten. Wieder iſt es Dr. Ruß, deſſen Autorität hier angerufen werden kann: Er erließ, „um ſeiner Sache ganz ſicher zu ſein, bei beſonderen Gelegenheiten, wenn die großen Händler

Digitized by Google

kranke Vögel in bedeutender Anzahl empfangen hatten, wenn alſo unter irgend welchen Beſtänden von Vögeln Typhus oder Cholera, Diphtherie, Sepſis oder eine andere Krankheit herrſchte, ſtets Anfragen, aber niemals hat ein einziger der Händler von irgend welcher Anſteckung und Erkrankung von Menſchen, alſo ſeiner Angehörigen oder ſeines Dienſtperſonals, berichten können,“ und ohne daß prophylaktiſche Maßregeln getroffen waren. Die Meinung dieſer beiden franzöſiſchen Forſcher bleibt alſo nichts als Hypotheſe.

Doch nun zurück zum genannten Artikel. Auch dieſer zitirt wiederum einen franzöſiſchen Forſcher: Nocard, der „experimentell nachgewieſen hat, daß ſich die Vogeltuberkuloſe auf Säugethiere übertragen läßt.“ Das ſei wiederum nicht beſtritten, aber die Folgerung daraus: „warum ſollte dies beim Menſchen, inſonderheit bei Kindern, nicht der Fall ſein können,“ ſcheint irrig zu ſein. Denn das Thierexperiment, die „künſtliche“ Uebertragung einer Krankheit auf Thiere. wie Mäuſe, Kaninchen u. a., zwingt doch nicht beweiskräftig zur Annahme einer natürlichen Anſteckung des Menſchen. Nocard ſcheint viele Experimente, das heißt ſogenannte Thierverſuche — denen überhaupt nicht nur zahlreiche Laien, ſondern auch viele Aerzte ſehr ſkeptiſch gegenüberſtehen — gemacht zu haben, aber daß er nur einen einzigen thatſächlichen Fall einer Krankheitsübertragung vom Papagei auf den Menſchen berichtet, das ſteht in dem angezogenen Artikel nicht. Und das iſt die Hauptſache. Alles Vermuthen und alles Experimentiren vermag die Vogelliebhaber und -Pfleger nicht zu überzeugen, das könnten nur einmal wirklich erwieſene Fälle, die einer gründlichen, wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Kritik Stand hielten.

Die Unterſuchungen zahlreicher Gelehrten haben dagegen ergeben, daß jede Thiergattung ſich Giften und Anſteckungen gegenüber anders verhält, daß man nicht einmal von Vogel auf Vogel ſchließen darf; um wieviel weniger iſt der Rückſchluß vom Thier bzl. Vogel auf den Menſchen zutreffend! In der Zeitſchrift „Zukunft“, Jhrg. 1896, läßt ſich ein hervorragender Arzt (Dr. Aſch) gelegentlich der Diphtheriefrage alſo vernehmen: „. . . Man laſſe ſich durch die Thierexperimente nicht täuſchen, denn das künſtliche Hervorrufen von Krankheiten geſchieht unter ganz anderen Bedingungen, als unter den in der Natur herrſchenden, ſodaß alle hierauf bezüglichen Schlußfolgerungen ohne Werth für die im menſchlichen Körper ſich abſpielenden Prozeſſe ſind.“ Das ſind Worte eines deutſchen Gelehrten, die uns ungleich vernünftiger dünken als jene Aufſtellungen franzöſiſcher Forſcher.

Wenn der angezogene Artikel ſchließlich die mehr als dreißigjährigen, höchſt verdienſtvollen Unterſuchungen und Erfahrungen Dr. Ruß’ mit ein par Worten abzuthun glaubt, ſo wird er ſicherlich die übergroße Mehrzahl der Vogelliebhaber und „erfahrenen Züchter“, auf welche er ſich, wol mit Unrecht, beruft, nicht auf ſeiner Seite haben. Denn wenn eine Krankheitsübertragung vom Vogel auf den Menſchen ſo leicht möglich wäre, müßten ſowol Dr. Ruß’ Unterſuchungen ſelbſt, ſowie jene der von anderen Gelehrten und bedeutenden Medizinern auf ſeinen Wunſch unternommenen doch einmal dieſelbe haben konſtatiren können. Warum iſt denn bis jetzt auf deutſchem Boden ein ſolcher Fall nicht zu konſtatiren geweſen, nur immer in Frankreich oder Italien? Wahrſcheinlich weil vor der deutſchen Gründlichkeit und gewiſſenhaften wiſſenſchaftlichen Kritik derartige Mären keinen Boden gewinnen können. Wie ſchnell wurde z. B. der Fall in Kreuzlingen als Schwindel charakteriſirt!*)

Uebrigens wurden derartige Papageiengeſchichten früher meiſt als das genommen, was ſie ſind: als Zeitungsenten; brachten ſie doch ſelbſt einzelne Zeitungen unter dem Titel „Papageienulk“. Erſt als vor zwei Jahren Dr. Eberlein von der Berliner Thierklinik mit ſeiner „Warnung“ kam, die jedoch Dr. Ruß ſcharf abfertigte, wurde die Sache ernſter, und es iſt Zeit, daß einmal eine authentiſche Löſung der Streitfrage erfolge.

Gibt man die Uebertragbarkeit einer Krankheit von Papageien auf Menſchen zu, ſo muß man dies logiſcherweiſe bei allen Stubenvögeln zugeben. Welch’ unerquickliche Perſpektive! Dann hätten, wie ich ſchon in einem diesbezüglichen Aufſatz in der vortrefflichen Zeitſchrift „Mutter-Erde“ ausgeführt, tauſende von Familien fortwährend eine drohende Anſteckungsquelle unter ſich, tauſende von Vogelpflegern hätten ſich immerdar einer Infektion durch ihre kranken Pfleglinge zu verſehen, ja die edle, über alle Maßen ſchöne Liebhaberei müßte zu einer Gefahr für Geſundheit und Leben werden! Denn welcher Vogelliebhaber und -Züchter wüßte nicht von Krankheiten und Seuchen unter ſeinen Lieblingen zu berichten? Man leſe z. B. nur die Anfragen und Auskünfte in den betreffenden Zeitſchriften, um einen geringen Begriff von dieſer die Liebhaberei ſo erſchwerenden Kalamität zu bekommen. Und welche ſcheußlichen und anſteckenden Krankheiten ſind darunter, die die Vogelbeſtände ſchon dezimirten! Vor drei Jahren brach unter meinen Vögeln urplötzlich eine Seuche aus, die mir einen um den andern Vogel hinwegraffte. Beim Aufſtehen morgens, beim jeweiligen Nachhauſekommen, immer fand ich einen oder mehrere tot auf dem Käfigboden. Nach Einſendung zweier Vogelleichen konſtatirte Dr. Ruß einen Unterleibstyphus; den Reſt der Ueberlebenden vermochte ich nach ſeinen Angaben zu retten. Solche und ähnliche Vorkommniſſe weiß jeder Liebhaber, auch wenn er nur einen oder etliche Vögel ſein Eigen nennt, zu berichten. Und da ſollen wir einer Anſteckung ausgeſetzt ſein?

Nun ſagen die Verfechter der Uebertragungstheorie freilich, das gelte nur von Papageien, weil ſie große Vögel ſind, bei den kleinen ſei das nicht möglich. Aber ich glaube, Dutzende und noch mehr kleinere Käfiginſaſſen wiegen doch einen Papagei auf, und was den „intimen Verkehr“ betrifft, den man mit Papageien pflegt, und der hauptſächlich als Grund herhalten muß, ſo läßt ſich dieſer auch vielfach mit kleinen Vögeln, wie Kanarienvögeln und anderen einheimiſchen Sängern, nachweiſen. Der „intime Verkehr“ beſteht meiſt in Streicheln und Krauen des Gefieders, auch im Hinwegnehmen von Biſſen aus dem Mund oder in ſeltenen Fällen im Küſſen. Das alles kommt aber auch bei kleineren Vögeln vor, wie man ja ſehr häufig zu beobachten Gelegenheit hat. Insbeſondere iſt der Verkehr vogelfreundlicher Damen mit Wellenſittichen, Kanarienvögeln, Dompfaffen, Zeiſigen, Stiglitzen, Rothkehlchen u. a. vielfach auch „intim“ zu nennen, laſſen ſich manche doch ſogar Zuckerſtücke von ihren kleinen Freunden aus dem Mund nehmen und führen ihr Köpfchen zum Mund! Würden dann ferner die maſſenhaften Entleerungen zahlreicher kranker Vögel ihre Ausdünſtung u. a. weniger gefährlich ſein, als der Verkehr mit einem kranken Papagei? Könnten nicht gerade hierdurch die Bazillen mit Leichtigkeit unter den Zimmerſtaub und ſo zu den Organen der Menſchen kommen?

---

*) Auch in Köln wurde in neueſter Zeit kein Beweis der Uebertragung geliefert.

Man ſieht, die Anſteckungsmöglichkeit wäre bei den kleinen Vögeln, wenigſtens beim Halten von mehreren derſelben, gerade ſo gegeben wie bei den großen, den Papageien. Mache einmal einer der Gelehrten das „Experiment“ und übertrage die Bazillen eines tuberkulöſen Kanarienvogels auf die gleichen Nährböden wie jene eines ſolchen Papageis, er würde wahrſcheinlich den gleichen Effekt erzielen. Keineswegs wäre aber damit die Uebertragbarkeit auf Menſchen erwieſen.

Doch nun genug der Worte. Nach alledem ſteht die Behauptung Dr. Ruß' noch immer voll zu Recht, daß noch niemals der Nachweis geführt worden iſt, daß ein Menſch von einem Papagei mit irgendeiner Krankheit angeſteckt wurde.

Beobachtungen aus der freilebenden Vogelwelt.

Aus dem Sauerlande.

Von W. Hennemann, Lehrer.

Der Frühling iſt wiedergekehrt, und die befiederten Sänger ſind jetzt größtentheils aus ihren fernen Winterherbergen in die heimiſchen Berge zurückgekehrt. Höher und höher in die Lüfte ſteigend, ſchmettert die Lerche wieder ihre herrlichen Triller; vom Baum herab, in der Nähe ſeines alten Niſtkaſtens ſitzend, der bereits vollzählige Gelege enthält, vernehmen wir wieder das Pfeifen und Schwätzen des Stars, und auch die Schwalbe, des Landmanns Hausgenoſſe, zwiſchert vom Giebel des Bauernhauſes herab wieder ihr einfach trauliches Liedchen. Mit dem Erſcheinen dieſer allbekannten Lenzesboten, ihrer Brutzeit u. drgl. ſind die Bewohner unſerer heimiſchen Dörfer und Gehöfte recht vertraut, wie denn auch das Eintreffen der Bachſtelzen und Rothſchwänzchen, welche gleich den Schwalben zu beſonderen Freunden des Menſchen geworden ſind, die ſeine Nähe aufſuchen und ſeine Wohnſtätten gern auch zu den ihrigen erwählen, dem beobachtenden Sinn der Landbevölkerung nicht entgeht. Der volksthümlichſte unter den Verkündern der wonnigen Lenzeszeit aber iſt auch für unſre Gegend der Kuckuck, deſſen Ruf — all das Jubeln und Frohlocken der heimgekehrten Sängerſcharen übertönend — von Alt und Jung mit dem Gefühl herzinniger Freude vernommen wird. Auch er iſt zurückgekehrt, und laut und vernehmlich erſchallt ſein melodiſcher Ruf wieder durch die Wälder!

Bevor ich dem geneigten Leſer meine Beobachtungen über das diesjährige Eintreffen der genannten und anderer Arten mittheile, ſei noch der verfloſſenen Herbſt- und Wintermonate gedacht, in welchen ſich in unſrer Gebirgsgegend ein recht reges Vogelleben zeigte, das Erſcheinungen bot, die ich des Aufzeichnens werth erachtete.

Das prächtige Herbſtwetter hielt bis tief in den November hinein an und ermöglichte zahlreiche Wanderungen. Vor allem wandte ich mich den Buchenwaldungen zu, Ausſchau zu halten nach dem Tannenheher (Corvus caryocatactes, *L.*), den man am 24. Oktober — wie bereits in Nr. 46 v. J. mitgetheilt — in hieſiger Gegend beobachtet hatte. Niemals aber habe ich den braunen Geſellen angetroffen, auch nicht von diesbezüglichen Beobachtungen anderer gehört, und ſomit handelt es ſich bei dem damals mitgetheilten Fall wol um einen ganz vereinzelt hergewanderten Flug dieſer Vögel. Umſo zahlreicher dagegen begegnete ich unſrer heimiſchen Heherart, dem Eichelheher (C. glandarius, *L.*), ſowol in den Buchenwäldern als auch in den Feldgehölzen, welch letztere namentlich zu der genannten Zeit nach Berenfrüchten abgeſucht werden. An einem ſonnigen, in der Nähe unſers Dorfs gelegenen Berghang habe ich öfter ein bis zwei Dutzend Heher aufgetrieben. Es wäre gewiß geboten, ſie zu Nutz und Frommen der Singvögel zu zehnten; keineswegs jedoch ſoll hiermit die Ausrottung der intereſſanten bunten Geſellen, die zur Belebung unſerer Wälder weſentlich beitragen und auch durch Vertilgen von Mäuſen, Raupen u. a. uns einigen Nutzen erzeigen, befürwortet ſein, wie denn überhaupt keine Thierart ohne jegliche Bedeutung im Naturhaushalt iſt und völlig der Aechtung preisgegeben werden darf. Wer Gelegenheit gehabt hat, den muntern, klugen Vogel in ſeinem Gebahren zu beobachten, wenn er z. B. Eicheln im Erdboden verſteckt oder wenn er bei guter Laune Thierſtimmen nachahmt, wird gewiß Freude an ihm haben und ihn nicht gänzlich miſſen wollen.

In großen Schwärmen ſtellten ſich im Lauf des Novembers im Lennethal Dompfaffen ein, wol angelockt durch die reichen Mengen der Berenfrüchte. Auf den über und über mit ſchwarzen Früchten bedeckten Hollunderſträuchern an Abhängen, Feld- und Waldrändern u. a. und auf den zahlreich an unſeren Landſtraßen ſtehenden Ebereſchen waren oftmals Schwärme von 20 bis 30 Köpfen, darunter auch Flüge der größeren nordiſchen Art, anzutreffen. Neben den rothbrüſtigen Vögeln thaten ſich auch zahlreiche Schwarzdroſſeln an den ſaftigen Beren gütlich, zumeiſt aus nördlicheren Gegenden zugewanderte Gäſte; denn obgleich man ſchon zur Sommerzeit häufig Schwarzdroſſeln in den Dorfgärten antrifft, ſind ſie doch dem Menſchen gegenüber ſtets ſcheu und vorſichtig, was bei den zur Herbſt- und Winterszeit in unſeren Bergen weilenden weniger zutrifft.

Von dieſen zugewanderten, harmloſen Vögeln werden wintersüber in den Dorfgärten manche für die Liebhaberei der Leute gefangen, denn beide, bei uns auch als Brutvögel vorkommenden Arten, die Schwarz- und Graudroſſel, im Plattdeutſchen als ſchwarze und graue „Gietlinge“ oder „Geitlinge“ angeſprochen, ſind ihres vorzüglichen Geſangs wegen als Stubenvogel beliebt.

Am 22. November trat der erſte Schneefall in unſeren Bergen ein, doch folgte bald Regenwetter, bis in der Nacht vom 20. zum 21. Dezember ſich der erſte Froſt einſtellte und bald größere Schneemaſſen fielen. Das über Weihnachten anhaltende ſtrenge Winterwetter ließ manche Dohlenſchwärme aus der Gegend ſcheiden, doch blieben die meiſten Völklein zurück. Auch ſpäterhin hielten ſie gegen die Unbilden der Witterung Stand und trugen zur Belebung der Thäler, namentlich in verſchneiter, winterlicher Landſchaft, ſehr bei.

Es kam das neue Jahr, und der Januar brachte an ſeinem zweiten Tage, nach vorherrſchendem Regen der letzten Zeit, wieder Schneefall. An dieſem Tage weilten nordiſche Vögel bei uns. Aus einem Gehölz in der Nähe des Dorfs vernahm ich nachmittags eigenartige, pfeifende und trillernde Töne, welche ſogleich die Vermuthung in mir aufkommen ließen, Wintergäſte vor mir zu haben. Infolge des Nebels, welcher ſchon im Thal lagerte, vermochte ich jedoch die im Geäſt ſitzenden Vögel nicht ſogleich zu erkennen, ſah ſie aber alsbald genau, nachdem einige über ihnen kreiſende Krähen ſich unter lautem Gekrächz auf die Bäume herabließen und die Fremdlinge aufſcheuchten. Unter ſchrillem Pfeifen ſtürzten ſich die etwa ſtargroßen Vögel, acht bis zehn an der Zahl, in denen ich jetzt deutlich Seidenſchwänze (Ampelis garrulus, *L.*) erkannte, in’s bergende Geſtrüpp. Seit dieſem Tage iſt mir keiner der hübſchen Vögel wieder zu Geſicht gekommen.

An den folgenden Tagen herrſchte milderes Wetter mit warmen Sonnenblicken, bis am Abend des 12. Januar ein fürchterliches Sturmwetter hereinbrach. Der Regen fiel in Strömen, Blitze durchzuckten die Luft, und die ſchauerlich heulenden Stürme tobten die ganze Nacht hindurch und legten ſich erſt am folgenden Tag gegen Mittag. So ſehr ſchon war die Lenne angeſchwollen, daß, wenn die heftigen Regengüſſe noch ein Par Stunden andauerten, die älteren Theile mancher Lennedörfer, welche als ehemalige Fiſcherwohnungen meiſt dicht an ihrem Ufer erbaut ſind, durch das Hochwaſſer bedenklich gefährdet worden wären. Zahlreicher ſtellten ſich die Rabenkrähen auf den Uferwieſen ein, und Krickenten (Anas crecca, *L.*) waren häufiger in nächſter Nähe der Häuſer auf dem Gewäſſer zu ſehen. Einige in der Nähe des Dorfs gelegene Teiche waren ausgetreten und ſtanden unter einem Brückenbogen mit dem Fluſſe in Verbindung. Müßig an dieſer Stelle einigen Reuſen auslegenden Burſchen zuſchauend, ſah ich plötzlich zwei über die ausgedehnte Waſſerfläche in pfeilſchnellem, ſchnurrendem Fluge dahineilende Eisvögel (Alcedo ispida, *L.*), denen ich fortan meine Aufmerkſamkeit zuwandte. Der eine dieſer herrlich ſchönen Vögel ließ ſich auf einem Uferpfahl nieder, um von dort aus nach Beute auszuſpähen, der andre kam, nachdem die Burſchen ſich entfernt hatten, zur Brücke geflogen, ſetzte ſich auf den Mauerrand und begann ſogleich zu fiſchen. Hinter einigen im Garten eines naheliegenden Häuschen aufgeſchichteten Reiſigbündeln ſtehend, konnte ich den ſcheuen Fiſcher trefflich beobachten, wie er ſich ins rauſchende Waſſer ſtürzte und manch’ Fiſchlein herauftrug. Höchſt intereſſant war es, zu beobachten, wie ſein ſcharfes Auge oft auf eine Entfernung von 8 bis 10 m in den trüben Fluten die winzigen Fiſchchen entdeckte.

Nach dem Sturmwetter folgte in der zweiten Hälfte des Januars mildes, öfter warmes Wetter. Ueberall ſtellten ſich jetzt Stare in kleineren Trupps ein und ließen ihren pfeifenden, ſchwirrenden Geſang von den höchſten Spitzen der Bäume herab vernehmen. Für unſere Gegend iſt der Star Zugvogel; ſeit Ende Oktober war er bis zur genannten Zeit in fremden Quartieren. Auf den zahlreichen Wanderungen während der vorwiegend milden Wintermonate habe ich oft geſchützte Thäler, Gebiete mit dichtem Strauchwerk u. drgl. berührt, aber nirgends iſt mir, ſo ſehr ich ſtets mein Augenmerk der Thierwelt zuwende, auch nur ein einziger Star zu Geſicht gekommen. Wäre er Strichvogel, ſo würde er ſich bei den nach ſeiner Rückkehr noch wiederholt eingetretenen Kälteperioden wieder ſüdwärts gewandt haben — aber er blieb fortan hier. Auch in früheren milden Wintern habe ich niemals Stare beobachten können, ebenſowenig von Beobachtungen anderer gehört.

Am 24. Januar trat wieder Schneefall und Kälte ein und bald waren die ſtehenden Gewäſſer mit einer dicken Eisdecke überzogen, ſo daß am 29. bereits an verſchiedenen Stellen mit der Eisabfuhr begonnen wurde. Zu dieſer Zeit waren öfter Gebirgsſtelzen (Motacilla sulphurea, *B.*) im Lennethal zu ſehen, jedenfalls an den Bergbächen zurückgebliebene Vögel, welche infolge Nahrungsmangels dieſe verlaſſen hatten, um hier ihren Lebensunterhalt zu ſuchen. Sie haben gleich den Staren und manchen anderen während dieſer Zeit ein recht kümmerliches Daſein gefriſtet.

(Schluß folgt.)

* * *

Plauderei von meiner Nordlandreiſe.

Von Joſef Wagner.

(Schluß).

II. Unſere Singvögel bei Hammerfeſt.

Hammerfeſt iſt die nördlichſte Stadt von Europa (unterm 70° 40′ 11″ nördlicher Breite gelegen), mit 2200 Einwohnern, mit nur aus Holz gebauten Häuſern. Die Häuſer des ſüdlichen Stadttheils, welcher vor mehreren Jahren abbrannte, ſind der Neuzeit entſprechend.

In der Zeit vom 13. Mai bis zum 29. Juli geht bei Hammerfeſt die Sonne nicht unter und in der Zeit vom 18. November bis zum 23. Januar nicht auf; die Sonne ſcheint dann gar nicht, und die Stadt wird elektriſch beleuchtet.

Die Fiſcher gehen von hier aus bis nach Spitzbergen und dem Kariſchen Meer, um ihre Beute zu holen; der Fiſchfang wird da großartig betrieben. Tauſende von Fiſchen ſieht man im Freien in der Sonne an Holzrahmen und Geſtellen zum Trocknen aufgehängt.

Land gibt es bei Hammerfeſt nicht mehr, nur dicht an den kleinen Seen findet man einige grüne Raſenſtellen, welche ſchon der kalten Temperatur wegen nicht mehr zu bebauen ſind, da doch nichts gedeihen könnte.

Die langgeſtreckten Höhenzüge, welche ſich in der Nähe der Stadt hinziehen und welche leicht zu erreichen ſind, ſind nur Karſt und Felſen. Der ſchönen Ausſicht halber beſtieg ich dieſe Höhen, wo nichts weiter wie Steine lagen, zwiſchen denen vereinzelt kleinblättrige Kräuter emporſproſſen, welche von Weitem nicht zu bemerken waren. Ich hatte eine herrliche Ausſicht über das ſchäumende Meer, welche mir unvergeßlich bleiben wird. Aber öde zeigte ſich im Anfang unſer Vogelleben (abgeſehen von den Tauſenden von Möven), da weder Bäume noch Gärten bei den Häuſern ſind.

Ich unternahm dann einen dreiſtündigen Aufſtieg nach den Diewen bei ſchönem klarem Wetter. Auf dieſer Tour begegnete ich einer Renthierherde von etwa hundert Stück, welche ohne jegliche Beaufſichtigung war. Ueberhaupt ſah ich weit und breit kein menſchliches Weſen. Die genannten Rennthiere befanden ſich in einer Thalmulde, wo ſie vor kaltem Wind geſchützt waren. Ich fand auch ein verwettertes Geweih, welches vielleicht abgebrochen oder abgeſtoßen ſein dürfte. Die Rennthiere ernähren ſich ſchon bei der allergeringſten Vegetation, denn wo ſie weideten, waren die Steine mit Mos bedeckt und wenig Pflanzenwuchs. Oede und ſtill ſah es da oben auf dem ſteinigen Karſt und Felſengebirge aus. In weiterer Entfernung in ſüdöſtlicher Richtung ſtanden einige kleine ganz verkümmerte Zwergbirken. Man konnte genau erkennen, daß die Bäumchen den Winter über mehr als einen Meter hoch mit dem Stamm im Schnee geſtanden hatten; die Knoſpen brachen erſt auf, und es gab noch kaum einen grünen Schimmer. Dort hörte ich drei Fitislaubvögel mit ihrem „Dibl dibl dibl, thei thei thei, da da da“. Es waren drei Pärchen, deren Brutgeſchäft vorbei, nebenbei noch einige Schneeammern, welche wiederholt ihren Geſang „Ziblj dä, ziblj dä, ziblj dä“ hören ließen, ſowie zwei Pärchen Singdroſſeln; von letzteren hörte ich jedoch nur immer das Geſchrei wie „Täk täk täk, Tekt ekt ekt ek“. Außerdem vernahm ich, wenn ich mich nicht getäuſcht haben ſollte, einen Schneefink. Dies war das geſammte Singvogelleben, welches ich bei der nördlichſten Stadt Europas beobachten konnte; dagegen umſchwärmten fortwährend ungeheure Scharen von Seemöven die Stadt und die Felſen.

Gegen 2 Uhr nachmittags beſtieg ich wieder ein Dampfbot, und die Fahrt ging weiter hinaus in das Eismeer mit größter Spannung dem ſchon lange erſehnten Nordkap zu.

Das Wetter war herrlich, die Sonne ſchien warm und Seemöven gaben uns zu Tauſenden das Geleit. Nach längerer Zeit verhüllte ſich die Sonne und Sturm aus dem Eismeer brach herein; die Wellen wurden immer größer, die Temperatur ſank, und der kalte ſcharfe Wind machte erſchauern. Ich ſtand auf Deck an der vorderen Spitze des Schiffes, hinausſchauend auf die erregten und ſchäumenden Waſſermaſſen.

Aus der ſchäumenden Meerestiefe ſtieg plötzlich eine keilförmige, dunkle Geſtalt; anfangs glaubte ich, ich wär im Traum, aber nein, es war das Nordkap, ſchwarz und kalt. Es war gegen 10 Uhr abends, als wir am Nordkap (unter dem 71° 10′ 40″ nördlicher Breite) anlangten und der Anker geworfen wurde; die Wellen gingen immer noch hoch, trotzdem wünſchten wir ausgebotet zu werden, was auch geſchah.

Auf ſchlechten, vom Schneewaſſer ausgeſpülten Wegen kletterten wir eine Stunde lang hinauf, vom Nebel und Sturm begleitet. Oben auf dem Plateau mußte ich mir als erſter bei niedergeriſſenen Drahtſeilen und umgebrochenen Holzpfählen im Nebel den Weg ſuchen, obwol wir Schiffsmannſchaft bei uns hatten. So gelangten wir in 25 Minuten weiter zum hölzernen Pavillon, woſelbſt man ſich für acht bis zehn Kronen durch eine Flaſche Sekt ſtärken kann.

Der Aufenthalt dauerte an zwei Stunden, und das Wetter klärte ſich glücklicherweiſe noch etwas auf, ſodaß wir an zehn Minuten lang die Mitternachtsſonne ſahen, und uns an einem Ausblick auf das Eismeer von unſerm ziemlich 300 Meter hohen Standpunkt aus erfreuten.

Hieraus können die geehrten Leſer erſehen, daß unſer kleiner Fitislaubvogel, welcher immer noch etwas ſchwer im Käfig zu überwintern iſt, bis in das rauheſte Klima und wo die letzten Menſchen ihr Heim im Norden aufgeſchlagen haben, ſich als Brutvogel heimiſch fühlt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn V. P. St.: 1. Die Schamadroſſel iſt an der ganzen Oberſeite ſchwarz, Kopf und Rücken ſind ſtahlblau glänzend, mit weißem Bürzel und ebenſolchen oberſeitigen Schwanzdecken und mit beſonders auffallender weißer Einfaſſung des Schwanzes; an der ganzen Unterſeite iſt ſie bräunlichgelbroth. 2. In der Größe gleicht ſie den europäiſchen Droſſeln oder ſie iſt doch nur ein wenig kleiner, aber bei weitem ſchlanker. 3. Der Geſang der Schamadroſſel läßt ſich nicht ohne weiteres mit dem einer andern Art vergleichen. Sie hat ein ſehr mannigfaltiges, reichhaltiges Lied, das zwar in einzelnen Touren an die Weiſen anderer Sänger erinnert, aber im großen und ganzen ein Originalgeſang bleibt. Sie iſt eine der hervorragendſten Sängerinnen, die es gibt.

Fräulein Bertha Holtz: Beſpritzen Sie Ihren Kakadu täglich, nachdem Sie ihn in die Nähe des warmen Ofens gebracht, mittelſt des Rafraichiſſeurs an allen kahlen Stellen des Körpers tüchtig mit einer Miſchung von lauwarmem Waſſer und Rum oder Cognak. Hierauf müſſen Sie ſeinen Käfig ſorgfältig verhüllen und ihn eine Stunde lang ſo ſtehen laſſen. Dann erſt rücken Sie den Vogel vom Ofen fort und enthüllen ſeinen Käfig. Sollte dieſe Kur, mehrmals angewendet, nichts helfen, ſo müſſen Sie das von einem amerikaniſchen Liebhaber empfohlene Mittel gegen Selbſtrupfen anwenden. Es hat ſich zwar bei kleineren Vögeln nicht bewährt, doch bei derben Papageien, wie Kakadus, wird es ſchon wohlthätig wirken. Es beſteht aus gewöhnlichem Schweinefett mit Schießpulver gemiſcht; man nehme auf etwa ſoviel wie eine Pflaume groß Fett, zweimal ſoviel Schießpulver als man zwiſchen drei Fingern halten kann, miſche dies gut, ſo daß es wie eine dunkelgraue Salbe ausſieht und reibe den Vogel damit ein. Am beſten iſt es, wenn Sie den Vogel von jemand, der ſich wildlederne Handſchuhe angezogen, halten laſſen und dann das Einreiben ſelbſt beſorgen. Nehmen Sie die Einreibungen täglich vor, ſpülen ihn jede Woche zweimal mit lauwarmem Waſſer ab, trocknen ihn und reiben ihn dann wieder ein. Sobald Sie einigen Erfolg ſehen, hören Sie mit den Einreibungen auf und reiben nur dann ein, wenn er wieder zu der Untugend zurückkehren ſollte.

Herrn Forſtaſſeſſor Hildebrand: Sie hätten den Stieglitzen, die augenſcheinlich alle bereits krank in Ihren Beſitz gelangten, außer dem genannten Futter ein Gemiſch aus friſchen oder getrockneten, angequellten Ameiſenpuppen, geriebenem Eierbrot oder Eifutter (Ei mit geriebener Semmel und Möre zum krümeligen Gemenge angemacht) reichen müſſen.

Herrn Fritz Schneider: Bringen Sie zunächſt die beiden Vögel in zwei verſchiedenen Zimmern unter. Sodann beſchränken Sie die Fütterung jetzt auf Rübſen und Spitzſamen. Sollten ſie die Untugend noch fortſetzen, ſo bieten Sie ihnen etwas Sepia oder Kreide, zwiſchen das Gitter geſteckt. Vielleicht kann in dieſer Weiſe der unnatürliche Trieb abgelenkt werden.

Herrn E. Knaps: Der Vogel muß unterwegs im Verſandtkaſten getobt haben, iſt augenſcheinlich mit dem Kopf gegen die Decke gefahren und hat ſich dabei ſchwer beſchädigt. Die Beängſtigung, die ſich in ſeinem Weſen nach dem Einſetzen in die Voliere zeigte, war jedenfalls noch die Folge davon. An den Folgen der Verletzung iſt er dann eingegangen. Das eingeſandte Miſchfutter war gut.

Herrn Wilhelm Prehm: 1. Das Päppelfutter für Droſſeln beſteht in Weißbrot in Milch geweicht, abwechſelnd mit friſchem Quarkkäſe, gekochtem geriebenem Herz, alles gut durcheinander gemiſcht. Sehr bald können Sie ſie auch an Zugabe von Mehlwürmern, zerſchnittenen Regenwürmern und weichen Inſekten gewöhnen. 2. Gefüttert werden müſſen die Jungen ſo oft ſie ſperren, denn wenn man das Aufpäppeln übernimmt, darf man ſich die Mühe nicht verdrießen laſſen. Ihre Mittheilungen werden mir willkommen ſein.

Herrn E. Blankenburg: 1. Wir würden Ihnen unter dieſen Umſtänden nicht rathen, noch ein Par Wellenſittiche in die Vogelſtube zu laſſen. 2. Der Sonnenvogel (chineſiſche Nachtigal) zeigt ſich in der Regel nicht als ein ſolcher Uebelthäter. 3. Setzen Sie doch die Kanarien in einen beſondern Heckkäfig innerhalb der Vogelſtube. Dann vermeiden Sie dieſe Gefahr und können ohne Bedenken die Wellenſittiche in den Raum laſſen.

◆

Bücher- und Schriftenſchau.

Adolph Nehrkorn, Katalog der Eierſammlung.

Nebſt Beſchreibungen der außereuropäiſchen Eier. Mit 4 Eiertafeln in farbigem Steindruck. Braunſchweig. Harald Bruhn.

Nehrkorns Eierſammlung iſt die bedeutendſte in Deutſchland, die zweitgrößte der Welt; ſeit vielen Jahren hat der Beſitzer mit unermüdlichem Eier geſammelt und für ſich ſammeln laſſen, ſo von Dr. Platen auf den oſtindiſchen Inſeln, Dr. Hahnel in Venezuela, J. Moeller auf dem Himalaya und vielen anderen. Auch aus den Vogelſtuben unſerer Züchter ſind ihm infolge der Anregung des Herausgebers dieſes Blattes viele Gelege zugegangen. Auf mehrfachen Wunſch befreundeter Gelehrter hat Nehrkorn jetzt einen Katalog ſeiner Sammlung herausgegeben, der vielen Naturfreunden willkommen ſein wird Derſelbe enthält die Beſchreibung der Eier von 3546 Vogelarten, welche nach der neueſten Syſtematik aneinander gereiht ſind. Vier Tafeln mit 50 farbigen Abbildungen dienen zur Ergänzung und Erläuterung des Textes. Für jeden Naturfreund wird das Buch eine reiche Quelle der Belehrung ſein, zumal wenn er ſich dafür intereſſirt, wie mannigfaltig die Geſtaltungskraft der Natur auch auf dem Gebiet der Oologie (Eierkunde) iſt. Wir wünſchen Herrn Amtsrath Nehrkorn in Zukunft noch eine recht reiche und erfolgreiche Sammelthätigkeit. K. R.

◆

Zu unſerm Bilde.

Die heutige Abbildung bringt uns eine Darſtellung aus der heimiſchen Vogelwelt; die Vögel auf derſelben eignen ſich zwar nicht als Hausgenoſſen, doch intereſſiren ſich zweifellos alle Naturfreunde für ſie.

Der weiße Storch iſt allbekannt und beim Volk allbeliebt. Der in Flur und Feld umherſtreifende Vogel richtet unter den Erdniſtern argen Schaden an, dennoch will es der Landmann nimmer leiden, daß der kundige Jäger ihm nachſtellt, weiſt vielmehr darauf hin, daß Freund Adebar auch viel ſchädliches Gewürm vertilgt, und andererſeits ein unentbehrlicher Schmuck der Landſchaft, nach der Meinung weiter Volkskreiſe ſogar ein heiliger Vogel iſt. Man hat ihn übrigens auch in Volieren gehalten, wo er ſich als Allesfreſſer gut hält, aber großer Reinlichkeit bedarf. In der Jugend verletzte, ausgeheilte Störche werden leicht zahm und bilden eine Zierde für jeden Hof und Park.

Weiteren Volkskreiſen völlig unbekannt erſcheint der ſchwarze Storch; ſieht ihn der Beſucher des zoologiſchen Gartens, ſo weiß er in der Regel garnicht, daß er einen einheimiſchen Vogel vor ſich hat. Dies liegt darin begründet, daß der Schwarzſtorch einerſeits bei uns in Deutſchland ſelten iſt, andrerſeits im Gegenſatz zu ſeinen Verwandten die Nähe des Menſchen ſcheu meidet. Er ſiedelt ſich in ausgedehnten einſamen Hochwaldungen an und horſtet dort meiſt einzeln, ſelten geſellig; da er überwiegend Fiſchfreſſer iſt, ſo müſſen ſich fiſchreiche Gewäſſer in der Nähe befinden. Zur Haltung in der Voliere ſoll er ſich beſſer als der vorige eignen. Im Berliner zoologiſchen Garten beobachtete ich einen Kampf zwiſchen dem ſchwarzen und weißen Storch, wobei der letztere den kürzeren zog.

Der dritte Vogel unſeres Bildes iſt der Seidenreiher (*Ardea garzetta, L.*), in ſeinem blendend weißen Federkleid einer der ſchönſten unter ſeinen Verwandten. In Deutſchland kommt er nur ſelten vor, ſeine Heimat iſt das Gebiet der untern Donau, die Balkanhalbinſel, Südrußland, Weſtaſien und Oſtafrika Auf dem Zug geht er bis nach Innerafrika. Seine Brutplätze bilden ausgedehnte Sümpfe und Moräſte mit dichten Rohrwaldungen. Er gehört zu den zierlichſten aller Reiher und iſt behender und lebhafter als alle Verwandten. Er iſt ſehr geſellig, brütet in großen Kolonien mit Seinesgleichen und anderen Vögeln. Seine Nahrung beſteht hauptſächlich aus kleinen Fiſchen, doch auch anderem kleinem Waſſergethier. In zoologiſchen Gärten ſieht man ihn nicht ſelten und er bildet einen herrlichen Schmuck der großen Stelzvogelvolieren. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Käfige

für Sproſſer,

Nachtigalen und alle übrigen Weichfreſſer, wie ſie das gute Gedeihen dieſer edlen Vögel **unbedingt** erheiſchen, werden, ſoweit der Vorrath reicht, als **Muſter-Käfige** zu den üblichen Preiſen auch jetzt abgegeben, und deren **genaue Nachahmung** im Intereſſe der Vogelliebhaberei allen wirklich Sachverſtändigen empfohlen.

Mathias Rausch,
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der
[861] beſten Singvögel,
Wien VII 3, Schottenfeldgaſſe 95.

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [865]

Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[866] **R. Schröter,** Clingen-Greußen.

Futtermittel.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.

Muska, hochf. 98er, à Ko. 3½, à Ltr. 80 ₰.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 4½, à Ko. 8.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 4, 5 Ko. 19.

Biskuit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,60
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,—
do. algeriſche	„ „ „ „	2,—
do. indiſche	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	4,—

Oſſa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [867]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter
Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Geſetzl. geſchützt.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die
Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [868]
Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Geſetzl. geſchützt.

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter
für inländiſche und ausländiſche inſektenfreſſende Singvögel.

Nach dem Ableben meines Mannes habe ich die Anfertigung des von demſelben zuſammengeſtellten **Rheiniſchen Univerſal-Miſchfutters** dem Herrn **Ernst Hanke** in **Trier** a. M. übertragen, welcher dasſelbe unter dem Namen

Rheiniſches Univerſal-Miſchfutter
für inländiſche und ausländiſche inſektenfreſſende Singvögel von Apotheker
Max Kruel,

weiter verſenden wird.

Für das meinem ſel. Manne bisher bewieſene Wohlwollen ſpreche an dieſer Stelle der verehrl. Kundſchaft meinen wärmſten Dank aus und bitte ſolches auch auf ſeinen Nachfolger übertragen zu wollen.

Otterberg, Rheinpfalz, den 1. Mai 1899.
Hochachtend
Frau Apotheker Max Kruel.

Bezugnehmend auf obige Anzeige halte mich bei Bedarf von **Rheiniſchem Univerſal-Miſchfutter** angelegentlichſt empfohlen.

Das Rheiniſche Univerſal-Miſchfutter wird genau in der bisherigen Weiſe, wie von Herrn Apotheker **Max Kruel** zuſammengeſtellt, angefertigt werden.

Mein Beſtreben wird es ſein, mir ebenfalls das Vertrauen der verehrl. Kundſchaft durch prompte und ſorgfältige Lieferung zu erwerben. [869]

Trier, Moſel, den 1. Mai 1899.
Hochachtend
Ernst Hanke.

Mehlwürmer,

rein reell gemeſſen, nur prachtvolle große Futterwürmer, Ltr. 5,— ℳ, Kilo 8,— ℳ, 1000 Stck. 1,60 ℳ **Anweiſung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer** 30 ₰, **Ameiſeneier,** nur feinſte, ſtaubfreie Ware, pr. Ltr. 70 ₰, Kilo 3,—, 10 Ltr. 6,50 ℳ, **Weißwurm** feinſter Beſchaffenheit, Ltr. 80 ₰, **Vogelleim, Netzfallen, Neſter, Samen** u. a. Preisliſte poſtfrei. **Verpackung frei.** [870]

Theodor Frank, Barmen.

Sonnenblumenkerne,

per 5 Kilo 2,50 ℳ, per 50 Kilo 20,— ℳ
☛ **Ameiſeneier Ia,** ☚
per 5 Kilo 14,— ℳ, per Kilo 3,— ℳ
[871] **Sommerrübſen Ia, ſüß,**
per 5 Kilo 2,20 ℳ, per 50 Kilo 18,— ℳ
empfiehlt **Carl Kämpf, Mainz.**

Mehlwürmer,

ſtaubfrei, à Ltr. ℳ 4,50, Ko. ℳ 8, **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Ltr. 90 ₰, bei 10 Ltr. 85 ₰; 1 bei 5 Ltr. 70 ₰, bei 10 Ltr. 65 ₰ empfiehlt u. verſ. geg. Nachn. [872]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Mehlwurmzüchterei

empfiehlt prima Würmer ℔ 4,— ℳ [873]
F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen **inſekten-** und **kerbthierfreſſenden Vögel** pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpaketen franko, garantirt ſandfrei. [874]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Frische Ameiseneier

liefere den ganzen Sommer hindurch, in beſter Qualität, à Ltr. 1 ℳ **Joseph Böning.**
[875] Braunſchweig, Klint Nr. 2.

Vögel.

Dayaldroſſeln

in vollem Geſang,
☛ **Goldſtirn-Blattvögel.** ☚
Ferner folgende im Freien gehaltene Vögel:

Singſittiche	**Par**	26.—
Gebirgsloris	„	30.—
Felſenſittiche	„	30.—
Sperbertäubchen	„	4.50
Dolchſtichtauben	„	25.—
Grünflügeltauben	„	8.—
Halsbandtauben	„	5.—
Palmtäubchen	„	5.—

hat abzugeben

August Fockelmann,
Thierhandlung, [876]
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Größte Seltenheit.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe einen **blaubärtigen Blattvogel** (Phyllornis Hardwicki), **tadellos im Gefieder, in vollem, lautem Geſang,** 1 Jahr im Käfig. Preis 120 ℳ. Gebe auch eine Orpheusgrasmücke für 12 ℳ ab. Leb. Ank. gar.

[877] Fabrikbeſitzer **F. Weber,**
Göttingen, Reinhäuſer-Chauſſee 26.

Verkaufe: [878]

2 ſchöne **Kanarienvögel** à 6 ℳ, 1 guten Zuchthahn 4 ℳ, weg. Aufgabe d. Liebhaberei.
Arth. Wilhelm, Greiz i. V., Elſterſtr.



No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild und unzerbrechlichen Scheiben ℳ 1.—

No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein farbig verziert . . . . ℳ 1.50

Gegen Einsendung von **ℳ 1.50** versende ich 1 Stück Nr. 1 franco, Nr. 2 gegen **ℳ 2.—**

Spezial-Artikel

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten!

Mein reichillustrierter Catalog über **Käfige für Kanarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörnchen, Tauben etc. etc.** mit **sehr billigen Preisen** steht auf Verlangen **franco** und **gratis** zu Diensten. [879]

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Zur Lieferung ihrer Lieblinge empfiehlt ſich den P. T. Herren

Vogelliebhabern

die beſtbewährteſte, ſtreng reelle Vogelhandlung von [880]

Gottlieb Wanek, Prag 411, I.

Saiſon-Offerte!

Sproſſer, je nach Geſangsleiſtung.	8—15	ℳ.
Nachtigalen, „ „	3—6	„
Schwarzplättchen u. Sprachmeiſter	4—5	„
Garten- und Sperbergrasmücken	3—5	„
Müller- und Dorngrasmücken	2—3	„
Braunellen und Bachſtelzen	2—3	„
Wieſen- und Steinſchmätzer	2—	„
Wieſen- und Baumpieper	3—	„
Fitis- und Weidenlaubſänger	2—	„
Schwarz-, Grau- u. Golddroſſeln	5—10	„
Roth- und Blaukehlchen	2—5	„
Haus- u. Gartenrothſchwänzchen	2—6	„
Droſſel-, Schilf- u. Sumpfrohrſäng.	3—5	„
Rothrück. Würger, ausgez. Spötter	2—3	„

Außerdem **großes** Lager in Meiſenarten, Finken, Ammern, Lerchen u. ſ. w.

Täglich Eingang von Seltenheiten.

Nur tadelloſe Vögel kommen zum Verſandt. Friſche, ſowie prima getrocknete Ameiſeneier, Muſca, Weißwurm, Mehlwürmer ſtets am Lager zu Tagespreiſen. [881]

W. Hiltmann,
Berlin S., Dresdenerſtraße 23.

Empfehlen garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende

Sproſſer

à Stck. 9—12 ℳ, ſowie

Nachtigalen

4—6 ℳ und alle Arten

Grasmücken

unter Garantie lebender Ankunft. **Preisliſte** gratis.

Friſche Ameiſeneier,

pr., ohne Gehölz, Sand und Ameiſen, à Ltr. 1.40 ℳ, dto. 1.20 ℳ II. Qualität.

[882] **Gebr. Haas,** Vogelexportgeſchäft, **Hofſtetten** b. Gemünden a. M. (Bayern).

---

1 P. Kaptäubchen

15 ℳ, 0,1 **Schopfwachtel** 13 ℳ, 1 P. ff. **Pariſer Kanarien** 30 ℳ ſende z. Anſicht. Tauſche 1,0 **Roſenpapagei.**

[883] **W. Dolff, Meckenheim** b. Bonn.

Verk. billig 1,0 Gartengrasmücke 2.75 ℳ, 1,0 Heidelerche 2 ℳ, 1,0 Baumlerche 2 ℳ, 1,0 gelb. Spötter 5 ℳ, alles ſ. 97er Vögel, 1 Par graue Steinſchmätzer, ſehr hübſch, 3,50 ℳ, alles zuſ. 13 ℳ. Off. u. F. an die „Gef. Welt“. [884]

Jede Sorte edler

Weichfutter-Vögel

in geſanglich erprobten ſeltenen Exemplaren empfiehlt direkt von Ort und Stelle reellſt und fachkundigſt unter üblicher Gewähr

Mathias Rauſch,
Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten Singvögel,
Wien VII 3, Schottenfeldgaſſe 95. [885]

Preisliſte gratis bei Angabe über welche Vogelart.

Sproſſer und Steinröthel

à Stck. 9 ℳ, **Nachtigalen** à Stck. 5 ℳ, **Schwarzköpfe, Gartengrasmücken** u. **gelbe Spötter** à Stck. 3 ℳ, bei größerer Abnahme billigere Preiſe, für ſichere Männchen u. lebende u. geſunde Ankunft leiſte Garantie. [886]

M. Völkl,
Vogelhandlung, **Linz** a. d. Donau.

Waldvögel.

Jch verſende vom 24. April an: **Ungariſche Nachtigalen, Steiriſche Schwarzplatteln,** à Stück 4 ℳ, **Ruſſiſche Sproſſer,** à Stück 10 ℳ, unter Garantie für ſichere Männchen u. lebende Ankunft, gegen Nachnahme. [887]

Georg Hahn, Vogelhändler,
Wien IV., Naſchmarkt.

1898 erhielt mein Stamm Harzer **Kanarienvögel 1. Staatspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille.** Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr. **Paul Holzky, Cöthen (Anhalt).** [888]

Betone ausdrücklich, es kommen nur

gesunde,

kräftige, tadelloſe, ſchöne Vögel zum Verſandt, unter Garantie lebender Ankunft und abſolut gewiſſenhafter Bedienung.

Roſenpapageien, richtige Zuchtp.,	25.—	ℳ
Pflaumenkopfſittiche, alte Zuchtp.,	17.—	„
Schnurrbartſittiche, in Pr., Par	15.—	„
Pennantſittiche, Par	25.—	„
Gebirgs-Loris, prachtv. Zuchtp.	30.—	„
Singſittiche, „ „	27.—	„
Jaco, Ia, anfangend zu ſprechen,	16.—	„
Echte Donau-David-Sproſſer, M.	9.—	„
Dalmatiniſche Steinröthel, Mch.	12.—	„
Auſtr. Schopftauben, Zuchtpar	12.—	„
Auſtral. Sperbertäubch., Zuchtp.	4.50	„
Oliven-Aſtrilde, Zuchtpar	4.50	„
Diamantfinken Zuchtpar	10.00	„
Braſil. blaunackige Elſtern, St.	12.—	„
Chin. Nachtigalen, prachtv. Mch., extra ausgeſ., feur. Doppelüberſchl.	5.50	„
do. Zuchtweibchen, St.	1.80	„
Blumenauſittiche, lern. ſprech. St.	4.50	„
Regenwachteln, Zuchtpar	10.50	„
Schamadroſſeln, bei mir abgemauſ., pr. Ia Sänger,	38—40	„
Spottdroſſeln, gewiſſenh. abgeh., garantirte prima Sänger	15.—	„
Halsbandſittiche, Mch., lern. ſpr., St.	5.—	„
Großer Alexanderſittich, zahm	12.—	„
Jmp. Zebrafinken, Zuchtpar	4.—	„
Jap. Mövchen, gelb- u. braunb. P.	3.—	„

Wellenſittiche, prachtvolle, echt auſtraliſche, große, ſtarke, ſofort zur Brut ſchreitende Zuchtpare, 7 ℳ, 3 P. 19.50 ℳ, 5 P. 30 ℳ

Wellenſ.-Naturniſtkäſten, Stück	1.50	„
Nymphenſittiche, imp. Zuchtp.	10.50	„
Kappen-Ammern, M. i. Pracht, St.	3.—	„
Jndigofinken, Mch., in Pracht, St.	4.50	„
Papſtfinken, Mch. in Pracht,	6.—	„
Safranfinken, in Pr., M. 3.50, P.	6.—	„
Feuerr. Kardinäle, Ia Säng., St.	8.—	„
Dominikaner-Kardinäle, Mnch.	5.50	„
Schneew. Reisfinken, Zuchtpar	7.—	„
do. graue, prachtvoll, „	2.—	„
Hartlaub-Zeiſige, Mch. 3, Par	4.50	„
Grauedelſänger, St.	3.50	„
Etw. ſprech. Amazon., Ia Ia,	35—45	„
Gutſprech. Graupapageien	50—150	„
Roſa-Kakadus, zahm, St.	10.—	„
Gelbe Turtel- od. Lachtaub., P.	2.50	„

Jn richtigen, kräftigen Zuchtparen: **Schmetterlingsfinken** 2.50, **Orangebäckchen** 2, **Griſblen u. Amaranth,** Par 4, **Atlasfinken** 2, **Aſtrilde** 2, **Goldbrüſtchen** 3, **kl. Elſterchen** 2.50, **Muskatfinken** 2, **Silberfaſänchen** 2, **Bandfinken** 2, **Paradiswittwen** 3, **Dominikanerwittwen** 4, **Napoleonsweber** 2, **Orangeweber** 2, **Blutſchnabelweber** 2, **Chineſerfinken** 1.50, **Tigerfinken** 2 ℳ. Dieſe **Senegalvögel,** gemiſcht nach meiner Wahl in reizendem Sortiment, 5 P. 9 ℳ, 10 P. 16 ℳ, 20 P. 30 ℳ [889]

Alle Sorten pr. Vogelfutter. **Preisl. gratis.**

Laubfröſche, große, grüne, gutgenährte Thiere, 100 St. 5 ℳ **Smaragd-Eidechſen,** prachtv. Exempl., St. 30 ₰, 10 St. 2.50 ℳ

Goldfiſche, pr. hochroth, abſolut haltbare Ware, 5—7 cm lang 5.50, 7—12 cm lang 8.50, dieſe Sorten gemiſcht 7.50, per 100 frko. mit Kanne.

Georg Brühl, Vogel-Exporthaus,
Kötzſchenbroda b. Dresden.
Größtes Spezialgeſchäft und Akklimatiſation.

Ungar. Nachtigalen,

die beſten Gebirgsſchläger, ſofort ſingend, à St. 2.50 ℳ, ½ Dtd. 12 ℳ, **Sp.-Grasmücken,** à 2 ℳ, ½ Dtd. 10 ℳ, **Schwarzplattln,** à 3 ℳ, **Wachteln,** g. Schläger, Dtd. 7,50 ℳ, **Rieſen-Kolkraben,** à 4 ℳ. [890]

N. Muſchna, Temesvar, Ungarn.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Hierzu eine Beilage.


Die gefiederte Welt
Wochenschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler
von Dr. Karl Ruß

Inhalt der Nr. 20.

Der ſchnurrbärtige Sperling (Fringilla lepidoptera).
Etwas über begabte Graupapageien.
Engliſche Vogelliebhaberei (Fortſetzung).
Beobachtungen aus der freilebenden Vogelwelt (Schluß).
Selten gehaltene einheimiſche Vögel (Fortſetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenſchau.
Briefwechſel.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der **Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Ohne Sportspreiſe

empfehle garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende, echte **Bukowiner- und Donau-David-**

Sprosser

aus den **Weidenpflanzungen der Donaugebiete die beſten, lauteſten tiefſchalligſt. Rogler, welche exiſtiren,** wirkliche ſeltene **Tag- u. Nachtſchläger,** Stck. 9,50 ℳ, 2 St. 18 ℳ, 3 St. 25 ℳ, dutzendweiſe **bedeutend** billiger. Ich liefere, wie allſeitig bekannt, unter **weitgehendſter Garantie für lebende und geſunde Ankunft, abſolut tadelloſe, ſtarke, gewiſſenhaft abgehörte Hähne,** elegante u. praktiſche **Weichfreſſerkaſtenkäfige,** mit Zinkſchubkaſten und weicher Decke, 53×30×38, St. 5 ℳ Büchlein über **Behandlung, Fütterung und Pflege gratis. Friſche Ameiſeneier** zum Tagespreis können jeder Sendung beigefügt werden. [902]

Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [907]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe, **Schlotheim i. Th.**

C. L. Flemming

Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen

empfiehlt: [908]

Flug- und Heckbauer, Einſatzbauer, Geſangskaſten. Muſterpackete 9 St. ſort. f. Kanarienzüchter M. 6 franko.

Holzwaarenfabrik.

Holzwaarenfabrik.



Man verlange Preisliste.

Käfige und Geräthſchaften.

50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.

Knochenmühlen für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,** [903] **Waren i. Mecklenb.**

Proſpekte gratis.

Käfige jeder Art

fabrizirt und empfiehlt preiswerth **Arthur Herrmann & Cie., Oſchatz i. S.**

Man achte genau auf unſere Firma und verlange unſere **vollſtändig neue** Preisliſte, ausgearbeitet von unſerm Mitinhaber **Arthur Herrmann.** [904]

Brut-Apparate mit Wärmeregulatoren.

Größte Vollkommenheit. Sicherer Erfolg. Bisher noch nicht erreichtes Brut-Reſultat: 90 %. — **Brut-Eier. Küchlein.**

General-Katalog franko.

J. Philippe, Chevalier du Mérite Agricole u. Fabrikant in **Houdan** (Seine & Oise) bei Paris, Frankreich. [905]

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [906]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Für alle Arten Vögel fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Staatspreis). Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.

Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [909]

Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Netzfallen,** kleine 80 ₰, groß. 1 ℳ, f. groß. Vögel 1,50 bis 2 ℳ, **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [910]

Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112.

Illuſtrirte Preisliſte gratis.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.

[911] **R. Schröter, Clingen-Greußen.**

Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in **praktiſcher** Ausführung, großer Auswahl u. billigem Preis [912]

Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!

August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 20. **Magdeburg,** den 18. Mai 1899. **XXVIII. Jahrg.**

Der ſchnurrbärtige Sperling (Fringilla lepidoptera).

Bericht eines Abonnenten in Transvaal (Südafrika).

Bezugnehmend auf Ihren Artikel „Fremdländiſche Finken" in der Gefiederten Welt 1898 theile ich Ihnen Folgendes aus meinem Tagebuch über den ſchnurrbärtigen Sperling (Fringilla lepidoptora) mit:

Es war im Oktober 1898, als ich dieſe ſchönen Vögel zum erſten Mal ſah, am Pienaarsriver, ungefähr vierzig engliſche Meilen nördlich von Pretoria. Die Vögel trieben ſich in einem Schwarm von 20 bis 30 Stück auf einer großen ausgefahrenen offenen Waldfläche am Boden Nahrung ſuchend herum und flogen bei meinem Kommen auf einen niedrigen Dornenbuſch, der auf der offnen Fläche ſtand. Im erſten Augenblick hielt ich die Vögel für Fringilla angolensis. Schnell präparirte ich einige Stöckchen mit Vogelleim; nachdem ich mich vorſichtig nach dem Dornenbuſch begeben hatte, wurden die Leimruthen oben auf den Buſch geſtellt. Die Vögel, die alle wieder auf den Boden geflogen waren, umging ich im weiten Bogen und jagte ſie nun auf, und richtig flogen alle nach dem Buſch mit den Leimruthen. Der Erfolg war günſtig; elf Stück waren gefangen. Nachdem ſie alle geſäubert und in einem Kiſtenkäfig untergebracht waren, konnte ich dieſelben als Fringilla lepidoptera feſtſtellen. Am folgenden Tag fing ich noch zwei Stück.

Als Futter gab ich den Vögeln fein geſchrotenen Mais und Grasſamen, was beides ſofort genommen wurde. Neſter von den Vögeln fand ich in Menge auf Dornbüſchen, die niemals höher als 6 Fuß vom Boden. Die Neſter ſind aus feinen Gräſerriſpen gefertigt von plattlänglicher Form mit ſeitlich ſchräggeſtelltem Einflugloch, das Innere iſt mit Thier- und Pflanzenwolle ausgepolſtert. Da es außer Brutzeit war, fand ich die Neſter leer, doch waren alle gut erhalten und wurden von den Vögeln als Schlafſtätte benutzt. Ich denke mir, daß die alten Vögel bei jeder Brut ein neues Neſt errichten und den Jungen den Bau als Erbtheil überlaſſen, denn die Neſter, die ich des Abends mit einer Laterne unterſuchte, beherbergten gewöhnlich vier bis fünf Vögelchen. Die Neſter unbeſchädigt aus den Dornbüſchen zu ſammeln, oder die Vögel in den Neſtern zu fangen, war unmöglich, denn die Dornen ſind ſo fein und ſcharf, daß ſie meine Hände nicht unerheblich verletzten.

Von den dreizehn gefangenen Vögeln habe ich drei Pärchen für meine Voliere behalten, welche ſich in ſehr kurzer Zeit eingewöhnten und nun ſeit Februar mit Niſten begonnen haben, leider noch nicht mit günſtigem Erfolg. Ein Neſt wurde durch Mäuſe zerſtört und eine andere Brut durch eine Nachtſchlange, welche meine Voliere geraume Zeit beraubt haben muß, denn es verſchwanden von Zeit zu Zeit Vögel und ich konnte nicht feſtſtellen, wohin die Thiere kamen, bis ich eines Abends im März durch ein fürchterliches Geſchrei in der Voliere veranlaßt wurde, mit Licht die Vögel zu beſichtigen und zu meinem nicht geringen Schrecken eine braune Schlange in den Zweigen ſah, welche eins meiner Schnurrbärtchen umringelt hielt. Die Schlange war gut einen Meter lang und hatte das Vögelchen bereits getödtet, weshalb ich nun ſchnell entſchloſſen auch das Reptil durch einen Schuß in's Jenſeits beförderte.

Seit einiger Zeit brüten die Vögel mit beſſerem Erfolg, wenigſtens hat ein Par zwei Junge, und das andere Par brütet in einer Konſervenbüchſe. Das von der Schlange erdroſſelte Schnurrbärtchen war ein Männchen, das ledige Weibchen lebt in ſehr vertraulichen Verhältniſſen mit einem Männchen Granataſtrild.

Das Schnurrbärtchen iſt in ſeinem ganzen Weſen ein echter Sperling, frech und brutal, aber für eine Voliere ein lieber und dankbarer Vogel.

Sehr intereſſant iſt es, wenn die Gatten zum Neſt oder zur Parung locken. Die Vögel machen ſich ſteif, ziehen den Kopf ein, die Augen werden halb geſchloſſen und der rechte Flügel wird ausgebreitet und in zitternder Bewegung gehalten, dabei locken die Vögel fein „tri tri tri“.

Der Geſang iſt unbedeutend und der gewöhnliche Ruf beſteht aus „tri ſchip ſhip ſhap“.

Das Ei iſt 16 × 11 mm im Durchmeſſer, die Spitze bräunlichweiß, das ſtumpfe Ende braun geflammt und gefleckt nach der Spitze zu verlaufend. Das Jugendkleid iſt grau, die Schuppenzeichnung auf dem Kopf und der ſchwarze Bart fehlen gänzlich. Die ſchwarzen Schafte in Schwanz- und Flügelfedern ſind nicht ſo ſcharf gezeichnet wie bei den alten Vögeln.

Die Vögel ſcheinen nur in dem ſogenannten Buſch oder Lagerfeld ſich aufzuhalten, denn in höher gelegenen Landſtrecken habe ich ſie nie geſehen. Als Nahrung gebe ich ihnen afrikaniſche Hirſe, Kanarienſamen, geſchrotenen Mais und alle Sorten Gräſer mit halbreifem Samen, hin und wieder kleine Regenwürmer nebſt Termiten.

Etwas über begabte Graupapageien.

Von Frau R. Siegmund.

Die in Nr. 51 der „Gefiederten Welt“, Jahrgang 1897, enthaltene kurze, aber intereſſante Abhandlung über „Begabte Graupapageien“ veranlaßt mich, auch einige Beobachtungen über dieſes Thema zur Sprache zu bringen. Wenn ich auch von der Annahme weit entfernt bin, noch nie Dageweſenes zu berichten, ſo glaube ich doch vorausſetzen zu dürfen, daß jeder wirkliche Papageienfreund Mittheilungen über die Talente einer geiſtig ſo hoch ſtehenden Vogelart immer wieder mit Vergnügen lieſt — wenigſtens mir geht es ſo —; ich bin auch der Anſicht, daß ein reger Meinungsaustauſch jeder Liebhaberei nur förderlich ſein kann.

Vorausſchicken muß ich, daß ich nicht von jeher Liebhaberin von Papageien war, ſondern im Gegentheil trotz meiner großen Paſſion für die Vogelwelt im Allgemeinen bis vor einigen Jahren nie recht begreifen konnte, daß ſo viele Vogelwirthe ſich ſolche ewig kreiſchenden, „falſchen“ und ſtets biſſigen Vögel halten mochten. Hatte ich doch niemals Gelegenheit gehabt, einen Papagei kennen zu lernen, der weder kreiſchte, noch Schnabelhiebe austheilte! Schon als vierzehnjähriges Mädchen war ich zwei Mal von ſogenannten fingerzahmen Papageien fürchterlich gebiſſen worden, obgleich ich den Vögeln garnichts zu Leide gethan hatte. Das erſte Mal handelte es ſich um einen kleinen gelbhaubigen Kakadu, den ich, damals ſchon eine leidenſchaftliche Vogelfreundin, in Pflege zu nehmen mich von Bekannten überreden ließ, da der Vogel, wahrſcheinlich in Folge unrichtiger Fütterung, ſchwer magenkrank war. Dieſer Papagei war gegen Jedermann, auch gegen Fremde, äußerſt liebenswürdig, ſchien garnichts vom Beißen zu wiſſen, und ließ ſich ſtreicheln und hätſcheln, wie ein junges Kätzchen. Mit Hülfe einiger tüchtiger ornithologiſcher Werke gelang es mir trotz meines Mangels an Erfahrung, zumal in der Papageienpflege, den kranken Kakadu wieder herzuſtellen. Nach knapp vierzehn Tagen war er wieder bei gutem Appetit, ſeine Verdauung war in Ordnung, und ſein anfänglich ſtruppiges Gefieder lag wieder glatt am Körper an. Trotzdem alle meine Familienangehörigen den ſtets äußerſt liebenswürdigen Vogel ſtreichelten und liebkoſten, hatte ich bisher nie gewagt, ihn zu berühren. Als er aber einmal aus freien Stücken an meinem Kleid emporzuklettern begann — er hatte ſtets freien Flug im Zimmer — ließ ich ihn gewähren, hielt ihm auch die Hand hin, um ihm entgegenzukommen. Ich ſollte meine Freundlichkeit ſchnell genug bereuen! — Kaum hatte der tückiſche Vogel ſich auf meine Hand feſtgeſetzt, als er mich auch ſchon mit ſolcher Gewalt in den Zeigefinger biß, daß das Blut floß. Ich trug das unartige boshafte Thier, das meine Güte ſo ſchlecht vergolten hatte, am gleichen Tage zu ſeinem Beſitzer zurück und wollte nichts mehr von Papageien wiſſen.

Etwa ein halbes Jahr ſpäter war ich mit meiner Mutter zu Beſuch bei Bekannten, die einen ungemein zahmen, gutſprechenden Graupapagei beſaßen, von dem ich mich aber ſtets in achtbarer Entfernung hielt. An dieſem Tag nun befand ich mich zufällig mit dem Papagei allein im Zimmer, als es dieſem gelang, durch die Gitterſtäbe ſeines Käfigs hindurch ein allzu nah befindliches Schächtelchen mit Phosphorzündhölzern zu erhaſchen. Erſchreckt trat ich an den Käfig heran, und als der Vogel daraufhin die Schachtel fallen ließ, öffnete ich, da der Käfig keine Schublade beſaß, das Thürchen und wollte behutſam die giftigen Streichhölzer entfernen; das Mitleid mit dem gefährdeten Thier ließ mich die ſonſt beobachtete Vorſicht einen Augenblick vergeſſen. Auch diesmal wurde mir meine Gutherzigkeit ſchlecht gelohnt, denn ſowie ich die Hand in den Käfig gebracht hatte, ſchoß der Papagei von ſeiner Stange herab, wie ein Stößer darauf los und verſetzte mir einen ſo furchtbaren Schnabelhieb, daß ich mit einem Schmerzenslaut meine blutende Hand zurückzog. — War es nach ſolchen Erfahrungen zu verwundern, daß ich fortan jedem Papagei aus dem Wege ging? — Ich glaube kaum. Da ich überdies noch das zweifelhafte Vergnügen hatte, im Lauf der Jahre bei einigen meiner Nachbaren während der warmen Jahreszeit, wo man die Fenſter offen läßt,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

angeſchafft haben, wenn nicht der Preis von 300 ℳ, der für „Lorchen“ gezahlt worden war, mir etwas zu hoch geweſen wäre. —

Erſt im vorletzten Winter faßte ich den Entſchluß, es doch einmal mit einem Papagei zu verſuchen, und ſo beſtellte ich denn bei einer großen Hamburger Firma einen jungen, aber akklimatiſirten Graupapagei. Der Vogel traf geſund und munter ein, war aber weder jung, noch zahm, und da er in einigen Monaten nicht einmal den Schnabel öffnete, ſo verkaufte ich ihn wieder und ſchaffte mir erſt eine Rothbug-Amazone, bald darauf auch noch eine Rothſtirn-Amazone an. Beide wurden großartige Sprecher; die erſtere war ein äußerſt liebenswürdiges Geſchöpf, ſchrie aber von Zeit zu Zeit, die letztere ſchrie niemals, war aber ein tückiſcher, biſſiger Vogel, vor dem man fortwährend auf der Hut ſein mußte. Da auch dieſe beiden Papageien mich nicht ganz befriedigten, ſo gab ich ſie ebenfalls wieder weg und kaufte bei F. Reſſek in Hamburg einen jungen akklimatiſirten Graupapagei, den ich, da ich ſehr mit ihm zufrieden war, endgültig behielt und der mir nun um keinen Preis mehr feil iſt.

„Lora“, ſo wurde der Graue getauft, iſt der Liebling der ganzen Familie geworden, hat aber ihrerſeits eigentlich nur mich in's Herz geſchloſſen, da ihrem ſchüchternen Charakter das derbere, haſtige Weſen meiner Angehörigen nicht zuſagt. An mir hängt ſie mit größter Liebe, und wahrhaft rührend ſind die Beweiſe ihrer Zärtlichkeit, wenn ſie mich etwa einen Tag lang nicht geſehen hat. Da lärmt und tobt ſie in oder auf ihrem Käfig, ſchlägt mit den Flügeln und ruft ſo lange: „Guten Tag“, oder „Mama“, bis ich ſie auf die Hand nehme. Nun legt ſie ihr Köpfchen an meine Wange, fährt küſſend mit ihrem Schnabel über mein Geſicht und flüſtert alle möglichen Worte koſend in mein Ohr, wie „Schatz, gute, gute Lora, Mama, guter Hund, gute Katze u. a.“ Wenn ich Morgens in's Zimmer trete, und ſie vernimmt meine Stimme, ſo ruft ſie augenblicklich „Guten Tag, Mama, guten Tag, Lora“; erblickt ſie meinen Mann, ſo ſagt ſie „Guten Tag, Papa“, während ſie mein Töchterchen ſtets mit ihrem Namen „Olga“ begrüßt. Ruft Jemand im Haus eine andre Perſon, ſo antwortet „Lora“ ſtets mit „Ja“; tritt eine fremde Perſon in's Zimmer, ſo ſagt der Vogel höflich „Guten Tag“.

Da ich herausgefunden habe, daß alle Papageien viel lieber oben auf ihrem Käfig, als in demſelben ſitzen, ſo habe ich einen viereckigen Käfig angeſchafft, auf dem ſich außerhalb noch eine Sitzſtange befindet; dieſe letztere iſt der Lieblingsaufenthalt des Grauen. Hier kann er ſich ſtundenlang mit ſich ſelber unterhalten, was ſich ungemein drollig anhört. Bald ruft er „Lora, wie ſpricht der Hund? Sag' ſchön, Lori, wie ſpricht er? — Wau, wau! — So iſt's ſchön. Und die Katz, Lora, wie ſpricht die Katz? — Miau! — So iſt's brav, Lori, ſo iſt's ſchön!“ — Dann wieder ſpricht er mit den Hunden, einigen großen, deutſchen Doggen, die im Haus gehalten werden. Kommt ihm eines der Thiere zu nahe, ſo ſchreit er ſofort: „Kuſch Pallas, kuſch Leda, kuſch, leg' dich, ruhig!“ — Macht eines derſelben den Verſuch, etwas vom Tiſch zu ſtehlen, ſo ruft Lora laut: „Pfui, aber, aber, was iſt das!“ Hier und da paſſirt es dem Vogel auch, daß er von einem Hund umgeworfen wird; da ſchreit er, ſowie er wieder auf die Füße gekommen, laut und unwillig: „Pfui, kuſch, Pallas, leg' dich, ruhig“! (Schluß folgt.)

Engliſche Vogelliebhaberei.

Von Albert Rettich.

(Fortſetzung).

Ich kann die Klaſſeneintheilung einer größeren engliſchen Ausſtellung nicht als vollſtändig beſchrieben anſehen, ohne ſpeziell auf zwei Umſtände hinzuweiſen, die im Lauf der Zeit durchaus nöthig geworden ſind und die für deutſche Leſer einiges Intereſſe haben dürften. Inmitten der Sektion Fremdländer befindet ſich eine Klaſſe für Dompfaffen und eine für Stiglitze! Dies ſind keine „Exoten“, ſondern einfach Europäer, die maſſenhaft importirt werden und ſo groß und farbenbunt ſind, daß ſie unſere einheimiſchen ganz in den Schatten ſtellen.

Wo kontinentale Blut- und Diſtelfinken mit konkurriren, da kommen die kleinen Inſulaner nicht mit und ſie müſſen deshalb dadurch beſchützt werden, daß für alle Ausländer dieſer zwei Arten beſondere Klaſſen aufgeſtellt werden, wo ſie auf ebenſo werthvolle Preiſe prämirt werden, ohne die verdienſtlichen britiſchen Artgenoſſen zu benachtheiligen.

Andere Arten von Finken, die wir viel ſchöner importirt in Harzer Bauerchen kaufen können, als die hier gefangenen, ſind vorerſt noch in der britiſchen Sektion zuläſſig, aber die Gewinne unter den Zeiſig-, Flachsfink-, Buchfink- und ſog. Kernbeißer-Liebhabern ſind meiſtens auf ruſſiſchen oder deutſchen Urſprung zurückführbar.

Trotzdem ſind dieſe Klaſſen für den Beſchauer ſehr intereſſant, denn es finden ſich darin vieler Herren Länder vertreten. Die zwei Spezialklaſſen haben meiſt nur ruſſiſche Blut- und Diſtelfinken aufzuweiſen, denn deren Größe und Farbe erreichen ſelbſt die beſten deutſchen nicht, obgleich die Letzteren ſchon die Engländer unſtreitig übertreffen.

Das Ergebniß der Auſſtellung der beiden Spezialklaſſen iſt folgendes: die beiden britiſchen Klaſſen füllen ſich koloſſal, weil ſie keine Ruſſen zu befürchten haben, die fremdländiſchen Klaſſen nehmen ab, weil nur Ruſſen zu befürchten ſind. Die prachtvollen Deutſchen, die meiſtens fingerzahm und weißfüßig ſind, ſitzen zwiſchen zwei Stühlen.

Aber man muß ſich zu helfen wiſſen! Die ſtärkſten Dompfaffen und Stiglitze meldet man in der Fremdenſektion an und die Kleinen — — hält man für Briten! Oder man ſchenkt der Ausſage des Händlers Glauben, daß es echte Einheimiſche ſeien! Nun liegt es dem Preisrichter ob, die Unechten herauszufinden und als ob das Werk dieſer Herren nicht ſchon ſchwer genug wäre, ſie müſſen ſich hier dagegen verwahren, ſolche Vögel zu begünſtigen, die vielleicht eine Stunde darauf ein halbvergeſſenes Liedchen zu pfeifen anfangen, denn das verräth ſofort die verbotene Nationalität, indem nur deutſche Blutfinken darauf dreſſirt werden. So viel ich weiß, hat bis jetzt noch Keiner den Blüchermarſch angeſtimmt, nachdem er geſiegt hatte, aber ich kenne wenigſtens Einen, der ſchon mehrmals, wenn auch nicht mit dem erſten Preis bedacht wurde, doch ein zu großer Stümper iſt, um ſein Geburtsland zu verrathen, aber der Eigenthümer hatte ihn aus einer Anzahl importirter deutſcher Dompfaffen herausgeſucht und mauſern laſſen.

Bei Stiglitzen haben die Preisrichter mehr Merkmale, woran ſie die Abſtammung der ausgeſtellten Stücke beurtheilen können; z. B. die weißen Backenſtreifen ſind weniger umfangreich, und mehr mit dem braunen Anflug überhaupt, als die importirten Raſſen aufweiſen.

Somit iſt die Prämirung dieſer zwei ſehr beſetzten Klaſſen äußerſt ſchwierig. Die Richter wiſſen im Voraus, daß mehr oder weniger Unfug ſeitens der Ausſteller getrieben wird, doch kompromittirt man Niemanden gern dadurch, daß man eine Nummer öffentlich als „wrong class“ brandmarkt. Die Leute ziehen vor, alles Verdächtige einfach zu übergehen, und ſind dann keinen Aergerniſſen ausgeſetzt. Durch das immer zunehmende Wachſen der Liebhaberei ſind ſie ohnehin ſchon mehr als je in Anſpruch genommen und haben täglich mit neuen Schwierigkeiten und Verſuchungen zu kämpfen.

Es dürfte hier am Platz ſein, hervorzuheben, daß jede Begünſtigung der Konkurrenten ſeitens der Preisrichter beinahe unmöglich gemacht wird. Die Mitglieder jedes Vorſtandes ſinnen hauptſächlich darauf, allen Ausſtellern vollſtändige Gerechtigkeit widerfahren zu laſſen und bedienen ſich jedes Mittels, geheime Einverſtändniſſe nahezu in den Bereich der Unmöglichkeit zu drängen. Die Beſichtigung des Katalogs iſt bis nach gethaner Arbeit gänzlich ausgeſchloſſen. Die Form, Farbe und Größe der Käfige iſt je nach der Art der betreffenden Klaſſe möglichſt gleichmäßig. Es muß zwar jeder Ausſteller ſeine eigenen Käfige liefern, aber die Kiſtenform iſt allgemein angenommen, und die beiden anderen Bedingungen wechſeln nur nach der Größe und Farbe der Inſaſſen. Jetzt hört man den Vorwurf „So und ſo habe den Käfig, nicht den Vogel prämirt“, nicht mehr. Alle Merkmale und Abzeichen, wie z. B. außergewöhnliche Sitzſtangen, Futtervorrichtungen, Anmalen eines Spielnamens wie etwa The Champion. The Wonder, Monarch u. a. werden unterdrückt. Geſchriebenes, wie z. B. der Verkaufspreis oder Anweiſungen der Pflege und Fütterung u. a. wird abgenommen.

Auf dieſe Weiſe iſt jeder Anhaltspunkt abgeſchnitten und alle mißgünſtigen Bemerkungen und Verdächtigungen ebenfalls. Man erſieht hieraus, daß die Zuerkennung der Geld- und Spezialpreiſe immer ſchwieriger wird.

Zwei Fälle will ich nennen, welche ſehr viel Aufſehen erregten und worüber die Vogelliebhaberwelt heute noch nicht das letzte Wort gehört hat. In dem erſten haben ſich die Sachverſtändigen ihres Titels vollſtändig würdig gezeigt, in dem zweiten ſchwebt die Entſcheidung vorerſt noch.

Seit zwei Jahren ſtellt ein gewiſſer Mr. Job Williams in Pontypridd im Wälſchland die beſten engliſchen Stiglitze aus. Einerlei, wo er ſie anmeldet, wer Preisrichter iſt, was für eine Jahreszeit ſein mag, ſeine Schauſtücke bekommen immer die höchſten Preiſe. Dies hatte die vielleicht nicht unnatürliche Folge, daß die enttäuſchten Nebenbuhler die Echtheit und ſelbſt den heimiſchen Urſprung der wälſchen Stiglitze in Frage ſtellten. Die Preisrichter wurden zu Rath gezogen, konnten aber nur ihre Ueberzeugung kund geben, daß ſie echt und naturfarbig ſeien und die erworbene Auszeichnung ehrlich verdienten. Der Vorſtand der Februar-Ausſtellung machte es ſich zur Pflicht, einen ungewöhnlichen Schritt zu thun, um dem Räthſel auf die Spur zu kommen. Anſtatt die fünf Anmeldungen alle zuſammengeſtellt zu laſſen, vertheilten ſie die Nummern ſo, daß Mr. Job Williams' Stamm nicht auf einem Haufen ſteckte.

Der Preisrichter war als ſolcher ein Neuling, ſonſt aber ein wohlbekannter Baſtardzüchter, Mitglied der beſten Vereine und guter Kenner. Als der Katalog endlich erſchien, war der gefürchtete Stamm von fünf Stück ſo prämirt: Nr. 1416 Zweiter Preis, Nr. 1418 Löbliche Erwähnung, Nr. 1421 Dritter Preis, Nr. 1425 Erſter Preis, Nr. 1426 Löbliche Erwähnung. Außerdem wurde demſelben Ausſteller mit einem einzigen Ausſtellungsſtück in der britiſchen Dompfaff-Klaſſe der erſte Preis darin und ein Spezial-Preis als „beſter Vogel in der ganzen einheimiſchen Sektion“ zuerkannt.

Wie gewöhnlich wurde der Wälſchländer mit Glückwünſchen überhäuft, dazwiſchen ſtürmten aber auch die Erkundigungen und Fragen ſo direkt auf ihn ein: „Wie fangen Sie es an, uns jedesmal ſo brillant zu ſchlagen“?, daß ſich Mr. Job Williams bewegen ließ, Richtern und Konkurrenten folgenden Aufſchluß zu geben: „Ich benutze keine künſtlichen oder fremdländiſchen Produkte. wie z. B. rothen Pfeffer, keine der vielen auspoſaunten Präparate, die in den Fachblättern angeprieſen werden. Ich ahme nur die Natur nach, aber ſo getreu wie möglich. Ich beobachte die wilden Finken das ganze Jahr hindurch und wovon ſie leben, ſammle ich mir Vorrath und reiche ihn meinen gekäfigten Pfleglingen, die ich vonvornherein ſchon ſorgſam auswähle. Ich bearbeite nur junges, großes, ſchöngeſtaltetes Material und darin habe ich die erſte Auswahl, denn die Vögel werden ſozuſagen vor meiner Thür gefangen. Dieſelben Sämereien, welche die wilden Maſſen in's Hochzeitskleid kommen laſſen, erhalten meine zahmen auch und ich erziele dadurch das Ergebniß, welches Sie vor ſich ſehen.“

Daß viele Hörer ungläubig den Kopf ſchüttelten, läßt ſich denken, denn daß während der Schneezeit dürre Unkrautſamen einen beſſern Effekt hervorbringen ſollen, als Cayennepfeffer während der Mauſer, leuchtet Wenigen ein; doch beſteht der Herr auf ſeiner Behauptung und die Thatſache bleibt, daß ihm nichts Gegentheiliges zu beweiſen iſt. Jetzt werden es andere Ausſteller auch ſo machen und man iſt auf den Erfolg geſpannt. Welcher Art dieſer auch ſein mag, das ſo vielfältig gegebene und beſtätigte Urtheil verſchiedener Preisrichter beweiſt ihre Fähigkeit und Würde.

Der zweite Fall, den ich angeben wollte, iſt der eines Blutfink-Miſchlings, welcher in der Kanarien-Baſtard-Klaſſe die höchſte Auszeichnung erhielt; der Gewinner des zweiten Preiſes in dieſer Klaſſe erhob Widerſpruch und machte ſich verbindlich, zu beweiſen, daß der ſeltene Baſtard von Hänfling und Dompfaff abſtamme und deshalb in die Klaſſe Miſchlinge von einheimiſchen Vögeln hätte geſtellt werden müſſen, dann wären er und die anderen Gewinner alle um eins heraufgerückt.

Nach vielen Bemühungen, Berathungen, Schreibereien und Hin- und Herreiſen wurde nach zwei Monaten eine ſchriftliche Erklärung auf den Vereinstiſch gelegt, worin Jemand beeidigt, er habe einen Hänfling-Dompfaff gezogen, ausgeſtellt, verkauft und ſei ihm ſpäter wieder begegnet, und daß er überzeugt ſei, der betreffende Baſtard wäre der von ihm gezüchtete.

Daraufhin mußte der Vorſtand ſich entſcheiden, er würde in Zukunft den Vogel nur in den britiſchen Baſtard-Klaſſen anerkennen. Aber der Preisrichter ſelbſt, einige alte Kenner (meine Wenigkeit) und ein großer Baſtard-Züchter ſtimmen dieſem Urtheilsſpruch noch lange nicht bei, deshalb ſagte ich oben: „Wir haben das letzte Wort darüber noch nicht gehört“.

(Fortſetzung folgt.)

Beobachtungen aus der freilebenden Vogelwelt.

Aus dem Sauerlande.

Von W. Hennemann, Lehrer.

(Schluß).

Am 6. Februar ließ die Kälte nach, und nun entwickelte ſich eine außerordentliche Wärme, wie ſelten zuvor in dieſem Monat; zeigte doch am 10. d. M., dem wärmſten Tage, das Thermometer in der Mittagſtunde faſt 15° R. im Schatten an. Ueberall in den Dorfgärten ſtanden die Schneeglöckchen in voller Blüthe, die Fruchtblüthen der Haſelſträucher ließen ihre purpurnen Fäden heraustreten, an den Bächen, Acker- und Wieſenrainen erſchienen die gelben Blütenköpfchen des Huflattichs, und am 20. fand ich vereinzelt die goldige Blüthe des Scharbockskrauts (Ficaria ranunculoides). Zahlreiche Fledermäuſe waren aus ihrem Winterſchlafe erwacht und machten kurze Ausflüge aus ihren geſchützten Verſtecken. Auch bei unſeren befiederten Sängern äußerte ſich die ungemein milde Witterung in auffallender Weiſe. Ueberall vernahm man den Geſang des Goldammers, vom Wald herüber klangen bereits die lieblichen Weiſen der Amſel, die erſten Lerchen ſtellten ſich ein und ließen ihre Jubellieder hören. Vereinzelt ließ ſich auch ſchon ein Buchfink hören, doch vernahm ich den erſten vollen Schlag merkwürdigerweiſe am 22. d. M. morgens bei vier Grad Kälte, nachdem über Nacht wieder Froſt eingetreten war. Die Buchfinken ſind in großen Schwärmen wintersüber bei uns geblieben, unter ihnen auch zahlreiche Weibchen.

Die Kälte der letzten Februarwoche brachte uns in mehreren Nächten 9 bis 10 Grad unter Null, aber jeden Morgen hörte man die Stare luſtig pfeifen. Noch vor Ablauf des Monats ſtellte ſich Regenwetter ein, doch ging am Morgen des 5. März der Regen in leichten Schnee über. Im Lauf dieſes Tags, an welchem ein ſcharfer Nordwind blies, ſah ich die erſte heimgekehrte weiße Bachſtelze (M. alba, *L.*). Die meiſten Bachſtelzen, weiße wie auch gelbe (M. flava, *L.*), kehrten aber erſt in der zweiten und dritten Märzwoche zurück und hielten trotz der dann nochmals eintretenden Kälteperiode aus. Der 6. März brachte Südwind und an den folgenden Tagen ſtieg die Temperatur ſtetig. Haſeln und Weiden wurden von den Bienen jetzt beflogen, und in der Vogelwelt wurde es immer regſamer. Lauter und feuriger ließen die Rothkehlchen oder Rothbrüſtchen (Sylvia rubecula, *L.*) ihre wechſelvollen Strofen ertönen und der laute, melodiſche Finkenſchlag war bereits aus jedem Garten heraus zu vernehmen. Unter dem recht zahlreich in unſeren Wäldern vertretenen Birkwild hörte man zu Mitte März die erſten balzenden Hähne. Am 17. ſah ich im Erlengebüſch am Ufer der Lenne das erſte Pärchen Schwanzmeiſen (Parus caudatus, *L.*), welch' hübſche Vögel gewöhnlich erſt anfangs April zurückkommen. Blaumeiſen (P. coeruleus, *L.*) waren bereits im Februar zahlreich zu ſehen, Kohl- und Tannenmeiſen (P. major, *L.* et ater, *L.*) haben ſich den ganzen Winter über in den Gärten und Gehölzen gezeigt, ebenſo die Spechtmeiſe (Sitta caesia, *M.*).

Als ich am 18. März in der Mittagſtunde ein Gebirgsthal hinaufwanderte, bemerkte ich die erſte aus dem lethargiſchen Winterzuſtand erwachte Eidechſe in dieſem Jahr; es war die kleine braune Bergechſe (Lacerta montana). Wol eben erſt aus dem Schlummer erwacht, kroch ſie träge an dem ſonnigen Abhange dahin. Und als ich darauf ein Gehöft erreichte, ſah ich einen heimgekehrten Rothſchwanz (Ruticilla titys, *S.*) auf dem Dachfirſt; doch war es nur ein Vorläufer, denn erſt gegen Ende des Monats, vorwiegend aber im April, kehrten dieſe Vögel zahlreicher zurück.

In den Nachmittagsſtunden des 18. März wurde die Luft rauher und gegen Abend trat ein Schneewehen ein, dem am folgenden Tag einige heftige Schneegeſtöber folgten. In großer Anzahl ſtellten ſich die Dompfaffen in den Gärten ein und große Schwärme Bergfinken (Fringilla montifringilla, *L.*), durch die Unbilden der Witterung auf ihrer Rückreiſe zur nordiſchen Heimat aufgehalten, ſtrichen über die ſchneebedeckten Fluren und erſchienen futterſuchend an den Gehöften und Dörfern. Ein Landwirth aus hieſiger Gegend hat an dieſem Tage einen wieder ſüdwärts ziehenden Schwarm Wildgänſe beobachtet, und an den folgenden Tagen hat man an ſchneefreien Wieſenplätzen raſtende Kibitze angetroffen. Es war ein ſtrenger Nachwinter, der allerdings ſchon am 26. mit einem letzten, überreichen Schneefall ſeine Herrſchaft beendete, nachdem er in den wenigen Tagen bereits eine hohe Schneedecke über die Berge gelegt und in der Nacht vom 20. zum 21. eine Kälte von faſt 10° R. gebracht hatte. Der Brut der Waſſeramſel (Cinclus aquaticus, *B.*) ſcheint dieſe nicht nachtheilig geweſen zu ſein; denn am 29. ſah ich im Ahethal*) ein Pärchen futtertragend mehrmals unter eine Holzbrücke fliegen, wo alſo zweifelsohne das Neſt mit Jungen ſtand.

In der letzten Märzwoche begannen die Starweibchen Niſtſtoffe zum Kaſten zu tragen, doch wurden ſie erſt anfangs April emſiger darin. Jetzt begannen auch die Fehden zwiſchen den bereits prächtig ausgefärbten Buchfinkmännchen, weil ein jedes ſeinen Brutbezirk nun gegen fremde Eindringlinge zu behaupten ſuchte. Zum Niſten aber ſchritten ſie noch nicht, denn die nun folgende naßkalte Zeit, in der ſogar in den Tagen des 11. und 12. d. M. Schneewehen eintraten, und die bis zum 20. öfter Nachfröſte brachte, hatte einen hemmenden Einfluß nicht nur auf die Entwicklung der Brutgeſchäfte der Finken, ſondern auch mancher anderer Arten. Zu Mitte des Monats trafen die Krähen und Dohlen Anſtalten zum Niſten. Die erſten Rauchſchwalben (Hirundo rustica, *L.*) trafen in den Tagen vom 16. bis 18. ein, der Kuckuck am 20. April. Am 24. ſah ich die erſte Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla, *L.*), nachdem die anderen hier vorkommenden Arten bereits zurückgekehrt waren. Als erſte erſchien die Zaungrasmücke (S. curruca, *L.*) ungefähr gleichzeitig mit dem Weidenlaubvogel (S. rufa, *L.*) etwa um den 9. d. M. Graue Fliegenſchnäpper (Muscicapa grisola, *L.*) waren bereits am 19. April zurückgekehrt; den ſchwarzrückigen (M. atricapilla, *L.*) habe ich bisher noch nicht beobachtet.

---

*) Vergl. Nr. 24 der „Gef. Welt" v. J.

Selten gehaltene einheimiſche Vögel.

Von A. Reuter.

(Fortſetzung aus Nr. 18).

Iſt man Willens, das Pärchen zu behalten, ſo bringe man dieſes ſammt den Jungen in einen Nachtigalkäfig, decke denſelben ringsum zu und füttere Ameiſenpuppen und Mehlwürmer. Sind die Jungen nach etwa vierzehn Tagen ſo weit, daß ſie ſelber Futter nehmen, ſo bringe man dieſe in einen andern Käfig und laſſe das alte Pärchen von nun an allein. Will man nur das Männchen behalten, ſo iſt es nöthig, jeden alten Vogel in einen beſondern Käfig zu thun und die Jungen zu vertheilen; das Männchen ſchlägt gewöhnlich noch am gleichen Tag, wenn nicht, ſo doch am folgenden, man muß jedoch das Weibchen noch ſo lange bei den Jungen laſſen, bis dieſe ſelbſt Futter nehmen. Dann gebe man dieſem die Freiheit, woſelbſt es ſich, wenn es erſt im Juni iſt, nochmals mit einem andern Männchen part und meiſtens auch nochmals Junge züchtet. Man kann auch die ſämmtlichen Jungen dem Männchen allein belaſſen; da dieſes nicht erſt nach Futter zu ſuchen braucht, wird es keines verhungern laſſen.

Es kommt allerdings vor, daß das Männchen durchaus nicht an die Falle herangeht, um ſeine Jungen zu ätzen; dann muß man eben von dem Fang abſtehen, wenn man anders kein Junges will. Weiß man beim Fang ſchon, welches das Männchen iſt, ſo nimmt man nur ein oder zwei Junge mit, denn ohne dieſe würde es ſterben. (? D. L.). Die meiſten Grasmückenmännchen ſchlagen, indem ſie mit der Aetzung zu den Jungen fliegen, und es iſt alſo nicht ſchwer, dies zu erkennen. Die übrigen Jungen ſetze man mit dem Neſt wieder an ihren Geburtsort zurück, woſelbſt ſie vom Weibchen aufgefüttert werden. Solche Junge, die durch irgend einen Zufall ihre beiden Alten verloren haben, werden von anderen in der Nähe befindlichen Grasmücken ſofort adoptirt und großgezogen. Kommt man um friſche Ameiſenpuppen in Verlegenheit, während man die ganze Familie im Käfig hat, ſo ſei man nicht ängſtlich; es geht auch einige Tage mit in Milch geweichter Semmel, ſowie mit Käſequark und Mehlwürmern, auch hartgeſottenes Hühnerei thut gute Dienſte, jedoch ſind Ameiſenpuppen immer das Beſte. In dieſer Jahreszeit gibt es auch ſchon Beren, mit welchen die Grasmücken ihre Jungen ebenfalls füttern; es darf nur ein regneriſcher, kalter Tag ſein, ſo finden die Alten nicht genug lebende Inſekten, ſie kommen jedoch nicht in Verlegenheit, ſondern füttern die Jungen mit Erdberen oder Heidelberen; im Käfig iſt es jedoch beſſer, dieſe nur im äußerſten Nothfall zu reichen, da die Jungen ſonſt den Käfig zu ſehr beſchmutzen, und die Reinigung desſelben zu oft nothwendig wird. Einzelnen Grasmücken gebe man aber Beren, ſo viel ſie nehmen wollen, ſie freſſen ſie alle ſehr gern.

Junge Grasmücken ſind auch leicht ſelbſt aufzuziehen, beſonders wenn ſie im richtigen Alter ausgenommen werden, und die beſte Zeit hierfür iſt, wenn die Kielfedern aufgebrochen und ſogenannte Pinſel haben, da ſperren ſie ſehr gut; man füttert ſie ebenfalls mit friſchen Ameiſenpuppen und einigen Mehlwürmern des Tags, auch mit in Milch geweichter Semmel und hartgekochtem Ei darunter. Sind die Jungen ſchon zu groß, ſo ſperren ſie nicht mehr und man iſt genöthigt, ſie ein oder zwei Tage zu ſtopfen, bis ſie wiſſen, was es gibt, dann ſperren ſie auch. Sehr gern nehmen die Grasmücken auch die kleinen Roſinen, die man unter den Kuchenteig mengt und mit bäckt; die großen zerſchneide man aber, ehe man ſie füttert. Die jungen Männchen ſind bald zu erkennen, denn ſie fangen ſchon nach zwölf bis vierzehn Tagen an zu dichten, und man kann dann die Weibchen, ſobald ſie ſelbſt Futter nehmen, in Freiheit ſetzen. Geſanglich werden die Jungaufgezogenen ſeltener gute Schläger, beſonders wenn ſie keinen Vorſchläger haben, und wenn auch dies der Fall iſt, ſo werden ſie nie einen richtigen Waldgeſang zu Stande bringen, im übrigen werden ſie jedoch ſehr zahm und ſingen ſehr fleißig, faſt das ganze Jahr hindurch, oft mitten in der Nacht, wenn man ſie zum Licht ſtellt.

(Schluß folgt.)

Briefliche Mittheilungen.

... Kaum ſind die erſten Frühlingsboten unter unſeren lieblichen Sängern in die Heimat zurückgekehrt, und ſchon beginnt in den Tageszeitungen wieder das alte Lied von der Unmenſchlichkeit und Grauſamkeit, die darin liege, ſolch liebliche Geſchöpfe der Freiheit zu berauben, ſie in enge Käfige zu ſtecken wo ſie bald vor Gram u. a. dahin ſtürben. Als einen kleinen Beitrag, um wie viel beſſer es unſere Lieblinge in den Händen eines verſtändnißvollen Pflegers haben, ein wie hohes Alter ſie erreichen, theile ich Ihnen mit, daß ein Mitglied des hieſigen „Singvögel-Klubs“, Herr Helbig, in letzter Sitzung eine Gartengrasmücke (Sylvia hortensis) vorzeigte, welche uns allen durch ihr prächtiges Gefieder und feurigen Schlag auffiel. Unſer Erſtaunen war kein geringes, als uns der betr. Herr mittheilte, er habe dieſelbe vor 18 Jahren als Hochzeitsgeſchenk erhalten. Ob wol in der Freiheit ein ſolcher Vogel auch nur annähernd dies hohe Alter erreicht? Ich glaube kaum, ſonſt müßte ihre Zahl viel größer ſein.

Arno Gary.

(Sie haben vollkommen Recht. Solche Beiſpiele müſſen häufiger veröffentlicht werden, um den boshaften und ſinnloſen Angriffen, die gerade jetzt gegen die Liebhaberei gerichtet werden, ſachgemäß entgegenzuwirken. D. L.)

Anfragen und Auskunft.

Freifrau H. von Witsdorf: 1. Bisher hat ſich jeder Fall von angeblicher Uebertragung von Papageienkrankheiten auf Menſchen als „Ente“ herausgeſtellt; wer den Papagei aus ſauberer Hand kauft und ſauber hält, braucht nichts zu befürchten. Leſen Sie über die angeblichen Uebertragungen in dem Artikel des Herrn Fleiſchmann nach. 2. Bei zahmen Hunden muß man es vermeiden, ſie mit der Hand an die Schnauze zu faſſen, denn es ſind ja thatſächlich Fälle vorgekommen, daß die ſog. Hundewürmer auf Menſchen, zumal Kinder, übertragen wurden; indeſſen iſt doch auch hier die Gefahr nicht ſo bedeutend — denn ſonſt müßten wol unzählige liebevolle Hundepfleger und -Pflegerinnen an ſchwerer Krankheit leiden, was bekanntlich nicht der Fall iſt. 3. Loris von den blauen Bergen werden hier ſtets im Anzeigentheil angeboten.

Herrn Otto Büſing, stud. med.: Hängen Sie den beiden Meiſenparen für alle Fälle noch neue Käſten zu den alten; es könnte ſonſt der Zufall wollen, daß ſie Ihren Garten verlaſſen und das würde Ihnen doch ärgerlich ſein.

Herrn A. Knepperger: Bieten Sie dem Vogel einmal Hanf an, wenn er ihn nicht anders nimmt, gequetſcht; miſchen Sie die vollen Körner mit den gequetſchten. Im Nothfall rathe ich zu Sonnenblumenkörnern, die wird er ſicher annehmen.

Herrn Franz Zugbaum: Das Abfeilen der Schnabelſpitze müßten Sie von einem Sachverſtändigen vornehmen laſſen und natürlich ſehr vorſichtig und mit ſcharfer Scheere; noch beſſer als letztere eignet ſich eine Zange, wie ſie Dentiſten gebrauchen, damit müſſen Sie die unnatürliche Spitze ſcharf abkneifen; nach dem Beſchneiden müſſen die Ränder gut abgefeilt werden. Sie ſelbſt müſſen den Vogel halten (mit einem Tuch umhüllt) und Jener die Prozedur vornehmen.

Herrn H. Hoeſte: 1. Die Antwort auf Ihre erſte Frage haben Sie wol in der vorigen Nummer gefunden. 2. In den großen Käfig von den angegebenen Maßen können Sie je einen Zeiſig, Stieglitz, Hänſling und Girlitz, wol auch noch mehr einzelne Männchen einſetzen, wenn Sie viel Strauchwerk anbringen. Futternäpfe an mannigfaltigen Stellen befeſtigen und die Geſellſchaft gut überwachen, jeden Störenfried entfernen.

Bücher- und Schriftenſchau.

Franz Anzinger, Die unterſcheidenden Kennzeichen der Vögel Mitteleuropas in analytiſchen Beſtimmungs-Tabellen. In Verbindung mit kurzen Artbeſchreibungen und Verbreitungsangaben. Bearbeitet von Franz Anzinger, herausgegeben vom Verein für Vogelkunde in Innsbruck.

Vorliegendes Büchlein bietet eine ſyſtematiſche Ueberſicht aller Vögel Mitteleuropas nebſt Beſchreibungen ihres Gefieders, des Jugendkleids, des Verbreitungsgebiets und der Brutzeit. Als Nachſchlagebuch können wir es jedem Liebhaber, der in Wald und Flur die heimiſche Vogelwelt beobachtet, warm empfehlen.

Briefwechſel.

P. 776. Herzlichſten Dank für die hochintereſſanten Berichte aus Südafrika! Für Mittheilungen über Aegintha cyanogaster, A. erythronota und Spermestes erythrocephala werden wir Ihnen ſehr dankbar ſein.

Zu unſerm Bilde.

Das Weibchen des grauen Steinſchmätzers (Saxicola oenanthe, *L.*) iſt ein wenig kleiner als das Männchen, oberſeits röthgrau, Stirn und Augenſtreifen ſchmutzig weiß, Zügel mattſchwarz, Unterſeite lichtbräunlich roſtfarben, Flügelfedern röthlich gekantet, Schwanz röthlich weiß. Zur Brut ſchreitet das Pärchen zweimal im Jahr; die erſte findet im Mai, die zweite Ende Juni, zuweilen erſt im Juli ſtatt. Das Neſt wird in Steinhaufen, Felſenritzen, unter hohlen Ufern und alten Stämmen, auch in hohlen Aeſten gebaut und zwar aus Halmen, Wurzeln und Faſern, nebſt Haren, Wolle und Federn locker geformt. Das Gelege beſteht aus fünf bis ſieben weißlichgrünen Eiern. Die Brutdauer beträgt dreizehn Tage. Das Jugendkleid iſt oberſeits hellbraun, roſtroth gefleckt, unterſeits roſtgelb, dunkelbraun gepunktet oder geſchuppt. Auch nach der erſten Mauſer bleibt die röthliche Rückenfarbe und geht erſt im zweiten Jahr in Grau über.

K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Neu! **Senſationell!**

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, ohne Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [913] **Edmund Schiewick**, Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

Futtermittel.

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche inſektenfreſſende Singvögel.

Nach dem Ableben meines Mannes habe ich die Anfertigung des von demſelben zuſammengeſtellten **Rheiniſchen Univerſal-Miſchfutters** dem Herrn **Ernst Hanke** in **Trier** a. M. übertragen, welcher dasſelbe unter dem Namen

Rheiniſches Univerſal-Miſchfutter
für inländiſche und ausländiſche inſektenfreſſende Singvögel von Apotheker
Max Kruel,

weiter verſenden wird.

Für das meinem ſel. Manne bisher bewieſene Wohlwollen ſpreche an dieſer Stelle der verehrl. Kundſchaft meinen wärmſten Dank aus und bitte ſolches auch auf ſeinen Nachfolger übertragen zu wollen.

Otterberg, Rheinpfalz, den 1. Mai 1899.
Hochachtend
Frau Apotheker Max Kruel.

Bezugnehmend auf obige Anzeige halte mich bei Bedarf von **Rheiniſchem Univerſal-Miſchfutter** angelegentlichſt empfohlen.

Das Rheiniſche Univerſal-Miſchfutter wird genau in der bisherigen Weiſe, wie von Herrn Apotheker **Max Kruel** zuſammengeſtellt, angefertigt werden.

Mein Beſtreben wird es ſein, mir ebenfalls das Vertrauen der verehrl. Kundſchaft durch prompte und ſorgfältige Lieferung zu erwerben. [914]

Trier, Moſel, den 1. Mai 1899.
Hochachtend
Ernst Hanke.

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen **inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ.** Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpaketen franko, garantirt [915] ſandfrei.

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Sonnenblumenkerne,

per 5 Kilo 2,50 ℳ, per 50 Kilo 20,— ℳ

Ameiſeneier Ia,

per 5 Kilo 14,— ℳ, per Kilo 3,— ℳ

[916] **Sommerrübſen Ia, ſüß,**

per 5 Kilo 2,20 ℳ, per 50 Kilo 18,— ℳ

empfiehlt **Carl Kämpf, Mainz.**

Mehlwürmer,

ſtaubfrei, à Ltr. ℳ 4,50, Ko. ℳ 8, **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Ltr. 90 ₰, bei 10 Ltr. 85 ₰; I bei 5 Ltr. 70 ₰, bei 10 Ltr. 65 ₰ empfiehlt u. verſ. geg. Nachn. [917]
C. O. Streckenbach, Breslau.

60 Mehlwürmerkiſten,

circa 75 : 50 : 30 cm — innen mit Zinkblech ausgeſchlagen, theils leer, theils im vorigen Jahre neu beſetzt, ſtehen wegen Aufgabe der Zucht zum Verkauf.
[918] **Lehmann,**
Breslau, Lehmdamm 66, I.

Mehlwürmer in guter, ſauberer Ware, das Liter 5 ℳ, Kilo 8 ℳ. Verpackung frei. [919]
Carl Bertram, Elberfeld, Brüderſtr. 8.

Vögel.

Sehr ſeltene ruſſiſche

Weiden-Sproſſer

aus den Uferpflanzungen verſchiedener großer Stromgebiete des fernen europäiſchen Nordoſtens und Nordweſtens zu 20 bis 35 ℳ;

feine
Au- u. Wald-Sprosser

verſchiedener Gebiete u. Länder zu 12 bis 18 ℳ, ſowie **gewöhnliche Sproſſer** zu 7 bis 10 ℳ, direkt von Ort und Stelle durch den ſeit vielen Jahren allſeitig als ſtreng reell bekannten und ſtets fachmänniſch bewährten Spezialiſten

Mathias Rausch,
[920] **Wien VII 3,**
Schottenfeldgaſſe Nr. 95.

Amerik. Spottdroſſel

20 ℳ, Singdroſſel 10 ℳ, ff. Säng., tadelloſes Geſied. Tauſche Schama- u. Dayaldroſſel. Rothkehlchen, Rohrſänger, Zaun- und Dorngrasmücken, Trauerfliegenfänger, à 2 ℳ. Tauſche Prachtfinken. [921]
M. Zierer, München, Parkſtr. 31/I.

Harzer Edelroller,

tieftourenreich u. weltbekannt, liefere überall hin. Der Preis richtet ſich nach Geſangsleiſtung, à St. 7, 8, 10, 12, 15 bis 30 ℳ. Verſandt unter Nachnahme. Garantie für geſundes Ankommen. [923]
Joh. Wink, Dresden-A., Marſchallſtr. 37.
Züchterei hochedler Kanarien, gegr. 1885. Goldene u. ſilberne Medaillen. Viele Dankſchreiben.

Saiſon-Offerte!

Sproſſer, je nach Geſangsleiſtung,	8—15	ℳ.
Nachtigalen, „ „	3—6	„
Schwarzplättchen u. Sprachmeiſter	4—5	„
Garten- und Sperbergrasmücken	3—5	„
Müller- und Dorngrasmücken	2—3	„
Braunellen und Bachſtelzen	2—3	„
Wieſen- und Steinſchmätzer	2—	„
Wieſen- und Baumpieper	3—	„
Fitis- und Weidenlaubſänger	2—	„
Schwarz-, Grau- u. Golddroſſeln	5—10	„
Roth- und Blaukehlchen	2—5	„
Haus- u. Gartenrothſchwänzchen	2—6	„
Droſſel-, Schilf- u. Sumpfrohrſäng.	3—5	„
Rothrück. Würger, ausgez. Spötter	2—3	„

Außerdem großes Lager in Meiſenarten, Finken, Ammern, Lerchen u. ſ. w.

Täglich Eingang von Seltenheiten.

Nur tadelloſe Vögel kommen zum Verſandt. Friſche, ſowie prima getrocknete Ameiſeneier, Muſca, Weißwurm, Mehlwürmer ſtets am [924] Lager zu Tagespreiſen.
W. Hiltmann,
Berlin S., Dresdenerſtraße 23.

Sproſſer, Grasmücken, Rohrſänger ꝛc.

halten ſich in unſeren **neu** konſtruirten Käfigen Nr. 62 u. 63 beim **beſtem Wohlbefinden.**

Nr. 62 40×23×19 3,50 ℳ
„ 63 60×26×25 4,80 ℳ
Metallkäfig mit Holzunterſatz, Zinkſchieber und Ledertuchdecke.

Gefällig und ſehr ſolid gearbeitet. Vorhang zum Eingewöhnen 75 ₰.
Arthur Herrmann & Cie.,
[925] **Oſchatz** i. Sa.

Empfehlen garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende

Sproſſer

à Stck. 9—12 ℳ, ſowie

Nachtigalen

4—6 ℳ und alle Arten

Grasmücken

unter Garantie lebender Ankunft. Preisliſte gratis.

Friſche Ameiſeneier,

pr., ohne Gehölz, Sand und Ameiſen, à Ltr. 1.40 ℳ, dto. 1.20 ℳ II. Qualität.
[926] **Gebr. Haas,** Vogelexportgeſchäft,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

ff. Harzer Kanarien-Vögel,

Hohl- u. Knorr-Vögel, ſowie Klingel- u. Schaukel-Roller ohne Fehler 15, 20 u. 25 ℳ, geb. dieſelb. 14 Tage a. Probe, jedoch p. Nachn. od. Betrg. vorher, nicht gefall. Vögel tauſche um od. zahle zurück. Preisliſte frei. [927]
L. G. Müller, Vogelzüchterei, **Nordhauſen a. H.**
NB. Junge von dieſem Jahr à Stck. 5 ℳ, 6 Stck. 25 ℳ, 12 Stck. 48 ℳ, frei dort.

1 Par Pariſer Trompeter,

hochgeſtellt, raſſige, äußerſt brutluſtige Thiere, 98er Zucht, für 20 ℳ zu verk.
W. Giessmann, Magiſtrats-Aſſiſtent,
[928] **Saalfeld** i. Thür.

Die Samen-Großhandlung

von

Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [922]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Anzeigen.

Zur Lieferung ihrer Lieblinge empfiehlt ſich den P. T. Herren

Vogelliebhabern

die beſtbewährteſte, ſtreng reelle Vogelhandlung von [929]

Gottlieb Wanek, Prag 411, I.

Feine

Singvögel

und zwar Sproſſer aller Raſſen, insbeſondere auch **echte** David-Sproſſer, welche den Davidruf **wirklich** ſchlagen, von 9—35 ℳ, Nachtigalen 4—9 ℳ, **Gebirgsſchwarzköpfe** 3,50—9 ℳ, Gelbſpötter 4—8 ℳ, Sumpfrohrſänger 4—5 ℳ, Blaukehlchen 4—7 ℳ, Rothkehlchen 1,50—5 ℳ, Garten- u. Sperbergrasmücken 3,50—6 ℳ, Würger, rothrückige, rothköpfige und Grauwürger 3—5 ℳ, ſowie überhaupt alle Sorten Weichfuttervögel empfiehlt unter üblicher Gewähr

Mathias Rausch,
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der
[930] beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Preisliſte koſtenlos und poſtfrei bei Angabe über welche Vogelart.

Nachtigalen,

Schwarzköpfe,
Sperbergrasmücken,
Gartengrasmücken,
gelbe Spötter,
rothköpfige Würger,
Kappenammern,

Stück 3 ℳ, **Dorngrasmücken, graue Würger,** Stück 2 ℳ, **Steinröthel,** Wildfang, 9 ℳ, **Sproſſer** 8—10 ℳ liefert unter voller Garantie für Männchen und Geſang

G. Findeis,
[931] **Wien I,** Wollzeile 25.

Stieglitz, Hänfling, Zeiſig, Buchfink à 1,50, **Grauer Kardinal,** Prachtgefied. 4 ℳ, **Hochrothe Dompfaffen** à 4 ℳ, **Singdroſſel,** brillante Rufe, David-Kuhdieb ꝛc., nur 10 ℳ.

Blauſtirn-Amazone in wirklichem Prachtgefieder, für Ausſtellungen ſehr geeignet, ſpricht viel, kein Schreier, **gibt Pfote, kommt auf Hand,** nur 30 ℳ.

Anfragen mit Rückporto. Verpackung frei. Alle Vögel ſind in vollem Geſang, kerngeſunde Männchen. **Kleiner Luxushund,** ſehr ſcharf auf Mäuſe und Ratten, ſehr wachſam und ſtubenrein, macht ſchön, gibt Pfote, geht auf Hinterbeinen, klettert auf Leiter ꝛc., nur in gute Hände, Ausnahmeofferte nur 30 ℳ.

H. Noack,
[932] **Friedeberg,** Nm., Markt 105.

Geſucht:

Dreifarb. Papagei-Amandine Wbch., **Binſen-Aſtrilde** Wbch., **Madagaskar-Weber** Wbch., **Orange-Weber** Wbch., Pärchen **rothköpfige Papagei-Amandinen.**

Hugo Dicker,
[933] **Halle** a. S., Landwehrſtr. 21.

Größte Seltenheit.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe einen **blaubärtigen Blattvogel** (Phyllornis Hardwicki), **tadellos im Gefieder, in vollem, lautem Geſang,** 1 Jahr im Käfig. Preis 120 ℳ. Gebe auch eine Orpheusgrasmücke für 12 ℳ ab. Leb. Ank. gar.

[934] Fabrikbeſitzer **F. Weber,**
Göttingen, Reinhäuſer-Chauſſee 26.

Verkaufe:

2 **Wolf'ſche** u. 1 **weißſterniges Blaukehlchen** à 5 ℳ, 1,0 **Gartengrasmücke,** 1,0 **Gelbſpötter** à 7 ℳ, 1,0 **Gebirgsbachſtelze** 5 ℳ, 1,0 **Wieſenpieper** 3 ℳ. **Alles tadelloſe, eingewöhnte Vögel.** [935]

H. Kestermann,
Leipzig, Pontſtraße 9 III.

Aus der Winter-Voliere habe abzugeben: 1 Pärchen Hänflinge, Mnch. vorzügl. Sänger, 2 ℳ, 1 Blaumeiſe 1,50 ℳ, 1 Pärchen Stieglitze 2 ℳ, 1 Buchfink 1 ℳ. Sämmtlich tadellos im Gefieder. [936]

L. Aeldert, Düſſeldorf, Ackerſtr. 153.

Holländer Kanarien-Vögel,

mit dem I. Preis prämirt, zu verkaufen, auch gegen gute Harzer getauſcht.

[937] **Joh. Weiss,**
Wien XVI/I, Hertlovgaſſe 28.

Nur für Händler!

Noch 1000 P. **Schwarzkopfnonnen,** à P. 75 Pf., dieſelben nicht unter 25 P. **Zebrafinken,** à P. 2.90 ℳ. **Japan. Mövchen,** à P. 1.90 ℳ. **Bandfinken, Muskatfinken, Aſtrilde, Orangebäckchen, Orangebrüſtchen, Schmetterlingsfinken,** alle à Par 1.80 ℳ. Reelle Bedienung. [938]

L. Swinnen, Aachen.

1898 erhielt mein Stamm Harzer **Kanarienvögel 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille.** Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ. u. Gar., 8 T. Pr.
Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [939

Ungar. Nachtigalen,

die beſten Gebirgsſchläger, ſofort ſingend, à St. 2.50 ℳ, ½ Dtzd. 12 ℳ, **Sp.-Grasmücken,** à 2 ℳ, ½ Dtzd. 10 ℳ, **Schwarzplattln,** à 3 ℳ, **Wachteln,** g. Schläger, Dtzd. 7,50 ℳ, **Rieſen-Kolkraben,** à 4 ℳ. [940]

N. Muschnu, Temesvar, Ungarn.

Eine preiswerthe Drahtvoliere, (g. neu) Holzſockel mit Zinkeinſatz, 89 cm h., 82 cm l., 37 cm t., u. dazu ein Abſperrkäfig, 22 □cm, 25 ℳ. 5 Stück neue Drahtkäfige, Holzſockel, 42 cm l., 35 cm h., 23 cm t., à Stück 2 ℳ. Volieren u. Käfige f. Exoten. Eine Singdroſſel, g. Sänger, geſund u. gut befied., 4 ℳ. Im Ganzen gekauft, Geſammtpreis 35 ℳ. Verp. frei. Garantie f. doppelten Werth. Auswahl. brieſl.

A. Klupsch,
[941] **Görlitz,** Auguſtaſtraße 20.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franko. [942]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Zur Reactivirung Berlin. Ziegen ꝛc.-Meierei u. -Zucht, ſuche Theilnehmer mit 10 Mille, **unverlierbar, 200 %** Gewinn. Abſolute Nothwendigkeit. Offert.
Ed. Reuter, Berlin, Calvinſtr. 28. [943]

Bücher-Anzeigen.

Verkaufe „Gefied. Welt“, Jahrgang 1895 14.—52., 1886 vollſtändig, Handbuch Dr. Ruß, I u. II, gebd., à 4,50. Offerten **mit Angeboten unter V. B. R. poſtlagernd** Erfurt. [944]

Auf vielſeitiges Verlangen habe ich

die wichtigſten Regeln
über
die rationelle Behandlung
aller hervorragenden europäiſchen
Singvögel,

wie Sproſſer, Nachtigalen, Gelbſpötter, Schwarzplättchen, Grasmücken, Steinröthel u. ſ. w. im Drucke erſcheinen laſſen. — Dieſelben wurden von mir auf Grund reicher Erfahrungen nach einer 35jährigen — an tauſenden dieſer Vögel erprobten — Praxis kurz zuſammengeſtellt und können daher jedem Liebhaber der genannten Vögel bei deren Käfigung, Wartung und Verpflegung als **vollkommen verläßlicher** Rathgeber dienen. —

Dieſe kleine Druckſchrift iſt von mir direkt erhältlich und ſteht allen meinen verehrten p. t. Kunden **koſtenlos und poſtfrei** zur Verfügung.

Mathias Rausch,
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der
[945] beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Weg. Aufgabe d. Liebhaberei

verkaufe: Jahrgang 95, 96, 97 der „Gefiederten Welt“, gebunden, à 4 ℳ, ½ Jahrg. 98, ungeb., 1,50 ℳ. Die Prachtfinken von Karl Ruß, ſtatt 6,50 3 ℳ. Der Wellenſittich, ſtatt 1 ℳ 60 ₰. 2 Mehlwurmkiſten, ſeit einem Jahr unberührt, dicht bevölkert, nach Vereinbarung. [946]

Paul Schlenert, Oppeln.

Für Aquarienliebhaber!

Im unterzeichneten Verlage erſcheint

Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde

herausgegeben von **Dr. E. Bade.**
(Monatlich zwei Nummern!)
Preis: halbjährlich Mk. 2.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in **Magdeburg.**

Der heutigen Nummer liegt ein Verlagsproſpekt der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung (M. Kretſchmann) in Magdeburg bei.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 21.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler

von

Dr Karl Ruß.

Preis: vierteljährlich
(13 Nummern mit Abbildungen)
M. 1.50.

Magdeburg
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretſchmann).

Einzelpreis der Nummer
20 Pfg.

Inhalt der Nr. 21.

Nachtigal und Sprosser als Stubenvögel.
Selten gehaltene einheimische Vögel (Schluß).
Aus meiner Vogelstube.
Etwas über begabte Graupapageien (Schluß).
Der beste Käfig für Weichfresser.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Berichtigung.
Zu unserm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg sowie in allen Annoncengeschäften.

Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen **bis spätestens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg sein.

Die 3gespaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthschaften.

50% Eier mehr durch Knochenschrotfütterung.
Knochenmühlen für Hühnerzüchter v. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,**
[947] Waren i. Mecklenb.
Prospekte gratis.

C. L. Flemming

Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [948]

Man verlange Preisliste.



Man verlange Preisliste.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Eine preiswerthe Drahtvoliere, (g. neu) Holzsockel mit Zinkeinsatz, 89 cm h., 82 cm l., 37 cm t., u. dazu ein Sperrkäfig, 22 □cm, 23 ℳ. 5 Stück neue Drahtkäfige, Holzsockel, 42 cm l., 35 cm h., 23 cm t., à Stück 2 ℳ. Volieren u. Käfige f. Exoten. Eine Singdrossel, g. Sänger, gesund u. gut befied., 4 ℳ. Im Ganzen gekauft, Gesammtpreis 35 ℳ. Verp. frei. Garantie f. doppelten Werth. Ausk. briefl.

A. Klupsch,
[949] **Görlitz,** Augustastraße 20.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** f. m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1.50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [950]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Für alle Arten Vögel fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niststutensilien

an (höchst prämirt mit goldenen und silbernen Medaillen, zuletzt die höchste Auszeichnung für praktische Käfige, den Statspreis). — Große, reich illustrirte Preisliste versende gegen Einsendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieser Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliste gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elsasserstr. 78, Ecke Ackerstr.
Spezial-Fabrik wirklich praktischer Vogelkäfige. [951]

Hermann Schramm's

mechanische

Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, sind das anerkannt beste Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit ersten Preisen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illustrirte Preisliste nebst Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [952]

Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerstr. 45.

Natur-Schlafkästen St. 60 ₰
Natur-Nistkästen „ 60 „
Universalfutter für Drosseln und alle größeren Insektenfresser Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Insektenfresser Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [953]
Mehlwurm-Heckkisten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckansatz Ltr. 1 ℳ. Anlt. gratis vers. **Gebr. Jansen,** M.-Gladbach 112.

Käfige jeder Art

fabrizirt und empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
Oschatz i. S.

Man achte genau auf unsere Firma und verlange unsere **vollständig neue** Preisliste, ausgearbeitet von unserm Mitinhaber
Arthur Herrmann. [954]

Vogelkäfige

aller Art,
Zuchtvolieren, Nistutensilien,
unerreicht in praktischer Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [955]
Illustrirte Preisliste kostenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Neu! Sensationell!

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausdrücken für jede Vogelstimme einzurichten, automatisch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Wasser- und Luft-Kessel, in elegantem Renaissance-Gehäuse m. Resonanzboden, empfiehlt
[956] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachsen.
Bitte Prosp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

Der beste Fangapparat

für kleine und größere Vögel ist mein selbstthätig sicher fangendes Schlagnetz. Beschädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinsendung des Betrags. [957]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Wegen Aufgabe d. Liebhaberei

ist ein nur kurze Zeit gebrauchter, grün lackirter **Etagenkäfig,** bestehend aus vier abnehmbaren Finkenkäfigen, ganz aus Metall, mit je einer Zinkschublade und gemusterten abnehmbaren Glaswänden, sowie **2 Hänflinge** und **1 Zeisig,** gute Sänger, für den billigen Preis von 15 ℳ zu verkaufen.
[958] **Otto Nessler, Zschopau.**

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Beſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 21. Magdeburg, den 25. Mai 1899. **XXVIII. Jahrg.**

Nachtigal und Sproſſer als Stubenvögel.

Von Fr. Anzinger.

Seit der längeren Reihe von Jahren, in denen ich Leſer der vorliegenden Zeitſchrift bin, ſind in derſelben bereits mehrmals ſehr gediegene Aufſätze über die Eingewöhnung und weitere Verpflegung unſerer beſten einheimiſchen Singvögel veröffentlicht worden, und es ſcheint ſomit nahezu überflüſſig, ein derartiges, ſchon ſo oft abgehaſpeltes Thema nochmals durchzunehmen. Mit Rückſicht auf den ſtets wechſelnden, bzl. zunehmenden Leſerkreis und die Verſchiedenheit der Anſichten innerhalb der großen Gilde der Stubenvogelpfleger darf und wird indes eine ſolche Wiederholung gerechtfertigt erſcheinen; im vorliegenden Fall umſomehr, als ſie auch von hieſiger, in vieler Hinſicht von anderweitigen Anſchauungen abweichender Vogelpflege und Geſangsbewerthung berichten will von welcher bisher noch ſehr wenig in die Oeffentlichkeit gedrungen iſt.

Ich geſtatte mir nämlich, das Weſentlichſte über die Eingewöhnung und Verpflegung von Nachtigal und Sproſſer, wie ſie hier in Innsbruck und in Salzburg ſeit langen Jahrzehnten mit Erfolg gepflogen wird, ſowie Einiges über deren Geſang und die Bewerthung deſſelben mitzutheilen.

Zur leichtern Ueberſicht ſtelle ich die Artbeſchreibungen einander gegenüber:

Nachtigal.	**Sproſſer.**
Erſte Handſchwinge breit und ſtumpf; Schwanz faſt gerade abgeſchnitten; die Unterſchwanzdeckfedern nicht gebändert; die Bruſt ohne wolkige Fleckung; Oberſeite röthlichbraun; Unterſeite trübweiß oder gelblichgrau, die Kehle (namentlich beim ♂) heller; Schwanz roſtfarbig; Geſammtlänge im Durchſchnitt 16,5 cm.*)	Erſte Handſchwinge ſchmal und ſpitz; Schwanz leicht abgerundet; untere Schwanzdecken an der Außenfahne dunkel quergebändert; Oberbruſt mit dunkelgrauer, wolkiger Fleckung, welche aber bei einzelnen Vögeln oft kaum ſichtbar iſt; Oberſeite dunkel röthlichgraubraun; Unterſeite grauweißlich; Schwanz ſchmutzig roſtbraun. Geſammtlänge 17 bis 19 cm.

Nun zum Geſang dieſer beiden Vögel. Kann die bezaubernde Schönheit und Vielſeitigkeit deſſelben in einer Weiſe geſchildert werden, daß der Unkundige durch eine ſolche Schilderung in der Art unterrichtet wird, um den Werth dieſes Geſangs ermeſſen zu können? Hierauf muß leider mit einem Nein geantwortet werden, denn die eingehendſte, gewandteſte, wortreichſte und von höchſter Begeiſterung getragene Darſtellung iſt nicht im Stande, dies zu erreichen. Es kann nur zum Verſtändniß gebracht werden, daß dieſe beiden Sänger über die höchſte Modulationsfähigkeit der Stimme verfügen, daß ſie unter allen Singvögeln die größte Differenz zwiſchen dem höchſten und tiefſten Ton beſitzen, daß ſie dieſe hohen und tiefen Noten mit der gleichen Leichtigkeit und Meiſterſchaft hervorbringen, wie die verſchiedenen weich oder hart angeſchlagenen Lautſilben, daß ihr Geſang inſofern ein harmoniſches Gepräge trägt, weil faſt alle Strofen rhythmiſch abgerundet zum Vortrag kommen und die ſo überaus verſchiedenen Geſangsfiguren in der Weiſe wechſeln, bzl. ſich aneinander reihen, daß zwiſchen denſelben eine gewiſſe Folgerichtigkeit wahrgenommen werden kann und daß ferner in dem ganzen Geſang dieſer beiden Künſtler (vorausgeſetzt, daß ſie normal ſchlagen) kein einziger Ton vorkommt, welcher das Gehör verletzt.

---

*) Ueber Variationen in der Größe an ſpäterer Stelle.

Es muß alſo der Gelegenheit überlaſſen bleiben, den einen oder andern von dieſen Meiſtern der Töne zu hören, um ſich ein Urtheil über die Schönheit ihres Geſangs bilden zu können. Manche ſchöne Leſerin indes, welche ſich in einem Roman von einer „im Gipfel der großen Dorflinde“ ſingenden Philomele erzählen ließ, die ihre „himmliſchen Lieder“, ihre „zauberhaften Melodien“, ihr „Klagen“ und „Schluchzen“ zu dem Zweck zum Beſten gab, um den Verlauf der Handlung etwas würziger zu geſtalten, dürfte vielleicht ſogar die Naſe rümpfen, wenn ſie ſtatt der erhofften himmliſchen Lieder u. a., die urwüchſigſten Töne hört, wenn der Vogel nicht einmal nach den Regeln unſers Notenſyſtems, ſondern ſo ſingt, wie es ihn von der Allmutter Natur gelehrt wurde. Daß ſolche „Enttäuſchungen“ vorkommen können, davon war ich einmal ſelbſt Zeuge. Derartige Anſichten ändern ſelbſtredend an der Sache nichts und ſind nicht zu vergleichen mit dem Urtheil ſolcher Vogelgeſangskenner, welche zwiſchen guten und ſchlechten Sängern zu unterſcheiden vermögen und welche je nach ihrem Geſchmack dieſer oder jener Art den Vorrang geben.

Lange Zeit hindurch wurde der Sproſſer von der Nachtigal artlich nicht unterſchieden, ſondern höchſtens als Unterart oder örtliche Abänderung anerkannt. Erſt 1795 wurde der Sproſſer vom Vater Bechſtein von der Nachtigal artlich getrennt und mit dem lateiniſchen Artnamen philomela getauft. Seine Bedeutung als hervorragender Sänger und ſeine weſentliche Verſchiedenheit als ſolcher von der Nachtigal ſcheint erſt in den ſechziger Jahren dieſes Jahrhunderts beſonders gewürdigt worden zu ſein, und von da an erfolgte ſein „Siegeslauf“ durch den größten Theil Deutſchlands und Oeſterreichs. Gegenwärtig ſcheint ſein Sängerruhm bereits denjenigen der Nachtigal zu überſtrahlen, und einzelne Sproſſer-„Anbeter“ gehen in ihrer übergroßen Verherrlichung dieſes Vogels ſo weit, daß ſie den Geſang der Nachtigal dem Geſang des Erſtern gegenüber als eine armſelige Stümperei bezeichnen und denjenigen belächeln, welcher ſich mit einer Nachtigal begnügt, weil er eben — kein Geſangskenner iſt. Solchen Anſichten gegenüber enthalte ich mich jeder Aeußerung, erwähne aber dafür, daß ich mich als Anhänger jener alten Gilde bekenne, welche die Nachtigal heute noch höher ſchätzt als den Sproſſer, und zwar aus folgenden Gründen:

Nicht mit Unrecht ſehen viele Vogelkenner den Sproſſer als ein Mittelding: ein Verbindungsglied zwiſchen der Walddroſſelgattung und der Gattung der Rothſchwänze an und ſtützen ihre Anſicht namentlich auf die Art ſeines Geſangs, welcher mit demjenigen der Singdroſſel (Turdus musicus, *L.*) inbezug auf die verſchiedenen Anrufe oder „Rufmarken“, wie man ſie auch zu nennen pflegt, viel Aehnlichkeit hat; er darf als eine Miſchung von Theilen des Singdroſſellieds und des Nachtigalenſchlags angeſehen werden, indem die Charakteriſtik der beiden Geſänge im Sproſſerſchlag ſich vereinigt und entſprechend abgeändert vorfindet. So wie unter den Singdroſſeln, iſt auch unter den Sproſſern ein gewiſſes Kompoſitonstalent zu Haus, aber — wohlgemerkt — nicht bei allen Vögeln zu finden. Iſt dieſe Gabe einem Sproſſer eigen, ſo ermöglicht ſie ihn, ſeinen ſonſt nicht ſehr tourenreichen Schlag bedeutend abwechslungsvoller zu geſtalten. **Gräßner** ſetzt dies durch folgende Worte auseinander: „Soviel ich von Nachtigalen und Sproſſern gehört habe, ſcheint mir feſtzuſtehen, daß die Nachtigalen, auch die größten Geſangskünſtlerinnen unter ihnen, nur feſtgegliederte Strofen, aber in verſchiedener Reihenfolge und in verſchiedenem Zeitmaß ſchlagen, je nach Stimmung und Tageszeit, während ein guter Sproſſer die ihm eigenen Strofen und Töne derart abändert, daß von einer Aufeinanderfolge beſtimmter Töne kaum die Rede ſein kann. Lautet der Schlag der Nachtigal wie eine beſtimmte, nur mit verſchiedenen Einſchaltungen und Vertönungen verwebte Weiſe, ſo erſcheint der Schlag des Sproſſers wie ein Recitativ, in welchem der Tondichter dem Sänger außerordentliche Freiheiten des Vortrags geſtattet hat und von denen dieſer ſo ausgibigen Gebrauch macht, daß man bei verſchiedenen Wiederholungen deſſelben Stücks, je nach Stimmung und Gefühl vorgetragen, dieſes oft gar nicht wiedererkennt, ſo wunderbar verändert der ausübende Künſtler. Der Eindruck iſt natürlich größer, wenn anſtatt der erwarteten Töne, Takte und Strofen ganz andere, nur aus demſelben Tonſchatz gebildete Vertönungen erfolgen. Darum gebe ich dem Sproſſer den Vorzug vor der Nachtigal, weil er nicht allein Sänger, ſondern auch Tondichter iſt, weil er die ihm von Natur verliehenen Töne ſelbſtſtändig je nach Stimmung verarbeitet.“

Wieviel ſolcher guten Sproſſer gibt es aber? Und wieviel Liebhaber kommen in den Beſitz ſolcher Vögel, welche ſich gleich nach dem Empfang oder doch wenigſtens nach einigen Jahren als vielſeitige Schläger, als ſogenannte Tondichter, hervorthun? Man darf annehmen, daß nur ein Fünftel aller Sproſſer als hervorragende Sänger gelten darf, zwei Fünftel Durchſchnittsvögel bleiben und zwei Fünftel die Durchſchnittsgüte nicht erreichen. Iſt ſchon ein Durchſchnitts-Sproſſer nicht mehr im Stand, an Vielſeitigkeit der Touren eine Nachtigal zu überbieten, ſo ſinkt der Geſangswerth bei vielen Vögeln der Art ſo tief herab, daß er für die Liebhaberei nicht mehr in Betracht kommt. Ein ſolcher Vogel darf dann wirklich als ein unfertiges Mittelding zwiſchen Nachtigal und Singdroſſel bezeichnet werden. Dieſer große Prozentſatz an unfertigen Sängern ſelbſt ſowol, als auch die bekannte häufige und ſehr merkbare Abweichung im Geſang der verſchiedenen Oertlichkeitsraſſen, führen zu dem Schluß, daß ſich die oben gerühmte Meiſterſchaft des Sproſſers nicht mit jener Stetigkeit und in jener Vollkommenheit forterbt, wie der Geſang anderer, ſogenannter Original-Sänger.

(Fortſetzung folgt.)

* * *

[illegible]

[illegible]

eines ſolchen Raubzugs einer Katze, und wurde durch das ängſtliche Kreiſchen der alten Vögel aufmerkſam gemacht; als ich näher kam, konnte ich nichts entdecken, und doch umflatterten die beiden Alten immer die Krone eines etwa zwei Meter hohen Buchsbäumchens; dieſes machte ſchwankende Bewegungen trotz völliger Windſtille; nichts Gutes ahnend, trat ich näher und ließ meinen Dachshund von der Leine, welcher ſich ſofort unter dem Bäumchen poſtirte und Standlaut gab, ebenſo ſchnell nahm ich meine doppelläufige Flinte von der Schulter. Die Katze ahnte wol bald, daß ſie in der Klemme ſaß, und ich hätte ſie ſofort herunterſchießen können, doch wollte ich dies vermeiden, da ich nicht ſehen konnte, wo ſich das Neſt der Grasmücken befand; ſie lauerte auf jeden unbewachten Augenblick, wo ſie abſpringen und flüchten könnte, doch hatte ſie mein treuer und auf alles Raubzeug „firmer“ Waldmann in den Augen. Da ich aber ſo nicht zum Schuß kommen konnte, rief ich den Hund ab, um die Katze zum Abſprung zu veranlaſſen, und wie ich ahnte, ließ ſie nicht lange auf ſich warten, ſie kam und wollte im nächſten Gebüſch Deckung ſuchen, doch ehe ſie dieſes erreichte, quittirte ſie, ſich überſchlagend, die Sprache meiner unfehlbaren Doppelläufigen. Den Schlußakt überließ ich meinem Waldmann, während ich mich nach dem Neſt und deſſen Inhalt umſah. Es enthielt vier, kaum zwei Tage alte Junge, welche noch unverſehrt waren, nur das Neſt war auf der einen Seite etwas verzerrt. Nun kamen die alten Vögel ſchleunigſt herbei, um auch Gewißheit zu erlangen, ob wieder alles in Ordnung ſei. Hätte ich dieſen Räuber nicht in's Jenſeits befördert, ſo wären ihm dieſe, wie wahrſcheinlich ſchon viele andere vorher, auch zum Opfer gefallen. — Jung aufgezogene Gartengrasmücken lernen auch fremde Melodien, und ich beſaß eine ſolche, die das Trillern einer Heidelerche nachahmte. Sie iſt ein ſehr empfehlenswerther Stubenvogel, und auch nicht ſchwieriger zu halten wie alle übrigen Grasmücken.

Zum Schluß will ich hier auch noch die Klappergrasmücke oder das Müllerchen erwähnen, da ich dieſe Art ſchon als Knabe mit Vorliebe gehalten habe. In meiner Heimath in Bayern findet man faſt in jedem Garten ein Pärchen, und ſie niſten mit Vorliebe in recht dichten Dornengebüſchen. Es iſt nun bei uns zu Haus die Sitte eingeführt, die Gartenhäuschen mit einer Art Dornen überwuchern zu laſſen, die ein ganz dichtes Dach bilden. Dort hinein, in dieſes Dickicht, bauen die Klappergrasmücken mit Vorliebe ihre Neſter. Die Behandlung dieſer Art iſt die gleiche wie bei den übrigen Grasmückenarten. Der Geſang hört ſich recht nett an, jedoch unter anderen lauten Sängern verſchwindet er, und es kommt dann nur noch das „Klapp, klapp“ zur Geltung. Sie iſt im Käfig nicht ſo ausdauernd wie die Gartengrasmücke, jedoch bei aufmerkſamer Pflege iſt ſie einige Jahre zu erhalten, wenigſtens war dies bei den meinigen der Fall. Einige Liebhaber ſagen, daß ſie alle anderen Grasmücken geſanglich an melodiſchen, abwechſelnden Tönen übertreffe, ich kann jedoch dieſer Anſicht nicht beiſtimmen. Die Jungen ſind unſchwer aufzuziehen, jedoch darf man nicht zu ſpät kommen, um ſie auszunehmen, denn ſie gehen ſehr früh aus dem Neſt. Sobald man ſich demſelben nähert, ſind ſie mit einem Ruck alle im Dornendickicht verſchwunden. Aufgefüttert werden ſie mit friſchen Ameiſenpuppen, in Milch geweichter Semmel, auch hartgekochtem Hühnerei und Mehlwürmern. Beren lieben ſie ebenfalls ſehr, wie die übrigen Grasmückenarten. Die Alten fängt man im Frühjahr im Schlaggärnchen, welches man auf das betreffende Gebüſch, wo ſie ſich aufhalten, ſtellt, und mit einem Mehlwurm beködert. In Bayern heißt dieſe Art im Volksmund einfach Heckſchmatzer.

Aus meiner Vogelſtube.

Von Hermann Caspari.

Nachdem die Putzerei in meiner Vogelſtube beendet iſt, prangt ſie z. B. (Anfang Mai) im ſchönſten Frühlingsſchmuck und herrlicher Vogelgeſang erfüllt den Raum.

Der Winter hat mir Verluſte an Vögeln kaum gebracht, nur an einzelnen Pflanzen, indem ich einige Epheuſtöcke durch friſche ergänzen mußte. Die beiden Epheuwände gedeihen herrlich und ziehen ſich jetzt bis an die Decke der Vogelſtube hinauf. Daß ich keine Verluſte an Vögeln hatte, ſchreibe ich meinem Springbrunnen zu, der den ganzen Winter über in Thätigkeit war, und ſomit ſehr zur Verbeſſerung der Luft beitrug, und dann auch, weil beſtändig friſches Waſſer zum Trinken und Baden vorhanden war. Das Springbrunnenbaſſin iſt ganz mit großen Tuffſteinen umgeben und auf letzteren befinden ſich große Platten friſchen Waldmoſes, was dem Ganzen ein ſchönes Ausſehen verleiht.

Seit langer Zeit habe ich wieder die echten Weißtannenzweige bekommen, womit die übrigen Wände ausgeſchlagen ſind. Auch ſind die Fenſter jetzt aus der Stube entfernt, und der Blick fällt durch das Drahtfenſter, das ganz engmaſchig iſt, und ſomit das Eindringen von Mäuſen und ſonſtigem Ungeziefer verhindert, auf das Grüne im Garten, was ebenfalls ſehr zur Zierde beiträgt.

Das ziemlich breite Fenſtergeſimſe habe ich ebenfalls mit Waldmos, Tuffſteinen und Flußſand belegt und hier halten ſich mit Vorliebe die Lerchen und die Steindroſſeln auf.

Die Vogelſtube bewohnen jetzt folgende Vögel: zwei Schwarzamſeln, eine Singdroſſel, eine Steindroſſel, ein Rothkehlchen, zwei Heckenbraunellen, zwei Blaumeiſen, zwei Heidelerchen, eine Feldlerche, drei Diſtelfinken, drei Buchfinken, zwei Hänflinge, ein Rohrammer, zwei rothe Kreuzſchnäbel, ein Girlitz, vier Zeiſige, zwei Grünlinge, ein Bergfink, ein Dompfaff.

Dazu kommen an fremdländiſchen Vögeln: ein rother Kardinal, ein grauer und ein Dominikanerkardinal.

An Paren fliegen frei herum: ein Par blaue Hüttenſänger, ein ſolches Sonnenvögel und ein ſolches Mozambikzeiſige.

Im Vorraum der Stube befinden ſich einzeln gekäfigt: zwei Nachtigalen, ein Gelbſpötter, ein Schwarzkopf, eine Schamadroſſel und eine amerikaniſche Spottdroſſel; außerdem noch ein Par Wellenſittiche und zwei Par chineſiſche Zwergwachteln.

Für die Zwergwachteln habe ich für jedes Par einen großen Laufkäfig eingerichtet, ausgeſtattet mit Mos, Tuffſteinen und Korkrinde, und ich kann zu meiner Freude Ihnen berichten, daß das eine Pärchen in einer Ecke des Käfigs aus Mos und Gras ſich ein Neſt gemacht hat, in welchem bis heute (5. Mai) das fünfte Ei liegt. Auch das andere Par ſchickt ſich zum Neſtbau an, und ſo hoffe ich auf einen kleinen Erfolg umſomehr, als ich jetzt das beſte Aufzuchtfutter habe, nämlich friſche Ameiſeneier.

Meine Inſektenvögel füttere ich noch bis zum Eintritt der wärmeren Witterung mit einem Miſchfutter, das ich wie folgt zuſammenſetze: Ia getrocknete Ameiſenpuppen, Weißwurm und Karottengries, alles mit kochendem Waſſer überbrüht, und nach zehn Minuten auf einem Harſieb abgelaſſen und gekühlt, hierauf feſt ausgedrückt und darunter gemiſcht: Kruel'ſches Univerſalfutter, Musca, und hier und da etwas fein geſchabte Sepia, ſowie etwas gequetſchten Hanf, alles zu einer lockeren Maſſe vermengt. Sobald es heiß wird, füttere ich blanke friſche Ameiſenpuppen unter Weglaſſung der Mehlwürmer. Auch reiche ich im Winter viel Obſt, was ſehr gern genommen wird, namentlich von Amſeln und Schwarzköpfen. Meine Schama- und Spottdroſſeln bekommen als beſondere Delikateſſe allerlei lebende Kerbthiere, welche jetzt reichlich zu erlangen ſind. Die Körnerfreſſer erhalten allerlei Sämereien, ſowie Grünzeug, auch Mehlwürmer.

So hoffe ich, daß ich meinen Vögeln ein einigermaßen erträgliches Daſein bereite, was z. B. der herrliche Geſang meiner Pfleglinge beweiſt.

Etwas über begabte Graupapageien.

Von Frau R. Siegmund.

(Schluß).

Als „Lorchen" einmal, auf einer Stuhllehne ſitzend, mit großem Behagen eine Kirſche ſchmauſte, ſchlug die vorübergehende Pallas ihr mit dem Schwanz die Frucht aus dem Schnabel; „na, na, na, Pallas, was iſt das", ſchallt der Papagei, kletterte von ſeinem Sitz herab und holte ſich ſeine Kirſche wieder. Ein anderes Mal wollte der Vogel, auf ſeinem Waſſernapf ſitzend, einige turneriſche Kunſtſtücke ausführen, glitt aber auf dem naſſen Porzellangeſchirr aus und wäre beinahe heruntergefallen. Sofort drehte er ſich herum und zankte auf den Trinknapf los: „Na, na, dumme Lopapa, was iſt das, wart', ich will Dir!" „Lopapa" iſt eine Erfindung Loras, die ſie ſich aus den Wörtern Lora und Papa geſchaffen hat und meiſtens im Aerger anwendet. Als ich in lautes Lachen ausbrach, lachte ſie augenblicklich aus vollem Halſe mit. Großes Vergnügen bereitet es ihr jeweilen, wenn die Hunde die unter ihrem Käfig verſtreuten Maiskörner aufleſen und dabei manchmal ihre Köpfe empfindlich gegen die Tiſchplatte ſtoßen; da läßt ſie ein ſchadenfrohes Gelächter hören und ruft dazu: „Oh, oh, oh!"

Hat ſie etwas Strafbares begangen, z. B. Gegenſtände zerbrochen oder zernagt, und ich drohe ihr mit ſcheltenden Worten, ſo lacht ſie und ruft laut und höhniſch: „Ja woll!" Erhebe ich einen Stock gegen ſie, ſo ſchreit ſie dagegen ängſtlich: „Nein, nein, nein", während ſie, wenn ich in warnendem Ton „Lora" ſage, ſofort ſich nach mir umwendet und ganz keck fragt: „Was iſt, was iſt denn?", was den ärgſten Hypochonder zum Lachen bringt.

Bin ich nicht im Zimmer anweſend, ſo vermißt mich der Vogel bald und fragt ängſtlich: „Wo iſt die Mama?" oder „Olga, wo iſt die Mama?" Hier und da fragt er auch „Wo iſt die Olga?" Antworte ich „Olga iſt fort," ſo ſagt Lora „So, ſo", fragt aber gleich weiter „Und wo iſt die Shiela?" (eine meiner Tochter gehörende Collierhündin). Sage ich: „Shiela iſt auch fort", ſo erwidert ſie langſam, als ob ſie darüber nachdächte: „Ja – ja!" — Bleibt ſie bei ihren beſtändigen Kletterübungen irgendwo hängen, klemmt ſich eine Zehe ein oder thut ſich anderswo weh, ſo ſagt ſie kläglich, wie ein weinendes Kind: „Au, au"; daſſelbe Wort wendet ſie aber auch an, wenn ſie für gelegentliches Beißen, das ſie ſtets Fremden gegenüber ſich erlaubt, durch Hiebe auf den Schnabel beſtraft wird, ebenſo wenn ſie beim Spielen hier und da ſich hinreißen läßt, mich unſanft zu kneifen, und es ſieht dann ungeheuer komiſch aus, wenn ſie mit zurückgebogenem Kopf, den Blick unverwandt auf meine Mienen geheftet, gewiſſermaßen vorbeugend, ihr „au, au" hören läßt. Verirrt ſich einer meiner zahmen Vögel, die ich täglich einige Stunden aus ihren Käfigen laſſe, gelegentlich in ihren Käfig, ſo wird ſie böſe und droht mit ihrem zarten Kinderſtimmchen dem Eindringling: „Wart' Du, wart' ich will Dir, wart' ich komm'", u. a.

Einen großen Beweis von Intelligenz legt ſie bei folgender Gelegenheit ab. Ueber Nacht wird ihr Käfig regelmäßig mit einem großen Tuch verhüllt, das ich am Morgen ſelbſt zu entfernen pflege, wobei „Lora" mich ſtets mit einem freundlichen „Guten Tag" begrüßt. Nimmt eine andere Perſon das Tuch weg, ſo bietet der Papagei keinen Morgengruß, ſondern fragt erſtaunt: „Wo iſt denn die Mama?" . . . Daß dies lediglich Zufall ſei, macht mir kein Menſch weiß.

Ebenſowenig iſt folgende Beobachtung auf Zufall zurückzuführen. Seit etwa vierzehn Tagen habe ich ein Bekannten gehörendes King-Charles-Hündchen in Koſt und Pflege. In den erſten Tagen hatte Lora den Namen des Thierchens, der auf „Piko“ lautet, ſich ſichtlich noch nicht gemerkt; dagegen imitirte ſie mit täuſchender Naturwahrheit das zarte, ſich ſtets in den höchſten Tönen bewegende Gebell des kleinen Burſchen, der ſie, wie überhaupt jedes neue Thier, ganz gewaltig intereſſirt. Kürzlich nun befand ich mich im Nebenzimmer, während Lorchen und die Doggen, ſowie der King-Charles das Eßzimmer inne hatten, als plötzlich ein ſcharfes Scharren und Kratzen, das meine Doggen, als verboten, ſich nie erlauben, vom gemeinſamen Hundelager, einer weichen, mit einem guten Teppich belegten Matratze her laut wurde. Eben wollte ich nachſehen, was da drüben los ſei, als ſchon Lorchen ſich in’s Mittel legte und mit ihrem hellklingenden Stimmchen rief: „Wart’ Du, wau, wau, wau“, (hierbei imitirte ſie das hohe Bellen des kleinen Hündchens) „wart’ Du, wart’ ich will Dir, pfui!“ Hat nun hier der Vogel nicht unſtreitig dem kleinen, ſeiner Meinung nach unartigen Hunde, eine unerlaubte Handlung wehren wollen? — Doch ganz ſicherlich! Seither hat Lora ſchon lange weg, wie der kleine Kerl heißt, und nun kommandirt ſie demſelben nach Herzensluſt. Anfänglich fürchtete ſie ſich ziemlich vor dem ſchwarzen Fremdling, da dieſer ſie einmal mit einem Satz zu erhaſchen verſucht hatte; inzwiſchen aber hat ſich das Blatt gewendet, und Piko, der mehr als einmal nahe Bekanntſchaft mit dem achtunggebietenden Schnabel des viel kleineren Vogels gemacht hat, reißt, wie alle meine Hunde, augenblicklich aus, wenn der Graue auf ihn zuwandelt. Ueberaus drollig ſieht es ſich alsdann an, wenn die ſonſt ſo ſchüchterne, aber gegen Hunde ſo kecke Lora in kurzen Sprüngen hinterher rennt und fortwährend ruft: „Piko, komm’!“

Nicht nur die Hunde, auch die Vögel kennt Lorchen mit Namen; wird z. B. die Schama, wenn gerade ein Geſpräch im Gange iſt, ab und zu einmal zu laut, ſo ruft der Papagei ſofort: „Schama, aber Schama“, gerade ſo, wie ich in dieſem Fall rufe. Noch hübſcher aber iſt es, wenn ich nach dem Mehlwurmtopfe greife. Da Lora aus Erfahrung weiß, daß bei dieſer Gelegenheit gewöhnlich auch der meiſt freifliegende Fliegenſchnäpper eine Spende erhält, ſo fühlt ſie ſich verpflichtet, den kleinen Vogel herbeizurufen, wie ich dies zu thun pflege. Kaum erblickt ſie daher einen Mehlwurm, oder auch eine Fliege in meiner Hand, ſo ruft ſie, ihr Köpfchen ſuchend nach allen Seiten drehend, mit hellklingender Stimme „Näppi, Näppi!“ (Abkürzung für das ihr wol zu ſchwierige „Schnäppi!“) —

So leicht und mühelos der Papagei von ſelbſt lernt, ja häufig genug ein beſonders laut betontes Wort nach einmaligem Anhören ganz korrekt nachſpricht, wie er bei den ſicherlich nicht leicht auszuſprechenden Wörtern „Kathrin“, „Fadentiſch“, „aufgeplatzt“ und noch vielen anderen oft genug bewieſen hat, ſo wenig iſt er gewillt, ihm vorgeſagte Worte nachzuſprechen. Das Einzige, was „Lorchen“ ſyſtematiſch gelernt hat, ſind die Fragen, wie der Hund und die Katz’ ſpricht, und die richtigen Antworten darauf, ſowie die Frage: „Wie groß iſt die gute Lora?“, die ſie ſich ſelbſt beantwortet, indem ſie ſich auf die Zehen ſtellt, die Flügel hoch emporreckt und mit lang ausgerecktem Hals in bewunderndem Ton ſagt: „So-o-o groß!“ –

Seit Jahr und Tag ſage ich ihr dagegen beim Schlafengehen vor: „Gute Nacht, Mama“, was ſie bis heute nicht gelernt hat, während es ihr hier und da einfällt, irgend einer fremden Perſon, die die Thür öffnet, um „Gute Nacht“ zu ſagen, ebenfalls ein lautes „Gute Nacht“ nachzurufen. —

Wahrhaftig ſchade iſt, daß ich ſelbſt dem Vogel keine Melodie vorpfeifen kann, denn derſelbe hat ſoviel Intereſſe für Muſik und ſoviel muſikaliſches Gehör, daß er beim Anhören hübſcher Muſik wie verzückt daſitzt und beſtändig vor Freude mit den Flügeln ſchlägt; jede Melodie, die er hört, verſucht er ſofort nachzupfeifen oder nachzuſingen, und meiſt ſind es nur die allerletzten Töne, die er nicht gleich richtig wiedergeben kann. — Sämmtliche Vogelgeſänge, die er bei mir hört, imitirt er von der Droſſel bis zur Schwalbe herab mit verblüffender Naturtreue, ſodaß man nur in nächſter Nähe an der gröbern Stimme die Nachahmung erkennt. —

Noch viel des Intereſſanten könnte ich von meinem Liebling erzählen, doch ich fürchte, die Geduld der freundlichen Leſer ſchon viel zu lange auf die Probe geſtellt zu haben. Daß ich ſo viele Freude an meinem Graupapagei habe, ja, daß derſelbe mir weit eher ein mit Verſtand begabter Freund und treuer Gefährte meiner einſamen Stunden, als ein unterhaltendes Spielzeug geworden iſt, ſchreibe ich in erſter Linie der Art und Weiſe zu, wie ich beim Ankauf des Vogels zu Werke ging. Ich erſuchte Herrn Neſſek, mir einen ferngeſunden, jungen und fingerzahmen, niemals ſchreienden Graupapagei zu ſenden, für deſſen Begabung er jede Garantie übernehmen könne; nach dem Preis fragte ich nicht, und es fiel mir auch nicht ein, zu markten, als der verlangte Vogel erheblich mehr koſten ſollte, als der gewöhnliche Marktpreis für einen jungen Graupapagei beträgt, denn ich gehe von dem Grundſatze aus: Lieber etwas Gutes, auch um höhern Preis, als etwas Minderwerthiges, auch wenn dieſes noch ſo billig ſein ſollte. Ich bin ſehr zufrieden, beim Ankauf dieſes Vogels nicht auf den billigen Preis geſehen zu haben, denn auf dieſe Weiſe habe ich einen Papagei erhalten, der mir niemals Kummer und Aerger, ſondern von Anfang an nur Freude gemacht hat. Darum möchte ich jedem angehenden Liebhaber rathen, bei eventuellen Einkäufen meinem Beiſpiel zu folgen.

Der beſte Käfig für Weichfreſſer.

Von Joh. Gabl.

Es ſind nun 21 Jahre, daß ich mit der Haltung und Verpflegung von Vögeln mich befaſſe und unſere einheimiſchen Sängerfürſten waren es ganz beſonders, denen ich meine Liebe und Sorgfalt zuwandte. Die Haltung und Verpflegung der heikelſten Sänger, auch der Wildfänge, machte mir wenig Schwierigkeit, da ich alles hierüber Wiſſenswerthe bei praktiſchen Vogelwirthen und Vogelfängern ſah und erlernte in einer Weiſe, welche nur wenig von den in der „Gefiederten Welt“ hierüber gegebenen fachmänniſchen Rathſchlägen abwich. Was mich aber bis vor einigen Jahren gar nie recht befriedigte, woran ich immer noch zu tadeln fand, waren die Käfige, welche ich für unſere lieben Sänger verwendet ſah. Die Beſchaffung und Herſtellung eines durchaus praktiſchen, einwandfreien, netten Käfigs für Weichfreſſer forderte darum ſchon ſeit Jahren mein beſonderes Intereſſe heraus. Ganz beſondere Anregung und auch Wegweiſung brachte mir hierin das Leſen der „Gefiederten Welt“, welche faſt in allen Jahrgängen die Käfigfrage behandelt und um die Klärung derſelben, um die Feſtlegung gewiſſer praktiſcher Grundſätze und Anſprüche für Weichfreſſer-Käfige ſich die größten Verdienſte erworben hat. Ich glaube nun auf Grund gewonnener praktiſcher Verſuche und Erfahrungen den geehrten Leſern dieſer Zeitſchrift einen Käfig empfehlen zu können, der ganz gewiß ihren Beifall finden wird und der nach dem gegenwärtigen Stand dieſer Frage wol als der beſte Käfig bezeichnet werden darf; freilich mag er noch der Vervollkommnung fähig ſein, denn „nichts Vollkommenes gibt es auf dieſer Erde“; trotzdem aber kann er als der beſte vorhandene bezeichnet werden und das genügt, um die Ueberſchrift dieſes Aufſatzes zu rechtfertigen und das Intereſſe aller Leſer dieſer Zeitſchrift zu wecken, welche ſich mit der Käfigung und Verpflegung der edelſten Weichfreſſer beſchäftigen.

Der Beſchreibung des Käfigs möchte ich einige praktiſche Regeln und Grundſätze voranſtellen, welche meiner Ueberzeugung nach die unerläßlichen Erforderniſſe und fachmänniſchen Anſprüche an einen praktiſch verwendbaren Weichfreſſerkäfig, auch wenn er nicht der beſte iſt, bezeichnen und damit den Stand der ganzen Käfigfrage markiren, ſoweit dieſelbe bis heute fachmänniſch entſchieden und geklärt iſt.

1. Der Käfigboden muß ganz leicht, ohne Störung für den Vogel, an jedem beliebigen Standort des Käfigs herausgenommen und gereinigt werden können. Der Käfig muß alſo in der vorderen Breitſeite ſeines Geſtelles eine verſchließbare Klappe haben, durch welche eine Zinkſchublade leicht ein- und ausgeſchoben werden kann. Unter der Zinkſchublade befindet ſich der eigentliche Käfigboden, welcher den Käfig bei entfernter Schublade nach unten verſchließt.

2. Die Decke des Käfigs muß weich ſein; ſie beſteht am beſten aus geſpanntem Tuch, damit die Vögel beim Emporfliegen während der Zugzeit ſich nicht beſchädigen können.

3. Die Futter- und Waſſergefäße müſſen feſt und unbeweglich liegen; ſie müſſen in Rückſicht auf die gute Erhaltung des vorgelegten Futters die nöthige Größe und Beſchaffenheit haben; ihre Umgebung ſoll das Hinauswerfen des Futters aus dem Käfig möglichſt verhindern.

4. Die Sprungſtäbe im Käfig müſſen ſo angeordnet werden, daß ſie dem Vogel einen in Weite und Höhe ſeiner Eigenthümlichkeit angemeſſenen Sprung gewähren, den er ſich leicht und ſicher angewöhnt, ſodaß er ihn auch im Dunkel ſicher benutzen kann; alſo keine überflüſſigen Sprungſtäbe, wie die nothwendigen.

5. Der Käfig ſoll im Innern überall leicht und ſchnell mit der Hand zu erreichen ſein, damit der Liebhaber nöthigenfalls auch ſogleich eingreifen kann, alſo genügende und praktiſch angebrachte Thüren haben.

6. Die Größe des Käfigs richtet ſich im allgemeinen nach der Vogelart; er ſoll niemals zu groß, aber auch nicht ſo klein als möglich ſein. Die Größe iſt vielfach durch die richtige Anbringung der Sprunghölzer und Futter(Waſſer)-Gefäße bedingt.

In dieſen Punkten ſind jene Grundſätze aufgezählt, über welche nach dem gegenwärtigen Stand der Käfigfrage in Fachkreiſen wol allgemeine Einigkeit herrſcht und deren Einhaltung von einem wirklich praktiſchen Weichfreſſerkäfig unbedingt gefordert werden muß. Die Frage iſt nun aber die, wie ſollen dieſe Forderungen am Käfig praktiſch ausgeführt werden und zur Geltung kommen?

Darüber gibt nun die Beſchreibung des in der Ueberſchrift genannten Käfigs Aufſchluß.

Da die oben aufgezählten Grundſätze *annähernd* in den bekannten Wiener Käfigen angewandt ſind, ſo iſt es begreiflich, daß der zu beſchreibende Käfig jenen einigermaßen ähnlich iſt; er unterſcheidet ſich aber doch mannigfach von ihnen und auf dieſe Unterſchiede werde ich darum eigens aufmerkſam machen und die Abweichungen begründen.*)

1. Das Käfiggeſtell, welches in ſeinen Eckſtücken aus Hartholz, in ſeinen füllenden Theilen aus Weichholz iſt, hat an ſeiner vordern Breitſeite eine in Charniren hängende, 5 cm hohe Klappe, welche zwiſchen den Eckſäulen knapp eingepaßt iſt und ohne weiteren Verſchluß zwiſchen denſelben feſt liegt. Hinter der Klappe, auf dem den Käfig nach unten abſchließenden Holzboden, liegt die Zinkſchublade, deren Ränder ebenfalls aus Zink und $3^{1}/_{2}$ cm hoch ſind.

Die Wiener Käfige weiſen hierin den Unterſchied auf, daß die Ränder der Schublade aus Holzſtäben gefertigt ſind, auf welche das Zinkblatt einfach aufgenagelt iſt. Die Schublade iſt alſo nicht *ein* Stück und auch nicht ganz dicht.

(Fortſetzung folgt.)

---

*) Die Vergleichung gilt beſonders dem Wiener Sproſſerkäfig. — Die Maße aller meiner Käfige ſind übrigens unten angegeben. D. V.

* * *

Briefliche Mittheilungen.

… Nach Durchleſen Ihres ſchönen Werkes „Die fremdländiſchen Stubenvögel“, Band II, Seite 804, finde ich bei **Senegal-** oder **Palmtäubchen** die Bemerkung: „Ihr Vorkommen in Südoſteuropa wird bezweifelt.“

Da es Sie vielleicht intereſſiren dürfte, theile ich ergebenſt mit, daß ich vor fünf Jahren hier in Konſtantinopel, in der Wohnung meines Schwagers, im Hochſommer (Juli-Auguſt) vor dem Fenſter auf dem Fenſterbrett ein Pärchen Palmtäubchen niſten ſah; ſie zogen auch ihre Jungen an derſelben Stelle mit Erfolg groß.

Auch fing ich im letzten Jahr, Ende Juli, zu meiner großen Freude ein Pärchen Senegaltäubchen auf meiner Terraſſe (flaches Dach), wie es bekanntlich im Orient größtentheils flache Dächer gibt.

Danach zu ſchließen, kommt das Senegaltäubchen im Hochſommer auch zu uns nach Konſtantinopel, und zwar in ziemlicher Anzahl. Sie ſind aber hier nur immer pärchenweis anzutreffen, niemals in größeren Flügen. **Adolf Paluka.**

Anfragen u. Auskunft.

Herrn **Hofrath Spreiſchickoff**: 1. Reichen Sie der Amazone zunächſt ſtatt des Trinkwaſſers ganz dünn gekochten Haferſchleim, der täglich friſch bereitet werden muß. Außerdem bieten Sie ihr täglich zweimal im beſonderen Gefäß einen Theelöffel voll Dulkamara-Extrakt (Auflöſung in Waſſer 1:200). 2. Dem Jako ſpritzen Sie das Gefieder mit einer Miſchung von Rum und lauwarmem Waſſer vermittelſt des Refraichiſſeurs alle Woche zweimal gründlich durch, wobei Sie ihn natürlich vor Erkältung ſorgſam behüten müſſen.

Herrn **W. Kracht**, stud. rer. techn.: Ihr Wunſch wird in kürzeſter Zeit erfüllt werden.

Herrn **Carl J. Schmidt**: 1. Inbetreff des blauen Zuckervogels (Coereba cyanea, *L.*) liegen keine neuen Meldungen vor. 2. Der Kronfink von Südamerika (Fringilla pileata, *Pr. Wd.*) iſt im Jahr 1892 mit Erfolg gezüchtet worden.

Herrn **V. Mautes**: 1. Unterſuchen Sie, ob Ihr Dompfaff Milben hat, indem Sie über Nacht ein weißes Tuch über ſeinen Käfig legen und am Morgen früh daſſelbe ausbreiten und nachſehen, ob Sie winzige rothe Punkte darauf finden. Iſt dies der Fall, ſo bepinſeln Sie den Vogel an allen kahlen Stellen mit verdünntem Glycerin und ſpritzen gutes Dalmatiniſches Inſektenpulver darüber. Hierauf bieten Sie ihm Gelegenheit zu einem Bad in lauwarmem Waſſer, wobei Sie ihn vor Erkältung ſorgſam behüten müſſen.

Herrn Oberlehrer **Joſ. Reinl**: Der Vogel ſcheint in ſtockende Mauſer gerathen zu ſein. Bieten Sie ihm jetzt einmal friſche Ameiſenpuppen in größerer Gabe. Außerdem ſpritzen Sie ihm das Gefieder alle zwei Tage mittelſt des Refraichiſſeurs mit lauwarmem Waſſer gründlich durch, laſſen dann ſein Gefieder in gleichmäßig hoher Temperatur trocken werden. Sollte dies nichts helfen, ſo fragen Sie nach einigen Wochen wieder an.

Frau **Luiſe Brußt**: Bieten Sie dem Vogel in dem Haferſchleim drei bis vier Tropfen Rothwein, vielleicht wird ihm dies wieder aufhelfen. Wenn er Mais lieber als Hanf frißt, ſo iſt dies ja gut, auch laſſen Sie ihn von dem Haferſchleim nur ruhig trinken. Geben Sie ihm neben dem bisherigen Körnerfutter auch etwas Spitzſamen (Kanarienſamen). Der Mais darf nicht „eingeweicht“, ſondern muß ſchwach angekocht ſein.

Herrn **Adolf Saenzmer**: Ein künſtliches Bein können Sie Ihrem Kanarienvogel natürlich nicht einſetzen, doch können Sie ihn auch mit einem Fuß noch Jahre lang am Leben erhalten. Gönnen Sie ihm nur vollkommene Ruhe, bewahren Sie ihn vor jeder Beängſtigung und füttern Sie ihn ſachgemäß.

◆

Berichtigung.

… In Nr. 19 der „Gefiederten Welt“, Seite 151, Zeile 31, ſoll es heißen: „Rothdroſſeln kommen bei Hammerfeſt noch vor“ — und nicht Singdroſſeln. **Joſef Wagner.**

◆

Zu unſerm Bilde.

Die Ammerfinken erfreuen ſich bei den nordamerikaniſchen Vogelfreunden großer Beliebtheit, während ſie bei uns, wenn ſie in den Handel gelangen, kaum beachtet werden. Doch thun die europäiſchen Liebhaber vielleicht Unrecht daran. Einerſeits ſind all' dieſe Vögel leicht zu verpflegen und wahrſcheinlich unter günſtigen Umſtänden unſchwer zu züchten, andererſeits dürften ſich die Männchen als gute „Spötter“ erweiſen, d. h. Nachahmer anderer Vogelſtimmen; denn nur ſo erklärt es ſich wol, daß die Amerikaner ſie im Freien als gute Sänger geſchildert haben, während man hier ihren Geſang ſehr gering bewerthet hat.

Der Vogel unſers heutigen Bildes iſt der **Zwergammerſperling** (Fringilla [Zonotrichia] pusilla, *Wils.*, s. F. juncorum, *Natt.*): an Oberkopf und Nacken roſtbraun, Kopf und Halsſeiten bräunlich roſtroth, Wangen dunkler; Mantel und Schultern roſtröthlichbraun, dunkel ſchaftſtreifig; Unterſeite graubräunlich, Unterleib weiß. —

Seinen Geſang ſchildert Simeon Peaſe, ein amerikaniſcher Geſangskenner, folgendermaßen: „Dieſer Sperling, nicht ſo gewöhnlich wie der Singammerſperling, gleicht dieſem in Ausſehen und Lebensweiſe. Er iſt nicht ſo geſellig, ſondern zieht Felder, Weiden und Buſchwerk vor. Wenn Wilſon ſchreibt: „Keiner unſerer Vögel iſt unvollkommener beſchrieben worden, als die gewöhnlich Sperlinge genannte Familie der Finken,“ ſo hat er recht; aber wenn er von dem Zwergammerſperling ſchreibt: „Er hat keinen Geſang“, ſo hat er ſich durch ſein eigenes Urtheil geſchlagen. Und wenn Dr. Coues auf der andern Seite ihn als „ſehr melodienreich und im Beſitz vieler und wechſelnder Weiſen“ ſchildert, und ihm weiterhin einen „ungewöhnlichen Stimmenumfang“ zuſchreibt, ſo paßt dies viel beſſer auf den Singammerſperling. Der Zwergammerſperling iſt ſicherlich ein guter Sänger und mag mehrere Lieder haben. Ich habe nur eins von ihm gehört; aber dieſes würde, trotz der Kürze, unvergleichlich ſein. Als Zuſammenſetzung von Tönen ſteht es beinahe, wenn nicht ganz, einzig da. Dr. Coues führt Mr. Minot inbetreff des Geſangs dieſes Vogels an: „Er beginnt mit ein par vortrefflich modulirten Pfiffen, jeder höher und ein wenig lauter als der vorhergehende, und ſchließt mit einem ſüßen Triller.“ Der Geſang beginnt in der That mit zwei oder drei ſcharf getrennten Tönen — oder „Pfiffen“, wenn man ſie ſo nennen will — aber ich entdecke keine Modulation, noch auch iſt jeder Ton höher als der vorhergehende, vielmehr haben die Anfangstöne dieſelbe Höhe. Indeſſen nimmt der Geſang von Anfang bis zu Ende an Stärke, wie auch an Schnelligkeit zu. Keineswegs aber erfordert er einen „ungewöhnlichen Umfang der Stimme“ — ſondern einfach den Zwiſchenraum einer kleinen Terz. — Wenn wir das Talent betrachten, das ſich darin entfaltet, in ſo ſchöner Weiſe die drei großen Erforderniſſe des Geſangs zu vereinigen — Dauer, Höhe und Stärke des Tons — ſo machen die Kürze ſeines Geſangs und der beſchränkte Umfang ſeiner Stimme den Geſang dieſes Vogels um ſo wunderbarer. Kaum etwas in Rhythmik und Dynamik iſt ſchwieriger zu geben als ein vollkommenes accelerando und crescendo, und der Gebrauch der chromatiſchen Leiter, durch welche ſich der Zwergammerſperling bei ſeinem ſchnellen Geſang erhebt, enthält das Beſte an melodiſchem Können. Dieſer kleine Sänger hat das ganze Reich der Töne erforſcht und ſeine Schönheiten mit vollendeter Kunſt in einen kurzen Geſang zuſammengedrängt.“ K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Nistkäſten für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[959] **R. Schröter**, Elingen-Greußen.

Futtermittel.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiſſe Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ.

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko 4½, à Ltr. 1 ℳ.

Muska, hochf. 98er, à Ko. 3, 5 Ko. 14 ℳ.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 5, à Ko. 9.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.

Bisquit u. Eierbrot, beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	" " " "	1,80
Hafer geſchält	" " " "	2,25
Mohn blau	" " " "	3,75
Hirſe weiß Pa.	" " " "	2,20
do. Senegal	" " " "	2,25
do. do. i. Kolb.	" " " "	5,—
do. algeriſche	" " " "	2,—
do. indiſche	" " " "	1,75
Sonnenblumen	" " " "	2,—
Kürbiskerne	" " " "	3,25
Reis i. Hülſen	" " " "	2,25
Zirbelnüſſe	" " " "	5,—

Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [960]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,–

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. Vogelfutterarten gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Mehlwürmer,

rein reell gemeſſen, nur prachtvolle große Futterwürmer, Ltr. 5,— ℳ, Kilo 8,— ℳ, 1000 Stck. 1,60 ℳ **Anweiſung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer** 30 ₰, **Ameiſeneier**, nur feinſte, ſtaubfreie Ware, pr. Ltr. 70 ₰, Kilo 3,—, 10 Ltr. 6,50 ℳ, **Weißwurm** feinſter Beſchaffenheit, Ltr. 80 ₰, **Vogelleim, Netzfallen, Neſter, Samen** u. a. Preisliſte poſtfrei. **Verpackung frei.** [961]

Theodor Frank, Barmen.

Mehlwürmer in guter, ſauberer Ware, das Liter 5 ℳ, Kilo 8 ℳ. Verpackung frei. [962]
Carl Bertram, Elberfeld, Brüderſtr. 8.

Sonnenblumenkerne,

per 5 Kilo 2,50 ℳ, per 50 Kilo 20,— ℳ
☞ **Ameiſeneier Ia,** ☜
per 5 Kilo 14,— ℳ, per Kilo 3,— ℳ
[963] **Sommerrübſen Ia, ſüß,**
per 5 Kilo 2,20 ℳ, per 50 Kilo 18,— ℳ
empfiehlt **Carl Kämpf**, Mainz.

Mehlwürmer,

ſtaubfrei, à Lit. ℳ 4,50, Ko. ℳ 8, **Ameiſeneier**, feinſte ſchleſ. Ware, per Lit. 90 ₰, bei 10 Lit. 85 ₰; I bei 5 Lit. 70 ₰, bei 10 Lit. 65 ₰ empfiehlt u. verſ. geg. Nachn. [964]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Staats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpaketen franko, garantirt ſandfrei. [965]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Mehlwurmzüchterei

empfiehlt prima Würmer ℔ 4,— ℳ [966]
F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

Alle Vogelfutter, Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [967

Vögel.

ff. Harzer Kanarien-Vögel,

Hohl- u. Knorr-Vögel, ſowie Klingel- u. Schaukel-Roller ohne Fehler 15, 20 u. 25 ℳ, geb. dieſelb. 14 Tage a. Probe, jedoch p. Nachn. od. Betrg. vorher, nicht gefall. Vögel tauſche um od. zahle zurück. Preisliſte frei. [968]

L. G. Müller, Vogelzüchterei, Nordhauſen a. H.

NB. Junge von dieſem Jahr à Stck. 5 ℳ, 6 Stck. 25 ℳ, 12 Stck. 48 ℳ, frei dort.

Nur für Händler!

Noch 1000 P. **Schwarzkopfnonnen**, à P. 75 Pf., dieſelben nicht unter 25 P. **Zebrafinken**, à P. 2.90 ℳ. **Japan. Mövchen**, à P. 1.90 ℳ. **Bandfinken, Muskatfinken, Aſtrilde, Orangebäckchen, Orangebrüſtchen, Schmetterlingsfinken,** alle à Par 1.80 ℳ. Reelle Bedienung. [969]

L. Swinnen, Aachen.

Ungar. Nachtigalen,

die beſten Gebirgsſchläger, ſofort ſingend, à St. 2.— ℳ, à Dtzd. 20 ℳ, **Wachteln**, g. Schläger, Dtzd. 7,50 ℳ. [970]
N. Muschna, Temesvar, Ungarn.

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten
echten Kayenne-Pfeffer,
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [971]
Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.
Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos).

Sehr ſeltene ruſſiſche

Weiden-Sproſſer

aus den Uferpflanzungen verſchiedener großer Stromgebiete des fernen europäiſchen Nordoſtens und Nordweſtens zu 20 bis 35 ℳ;

☞ **feine** ☜

Au- u. Wald-Sprosser

verſchiedener Gebiete u. Länder zu 12 bis 18 ℳ, ſowie **gewöhnliche Sproſſer** zu 7 bis 10 ℳ, direkt von Ort und Stelle durch den ſeit vielen Jahren allſeitig als ſtreng reell bekannten und ſtets fachmänniſch bewährten Spezialiſten

Mathias Rausch,
[972] **Wien VII/3,**
Schottenfeldgaſſe Nr. 95.

Saiſon-Offerte!

Sproſſer, je nach Geſangsleiſtung,	8–15	ℳ.
Nachtigalen, " "	3–6	"
Schwarzplättchen u. Sprachmeiſter	4–5	"
Garten- und Sperbergrasmücken	3–5	"
Müller- und Dorngrasmücken	2–3	"
Braunellen und Bachſtelzen	2–3	"
Wieſen- und Steinſchmätzer	2—	"
Wieſen- und Baumpieper	3—	"
Fitis- und Weidenlaubſänger	2—	"
Schwarz-, Grau- u. Golddroſſeln	5–10	"
Roth- und Blaukehlchen	2–5	"
Haus- u. Gartenrothſchwänzchen	2–6	"
Droſſel-, Schilf- u. Sumpfrohrſäng.	3–5	"
Rothrück. Würger, ausgez. Spötter	2–3	"

Außerdem großes Lager in Meiſenarten, Finken, Ammern, Lerchen u. ſ. w.

Täglich Eingang von Seltenheiten.

Nur tadelloſe Vögel kommen zum Verſandt. Friſche, ſowie prima getrocknete Ameiſeneier, Musca, Weißwurm, Mehlwürmer ſtets am Lager zu Tagespreiſen. [973]

W. Hiltmann,
Berlin S., Dresdenerſtraße 23.

Empfehlen garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende
☞ **Sproſſer** ☜
à Stck. 9–12 ℳ, ſowie
Nachtigalen
4—6 ℳ und alle Arten
☞ **Grasmücken** ☜
unter Garantie lebender Ankunft. Preisliſte gratis.

Friſche Ameiſeneier,

pr., ohne Gehölz, Sand und Ameiſen, à Lit. 1.40 ℳ, dto. 1.20 ℳ II. Qualität.
[974] **Gebr. Haas**, Vogelexportgeſchäft, **Hoffſtetten** b. Gemünden a. M. (Bayern).

[975]

Geſucht:

Granataſtrilde, Buntaſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen u. ſeltene ausländ. Finken.
J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.).

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [976]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Google

Sproſſer, Grasmücken, Rohrſänger 2c.

halten ſich in unſeren **neu** konſtruirten Käfigen Nr. 62 u. 63 beim **beſtem Wohlbefinden.**

Nr. 62 40×23×19 3,50 ℳ } Metallkäfig mit Holzunterſatz, Zinkſchieber und Ledertuchdecke.
„ 63 60×26×25 4,80 ℳ }

Gefällig und ſehr ſolid gearbeitet. Vorhang zum Eingewöhnen 75 ₰.

Arthur Herrmann & Cie.,
[977] **Oſchatz i. Sa.**

☛ Feine ☚ Singvögel

und zwar Sproſſer aller Raſſen, insbeſondere auch **echte** David-Sproſſer, welche den Davidruf **wirklich** ſchlagen, von 9—35 ℳ, Nachtigalen 4—9 ℳ, **Gebirgsſchwarzköpfe** 3,50—9 ℳ, Gelbſpötter 4—8 ℳ, Sumpfrohrſänger 4—5 ℳ, Blaukehlchen 4—7 ℳ, Rothkehlchen 1,50—5 ℳ, Garten- u. Sperbergrasmücken 3,50—6 ℳ, Würger, rothrückige, rothköpfige und Grauwürger 3—5 ℳ, ſowie überhaupt alle Sorten Weichfuttervögel empfiehlt unter üblicher Gewähr

Mathias Rausch,
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der
[978] beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Preisliſte koſtenlos und poſtfrei bei Angabe über welche Vogelart.

Stieglitz, Hänfling, Zeiſig, Buchfink à 1,50, Grauer Kardinal, Prachtgefied. 4 ℳ, Hochrothe Dompfaffen à 4 ℳ. Singdroſſel, brillante Rufe, David-Kuhdieb 2c., nur 10 ℳ.

Blauſtirn-Amazone in wirklichem Prachtgefieder, für Ausſtellungen ſehr geeignet, ſpricht viel, kein Schreier, **gibt Pfote, kommt auf Hand,** nur 30 ℳ.

Anfragen mit Rückporto. Verpackung frei. Alle Vögel ſind in vollem Geſang, kerngeſunde Männchen. **Kleiner Luxushund,** ſehr ſcharf auf Mäuſe und Ratten, ſehr wachſam und ſtubenrein, macht ſchön, gibt Pfote, geht auf Hinterbeinen, klettert auf Leiter 2c., nur in gute Hände. Ausnahmeofferte nur 30 ℳ.

H. Noack,
[979] **Friedeberg,** Nm., Markt 105.

Holländer Kanarien-Vögel,
mit dem I. Preis prämirt, zu verkaufen, auch gegen gute Harzer getauſcht.

[980] **Joh. Weiss,**
Wien XVI, Herklotzgaſſe 28.

☞ 1898 erhielt mein Stamm Harzer Kanarienvögel 1. Staatspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr. **Paul Holzky,** Cöthen (Anhalt). [981

Größte Seltenheit.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe einen **blaubärtigen Blattvogel** [illegible], tadellos im Gefieder, in vollem, lautem Geſang, 1 Jahr im Käfig, [illegible] 120 ℳ [illegible] eine Orpheusgrasmücke für 12 ℳ ab. Leb. Ank. gar.

Fabrikbeſitzer **F. Weber,**
Göttingen, Reinhäuſer-Chauſſee 26.

Bücher-Anzeigen.

Auf vielſeitiges Verlangen habe ich

die wichtigſten Regeln
über
die rationelle Behandlung
aller hervorragenden europäiſchen
☛ **Singvögel,** ☚

wie Sproſſer, Nachtigalen, Gelbſpötter, Schwarzplättchen, Grasmücken, Steinröthel u. ſ. w. im Drucke erſcheinen laſſen. — Dieſelben wurden von mir auf Grund reicher Erfahrungen nach einer 35jährigen — an tauſenden dieſer Vögel erprobten — Praxis kurz zuſammengeſtellt und können daher jedem Liebhaber der genannten Vögel bei deren Käfigung, Wartung und Verpflegung als **vollkommen verläßlicher** Rathgeber dienen. —

Dieſe kleine Druckſchrift iſt von mir direkt erhältlich und ſteht allen meinen verehrten p. t. Kunden **koſtenlos und poſtfrei** zur Verfügung.

Mathias Rausch,
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der
[982] beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Verkaufe „Gefied. Welt“, Jahrgang 1895 14.—52., 1886 vollſtändig, Handbuch Dr. Ruß, I u. II, gebd., à 4,50. Offerten mit Angeboten unter V. B. R. poſtlagernd Erfurt.

In unserem Verlage erschien:

Das Huhn als Nutzgeflügel.

Von
Dr. Karl Russ.

Zweite, reich illustrirte Auflage.
Preis M. 2.—; geb. 2.50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Für Beſitzer des

Handbuch für Vogelliebhaber

von **Dr. Karl Ruß**

in früheren Ausgaben ſtehen die dem Werke jetzt beigegebenen Illuſtrationen, beſtehend in

28 Vollbildern fremdländiſcher Stubenvögel
(zu Band I), ſowie
25 Vollbildern einheimiſcher Stubenvögel
(zu Band II)

für den Preis von je nur 1 Mark durch jede Buchhandlung, ſowie in der unterzeichneten Verlagshandlung ſelbſt zu Dienſten.

Das **Illuſtrirte Handbuch** koſtet auch jetzt noch, wie bisher, für

Bd. I (Fremdl. Stubenv.) broch. 6.50, geb. 8 ℳ
„ II (Einh. Stubenv.) „ 6.—, „ 7.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.

Zeitschrift für *Elektrotechnik* und *Maschinenbau*,

Poſtzeitungsliſte 8178 a.

sowie für ***Metall- und Montanindustrie.***

Abonnementspreis: pro Monat 20 Pf. durch jede Buchhandlung, bei der Poſt 60 Pf. für das Vierteljahr.

Bereits erſchienene Nummern des Quartals werden koſtenlos nachgeliefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervorragendſten Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und berufen, unendlichen Nutzen zu ſtiften.

Dieſe Zeitſchrift iſt **ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte** und den Ideen des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik und dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montanínduſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt, Alles, was irgendwie für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elektrotechnik und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in [illegible], leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle ſpeziellen Zweige der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des **Auslandes** hat die Zeitſchrift **zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute als Mitarbeiter,** welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues 2c. ſofort Kenntnis geben und über alle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten. Jede Nummer der Zeitſchrift wird daher eine Reihe **elektrotechniſch-wiſſenſchaftlicher** und **maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel** aus der Feder erprobter Autoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten. Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl **kleiner Mitteilungen** aus dem Gebiete der **Elektrotechnik,** des **Maſchinenbaues** und der **Metall-** und **Montaninduſtrie** an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und allezeit wiſſen, welche **neuen** Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die **Patentnachrichten,** die von uns ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den Leſern einen Überblick über die neuen Erfindungen 2c. zu geben. Der **techniſche Briefkaſten** erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch Fachmitarbeiter zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner **handelspolitiſche Leitartikel,** die energiſch für die Intereſſen der deutſchen Induſtrie eintreten. Unter dem Titel: **„Kleine handelsinduſtrielle Mitteilungen“** wird alles dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt Metall- u. Montaninduſtrie Bezug hat. Ebenſo finden die **Submiſſionen, geſchäftlichen Mitteilungen** 2c. 2c. eine gebührende Stätte in unſerem Blatte. — Jeder Nummer iſt eine ***Unterhaltungsbeilage*** hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeitſchrift das techniſche mit dem unterhaltenden Moment [illegible]

[illegible] wird die „Zeitſchrift für Elektrotechnik und Maſchinenbau, [illegible] Metall- und Montaninduſtrie“ ein unentbehrliches Organ [illegible] maſchineller und elektrotechniſcher Fabriken und Werkſtätten, [illegible] Hüttenwerke, Schloſſereien und anderen [illegible] und Ingenieure, Techniker und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.

Probenummern koſtenlos und franko von der

Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechnik u. Maſchinenbau,
ſowie für Metall- und Montaninduſtrie, *Leipzig.*

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Die gefiederte Welt
Wochenschrift für
Vogelliebhaber,
Züchter und Händler

[illegible] [illegible] [illegible]

Anzeigen.

[illegible]

Sprosser

[illegible]

Brut-Apparate

[illegible]

[illegible]

Nistkästen, Vogelfutter [illegible]

[illegible]

[illegible]

C. L. Flemming

[illegible]

Man verlange Preisliste.

Käfige jeder Art

[illegible]

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Allianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 22. Magdeburg, den 1. Juni 1899. XXVIII. Jahrg.

Der goldſtirnige Blattvogel und die Dayaldroſſel.

Nur wenige Vögel gibt es, deren Vorzug ſchönes Gefieder und angenehmer Geſang zugleich bilden; meiſt gilt die Regel, daß hervorragende Sänger ein ſchlichtes Federkleid tragen. Eine Ausnahme von letzterer haben wir bereits in der Schamadroſſel vor uns, die eine farbenprächtige Sängerkönigin iſt, und zwei weitere ſolche ſind. die in der Ueberſchrift genannten Vögel. Obwol ſie mit einander nicht im geringſten verwandt ſind, will ich ſie dennoch gemeinſam beſprechen, da ſie jetzt zu gleicher Zeit auf dem Vogelmarkt ausgeboten werden, und da aus dem Leſerkreiſe nach ihnen gefragt und eine Beſchreibung derſelben gewünſcht wird.

Der bekanntere von beiden iſt der goldſtirnige Blattvogel (Phyllornis aurifrons, *Tmm.*). Die Gattung Blattvögel (Phyllornis, *Boie*) gehört zur Familie der Honigfreſſer (Meliphagidae) und umfaßt etwa zehn Arten, die in Indien und auf den Sunda-Inſeln heimiſch ſind; die beiden bisher lebend eingeführten Arten ſtammen aus Indien. Der goldſtirnige Blattvogel erſcheint am ganzen Körper ſchön grasgrün, oberſeits dunkler, unterſeits heller; die Stirn bis zur Kopfmitte iſt glänzend orangegelb, die Oberkehle tiefblau, von einer breiten ſchwarzen Binde umgeben, die ſich vom Schnabelwinkel über Geſicht, vordere Kopfſeiten, Halsſeiten und Oberbruſt hinzieht; dieſe ſchwarze Färbung iſt eingerahmt von einer ſchmalen orangegelben Binde. Seine Heimat iſt der größte Theil Indiens, wo er bereits häufig im Käfig gehalten wird. Im Lauf der Jahre gelangte er vereinzelt nach Europa.

Ueber ſeinen Geſang äußerte ſich zunächſt A. E. Brehm, daß derſelbe ihn überraſcht und ſeine Erwartungen übertroffen habe; er bezeichnet ihn als einen Schlag in beſtimmten Strofen, laut, tonreich, mannigfaltig und durchaus wohlklingend; „ſcharf abgeſetzte Töne wechſeln mit trillernden und werden durch ſchmatzende und gelind ſchnarrende verbunden“. Schlechtendal ſagt, ihn habe der Geſang des Blattvogels befriedigt: „Selbſt die ſchnarrenden Töne klingen keineswegs unangenehm, die Triller ſind anmuthig und die flötenden Töne von großem Wohlklang.“ Frau Caroline Hodgſon, eine engliſche Vogelliebhaberin, ſchrieb vor einigen Jahren in dieſer Zeitſchrift über den Geſang eines Vogels dieſer Art: „Einzelne Strofen ſind ſehr melodiſch und ähneln dem Droſſel- und Schwarzplättchengeſang, ja ſogar dem der Schamadroſſel. Leider hat er aber mitunter recht ſchreiende Töne, die er mit beſonderer Vorliebe erſchallen läßt, wenn man im Geſpräch begriffen iſt; meines Erachtens muß er dieſe ſchrillen Laute einem Papagei abgelernt haben!“

Die Fütterung des Blattvogels muß hauptſächlich aus allerlei weichen, ſüßen Früchten beſtehen, namentlich Birnen, Weinberen, Kirſchen, Erdberen, Eierpflaumen u. a.; zum Herbſt hin muß man ihn an mürbe Aepfel, Bananen, Feigen, Datteln, Apfelſinen, Roſinen u. a. gewöhnen. Es empfiehlt ſich, ihm alle harten Früchte zerſchnitten zu reichen, obgleich er es vermag, mit ſeinem ſpitzen Schnabel auch aus dem Innern der Frucht den Saft zu ſaugen. — Daneben bedarf er thieriſcher Nahrung: ein Miſchfutter aus getrockneten Ameiſenpuppen, überrieben mit Möre oder Gelbrübe und dazu erweichtes, gut ausgedrücktes und zerkrümeltes Eierbrot oder auch wol ebenſolches gutes Weißbrot und dann fein gehacktes mageres rohes Rindfleiſch, Alles zu gleichen Theilen tüchtig untereinander gearbeitet. (Schluß folgt.)

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

I.

Recht gut ſind mir noch die lebhaften Schilderungen und Erzählungen der Forſcher fremder Gebiete über deren gefiederte Welt in Erinnerung. Bin ich doch beim Leſen dieſer lebendigen Darſtellungen mit allen meinen Empfindungen den Forſchern durch Afrika und Amerika gefolgt; im Geiſte habe ich die großen Flüge meiner Lieblinge geſehen und ſo oft den beneidet, der all' die ſchätzenswerthen und wiſſensreichen Beobachtungen an Ort und Stelle, in Gottes freier Natur hat machen können. Sollte ich dabei nicht daſſelbe Verlangen, daſſelbe Sehnen an den Tag gelegt haben, wie ſo mancher unſerer Vogelliebhaber, deſſen Berufsſtellung es verbietet, dem Forſcher zu folgen, der aber in ſeiner mit Liebe gepflegten Vogelſtube einen Erſatz findet, eine Stätte, die ihm tagtäglich ſo unausſprechlich viel Stoff der Unterhaltung und Belehrung bietet?! Wie viele wiſſenſchaftliche Fragen über das Vogelleben hat der Züchter viel früher zu beantworten gewußt, als es dem Forſcher in entfernten Gebietstheilen gelingen wollte. Mit Recht kann man wohl behaupten, daß die Züchtungen in der Vogelſtube der Wiſſenſchaft dieſelben Dienſte geleiſtet haben, wie die Forſchungsreiſenden in fremden Erdtheilen. Allerdings muß dem noch ergänzend hinzugefügt werden, daß die Liebhaberei für eine Vogelſtube lange nicht die Erforderniſſe an den Züchter ſtellt, als eine Forſchungsexpedition durch Afrika und Amerika, infolgedeſſen ſteht nun auch auf der einen Seite ein ganzes Gros von Züchtern, während andererſeits die Namen der Forſcher in unſerer einſchlägigen Litteratur nur vereinzelt zu finden ſind.

Meinen Reiſen liegt nun allerdings keineswegs die Veranlaſſung wiſſenſchaftlichen Strebens zu Grunde, vielmehr iſt es die Lebensaufgabe bürgerlicher Arbeit, welche mir ſeit zwei Jahren den Aufenthalt in den amerikaniſchen Tropen angewieſen hat. Umſomehr lag mir jetzt der Gedanke nahe, diejenigen Vogelarten in der Natur kennen zu lernen, denen ich ſeither nur in der Vogelſtube meine Aufmerkſamkeit zuwenden konnte.

Die Illuſionen, mit denen ich die Tropen betreten habe, — was hoffte ich nicht alles zu finden! — haben im Grunde genommen eine nicht geahnte Enttäuſchung erfahren. Mit Ausnahme der üppigſten Vegetation in der Pflanzenwelt fand ich alles leer und ausgeſtorben. Von den farbenprächtigen Papageien, von den Sängern u. a. war keine Spur. Hin und wieder ein kleines Vögelchen, deſſen Art zu beſtimmen durch das unſcheinbare Gefieder und auf Entfernung mir unmöglich war, welches ich ſchließlich auch nicht gekannt haben würde, da ſeines Gleichen wol kaum ſchon einmal lebend nach Deutſchland gekommen ſind. Die einzige Vogelart, welche gleich zu Anfang in großen Scharen zu beobachten ich Gelegenheit hatte, waren die Aasgeier, Cathartes aura (zu Lande Zopilotes), wenn ſie zu Hunderten über ein verendetes Thier hergefallen waren und durch das Nahen der Menſchen aufgeſcheucht wurden. Dieſelben konnten für mich nur wenig Intereſſantes bieten und ſomit muß ich es nochmals wiederholen, daß meine Erwartungen in eine große Enttäuſchung verwandelt waren.

Seit jener Zeit, alſo innerhalb der zwei Jahre meines Aufenthalts in Centralamerika, hat ſich nun manches geändert, d. h. nicht die Natur, ſondern ich mich mit meinen Anſchauungen. Nicht nur, daß ich die früher gehaßten, ekelhaften Aasgeier, auf welche Vogelart ich in einem ſpäteren Artikel nochmals zurückkommen werde, als eine Wohlthat, als eine Sanitätspolizei der Tropenländer ſchätzen gelernt, ſondern ich habe auch nach und nach all' die Gegenden aufzufinden gewußt, wo meine Hoffnungen, das Thun und Treiben der hieſigen Vogelwelt eingehend beobachten zu können, beſtätigt worden ſind. Wenngleich ich heute auch noch nicht mit meinen Beobachtungen über die einzelnen Arten an die Oeffentlichkeit treten will, vielmehr nach und nach den deutſchen Liebhabern meine Erfahrungen niederſchreiben werde, ſo muß ich dennoch ſchon heute vorausſenden, daß meine Abhandlungen auf wiſſenſchaftliche Studien abſolut keinen Anſpruch machen ſollen, ſondern es iſt lediglich das Intereſſe zu den Vögeln, welches durch jahrelange Züchtungen auf allen Gebieten mir Erfahrung und vor allem einen offenen Blick geſichert hat.

Mein heutiger Bericht ſoll den Rahmen des Allgemeinen nicht überſchreiten und dennoch hoffe ich, noch manches zu behandeln, was von Intereſſe ſein könnte.

Wie bereits erwähnt, machen die Tropen Centralamerikas bei erſter Beurtheilung den Eindruck, als ob außer der Pflanzenwelt wenig Leben zu finden wäre und dies gilt inſonderheit während der Trockenzeit, in welcher noch nicht einmal an den Küſten ein regeres Vogelleben ſich feſtſtellen ließ. Allerdings habe ich mich daſelbſt nie längere Zeit aufgehalten und aus Geſundheitsrückſichten mehr im Innern und in höheren Lagen das Ziel meiner Thätigkeit geſucht. Aber auch hier macht anſcheinend alles einen überaus ruhigen Eindruck. Die meiſten Vögel ziehen in Scharen im Land umher und deren Auffinden iſt vielfach nur vom Zufall abhängig. In den Monaten Februar und März beziehen die Pare ihre Brutſtätten und die Aufzucht der Jungen fällt größtentheils in den Anfang der Regenzeit. Sind die erſten Regenſchauer niedergegangen, ſo iſt wie mit einem Zauberſchlag die ganze Natur umgewandelt. In wenigen Tagen haben ſich die während der ſechsmonatlichen Trockenheit von glühender Hitze verſengten und verdorrten Grasflächen in einen grünen Teppich umgewandelt. Sproſſendes Grün, zahlreiche Käfer und andere Inſekten bereiten den gefiederten Weſen den Tiſch. Ein buntes Leben und Treiben bietet ſich jetzt dem Beobachter. Es iſt die vortrefflichſte Zeit, Studien zu machen, die Vogelwelt in ihrem Thun und Treiben kennen zu lernen, die Neſter ausfindig zu machen und da die Männchen, ſoweit dies der Fall, ſich durch Geſang oder durch Prachtgefieder von ſelbſt kennzeichnen, die Zuſammengehörigkeit der einzelnen Pare feſtzuſtellen.

Digitized by Google

Offen muß ich bekennen, als ich meine Studien in Centralamerika begann, kannte ich nichts, als einige gewöhnliche Erſcheinungen des deutſchen Vogelmarkts. Der größte Theil der mir entgegentretenden Vögel war und iſt mir noch unbekannt und beſteht in der Hauptſache aus Arten, welche in Deutſchland vielleicht in zoologiſchen Sammlungen und Muſeen zu finden ſind, aber lebend ſelten oder gar nicht in dem Handel vorkommen. Ich ſtand vor einem Hinderniß, das zu überwinden mir nicht geringe Anſtrengungen verurſachte. Alle Auskünfte bei den Indianern, wenigſtens ſoweit ſie die Art eines Vogels betreffen, ſind mangelhaft und unrichtig und konnten mir kaum dienen. Zunächſt lag mir nun der Gedanke nahe, mit einigen Liebhabern in Verbindung zu treten und meine freundſchaftlichen Beziehungen wurden im Lauf der Zeit ſo weit ausgedehnt, daß ich eine ſtändige Einlaßkarte fürs zoologiſche Muſeum in Guatemala erhielt.

(Schluß folgt.)

Das Rothkehlchen, auch Rothbrüſterle genannt.

Von A. Reuter.

Dieſes überall gekannte Vögelchen iſt unſtreitig der Liebling aller Vogelfreunde. Schon ſein anmuthiges und intelligentes, dabei neugieriges und zutrauliches Weſen bringt es dem Menſchen näher, als, ich möchte faſt ſagen, jeden andern Vogel, und es beſitzt alle Eigenſchaften, dem Natur- und Vogelfreund zu gefallen. Sein anmuthig lieblicher Geſang, den es von den höchſten Gipfeln der Bäume, wie auch vom tiefſten Fichtendickicht aus, vorträgt, iſt beſonders ſchön und feierlich des Morgens früh, und Abends, wenn es ſchon lange dunkel geworden.

Es kommt gewöhnlich im ſüdlichen Deutſchland zu Anfang oder Mitte März, in anderen Gegenden erſt im April zurück, zuerſt die Männchen und vierzehn Tage oder drei Wochen ſpäter die Weibchen, je nachdem die Witterung ſich geſtaltet. Sie halten ſich dann meiſtentheils in Hecken und Gärten in der Nähe unſerer Wohnungen auf, und werden da leider nur zu oft von Unkundigen und Kindern mit Leichtigkeit gefangen und elendig eingekerkert, und mit allem möglichen, nicht zuſagenden Futter einem baldigen Tod preisgegeben, oder es werden ihnen die Flügel geſtutzt, um ſie im Zimmer frei laufen zu laſſen, wo ſich dann in der Regel nur zu bald die alte Hauskatze einen leckern Biſſen verſchafft. Oft haben ſie auch noch durch Schnee und Kälte viel zu leiden; zu Dutzenden hüpfen ſie dann auf Höfen und Dungſtätten herum und ſuchen Futter. Da ſollte ſich nun der Menſch erbarmen und Futter ſpenden in dieſer Zeit; der Vogel nimmt ja mit allem fürlieb, ſeien es trockene Brodkrumen oder eingeweichtes Brod, Fleiſchreſte oder Erdwürmer, die in jedem Garten zu finden ſind. Ich ſelbſt habe in ſolchen Zeiten ganze Mehlwurmhecken dieſen Hungrigen geopfert; ich erinnere mich heute noch mit Vergnügen einer Epiſode in einem ſehr kalten und ſchneereichen Frühjahr zu Anfang der achtziger Jahre, und bitte die ſehr verehrten Leſer der „Gefiederten Welt“, gütigſt entſchuldigen zu wollen, wenn ich dies hier einſchalte; es iſt jedoch nicht ganz ohne Intereſſe. Ich war damals in Bayern, und wir hatten, wenn ich nicht irre, ſchon Mitte April; Rothkehlchen, Bachſtelzen, Stare und Rothſchwänze waren da, und hatten ſeit ihrer Ankunft ziemlich warmes Wetter. Eines Tags ſchlug jedoch die Witterung um, es fiel ein Meter hoher Schnee, und die Nächte waren ſehr kalt, ſodaß der am Tage von der Sonne geſchmolzene Schnee zuſammenfror, und ſo an der Oberfläche eine harte Kruſte bildete, ſodaß die Vögel großen Nahrungsmangel hatten und halbverhungert auf Straßen und Gärten umherwankten. Da dieſe Witterung anhielt und in den nächſten Tagen noch keine Beſſerung zu erhoffen war, ging es natürlich den Vögeln nicht gut, und ſie flogen bei offenem Fenſter geradezu in die Stube, ſie ſuchten alſo Schutz und Hülfe bei den Menſchen. Ich that für ſie, was in meinen Kräften ſtand, und die Kinder der Nachbarſchaft brachten mir die Vögel, welche ſich in die Häuſer flüchteten, dutzendweis. Auch ich fing alle, die in die Nähe unſeres Hauſes kamen und brachte ſie in eine nichtgeheizte Kammer. Das Futter brachte ich kaum mehr auf für ſo viele Gäſte, und doch konnte ich nicht zuſehen, wie ſie auf den Straßen elendiglich verhungern und hinſterben mußten. Ich ſtellte nun vor dem Haus ein Schlaggärnchen auf, um die Bachſtelzen und Rothſchwänze einzufangen und dieſelben zu den Uebrigen in die Kammer zu thun; bei Aenderung der Witterung wollte ich ſie wieder frei laſſen. Dies unſchuldige Unternehmen hätte mich aber damals bald vor den Richter gebracht. Es ging da jeden Tag ein älterer Herr Major, der zugleich Bezirkskommandeur war, vorüber, welcher einen weißen Pudel als Begleiter bei ſich hatte. Ob dieſer Pudel das Schlagnetz ſah, ich weiß nicht wie es kam, er lief, als ſein Herr ſchon einige Schritte vorbei war, wieder zurück und ſchnupperte an der Falle, welche ihm einen kleinen Denkzettel auf die Naſe gab, indem ſie zuſchlug. Der kluge Pudel aber ließ ſich nicht abſchrecken, nahm das Schlaggärnchen auf und brachte es ſeinem Herrn. Verwundert über dies ſeltſame Herbeibringen, machte der gute alte Herr Kehrt und ſein Pudel mit ihm, und legte das Schlaggärnchen auf denſelben Platz wieder hin, wo er es gefunden hatte. Da nun auch Futterreſte auf dieſem Platz lagen, ſo war ja kein Zweifel mehr, daß die Falle hier geſtellt wurde. Der Herr Major ſchickte ſich gerade an, in unſer Haus zu gehen, als ich ihm ſchon entgegen kam, ihn freundlichſt begrüßte und ihm das ſeltſame Abenteuer ſeines Begleiters, ſowie den Zweck meines Fallenſtellens erklären wollte. Der alte Herr unterbrach mich jedoch in meiner Rede und ſagte zu mir: „Es iſt nicht recht, den Hunger der Vögel zu benutzen, um ſie zu fangen.“ Ich war natürlich ſehr niedergeſchmettert durch dieſen Vorwurf, trotz des Bewußtſeins meiner Unſchuld und der Aufopferung für die hungernden und frierenden Vögel. Ich bat nun den Herrn Major um gütigſte

Anhörung meiner Entſchuldigung unter Nennung meines Namens und Standes, es wurde mir gewährt, und der Herr Major bemühte ſich die Treppe hinauf und betrachtete die Noth-Herberge meiner Gäſte. Nunmehr von der guten Sache überzeugt, verabſchiedete er ſich und erſuchte mich, ſeinen Argwohn nicht mißzudeuten. Ich war glücklich, daß ſich die Sache ſo gut abgewickelt hatte. Nach einigen Tagen, als beſſeres Wetter eingetreten war, öffnete ich die Fenſter der Vogelſtube und meine ſämmtlichen Gäſte gingen in Freiheit, von herzlichſten Glückwünſchen für ferneres Gedeihen meinerſeits begleitet.

Als weitere Fütterung nehmen die Rothkehlchen auch gequetſchten Hanfſamen; kurz geſagt, faſt jeder Menſch hat ſo viel übrig, um dieſe Thierchen vom Hungertode zu bewahren. Doch hüte man ſich, etwa in dieſer Zeit gefangene Rothkehlchen in ein geheiztes Zimmer zu bringen, denn dieſe ſind alle verloren, wenn nicht gleich, ſo doch ſpäter. Sie bekommen durch den zu raſchen Temperaturwechſel allerlei Leiden, von denen die gewöhnlichſten Durchfall und Aſthma ſind, an dem ſie meiſtens zu Grunde gehen. Im günſtigſten Fall kommen ſie mit knapper Noth mit dem Leben davon, wenn man ſie in einen nichtgeheizten Raum bringt und einige Tage ſparſam füttert, denn durch die vorausgegangene Futtersnoth nehmen ſie zu viel zu ſich und ſterben davon. Noch weniger darf man ſie fangen, wenn der April ſchon zu weit vorgerückt iſt, denn dann ſind die Weibchen ſchon da und die Vögel haben ſich gepart; da wären ſie in einem Tag ſchon dem Tod überliefert. Am beſten ſind die in den erſten Tagen des März gefangenen, dieſe ſind noch nicht gepart und ſingen oft ſchon am zweiten oder dritten Tag, auch ſollen die zuerſt ankommenden die beſten Sänger ſein. Man verhänge bei ſolchen Wildfängen den Käfig etwa acht Tage ganz und lüfte das Tuch nach acht Tagen jeden Tag ein bischen mehr, ſetze ihnen zuerſt auf den Boden des Käfigs Futter, in Form von Erdwürmern und Mehlwürmern, ſowie auch Waſſer. Das Rothkehlchen geht gewöhnlich ſchon in den erſten par Stunden an das Futter; hat es dieſes angenommen, ſo kann man am zweiten Tag ſchon geriebene Gelbrüben mit Semmel gemiſcht geben, darunter zerſchnittene Erd- und Mehlwürmer. Das Univerſalfutter klebt dann an den zerſchnittenen Würmern, und wird auf dieſe Weiſe mit verſchluckt. Einmal gekoſtet, wird es auch ferner genommen, und der Vogel iſt eingewöhnt. Man gebe ihm dann ſpäter auch Fleiſch, wie bei den übrigen Weichfreſſern angegeben iſt, darunter auch hartgekochtes geriebenes Hühnerei in kleinen Gaben, ſowie Ameiſenpuppen, friſch und gedörrt, welche es ſehr liebt, ſelbſtredend auch einige, etwa ſechs bis acht, Mehlwürmer des Tags.

Mit dieſem Futter kann ein Rothkehlchen lange Jahre erhalten werden. Ich hatte ein ſolches zehn Jahre lang. Es wurde zuletzt ganz ſteif auf den Ständerchen, an welchen ſtarke Schorfe entſtanden, während an den Kniegelenken ſich Geſchwülſte bildeten, eine Art gichtiſcher Veranlagung. Ich pinſelte die Ständer jeden Tag mit Jod oder Ameiſenſpiritus ein, am andern Tag mit ziemlich warmem Olivenöl, was dem Thierchen ſichtliche Erleichterung brachte. Trotz ſeines Alters und Leidens ſang es noch ſehr fleißig. Es war auch einer meiner beſten Sänger, die ich je hatte, und zugleich der Lehrmeiſter verſchiedener Jungaufgezogenen. Es ſang ſo laut und ſtark, daß ich oft glaubte, es müßten ihm die Lungenadern zerſpringen. Im zehnten Jahr lag es eines Morgens todt im Käfig; es ging zuletzt nicht mehr auf die Sprunghölzer, doch hatte es immer gleich guten Appetit. Ich verſorgte es auch mit allen möglichen Würmchen und Käfern, welche ich, hinter dem Pflug hergehend, auflas, und brachte oft in ein par Stunden eine anſehnliche Büchſe voll zuſammen, ſodaß ich immer für mehrere Tage meine Vögel damit verſorgen konnte, und dieſes iſt das natürlichſte Futter für die Rothkehlchen. Von Beren liebt es hauptſächlich die rothen und ſchwarzen Hollunderberen, auch Heidel- und Erdberen, ſowie Johannis- und Bromberen. Junge Rothkehlchen werden mit Ameiſenpuppen, in Milch geweichter Semmel und Hühnerei aufgepäppelt, ſpäter erhalten ſie das gleiche Futter wie die Alten. Die jungen Männchen ſind bald zu erkennen, ſie fangen gewöhnlich, erſt vierzehn Tage alt, zu dichten an. Die jungen Weibchen paren ſich ſehr leicht mit älteren Männchen, und man kann damit Züchtungsverſuche anſtellen; es gelingt faſt in jedem Fall, ob im Zimmer freifliegend oder im größern Käfig. Bei mir brüteten ſie am liebſten in alten ausgehöhlten Baumſtümpfen, welche ich ihnen in der Vogelſtube, hinter Farrenkrautſtöcken aufſtellte, auch zwiſchen den Winterfenſtern ließ ich ſie niſten. Bei einem Landmann ſah ich ſogar ein Pärchen, welches frei im Zimmer flog, auf einer der großen Himmelbettſtellen, wie man ſie in Bayern noch häufig auf dem Land antrifft, in einem alten Stiefelrohr brüten. Das Fenſter war mit engmaſchigem Drahtgitter verſehen, ſodaß wol Fliegen maſſenhaft herein konnten, welche den Vögeln theilweiſe als Nahrung dienten, jedoch dieſe nicht entfliegen konnten. Auf dieſe Weiſe ſah ich auch ſchon Bachſtelzen am gleichen Ort brüten, nur mit dem Unterſchied, daß ſie aus- und einflogen und das Futter für ihre Kleinen ſelber ſuchten. Durch den oberen Fenſterflügel flogen ſie aus und ein, es ſchien ſie nichts zu ſtören. Erwähnen muß ich noch, daß dies jungaufgezogene Vögel waren, die ſchon vorher aus- und eingingen.

Im Freien ſind die Rothkehlchen mit ihrer Brut vielen Gefahren ausgeſetzt. Oft haben ſie das Neſt freilich ſehr geſchickt und verborgen angelegt, aber auch ebenſo oft ungeſchickt, ſodaß ſie nicht allein von Menſchen, ſondern auch von allen möglichen Thieren heimgeſucht werden. Da geht gelegentlich der Igel an Eier und Junge, ferner Iltis, Marder und Wieſel, auch die Spitzmaus ſcheint Gefallen daran zu finden. Ferner iſt es noch die nackte rothbraune Waldſchnecke, deren es hier im Renchthal eine erſchreckend große Anzahl gibt. Dieſes gefräßige Ungezieſer vernichtet nicht bloß die Pflanzen, ſondern es geht auch an Fleiſchkoſt. Sie nehmen alle todten Thiere an, ſelbſt ihr eigenes Geſchlecht, wenn zufällig eine am Wege todtgetreten wird; gerathen ſie aber an ein Vogelneſt, in dem ſich nackte Junge befinden, dann wehe dieſen. Ich fand vor einigen Jahren in einem Erdloch eines Hohlwegs ein Rothkehlchenneſt, und wurde dadurch aufmerkſam, als ich eine mindeſtens 9 cm lange braune Schnecke dort am Neſtrande hängen ſah; vor ihr lag ein nacktes Junges auf dem Rücken und zappelte. Als ich mir die Sache genauer beſah, fand ich, daß die Schnecke dem Thierchen den Leib angefreſſen hatte, und ein Darm in ihrem Freßwerkzeug hing. Ich ſah ein, daß es unter dieſen Umſtänden das Beſte war, das Vögelchen ohne Weiteres von ſeinen Qualen zu erlöſen, was ich auch unverzüglich that. Dann ging es aber an die Schnecke; dieſe machte mit meinem Stiefelabſatz Bekanntſchaft. Es waren nun noch drei Junge im Neſt. Am andern Tag ſah ich nach, es fehlte wieder ein Junges. Ich fand es nun am gerathenſten, die noch übrigen zwei Jungen mit nach Haus zu nehmen und ſie ſelbſt zu pflegen, obwol ich zweifelte, dieſe aufzubringen, da ſie noch nackt waren und der Brutwärme noch bedurften. Ich hüllte ſie nun in Watte ein, ſtellte ſie auf den Ofen in einem Blumentopf, und fütterte ſie mit nur friſchen, gebrühten Ameiſenpuppen. Die Schnäbelchen öffneten ſie nicht, ſie waren noch zu klein. Das Köpfchen legten ſie immer auf die Seite und achteten nicht auf mein nachgeahmtes Locken der Alten. Ich ſuchte nun bei jedesmaliger Fütterungsvornahme ihre Schnäbelchen mittelſt eines rundgeſchnitzten Hölzchens zu öffnen, und ihnen Futter, wenn auch ſehr wenig, da ſie faſt zu ſchwach zum Schlucken waren, beizubringen. Es gelang auch mit großer Mühe, trotzdem hatte ich keine Hoffnung, ſie am Leben zu erhalten. Als ich ſie aber am dritten Tag noch hatte, da war mir nicht mehr bange, denn wärmender Federflaum bedeckte ihre erſt nackten Körperchen; auch fingen ſie an, die Schnäbel ſelbſt aufzuſperren. Nun hatte ich gewonnenes Spiel, hätte ich ſie aber dort gelaſſen, ſo wären ſie ſicher gleich ihren zwei Geſchwiſtern auch umgekommen. Die beiden Jungen gediehen vortrefflich; es war ein Weibchen und ein Männchen. Letzteres wurde ein recht guter Sänger; dem Weibchen gab ich die Freiheit. Im Herbſt ſind Rothkehlchen am beſten auf den ſchwarzen Hollunderberen zu fangen. So lange es jedoch noch Würmchen und Käfer gibt, gehen ſie nicht leicht in die Falle, höchſtens noch junge, unerfahrene; aber ältere beachten einen Mehlwurm auf dem Sprunggärnchen nicht zum Mindeſten, ſondern ſie hüpfen daran vorbei.

Der beſte Käfig für Weichfreſſer.

Von Joh. Gabl.

(Fortſetzung).

Ein anderer Uebelſtand, der mit dieſer Herſtellung der Schublade bzl. mit ihren Holzrändern noch verbunden iſt, iſt der, daß die Staubleiſten, welche über der Schublade innen im Käfig ringsumlaufen und deren Ränder decken, viel zu breit ſein müſſen, wenn ſie die hölzernen Ränder der Schublade wirklich gut decken wollen. Sie ſtehen alſo im Käfig zu weit vor und da die Vögel, beſonders Nachts, gern an der innern Käfigwand ſitzen, ſo lagert ſich gerade auf der Staubleiſte unter dem oberſten Sitz des Vogels gern der Koth deſſelben ab, deſſen kalkige Beſtandtheile nach der Vertrocknung als weiße Flecke in unvortheilhafteſter Weiſe aus dem Käfig dem Beſchauer entgegenleuchten. Wie ſoll zudem, ohne beſondere Beunruhigung des Vogels, eine ſolche Stelle gereinigt werden? Ohne Pinſel iſt das gar nicht möglich, und ſo bietet denn ein ſolcher, länger in Gebrauch ſtehender Käfig einen nichts weniger als reinlichen Anblick.

Indem ich die Schublade ganz aus Zink machte, wurde ſie ganz dicht und ihre Ränder wurden ſo ſchmal, daß ſie unter ganz ſchmalen, ſcharfgeneigten Staubleiſten vollſtändig gedeckt ſind; vom herabfallenden Koth können ſie viel weniger getroffen werden, und wenn, ſo bleibt er auf ihnen nicht liegen, ſondern rinnt ſogleich ab. Wenn die Wandungen des Käfiggeſtells etwa 2 mm dicker genommen werden, ſo entfallen die Staubleiſten vollſtändig, indem in den Wandungen des Käfigs in dieſem Fall ſoviel Holz ausgehoben wird, als die Schubladenränder zu ihrer Deckung brauchen. Die Stärke des Käfigs wird dadurch kaum beeinträchtigt.

Der eigentliche, unter der Schublade liegende hölzerne Käfigboden hat an der hintern Längsſeite des Käfigs einen an der Wand deſſelben hinlaufenden, etwa ½ bis 1 cm breiten Schlitz, den auch die Wiener Käfige haben und der ſich ſehr praktiſch erweiſt, indem man, wenn Sand oder etwas auf den Boden gerathen ſein ſollte, durch Hineinblaſen bei der Klappe es durch jenen Schlitz leicht entfernen kann.

2. Die Decke des Käfigs beſteht aus einem weichen, dunkelgrünen Tuch, welches auf einem in das Geſtell des Käfigs genau eingepaßten und herausnehmbaren Rahmen aufgeſpannt iſt. Die Drahtſpangen, welche über die Breitſeiten des Käfigs gehen, um ſicherheitshalber den Rahmen in ſeiner Lage zu ſchützen, ſollen aber nicht über irgend einen der Sprungſtäbe, überhaupt nicht innerhalb des Sprungraums, ſondern höchſtens über Futter- und Waſſergeſchirr verlaufen, da erfahrungsmäßig die Vögel immer von den Sprunghölzern, beſonders dem oberſten, aufwärts fliegen. Dadurch iſt jeder ſtarke Anprall und jede Beſchädigung des Vogels gänzlich ausgeſchloſſen, während bei den Wiener Käfigen eine ſolche Drahtſpange gerade über dem oberſten Sprungholz und parallel mit ihm verläuft.

3. Futter- und Waſſergefäß ſind zwei Zinkſchubladen von 22 cm Länge, 3 cm Höhe und 5 cm Breite. Sie werden in den Käfig eingeſchoben durch genau paſſende Oeffnungen, welche unmittelbar über der Staubleiſte in die vordere Holzwandung des Käfigs eingeſchnitten ſind. Die Oeffnungen ſind nach außen durch vertikal bewegliche, am Käfig anliegende Blechſchilde geſchloſſen, welche nach Herausnahme des Gefäßes von ſelbſt zufallen. Dieſe Einrichtung hat der Käfig, abgeſehen von den Maßen der Gefäße, mit den Wiener Käfigen gemein; verſchieden von dieſen iſt aber die Anordnung, durch welche die Gefäße in ihrer Lage feſtgehalten werden. Bei letzteren Käfigen werden die Gefäße in ihrer Lage feſtgehalten durch einen längsgeſpannten Draht, ſodaß das Gefäß zwiſchen dieſem und der Käfigwand, an welcher es auf der

Digitized by Google

darunter verlaufenden Staubleiſte aufliegt, eingeſpannt iſt und ſo in ſeiner Lage feſtgehalten wird. Dieſe Einrichtung habe ich in zweifacher Hinſicht als nachtheilig erfahren. Ein ſeitlicher Sprungſtab hatte ſich in einem Wiener Käfig durch Austrocknung in der warmen Zimmerluft gelockert und gegen das Waſſergefäß hin etwas verſchoben (ein Nachtheil, den ich unter 4 beſprechen werde), ſodaß der Vogel mit ſeinen Entlerungen den geſpannten Draht, alſo auch die Wand des Waſſergefäßes erreichen konnte. Der Koth blieb daran hängen, drang auch zwiſchen den Draht und das Waſſergefäß, verhärtete über Nacht und am folgenden Morgen war das Gefäß hierdurch wie feſtgenagelt, ſodaß es nicht mehr herausgezogen, ſondern nur losgeriſſen werden konnte, was oft ein Verſchütten des Waſſers zur Folge hatte. Aber noch einen weitern Uebelſtand mußte ich praktiſch erfahren. Ein Sproſſer, der nachts immer herumtobte, war am Morgen früh oft ganz naß, weil er im Dunkeln in das Waſſergefäß gerathen war. Ich entfernte nun abends das Waſſergefäß ganz, mußte aber einmal erfahren, daß er im Dunkeln unter den Draht hineingerathen war, dort mit den Flügeln ſchlug und ſich mit denſelben zwiſchen Draht und Wand ſo verſperrte, daß er ſie nicht mehr ſchließen konnte und große Gefahr eines Flügelbruchs war; ich mußte ihn mit der Hand aus ſeiner Lage wieder befreien. Dieſe Erfahrungen überzeugten mich, daß der Draht zu entfernen und die Gefäße in anderer Weiſe zu befeſtigen ſeien. Dies iſt nun dadurch erreicht, daß an der Rückwand des Käfigs, wo die Gefäße anſtoßen und mit ihrer Schmalſeite auf der Staubleiſte aufliegen, eine kleine Leiſte von der Höhe der Gefäße gezogen iſt, welche auf der Staubleiſte ſenkrecht ſteht, ſodaß das Gefäß hierdurch in ſeiner Lage feſtgehalten wird und alſo nicht gegen das Innere des Käfigs hinabkippen kann. Der durchgeſpannte Draht iſt dadurch ganz überflüſſig geworden. Die Gefäße liegen ganz feſt, und wenn ſie herausgezogen ſind, iſt der innere Raum gänzlich frei, was auch ſonſt noch vortheilhafter iſt. Wenn ein Vogel nachts unruhig iſt, nehme ich beide Gefäße heraus, ſodaß kein Futter zerſtreut oder verunreinigt, der Vogel nicht naß werden und ſich auch in keiner Weiſe verletzen kann. Wer dieſe Einrichtung einmal praktiſch erprobt hat, wird gewiß nicht mehr von ihr abgehen.

4. Die Sprungſtäbe ſind als ſogenannter Dreiſprung eingerichtet, wobei aber unter dem höhern Mittelſprungholz ein viertes, tiefer als die ſeitlich liegenden, angebracht iſt. Es iſt alſo eigentlich ein Vierſprung. Die beiden ſeitlichen Sprungſtäbe ſind von einander $31\frac{1}{2}$ cm (Wiener 24) entfernt; zwiſchen beiden um 9 cm höher (Wiener 8) liegt das Dritte, und 12 cm unter dieſem, alſo 3 cm tiefer als die ſeitlichen, liegt das Vierte. Hieraus iſt auch erſichtlich, daß in dieſem Käfig der Sprung von einem ſeitlichen auf den obern Sprungſtab verhältnißmäßig nicht ſo ſteil iſt, als bei den Wiener Käfigen (z. B. für Nachtigal und Sproſſer), indem er auf $15\frac{3}{4}$ cm nur 9 cm ſteigt, während er bei letzteren auf 12 cm Länge 8 cm Steigung hat.

(Schluß folgt.)

Briefliche Mittheilungen.

... Ein Bekannter von mir bezog von Herrn G. Brühl ein Pärchen **Wellenſittiche**; er pflegte ſie im Käfig. Nach einiger Zeit öffnete er den Käfig und ließ ſie zu ſeinem Vergnügen frei im Zimmer fliegen, ſie gingen dann jedesmal wieder zurück zum Freſſen. Einmal war unvorſichtigerweiſe das Fenſter auf und das Männchen entwiſchte und war nirgend mehr zu ſehen. Nun hing er das Weibchen vor's Fenſter, und nach ein par Minuten ſaß das Männchen wieder auf dem Käfig und wollte hinein; es flog beim Herannahen wieder auf den nächſten Baum. Nun wurde das Weibchen wieder ins Zimmer genommen und ſo geſtellt, daß das Männchen es ſehen konnte, im Nu war es dann auch im Zimmer. Nun hing er täglich bei gutem Wetter die Vögel zum Fenſter hinaus und öffnete die Thür, ſie verließen dann den Käfig und kamen ſtets zur Fütterung wieder. Abends ſetzten ſie ſich auch im Käfig zur Ruhe. Es war ein prachtvoller Anblick, wenn ſie im Sonnenſchein ihre Ausflüge machten, manchmal hoch in die Luft hinauf, und dann wie ein Pfeil wieder herunter, auch weit bis zur Oſtſee — dieſer Herr wohnt in Stolpmünde an der Oſtſee — fliegen ſie, um dann hin und wieder zur Fütterung heimzukehren. Leider iſt aber das Männchen von einer Katze ergriffen worden und das Weibchen wird nun vorläufig im Zimmer gehalten, bis es wieder ein neues Männchen hat. —

In Stolpmünde beſitzt ein Herr eine **Amazone**, die auch frei herumfliegt und ſtets heimkehrt; ſehr oft habe ich ſie ſchon von einer Telegraphenſtange ihr „Lora" rufen hören. Wenn man ſie von unten ruft und zeigt ein Stückchen Semmel, ſo thut ſie auch, als möchte ſie herunter kommen, kommt aber nicht, ihrem Herrn dagegen fliegt ſie ſofort auf die Schulter.

Alsdann möchte ich Ihnen noch das Sprachverzeichniß meines von Herrn G. Brühl bezogenen **Doppelgelbkopfs** einſenden: „Guten Morgen Mama, Kaffee kochen! Komm, Köpfchen kraueln, na komm, na komm! (Im befehlenden Ton) Na komm mal her! So iſt's ſchön, Köpfchen kraueln! Wo iſt denn mein Jung? Na tanz mal, mein Lorchen! (Tanzt dann.) Ach wie ſchön kann Lora tanzen, ach wie ſchön! Eins, zwei, drei, hurrah, Wache raus, der Prinz iſt da! Na ſing' mal, mein Lorchen! (Singt dann.) Hoch ſoll er leben, hoch ſoll er leben, dreimal, dreimal! (Fängt an zu ſingen.) Eins, zwei, drei, vier, Mutter mach' die Thüre auf, die Lora die iſt hier! (Fängt an zu pfeifen.) Lott iſt todt! (Bellt und lacht ganz furchtbar.) Na komm, gib Kuß! Schmeckt gut! Wo iſt denn meine Lora? Wo iſt denn mein Zuckerjunge? Mama kukuk! Wackre Lora! Papagei! (Auf Anklopfen) Herein! Elſe! Max! und Anderes mehr. **Fritz Gurgel.**

… Bei einem geſtrigen Spaziergang konnte ich zwei Pärchen Girlitze beobachten; es ſind die erſten, welche ich in unſerm Saarthal ſah. Das Vogelleben iſt hier ſehr mannigfaltig. Finken, Grasmücken, Droſſeln, Stare, Wendehals, Kuckuck, Pirol, Meiſen, Zaunkönig und Rothkehlchen ſind hier vertreten. Auch habe ich ſchon verſchiedene Male eine Waſſeramſel beobachtet, ein wirklich prächtiges Thierchen.

P. Mantes, Poſtſchaffner.

Aus den Vereinen.

Mainz, Geflügelverein. Unter dem Vorſitz des Herrn Direktor Gg. Schüler fand am 3. Mai in dem Glasſal des Schöfferhofs die diesjährige ordentliche Generalverſammlung des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht ſtatt. Nach der Begrüßung theilte der Vorſitzende mit, daß infolge anderweitiger Verwendung des ſeitherigen Vereinslokals die Verſammlungen nunmehr in dieſem Sal ſtattfinden würden, und er glaube, daß damit eine gute Wahl getroffen worden ſei. Eingehend berichtete er hierauf weiter über die in Petersburg ſtattfindende internationale Geflügelausſtellung, welche mit einem internationalen Kongreß verbunden ſei, auf dem eine Reihe der wichtigſten Gegenſtände für Geflügelzucht zur Verhandlung kommen würden. Der deutſch-öſterreichiſch-ungariſche Geflügelklub habe ein großes Intereſſe ſowol für den Kongreß, als auch für die Ausſtellung bekundet und würde eine größere Anzahl von Preiſen für die Ausſtellung ſtiften; ihm — dem Vorſitzenden — ſei die Ehre zu Theil geworden, als Delegirter einen Ruf für den Kongreß zu erhalten, infolge ſeiner Arbeitslaſt ſei es ihm aber nicht vergönnt, ſich nach Rußland zu begeben. Weiter theilt der Vorſitzende mit, daß in den Tagen vom 27. bis 29. Mai in Darmſtadt eine Geflügelausſtellung ſtattfände und er ſpricht die Hoffnung aus, daß dieſe Ausſtellung auch von Mainz aus gut beſucht werde, der Vorſtand werde für dieſe Ausſtellung einen Ehrenpreis ſtiften. Der Vorſitzende erſtattete nunmehr Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr, die Mitgliederzahl belaufe ſich jetzt auf 262; 7 Vorſtandsſitzungen, 6 Vereinsverſammlungen und 1 Hauptverſammlung hätten ſtattgefunden. Das Vermögen des Vereins betrage z. Z. 5546,84 Mk., welches bei der Sparkaſſe angelegt ſei. Mit voller Zufriedenheit könnten der Vorſtand und die Mitglieder auf das verfloſſene Vereinsjahr zurückblicken. Der Reviſionsbericht ſtellte den richtigen Befund der Bücher und Rechnungen feſt und dem Vorſtand wurde Entlaſtung ertheilt und dem Rechner, Herrn Schmitt, der Dank der Verſammlung ausgeſprochen. Es wird nunmehr zur Ergänzungs- und Neuwahl des Vorſtandes geſchritten und werden die Herren G. Schüler mit 129, S. Salomon mit 121, R. Schröter mit 123 und P. Buſchbeck mit 80 Stimmen wieder- und H. Schädler mit 81 Stimmen neugewählt. Herr Schüler erklärte, daß es ihm leider nicht mehr möglich ſei, den Vorſitz des Vereins zu behalten; ſeine Wohnung ſei von der Stadt zu weit abgelegen und er könne ſich nicht mehr, wie er es wünſche, voll und ganz dem Verein widmen. Es wird nunmehr zur Wahl des Ehrenraths geſchritten und es werden die Herren Bartz, Hillebrand, Krug, Loye und Dr. Mannheimer einſtimmig gewählt und zu Reviſoren wurden die Herren Lindebner und Oppenheim gewählt. Den Schluß der Verſammlung bildete die übliche Verloſung verſchiedener Vogelarten.

Anfragen und Auskunft

F. G. in St.: Der Vogel iſt in die Mauſer gekommen. Sie müſſen abwarten, bis er dieſelbe durchgemacht hat, dann wird er wieder ſingen.

Herrn Baumeiſter Friedrich Kennerknecht: 1. Der mir überſandte Papagei hatte im Leib in der Herzgegend ein Gewächs, das ſeinen Tod herbeigeführt hat. Der Kummer um die Abweſenheit ſeiner liebevollen Pflegerin hat ihn alſo nicht getötet, mag aber wol ſeinen Tod beſchleunigt haben. 2. Die Schamadroſſel war infolge eines Schlaganfalls geſtorben. Eine anſteckende Krankheit liegt nicht vor. 3. Das vermeintliche Weibchen war wahrſcheinlich ein junges Männchen. Die Geſchlechter der Sonnenvögel ſind ja ſchwer zu unterſcheiden. 4. Laſſen Sie ſich durch einzelne Unglücksfälle nicht abſchrecken, eine Vogelſtube einzurichten. Bevölkern Sie ſie zunächſt nur mit ausdauernden Vögeln, bei denen Sie keine Verluſte zu befürchten haben, dann werden Sie bald wieder Freude an unſrer ſchönen Vogelliebhaberei finden.

Frau R. Siegmund: Zur Zucht Ihrer Schwalben wünſche ich Ihnen viel Glück! Fügen Sie zu dem genannten Niſtmaterial noch Roßhare hinzu. Als Aufzuchtfutter empfehle ich Ihnen ein Gemiſch von gehacktem Ei, Ameiſenpuppen und Semmel.

Herrn K. Hang: 1. Vögel, die Ihren Wünſchen entſprechen, ſind der Prachtfink, der Indigofink und der amerikaniſche Trauer-Zeiſig. 2. Das Nachtigalweibchen iſt dem Männchen faſt völlig gleich, doch bei den alten Vögeln ſind die Unterſchiede in Farbe und Geſtalt wenigſtens ſo bemerkbar, daß ſich der Kenner ſelten im Geſchlecht irrt. Der Oberkörper des Männchens iſt ſchön ſeidenartig roſtbraun, der des Weibchens matter, fahler; die Wangen des erſteren ſind bräunlich, die des letztern mattbräunlich, mit deutlichem aſchgrauem Schimmer; Kehle und Unterleib ſind beim Männchen reinweiß, beim Weibchen hellaſchgrau oder weißlichgrau; Schwingen beim Männchen an der Innenfahne ſchwärzlichgrau, beim Weibchen mattdunkelgrau; Steuerfedern beim Männchen bräunlichroſtroth, beim Weibchen entſchieden heller roth; Unterſchwanzdeckfedern beim Weibchen verwaſchen gelblichweiß, beim Männchen kräftiger mit lichtem röthlichem Anflug; ähnlich die unteren Flügeldeckfedern; Kopf des Männchen breiter als beim Weibchen. Die Barthare des Männchens fallen nach Stärke und lebhafter Farbe mehr in's Auge.

Zu unſerm Bilde.

Um dieſe Zeit, Ende Mai und Anfang Juni, beginnt das Brutgeſchäft des Mauerſeglers (Cypselus apus, *L.*), jenes Bewohners der Lüfte, der nur zu uns kommt, um zu brüten und uns verläßt, ſobald ſeine Jungen flugfähig ſind.

Neſtbauſtoffe herbeizuſchaffen fallen dieſen Seglern, die faſt niemals den Boden berühren, recht ſchwer, da ſie ſie ſämmtlich aus der Luft aufſchnappen müſſen, wenn ſie der Wind emporwirbelt oder günſtigenfalls aus Sperlingsneſtern zupfen können. Dürres Gras, Blätter, Stroh, Lappen, Fäden, Wolle, Hare, Federn u. dergl. ſchleppen ſie, nachdem ſie ſich ihren Niſtplatz im Kampf mit ihres Gleichen oder Sperlingen und Staren, die ſie ohne Bedenken aus ihrem Neſt vertreiben, erobert haben, zu einem unordentlichen Haufen zuſammen, den ſie mit ihrem klebrigen Speichel überziehen, welcher dann an der Luft gummiartig raſch trocknet und wie lackirt ausſieht. Als Niſtplatz wählen die Mauerſegler, die ſtets geſellig leben, Höhlungen mehr oder minder hoher Gebäude, Mauerſpalten hoher Thürme, Riſſe alten Gemäuers, Räume unter Dachſparren, auch Felswände u. a. Man findet aber auch ihre Neſter hoch oben in Waldbäumen, beſonders in Eichen- und Kiefernwaldungen, wo ſie dann in kleinen Kolonien beiſammen niſten. Wo ſich ihnen die Gelegenheit bietet, drängen ſie ſich auch in die Höhlungen der Uferſchwalben und verdrängen dieſe. Daß ſie ſogar von Starkäſten Beſitz ergreifen, iſt weiter oben ſchon erwähnt worden.

Auf die verpappte flache Unterlage, aus der das Neſt beſteht, legt das Weibchen zwei bis drei weiße, faſt walzenförmige, 26 mm lange und 16 mm dicke Eier, die etwas grobkörnig und mattglänzend ſind. Das Weibchen brütet allein, und nach vierzehn Tagen, alſo Mitte oder Ende Juni, ſchlüpfen die Jungen aus, die, wie die Alten, mit Ausnahme der weißen Kehle, einfarbig roſtröthlichſchwarz ſind, nur etwas heller erſcheinen, da alle Federn einen ganz ſchmalen fahlweißlichen Saum haben. Die kurz zuvor ausgeflogenen Jungen erkennt man im Flug an den breiten Flügeln. Sie ſind oft kurz vor dem Abzug völlig flügge. Eine zweite Brut findet nicht ſtatt.

Unſer Bild zeigt das Weibchen des Mauerſeglers, das ſich vom Männchen nicht unterſcheidet, ein Junges, das Ei, ſowie das einfache Neſt.

K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Zu verkaufen: Zimmer-Volieren, Drahtgeflecht (eng), hartes Holz, 20 ℳ. Näheres u. Bild bei **Frl. Teubner,**
[993] **Weimar,** Berkaer Chauſſee 1.

Auch habe Jahrgänge 1890 u. 1893 der „Gef. Welt" billig abzugeben.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[994] **R. Schröter,** Clingen-Greußen.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in **praktiſcher** Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [995]

☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜

August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Futtermittel.

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter
für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[996] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
☞ Muſter und Proſpekte koſtenlos. ☜

Lager von **Ameiſeneiern.**
Direkter Import bei
[997] **H. Drefalt, Lübeck.**

Mehlwürmer, 1000 St. geg. Einſ. v. 1,70 in deutſch. Reichsp.-Markn. verſ. franko
[998] **D. Waschinsky, Berlin NW,** Wilsnackerſtr. 63.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen **inſekten-** und **kerbthierfreſſenden Vögel** pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpaketen franko, garantirt
[999] ſandfrei.
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfuttertab. m. Dampfbetr.

Mehlwürmer,

ſtaubfrei, à Lit. ℳ 4,50, Ko. ℳ 8, **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Lit. 90 ₰, bei 10 Lit. 85 ₰; I bei 5 Lit. 70 ₰, bei 10 Lit. 65 ₰ empfiehlt u. verſ. geg. Nachn. [1000]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Alle Vogelfutter,
Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.
E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche. Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1001

Frische Ameiseneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt der einzige Erſatz: **Zecke** mit heißem Waſſer übergoſſen und dann ausgedrückt. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zecke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Drogerien. Man verlange Zecke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1002]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Vögel.

Sehr ſeltene ruſſiſche
Weiden-Sproſſer
aus den Uferpflanzungen verſchiedener großer Stromgebiete des fernen europäiſchen Nordoſtens und Nordweſtens zu 20 bis 35 ℳ;
☞ **feine** ☜
Au- u. Wald-Sprosser
verſchiedener Gebiete u. Länder zu 12 bis 18 ℳ, ſowie **gewöhnliche Sproſſer** zu 7 bis 10 ℳ, direkt von Ort und Stelle durch den ſeit vielen Jahren allſeitig als ſtreng reell bekannten und ſtets fachmänniſch bewährten Spezialiſten
Mathias Rausch,
[1003] **Wien VII 3,**
Schottenfeldgaſſe Nr. 95.

Gelegenheitskauf!

Infolge einer unaufſchiebbaren Badereiſe gebe ſofort ab: 1 hochprima Donauſproſſer (Nachtſchläger) 20 ℳ, 1 ruſſ. Weidenſproſſer (Nachtſchläger) 16 ℳ, 1 Gartengrasmücke 6 ℳ, 1 Gelbſpötter 10 ℳ, 1 Wipſelrothkehlchen 3 ℳ, 1 roſenbrüſt. Kernbeißer 15 ℳ, ſämmtlich vorzügliche Sänger, 2–3jährig u. kerngeſund, 1 Kapfink 7 ℳ, 1 Haidelerche (Nachtſänger) 4 ℳ. Offerten unter S. an die Exped. dieſes Blattes. [1004

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

„Insectiverous",

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die
Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1005]
Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Geſetzl. geſchützt.

Geſetzl. geſchützt.

---

ff. Harzer Kanarien-Vögel,

Hohl- u. Knorr-Vögel, ſowie Klingel- u. Schaukel-Roller ohne Fehler 15, 20 u. 25 ℳ, geb. dieſelb. 14 Tage a. Probe, jedoch p. Nachn. od. Betrg. vorher, nicht gefall. Vögel tauſche um od. zahle zurück. Preisliſte frei. [1006]
L. G. Müller, Vogelzüchterei, **Nordhauſen a. H.**

NB. Junge von dieſem Jahr à Stck. 5 ℳ, 6 Stck. 25 ℳ, 12 Stck. 48 ℳ, frei dort.

☞ 1898 erhielt mein Stamm **Harzer Kanarienvögel 1. Statspreis, 8 gold., 1 gr. ſilb. Medaille.** Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10–25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.
Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [1007

Stiglitz, Hänfling, Zeiſig, Buchfink à 1,50, **Grauer Kardinal,** Prachtgefied. 4 ℳ, **Hochrothe Dompfaffen** à 4 ℳ, **Singdroſſel,** brillante Rufe, David-Kuhdieb ꝛc., nur 10 ℳ.

Blauſtirn-Amazone in wirklichem Prachtgefieder, für Ausſtellungen ſehr geeignet, ſpricht viel, kein Schreier, **gibt Pfote, kommt auf Hand,** nur 30 ℳ.

Anfragen mit Rückporto. Verpackung frei. Alle Vögel ſind in vollem Geſang, kerngeſunde Männchen. **Kleiner Luxushund,** ſehr ſcharf auf Mäuſe und Ratten, ſehr wachſam und ſtubenrein, macht ſchön, gibt Pfote, geht auf Hinterbeinen, klettert auf Leiter ꝛc., nur in gute Hände, Ausnahmeofferte nur 30 ℳ.
H. Noack,
[1008] **Friedeberg,** Nm., Markt 105.

Sproſſer, Grasmücken, Rohrſänger ꝛc.

halten ſich in unſeren **neu** konſtruirten Käfigen Nr. 62 u. 63 beim **beſtem Wohlbefinden.**

Nr. 62 40×23×19 3,50 ℳ
„ 63 60×26×25 4,80 ℳ
} Metallkäfig mit Holzunterſatz, Zinkſchieber und Ledertuchdecke.

Gefällig und ſehr ſolid gearbeitet. Vorhang zum Eingewöhnen 75 ₰.
Arthur Herrmann & Cie.,
[1009] **Oſchatz i. Sa.**

Empfehlen garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende
☞ **Sproſſer** ☜
à Stck. 9–12 ℳ, ſowie [1010]
Nachtigalen
4–6 ℳ und alle Arten
☞ **Grasmücken** ☜
unter Garantie lebender Ankunft. Preisliſte gratis.

Friſche Ameiſeneier,
pr., ohne Gehölz, Sand und Ameiſen, à Lit. 1,40 ℳ, dto. 1,20 ℳ II. Qualität
Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Verk.: 1 ausgezeichn. **David-Singdroſſel,** 98er Wildf. m. rein. ſch. Waldgeſ. 10 ℳ, 1 hochf. Steinrothel 12 ℳ, 1 Nachtigal 98er ſ. tief u. rein. Schläg. 10 ℳ, 1 hochf. Gebirgs-Amſel m. herrlich. Waldgeſ. 98er Wildf. 10 ℳ, 1 ſelten Hochgebirgs-Gelbſpötter, ausgezeichn. Sänger.
[1011] **Adolf Markert,** Scheibenberg, S.

Verkaufe:

1 Heuſchreckenrohrſänger, 1 Sumpfrohrſänger fürs Meiſtgebot. 1 Dorngrasmücke, 1 Zaungrasmücke, 1 Trauerfliegenſänger, 1 Schwanzmeiſe à 2 ℳ. Tauſche auf gleichw. Groten
Karl Mayer.
[1012] **München,** Parkſtraße 28/r

Digitized by Google

F. Rejsek,

Papageien-Gross-Handlung,

Hamburg, Peterstr. 28.

Specialität: Sprechende Papageien und Papageien-Käfige mit Porzellannäpfen.

Prämirt auf allen beschickten Ausstellungen.

Offerire als Specialität in schönsten, gesundesten, gelehrigsten Exemplaren: junge **Graupapageien** (Jakos), à 15 ℳ, solche bereits 8 Wochen hier, an Hanf und Wasser gewöhnt, tadell. schön im Gefieder, à 20 ℳ, solche, einige Stück schon ¾ Jahr in Europa, grosse Prachtexemplare, schon **vollkommen acclimatisirt,** wunderschön flötend u. zu sprechen anfang., nur 35 ℳ, solche schon viel sprechend, singend u. flötend, von 60 ℳ an, junge **Amazonen** (Blaustirn-Rothbug) anf. zu sprech., à 20 ℳ, solche, schon gut sprech., pfeifend, lachend, weinend, bellend, 30, 35, 40 ℳ und höher, je nach Leistung, einige junge **Doppelgelbköpfe,** prachtvoll in Farbe und Gefieder, gesund und anfangend schön zu sprechen, Stück nur 30 ℳ; dito junge **Goldnacken,** sehr gut u. allerliebst sprech. und täglich Neues lernend, à Stück nur 50 ℳ, **Rosakakadus,** St. nur 8 ℳ, **Inkakakadus,** in schönstem Prachtgefieder und zahm, nur 35 ℳ, **Alexander-Papageien,** Stück nur 3 ℳ, Par 5 ℳ, **1 Königslori** in schönster Farbenpracht, mit I. Preis prämirt, 40 ℳ, **1 Blumenausittich,** fingerzahm, anf. schön zu sprechen, 12 ℳ, **rothe Kardinäle,** Männchen, Stück nur 8 ℳ, **Wellensittiche,** echt importirte, Par nur 6 ℳ, **Tigerfinken** und **Schwarzkopfnonnen,** Par nur 1,50 ℳ, **6 Par für nur 6 ℳ, Astrilde, Orangebäckchen, Bandfinken,** à Par nur 2 ℳ, kleine **Sperbertäubchen,** à Par 4 ℳ, ausgesuchte Zuchtpare, Par 5 ℳ, **Zebrafinken,** Par 4 ℳ, **Harzer Kanarienhähne,** Tag- u. Lichtsänger, Stück nur 7 ℳ. **Japanesische Tanzmäuse,** Par nur 1,50 ℳ.

☞ **Affen,** besonders schön, an das Zimmer und Garten gewöhnt, Stück nur 18 20 ℳ, **Rhesus-Affen** nur 15 ℳ.

Versandt nach überall gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages und unter Garantie lebender Ankunft. **Papageienkäfige** mit Porzellannäpfen in allen Grössen und Façons stets auf Lager. Umtausch gestattet. [1013]

☞ Feine ☜

Singvögel

und zwar Sproſſer aller Raſſen, insbeſondere auch **echte** David-Sproſſer, welche den Davidruf **wirklich** ſchlagen, von 9—35 ℳ, Nachtigalen 4—9 ℳ, **Gebirgsſchwarzköpfe** 3,50—9 ℳ, Gelbſpötter 4—8 ℳ, Sumpfrohrſänger 4—5 ℳ, Blaukehlchen 4—7 ℳ, Rothkehlchen 1,50—5 ℳ, Garten- u. Sperbergrasmücken 3,50—6 ℳ, Würger, rothrückige, rothköpfige und Grauwürger 3—5 ℳ, ſowie überhaupt alle Sorten Weichfuttervögel empfiehlt unter üblicher Gewähr

Mathias Rausch,
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der
[1014] beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Preisliſte koſtenlos und poſtfrei bei Angabe über welche Vogelart.

Marocco — Tanger

Salomon & Co.

(Inhaber **Dr. M. Salomon**)

offeriren **Marocc. Vogeleier** in Neſtern, **Vogelbälge, lebende Sing- und Raubvögel.** Näheres auf direkte Anfragen. [1015]

Prachtvolle rothköpfige

Goulds-Amandinen,

Par 30 ℳ, dito ſchwarzköpfige dito, Par 26 ℳ, Sonnenaſtrilde od. auſtr. Amaranthen, Par 35 ℳ, Spitzſchwänz. Gürtelamandinen, Par 20 ℳ, Diamantfinken, Par 10 ℳ, Zebrafinken, Par 4,50 ℳ. [1016]

S. Risius, Bremerhaven.

Empfehle:

Wachtel-Hähne, gute Schläger, u. Rothrück. Würger à Stck. 2 ℳ, 3 Stck. 5 ℳ, junge futterfeſte Perlſtare, geeignet zum Anlernen, à Stck. 1,50, 6 Stck. 6 ℳ, junge Amſeln u. Droſſeln à 2 ℳ, junge Eichkätzchen à 2,50 ℳ, Rohrſänger und Nachtigalen à 3 ℳ, Schwarzplättchen, Doppelüberſchläger, à 4 ℳ, Erlenzeiſig u. rothe Kreuzſchnäbel à 1,50 ℳ, Lachtauben, Zuchtp. 2 ℳ, Dito reinweiße, Zuchtp. 4 ℳ. Garantie für gute Ankunft. [1017]

Aug. Schulz, Breslau I, Altbüßerſtr. 36.

Praktiſche Käfige für Nachtigal u. Sproſſer u. ſ. w. komplet à 3,50.

Habe weg. Wohnungswechſel einige vorzügl. Sänger abzugeben: **Blauamſel,** junger ausgefiederter ſſ. Sänger, 15 ℳ, **amerik. Spottdroſſel,** ſelten guter Spötter, 15 ℳ, **Jochbronelle,** hochalpiner Vogel (Seltenheit), 12 ℳ, **Orpheusgrasmücke** 10 ℳ, **Kalanderlerche** 8 ℳ, **Gartengrasmücke** 6 ℳ, **Schwarzkopf** 6 ℳ. Dann Frühjahrsfänge: 2 ſſ. ſüdtiroler **Nachtigalen** à 7 ℳ, **Blaubrüſtchen** 5 ℳ, ſowie junge **Harzer** von hochfeinen Eltern à Par 10 ℳ. [1018]

W. Lantschner,
Innsbruck, Karl-Ludwig-Platz 10.

[1019]

Geſucht:

Granataſtrilde, Buntaſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen u. ſeltene ausländ. Finken.

J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.).

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1020]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Prachtvoller, ſprechender

Breitſchwanzlori,

ſehr zahm.
[1021] **Fodróczy,**
Graz, Wickenburggaſſe 40.

Verkaufe: 1 Par grünfüßige Teichhühner mit wachsrother Stirnplatte u. Schnabel, 12 ℳ, 0,1 auſtraliſche Schopftaube, zuchtfähig, 8 ℳ. Sämmtliche Vögel ſind an Voliere gewöhnt und zahm.

J. Samereier,
[1022] **Birnbach,** Niederbayern.

---

1 Reitzugfink

und **1 Wildfaufink,** zweiſchallig, gut ſchnappend, billig abzugeben oder zu vertauſchen.

J. Blechschmidt,
[1023] **Schneeberg** in Sachſen.

Rothe u. gelbe Kreuzſchnäbel

verſende 6 Stück 4 ℳ, Dutzend 6 ℳ. Tauſche auch auf friſche Ameiſeneier, Sproſſer, Schwarzblättchen, Nachtigalen u. Käfige.

A. Jaumann,
[1024] **Großbreitenbach,** Thür.

Verkaufe: 1 Schwarzplättchen, 1 Rothkehlchen, 1 Zaunkönig mit Käfige, zuſ. für 27 ℳ. Ferner: 1 großen Heckkäfig für 15 ℳ.

P. Richter,
[1025] **Berlin SO. 26,** Naunynſtr. 58.

Bücher-Anzeigen.

In unſerm Verlage erſchien:

Naturgeſchichte der deutſchen Sumpf- u. Strandvögel

von **Dr. Curt Floericke.**

Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck.

Broch. ℳ 4.50, geb. ℳ 5.50.

Dieſes, eine höchſt intereſſante, noch wenig bekannte Vogelgruppe behandelnde Werk iſt in der Hauptſache auf Grund eigener Beobachtungen des Verfaſſers entſtanden, und ſo reizvoll geſchrieben, daß es das volle Intereſſe jedes Naturfreunds, Jägers oder Landmanns in Anſpruch nehmen muß.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
in **Magdeburg.**

Für Aquarienliebhaber!

Im unterzeichneten Verlage erſcheint

Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde

herausgegeben von **Dr. E. Bade.**

(Monatlich zwei Nummern!)

Preis: halbjährlich Mk. 2.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in **Magdeburg.**

Bei uns erschien:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von **Dr. Karl Russ.**

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhdlg.
in Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch **jede Buchhandlung,**
ſowie **jede Poſtanſtalt** (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der **Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung** in **Magdeburg** entgegengenommen.

Nr. 25. Magdeburg, den 7. Juni 1899. XXVIII. Jahrg.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Im Muſeum fand ich ja nun zu meiner Freude freilich einen großen Theil aller hier lebenden Vögel, wenngleich auch nicht immer in beſtem Zuſtand, aber doch vielfach Männchen und Weibchen, theilweiſe auch noch Exemplare im Jugendkleid.

Beſtimmt und mit Namen verſehen iſt alles, wenn auch vielfach nach älteſten Autoren und wenn auch theilweiſe für die Benennung provinziale Namen herangezogen wurden. Bekannter Weiſe iſt bei mancher Spezies die Nomenklatur eine überaus weitgehende, aber immerhin wird es mir leicht, mich zurechtzufinden. Ich habe ſogar den Muth, in periodiſchen Mittheilungen über die eine oder andre Art zu berichten, wenn nicht gar eine Zuſammenſtellung aller hier vorkommenden Arten aufzubauen. Freilich darf der Leſer nicht mehr von mir verlangen, als ich als Liebhaber der Sache zu nützen vermag. Beruf und Stellung geſtatten mir eben nur in freier Zeit mich der Liebhaberei und ihrer wiſſenſchaftlichen Seite zu widmen. Demzufolge können und ſollen meine „Mittheilungen aus Centralamerika“ nichts weiter ſein, als das Ergebniß gewiſſenhafter Beobachtungen, von einem Liebhaber geſammelt und niedergeſchrieben.

II.

Der Seidenſchwanz (Ampelis garrula)*).

Wie iſt es möglich, wird der Leſer fragen, daß man aus dem heißen Amerika über einen Vogel berichten kann, der doch im Allgemeinen zu den nordiſchen Vögeln gezählt werden muß und der ſich höchſtens in ſtrengen Wintern einmal veranlaßt fühlt, dem Süden von Deutſchland und dem ſüdlicheren Europa einen Beſuch abzuſtatten. Aber dennoch iſt dem ſo. Der Seidenſchwanz kommt nicht nur im nördlichen Europa, ſondern auch im nördlichen Amerika vor. Volle drei Monate konnte ich dieſen hübſchen Vogel in Guatemala beobachten, und noch heute, Anfang April, ſind einzelne Vögel zu finden. Er gehört in Guatemala 15° nördlicher Breite zu den regelmäßigen Wintergäſten und ſoll gerade in dieſem Jahr in größeren Scharen als früher eingetroffen ſein, deren ſüdlichſte Streifzüge ſich bis Nicaragua ausgedehnt haben ſollen. In Guatemala wurden die Seidenſchwänze in Unmaſſen gefangen und von den Indianern unter dem Namen „Mexikaniſche Vögelchen“ für circa 30 Pfennig deutſchen Geldes auf den Markt gebracht. Den Namen gab man den Vögeln wol deshalb, weil ſie über die mexikaniſche Grenze in das Land gekommmen ſind. Gefangen wurden ſie mit Schlingen und Leimruthen, welche an den Fruchtähren der Bananen und an den Tränkplätzen aufgeſtellt waren. Das Erſcheinen der Seidenſchwänze iſt alljährlich faſt ohne Ausnahme und ihre allgemeine Benennung iſt „Kapuziner“.

Wenn ich es offen ſagen ſoll, zählt der Seidenſchwanz nicht zu meinen Lieblingsvögeln, aber dennoch habe ich ihm dieſes Jahr mehr Aufmerkſamkeit als ſonſt entgegengebracht. Habe ich ihn doch als denſelben

---

*) Der Herr Verfaſſer befindet ſich im Irrthum. Es iſt nicht unſer europäiſch-aſiatiſcher Seidenſchwanz, der dort vorkommt, ſondern der amerikaniſche Verwandte (Ampelis cedrorum); wir kommen am Schluß darauf zurück. D. L.

Gaſt angeſehen und erkannt, der zur Winterzeit ſo oft die Thüringer Berge meiner Heimath belebte und dem ſich nun manche Erinnerungen anſchloſſen. — Größtes Intereſſe hatte für mich ſeine Ernährung, da er ſich doch in einem von ſeiner Heimath klimatiſch vollſtändig verſchiedenen Land befand. Die hieſigen Seidenſchwänze ſind gleich denen in Europa äußerſt träge, benehmen ſich dumm und nicht überaus ſcheu. Ihre Haupteigenſchaft ſcheint gut entwickelter Appetit und ungeſtörte Verdauung zu ſein. In der Freiheit haben ſich hier die Seidenſchwänze hauptſächlich von Bananen, Feigen und Beren genährt, ſie ſollen ſich aber auch an anderen Früchten des Landes, an denen kein Mangel iſt, gütlich gethan, ja ſogar den reifen Orangen (Apfelſinen) nicht unerheblichen Schaden zugefügt haben. Ich kann dieſe Angaben ſoweit beſtätigen, als die in meiner Gefangenſchaft befindlichen Vögel alle dieſe Früchte mit Vorliebe verzehrten und die mit einem Meſſer durch Querſchnitt in zwei Hälften getheilten Apfelſinen ſo ſauber ausfraßen, daß nur die Schale und das ſteinartige Samengehäuſe übrig blieben. Immerhin bleibt es bemerkenswerth, wie der Vogel ſeinen großen Appetit an Früchten, die er in ſeiner Heimath nicht kennt, zu ſtillen verſteht. Für gewöhnlich füttert man hier die Vögel mit gekochtem Reis. Eine lange Ausdauer ſollen die Kapuziner in der Gefangenſchaft nicht haben; ſie gehen meiſtens im Lauf des erſten Jahres ein, was ſchließlich vielleicht auf das heiße Klima oder auf unzweckmäßige Ernährung zurückzuführen wäre.

Die Seidenſchwänze erſchienen in Guatemala Anfang Dezember und verſchwanden Anfang März. Ich ſelbſt habe noch einige muntere Geſellen in der Voliere, habe mir aber außerdem noch einige Bälge präparirt, ſofern Zweifel darüber auftauchen ſollten, daß die hieſigen Seidenſchwänze anderer Art ſein ſollten, als die in Europa vorkommenden. Ich halte ſie für übereinſtimmend, indeſſen iſt es mir unmöglich, Vergleiche anzuſtellen, ebenſo fehlt mir hier jegliche Litteratur. Schon aus dieſem Grunde bin ich auf die Unterſtützung meiner deutſchen Kollegen angewieſen und Ergänzungen und Beſtätigungen werden mir nur willkommen ſein.

In der Liſte des „Museo Zoológico de Guatemala“ wird der Seidenſchwanz als in Guatemala vorkommend aufgezählt und befindet ſich auch in einigen ausgeſtopften Exemplaren in der Sammlung. Der ihm beigegebene wiſſenſchaftliche Name iſt „Ampelis cedrorum“ und ſeine fernere Beſchreibung lautet wörtlich:

„Este pàjaro es canoiido con el nombre de Capuchino, vive en tierra caliente: Escuintla, Chipuimulilla, Guazacapam, etc., y se aparecen en Guatemala en las meses de febrero y marzo, andan en bandadas bastante numerosas.“

Ueberſetzt: „Dieſer Vogel iſt bekannt unter dem Namen „Kapuziner“, er lebt im heißen Land: Esquintla, Chiquichulilla, Guazacapam u. a., und erſcheint in Guatemala in den Monaten Februar und März, ſie ſchwärmen alsdann in vielen und zahlreichen Zügen umher.“

Dieſen Mittheilungen zufolge zählt man den Seidenſchwanz zu den in Guatemala niſtenden Vögeln, denn die erwähnten Orte liegen alle in Guatemala und das Klima daſelbſt iſt infolge der ſeichten Lage ſehr heiß. Jeder weiß aber nun, daß die Heimath unſeres Vogels der Norden iſt und die vom Muſeum angeführten Angaben nicht ganz den Thatſachen entſprechen können. Möglich wäre es, daß einzelne Pare ſich im Zug verſpäteten und in Guatemala niſteten. Trotzdem mir dies wenig glaubhaft erſcheint, will ich dem Autor nicht eher widerſprechen, bevor ich meine Unterſuchungen in dieſer Angelegenheit abgeſchloſſen habe. Die hieſigen Eingeborenen kennen den Seidenſchwanz nur als Zugvogel, der vom Norden kommend, die Wintermonate in Guatemala verbringt. Dafür ſpricht auch ſchon der den Seidenſchwänzen gegebene Name (pajaros mejicanos) Mexikaniſche Vögel, und ich glaube, daß der Indianer in dieſem Punkt richtiger geurtheilt hat, als das Zoologiſche Muſeum von Guatemala. (Fortſetzung folgt.)

Nachtigal und Sproſſer als Stubenvögel.

Von Fr. Anzinger.

(Schluß).

Anders die Nachtigal. Man mag hundert Vögel dieſer Art aus einer Gegend ſchlagen hören, ſo gleichen ſie ſich faſt wie ein Ei dem anderen. Die Zahl der verſchiedenen Strofen wird nur ſelten unter 15 herunterſinken, der Unterſchied in der Prägung derſelben wird ſich meiſt nur auf eine minimale Abweichung beſchränken und das Fehlen irgend einer ſchönen Strofe wird meiſt durch einen anderen Vorzug im Geſang erſetzt. Auch zwiſchen Oertlichkeitsraſſen — wenn von ſolchen bei der Nachtigal überhaupt geſprochen werden darf — iſt ein ſo großer Unterſchied nicht bemerkbar als beim Sproſſer; der Prozentſatz an guten Vögeln iſt ein bedeutend höherer und minderwerthige Sänger kommen nicht in ſo großer Häufigkeit vor, wie bei der vorigen Art. Dieſe Vererbung conſequenter Vollkommenheit innerhalb der Geſammtheit der Nachtigalenſippe adelt ſie eben und läßt ſie in der Geſangsentwickelung höher ſtehen als die Sproſſerart. Aus dieſem Grunde achte ich die Nachtigal höher als den Sproſſer und betrachte ſie als die höchſtvollendete Form der Erdſänger.

Daß ich den Sproſſer trotzdem nicht ſo verſchmähe, wie andere die Nachtigal, möge darin ſeine Beſtätigung finden, daß in Innsbruck ſpeciell ich auf den Geſangswerth deſſelben aufmerkſam machte, viele Anhänger, bzl. Nachahmer fand und ſo einigermaßen eine Abwechslung in der hieſigen Vogelliebhaberei erzielte. Ob ſich der Sproſſer hier halten wird, iſt allerdings eine Frage, denn es kommen neben der

eier werden hier nicht beachtet —, ſo greift man behufs Einfütterung ſolcher Wildfänge zu „lebendem Futter“: Der arme Welſchtiroler ſucht nach den dort ſehr häufigen Küchenſchaben, gibt ſie zuerſt lebend, dann durch heißes Waſſer getödtet und ſpäter zerquetſcht und mit trockenem Polentabrei vermengt. Der Nordtiroler geht appetitlicher zu Werke und greift zu ſeinen beliebten Mehlwürmern. Noch bevor der Wildfang in den Käfig gebracht wird, werden 20 bis 30 Stück theils lebender, theils halbgetöteter Mehlwürmer auf den Sand der Schublade geworfen, das Trinkwaſſer eingeſchoben und der zur Verhüllung des Käfigs bereit gehaltene Stoff (gewaſchener, weißer Perkail) über denſelben geworfen.

Wenn ſich die Käfigthür hinter dem Gefangenen geſchloſſen hat, wird der Käfig „eingebunden“ d. h. mit dem erwähnten Stoff derart verhüllt, daß nirgends eine Lücke offen bleibt. Die Umhüllung wird ſtraff angeſpannt, ſodaß ſie ſich beim Herumflattern des Vogels nicht bewegt und denſelben nicht ängſtigt. Der Vogelkäfig wird nun gleich an jenen Platz gehängt oder geſtellt, wo er für die nächſte Zeit zu bleiben hat und wo Ruhe, möglichſt gleichmäßige Temperatur und, wenn thunlich, Sonnenlicht gewährt werden kann. Die auf dem Zug gefangene, ziemlich ausgehungerte Nachtigal geht ſehr bald, manchmal ſchon einige Minuten nach der Käfigung auf die am Käfigboden herumkrabbelnden Mehlwürmer los und nimmt ſie oft ſchon am nächſten Tage aus dem von anderen Vögeln oft mit Mißtrauen angeſehenen weißen Futtertrog. Der etwa $^{1}/_{10}$ Liter Flüſſigkeit faſſende, längliche und ſeichte Futtertrog wird nun täglich frühmorgens mit lebenden Mehlwürmern ſo weit gefüllt, daß letztere über den Rand deſſelben nicht herauskrabbeln und entfliehen können. Mit dieſer blanken Mehlwurmfütterung wird fortgefahren, bis die friſchen weißen, kleinen Ameiſenpuppen erhältlich ſind, von welchen dann täglich ein ſtarker Eßlöffel voll gereicht wird. Am dritten oder vierten Tage, manchmal aber auch erſt nach 14 Tagen nach der Käfigung beginnt die Nachtigal zu ſchlagen und ſetzt ihren Geſang gewöhnlich bis in die zweite Hälfte Juni, bisweilen aber auch bis Anfangs Auguſt fort. Bis zu dieſem Ende der Singzeit bleibt der Käfig verhüllt. Das gänzliche Einſtellen des Geſanges macht ſich gewöhnlich ſchon einige Tage vorher bemerkbar, indem das Feuer und die Kontinuität im Schlage bedeutend nachläßt und die Nachtigal auch nicht mehr auf die bekannten Reizmittel (Anwendung der Nachtigalenlocke und Reiben eines ſteifen, rauhen Papieres mittelſt einer ſteifen Bürſte) antwortet.

Iſt das Ende der Singzeit gekommen, ſo wird der Käfig abgedeckt. Zeigt ſich der Inſaſſe nach dieſer Bloßſtellung außerordentlich furchtſam und dementſprechend unruhig, ſo wird der Käfig auf den Fußboden des Zimmers an einer Stelle plazirt wo viel vorbeigegangen wird und hier bis zur Vollendung der Mauſer belaſſen. Mittelſt dieſes Verfahrens ſind die wildeſten Vögel, ſogar die ſtörrigen Würger (Lanius collurio) kirre zu machen. Selbſtverſtändlich kann dies nur dort vorgenommen werden, wo weder Hunde noch Katzen den gleichen Wohnraum mit dem Vogel theilen. Viele Vogelpfleger begehen dadurch einen Mißgriff, daß ſie ihren Sängern ſo hoch als möglich, manchmal dicht unter der Zimmerdecke den Platz anweiſen. Erſtens erhält hierdurch der Vogel niemals jene Zahmheit, als wenn er in gleicher Höhe oder etwas tiefer als das Geſicht des Pflegers ſeinen Stand hat und zweitens iſt die unter der Zimmerdecke befindliche Luft niemals ſo rein wie unten, ja manchmal ſogar mit Rauch oder Dunſt geſchwängert, was auf den Sänger ſicherlich nicht günſtig einwirkt.

Die Mauſer ſtellt ſich entweder ſogleich nach Beendigung der Singzeit oder acht bis vierzehn Tage ſpäter ein und dauert etwa drei bis vier Wochen.

Erſt nach dieſer Zeit, wenn der Vogel wieder in ſeinem ſchönen, glatten Federkleid vor uns ſteht, wird mit der Eingewöhnung deſſelben auf das Miſchfutter begonnen, denn ein hieſiger Grundſatz lautet: „Schnell und gut durch die Mauſer geholfen, heißt frühzeitigen Beginn der Singzeit herbeigeführt“.

Das hier übliche Miſchfutter beſteht in dem auch anderwärts bekannten Gemengſel aus geriebener Möre, geriebener altbackener Semmel oder an Stelle der letztern, geſottenem und geriebenem Rindsherz und in friſchem, ſüßem Käſequark, hier Topfen genannt. Dieſe Stoffe werden derart ſtark gemiſcht, daß ſie im Futter nicht als ſeparate Beſtandtheile vorkommen, ſondern untereinander gut zuſammenhängen. Einzelne Liebhaber geben unter dieſe Miſchung für je einen Vogel auch einen Theelöffel voll zu Mehl zerquetſchten Hanf, was ich bei eingewöhnten Nachtigalen zur Singzeit empfehlen, außerhalb derſelben aber nicht anrathen möchte. Unter dieſes zuſammengeſetzte Futter werden nun die urſprünglich blank gefütterten Ameiſenpuppen in ſolcher Menge gemiſcht, daß ſie im Futter vorherrſchen und hiermit wird ſo lange fortgefahren, bis das den Ameiſenpuppen mehr oder weniger anhaftende Miſchfutter mitgefreſſen wird. Stehen dem Liebhaber um dieſe Zeit noch alte oder ſchon friſchgezüchtete Mehlwürmer zur Verfügung, ſo empfiehlt es ſich, ſolche ſtark zerkleinert unter das Futter zu mengen, denn an die klebrigen Fleiſchtheile des zerſchnittenen Wurms heftet ſich mehr Miſchfutter an, als an die glatten, trockenen Ameiſenpuppen und wird ſomit am eheſten vom Vogel angenommen. Nunmehr kann die Beimengung der Ameiſenpuppen derart verringert werden, daß ſie nicht mehr den Haupt-, ſondern einen Nebenbeſtandtheil des Futters bilden. Für den Winter präparirte, d. h. ſcharf getrocknete Ameiſenpuppen werden hier wenig beachtet. An deren Stelle tritt wieder der Mehlwurm, welcher bis zu der gewöhnlich zur Winterſonnenwende beginnenden Singzeit in mäßiger, von da ab aber und bis zum Wiedererhalt friſcher Ameiſenpuppen in größerer Menge (etwa 20 Stück pro Tag) gefüttert wird. —

Hinſichtlich der Verpflegung des *Sproſſers* glaube ich nunmehr nur noch Folgendes anführen zu müſſen: Bei der Wahl des Raums, in dem der Vogel untergebracht werden ſoll, muß unbedingt darauf geſehen werden daß die Temperatur im Raum eine möglichſt gleichmäßige iſt und niemals unter 14 Grad Celſius herabſinkt, damit nicht Herabſtimmung der Geſangsluſt oder gar eine Erkältung des Vogels herbeigeführt werde.

Was die Fütterung betrifft, ſo iſt zu beachten, daß in der Winternahrung (Oktober bis Anfangs Januar) die fettbildenden Stoffe wie Hanf, Käſequark, Weiß- und Mehlwurm in möglichſt kleinen Mengen vorhanden ſein ſollen. Am beſten dürfte ſich folgendes Gemiſch empfehlen: Geriebene Gelbrüben, von welchen eventuell allzuviel vorhandener Saft durch Ausdrücken entfernt wird, geriebenes Rinderherz und getrocknete Ameiſenpuppen werden am Abend vor dem Tag der Verfütterung gut vermiſcht, in einem hermetiſch verſchloſſenen Gefäß bis zur Verabreichung am nächſten Morgen aufbewahrt, wobei die trockenen Ameiſenpuppen die Feuchtigkeit des übrigen Futters anziehen, weicher werden und etwas aufquellen. Zur Singzeit ſind wir hingegen in der Verabreichung von Mehlwürmern durchaus nicht ängſtlich und geben einem ſcharf und anhaltend ſchlagenden Sproſſer das gleiche Quantum von denſelben wie den Nachtigalen.

Ueber Krankheiten dieſer beiden Vögel und deren mögliche Heilung getraue ich mir nichts zu ſagen, denn ich habe mit meinen Anſichten kein Glück. Einmal fragte mich eine Dame während einer hieſigen Vogel-Ausſtellung, auf welche Art ſie ihr epileptiſches Schwarzblattl heilen könnte. Ich erwiderte hierauf mit einem Scherz einlenkend: „Geben Sie ihm kalte Umſchläge auf den Kopf und legen Sie ihm Senfteig auf die Waden“! — Entrüſtet ob ſolcher Frivolität kehrte mir die Schöne den Rücken und ließ mich mit meinen werthvollen Kenntniſſen allein. Die geehrten Leſer wollen daher entſchuldigen, wenn ich hier zu — ſchweigen beginne.

Der beſte Käfig für Weichfreſſer.

Von Joh. Gabl.

(Schluß).

Die Sprünge werden dadurch allerdings etwas größer (18 cm aufwärts und 16½ abwärts gegen 15 und 12½ cm im Wiener Käfig), allein das iſt beabſichtigt. Die Sprungweiten im Wiener Käfig ſind ſo klein genommen, daß mir Jedermann gewiß Recht geben wird, wenn ich ſage, daß dieſelben in Rückſicht auf den Vogel (Sproſſer und Nachtigal) abſolut nicht kleiner ſein dürften; die Maße ſtehen alſo an der Grenze des „zu kleinen“ und bezeichnen ſchon darum nicht das goldene Mittelmaß, welches auch hier zu empfehlen iſt. Da hingegen die hier angegebenen Maße aus der Praxis gewiß nicht werden als „zu groß“ wirklich nachgewieſen werden können, ſo dürften ſie dem empfohlenen und geſuchten Mittelmaß jedenfalls nahe liegen. Ich kann auch aus der Praxis verſichern, daß die Vögel dieſe Sprünge ſehr leicht, graziös, leicht hingleitend ausführen und ſich dabei wunderſchön und unverletzt im Gefieder erhalten, woran allerdings auch die demgemäß größeren Käfigmaße ein Verdienſt haben. Ich kann nicht unterlaſſen, hier auch einen ganz beſonderen Tadel gegen die Befeſtigung der drei unteren Sprungſtäbe im Wiener Käfig auszuſprechen. Welchen Verdruß und Aerger haben ſie nicht ſchon mir, welche Störungen nicht ſchon dem Vogel gemacht! Die beiden ſeitlichen Sprungſtäbe ſind nämlich nicht an einem Punkt feſtgelegt, ſondern laufen an je zwei horizontal in die Käfigwand eingelaſſenen und um ihre Dicke aus denſelben hervorragenden Drähten. Die Dicke dieſes Drahtes iſt ihr ganzer und einziger Stützpunkt. Wenn nun in der warmen Zimmerluft der Sprungſtab ſich nach und nach um etwa 2 mm verkürzt oder die Wände um ſoviel nachgeben, ſo iſt das Unglück fertig, der Stab fängt an hin und her zu rutſchen, er ſteht ſchief und fällt beim nächſten Sprung zu Boden. Ueber die ſchwierige Aufgabe, den Stab wieder an ſeine Stelle zu bringen, werde ich unter 5 reden; ohne Herausfangen des Vogels iſt dies wegen mangelnder paſſender Thüren ganz unmöglich.

Bevor aber noch der Stab zu Boden fällt, ſtellt ſich ſchon ein andrer Uebelſtand ein; wenn der Stab nicht mehr ganz feſt liegt, ſondern zu rutſchen anfängt, ſo ruſcht er der Sprungweiſe des Vogels und dem dadurch erhaltenen Stoß entſprechend nie gegen die Mitte des Käfigs, ſondern immer gegen die Gefäße zu. Wenn er nun nicht zu Boden fällt, ſondern ſogar gleichmäßig auf beiden Seiten weiterrutſcht, ſo braucht es nur wenig, daß der Koth des Vogels nicht vor dem Gefäß zu Boden fällt, ſondern auf den vorgeſpannten Draht, auf den Rand des Gefäßes oder gar in das Futter und Waſſer ſelbſt hinein. Welch' angenehme Ueberraſchung für den beſorgten Vogelfreund, wenn er bei der Fütterung das Gefäß voller Unreinigkeiten und Schmutz findet, indem der Käfig über Augenhöhe ſtand und das allmähliche Lockerwerden des Sprungſtabs nicht von Anfang an bemerkt wurde.

Das ſind nicht theoretiſche Nörgeleien, ſondern Uebelſtände, die ich an einem ſeit zwei Jahren benutzten Wiener Käfig praktiſch und wirklich ſelbſt erfahren habe. Und was ſoll ich nun vom unterſten Sprungſtab ſagen? Er iſt ein Muſter davon, wie es nicht gemacht werden ſoll; denn er iſt einfach, ohne ſeitlichen Halt auf die Staubleiſte aufgelegt und zwiſchen die beiden Längsſeiten des Käfigs eingepreßt, er fängt daher zuerſt und noch leichter zu rutſchen an, als die ſeitlichen Sprungſtäbe. Will man aber einen kleinen Keil zu ſeiner Befeſtigung einlegen oder ihn durch einen längern Stab erſetzen, ſo fallen dabei die ſeitlichen beiden Sprungſtäbe aus ihren ſchmalen Lagern und die letzten Dinge werden ärger als die erſten.

Dieſe Uebelſtände kann ganz unmöglich ich allein erfahren haben, da ſie in der Natur des Holzes und der Wirkung der Wärme liegen, welche gewiß überall gleich ſind. Ich habe darum die Sprungſtäbe, der altbewährten, einfachſten und ſicherſten Methode folgend, durch eingeſchnittene Kerben am Gitterwerk ſelbſt feſtgelegt. Dadurch können die Stäbe von außen, alſo ohne Eingriff in den Käfig ſelbſt, verſchoben und ſo die früher genannte Sprungweite vergrößert oder verkleinert werden. Das tiefſte Sprungholz aber, welches ſeiner Tieferlegung wegen nicht mehr zwiſchen dem Gitterwerk, ſondern zwiſchen den Längswandungen zu liegen kommt, ruht in einem eigenen viereckigen Lager, welches, in einem kleinen Klötzchen ausgehauen, unmittelbar über der Staubleiſte befeſtigt iſt. Ein Sichbewegen, Rutſchen, Herausfallen und Drehen dieſer Stäbe, ein Auseinanderſperren der Käfigwandungen iſt dadurch gänzlich ausgeſchloſſen. — Ich will nicht verſäumen, anzuführen, daß meine Sproſſer und Nachtigalen in dieſem Käfig keine umwundenen, ſondern nackte Holzſtäbe haben und trotz der größeren Sprungweite durchaus geſunde und reine Füße haben.

5. Die oben geſchilderten Erfahrungen mit heruntergefallenen Sprungſtäben u. ſ. w. überzeugten mich davon, daß ein praktiſcher Käfig unbedingt in der Mitte ſeiner Vorderſeite eine Thür haben müſſe, durch welche nothwendigen Falles die Hand ſchnell und leicht in alle Theile des Käfigs gelangen kann, und ſo iſt denn auch eine ſolche, beſtehend aus einem ganz leichten Holzrahmen mit Gitterfüllung wie der übrige Käfig, mitten in der Vorderſeite, zwiſchen der Holzfüllung und dem 9 cm höher ſich hinziehenden Holzſtab eingeſetzt. Manch' ein Vogelfreund ſpielt auch gern mit ſeinem zahmen Liebling, der gern auf den Tiſch herauskommt oder auf die Hand, um einen Mehlwurm zu holen; ihm iſt eine ſolche vordere Thür ganz unentbehrlich. Bei den Wiener Käfigen vermißt man ſie ſehr ſchwer. Wenn ein Sprungſtab in Ordnung zu bringen iſt, ſo muß man durch die einzige ſeitliche Thür vielleicht durch den ganzen Käfig hindurchlangen, während der Vogel vor Schreck in's Gitter ſtößt. Oder man muß die Decke abheben und den Vogel erſt herausfangen oder fliegen laſſen, um zur gewünſchten Stelle zu kommen. Hängt der Käfig völlig an einer Wand, ſo iſt die Ordnung im Käfig gar nicht wieder herzuſtellen, ohne daß derſelbe von der Wand herabgenommen wird. Dies alles wird durch die in der Vorderſeite angebrachte Thür vermieden, wodurch allein deren Anbringung genügend gerechtfertigt iſt. An der einen Schmalſeite befindet ſich eine gleiche zweite Thür, wie bei den Wiener Käfigen.

6. Die Größe des Käfigs iſt, wie ſchon angedeutet, durch die richtige Anbringung der Sprungſtäbe und Futtergefäße, bzl. deren Entfernung von einander bedingt. Die Entfernung der beiden ſeitlichen Sprungſtäbe von einander iſt $31\frac{1}{2}$ cm. Vom Sprungholz bis zum Futter- bzl. Waſſergefäß beträgt die gewählte Entfernung 7 cm, welche aber durch Näherrücken des Sprungſtabes verringert, durch Weiterrücken vergrößert werden kann, wodurch ſich dann natürlich auch die Entfernung der ſeitlichen Sprungſtäbe von einander vergrößert oder verkleinert.

Die Summe dieſer Maße, nämlich $31\frac{1}{2}$ cm + 7 cm × 2 + 5 cm (Gefäße) × 2 = $55\frac{1}{2}$ cm, ſammt der Dicke des Käfiggeſtells ergibt ſodann die Geſammtlänge des Käfigs mit etwa 57 bis 58 cm. Der Wiener Sproſſer-Käfig zeigt als Länge nur 46 cm.

Ueber die Vergrößerung der Sprungweite iſt das Nöthige ſchon unter Nr. 4 geſagt. Was nun die Wahl der Entfernung mit 7 cm vom Sprungſtab zum Gefäß betrifft, ſo war hierfür folgende Erfahrung maßgebend. Das Ideal für jeden Käfig wäre ein Vogel, der auf ſeinem ſeitlichen Sprungſtab ſitzend nach dem vorgelegten Futter langte, ohne ſeinen Platz zu verlaſſen, alſo ohne auf den Rand des Gefäßes ſelbſt zu ſpringen. Einen ſolchen Idealvogel gibt es aber nicht. Ich habe erfahren, daß jeder Vogel ausnahmslos, wenn ihm das Futter- bzl. Waſſergefäß nicht ganz nahe gerückt war, alſo auch dann, wenn er von ſeinem Sitz aus daſſelbe wol erreichen konnte, dennoch faſt immer oder doch ſehr oft auf den Rand des Gefäßes ſprang und ſo den Zweck des Näherrückens des Gefäßes vereitelte. Ich fand alſo in den gemachten Erfahrungen keinen Grund, Sprungſtab und Gefäß ſo nahe als möglich zuſammen zu bringen. Wenn der Vogel nun doch hinüberſpringt, iſt es offenbar ganz gleichgültig, ob er 7 cm wie hier, oder bloß etwa 3 bis 4 cm, wie im Wiener Käfig ſpringt. Das Näherrücken des Gefäßes hat aber ganz offenkundige Nachtheile, denn der Vogel verſtößt ſeinen Schwanz am allzu nahen Gefäß und vermag auch oft, beſonders bei dünnen Entleerungen, daſſelbe zu erreichen, wenigſtens an ſeiner dem Vogel zugekehrten Wand. Alſo ſowol die Reinhaltung des Käfigs als die Schonung des Gefieders empfehlen geradezu einen etwas größeren Abſtand.

Aus Erfahrung, die ich gemacht habe, kann ich verſichern, daß ſich der Käfig bei dieſen Maßen ſehr reinlich hält, ein beſchmutztes Gefäß mir überhaupt noch nicht vorgekommen iſt, und der Vogel auch ſein Gefieder leichter ſchont.

Die Höhe des Käfigs iſt bedingt durch die Höhe der Schublade, das oberſte Sprungholz und jene aufgerichtete Stellung, die der Vogel auf demſelben beim Geſang und auch ſonſt gern einnimmt. Die Höhe der Schublade beträgt $3\frac{1}{2}$ cm (gegen $2\frac{1}{2}$ beim Wiener Käfig). Das unmittelbar über der Staubleiſte liegende unterſte Sprungholz ſteht 6 cm über dem Boden der Schublade (beim Wiener Käfig $4\frac{1}{2}$); es ſteht 3 cm tief unter dem ſeitlichen und letztere 9 cm unter dem oberſten, alſo 12 cm unter dieſem (beim Wiener Käfig 11 cm). Das oberſte Sprungholz liegt dann ungefähr wie beim Wiener Käfig 12 cm unter der weichen Decke. Es ergibt ſich mithin als Höhe des innern Käfigraums 30 cm. Rechnet man noch die vier Eckfüße des Käfigs hinzu, ſo ergibt ſich als geſammte Höhe 32 cm, während jene des Wiener Käfigs 30 cm beträgt.

Die Tiefe (Breite) des Käfigs iſt 23 cm (Wiener Käfig 21 cm).

Die Größe des Futter- bzl. Waſſergefäßes iſt in Bezug auf die Breite dieſelbe wie beim Wiener Käfig, nämlich 5 cm, dagegen etwas tiefer, nämlich 3 cm (gegen $2\frac{1}{2}$) und durch die Käfiggröße bedingt um 2 cm länger, nämlich 22 (gegen 20).

Der Anſtrich des Käfigs iſt grün, mit einer goldbronzirten Krönungsleiſte. Der Käfig präſentirt ſich alſo im Vergleich zum Wiener Käfig als etwas höher und tiefer, dagegen um 12 cm länger. Die

Einrichtung iſt nach den früher gemachten Grundſätzen und Forderungen an einen Weichfreſſerkäfig angeordnet. Sie dürfte auf Grund der erprobten Anwendung und gemachter praktiſcher Erfahrungen jene Uebelſtände vollkommen vermeiden, welche an den Wiener Käfigen hervortreten, wenn ſie länger in Gebrauch ſind und in dieſer Zeitſchrift in früheren Aufſätzen wenigſtens berührt worden ſind. Ich kann nicht umhin, allen Freunden von Sproſſern, Nachtigalen, Sperbergrasmücken ꝛc. dringend zu empfehlen, einmal den Verſuch zu machen und ſich einen Käfig genau nach den hier angegebenen Maßen und Anordnungen bauen zu laſſen und dann praktiſch zu erproben. Sie werden ganz gewiß, deſſen kann ich ſie verſichern, keinen andern mehr verwenden und ſich von den gerühmten Vorzügen deſſelben vollſtändig überzeugen.

Der Käfig kommt, trotz ſeiner nicht unbeträchtlicheren Größe, auch nicht theurer als der Wiener Käfig, da ihn ein hieſiger Schreinermeiſter, bei dem ich ihn anfertigen ließ, für 10 ℳ fertig herſtellt. Sollte es möglich werden, denſelben in mehreren Stücken (etwa 5) zugleich herzuſtellen, ſo würde er vielleicht auch für 9 ℳ lieferbar werden.

Wenn Freunde unſerer heimiſchen Sänger oder Käfigfabrikanten einen ſolchen Käfig als Muſter wünſchten, um ihn zu erproben und dann etwa nachzuahmen, ſo bin ich im Intereſſe der Sache gern bereit, die Beſtellung an genannten Schreinermeiſter zu vermitteln und ſeine richtige Ausführung zu überwachen.

Zum Schluß bemerke ich noch ausdrücklich, daß genannter Käfig nur mit dem Wiener Sproſſer- bzl. Nachtigalenkäfig verglichen ſein will. Auch Schwarzköpfe, welche die Wiener in ſogenannten Zweiſprungkäfigen beherbergen, finden ſich im obengenannten Käfig ſehr wohl und gewöhnen ſich ſehr leicht an den dargebotenen Dreiſprung. Sollte aber Jemand dem Schwarzkopf und ſeiner Sprungweiſe ganz beſonders entſprechen wollen, ſo kann dies auch in dieſem Käfig geſchehen, indem über den beiden ſeitlichen Sprungſtäben je einer in gleicher Linie mit dem oberſten angebracht wird, ſodaß dann oben 3 ſolche in einer Ebene liegen. Was bei Nachtigalen und Sproſſern nie anginge, da ſie von den Sprungſtäben oft gerade aufwärts fliegen und ſich ſo an den oberen Sprungſtäben beſchädigen könnten, kann bei Schwarzköpfen, Rothkehlchen und Sperbergrasmücken unbedenklich erlaubt werden, da dieſe letzteren in der Zugzeit nie gerade auffliegen, ſondern nur am Gitter hinaufflattern. Das Auge des verſtändigen Beſchauers wird ſich immer daran erfreuen, den Vogel in einem verhältnißmäßig genügenden Käfig ſich bewegen zu ſehen, und ihn nicht in einem ſolchen zu erblicken, in welchem das Maß ſeiner Bewegungen auf das zuläſſig kleinſte eingeſchränkt und er nicht einmal in der guten Erhaltung ſeines Gefieders jederzeit thunlichſt geſchützt iſt.



Briefliche Mittheilungen.

... Auf die im Briefkaſten der Nr. 21 Ihres geſchätzten Blattes ertheilte Auskunft, daß „man einem Kanarienvogel kein künſtliches Bein einſetzen könne“, erlaube ich mir anzuführen, daß ich jahrelang eine Feldlerche erhalten habe, der ich ſelbſt ein künſtliches Bein gemacht hatte. Der Vogel hatte ſich in einem Raſenſtück, das ich ihm in den Käfig gelegt, einen Fuß dicht unter dem Sprunggelenk abgebrochen; ich ſchnitt das faſt abgeriſſene Ende mit einer ſcharfen Schere ſauber durch, verheilte den Stumpf und umwickelte ſodann die Spitze deſſelben mit einem dünnen Streifchen Verbandwatte. Auf dieſe ſtrich ich ringsum guten Fiſchleim und ſtreifte nun über den Stumpf einen Federkiel, deſſen Länge ſich natürlich der Länge des geſunden Beines von der Bruchſtelle abwärts anpaſſen mußte und deſſen Lumen genau über den umwickelten Stumpf paßte, d. h. demſelben ſich dicht anſchloß, ohne ihn jedoch zu quetſchen. Der Federkiel muß etwa 5 mm weit über den Stumpf hinaufgezogen werden, da ſonſt das Bein keine Feſtigkeit hat, und wenn dies geſchehen iſt, muß daſſelbe genau die Länge des geſunden Beines haben, da ſonſt der Vogel hinkt. Bei einer geſchickten Hand und einiger Uebung kann man bald dem Federkiel vorher ſchon die richtige Länge geben, was inſofern beſſer iſt, als derſelbe ſich durch das Gehen und Hüpfen des Vogels viel weniger raſch abnutzt, wenn ihm ſein natürliches Ende belaſſen, als wenn er an dieſer Stelle abgeſchnitten wird. Natürlich nutzt ſich jeder Federkiel mit der Zeit ab und muß durch einen andern erſetzt werden, ſobald er erheblich kürzer geworden iſt, als das geſunde Bein, was je nach der Beweglichkeit des Vogels 4 bis 8 Wochen dauert. Das Ablöſen des Stelzfußes geſchieht am Beſten, indem man den Fiſchleim ſorgſam in warmem Waſſer erweicht. Meine Lerche befand ſich ſehr wohl mit ihrem Stelzfuß und lebte in dieſem Zuſtande noch manches Jahr. Einem Kanarienvogel, der ſich natürlich nicht an der Erde aufhält, müßten nach dieſer Operation ſelbſtverſtändlich keine runden, glatten Sitzſtangen mehr, ſondern flache, dünne Brettchen von etwa 1½ cm Breite gegeben und auch dieſe noch mit weichem, rauhem Stoffe überzogen werden, da ſich der Vogel ſonſt nicht darauf halten könnte.

Frau R. Siegmund.

... Seit etwa acht Tagen brüten in meiner Vogelſtube ein Pärchen Sproſſer und ein Pärchen Gelbſpötter. Ich habe dieſelben unter ca. 30 europäiſchen Weichfreſſern fliegen, und beides ſind überwinterte Vögel. Die Sproſſer haben 3 Eier gelegt; von den Gelbſpöttern weiß ich nicht, wieviel Eier liegen, da dieſelben hoch oben an der Decke in einem Birkenſtrauch gebaut haben, und ich die Vögel nicht ſtören will. Beide Weibchen brüten ſehr feſt. — Leider finde ich ſoeben am Rande des Sproſſerneſtes ein Ei liegen, welches defekt an der Schale und vollſtändig im Dotter und Eiweiß hart getrocknet iſt. Woran mag das liegen?*) Ich bin nur begierig, ob ich glücklich Junge erwerben werde. Vor vier Jahren hatte ich es bereits ſo weit, doch hat meine amerikaniſche Spottdroſſel, die ich damals mit in der Stube fliegen hatte, die Jungen gefreſſen und das Neſt ganz zertreten. Damals, wie auch jetzt, baute das Weibchen allein das Neſt, und ich habe auch damals, ſowie jetzt nie das Männchen brüten ſehen. Auch Gartengrasmücken, die ich ſchon ſechs bis ſieben Jahre in der Stube habe, haben gebaut, hoffentlich bringen ſie es zum Gelege. Früher ſchon, d. h. vor zwei und drei Jahren, hatten dieſe Grasmücken Eier gelegt. Mir war es jedoch nicht bekannt und ſo habe ich ſie beim Brüten geſtört, während ich die Stube mit friſchem Geſträuch verſah. Wenn Ihnen daran liegt, werde ich Ihnen ſpäter mittheilen, ob das Brutgeſchäft des Sproſſers und des Gelbſpötters von Erfolg begleitet iſt.**) Jetzt brüten die Weibchen, wie geſagt, feſt und werden, ſobald ſie einmal das Neſt behufs Futterſuchens verlaſſen haben, von den Männchen unter lebhaftem Geſang wieder zum Brüten angehalten.

Herm. Unger.

Anfragen u. Auskunft.

Herrn M. in B.: Die Mauſer der Orpheusgrasmücke geht in der Gefangenſchaft im Januar und Februar vor ſich. 2. Das Futter für die Wintermonate wird am beſten aus fein geriebener Möre, die möglichſt lichtgelb ſein und nach dem Reiben ausgedrückt werden muß, Ameiſenpuppen und abgekochtem, zerriebenem Rinderherz oder magerm Rindfleiſch zu gleichen Theilen bereitet. Statt Herz oder Rindfleiſch kann auch Weißwurm verwendet werden. Sind alle drei Futterſtoffe mit einander gut vermengt, ſo iſt es gut, wenn Sie das Gemiſch noch weiter zerkleinern, indem Sie es vermittelſt des Wiegemeſſers auf einem Brettchen zerſchneiden. Im Herbſt und Winter bis Neujahr erhält dieſe Grasmücke 4–5 Mehlwürmer am Tag, nach dieſer Zeit reichen Sie allmählich bis 10 und 12 Stück täglich. Als Futterbeigabe geben Sie ab und zu allerlei weiche Früchte, wie Birnen, Datteln, Feigen, auch gedünſtete oder gebratene Aepfel; ſchwarzen Hollunder und rothen Trauben-Hollunder, friſch gepflückt oder getrocknet und aufgequellt, können Sie nebenbei reichen. Während der Mauſer wird das Futter nicht verändert. 3. Als Stubenvogel ſingt die Orpheusgrasmücke oft ſchon im November und Dezember, allerdings nur leiſe. Nach vollendeter Mauſer wird ihr Geſang laut und voll und dauert dann, wie in der Natur, bis zum Juli.

Herrn Georg Stoßer: 1. Mit dem Namen „chineſiſche Nachtigal“ bezeichnet man den Sonnenvogel (Leiothrix luteus, *Scop.*). Sein Geſang kann ſich mit dem der europäiſchen Nachtigal keineswegs meſſen, iſt überhaupt nicht mit ihm zu vergleichen. Den bei beſcheidenen Anſprüchen immerhin erfreuenden, lieblichen Geſang bilden rund und voll klingende, ſchöne, harmoniſche, droſſelartige Rufe, vielfach wiederholt und zuweilen ſogar ſchmetternd den Raum durchhallend, meiſtens aber nur angenehm und wohltönig. Dagegen hat der Sonnenvogel den Vorzug, daß er zu den Vögeln gehört, die faſt das ganze Jahr hindurch, und eigentlich nur während der Mauſer, nicht ſingen. Wer ſich am friſchen, fröhlichen Sänger, am ſchönen und anmuthigen, zugleich munterem und lebhaftem gefiederten Genoſſen erfreuen will, dem ſei der Sonnenvogel empfohlen, beſonders da er ſich leicht züchten läßt. 2. Zur Hauptnahrung erhält er ein Weichfuttergemiſch aus friſchen oder trockenen Ameiſenpuppen nebſt geriebenem, altbacknem Weizenbrot oder Semmel, überrieben mit Gelbrübe oder Möre, dazu wechſelnde Gaben von Quarkkäſe, hartgekochtem, gehacktem Ei (Gelb und Weiß zuſammen) oder im Waſſer erweichtem, gut ausgedrücktem und zerriebenem Eierbrot (in welchem Fall das Weißbrot fortbleibt). Als tägliche Zugabe gibt man für gewöhnlich 2 bis 3 Stück Mehlwürmer, während der Mauſer 5 bis 8 Stück. In der warmen Jahreszeit bietet man ihm allerlei lebende Kerbthiere, Fliegen, Spinnen, Blattläuſe, Engerlinge, Schmetterlinge, kleine Heuſchrecken u. a. m., im Winter Schaben ꝛc. Auch der Zugabe von Frucht bedarf er: irgendwelchen Beren oder gehacktem Obſt, je nach der Jahreszeit. Unter das Weichfutter miſcht man auch gehacktes Grünkraut, Vogelmiere und Doldenrieſche oder Tradeskantia. Schließlich gibt man ihm auch Sämereien: Hirſe, Kanarienſamen, Mohn, auch gequetſchten Hanf. 4. Anleitung zur Zucht des Sonnenvogels finden Sie in meinem Werk „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ Band II. 5. Zum Bezug Trute'ſcher Hohlroller wenden Sie ſich an Trute's Sohn, Andreasberg i. H., oder an E. Hinze, Berlin.

◆

Zu unſerm Bilde.

Die fremdländiſchen Spechte ſind im allgemeinen auf unſerm Vogelmarkt ſehr ſelten, und wenn ſie eingeführt werden, gelangen ſie meiſt in die zoologiſchen Gärten. Privatliebhaber haben ſich mit ihnen bis jetzt leider nur wenig beſchäftigt. Der bekannteſte unter ihnen iſt noch der Goldſpecht (Colaptes auratus, *L.*), den unſer Bild zeigt.

Er iſt ein ſchöner, ſtattlicher Vogel, der beſonders durch ein rothes, hufeiſenförmiges Nackenband auffällt, das ſich von dem aſchgrauen Kopf und Nacken lebhaft abhebt. Die übrige Oberſeite iſt auf gelblichbraunem Grund ſchwarz quergebändert; der Bürzel iſt weiß; Zügel und Schläfenſtreif unterhalb jedes Auges, Kopf- und Halsſeiten und die Kehle ſind blaß röthlichbraun; ein Bartſtreif und ein halbmondförmiges Band über der Oberbruſt ſind ſchwarz; die übrige Unterſeite iſt weiß, nach dem Schwanz hin gelblich, mit ſchwarzen Tropfenflecken. Schäfte und Unterſeite der Schwingen ſind glänzend gelb; der Schnabel iſt braun, der Unterſchnabel bläulich; die Augen ſind braun, die Füße bleigrau. Der Goldſpecht iſt nicht ganz ſo groß wie unſer Grünſpecht. Das Weibchen iſt übereinſtimmend gefärbt, nur fehlt ihm der ſchwarze Bartſtreif.

Die Heimath des Goldſpechts iſt Nordamerika; ſein Verbreitungsgebiet erſtreckt ſich hier vom Atlantiſchen Ozean bis zu den öſtlichen Abhängen des Felſengebirgs, vom Rio Grande bis nach Alaska. Als Aufenthaltsort bevorzugt er große, zuſammenhängende, aus vielerlei Holzarten beſtehende Waldungen. Hier führt er ein ſehr regſames, munteres Weſen. Zur Parungs- und Brutzeit hallen ſeine lauten, einem frohen Lachen vergleichbaren Töne weithin durch den Wald. Der Volksmund nennt ihn auch Flicker nach ſeinem wie Flick, Flick oder Flicker erſchallenden Rufe. Um ſeiner Schönheit und Zutraulichkeit, wie um ſeiner Häufigkeit willen iſt er überall bekannt und gern geſehen, beſonders da er ein ungemein nützlicher Vogel iſt, der durch die Vertilgung zahlreicher Holzwürmer und Käfer zu den Hütern der Wälder gehört. Mitte Mai ſchreitet der Goldſpecht zur Brut. Seine Niſthöhle zimmert er ſich mit Vorliebe in Linden, Ulmen, Ahornen und Buchen, die ſchadhafte Stellen haben. Vom frühen Morgen bis ſpät in die Nacht hinein arbeiten Männchen und Weibchen abwechſelnd an der Herſtellung der Niſtſtätte, die dann als eine oben ziemlich enge, ſich nach unten hin bedeutend erweiternde, 8 Zoll bis 2 Fuß tiefe Höhle erſcheint. Auf dem Boden derſelben liegt nur eine dünne Unterlage weichen Mulms. Das Gelege beſteht aus 5 bis 7 glänzend reinweißen Eiern.

In Amerika wird der Goldſpecht viel gehalten, da er ſich von allen Spechten am beſten für die Gefangenſchaft eignet. Nach Nehrling läßt er ſich leicht an ein einfaches Miſchfutter, wie man es für Spottdroſſeln und andere kräftige Inſektenfreſſer benutzt, mit einer Zugabe von Mehlwürmern und Ameiſenpuppen gewöhnen.

Es iſt zu bedauern, daß der hübſche Vogel ſo ſelten eingeführt wird. Er würde ſicher Liebhaber finden, da er nicht allein leicht lange zu erhalten iſt, ſondern auch bald zahm und zutraulich wird. K. R.

---

*) Wahrſcheinlich hat das Weibchen beim plötzlichen Auffliegen vom Neſt, durch irgend etwas erſchreckt, das Ei beſchädigt und es infolgedeſſen an den Rand des Neſtes geſchoben und unbeachtet liegen laſſen. D. L.

**) Wir bitten ſehr darum. D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

☛ **Für alle Arten Vögel** fertige ich ſachgemäße

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1034]

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
1035] **R. Schröter,** Clingen-Greußen.

Neu! Senſationell!

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt
[1036] **Edmund Schiewick, Zittau, Sachſen.**
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

Käfige jeder Art

(Preisliſte gratis) fabrizirt und empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1037] Oſchatz i. S.

Futtermittel.

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche **inſektenfreſſende Singvögel** von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1038] Allein angefertigt von
Ernſt Hanke, Trier, Moſel.
☛ Muſter und Proſpekte koſtenlos. ☚

Lager von Ameiſeneiern.

Direkter Import bei
[1039] **H. Drefalt, Lübeck.**

Mehlwürmer, 1000 St. geg. Einſ. v. 1,70 in deutſch. Reichsp.-Mrkn. verſ. franko
1010] **D. Waschinsky, Berlin NW, Wilsnackerſtr. 63.**

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt
[1041] ſandfrei.
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ
Weißwurm, 98er hochprima, à Ko. 4½, à Ltr. 1 ℳ.
Muska, hochf. 98er, à Ko. 3, 5 Ko. 14 ℳ.
Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 5, à Ko. 9.
Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.
Bisquit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.
Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.
Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack	5	Ko.	no.	1,50
Hanfſat	„	„	„	„	1,80
Hafer geſchält	„	„	„	„	2,25
Mohn blau	„	„	„	„	3,75
Hirſe weiß Pa.	„	„	„	„	2,20
do. Senegal	„	„	„	„	2,25
do. do. i. Kolb.	„	„	„	„	5,—
do. algeriſche	„	„	„	„	2,—
do. indiſche	„	„	„	„	1,75
Sonnenblumen	„	„	„	„	2,—
Kürbiskerne	„	„	„	„	3,25
Reis i. Hülſen	„	„	„	„	2,25
Zirbelnüſſe	„	„	„	„	5,—

Oſſa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [1042]
Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, **Papageien-** und **Waldvogelfutter** Poſtſack 5 Ko. no. 2,—
Ausführl. Preisliſten ſämmtl. Vogelfutterarten gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Frische Ameiseneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt der einzige Erſatz: **Zecke** mit heißem Waſſer übergoſſen und dann ausgedrückt. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zecke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Drogerien. Man verlange Zecke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1043]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Mehlwurmzüchterei

empfiehlt prima Würmer ℔ 4,— ℳ [1044]
F. Wulfram, Mölln i. Lbg.

Mehlwürmer

zum Tagespreiſe bei [1045]
Theodor Frank, Barmen.

Die Samen-Großhandlung
von

Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [1046]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Alle Vogelfutter, Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1047

Mehlwürmer,

ſtaubfrei, à Lit. ℳ 4,50, Ko. ℳ 8, **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Lit. 90 ₰, bei 10 Lit. 85 ₰; I bei 5 Lit. 70 ₰, bei 10 Lit. 65 ₰ empfiehlt u. verſ. geg. Nachn. [1048]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Vögel.

Verkaufe für's Meiſtgebot

wegen Wohnungswechſel aus meiner Vogelſtube folgende eingewöhnte Zuchtpare, die bei mir ſchon ſämmtlich zur Brut ſchritten: 1 Par Roſenpapageien, 1 Par ſchwarzköpf. Goulds-Amandinen, 1 Par gelbe Wellenſittiche, 2 Par jap. Mövchen, 1 Par chineſ. Zwergwachteln, 1 Par Nymfenkakadus und 2 Par alte Wellenſittiche. Letzte 3 Pare am Brüten.
W. Hoffmann,
[1049] **Dortmund,** Zeche Hanſa.

Rothe u. gelbe Kreuzſchnäbel

verſende 6 Stück 4 ℳ, Dutzend 6 ℳ. Tauſche auch auf friſche Ameiſeneier, Sproſſer, Schwarzblättchen, Nachtigalen u. Käfige.
A. Jaumann,
[1050] **Großbreitenbach,** Thür.

☛ Zu verkaufen: 1 Par **Spitzſchwanz-Gürtelamandinen** 15 ℳ, 1 Par **Masken-Gürtelamandinen** 35 ℳ, 1 Par **Sonnenaſtrild-Gürtelamandinen** 35 ℳ, 1,0 **Schilffink** 6 ℳ, 1,0 **Aurora-Aſtrild** 6 ℳ, diverſe ausländ. Prachtfinken; die Preiſe incl. Porto und Verpackung.
Dr. Kochenburger,
[1051] **Berlin W. 62.**

Schamadroſſel,

2 Jahr im Käfig, großartiger fleißiger Sänger, tadellos im Gefieder, ganz zahm, für 40 ℳ, 1 **roſenbrüſt. Kernbeißer,** ff. Sänger und ſchön im Gefieder, 18 ℳ. Verz. billigſt, Gar. für Werth u. geſ. Ankunft. [1052]
H. Dambock, Landeshut i. Schl.

Dank.

Meinen herzlichſten Dank ſpreche ich hierdurch Herrn **F. Rejſek, Papageigroßhandlung, Hamburg, Peterſtr. 28,** für ſeine **äußerſt ſolide** u. **ſtreng reelle** Bedienung bei dem von ihm bezogenen ſprechenden Papagei aus. Und kann ich Herrn F. Rejſek nur jedem Papagei-Liebhaber auf das **Wärmſte** und **Angelegentlichſte** empfehlen, da ſeine Firma **durchaus leiſtungsfähig** iſt und ſeine mir gemachten Angaben in jeder Hinſicht der **genaueſten Wahrheit** entſprachen und ſeine Bedienung überhaupt die denkbar **reellſte** iſt. Gebe auch auf Wunſch von Intereſſenten noch nähere briefliche Auskunft. [1053]

Karl Seidl jun.,
Steinſchönau (Nord-Böhmen).

Offerire in geſunden Exemplaren

freibleibend

Aſtrilde, Orangebäcks, Bandfinken, Silberbäcks, Elſterchen, Atlasfinken, Feuerweber, Graue Reisfinken, Blutſchnabelweber, Schmetterlingsfinken, à Par 2 ℳ,

Schwarzk. Nonnen, à P. 1,50, 3 P. 4, 5 P. 5,50, 10 P. 9 ℳ,

Tigerfinken, à P. 1,80, 5 P. 8, 10 P. 15 ℳ,

Goldbrüſtel, Wittwen, Amaranthen, à P. 2,50 ℳ,

10 P. ſortirt nach m. Wahl 15 ℳ

Grisbleus, gelbgr. Aſtrilde, Malabarfaſänchen, à P. 3 ℳ,

Ceresaſtrilde, à P. 12 ℳ,

Gürtelgrasfinken, à P. 10 ℳ,

Diamantfinken, à P. 10 ℳ,

Japan. Mövchen, gelb u. brbt. à P. 3 ℳ,

Japan. Mövchen, weiß, à Par 6 ℳ,

Zebrafinken, à P. 4, 3 P. 11 ℳ,

Mozambiquezeiſige, à P. 4 ℳ, à Mch. 3 ℳ,

Weiße Reisfinken, à P. 7 ℳ,

Kl. Alexanderſittiche, à St. 4 ℳ,

Sperlingspapagеien, à P. 10 ℳ,

Rothköpfige Inſeparables, à P. 12 ℳ,

Auroraaſtrilde, à P. 10 ℳ,

Goldſtirn. Blattvögel, à Stück 45 ℳ,

Barabandſittiche, à P. 40 ℳ,

Roſellas, à P. 24 ℳ,

Rothe Tangaren, à P. 25 ℳ,

Roſenpapageien, à P. 25 ℳ,

Singſittiche, à P. 24 ℳ,

Wellenſittiche, prachtvolle Pare, ohne jeden Tadel, à P. 7 ℳ, 5 P. 33 ℳ,

Rothe Kardinäle, à Stück 8 ℳ,

Goldzeiſige, à P. 10, à Mch. 7 ℳ,

Goulds-Amandinen, tadellos ſchön, à P. 22 ℳ, 3 P. 60 ℳ,

Wunderſchöne Amandinen, à Stück 12,50 ℳ,

Auſtral. Amaranthen, à Stück 15, à P. 30 ℳ,

Gebirgsloris, à P. 30 ℳ,

Grasſittiche, à Stück 4 ℳ,

Pflaumenkopfſittiche, ausgefärbt, à P. 12 ℳ,

Safranfinken, à Stück 4 ℳ,

Spottdroſſeln, à Stück 12 ℳ,

Roſakakadus, à Stück 10 ℳ,

Dolchſtich- u. Wonga-Wongatauben, à Par 36 ℳ,

Schuppenloris, à P. 36 ℳ;

Indigovögel in voller Pracht, à Stück 4,50 ℳ,

Papſtfinken, Nonpareills, à Stück 5,50 ℳ. [1054]

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis.

Feine

Singvögel

und zwar Sproſſer aller Raſſen, insbeſondere auch **echte** David-Sproſſer, welche den Davidruf **wirklich** ſchlagen, von 9—35 ℳ, Nachtigalen 4—9 ℳ, **Gebirgsſchwarzköpfe** 3,50—9 ℳ, Gelbſpötter 4—8 ℳ, Sumpfrohrſänger 4—5 ℳ, Blaukehlchen 4—7 ℳ, Rothkehlchen 1,50—5 ℳ, Garten- u. Sperbergrasmücken 3,50—6 ℳ, Würger, rothrückige, rothköpfige und Grauwürger 3—5 ℳ, ſowie überhaupt alle Sorten Weichfuttervögel empfiehlt unter üblicher Gewähr

Mathias Rausch,
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der
[1055] beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Preisliſte koſtenlos und poſtfrei bei Angabe über welche Vogelart.

Goulds u. d. wunderſchöne Amandine P. 30 ℳ.
Breuel, Leipzig, Commeniusſtr. 1. [1056]

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel für den Kanarienzüchter.** Preisl. franco. [1057]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Empfehlen garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende

Sproſſer

à Stck. 9—12 ℳ, ſowie [1058]

Nachtigalen

4—6 ℳ und alle Arten

Grasmücken

unter Garantie lebender Ankunft. Preisliſte gratis.

Friſche Ameiſeneier,

pr., ohne Gehölz, Sand und Ameiſen, à Lit. 1.40 ℳ, dto. 1.20 ℳ II. Qualität.
Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft,
Hoffſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Verkaufe

meinen **ff. Sproſſer,** 2mal überwint., für 12 ℳ incl. Verp. **E. Seidler,**
[1059] **Leipzig,** Delitzſcherſtr. 3 IV.

Waldelſtern,

leicht ſprechen lernend, Stück 2 ℳ, Dutzend 18 ℳ. [1060]
Fr. Kretschmar, Dortmund.

[1061]

Geſucht:

Granataſtrilde, Buntaſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen u. ſeltene ausländ. Finken.
J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.).

Schamadroſſeln,

Männchen in vollem Geſang,

Dayaldroſſeln, desgl., Stück 25 ℳ,

Gebirgslori, im Freien gehalten, Par 28 ℳ,

Singſittiche, im Freien gehalten, Par 25 ℳ,

Mandarin-Enten, Par 30 ℳ,

Mitchells-Loris, an Saat gewöhnt,

Schwarzäugige Graupapageien, an Hanf und Waſſer gewöhnt, tadellos befiedert, à 18 ℳ,

hat abzugeben

August Fockelmann
Thierhandlung [1062]
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Marocco — Tanger

Salomon & Co.
(Inhaber **Dr. M. Salomon**)

offeriren **Marocc. Vogeleier** in Neſtern, **Vogelbälge, lebende Sing- und Raubvögel.** Näheres auf direkte Anfragen. [1063]

Verkaufe: Ein prachtvolles Zuchtp. **Bartmeiſen** 6 ℳ, einen **Trauerfliegenſchnäpper** 2 ℳ, ein **Hausrothſchwänzchen** 2 ℳ, eine **Dorngrasmücke** 2 ℳ, letztere tadellos, 1 Jahr gekäfigt, tauſche gegen Exoten.
[1064] **L. Häcker,**
München, Hans Sachsſtr. 13/4.

Geſucht:

1 **Schwarzköpfchen,** prima Sänger mit feinem lautem Vorſpiel und doppeltem Ueberſchlag.

1 **Rothkehlchen,** Wipfelſänger, laut und fleißig im Vortrag und angenehmen Touren.

Beide Vögel müſſen geſund, tadellos im Gefieder und 1 bis 2 Jahr gekäfigt ſein. Verkäufer muß für geſangl. Leiſtung, Geſundheit ꝛc. Garantie übernehmen.

Offerten mit Preisangaben unter L. W. an die Exped. dieſes Blattes erb. [1065]

Suche zu kaufen

einen zahmen, ſehr gut ſingenden und ſehr gut gefiederten, **rothrückigen Würger,** reflektire nur auf wirklich tadelloſes Exemplar. Gebe ab 1 **Steinröthel,** ſehr zahm und vorzüglich ſchlagend, 15 ℳ. [1066]
Paul Link, Schwerin i. Meckl.

---

ff. Harzer Kanarien-Vögel,

Hohl- u. Knorr-Vögel, ſowie Klingel- u. Schaukel-Roller ohne Fehler 15, 20 u. 25 ℳ, geb. dieſelb. 14 Tage a. Probe, jedoch p. Nachn. od. Betrg. vorher, nicht gefall. Vögel tauſche um od. zahle zurück. Preisliſte frei. [1067]
L. G. Müller, Vogelzüchterei, Nordhauſen a. H.

NB. Junge von dieſem Jahr à Stck. 5 ℳ, 6 Stck. 25 ℳ, 12 Stck. 48 ℳ, frei dort.

1898 erhielt mein Stamm Harzer Kanarienvögel 1. Staatspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ. u. Gar., 8 T. Pr.
Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [1068

Verkaufe: 1 Schwarzplättchen, 1 Rothkehlchen, 1 Zaunkönig mit Käfige, zuſ. für 27 ℳ.

Ferner: 1 großen Heckkäfig für 15 ℳ.

P. Richter,
Berlin SO. 26, Naunynſtr. 58.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 24.

Mittheilungen aus Centralamerika (Fortſetzung).
Engliſche Vogelliebhaberei (Fortſetzung).
Das Blaukehlchen oder die Waſſernachtigal.
Wie bekomme ich Vögel in meinen Garten?
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechſel.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.



50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter v. St. 40 ℳ
bei **Behm & Steinhardt,**
[1069] Waren i. Mecklenb.
Proſpekte gratis.

Große praktiſche [1070]
Futtergefäße
aus Zinkblech,
für Volieren äußerſt praktiſch und ſich in Kürze bezahlt machend, à Stck. 12 ℳ.
J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Zu verk. eine ungemein praktiſche, nach Ruß' „Lehrbuch der Stubenvogelpflege", Seite 74, hergeſtellte

feine
Zimmer-Volière

mit engen Stäben (auch für kleine Exoten paſſend), 1,25 m lang, 1,45 m hoch, 0,75 m breit, braun geſtrichen, mit einer großen Vorderthür (zum Hineinſteigen) und vielen kleinen Seitenthüren und einer Seitenwand aus Rinde der Korkeiche zum beliebigen Einhängen für Baumläufer, Kleiber und kleine Spechte, ſowie mit einem nußbaum lackirten feinen **Untergeſtell (Tiſch) von Holz** dazu, 0,47 m hoch, auf Rollfüßen, **ſtatt zum Anſchaffungspreiſe von** 135 „ für nur 50 „. Anfragen unter **K. W. 700** erbeten. [1071]

Brut-Apparate
mit Wärmeregulatoren.

Größte Vollkommenheit. Sicherer Erfolg. Bisher noch nicht erreichtes Brut-Reſultat: 90 %. — **Brut-Eier. Küchlein.**

General-Katalog franko.

J. Philippe, Chevalier du Mérite Agricole u. Fabrikant in **Houdan** (Seine & Oise) bei Paris, Frankreich. [1072]

Käfige jeder Art
(Preisliſte gratis) fabrizirt und empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1073] Oſchatz i. S.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[1074] **R. Schröter,** Elingen-Greußen.

Den erſt mit dem Beginn des II. Vierteljahres neu hinzugetretenen Abonnenten der „Gefiederten Welt" theilen wir mit, daß wir bei Nachbezug des erſten Vierteljahres (1,50 ℳ)

eine Farbendrucktafel,

darſtellend:
1. Sproſſer, 2. Nachtigal, 3. Schwarzköpfige Grasmücke,
4. Sperbergrasmücke, 5. Gartengrasmücke,

als Gratisprämie beifügen, der ſich im III. Quartal

eine zweite Farbendrucktafel,

darſtellend:
1. Gelbſpötter, 2. Orpheusgrasmücke, 3. Blaukehlchen,
4. Sumpfrohrſänger, 5. Rothkehlchen,

anſchließen wird. Wir ſtellen anheim, ſich dieſe Vortheile rechtzeitig durch Nachbeſtellung bei der nächſten Buchhandlung zu ſichern, da die Vorräthe in abſehbarer Zeit vergriffen ſein dürften.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1075]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Für alle Arten Vögel fertige ich **fachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Staatspreis). Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1076]

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei.
R. Schröter (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Elingen bei Greußen.** [1077]

---

1 Vogelſchrank,
beſtehend aus 5 Bauer für Weichfreſſer, für Droſſeln und für 4 kleinere Weichfreſſer, aufs Praktiſchſte eingerichtet, iſt zu verkaufen.
[1078] **Paul Badorf.**
Dresden-Altſt., Gerbergaſſe 21

Neu! Senſationell!

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G.-M. 108181, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden empfiehlt
[1079] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 24. Magdeburg, den 15. Juni 1899. XXVIII. Jahrg.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Bemerkung der Leitung: Der eigentliche Seidenſchwanz (Ampelis garrula, *L.*) kommt nur in Britiſch-Nordamerika und im äußerſten Norden der Vereinigten Staten vor; auf dem Zug beſucht er den Süden der Union. Die von Herrn Eichlam beobachtete Art iſt der Cedernvogel (Ampelis cedrorum, *Vll.*). Das Muſeum in Guatemala hat ihn ganz richtig benannt. Er bewohnt als Brutvogel Nordamerika und kommt auf dem Zug nach Mittelamerika. Salvin und Godman ſagen in ihrem trefflichen Werk über die Vögel Centralamerikas über ihn: „Der Cedernvogel iſt ein gewöhnlicher Wintergaſt in Mexiko und Guatemala, jedoch etwas unregelmäßig in ſeinen Zügen. Obgleich meiſt im Hochland häufiger, wird er auf verhältnißmäßig niedrigen Erhebungen, ſowol in Mexiko als Guatemala gefunden. Prof. Sumichraſt hat Tehuantepec als eine der Oertlichkeiten in dem erſtern Land angegeben, wo er vorkommt, und in dem letztern beobachteten wir ihn ſowol in Escuintla, ungefähr 1500 Fuß über dem Meer, wie in den Fichtengipfeln von Dolores, im Departement Peten, welches auf einer noch niedrigeren Erhebung liegt. Auf den Hügeln rings um die Stadt Guatemala wird er in beträchtlicher Anzahl vom Herbſt bis zum Frühling geſehen, in Scharen fliegend oder auf einem fruchttragenden Baum ſitzend. In der Nachbarſchaft von Coban iſt er auch ein gemeiner Vogel. Mr. Taylor iſt der einzige, der von dem Vorkommen des A. cedrorum jenſeits der Grenzen von Guatemala berichtet; er hat ihn bei Siquatepec in der Republik Honduras gefunden. Sein Erſcheinen in Südamerika muß erſt noch vermerkt werden. Was die Antillen anbetrifft, ſo kann man von A. cedrorum nur ſagen, daß er in ſeltenen Zwiſchenräumen in Jamaika und Cuba erſcheint. Mr. Goſſe führt Hills Zeugniß für ſein Vorkommen in Jamaika an, da eine Schar bei Spaniſh Town im Jahr 1836 beobachtet worden iſt. Nach Cuba verfliegt er ſich ganz ſelten, aber wenn er jene Inſel beſucht, erſcheint er in Scharen und nicht als einzelner Vogel. Als Regel iſt anzunehmen, daß ſeine Wanderungslinie dem Land nach Weſten zu folgt und keine weite Ausdehnung der See kreuzt; er iſt jedoch mehrere Male in Bermuda vorgekommen. In den Vereinigten Staten und Canada iſt Ampelis cedrorum ein ſehr bekannter Vogel. In ſeinen Wanderungen iſt er unſicher, da er oft das ganze Jahr hindurch an Orten bleibt, wo der Winter zufällig mild iſt. Er brütet ſpät, denn man hat unausgebrütete Eier noch im Oktober gefunden. Infolge der Plünderungen, die ſie an den Obſtbäumen vornehmen, wird eine große Anzahl dieſer Vögel alljährlich vernichtet. Aber Früchte ſind nicht ihre einzige Nahrung; denn ſie verzehren im Frühling und frühen Sommer auch Mengen von Inſekten, beſonders deren Larven.“ — Wir laſſen nun Herrn Eichlam fortfahren:

Die Gelbnackenamazone (Psittacus auripalliatus *Lss.*).

Einer der beliebteſten Vögel des Landes iſt unſtreitig die Gelbnackenamazone. In der Liſte des Zoologiſchen Muſeums von Guatemala ſteht ſie unter Chrysotis auripalliatus; obgleich ſie zu den tagtäglichen Erſcheinungen gehört, iſt ſie jedoch in der Sammlung nicht vertreten.

Der Preis für dieſen Vogel iſt ſehr verſchieden und richtet ſich nach der Erhaltung des Gefieders, der Zahmheit und der Sprachbegabung. Zieht man die oben erwähnten Unterſchiede in nähere Erwägung, ſo ergeben ſich bei jeder dieſer Anforderung die weitgehendſten Differenzen. Man findet Vögel mit ausnehmend ſchönem Gefieder, aber ſtockdumm oder unbändig wild, andererſeits wieder hervorragend gute Sprecher, aber in einem miſerablen zerlumpten Gefieder. Derartige Vögel ſind ſehr ſchwer, theilweiſe garnicht wieder in Ordnung zu bringen, wenigſtens vergehen 1—2 Jahre, bis alle Federn wieder naturgemäß nachgewachſen ſind. In allen Theilen gute Vögel, d. h. ſchön im Gefieder, zahm und begabt im Sprechen, werden in Centralamerika mit demſelben Geld aufgewogen wie in Europa. Die Gelbnackenamazone iſt allgemein geſchätzt und findet ſich in den Häuſern der Reichen wie in dem Rancho der Eingeborenen. Für gewöhnlich klettern die Vögel in den Fenſtergittern umher, theilweiſe ſitzen ſie auf den Dächern oder begleiten, auf den Schultern der Ladinos ſitzend, dieſe auf ihren Ausgängen. Nur in ſeltenen Fällen wird die Amazone, was ſchließlich hier von allen Papageien gilt, in Käfigen gehalten. Regelmäßig iſt, ſelbſt bei beſſerer Pflege, ein Flügel mit Ausnahme der erſten drei Schwungfedern beſchnitten, alsdann bleiben die Vögel ruhig auf den ihnen angewieſenen Ständern ſitzen. Ganz zahme Vögel fliegen vielfach umher und kommen auf Zuruf zurück, fliegen auf naheſtehende Bäume, nach der Waſſerleitung um zu baden, kurz ſie benehmen ſich wie Haustauben. Ich ſelbſt hatte bis vor wenigen Wochen zwei Gelbnacken, welche durch den Garten förmliche Streifzüge unternahmen. Kommt wirklich einmal ein Vogel abhanden, ſo iſt er regelmäßig geſtohlen. Eine meiner Amazonen kam regelmäßig des Morgens mit Tagesgrauen in mein Bett, kraute mich ſo lange im Kopfhar, bis ich munter wurde und ſie unter die Decke nahm. Es war ein Männchen, das außerdem noch die Eigenheit an den Tag legte, daß es keine Zärtlichkeiten Menſchen oder Thieren gegenüber duldete. Reichte ich einem Freunde zur Begrüßung die Hand, ſo war meine Amazone im Augenblick da und biß den Fremden in die Beinkleider. Furcht vor einem Hund hatte ſie nicht, wurde ein ſolcher von mir geſtreichelt, fuhr ſie wüthend auf ihn los, ſträubte die Federn und biß ihn in die Beine, wobei es ihr regelmäßig gelang, den Hund zu vertreiben.

Die Ernährung der Amazone iſt hier, wenn auch nicht die richtigſte, ſo doch die denkbar einfachſte. Nächſt Mais, der Hauptnahrung, bekommt ſie von allen Früchten und Speiſen, welche den Tiſch decken; außerdem als Getränk nächſt Waſſer verdünnten ſchwarzen Kaffe.

Die in den Handel kommenden Vögel ſind meiſtens aus dem Neſt genommen und von klein aufgezogen. Derartige Vögel erlangen denn auch meiſtens eine überaus große Anhänglichkeit und Zutraulichkeit, während alt eingefangene Vögel in den wenigſten Fällen vollkommen zahm werden und ſich bei Annäherung wie eine fauchende Katze benehmen, ſich an die Wand gelehnt auf den Schwanz ſtellen, ſogar auf den Rücken legen und von ihrem Schnabel den ausgibigſten Gebrauch machen. Meiſtens ſind dieſe Wildfänge im Gefieder gerade die ſchönſten, mit intenſiver Färbung; ſprechen lernen ſie gerade ſo leicht, wie die jung aufgezogenen, laſſen aber ihr markdurchdringendes Geſchrei oft genug hören. Im Preis ſtehen dieſe Vögel ſehr billig und werden, wie ich es auch gethan habe, meiſtens verſchenkt, aber auch dann ſind ſie noch zu theuer. Wie es mir vorkommt, ſcheint dieſe Amazone gern zu baden, wobei ſie ſich oft ſo naß macht, daß das Fliegen ihr verſagt, und ſie dadurch vielfach gefangen wird.

Die Schiffsmannſchaften der Pacifikmarl kaufen mit Vorliebe die Gelbnackenamazone in den Centralamerikaniſchen Hafenplätzen, bringen dem Vogel in 2—3 Wochen einige Worte Engliſch bei und verkaufen ſie alsdann zu guten Preiſen in San Francisco. Daraus geht auch ſchon hervor, daß dieſe Amazone zu den ſprachbegabteſten Papageien gehört.

Ueber das Brutgeſchäft kann ich den verehrten Leſern aus eigener Erfahrung und Anſchauung nichts berichten, wenngleich ich die Hoffnung hierzu noch nicht aufgegeben habe. Die Brutſtätten ſollen ſich hauptſächlich in alten Eukalyptusbäumen befinden und das Gelege aus drei ſtarkgerundeten weißen Eiern beſtehen. Trotz meiner vielfachen Verſprechungen konnte ich aber niemand dazu bewegen, mir ein Neſt zu zeigen, um mich ſelbſt davon zu überzeugen. Vergangenes Jahr im Mai brachte man mir einen jungen Vogel im grauen Neſtflaum. Auf den erſten Blick hielt ich das Geſchöpf für einen jungen Geier, und erſt die Zehen und der Schnabel gaben mir bei näherer Unterſuchung die Ueberzeugung, es wirklich mit einem jungen Papagei zu thun zu haben. Die Indianer behaupteten, es ſeien Junge von der Gelbnackenamazone, noch zwei weitere Junge ſeien durch eine Spalte den Baum hinuntergefallen. Ich gab mir alle erdenkliche Mühe, das kleine Geſchöpf groß zu bekommen, aber leider ohne Erfolg. Es hatte immer Froſt, zitterte am ganzen Körper, und die ihm nothwendige künſtliche Wärme verurſachte viel Arbeit, noch mehr Arbeit das Füttern mit halbgekochten Maiskörnern. Lange währte allerdings die Arbeit nicht, denn ſchon nach drei Tagen war der kleine Kerl tod. Wenn ich dem Geſchöpf noch einige Worte widmen ſoll, ſo wäre es, daß ich außer Zweifel einen jungen Papagei vor mir hatte. Das Ausſehen war häßlich, der auffallend große Kopf und Schnabel ſtanden in keinem Verhältniß zu den übrigen Körpertheilen. Der Schnabel war ſchmutzig gelblichweiß, das Auge gelblichgrau, die Füße ſchmutzig fleiſchfarben, die Zehen weiß und der ganze Flaum aſchgrau, an der Unterſeite etwas heller. Die Federkiele begannen gerade durchzubrechen, ich hatte es aber leider überſehen, dieſelben aufzuſchneiden oder ſonſt nach der Farbe der ſich etwa bildenden Federn zu ſehen. Es ſcheint, als ob die Vögel ſich ziemlich ſpät befiedern. Daß der ſoeben beſchriebene Vogel eine junge Gelbnackenamazone war, kann ich nicht verbürgen. Die Möglichkeit liegt indeſſen ſehr nahe, ſchon deswegen, weil der genannte Vogel ſeiner Art der gewöhnlichſte des Landes iſt. Aeltere junge Vögel, die ſchon flügge und ſelbſtändig waren, hatte ich wiederholt in Händen. Dieſe Jungen haben einen kürzeren Schwanz und

etwas kleiner iſt und das Gefieder mehr einen bläulichen Schein zeigt, wie mit einem feinen Puder überzogen. Jnbetreff der Variationen der gelben und rothen Färbung ſind beide Raſſen gleich.

Das Männchen nennt man Loro, das Weibchen Lora. Wie unterſcheidet man aber den Loro von der Lora? Dieſe Frage iſt ſchwer zu beantworten, wenigſtens einem einzelnen Vogel gegenüber. Hat man zehn Köpfe vor ſich, ſo läßt ſich ſchon mit einiger Sicherheit das Geſchlecht beſtimmen. Etwas größere Geſtalt, größerer Kopf und dennoch kürzer und mehr gebrungen erſcheinender Hals; bei gleichaltrigen Vögeln der größere Nackenfleck und die intenſiv gelbere Stirn ſind im Allgemeinen die Anhaltspunkte für das Männchen.

Das Alter der Vögel läßt ſich nächſt den bereits erwähnten Merkmalen mehr oder weniger an den Füßen und Nägeln und an dem mehr geſchieferten Schnabel erkennen, auch der weiße Schnabelfleck wird mit dem Alter größer. Für ganz junge Vögel iſt auch noch die mattere Farbe der Augen maßgebend.

Hier iſt unſere Amazone ſehr hart und widerſtandsfähig, nicht empfindlich gegen veränderte Ernährungsverhältniſſe und gegen Kälte. Jn den hohen Lagen von Central-Amerika fällt in der Nacht oft das Thermometer auf 5—8° R. Aber dennoch ſind meine im Freien gehaltenen Vögel wohl und munter und entwickeln nach einer kühlen Nacht einen größeren Appetit als ſonſt.

Regelmäßig ſcheint die Einfuhr nach Europa nicht vor ſich zu gehen. Es iſt dies umſomehr zu bedauern, als die Gelbnackenamazone zu den beſten Sprechern zu zählen und überaus widerſtandsfähig iſt und nicht die großen Verluſte zu gewärtigen ſind, wie dies leider nur zu oft beim Graupapagei der Fall iſt.

(Fortſetzung folgt.)

Engliſche Vogelliebhaberei.

Von Albert Rettich.

(Fortſetzung).

Heute will ich auf einige Punkte unſerer Vogelliebhaberei zurückkommen, die ich früher angeregt und die inzwiſchen weitere Entwicklung erreicht haben.

Jn einem Land, wo ſoviel Mittel angewandt werden, um auf künſtliche oder wiſſenſchaftliche Weiſe der Natur nachzuhelfen, wie hier, läuft man oft Gefahr, die erlaubte geſetzliche Grenze zu überſchreiten. Seit der Zeit, wo zum erſten Mal Kanarien ausgeſtellt waren, die durch Fütterung mit Cayennepfeffer orangefarbig erſchienen, ſind vielerlei Subſtanzen in den Handel gekommen, die ähnliche Wirkungen haben ſollen und dabei als weniger koſtſpielig oder ſchadenbringend angeprieſen werden. Die Experten ſagen: das Geſetz ſchreibt vor: So lange die Färbung nicht durch chemiſche Behandlung von den Federn abgenommen werden kann, muß ſie als echt anerkannt werden. Wenn der Vogel vor und während des Federwechſels etwas frißt, wodurch das Blut ſo geſättigt oder gar erhitzt wird, daß es auf die Farbe der Adern und des Kleides einwirkt, darf das Thier nicht als künſtlich gefärbt gebrandmarkt werden. Die erhöhte Farbe kommt aus den inneren Organen und iſt feſt auf der Außenſeite, folglich iſt der Vogel konkurrenzfähig.

Kein Wunder, daß man weiter forſchte und andere Produkte ähnlicher Natur zu entdecken ſuchte, und ebenfalls kein Wunder, daß man das Entdeckte nicht länger auf Kanarien und deren Baſtarde beſchränkte, ſondern auch auf Benutzung bei einheimiſchen Singvögeln und deren Miſchlingen ausdehnte. Rother Pfeffer, denaturirt und beinahe geſchmacklos, wird in immer ſteigender Proportion unter das Weichfutter gemiſcht und die Vögel ſchlucken es mit Ei oder Semmel, Möre oder Ochſenherz hinunter, ohne zu blinzeln. (Trocken und ungemiſcht würde es freilich ganz verſchmäht werden.)

Wodurch wird der Schnabel und der Augenring der Amſel roth und das Gefieder glänzend ſchwarz? Wodurch werden Bruſt und Hals der Droſſel chokoladenfarbig? Wodurch wird das Geſicht des Stieglitzes karmoiſin und das Flügelband orange? Wodurch der Zeiſig hochgelb und der Hänfling mahagonifarbig auf der Bruſt? Durch Cayennepfeffer! Von den neuerdings eingeführten Produkten will ich keine nennen, denn es fehlen mir alle authentiſchen Angaben, ob ſie probat und hauptſächlich ob ſie verdaulich ſind. Letztere Bedingung ſteht in erſter Linie, denn der Farbſtoff, der durch den Körper auf die Außenſeite gewirkt hat, läßt ſich ſelbſt nicht durch Scheidewaſſer wieder ablöſen.

Wo ſo viele Hunderte von Schauſtücken ausgeſtellt ſind, die alle in den Schranken des Geſetzes behandelt werden ſollen, wo in immer friſchen Klaſſen Spuren dieſer neuen Bearbeitung der Vögel auftreten, wo in jeder Klaſſe die wirklich naturfarbigen Exemplare immer ſeltener werden, da ſteht zu erwarten, daß unechte, d. h. von außen gefärbte, mitunterlaufen. Es fehlt nicht an Liebhabern, die ſich leicht überreden laſſen, ein verdächtiges Stück als echt zu kaufen oder ſelbſt ein neues Präparat anzuwenden, was feſtere „äußerliche“ Färbung hervorbringen ſoll, als alles vorhergehende. Die Wachſamkeit der Preisrichter wird immer mehr in Anſpruch genommen, und das Murren der ſich ihrer Lauterkeit bewußten, aber beim Prämiren übergangenen Ausſteller wird immer lauter. Das Prämiren und das Ausſtellungsweſen werden immer verwickelter.

Aber die tolerirte Behandlung, ſei es mit Cayennepfeffer, Rothmiſchung, Gelbmiſchung oder ſonſtigem Fütterungsmaterial, hat jetzt ſo überhand genommen, daß man über keinen Grad von Metamorphoſe mehr erſtaunt. Man ſchreibt alles der mehr oder weniger geglückten Beibringung von recht viel Pfeffer zu und da ſchlüpft hier und da auch einmal ein Unbefugter durch. So kaufte der genannte Mr. Fulljames vor zwei Jahren einen Ia Preis-Hänfling zu hohem Preis.

Auf der nächſten Ausſtellung bekam er nur den dritten Preis in ſeiner Klaſſe, das folgende Mal garnichts! Die ſchöne Mahagoni-Bruſt war allmählich heller geworden und ſolch „farbloſe“ Hänflinge haben keine Ausſicht auf Prämirung mehr. Dann kam die Mauſer und mit ihr die erneuerte Cayenne-Fütterung, die bekanntlich bei jedem Federwechſel wiederholt werden muß, ſonſt kommt das Gefieder einfach naturgemäß. Der oben beſchriebene Vogel bekam aber nie ſeine tiefe Farbe wieder.

Inzwiſchen hatten einige Preisrichter Verdacht gegen eine neu aufgetretene Firma geſchöpft, die auffallend viel Hänflinge anmeldete und auffallend viel Preiſe erzielte. Der obenbeſchriebene ſtammte von dieſen Ausſtellern ab. Man unterſuchte nach der Prämirung als Gewinner und fand zuletzt in der Februar-Ausſtellung einen einzigen, von dem ſich braune Farbe von der Bruſt ablöſen ließ. Die Leute deklarirten in der Fachpreſſe, ſie hätten dieſen Vogel ſelbſt auf einer vorhergehenden Ausſtellung gekauft und wieder ſo ausgeſtellt; ſie fügten hinzu, daß zwei Drittel der angemeldeten Hänflinge geſetzwidrig gefärbte ſeien, daß ſie ſelbſt dieſem Unfug zum Opfer gefallen ſeien und daß ihre eigenen Exemplare mit der einzigen Ausnahme durchaus echt ſeien. So wird der Wirrwarr immer größer.

Ein anderer Fall, worin Mr. Fulljames die gegentheilige Erfahrung machte, wie mit ſeinem verblaßten Hänfling, iſt folgender. Man wird ſich erinnern, daß er in letzter Oktober-Ausſtellung die Ia Preis-Schafſtelze zu einem unerhörten Preis erſtanden hatte. Hier hatte er wieder Grund, ſeinen Spekulanten-Geiſt zu bereuen; das wunderbar ſchöne Thier wurde ſehr bald „ſtubenfarbig“. Bei der erſten Waſchung zeigte es ſchon einigen Verluſt an Intenſivität und bekam eine ganz geringfügige Anerkennung. Dann wurde es immer weniger gelb und konnte garnicht mehr angemeldet werden. Der enttäuſchte Eigenthümer mußte viel Mitleid, auch einigen Spott ſeitens der Konkurrenz ertragen, und zuletzt fiel der Vogel in eine verfrühte Mauſer. Sofort holte man wieder die Pfefferbüchſe hervor und letzte Woche konnte man in einem Fachblatt leſen, daß Mr. Fulljames berühmte gelbe Bachſtelze jetzt „ſchöner wie je ausſähe“. Ebenſo ſoll er jetzt eine Kollektion britiſcher inkontinentaler Körner- und Weichfreſſer beſitzen, wie ſie noch nie da war. Leider gibt es jetzt keine Gelegenheit, Ehrendiplome damit zu erwerben, denn die Saiſon für größere Ausſtellungen iſt vorbei. Aber die Stelze iſt wenigſtens wieder hochgelb geworden. (Fortſ. folgt).

Das Blaukehlchen oder die Waſſernachtigal.

Von A. Reuter.

Dieſer an Körperbau und Gefieder prächtige Vogel iſt allenthalben in Deutſchland an vielen Orten ſehr häufig anzutreffen. Das Blaukehlchen bevorzugt meiſt die Ebenen und kommt gewöhnlich mit den Rothſchwänzen im April zu uns, wo es ſich dann in Hecken und Gärten nahe an Gewäſſern aufhält. Es iſt ebenſowenig ſcheu wie die Nachtigal und geht blindlings in die Falle, durch einen Mehlwurm oder Erdwurm geködert, läßt ſich auch treiben. Ich kenne zweierlei Farbenvariationen*), und habe beide ſchon zu öfteren Malen als Stubenvögel gehalten. Die erſte war an der Kehle ſchön kornblumenblau und hatte darunter ein rothbraunes Halsband, die zweite hatte im Blauen noch einen weißen Stern und ſchien mir auch etwas größer als erſtere, im Uebrigen waren ſie ſich in allem andern gleich.

Einzugewöhnen iſt das Blaukehlchen ſehr leicht, das heißt, es ſollen ſich nur erfahrene Vogelwirthe darauf einlaſſen. Man gibt ihm den Sommer über friſche Ameiſenpuppen, im Winter trockene, und etwa 15 Stück Mehlwürmer am Tag, in Milch geweichte Semmel, hartgekochtes Hühnerei, gekochtes, fein geriebenes Kalbs- oder Rindsherz, auch Kalbsleber; überhaupt muß es Fleiſch erhalten, auch Quargkäſe liebt es. Ich fütterte als Miſchfutter einen Theil gelbe Rüben mit Semmel, darunter miſchte ich von angeführten Futterbeſtandtheilen zwei Theile. Im Herbſt kann man auch ab und zu einige ſchwarze Hollunderberen reichen. Sehr gern nimmt es auch die Larven des Junibrachkäfers und iſt beſonders gut damit einzugewöhnen, ferner alle nackten Raupen, auch kleine Käfer, Fliegen und Spinnen. In einem Haus, wo es Küchenſchaben oder ſonſtige läſtige Inſekten gibt, laſſe man es frei laufen, es räumt in kurzer Zeit damit auf; jedoch füttere man es dabei ſehr kräftig, da es durch den Genuß vieler Küchenſchaben Durchfall bekommt und leicht eingeht. Leider hält ſich dieſer ſo ſchöne Vogel nicht ſehr lange in Gefangenſchaft, und ich habe bei ſorgſamſter Pflege keinen über 5 Jahre gebracht. Im Ganzen genommen iſt es ein äußerſt liebes Vögelchen, wird ſchnell zahm, ſodaß es ſchon nach einigen Tagen ſeinen Pfleger kennt und dargereichte Mehlwürmer von der Hand nimmt.

Sein Geſang hört ſich recht lieblich an, er iſt ein leierartiges Gegurgel, mit ſchönen Flötentönen gemiſcht, jedoch unter anderen lauten Sängern kommt er nicht mehr zur Geltung. Es ſingt auch häufig des Nachts bei Licht, jedoch, wie mir ſcheint, nur die jüngeren Vögel. Die Pflege ſei die gleiche, faſt noch peinlicher wie die der Nachtigal, auch gebe man ihm den gleichen Käfig und laſſe es nicht an Waſſer fehlen, denn es badet ſehr gern. Ich gab meinen Blaukehlchen auf den Boden des Käfigs einen Blumentopfunterſatz mit Waſſer gefüllt; dieſe Badewanne benutzten ſie jeden Tag. In der Voliere vertrugen ſie ſich nicht gut mit anderen Vögeln und bekamen den meiſten Streit mit den Bachſtelzen, beſonders am

---

*) Es gibt drei: mit weißem Stern auf der Bruſt, rothem Stern und ohne den Stern. D. L.

Futtertrog und an der Fontaine; da wollte jedes das größte Recht behaupten. Ich ſah mich deshalb genöthigt, das Blaukehlchen zu entfernen und in einen Käfig allein zu thun. Ich empfehle dieſen Vogel allen Liebhabern, doch bedarf er einer ſehr guten aufmerkſamen Pflege, ohne dieſe würde man ihn nicht lange haben. Man kann eher eine Nachtigal oder Grasmücke einen ganzen Tag ohne Futter laſſen, als ein Blaukehlchen nur zwei Stunden.

[illegible]

Wie bekomme ich Vögel in meinen Garten!

Von M. Dankler.

In einem Aufſatz „Ueber das Schickſal der Vogelneſter und die wichtigſten Faktoren des Vogelſchutzes" Nr. 4 d. J.) hatte ich darauf hingewieſen, den Vögeln im Garten eine ſichere Heimſtätte zu ſchaffen, worauf mir verſchiedene Zuſchriften zugingen. In mehreren derſelben wurde die Frage geſtellt, „Wie bekomme ich Vögel in meinen Garten?" Dieſe Frage ließe ſich ganz kurz beantworten, „Sorge für Sicherheit und Lebensbedingungen": aber da gerade hier ſelbſt bei Vogelfreunden noch viel gefehlt wird, ſo will ich doch einige Punkte etwas näher beſprechen.

An erſter Stelle muß für genügenden Schutz geſorgt werden. Ja, wird da vielleicht einer denken, „Wer beſchützt die Vögel denn im Wald?" Dieſer Einwurf ſcheint berechtigt zu ſein, aber er ſcheint es auch nur. Bei genauerm Nachdenken wird man aber finden, daß die Feinde der Vögel im Garten, überhaupt in der Nähe des Menſchen viel zahlreicher und gefährlicher ſind, als in der freien Natur. Wie ich in dem oben angezogenen Aufſatz zeigte, habe ich durch Nachfragen in den Schulen manches Material gewonnen. So ergab eine Nachfrage, daß in einem Dorf von nicht mehr als 70—80 Häuſern weit über 100, in einem andern von 90—100 Häuſern über 180 Katzen gehalten wurden. Dies klingt im erſten Augenblick unwahrſcheinlich, ja unglaublich, aber gehe ein jeder nur einmal in Gedanken die Häuſer ſeiner Bekannten durch, ſo wird er ſich ſchnell von der Wahrheit überzeugen. Ich nehme meine eigenen Nachbarn, und finde in drei Häuſern 5 Katzen. Dazu ſind dieſe Häuſer nur von je einer Familie bewohnt. Ich kenne aber auch Häuſer, wo bei den verſchiedenen Miethspartien 5 Katzen unter einem Dach leben. Nun denke man ſich einmal 100—150 Katzen Tag für Tag, Nacht für Nacht, durch die Gärten der nächſten Umgebung ſtreifen, ſo wird wol jeder zu der Ueberzeugung kommen, daß der Vogel im Garten viel größeren Gefahren ausgeſetzt iſt, als im Wald, denn ſchrecklichere Vogelräuber als die geſchmeidigen, lautlos nahenden, gut ſpringenden, laufenden und kletternden Katzen ſind überhaupt nicht zu denken. Dazu ſchützt die Natur ſelbſt im Wald den Vogel durch Vegetation, durch das dürre Laub, welches jedes Anſchleichen verräth, und durch faſt unzugängliche Schlupfwinkel. Der Vogel kennt auch ſeine Feinde im Wald. Er bleibt ruhig an dem Stamm eines Baumes gedrückt ſitzen, wenn der Fuchs ganz nahe vorbeiſtreicht, denn ſein Inſtinkt ſagt ihm, daß der Fuchs nicht den Baum heraufſpringt. Aber dieſer Inſtinkt erſtreckt ſich nur auf die natürlichen Feinde, nicht auf die, welche der Menſch in ſeine Nähe bringt. Befolgt da z. B. ein Vogel beim Begegnen mit einer Katze daſſelbe Verhalten wie beim Fuchs, bleibt alſo in vermeintlich ſicherer Höhe ruhig ſitzen, ſo fällt er der hochſpringenden Katze ſicher zum Opfer. Dies iſt nur ein Beiſpiel, aber in Verbindung mit dem Ebengeſagten, von dem natürlichen Schutz der Vögel im Wald, iſt es ein Feld, welches ich jedem Vogelfreund als höchſt intereſſant zur Beobachtung empfehle. Es muß hier des beſchränkten Raumes wegen genügen, ſonſt wären hunderte von Beiſpielen und Beobachtungen zu bringen. Ein Beiſpiel mag noch Platz finden, welches bei umgekehrten Verhältniſſen daſſelbe zeigt. Der Haushahn kennt die Gefahren ſeines Bezirks ganz genau. Er weiß ſich den Nachſtellungen von Katze und Hund, vom kreiſenden Habicht, ja ſelbſt den Steinen muthwilliger Knaben mit Geſchick zu entziehen. Dagegen wird er kaum eine Nacht im Wald überleben, da er ſich der dortigen unbekannten Feinde nicht erwehren kann. Gerade ſo hülflos iſt der wilde Vogel in unſerm Kulturgarten.

Zum Schutze des Gartens und ſeiner Inſaſſen vor Katzen habe ich das Drahtgitter empfohlen, welches ſich beſonders bewährt, wenn einige nebeneinanderliegende Gärten es gemeinſam anlegen. Dieſer Gitterſchutz genügt für die einmal im Garten angeſiedelten Vögel, aber nicht, um neue zum Anſiedeln zu bewegen. Sehen wir einmal zu, wodurch wir Vögel zum Anſiedeln reizen können. Wir können es erſtens durch Schaffung von Niſtgelegenheiten und zweitens durch Anpflanzen von ſolchen Gewächſen, die von den Vögeln bevorzugt werden. Unter Niſtgelegenheit verſtehe ich nicht nur das Anbringen von Niſtkäſtchen, ſo empfehlenswerth dies auch iſt, ſondern beſonders Schaffung natürlicher Niſtplätze. Machen es doch manche Gärten dem Vogel ganz unmöglich, darin ſein Neſt aufzuſchlagen. Die gutgepflegten, jeden Monat geſtutzten Weißdornhecken, die kaum handdick ſind, der glatte Plankenzaun, die Betonmauer oder das zierliche Eiſengitter, ſie alle können kein Neſt beherbergen. Ganz daſſelbe gilt von den ſtets licht gehaltenen Formbäumchen, den hochſtämmigen, mit kopfdicken Krönchen verſehenen Berenſträuchern und der lattenbekleideten Laube. Derart gepflegte Gärten werden zwar von Vögeln beſucht, aber es wohnen keine darin. Wie iſt dem abzuhelfen? Sehr leicht. Zunächſt laſſe man die Umzäunungshecken mindeſtens fußdick werden, und laſſe in der abgelegenſten Ecke einen kräftigen Weißdornſtrauch über die Hecke hinauswachſen. Dies ſieht gar nicht häßlich aus. Zu Füßen dieſes Dornſtrauches pflanze man nun einige Bromberranken, eine Himbere, eine Klematis und rechts und links je einen rothen Traubenhollunder. Dieſe Ecke wird nun bald vollſtändig zuwuchern und mit ihren Dornen und Ranken eine Niſtgelegenheit bieten, die ſehr ſchnell von den gefiederten Gäſten benutzt wird. In einem derartigen Winkel hatte ich in einem Jahr eine Nachtigal, zwei Flachsfinken, ein Rothkehlchen und noch ein Par minderwerthige Sänger wohnen. Meine Laube wird von einem dichten Rankengewirr von wildem Wein bekleidet und an den Seiten von 2 bis 3 Meter hohen Dornen- und Hollunderſtämmen überragt. Jn jedem Jahr wohnen verſchiedene Vogelfamilien, beſonders Rothſchwänzchen, darin. Jn dieſem Jahr habe ich in kurzer Entfernung davon noch 12 Edeltannen (junge Fichten) angebracht, und ich werde auch noch eine Gruppe in einer Ecke anbringen. Jch bin ganz ſicher, dadurch beſonders Meiſen an meinen Garten zu feſſeln, beſonders da ich neuerdings noch einige Hochſtämme durch den Garten vertheilt habe. Jn jedem Jahr werden eine größere Anzahl Sonnenblumenkerne geſteckt. Wo eine freie paſſende Stelle iſt, kommt ſo eine Sonnenblume hin. Von dieſen bleibt eine Anzahl im Herbſt im Garten ſtehen, eine Anzahl wird dicht über dem Boden abgeſchnitten und ſo ganz vorſichtig auf den Speicher geſtellt. Jm Winter wird nun von Zeit zu Zeit eine ganze Pflanze heruntergeholt und in den Garten gebracht. Das iſt ein Feſt für das kleine gefiederte Völkchen. Dazu finden ſich im Winter noch ſtets eine ganze Anzahl Beren auf den verſchiedenen Straucharten (Vogelkirſchen werden dieſen Herbſt gepflanzt). Endlich werden die alten Stöcke der Hecke nicht ausgeriſſen, ſondern noch feſtgebunden, und wenn ich recht ſchön ausgehöhlte finde, ſo werden ſie an paſſenden Stellen angebracht.

Und der Erfolg: Den ganzen Tag über habe ich luſtige Sänger im Garten. Schon in aller Frühe wecken mich am Morgen die tiefen Flötenſtimmen der Amſeln, und am Abend kann ich mich an den Zaubertönen eines Wechſelgeſanges erfreuen, den 4 bis 5 Nachtigalen, von denen eine in meinem Garten wohnt, veranſtalten. So ein einziger Abend entſchädigt für die geringe Mühe, welche das Schaffen der Niſtgelegenheiten im Garten verurſacht. Speziell um die Nachtigalen feſtzuhalten, bin ich jetzt auch mit der Anlage einer kleinen Tränke beſchäftigt. Jch will zu dieſem Zweck ein altes Regenfaß mit Raſenſtücken umkleiden und aus einem einen halben Strohhalm dicken Röhrchen einen kleinen Strahl in einen davorliegenden ausgehöhlten Stein laufen laſſen.

Bei einem Freunde ſah ich folgende Einrichtung. Ein mannshoher Haufen abgehauener Dornenreiſer wurde an einer Seite von hohen Haſelſträuchern, an der andern von einer Nadelholzgruppe begrenzt. Stechpalme, Roth- und Weißdorn ſchloſſen jede Lücke zu, und Bromberen rankten über das dürre Dornreiſig. An dieſes Plätzchen ſchloß ſich ein etwa 3 Meter breiter Raſenfleck mit 2 bis 3 Fuß hohen Gräſern. Die ganze Anlage ſah reizend aus, aber mit Stolz zeigte mir der Eigenthümer derſelben nicht weniger als 14 der verſchiedenſten Vogelneſter, welche theils in den Zweigen der umſtehenden Sträucher, theils im dürren Reiſig, theils im Graſe oder den umliegenden Hecken Platz gefunden hatten. Am ſtolzeſten war der Beſitzer, daß es ihm in dieſer Weiſe ſelbſt gelungen war, eine Grasmücke an ſeinen Garten zu feſſeln.

Dieſe Winke mögen genügen. Natürlich muß jeder dafür ſorgen, daß die in ſeinem Garten wohnenden Vögel nicht zu oft in ihrem Brutgeſchäft geſtört werden, da die meiſten in dieſem Stück ſehr empfindlich ſind und ſich ſchnell verſcheuchen laſſen. Ganz beſonders aber achte man darauf, daß die Vögel nicht von kleinen oder großen Rangen aus der Nachbarſchaft niedergeknallt werden. Jſt es nicht ſchrecklich, wenn man ſehen und hören muß, wie dumme Jungen, denen unvernünftiger Weiſe eine Flobert- oder Windbüchſe geſchenkt wurde, nun unſere lieblichen und nützlichen Gartengenoſſen töten?! Hier ſchreite man direkt durch eine Anzeige bei der Polizei oder dem Bürgermeiſteramte ein. Hat man Sorge, daß die Sache dort nicht gewürdigt wird, ſo hebe man die Gefahr für die Geſundheit und das Leben der in Gärten lebenden Menſchen hervor, und die Behörde wird prompt für Abhilfe ſorgen. Ein ſolcher „Schießer“ kann in ein par Tagen alle beſſeren Vögel, außer den Spatzen, vertreiben, und es iſt eben das Schlimmſte, daß die viel zutraulicheren und gutmüthigeren Sänger weit eher getroffen werden, als der mit allen Liſten des Stetsverfolgten ausgerüſtete Spatz.

Alſo unſer Garten ſei ein Vogelheim, und dies iſt er und wird er, wenn wir in oben beſchriebener Weiſe dafür ſorgen.

* * *

Briefliche Mittheilungen

... Auf dem Hof des Gerichtsgebäudes Neue Friedrichſtraße 13 in Berlin hält ſich des Oeſteren ein Amſelpärchen auf. Während das Männchen das gewöhnliche ſchwarze Kleid trägt, iſt das Weibchen weiß, mit ſchwarzen Schwanzfedern und ſchwarzen äußeren Schwungfedern. N. Müller, Kanzleirath.

... Noch möchte ich erwähnen, daß bei uns in Böhmen in dieſem Jahr ein ungemeiner Zuzug von Sproſſern und Nachtigalen bemerkt wurde, und dieſe infolgedeſſen in größerer Anzahl gefangen wurden — während dieſe Vögel ſonſt zu den größten Seltenheiten gehörten und oft Jahre lang gar keiner gefangen wurde. Heute beſitzt ein jeder Liebhaber ſeine ſämmtlichen Käfige voll Sproſſer und Nachtigalen.

Ludwig Krippner.

Anfragen u. Auskunft

Herrn Jngenieur Robert Schütz: Stechen Sie die blaſenartige Anſchwellung des erkrankten Vogels hier und da vorſichtig auf und drücken Sie die angeſammelte Luft gelinde heraus; dann beſtreichen Sie die Stelle mit erwärmtem Oel. Füttern Sie ihn jetzt etwas weniger reichlich und entziehen Sie ihm vor allem einen Theil der Mehlwürmer.

Herrn Hütten-Jngenieur O. Rabiſch: Soweit ſich feſtſtellen läßt, hatte der Vogel etwas ihm Schädliches gefreſſen, und war infolge deſſen eingegangen.

Herrn P. Link: Der Geſang Ihres Sproſſers iſt infolge der zu früh eingetretenen Mauſer verſtummt. Wahrſcheinlich war der Wechſel zwiſchen warm und kalt zu groß, als Sie den Vogel auf die Veranda hinaus brachten; ſetzt man ihn allzu raſchen und großen Wärmeſchwankungen aus, ſo bringt man ihn leicht zur vorzeitigen Mauſer. Jetzt jedoch laſſen Sie ihn ruhig auf der, wie Sie ſchreiben, geſchützten Veranda ſtehen, da Licht und Luft den Federwechſel beſchleunigen. Um ſeinen Geſang iſt es allerdings für dies Jahr geſchehen.

Herrn C. Röben: Die Erfahrung hat gelehrt, daß ſich eine ganze Anzahl Vögel fremder Zonen bei uns im Freien halten, überwintern und ſogar züchten läßt. Vor allem ſind hier der Wellenſittich, der rothe Kardinal, der roſenbrüſtige Kernbeißer, die grauen Kardinäle und der blaue Hüttenſänger zu nennen. An Papageien kommen außerdem der Nymfenkakadu, zahlreiche auſtraliſche Plattſchweifſittiche und dann auch die weißen Kakadus in Betracht. Auch Hühnervögel, wie kaliforniſche Schopf- und virginiſche Wachteln, eignen ſich gut für dieſen Zweck. Rathſchläge und Winke über die Einrichtung der Voliere finden Sie in meinem „Lehrbuch für Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ (Die fremdländiſchen Stubenvögel, Band IV) S. 87.

Herrn Carl Würfel, Altona: Fordern Sie die Doldenrieſche unter dem Namen Tradescantia und zwar die grüne Spielart.

Herrn Ludwig Krippner: Ueber den Speckkäfer ſowohl als über den Pelzkäfer und den Werth ihrer Larven als Futter für zarte Weichfutterfreſſer enthielten die Nr. 2 und 4 des Jahrgangs 1898 der „Gefiederten Welt“ längere Artikel aus der Feder erfahrener Vogelwirthe, und Nr. 9 brachte die Abbildung beider Kerbthiere. Mit Rückſicht auf die neu hinzugekommenen Abonnenten erfüllen wir Ihren Wunſch und geben kurz noch einmal Auskunft über dieſe Käfer: Der gemeine Speckkäfer iſt 7 bis 8 mm lang, oberſeits ſchwarz, mit einer breiten, braungelben Querbinde über die Wurzel der beiden Flügeldecken, die grauflaumharig und mit ſechs ſchwarzen Pünktchen gezeichnet iſt; an der Unterſeite erſcheint er gelblich behart. Die Larve iſt doppelt ſo lang wie der Käfer, oberſeits braun, mit langen braunen Haren, am Bauch weiß; auf dem letzten Ring trägt ſie zwei kräftige Hornhaken. Der kleine Käfer kommt in ganz Europa häufig vor; im Freien nährt er ſich, ebenſo wie die Larven, von Aas, in der menſchlichen Häuslichkeit, in die er oft eindringt, von allerlei thieriſchen Stoffen, Fleiſchwaren, Fellen, Pelzwerk u. a.; in dieſe Gegenſtände legt das Weibchen im Mai ſeine Eier ab. Im Auguſt und September verpuppt ſich die Larve. — Der Pelzkäfer, auch Kürſchner genannt, iſt 4 bis 5 mm lang, ſchwarz mit einem weißen Punkt auf jeder Flügeldecke; weniger deutlich ſind drei kleinere Punkte am Hinterrand des Halsſchilds; unterſeits iſt der Käfer grau behart und ſeidenglänzend, an Fühlern und Beinen rothbraun. Die Larve iſt bei dieſer Art ebenfalls doppelt ſo groß wie der Käfer, gleichfalls oberſeits braun, unterſeits heller, ringsum mit Schuppen bekleidet und behart. In der Lebensweiſe gleichen Käfer und Larve dieſer denen der vorigen Art. Der Erſtre findet ſich im Freien an Blüthen von Dolden und Spiräen. In der Häuslichkeit richtet die Larve namentlich an Pelzwaren, Teppichen, Wollſtoffen u. a. Schaden an. — Die Larven beider Käfer ſind ein ausgezeichnetes Futtermittel für unſere Weichfutter freſſenden Vögel. Sie zu züchten iſt nicht ſchwer. Die Anlage der Hecke muß genau wie die einer Mehlwurmhecke vorgenommen werden; doch muß man ſehr vorſichtig ſein, um zu verhindern, daß die ſchädlichen Käfer und Larven daraus entkommen und in der Häuslichkeit Schaden anrichten.

Herrn Guſtav Schwab: Füttern Sie Ihre Schamadroſſel zunächſt auf folgende Weiſe: gelbe Rübe oder Möre, Semmel, gekochtes Ochſenherz, alles fein und gleichmäßig zuſammengerieben, und dazu trockne Ameiſenpuppen. Hierzu reichen Sie etwas abgekochten Siebkäſe und in ſehr geringer Gabe zerkleinertes, hartgekochtes Hühnerei. Außerdem geben Sie ihr zerſchnittene Feige, kleine Roſinen oder Korinthen, rothe Hollunderberen (trocken oder eingeweicht). Die Mehlwürmer laſſen Sie vorläufig ganz fort, da der Vogel anſcheinend ſehr fett iſt. Tritt in ſeinem Zuſtand, der durch falſche Fütterung hervorgerufen worden, keine Aenderung ein, ſo fragen Sie bitte nochmals bei mir an.

Herrn Hugo Dicker, Fabrikbeſitzer: Das Weibchen Gould's Amandine war an Unterleibsentzündung eingegangen. Da Sie nicht angegeben haben, wie Sie den Vogel gefüttert haben, vermag ich nicht zu entſcheiden, ob Sie vielleicht in der Fütterung einen Fehler begangen, wodurch die Erkrankung des Vogels herbeigeführt worden. Möglich iſt allerdings auch, daß das Waſſer des Springbrunnens doch zu kalt war.

Herrn C. J. Schmidt: Ihrem Wunſch entſprechend nenne ich Ihnen folgende Namen: Poiſſon-Bordeaux, Cremieux und Ruſpini-Marſeille, Letzterer auch in Paris, dann Geoffroy de St. Hilaire, Direktor des Akklimatiſationsgartens von Paris. In den anderen genannten Orten kann ich Ihnen leider keine Adreſſen nennen.

Briefwechſel

Herrn Dankler: Ihren Artikel über die Kukuke bringen wir demnächſt.

Zu unſerm Bilde.

Die Abbildung zeigt uns zunächſt die von Herrn Eichlam in dieſer Nummer geſchilderte Gelbnackenamazone (Psittacus auripalliatus, *Lss.*). Als genaue Beſchreibung ihres Gefieders nach Durchſchnittsvögeln wäre folgende zu nennen: ſie iſt an Stirn, Oberkopf und Wangen hellgrasgrün; Scheitel meerbläulich, Scheitelmitte mehr oder minder, manchmal garnicht gelb; Augengegend meerblau, jede Feder ſchwärzlich gerandet; Nacken zitrongelb; Flügelrand nur zuweilen roth, manchmal mit einzelnen rothen Federn, doch auch bis zu großen rothen Achſeln, Spiegelfleck im Flügel roth; Schwanzfedern am Grunddrittel der Innenfahne roth; ganze übrige Oberſeite grasgrün, nur an Hinterhals und Halsſeiten jede Feder mit ſchwärzlichem Endſaum; Unterſeite mehr gelbgrün; Schnabel dunkelhorngrau, am Grund ein gelblicher Fleck, Wachshaut ſchwärzlich mit ſchwarzen Borſtenfederchen; Auge braun- bis röthlichgelb, Augenkreis weißlich; Füße bräunlichhorngrau, Krallen ſchwarz. Jugendkleid ohne den gelben Nackenfleck. Beſondere Kennzeichen: meerblaue Färbung an Scheitel und Augengegend, gelber Nacken, ſchwarze Borſtenfederchen auf der Naſenhaut. Ihr Verbreitungsgebiet iſt ganz Mittelamerika; in Coſta-Rica ſoll ſie als Stubenvogel ebenſo beliebt ſein, wie in Guatemala. Auch bei uns hat der hübſche, begabte und leicht zahm werdende Vogel jederzeit begeiſterte Liebhaber gefunden.

Der zweite Vogel unſeres Bildes iſt die Guatemala-Amazone (Psittacus guatemalae, *Hrtl.*). Sie iſt an Stirn, Oberkopf bis Nacken himmelblau; die Kopfſeiten ſind lebhaft grün; Nacken, Hinterhals, Mantel und Schultern grünlichgrau; Spiegelfleck im Flügel ſcharlachroth; Flügelrand ohne Roth; Schwanzfedern durchaus ohne Roth; ganze Oberſeite dunkelgrasgrün; Unterſeite kaum heller grün; Hinterleib und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel ſchwärzlich, Oberſchnabel mit röthlichweißem Fleck, Wachshaut bläulichgrau; Auge karminroth, Iris mit breitem braunen Rand, Augenrand bläulichweiß; Füße weißgrau, Krallen ſchwarz. Das Weibchen iſt an der Stirn grün, jede Feder blau geſäumt, Oberkopf und Nacken mehr lilablau, Wangen, Kopfſeiten und Kehle grasgrün; Schnabel heller, ſchwärzlichhorngrau, mit weißlichem Fleck am Grund des Unterſchnabels; der rothe Ring in der Iris des Auges viel ſchmaler. Beſondere Kennzeichen: bläulicher Oberkopf; kein Roth am Flügelrand und im Schwanz; Puderdaunen am Rückgefieder; faſt über Rabengröße. Auch ihre Heimat erſtreckt ſich über Mittelamerika, ſowie über Süd-Mexiko. Im Weſen ſoll ſie der bekannten Müller-Amazone am meiſten ähnlich ſein. Selbſtverſtändlich gibt es auch unter dieſer Amazonenart neben leicht zahm werdenden Vögeln unleidliche Schreier und neben wenig begabten ſehr befähigte. Sehr viel kommt es darauf an, ob die Vögel alt oder jung gefangen und ob ſie ſachgemäß behandelt werden. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Holzwaarenfabrik.

C. L. Flemming

Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen

empfiehlt: [1080]

Flug- und Heckbauer. Einſatzbauer. Geſangskaſten.
Muſterpackete 9 St. ſort. f. Kanarienzüchter M. 6 franko.

Holzwaarenfabrik.



Man verlange Preisliſte.



Vogelkäfige aller Art **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in **praktiſcher** Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1081]

☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜

August Hermann Luther, Oschatz i. S.



Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Neyfallen,** kleine 80 ₰, größ. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ, **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [1082]

Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112.

Illuſtrirte Preisliſte gratis.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1083]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Futtermittel.

Lager von **Ameiſeneiern.**

Direkter Import bei

[1084] **H. Drefalt, Lübeck.**

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche **inſektenfreſſende Singvögel** von Apotheker **Max Kruel.**

Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!

[1085] Allein angefertigt von

Ernst Hanke, Trier, Moſel.

☞ Muſter und Proſpekte koſtenlos. ☜

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [1086]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)

Vogel- und Hundefutterhandlung.

Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Alle Vogelfutter, Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.

Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche. Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1087]

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [1088]

Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos)

Friſche Ameiſeneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt der einzige Erſatz: **Zecke** mit heißem Waſſer übergoſſen und dann ausgedrückt. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zecke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Drogerien. Man verlange Zecke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1089]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Friſche Ameiſeneier

liefere den ganzen Sommer hindurch, in beſter Qualität, à Ltr. 1 ℳ **Joseph Böning,**
[1090] Braunſchweig, Klint Nr. 3.

Friſche Ameiſeneier,

ſaubere helle Ware, à Liter 1 ℳ, 10 Liter 9 ℳ gegen Nachnahme. [1091]

J. Nullmeyer, Vogelhandl., Mannheim.

Vogel-Bisquits

fabrizirt als **Spezialität** und offerirt in **beſter Qualität** zu 2,50 ℳ pro 100 Stck. **franko** gegen Einſendung des Betrags oder per Nachnahme. [1092]

Paul Bienzeisler, Tillowitz, O.-S.

Vögel.

ff. Harzer Kanarien-Vögel,

Hohl- u. Knorr-Vögel, ſowie Klingel- u. Schaukel-Roller ohne Fehler 15, 20 u. 25 ℳ, geb. dieſelb. 14 Tage a. Probe, jedoch p. Nachn. od. Betrg. vorher, nicht gefall. Vögel tauſche um od. zahle zurück. Preisliſte frei. [1093]

L. G. Müller, Vogelzüchterei, Nordhauſen a. H.

NB. Junge von dieſem Jahr à Stck. 5 ℳ, 6 Stck. 25 ℳ, 12 Stck. 48 ℳ, frei dort.

☞ 1898 erhielt mein Stamm Harzer Kanarienvögel 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.

Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [1094

[1095] **Geſucht:**

Granataſtrilde, Buntaſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen u. ſeltene ausländ. Finken.

J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.).

Empfehlen garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende

☞ **Sproſſer** ☜

à Stck. 9—12 ℳ, [1096]

Wachtelhähne,

à Stück 1,50 ℳ, 6 Stück 7 ℳ, ſowie

Nachtigalen

4—6 ℳ und alle Arten

☞ **Grasmücken** ☜

unter Garantie lebender Ankunft. Preisliſte gratis.

Friſche Ameiſeneier,

pr., ohne Gehölz, Sand und Ameiſen, à Lit. 1,40 ℳ, dto. 1,20 ℳ II. Qualität.

Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft, **Hofſtetten** b. Gemünden a. M. (Bayern).

Wachteln,

nur Hähne, gute Schläger, Dtzd. 7,50 ℳ, **Nachtigalen,** St. 2 ℳ. Garantie für Männchen und lebende Ankunft. [1097]

M. Muschner, Temesvar, Ungarn.

Es kommen nur akklimatiſirte,

gesunde,

kräftige, tadelloſe, ſchöne Vögel zum Verſandt, unter Garantie lebender Ankunft und abſolut ſorgfältiger Bedienung.

Toviſittiche, fingerzahm St. 12, P. 22 ℳ
Elfenbeinſittiche, fingerz. St. 12, P. 22 „
Roſenkopfſittiche, alte Zuchtp., 15.— „
Rothbrüſt. Edelſittiche, prchtv. Z., 12.— „
Feuerflügelſittiche, fingz., St. 13 ℳ, P. 25 „
Roſenpapageien, richtige Zuchtp., 25.— „
Nymphenſittiche imp. Zuchtp. 10.50 „
Halsbandſittiche, Mch., lern.ſpr., St. 5.— „
do., richtige Zuchtp., 9.— „
Blumenauſittiche, lern. ſprech. St. 4.50 „
Mönchſittiche, prachtv. Zuchtp., 8.— „

Wellenſittiche, prachtvolle, echt auſtraliſche, große, ſtarke, ſofort zur Brut ſchreitende Zuchtp. 6 ℳ
Wellenſ.-Naturniſtkäſten, Stück 1.50 „
Paſtorvogel, eingew., Ia Säng. 50.— „
Beo, Ia, anfangend zu ſprechen, 16.— „
Echte Donau-David-Sproſſer, M. 9.— „
Tambourintäubchen, Zuchtpar 12 „
Auſtr. Schopftauben, Zuchtpar 12.— „
Zebra- od. Sperbertäubch., Zp. 4.50 „
Oliven-Aſtrilde, Zuchtpar 4.50 „
Braſil. blaunackige Elſtern, St. 12.— „
Chin. Nachtigalen, Doppelüberſchl. 6.50 „
do. Zuchtweibchen, St. 2.— „
Regenwachteln, Zuchtpar 10.— „
Schamadroſſeln, pr. Ia Sänger, bei mir abgemauſ. Exemplare 34—36 „
Jamaika-Trupial, prchtv. Ia Sg., 16.— „
Imp. Zebrafinken, Zuchtpar 4.50 „
Jap. Mövchen, gelb- u. braunb. P. 3.— „
Königs-Ortolan, Mch. i. Pracht, St. 3.— „
Papſtfinken, Mch. in Pracht, 5.50 „
Indigofinken, himmelbl., i. Pr., St. 4.50 „
Indigofinken, Weibchen, St. 3.50 „
Safranfinken, Männch. 3.50, P. 6.— „
Dominikaner-Kardinäle, Mnch. 5.50 „
Feuerrothe Kardinäle, prachtv. bei mir abgemauſ. Ia Säng., St. 9.— „
Schneewſz. Reisfinken, Zuchtpar 7.— „
do. graue, prachtvoll, „ 2.— „
Hartlaub-Zeiſige, Mch. 3, Par 4.50 „
Grauedelſänger, St. 3,50 „
Etw. ſprech. Amazon., Ia Ia, 35—45 „
Gutſprech. Graupapageien 50—150 „
Gr. Gelbhaubenkakadu, vollſt. fingerzahm, 20.— „
Roſakakadu, vollſtändig fingerz., 12.— „
Gelbe Turtel- od. Lachtaub., P. 2.50 „

In richtigen, kräftigen Zuchtparen: Schmetterlingsfinken 2.50 ℳ, Atlasfinken 2 ℳ, Aſtrilde 2 ℳ, Goldbrüſtchen 3 ℳ, kl. Elſterchen 2.50 ℳ, Orangebäckchen 1,80 ℳ, Muskatfinken 2 ℳ, Silberfaſänchen 2 ℳ, Bandfinken 2 ℳ, Paradiswittwen 3 ℳ, Dominikanerwittwen 4 ℳ, Napoleonsweber 2 ℳ, Orangeweber 2 ℳ, Blutſchnabelweber 2 „, Chineſerfinken 1.50 ℳ, Tigerfinken 2 ℳ, Grisbleu 4 ℳ, Amaranthen 4 ℳ. Von dieſen Senegalvögeln, gemiſcht nach meiner Wahl in reizendem Sortiment, 5 Par 9 ℳ, 10 Par 16 ℳ, 20 Par 30 ℳ. [1098]

Alle Sorten pr. Vogelfutter. Preisl. gratis.

Goldfiſche, pr. hochroth, abſolut haltbare Ware, 5—7 cm lang 5.50 ℳ, 7—12 cm lang 8.50 ℳ, 5—12 cm 7.50 ℳ, per 100 franko mit Kanne.

Lothr. Rieſen-Kaninchen, 3 Monate alt, kräftig u. gut entwickelt, St. 1,50 ℳ.

Georg Brühl, Vogel-Exporthaus,
Kötzſchenbroda b. Dresden,

Größtes Special-Geſchäft dieſer Branche.
Im eigenen dazu eingerichteten Grundſtück.
Händler u. Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1099]
C. G. Vodel, Leipzig, [illegible] 16.

Verk. od. vertausche: 2,2 Wellensittiche à 7 ℳ, 1,1 Amarant 4 ℳ, 1,1 Schmetterlingsfink 3 ℳ, 1,1 Orangebäckchen 2 ℳ, sämmtlich tadellose Zuchtpare. **Zu kaufen gesucht:** 0,1 Ceresastrild. [1100]

Otto Schneider,
München, Herzogwilhelmstr. 16/4.

Schamadroſſel,

großartiger Sänger, tadellos im Gefieder, hat 2 mal bei mir gemauſert, frißt aus der Hand, freifliegend in der Vogelſtube, durchaus friedlich, für 45 ℳ zu verkaufen.

Ferner **rother Kardinal,** ebenfalls vorzüglicher Sänger, 2 Jahre hier, ſelten ſchönes Gefieder, 8.50 ℳ. [1101]

Overhamm, Apotheker,
Werden (Ruhr).

Rothe u. gelbe Kreuzſchnäbel

verſende 6 Stück 4 ℳ, Dutzend 6 ℳ. Tauſche auch auf friſche Ameiſeneier, Sproſſer, Schwarzblättchen, Nachtigalen u. Käfige.

A. Jaumann,
[1102] **Großbreitenbach,** Thür.

Harzer Kanarienvögel,

Hohlroller-Stamm, diesjährige Hähne à 5 ℳ, Dtz. 48 ℳ, Weibchen à 80 ₰, Dtz. 8 ℳ. Garantie für Hähne und leb. Ankunft.

Wilhelm Kaye,
[1103] **Thale** (Harz).

Graupapagei,

Seltenheit, erſt 1 Jahr hier, ſpricht deutlich wie ein Menſch ca. 200 Wörter in ſchönen langen Sätzen, unermüdlicher Sprecher, ſingt u. flötet, iſt zahm, ſchön i. Gef., ohne jeden Fehler, verkaufe unter Garantie für 125 ℳ. 1 ſchöner junger **Doppelgelbkopf,** ſehr gut ſprechend, zahm, ſchönes Gefieder, ohne jeden Fehler, unter Garantie, Pr. 60 ℳ [1104]
Herm. Thiel, Hamburg, Taubenſtr. 9.

Selten ſchöner rabengroßer

Doppelgelbkopf,

taubenzahm, ſchön im Gefied., ſpricht Lora, Papagei, 1, 2, 3, hurra, der Kronprinz iſt da, Wackerlora, herein, guten Tag, Karo, Muſch, Muſch, Mutter, Papa, Loritara, Zuckerjung, Jako, lacht, weint und ſingt hipp, hipp, hurra ꝛc., 60 ℳ. Garantie für lebende Ankunft.

H. Rath,
[1105] **Hamburg,** Neue Roſenſtr. 45.

Gebe ab:

1,1 Dompfaff 3 ℳ, 1,0 Schwanzmeiſe 2 ℳ, 1,0 Donauſproſſer im vollen Schlag 9 ℳ, 1,0 Eichelheher, pfeift, ahmt alles nach, 3.50 ℳ. [1106]

Baron, Breslau 8.

Dreifarbg. Papag.-Amand., brutluſtiges kräftiges Weibch., hat wegzugeben **Joh. Gabl,** Cpl.,
[1107] **Dornbirn** (Vorarlberg, Oeſterr.).

---

1 prima Amsel

6 ℳ, **1 prima Droſſel** 4 ℳ, mit Verp. Beide 2 Jahre im Kaſig. [1108]

R. Dischinger,
Karlsruhe, Herrenſtraße 29.

Mitarbeiter

geſucht für eine wöchentlich erſcheinende Zeitſchrift für Blumen-, Vogel-, Aquarien- und Terrarienfreunde. [illegible] erbeten an **Rudolf Mosse, Hamburg** unter **H. R. 1148.** [1109]

---

1 ausgezeichneten echten reinſchall. **Reitzugfink** m. lg. Schlag u. „Schnapper" und einen desgl., abſetzend mit „Schnapp". **Markert, Scheibenberg,** Erzgeb. [1110

Bücher-Anzeigen.

Vogelliebhaber

erhalten auf Wunſch koſtenlos und poſtfrei unſre 32 Seiten umfaſſende illuſtrierte Verlagsbroſchüre.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Der

Deutſche Geflügelhof

Abonnement vierteljährlich 75 Pfg.

Inſerate: die einſpaltige Zeile 15 Pfg.

Amtliches Organ des Sonderausſchuſſes für Geflügelzucht der Landw. Kammer für die Prov. Brandenburg und der demſelben angeſchloſſenen Vereine.

Redaction:
Bruno Dürigen, Charlottenburg.

Der „Deutſche Geflügelhof" bringt alles Wiſſenswerthe auf dem Gebiete der landw. Nutzgeflügelzucht, ſowie rationellen Tauben- und Kaninchenzucht, auf den Sport dabei gebührend Rückſicht nehmend, belehrende Artikel für den Anfänger, Beſchreibungen und Abbildungen.

Probenummern koſtenlos durch die Geſchäftsſtelle

Otto Koobs Verlagsanſtalt,
Forſt i. L.

Bei uns erschien:

Der Sprosser oder die Aunachtigal

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber und Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung Magdeburg.

[illegible] Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von [illegible] in Bur[illegible]

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2688).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Alliancestraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 25. Magdeburg, den 22. Juni 1899. XXVIII. Jahrg.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Petz' Keilſchwanzſittich (Psittacus Petzi, *Leibl.*).

Ländlich — ſittlich! lautet vielfach die Antwort auf Gepflogenheiten und Einrichtungen derjenigen Länder, denen man fremd und neu gegenüberſteht. Wie in jeder Thüringer Bauernſtube ein Rothkehlchen zu finden iſt, oder die umherziehenden Spielwagen den Kreuzſchnabel als beſonderen Liebling mit ſich führen, ſo findet man in Guatemala bei allen Familien ein oder mehrere Periquitos. So nennt der Eingeborene dieſen ſeinen Liebling, und dieſe Benennung iſt thatſächlich zur Allgemeinheit geworden. Dieſer allerliebſte kleine Sittich iſt hier geradezu das lebendige Spielzeug der Familien. Mit beſchnittenen Flügeln läuft das kleine Kerlchen im ganzen Hauſe umher, fügt ſich in alle Verhältniſſe, nimmt mit jeder Nahrung fürlieb, gewöhnt ſich leicht an alle die ihn umgebenden Perſonen, erträgt ihre guten und ſchlechten Launen und iſt dankbar für jedes freundliche Wort, beſonders wenn ein kleiner Leckerbiſſen ſeine Artigkeit belohnt. Nur dieſe Vorzüge können ihm den Platz in der Familie erworben haben, nicht die Billigkeit, die es geſtattet, den allerliebſten Vogel das ganze Jahr hindurch für etwa eine Mark deutſchen Geldes kaufen zu können.

In Deutſchland gehört der Petzſittich zu den weniger eingeführten Vögeln und ſteht demzufolge verhältnißmäßig hoch im Preiſe. Durch die handelspolitiſchen Beziehungen iſt Guatemala mit Deutſchland inniger, als mit jedem andern Land verbunden; es beſteht ein bedeutender Verkehr in Ein- und Ausfuhr. Umſomehr wundert es mich, daß ſich die Fäden kommerzieller Thätigkeit noch nicht auf lebende Ware erſtreckt haben. Würde der Petzſittich des öfteren und regelmäßig nach Deutſchland eingeführt, ſo würde er ſich ſicherlich auch drüben einen großen Kreis von Freunden erwerben, zumal ich glaube, daß bei der Auswahl richtiger Pare einer leichten Züchtbarkeit nichts im Weg ſtehen könnte und der Petzſittich alsdann ſelbſt dem Wellenſittich Konkurrenz machen würde. Dabei iſt dieſe kleine Rothſtirne viel zutraulicher, ſetzt ſich mit Vorliebe auf den Finger und unterhält ſich mit ihrem Pfleger. Ich habe dieſen kleinen Sittich lieb gewonnen, und was ich von ihm ſchreiben kann, iſt vorurtheilsfrei geurtheilt, nur gut und lobenswerth. Der kleine Grünfrack lernt auch etwas ſprechen, und wenn es nur einige Worte ſind, um ſo werthvoller erſcheint mir ſeine Leiſtung.

In der Vogelſtube oder in der Gemeinſchaft mit anderen Vögeln iſt er verträglich und mit ſeines Gleichen nicht zänkiſch. Er liebt überaus die Geſelligkeit und zwei gleiche Geſchlechter bringen ſich dieſelbe Liebe und Aufmerkſamkeit entgegen, als ob ſie Pare wären. Sie krauen ſich gegenſeitig im Gefieder, füttern ſich gegenſeitig aus dem Kropf u. a.

In Guatemala iſt der Petzſittich der gewöhnlichſte Vogel und kommt regelmäßig zum Verkauf auf den Markt, aber immer iſt er raſch vergriffen und jederzeit finden ſich Abnehmer. Leider ſind regelmäßig ſeine Flügel ganz barbariſch beſchnitten. Von dieſer Grauſamkeit ſind eben die Eingeborenen nicht abzubringen. Es iſt Gebrauch, und den ändern weder Bitten noch Verſprechungen. Die beſchnittenen Flügel ſind daher auch vielfach der Grund für den Verluſt des Vogels. Bald holt ihn eine Katze, oder er wird zwiſchen die Thüre geklemmt, er fällt in den Saufnapf oder in ein anderes Gefäß oder er wird, wie dies am meiſten geſchieht, aus Verſehen todtgetreten. Auf dieſe unnatürliche Weiſe kommen die meiſten Periquitos ums Leben. Mein Trachten ging ſtets darnach, die Sittiche nur im beſten Gefieder zu halten, weil nur dann der Vogel ſich in ſeiner vollkommenen Schönheit zu zeigen vermag. Um das zu erreichen, zog ich meiſtens nur an einem Flügel die abgeſchnittenen Federſtumpfe aus, die am andern Flügel fallen alsdann regelmäßig von ſelbſt. Beſte Pflege, gute Nahrung und Reinlichkeit, während der Nacht möglichſt Wärme, bringen den Vogel bald in die gewünſchte Verfaſſung.

Die Liſte des zoologiſchen Muſeums führt den Petzſittich unter der Bezeichnung „Conurus Petzii“ auf, mit der Bemerkung, daß derſelbe in der Sammlung fehlt. Vor kurzem iſt er aber in drei Köpfen, angeblich die beiden Geſchlechter mit einem vollſtändig ausgefiederten Jungen der Sammlung einverleibt worden. Die ſonſt übliche kurze Beſchreibung fehlt noch den Vögeln.

In großen Zügen ſtreicht der Petzſittich umher, kommt oftmals in unmittelbare Nähe von Guatemala und ſtattet nicht ſelten den in Gefangenſchaft lebenden Genoſſen auf einzeln gelegenen Anweſen einen Beſuch ab. Auf ſeinen Zügen richtet er vielfach in den Maisfeldern während der Halbreife bedeutenden Schaden an. Das eigentliche Gebiet ſeiner Lebensthätigkeit iſt jedoch Escuintla, S. Lucia, Patulul, Mazatenango, Chiquimulilla und von hier aus wird auch unſer Freund nach der Hauptſtadt in den Handel gebracht. Die Niſtperiode fällt in die Monate März bis Mai. Für gewöhnlich wird nur eine Brut gemacht. Das Neſt iſt in hohlen Bäumen möglichſt hoch und nicht leicht zu finden. In der Regel enthält es fünf Eier von weißer Farbe. Die Jungen werden hauptſächlich mit Früchten und halbreifen Sämereien aufgefüttert und ſollen bis zum Flüggewerden vier Wochen gebrauchen. Aus dem Neſt genommene und aufgefütterte Junge erhält man ſelten. Dieſe Arbeit verlohnt ſich nicht, da friſch eingefangene Vögel ſchon nach wenigen Tagen zahm ſind, ihre Freiheit vergeſſen haben und ſich benehmen, als hätten ſie letztere nie gekannt. In der Nahrung iſt der Petzſittich nicht wähleriſch und bekommt auch von ſeinem Pfleger alles zu freſſen. Meiſtens erhält er tortillas, ein Gebäck aus Maisſchrot und Kalk, das Nationalgericht der Eingeborenen; mit beſonderer Vorliebe frißt er halbreifen Mais. Von ausgereiftem Mais höhlt er nur den weißen Kern aus und verſchwendet auf dieſe Weiſe ſehr viel Futter, ſofern man nicht vorzieht, ihm den Mais als grobes Schrot zu verabfolgen. Außerdem thut ſich dieſer kleine Sittich noch ein Gutes an altbackenem Weißbrot.

Die jungen Vögel zeigen ſchon im Neſtgefieder die gelbe Stirn, allerdings nicht ſo groß und intenſiv wie bei den alten Vögeln. Die gelbrothe Stirn erweitert ſich mit dem Alter und gewinnt mit der Zeit an Feuer. Der blaue Scheitel erſcheint ebenfalls erſt ſpäter, bei jungen Vögeln läßt ſich ein blaugrauer Schein feſtſtellen. Das grüne Gefieder iſt anfänglich viel dunkler, ohne Glanz, ſchmutzig graugrün und verſchwommen ohne Ausdruck. Der nackte Augenkreis bekommt erſt im zweiten Jahr ſeine ſchöne Färbung, vordem iſt er, wohl die zukünftige Farbe verrathend, mehr von der Farbe des Schnabels.

Die Geſchlechter laſſen ſich ſchwer von einander unterſcheiden, ein unbedingt ſicheres Erkennungszeichen iſt mir nicht bekannt. In Gemeinſchaft mehrerer Köpfe ließen ſich vielleicht die Männchen mit etwas Sicherheit von den Weibchen unterſcheiden, wobei durch Beobachtung das Gefühl in der Beſtimmung der Geſchlechter, wie es dem Züchter und dem Liebhaber erſt mit der Zeit eigen wird, zum Ausdruck kommt. Der Indianer ſucht die Männchen an dem mehr ausgedehnteren und dunkleren Blau des Kopfes zu erkennen.

In meinem Flugraum habe ich zur Zeit drei Pärchen als Ausleſe von einer 20köpfigen Schar. Dieſe drei Pare hatten ſich von den anderen abgeſondert, bezogen in je einem Par einen Niſtkaſten, den ſie auch beim Schlafen benutzen und ſo ſehe ich mit großem Intereſſe der Dinge, die ſich hoffentlich recht bald entwickeln, entgegen. Wie würde ich mich freuen, wenn ich an dieſer Stelle bald von einem günſtigen Erfolg meiner Zucht berichten könnte*). Aber wie oft werden bei der Stubenvogelzucht die berechtigtſten und ſchönſten Hoffnungen zu Nichts, zu einer Enttäuſchung. Wer könnte nicht darüber ein Leid klagen? Auch ich habe in dieſer Hinſicht ſchon ſo manche traurige Erfahrung machen müſſen und doch niemals die Liebe zu den gefiederten Pfleglingen verloren. Sollten meine Petzſittiche mir auch nicht den Gefallen zeigen, zu niſten und mir einen tieferen Einblick in ihr Familienleben geſtatten, ſo bleiben ſie mir dennoch gute Freunde und ich wünſche, daß dieſe zutraulichen Vögel ſich in Europa einen immer größeren Eingang verſchaffen. Der Ankauf des Petzſittichs wird von Niemand bereut werden. (Fortſetzung folgt).

---

*) Wir bitten dann recht ſehr darum. D. L.

Engliſche Vogelliebhaberei.

Von Albert Rettich.

(Fortſetzung).

Am 7. Mai, am heiligen Sonntag, beging ich die Sünde, mir ein Vergnügen zu machen. Ich wollte nämlich einmal in dem Anblick und der Beobachtung außergewöhnlicher Singvögel ſchwelgen. Da aber der Zoologiſche Garten Sonntags dem Publikum unzugänglich, mir auch zu weit entfernt iſt, machte ich einen halbſtündigen Spaziergang in die Villa meines Freundes, ehemaligen Zöglings und gegenwärtigen Vereins-Vorſitzenden, Mr. H. J. Fulljames. Man möge es mir nicht verübeln, daß ich immer wieder

Weitere Seltenheiten ſind ein Par Gang-gang- oder Helm-Kakadus (Callocephalon galeatum, *Lath.*) aus New South Wales; ein einfach benannter Meyer's Papagei (Poeocephalus meyeri, *Rüpp.*)*) aus Südweſt-Afrika; ein ſog. blutbefleckter Kakadu (Cacatua sanguinea, *Gould*)**) aus dem Norden Auſtraliens ſtammend. Beiläufig geſagt, nahm es geraume Zeit in Anſpruch, ehe ich den Blutfleck entdeckte, und ſelbſt dann war er ſehr blaß und unbemerkbar. Ein reizender, zahmer, wenn auch nicht brillantgefärbter Papagei war ein mit bronzeſchillernden Flügeln begabter. Das ruhige, zufrieden daſitzende Thierchen, kaum ſo groß wie ein Rebhuhn, ſchreit nie, unterhält ſich aber oft ſtundenlang allein und geht Jedermann ſofort auf die hingehaltene Hand. Die metalliſchen Flügel-, Rücken- und ſchwarzblauen Körperfedern liegen immer ſo glatt und feſt auf wie gebügelt. Fraſer gab dieſem Thierchen den Namen Pionus chalcopterus***). Es iſt in Columbia heimiſch, aber der hier beſchriebene fühlt ſich auch in Mr. Fulljames Wohnung ganz wohl, denn ſeit ſeiner Ankunft darin, die vor 3—4 Jahren ſtattfand, hat das niedliche Ding nie das geringſte Mißbehagen verrathen, obgleich es auch oft ausgeſtellt und manchem Witterungswechſel ausgeſetzt wurde.

Unter den Araras will ich Illigers und den unſchönen, aber ſehr ſeltenen Spix' Arara von Mexiko erwähnen. Beide ſind auf ihre Ständer gekettet, bleiben aber ſo wild und raſtlos, daß ſie ſelten ausſtellungsfähig ſind. Namentlich der Letztere mauſert ſich ſo ſchwer und anhaltend, daß er noch nie einen Preis gewinnen konnte.

Nicht viel beſſer ging es mit einem Baſtard zweier Sittiche, der zwar „kurios“ ausſieht, aber die Preis-Richter in Verlegenheit bringt, denn für Ausländer-Miſchlinge gibt es keine Klaſſen.

Ein ſicherer Sieger iſt der ſchon früher angeführte hyazinthblaue Arara (Anodorhynchus hyacinthinus, *Lath.*). Dieſer Rieſenarara wird immer größer und ſchöner im Gefieder, und nimmt zu an Kraft und Zerſtörungstrieb. Er iſt nämlich jetzt auch mit ſeinem fünften und ſtärkſten Zwinger fertig geworden. Dieſer iſt aus 1 cm dicken Eiſenſtäben gebaut und koſtete nicht weniger wie 80 ℳ. Trotzdem hat er dieſe zuletzt ſo zuſammengebogen, daß er wieder durchſchlüpfen kann, denn er trachtet immer danach, auf der Schulter ſeines Beſitzers oder ſeiner Wärterin zu ſitzen und ſich liebkoſen zu laſſen wie ein Schoßhündchen.

Dieſer Arara wurde vor etwa drei Jahren, auf einer dicken Eiſenſtange angekettet, auf dem Schiff ſchon gekauft. Dann wurde die Kette abgefeilt und ſiehe da, er verließ ſeine gewohnte vier Fuß lange Stange nicht — während acht Tagen — dann wollte er mit ſeinem vermeintlichen Genoſſen im Spiegel nähere Bekanntſchaft machen, flog auf ihn zu, zertrümmerte eine Standuhr und ein Par Vaſen und wurde dann ſchleunigſt in den größten Papageikäfig geſteckt, den er ſofort ruinirte. Ebenſo zwei bedeutend ſtärkere, ſpeziell angefertigte, bis er endlich in dem obenbeſchriebenen feſtgehalten wurde. Jetzt ſoll auch dieſer gründlich reparirt werden, und ſomit muß der Vogel noch ſehr viel erſte Preiſe gewinnen, bis die Behauſungskoſten allein wieder herauskommen.

In demſelben Zimmer ſtand vor kurzem auch der Smaragdgrüne Paradisvogel (Paradisea apoda) von den Aroo-Inſeln, deſſen Ankaufspreis wol der höchſte war, der je für einen Stubenvogel gelöſt wurde. Dieſe Rarität war von dem berühmten Händler Wm. Croß in Liverpool annonzirt worden. Zu 3000 ℳ wollte ihn kein Zoologiſches Inſtitut nehmen. W. Croß ſchrieb an Fulljames. Dieſer reiſte nach Liverpool, ſchloß den Handel ab und hatte drei Tage darauf das Schauſtück mit nach London gebracht.

Mr. Fulljames war ſeelenvergnügt, mit einer Baar-Auslage von „kaum 2000 ℳ“ in Beſitz des Wunderthieres gekommen zu ſein. Es fraß Trauben, Bananen, Hausſchaben und rohes Beefſteak. Nach wenigen Tagen fing es an zu kränkeln, nahm ſeine Nahrung nur, wenn ſie ihm in der Hand ſeiner Wärterin dargereicht wurde und ging dann elend zu Grunde. Der Abſtand zwiſchen tropiſcher Urwald-Atmoſphäre und unſerm Januar-Rauchnebel muß zu groß für das ſchöne Thier geweſen ſein.

Ein ſo bedeutender Verluſt ſchreckt den Betroffenen freilich nicht ab, weitere Opfer zu bringen, denn er erwähnt ihn nicht einmal ohne ausdrückliche Aufforderung. Eine ſolche und dabei ſehr ausdrückliche kam am 1. Mai in einer Monatsſchrift, wo dem Redakteur die Frage geſtellt wurde: „Können Sie Ihren Leſern Auskunft geben, was aus dem ſmaragdgrünen Paradiesvogel geworden iſt, den Wm. Croß zu 150 Pfund Sterling anbot? Es iſt dies jetzt drei Monate her und wir Provinzialen würden gern erfahren, an wen und zu welchem Preiſe jenes Prachtſtück verkauft wurde.“

Nächſten Monat wird nun Mr. Fulljames darauf antworten, aber ohne dieſe direkte Anfrage hätte er ſich kaum als Käufer ausgegeben.

Ehe wir dieſen Raum verließen, bemerkte ich mit Freuden, daß ſeine rothköpfigen und pflaumenköpfigen „Inſeparables“ immer noch geſund ſind. Die erſteren ſind die Ueberreſte von drei Paren, die er vor zwei Jahren erſtand, ſeit welcher Periode keine mehr zu kaufen waren. Es ſind dies nämlich nicht die bekannten „Unzertrennlichen“, ſondern eine ſehr ſeltene Art, die andere Kopfzeichnung und andere Bewegungen haben. Man ſieht ſie nämlich ſelten anders als umgekehrt, d. h. ſie hängen ſtundenlang von ihrer Sitzſtange bzl. Hängeſtange herunter, genau ſo wie Fledermäuſe, und ſehen ſich die Umgebung von einem ganz verkehrten Standpunkt an. (Es ſind alſo nicht Zwergpapageien (Psittacula), ſondern Fledermauspapageien (Coryllis). D. L.) Sie thun dies nicht aus Angſt, ſondern aus Liebhaberei. Das Hängen ermüdet ſie nicht, aber wie alle dieſe Inſeparables bewegen ſie ſich ſehr ſelten und ruhen ſehr viel aus.

---

*) Es iſt ein Langflügelpapagei. D. L.
**) Kakadu mit roſenrothem Stirn- und Zügelſtreif.
***) Der blauſchwarze Langflügelpapagei. Bei uns nur einmal lebend eingeführt.

Von einer Spielart dieſer hängeſüchtigen Zwergpapageien iſt auch ein Par da. Ebenfalls grasgrün mit rothen, ſchwarzen und weißen Kopf- und Augenſtreifen, ſind dieſe etwas größer als die obigen drei Pare, d. h. ſie ſtehen zwiſchen den gewöhnlichen rothköpfigen, und den roſaköpfigen Inſeparables. Gelbe Wellenſittiche ſind auch in dieſem Zimmer vertreten. (Fortſetzung folgt).

* * *

Welches iſt das beſte Futter für die in den Wintermonaten mauſernden Vögel?

Von A. Reuter.

Die beſte Futterzugabe für Gelbſpötter, Sumpfrohrſänger, Grasmücken u. a. zur Zeit der ſchlimmen Mauſer in den Wintermonaten, wo noch keine friſchen Ameiſenpuppen zu haben ſind, dürften, als einziger Erſatz derſelben, die Larven des Junibrachkäfers ſein, und dieſe meine Erfahrung, welche ich im Lauf vieler Jahre an den edelſten unſerer gefiederten Lieblinge zur Genüge erprobt habe, dürfte für manchen Liebhaber dieſer Vögel von Intereſſe ſein.

Ich wurde im Juni 1893 von einem Freund, in deſſen Garten ſich eine Gelbſpötter-Familie befand, welche von Katzen heimgeſucht wurde, zu Rath gezogen. Da ſich die Katzen durch kein Mittel vertreiben ließen und immer wieder kamen, ſo beſchloſſen wir endlich, das Spötterneſt mit den fünf jungen Inſaſſen vom Baum zu nehmen, da wir einſahen, daß dieſe Vögel doch früher oder ſpäter einem Vogelräuber der ſchlimmſten Sorte zum Opfer fallen würden. Dieſelben wurden auf einem Fenſtergeſimſe, welches wir mit grünen Zweigen ausſtatteten, plazirt, jedoch erſahen wir bald, daß die armen Jungen verhungert wären, da es gerade an einer ſehr belebten Straße lag. So oft nun die alten Vögel mit Futter kamen, flogen ſie ängſtlich hin und her, fürchteten ſich vor den Vorübergehenden, und verzehrten das für die Jungen beſtimmte Futter in der Regel ſelbſt, ſodaß die armen Jungen lange zu kurz gekommen waren, weshalb wir uns entſchloſſen, die Pflege und Auffütterung ſelbſt in die Hand zu nehmen. Mein Freund behielt drei von den Jungen und mir übergab er zwei. Dieſelben gediehen unter unſerer Fürſorge prächtig, beſonders da wir genügend friſche Ameiſenpuppen zur Verfügung hatten, und die jungen Männchen fingen bald zu dichten an. Ich hatte zwei Männchen, mein Freund ebenfalls und ein Weibchen. In etwa vierzehn Tagen nahmen ſie ihr Futter ſchon ſelbſt. Wir gewöhnten ſie nun auch gleich an Mehlwürmer, was beim Gelbſpötter keine ſchwierige Aufgabe iſt; er nimmt ſie ſo gierig an wie die Nachtigal, und Miſchfutter, welches natürlich zum größten Theil aus friſchen Ameiſenpuppen beſtand (der übrige Zuſatz beſtand aus einem Theil geriebener Möre und altbackener Semmel), mehr zu geben, wäre bei dieſer Art nicht angebracht, da der Spötter von vegetariſcher Nahrung nicht viel wiſſen will. Jedoch wäre es unangebracht, ihm nur Fleiſch oder fleiſchähnliche Beſtandtheile allein zu reichen. In der Gefangenſchaft iſt es ihm dienlicher, auch vegetariſche Koſt zu genießen. Der Gelbſpötter verſchmäht ſie auch nicht, läßt ſich aber nicht zwingen, dieſe allein zu nehmen, ſondern wie geſagt, nicht zu wenig, auch nicht zu viel. Als weitere Beimiſchung gaben wir dann ein Theil geriebenes, vorher abgekochtes Kalbs- oder Rinderherz, mit Zugabe von etwa einer Meſſerſpitze voll hartgekochtem Hühnerei, entweder auf dem Reibeiſen gerieben oder gehackt, auch ab und zu friſchen Quarkkäſe. Es war eine Freude, zu ſehen, wie ſich die Vögel entwickelten, ſodaß ſich mein Freund einmal mir gegenüber äußerte, „Jetzt haben wir gewonnen“, und meinte, als ſie auch im Geſang immer lauter wurden, „das gibt prächtige Sänger“, worauf ich ihn jedoch gleich dahin verwies, daß wir nicht eher triumphiren dürften, als bis der Winter vorüber ſei und unſere Pfleglinge die Mauſer überſtanden hätten. Eines Tags im Oktober meldete mir mein Freund den Tod eines ſeiner Spötter an, ohne vorher etwas Beſonderes an ihm bemerkt zu haben, nur ſagte er mir, daß ſeine Vögel des Nachts in ihrem Käfig ſehr tobten. Zu Ende des Monats hatte er alle drei eingebüßt. Ich konnte ihm jedoch von meinen Gelbſpöttern nur das beſte Wohlſein bekunden, obwol ſie nachts auch ſehr unruhig waren, ſodaß ich oft meinte, der Käfig müßte herunterfallen; dies war auch ſehr ſtörend, da ich ſie im Schlafzimmer hängen hatte. Ich konnte wenigſtens nicht ſchlafen, und glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, daß ſchon viele Vogelfreunde das Gleiche erfahren haben. Ich ließ nun einige Nächte hindurch die Lampe brennen und fütterte des Abends nochmals friſch, was dem Toben wol einigermaßen abhalf. Die Spötter begaben ſich immer nach Mitternacht zur Ruhe, doch kaum eingeſchlafen, war es, als ob der Böſe in ſie gefahren wäre, und das Toben und Flattern ging von neuem los. So bald es aber zu tagen anfing, waren meine Spötter ruhig und ſchliefen bis gegen Mittag. Dann ging es mit wahrem Heißhunger an den Futtertrog. Am Nachmittag ſchliefen ſie wieder, was leicht erklärlich iſt, denn ſie waren abgemattet genug, und am darauf folgenden Abend ging der Tanz auf's Neue los, ſodaß ich alſo über ihr Betragen nichts weniger als befriedigt war. Ich ſann nun einmal während einer ſo ſchlafloſen Nacht darüber nach, wie der Sache abzuhelfen ſei, und fand auch wirklich ein probates Mittel. Ich konſtruirte einen ſogenannten Schlafkäfig (wie ich mir denſelben zu nennen geſtatte), denn er war es in vollem Sinn des Wortes. Des Abends ſpazirten ſie ganz gemüthlich hinein, die Thür wurde geſchloſſen und die Spötter begaben ſich ſehr bald zur Ruhe, ſodaß ich höchſt befriedigt war über die zur Ausführung gebrachte Idee. Mein Freund wollte aber nichts mehr von Spöttern wiſſen; er meinte, das wären bei ihm die Erſten und die Letzten geweſen, er hätte genug davon. Ich hatte jedoch den Muth nicht ſinken laſſen, denn Geduld überwindet alles, beſonders bei der Vogelliebhaberei. Ich gab meinen Spöttern alles, was ich nur bieten konnte. Ich machte Jagd auf Fliegen und Spinnen, ſo viel ich nur Gelegenheit hatte, kurz geſagt, ich ließ es an nichts fehlen und ſcheute keine Mühe, um ſo viel als irgend möglich lebende Inſekten aller Art zu erlangen. Somit wurde es Weihnachten, und mein Freund erhielt noch immer keine Todesnachricht, auf die er vergebens gewartet hatte. Ich hatte jedoch Bange für die ſich immer mehr nähernde gefürchtete Mauſerzeit, und gewiß nicht mit Unrecht, denn der Monat Januar brachte mir, bzl. meinen Spöttern, ſchlimme Tage. Sie verſchmähten plötzlich alles dargereichte Futter, ſodaß ich mir nicht mehr zu helfen wußte. Nach den Mehlwürmern kamen ſie wol ab und zu, um dieſe von meiner Hand zu nehmen, wie ſie es gewohnt waren, doch ließen ſie dieſelben alsbald wieder fallen. Hin und wieder verſuchten ſie die Würmer zu verſchlucken, doch dabei blieb es auch, denn alsbald ſpieen ſie dieſelben wieder aus. Ich that mein möglichſtes und empfahl ſie dem guten Glück.

Nun ſtieß ich eines Tags bei einem Reviergang auf etwas, welches ich einer näheren Unterſuchung unterzog. Ich kam im Feld an einen großen Erdhaufen, welcher wahrſcheinlich zu Kompoſt Verwendung finden ſollte, und wühlte unwillkürlich mit meinem Stock darin herum, wobei mich mein Waldmann noch unterſtützte. Was kam da nicht alles Schönes und Gutes zum Vorſchein! Ich fand die Larven des Junibrachkäfers, welche zu vielen Hunderten in lauter fetten Exemplaren aus kleinen, ihrer Körperſtärke entſprechenden Röhren herauspurzelten. Welch' eine Wonne für mich, und welch' ein Genuß für meine armen gepeinigten Spötter! Ich hätte vor lauter Freude gleich ſelbſt von dieſen appetitlich weiß ausſehenden Würſtchen koſten mögen, mein Waldmann hatte ſie ohnehin ſchon verſucht, und ſie ſchienen ihm nicht übel zu munden. Ich füllte mir nun eine größere Blechbüchſe voll (dieſe trage ich auf jedem Gang bei mir, um einen gelegentlichen Fang zu bergen). Dann machte ich ſofort Kehrt und ging nach Haus, um meinen Spöttern die neuentdeckten Leckerbiſſen zu präſentiren, und (welche Wonne!) ſie ließen keinen auf den Boden fallen, wie ſie es mit den Mehlwürmern thaten, ſondern ließen etwa zehn Stück hintereinander in ihrem Magen verſchwinden. Hatten ſie einen beim Aufſtauchen auf dem Sprungholz zum Zweck des Abtötens verletzt, ſodaß der dem Inhalt der friſchen Ameiſenpuppen ähnliche weiße Saft mit ihrer Zunge direkt in Berührung kam, ſo kannte ihr Appetit nach weiteren keine Grenzen mehr. Wol 40 bis 50 Stück verzehrte jeder von ihnen am Tag, ſodaß ich ſchon beſorgt wurde, woher ich die vielen Brachkäferlarven nehmen ſollte, wenn dieſe Quelle einmal erſchöpft ſei; auch fürchtete ich, ſie könnten des Guten zu viel thun. Doch meine Beſorgniß war unbegründet, denn ich fand das Gegentheil in ihrem Befinden, ſie wurden mit jedem Tag munterer und fröhlicher. Ich ſuchte nun beim Beſitzer des betreffenden Grundſtücks um die Erlaubniß nach, den Erdhaufen ganz herumſchaufeln zu dürfen, was mir auch gern geſtattet wurde. Ich nahm einige Knaben, mit Schaufeln und Hacken ausgerüſtet, mit mir, und nun ging es an die Arbeit, dieſen ſo köſtlichen Schatz zu graben. Ich geſtehe offen, daß ich mir eine ſo große Menge Käferlarven nicht gedacht hätte, wie wir ſie zu Tage förderten. Ich brachte dieſelben nun in einer großen Kiſte, in welche ich immer eine Lage Erde und darauf eine Lage Käferlarven that, unter, bis die Kiſte voll war. Dann ließ ich dieſelbe nach Hauſe ſchaffen, und ſtellte ſie in den Keller, wo ich ihr dann jeden Tag ſoviel als nöthig entnehmen konnte. Ich behaupte heute noch, daß ich meine Spötter durch dieſes Futter zur Mauſer brachte, denn bald darauf ſtellte ſich dieſelbe ein, und verlief ohne weitere Störung, ſodaß ich nach Schluß derſelben zwei prächtige Vögel hatte. Fern von Selbſtſucht, gab ich meinem lieben wankelmüthigen Freund wieder einen hiervon zurück, ſodaß auch ſeine Mühe nicht ganz umſonſt war. Die Vögel ſangen ſehr fleißig und leidlich gut, trotzdem ſie keine Vorſchläger hatten, außer unſeren Dorngrasmücken und Rothkehlchen. Mein Spötter wurde ſo zahm und zutraulich, daß ich ihn zu jeder Stunde der Nacht auf den Tiſch zum Licht ſtellen durfte, wo er mir ihm dargereichte Leckerbiſſen aus der Hand nahm, dabei herumtanzte wie ein Diſtelfink und mit einer Grazie, als ſtünde ſeine Herzauserwählte vor ihm. Er verſtand meine Worte und ſang auf Geheiß. War ich ausgegangen und kam wieder nach Haus zurück — gleichviel zu welcher Stunde — ſobald ich das Zimmer betrat, lockte er mir zu mit ſeinem kräftigen tack-tack. Das war anders als in den Tagen der Trübſal, wo es den ganzen Tag über hieß: tſchäckerä, tſchäckerä, und ſie bettelnd und kläglich am Käfiggitter hin- und herhüpften. Das Gefieder erhielten ſie wunderſchön, ſodaß zwiſchen ihnen und einem Wildfang kein Unterſchied war. Im darauf folgenden Herbſt brachte ich meinen Gelbſpötter jeden Abend in ſeinen Schlafkäfig, ſomit hat er ſich nie mehr abgeſtoßen. Mögen nun alle Freunde und Liebhaber des Gartenlaubvogels gleiches Glück damit haben, und im Fall der Noth daſſelbe gute, oder ein ähnliches Futter entdecken. Vor allem nicht die Geduld in ſchwierigen Fällen verlieren!

Der goldſtirnige Blattvogel und die Dayaldroſſel.

(Schluß).

Die ſeit altersher bekannte Dayaldroſſel (Copsychus saularis, *L.*) iſt ein recht hübſcher, anmuthiger Vogel. Der Kopf und die ganze übrige Oberſeite nebſt Hals und Bruſt ſind tiefſchwarz, lebhaft blau glänzend; die Flügel ſind ſchwarz, aber ohne Glanz, und haben eine weiße Längsbinde. Die vier äußeren Schwanzfedern ſind jederſeits weiß, die übrigen ſchwarz. Auch der ganze Unterkörper iſt weiß. Der Schnabel und die Füße ſind ſchwarz und die Augen dunkelbraun. In der Größe ſteht ſie unſeren europäiſchen Droſſeln gleich. Das Weibchen iſt am Oberkörper gleichfalls ſchwarz, aber matt, nicht glänzend, am Unterkörper dagegen grau, mit fahl roſtröthlichen Seiten, und nur der Bauch und die unterſeitigen Schwanzdecken ſind weiß.

Die Dayaldroſſel hat eine außerordentlich weite Verbreitung, denn ſie kommt in ganz Indien bis auf Ceylon vor, ferner in Südchina, auf den Philippinen, ſowie auch auf Java und Sumatra.

Ueber ihren Geſang haben nur wenig Naturfreunde berichtet, und dieſe ſind auch noch verſchiedener Meinung. Nach Jerdon's Urtheil iſt ihr Geſang ſehr angenehm, bleibt jedoch an Fülle und Wohlklang hinter dem der Schamadroſſel zurück. Hodgſon dagegen meint, daß nur wenige Droſſeln einen ſchönern Geſang haben als dieſe, zumal derſelbe nicht durch nachgeahmte fremde Laute entſtellt werde. Père David, der ſie in China beobachtet hat, ſagt: „Vom frühen Morgen an läßt ſie einen ziemlich angenehmen Geſang hören, der aus pfeifenden Lauten beſteht.“ Layard und Kelaart hinwiederum bezeichnen den Geſang dieſer und auch einer verwandten Art als ſo vorzüglich, daß er einen Vergleich mit dem der berühmteſten europäiſchen Vögel, ja ſelbſt mit der Nachtigal, wohl beſtehen könne. Nähere Angaben über den Geſang dieſes Vogels macht Dr. H. A. Bernſtein von Java her: „Sie macht ſich durch ihren einfachen, aber angenehm flötenden Geſang, den ſie beſonders bei Anbruch des Tages fleißig hören läßt, überall bemerkbar und beliebt. Dieſer Geſang beſteht eigentlich nur aus einer einzigen Strofe, die wie „wüht, wüht, wüüht, tü, tütütütü“ klingt und mit unbedeutenden Abänderungen mehrmals nacheinander wiederholt wird.

Aeußerungen über den Geſang der Dayaldroſſel liegen alſo nur von Forſchern vor, die den Vogel im Freileben, in ſeiner Heimat beobachtet und gehört haben. Liebhaber dagegen haben noch nichts Näheres über den Werth dieſer Droſſel als Sängerin mitgetheilt, mit Ausnahme des Herrn E. Baumann, der unlängſt ſchrieb, daß ſeine Dayaldroſſel ſich als netter und liebenswürdiger Vogel mit hübſchem Geſang zeige und einen laut flötenden Ruf: „Hui, hui ti tu tio tio, habita ti tu tio tio“ hören laſſe. Der Warnungsruf ſei kaum von dem des rothköpfigen Würgers zu unterſcheiden.

Die Nahrung der Dayaldroſſel beſteht aus allerlei Kerbthieren: Käfern, Ameiſen, Grashüpfern, Schmetterlingen und deren Raupen, auch Würmern u. drgl., im Winter aus unreifen Wicken, nicht aber aus harten Sämereien. In der Gefangenſchaft füttert man ſie wie die Schamadroſſel.

Briefliche Mittheilungen.

... Angeregt durch Ihre hochgeſchätzten Schriften machte ich einen Niſtverſuch mit **Graupapageien** (Jakos). Als Niſtplatz habe ich einen Abſchlag in meiner Vogelſtube hergerichtet und mit einem Niſtkaſten ausgeſtattet. Etwa drei Wochen nach dem Einſetzen der Vögel fingen dieſe an, das Neſt aus Torfmull und Sägemehl herzurichten. Einige Tage darauf bemerkte ich die erſten Begattungsverſuche, und das Weibchen beſuchte oft am Tage und des Nachts immer den Niſtkaſten. Vorgeſtern ſah ich jedoch den Vogel an Legenoth ſchwer erkrankt am Boden des Niſtraumes ſitzen. Nach mehrfachem Bemühen, das Ei, welches keine harte Schale hatte, zu entfernen, nahm ich die Hülfe eines Thierarztes in Anſpruch. Dieſem gelang es, das Ei im Vogel zu öffnen, ſodaß der Inhalt abging. Der Vogel war nach kurzer Zeit vollſtändig wieder hergeſtellt.

... (Etwas ſpäter). Das Weibchen, welches ich nach der bereits mitgetheilten Legenoth ſogleich wieder zu dem Männchen ſetzte — weil ich keinen beſſeren Pfleger für das ſehr ermattete Thier hatte finden können —, legte einige Tage nachher ein zweites und darnach ein drittes Ei. Dieſe hatten jedoch eine ſo dünne Kalkſchale, daß ſie ſich bei dem geringſten Druck eindrückten. Ich nahm dieſe Eier fort und der Vogel hat 4 Wochen lang im leeren Neſte gebrütet. Nach Ablauf dieſer Zeit bemerkte ich wieder Liebesſpiele und Begattung und am 21. Mai wurde wieder das erſte Ei gelegt, welchem am 24. und 27. zwei weitere folgten. Dieſe drei Eier ſind vollkommen ausgebildet und mit ſtarker Schale verſehen. Das Weibchen hat ſeit dem Legen des dritten Eies das Neſt nicht mehr verlaſſen und wird vom Männchen gefüttert, was auch in der erſten Brutperiode geſchah. Um dem Legen ſchalenloſer Eier vorzubeugen, habe ich Weißbrot angefeuchtet und mit pulveriſirter Eierſchale beſtreut. Auf dieſe Weiſe war es möglich, den Kalk in die Vögel zu bekommen. Ein Verſuch, an den Niſtkaſten zu kommen, iſt nur mit der größten Todesverachtung möglich, weil das Neſt von den beiden auf die nachdrücklichſte Art vertheidigt wird. Ich hoffe, daß diesmal alles gut gehen wird und werde mir dann geſtatten, Ihnen weitere Nachricht zu geben.*)

Frau **Lotze**.

... Meiner kleinen Vogelſammlung geht es gut; nur mußte ich ſie ſieben Wochen aus meiner Pflege geben. Meine Frau und ich haben uns in Italien herumgetrieben. Für unſere Liebhaberei war dort wenig zu holen. In Marſeille waren bei einigen Händlern Dolchſtichtauben, Nikobartauben, rothbäckige Bülbüls, ebenſo in Genua, wo wir einige Loris von den blauen Bergen ſahen. In San Remo bot ein Händler auf der Promenade ein Pärchen rother Loris an, das recht elend ausſah. Eingekäfigt ſah ich neben Kanarienvogel, Zeiſig, Stiglitz, des Oeſteren die Kalanderlerche.

In meiner Vogelſtube fliegen frei ein Pärchen rothköpfige Gould's Amandinen (Spermestes mirabilis, *Hmbr. et Jacq.*), die brüten, ferner ein Pärchen eigentliche Papageiamandinen, drei Pärchen rothrückige Elſterchen (Spermestes rufodorsalis, *Ptrs.*), ein Pärchen Zwergelſtern (Sp. nana, *Puch.*), ein Pärchen Grauedelfinken (Fringilla musica, *Vll.*), ein Pärchen Maskengrasfinken, ein Pärchen ſpitzſchwänzige Grasfinken (mit rothen Schnäbeln), ein Pärchen Trauerzeiſige (Fringilla tristis, *L.*), ein Pärchen Wellenſittiche, die in erſter Brut ſieben Junge brachten, ein Pärchen kurzſchwänzige Widafinken (Vidua axillaris, *Smth.*). Leider iſt ein Junges von letzteren vom vorigen Jahr irrthümlich in die Stube gelaſſen, während die beiden anderen im Käfig ſitzen. Ob es Weibchen ſind? Keines hat ſich bis jetzt verfärbt. Ferner fliegen frei umher ein Pärchen gelbbrüſtige Bayaweber, ein Männchen Maskenweber (Ploceus luteolus, *Lchtst.*). Der Vogel iſt ſehr ſchön geworden, nur ſchade, es fehlt das Weibchen.

---

*) Wir bitten ſehr darum. D. L.

Ein Männchen Buntaſtrild (Aegintha melba, *L.*) hatte ich im Käfig mit einem Weibchen Wiener's Aſtrild (A. Wieneri, *Rss.*) zuſammengeſetzt. Die Vögel haben in der Stube unter Hirſeſtengeln ein ſchönes Neſt gebaut und brüten fleißig. Hoffentlich kann ich Ihnen ſ. Z. einen Erfolg melden. Ein anderes Weibchen Wiener's Aſtrild parte ſich mit einem Männchen Aurora-Aſtrild ohne Erfolg. Ein ſchönes Pärchen Sonnenaſtrilde ſcheint jetzt auch zur Brut ſchreiten zu wollen. Zu einem Männchen Diamanttaube kann ich kein Weibchen erhalten.

Apotheker **Nagel**.

... Meine Schwalben haben jetzt ihr Neſt beendigt; daſſelbe iſt ſehr ſchön aus Thon und Agavefaſern hergeſtellt und mit Pferdeharen ausgepolſtert. Hoffentlich beginnen ſie nun mit dem Brutgeſchäft.

Frau R. **Siegmund**.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Fabrikbeſitzer **Eduard Görres**: Als Päppelfutter geben Sie den jungen Nachtigalen feingehacktes rohes Fleiſch, friſche Ameiſenpuppen, Käſequark zu gleichem Theil und möglichſt viel Mehlwürmer. Späterhin gewöhnen Sie ſie an getrocknete Ameiſenpuppen nebſt Mehlwürmern oder an ein Futtergemiſch, das aus getrockneten Ameiſenpuppen, zwei Theile, geriebnem Hühnerei, geriebner Semmel und geriebner Möre. je ein Theil, beſteht. In der Geſangszeit erhalten die Nachtigalen reichlich friſche Ameiſenpuppen und drei bis ſechs Stück, ja bis zehn Mehlwürmer täglich. Den Zaunkönigen geben Sie zunächſt nur friſche Ameiſenpuppen, zerſchnittene kleine Mehlwürmer u. a. kleine, weiche Kerbthiere, wie Blattläuſe, Spinnen u. a. Dann bekommen ſie geriebenes Ei, desgl. Herz und Eierbrot, nebſt zerquetſchtem Hanf und Mohn, alles gemiſcht. Als Leckereien reichen Sie weiche innere Feige, fein zerſchnitten, höchſtens ſechs nicht zu große Mehlwürmer täglich, friſche Ameiſenpuppen, allerlei kleine Kerbthiere und deren Bruten.

Herrn **Max Schluſche**: 1. Füttern Sie Ihre Nachtigal jetzt nur reichlich mit friſchen Ameiſenpuppen und geben Sie ihr 3 bis 6 Stück, ja bis 10 Mehlwürmer täglich, aber nicht mehr. Das Univerſalfutter laſſen Sie vorläufig ganz fort. 2. Ihrem Stiglitz iſt der gekochte Hanfſamen nicht gut bekommen. Hanfſamen muß man überhaupt nicht kochen. Um ihn für die kleineren Vögel zugänglich zu machen, muß man ihn zerquetſchen. Geben Sie dem Stiglitz jetzt, um ihn wieder zu Kräften kommen zu laſſen, friſche oder getrocknete angequellte Ameiſenpuppen, geriebenes Eierbrot oder Ei mit geriebener Semmel und Möre zum krümeligen Gemenge vermiſcht. Dies Gemiſch beſtreuen Sie mit Salatſamen und einigen Mehlwürmern, die aber klein zerſchnitten ſein müſſen. Nach 1 bis 2 Tagen mengen Sie unter das Miſchfutter gequetſchten Hanfſamen. Wenn der Vogel ſich erholt hat,, kehren Sie allmählich wieder zu der von Ihnen angegebenen Fütterung zurück; doch müſſen Sie als Leckerei hin und wieder etwas Kletten- und Diſtelſamen hinzufügen und etwas Salatblättchen reichen. 3. Je ein Par Napoleon- und Orangeweber können Sie in der Voliere von angegebener Größe halten und zur Brut kommen laſſen. 4. Ihr Kiſtenkäfig iſt für Prachtfinken gut geeignet, doch mehr als ein Pärchen können Sie nicht hineinſetzen, wenn Sie Zuchterfolge haben wollen. Wellen- und Pflaumenkopfſittiche können im Kiſtenkäfig nicht gehalten werden, da ſie das Holz deſſelben vollſtändig zernagen.

Herrn **Ludwig Laboda**: 1. Aus dem Neſt genommene Amſeln und Singdroſſeln können den vollen ſchönen Geſang ihrer Art nur durch einen Vorſänger lernen. 2. Die jungen Amſelmännchen ſind ſchon im Neſt an der dunkleren Färbung des Oberkörpers von den Weibchen zu unterſcheiden und die jungen Singdroſſeln ſind im Neſtkleid oberſeits mehr orangegelb angehaucht als die jungen Weibchen; allerdings nur der Blick des Kenners vermag ſicher einen Unterſchied zu finden. 3. Die genannten Vögel können Sie auch ohne friſche Ameiſenpuppen erhalten, aber Sie müſſen unter das Univerſalfutter trockene angequellte miſchen. 4. Das Capelle'ſche Univerſalfutter iſt ſehr gut.

Herrn **Adolf Büchner**: 1. Gould's Amandinen verlieren in der Gefangenſchaft nicht ihr prachtvolles Gefieder. Die feurigen Farben kehren nach der Mauſer, in der ſich Ihre Vögel befinden, wieder. 2. Dieſe zarten Vögel können Sie nicht in der Gartenvoliere halten. 3. Allerdings iſt zu befürchten, daß die Glanzſtare und Weber ſelbſt die genannten Finken und der Stiglitz die Bruten der übrigen Vögel ſtören. Das Zuſammenhalten aller dieſer verſchiedenen Vögel macht viel Freude, doch darf man auf Züchtungserfolge nicht mit Sicherheit rechnen.

Mancherlei.

Der Ornithologe Th. Salvadori hat neuerdings entdeckt, daß der in dieſer Nummer beſchriebene Petz' Sittich nicht Conurus Petzi heißen müſſe, ſondern daß ihn Linné urſprünglich unter dem Namen Conurus canicularis beſchrieben habe. Infolgedeſſen prangt dieſer Name bereits in neu erſchienenen ornithologiſchen Werken, und wird vielleicht auch in den zoologiſchen Gärten und dann bald von den Großhändlern angewandt werden. Wir machen daher die Leſer darauf aufmerkſam, für den Fall, daß ein Conurus canicularis im Handel auftaucht. Dies iſt um ſo nöthiger, als die Händler ja auch einen andern deutſchen Namen gebrauchen, und den Vogel Elfenbeinſittich nennen. K. R.

Berichtigung.

Zeile 19 in der brieflichen Mittheilung von Frau Siegmund in Nr. 23 muß es heißen: „Der Federkiel muß etwa **8 mm** weit über den Stumpf hinaufgezogen werden", nicht 6 mm.

Zu unſerm Bilde.

Unſer Bild zeigt Weibchen, Neſt, Ei und Junges des in Deutſchland eigentlich nirgends fehlenden grauen Fliegenſchnäppers (Muscicapa grisola, *L.*). Das Weibchen iſt auf dem Rücken und Bauch trüber gefärbt als das Männchen.

Es kommt zuweilen vor, daß dieſe Vögel zwei Bruten machen, die erſte im Mai, die zweite Anfang Juli. Gewöhnlich aber niſten ſie Anfang Juni.

Man findet das Neſt in Laubholzwäldern, an ſchattigen Stellen, namentlich in der Nähe vom Waſſer; auch in Obſtgärten. Beſonders gern ſiedelt er ſich auf dem Kopf der Weide an, in Baumhöhlen, auf kurzen alten Aeſten, auf Zweigen dicht am Schaft des Stammes. Auch Balkenköpfe, Lauben, Zäune, Geländer, Mauerlöcher bieten ihm Niſtplätze. Selbſt Niſtkäſten bezieht er, wie er überhaupt die Nähe der Menſchen ſucht. Für das Neſt, deſſen Höhe verſchieden iſt, — etwa 2 bis 6 m vom Boden entfernt — benutzt der Vogel Mos und feine Wurzeln, die er, nicht ohne Kunſt, mit Flechten, Halmen und Baumbaſt zuſammenfügt und mit Federn, Haren und Wolle ausfüttert. In dem gewöhnlich grünlichen und bräunlichen Neſte findet man Anfang Juni das Gelege: vier bis fünf Eier, lichtgraugrün und gelblichroth, gefleckt mit violetten Punkten und Strichen, häufig mit einem Fleckenkranz am dicken Ende. Die Eier ſind in der Regel 18 mm lang und 13 mm dick. Das Brüten beſorgen Weibchen und Männchen; dieſes jedoch nur in der Mittagszeit, um das Weibchen abzulöſen. Die Jungen ſind auf der oberen Seite ſilbergrau, dunkelbraun geſchuppt und weiß getropft; ihre Bruſt zeigt matte Streifen.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

C. L. Flemming

Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1120]



Man verlange Preisliste.

Man verlange Preisliste.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei.
R. Schröter (vorm. G. A. Dietrich, Hoflief.), **Elingen** bei **Greußen.** [1121]

Neu! Senſationell!

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184. **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [1122] **Edmund Schiewick, Zittau, Sachſen.**
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1123]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Vogelkäfige
aller Art.
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in **praktiſcher** Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1124]
☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Futtermittel.

Mehlwürmer

zum Tagespreiſe bei [1125]
Theodor Frank, Barmen.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.
Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 8 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ
Weißwurm, 98er hochprima, à Ko. 4½, à Ltr. 1 ℳ.
Muſka, hochf. 98er, à Ko. 3, 5 Ko. 14 ℳ.
Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 5, à Ko. 9.
Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.
Biscuit u. Eierbrot, beſt. Qualit. à Ko. 3.
Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.
Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,80
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,20
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,—
do. algeriſche	„ „ „ „	2.
do. indiſche	„ „ „ „	1.75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	5,—

Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [1126]
Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—
Ausführl. Preisliſten ſämmtl. Vogelfutterarten gratis und poſtfrei.
J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit I. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [1127]
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Friſche Ameiſeneier,

ſaubere helle Ware, à Liter 1 ℳ, 10 Liter 9 ℳ gegen Nachnahme. [1128]
J. Nullmeyer, Vogelhandl., **Mannheim.**

Alle Vogelfutter,

Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.
E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche. Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1129

Frische Ameiseneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt der einzige Erſatz: **Zecke** mit heißem Waſſer übergoſſen und dann ausgedrückt. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zecke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Drogerien. Man verlange Zecke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1130]
Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1131] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
☞ Muſter und Proſpekte koſtenlos. ☜

Lager von Ameiſeneiern.

Direkter Import bei
[1132] **H. Drefalt, Lübeck.**

Friſche Ameiſeneier,

à Liter 1 ℳ incluſive Verpackung, täglich friſch, empfiehlt [1133]
Elise Elias, Burg b. Magdeb.

Friſche Ameiſeneier, à Liter 1 ℳ, 99er getr., à Ltr. 1,20, jeden Poſten. ff. Weichfreſſer vorräthig u. empf. [1134]
A. Seyfert, Magdebg.-Neuſt., Morgenſtr. 4.

Vögel.

Empfehlen garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende

☞ **Sproſſer** ☜

à Stck. 9—12 ℳ. [1135]

Wachtelhähne,

à Stück 1,50 ℳ, 6 Stück 7 ℳ, ſowie

Nachtigalen

4—6 ℳ und alle Arten

☞ **Grasmücken** ☜

unter Garantie lebender Ankunft. Preisliſte gratis.

Prima friſche Ameiſeneier

und 99er getrocknete, à Liter 1 ℳ.
Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft,
Hoffstetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Schamadroſſeln

in vollem Geſang
☞ **Dayaldroſſeln,** ☜
Goldſtirn. Blattvögel,
Nymphenſittiche, Gebirgsloris
hat abzugeben
August Fockelmann
Thierhandlung [1136]
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Geſucht: 2 ♀ Elſterchen, 1 ♀ Rieſenelſter, 1 ♀ Gürtelgrasfink, ♂ u. ♀ blauk. Pap.-Am. **Blume.**
[1137] Großeutersdorf (Kahla).

Seltenheiten! Schwarzſpecht, futterfeſt, à 15 ℳ. **weiße Dohle,** futterfeſt, à 20 ℳ. [1138]
Hesse, Berlin, Schleiermacherſtr. 10.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfresser,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutensilien,
alles ganz aus Metall, in sehr solider, zweckmäßiger Weise hergestellt, empfiehlt zu sehr billigen Preisen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1139]

Kanarien-Vorsänger!

Vorzügliche tieftourenreichste, noch nie zur Zucht benutzt und flott durchsingend, nach Gesangsgüte à 12, 15, 20, 25 und 30 ℳ, noch in großartiger Auswahl da. Versandt überallhin gegen Vorherkasse oder Nachnahme mit voller Garantie für Werth, Gesundheit und Probezeit.

[1140] **Julius Häger,**
St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864.
Höchste Ehrenprämien. Tausende Dankschreiben.

Zaunkönige,

Baumläufer, Rohrsänger, Bachstelzen, Baumpieper, Grasmücken, Würger, Kappen-, Braunkopf- u. Gartenammern, Stück 3 ℳ, Blaukehlchen, Hausrothschwänze, Stück 4 ℳ, Rothkehlchen, Gartenrothschwänze, Fliegenschnäpper, Lerchen, Stück 2 ℳ, Rohr- und Goldammern, Buch- u. Grünfinken, Zeisige, Stiglitze, Stück 1,50 ℳ, Kalanderlerche 8 ℳ, kleiner Buntspecht (picus minor) 10 ℳ, sowie alle Seltenheiten liefert prompt

W. Hiltmann's zoologische Handlung,
Berlin S., Dresdenerstr. 23. [1141]

Zu kaufen gesucht:

Weibchen Singsittich, möglichst gezüchtet.

[1142] **Brummund,**
Cöslin, Schulstraße 12.

Nur für Liebhaber.

Habe nachsteh. in voll. Gesang befindl., bereits 1 Jahr gekäfigte prima **Gebirgsvögel** abzugeben: Amsel 5 ℳ, Schwarzplättchen, Ueberschl., 5 ℳ, Rothkehlchen, Wpfst., 2 ℳ, Wachtel, sehr zahm u. laut schlagend, 3 ℳ, Heidelerche 4 ℳ. Bei Abn. aller Verp. frei, einzeln 50 ₰. Auch Tausch auf prima Steinröthel. [1143]

A. Olszewski, Uoderhli, Galizien.

PariserTrompeter

0,4 gelb oder grün, hochgestellt, gut in Federn, zu kaufen gesucht.

Gefl. Offerten mit genauer Beschreibung und Preisangabe erbittet

[1144] **Alfred Zuntz,**
Frankfurt a. M., 31 gr. Eschenheimerstr.

Umstandshalber billig:

1 Schwarzamsel m. laut. tourr. Waldgesang 6 ℳ, **1 ff. Schwarzplättchen** 6 ℳ, beide gut überwint. Vögel. Verp. frei.

[1145] **Hähnel,**
Chemnitz, Salzstraße 5.

Umständehalber verkaufe ich:

1 laut pfeifendes **Rothkehlchen,** 1 desgl. **Rothschwänzchen** à 2 ℳ, 1 prachtvoll singende **Grasmücke** 3 ℳ, 1 schlagende **Nachtigal** 6 ℳ, 1,1 grüne, 1,1 gelbe und 1,1 rothe **Kreuzschnäbel** à Par 1,50 (Männchen herrliche, fleißige Sänger), 1,1 grüne **Zeisige** 1,75, **1,1 Hänflinge** 1,75, **1,1 Bergfinken** 1,50; ferner 1,1 weiße **Mövchen** 4, **1,1 Zebrafinken** 5, **1,1 Nonnen** 2 ℳ, alle drei erprobte Zuchtpare.

W. Hinz,
[1146] Bankbeamter, **Berlin,** Yorkstr. 46.

Verkaufe:

1 ff. Amsel für 10 ℳ, 1 ff. Schwarzplatte für 8 ℳ, 1 ff. Grasmücke für 8 ℳ, 2 ff. Rothkehlchen, à Stück 5 ℳ. Die Vögel pfeifen schön und laut und sind das Doppelte werth; tausche auch auf Herrenstoff. [1147]

Aron Richter, Eibenstock i. S.

1898 erhielt mein Stamm Harzer Kanarienvögel 1. Staatspreis, 3 gold., 1 gr. silb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.
Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [1148

[1149]

Gesucht:

Granatastrilde, Buntastrilde, dreifarbige Papageiamandinen u. seltene ausländ. Finken.
J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.).

ff. Harzer Kanarien-Vögel,

Hohl- u. Knorr-Vögel, sowie Klingel- u. Schaukel-Roller ohne Fehler 15, 20 u. 25 ℳ, geb. dieselb. 14 Tage a. Probe, jedoch p. Nachn. od. Betrg. vorher, nicht gefall. Vögel tausche um od. zahle zurück. Preisliste frei. [1150]

L. G. Müller, Vogelzüchterei, Nordhausen a. H.

NB. Junge von diesem Jahr à Stck. 5 ℳ, 6 Stck. 25 ℳ, 12 Stck. 48 ℳ, frei dort.

Schamadrossel,

großartiger Sänger, tadellos im Gefieder, hat 2 mal bei mir gemausert, frißt aus der Hand, freifliegend in der Vogelstube, durchaus friedlich, für 45 ℳ zu verkaufen.

Ferner **rother Kardinal,** ebenfalls vorzüglicher Sänger, 2 Jahre hier, selten schönes Gefieder, 8,50 ℳ. [1151]

Overhamm, Apotheker,
Werden (Ruhr).

Ausgezeichnete Harzer Kanariensänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1152]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferstr. 16.

Wachteln,

nur Hähne, gute Schläger, Dtzd. 7,50 ℳ, **Nachtigalen,** St. 2 ℳ. Garantie für Männchen und lebende Ankunft. [1153]

N. Muschnn, Temesvar, Ungarn.

Harzer Kanarienvögel,

Hohlroller-Stamm, diesjährige Hähne, à 5 ℳ, Dtz. 48 ℳ, Weibchen à 80 ₰, Dtz. 8 ℳ. Garantie für Hähne und leb. Ankunft.

Wilhelm Kaye,
[1154] Thale (Harz).

Rothe u. gelbe Kreuzschnäbel

versende 6 Stück 4 ℳ, Dutzend 6 ℳ. Tausche auch auf frische Ameiseneier, Sprosser, Schwarzblättchen, Nachtigalen u. Käfige.

A. Jaumann,
[1155] **Großbreitenbach,** Thür.

Steinkauz

5 ℳ, weiße Dohlen 15 ℳ, Bartmeisen P. 6 ℳ, Lachtauben P. 1,20, weiße P. 3 ℳ. Mehlwürmer Liter 4 ℳ, Grottenolme à 4 ℳ, alle Arten Schlangen und Eidechsen liefert [1156]
G. Findeis, Wien I, Wollzeile 25.

Verk.: 1 Finken, Thür. Doppelschlg., 2jähr., 10 ℳ, 1 ff. Schwarzblättchen, Ueberschläg., 8 ℳ u. einige Mittelvögel à 3.50 ℳ.
[1157] **O. Reichel,** Tierdepot, **Ruhla** i. Th.

2

Prachtv. **Amazone** (grüner Papagei), schön im Gef., taubenz., selten gelehr. Vogel, spricht Lora, wacker Lora, 1, 2, 3, Hurra, Papa, Mutter, herein, Zuckerjung, guten Morgen, au au, pfeift den Hund, Narro, Narro, lacht, weint u. singt d. Auf v. tüh tüh lüt lüt lüt, nur 40 ℳ. Gar. für leb. Ank. **H. Rath,**
[1158] **Hamburg,** Neue Rosenstr. 45.

Suche mit Singsittichzüchter in Verbindung z. tret. behufs Austausch junger Singsittiche. [1159]
Goldbeck, Prdgr., Liebstadt, Ostpr.

Zeis.-H., Dtzd. 5 ℳ, dito Weibchen 1,20 ℳ, **Kreuzschnäbel,** Dtzd. 5 ℳ.
[1160] **G. Schubert, Ziegenhals.**

Vogelkatze,

2 Jahre alt, bei Vögel aufgezogen, wegen Umzug für 25 ℳ zu verkaufen.

Aug. Meyer, Vogelhandlung,
[1161] **Straßburg i. E.**

Geflügel.

Ein Ehepar, das selbstthätig eine große Geflügelhaltung besorgt, die mit künstlicher Brüterei u. Käfigaufzucht der jungen Küken, nachweislich mit besten Resultaten, verbunden ist, in ungekündigter Stellung, sucht vom 1. Oktober ab oder später andere gleiche Stellung. [1162]

Gefl. Offerten erbeten unter **S. postlagernd Glogau,** Schlesien.

Der Deutsche Geflügelhof

Abonnement vierteljährlich 75 Pfg.

Inserate: die einspaltige Zeile 15 Pfg.

Amtliches Organ des Sonderausschusses für Geflügelzucht der Landw. Kammer für die Prov. Brandenburg und der demselben angeschlossenen Vereine.

Redaction:
Bruno Dürigen, Charlottenburg.

Der „Deutsche Geflügelhof“ bringt alles Wissenswerthe auf dem Gebiete der landw. Nutzgeflügelzucht, sowie rationellen Tauben- und Kaninchenzucht, auf den Sport dabei gebührend Rücksicht nehmend, belehrende Artikel für den Anfänger, Beschreibungen und Abbildungen.

Probenummern kostenlos durch die Geschäftsstelle
Otto Koobs Verlagsanstalt,
Forst i. L.

Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von August Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 26.

Mittheilungen aus Centralamerika (Fortſetzung).
Die Kukuke.
Die Lerchen und deren Haltung und Pflege in Gefangenſchaft.
Aus meiner Vogelſtube.
An die Leier.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechſel.
Zu unſerm Bilde.

[illegible]
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
[illegible]

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

[1163] **99er Ameiſeneier,**

friſch getrockn., allerfeinſte, reinſte deutſche Ware, Lt. 90 ₰, 10 Lt. frco., do. 98er gute Ware, Lt. 65 ₰, Ko. 2,60 ℳ. Pa. friſche, nicht blau werdende Ameiſeneier, Lt. 1,50 ℳ, Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahren ſelbſt erprobt, Ko. 2 ℳ, 3 Ko. frco., ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- und Prachtfink. u. Waldvögel, Kanarien, 5 Ko 2,50 mit Sack. Prompte, gewiſſenhafte Bedienung.

Bitte beachten Sie meine Vogelofferte in Nr. 25 letzte Seite, alles noch vorhanden.

Neu hinzugekommen:

Grauköpf. Zwergpapageien,	Zchtp.	4,50 ℳ
Madagaskarweber,	in Pracht,	4,50 „
Grüne Kardinäle,	Männch.,	14.— „
„ „	Weibchen,	7.— „

ferner beſitze ich den in Nr. 25 ausführlich beſchriebenen

Petz' Keilſchwanzſittich

(Conurus canicularis) in einigen, ganz fingerzahmen, wirklich ſchönen Exemplaren à Stück 12 ℳ, Par 23 ℳ.

Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. G. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1164]

C. L. Flemming

Holzwaarenfabrik
Globenſtein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1165]

Man verlange Preisliste.



Man verlange Preisliste.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpakete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1.50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1166]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

☞ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1167]

---

50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
☞ **Knochenmühlen** ☜
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,**
[1168] Waren i. Mecklenb.
▬ Proſpekte gratis. ▬

Käfige jeder Art

(Preisliſte gratis) fabrizirt und empfiehlt preiswerth

Arthur Herrmann & Cie.,
[1169] **Oſchatz** i. S.

Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Netzfallen,** kleine 80 ₰, größ. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ, **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [1170]
Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112.
Illuſtrirte Preisliſte gratis.

Nistkästen für inſektenfreſſ. Vögel billigſt. Preisliſte gratis.
[1171] **R. Schröter, Clingen-Greußen.**



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in **praktiſcher** Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1172]
☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Neu! **Senſationell!**

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrüſten für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G.-M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt
[1173] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1174]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Futtermittel.

▬ Universalfutter ▬

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [1175]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutter ab m. Dampfbetr.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen

Nr. 26. Magdeburg, den 29. Juni 1899. XXVIII. Jahrg.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Der Tovi-Schmalſchnabelſittich (Psittacus tovi, *Gm.*).

Urſprünglich war meine Abſicht, den Toviſittich in Gemeinſchaft mit dem Petzſittich zu behandeln, da er mit demſelben vieles gemein hat. Bei genauer Prüfung fand ich jedoch, daß er von dieſem mehr abweichende als übereinſtimmende Punkte zeigt und ich mußte mich entſchließen, in einem beſonderen Artikel ſein Weſen zu ſchildern.

Im zoologiſchen Muſeum iſt der Toviſittich in einem Exemplar unter dem Namen „Brotogerys tovi“ vertreten, und die ihm beigegebene Beſchreibung lautet: „Dieſer Lorito (Verkleinerungswortform von Loro) zählt zu den gewöhnlicheren Vögeln und iſt gezähmt oft in den Häuſern zu finden, er lernt das ihm Vorgeſagte mit großer Leichtigkeit ſprechen; am ganzen Körper iſt er von hellgrüner Farbe mit einem kleinen röthlichen Fleck unterhalb des Schnabels. Er lebt im heißen ſüdlichen Klima“.

Mit dieſen wenigen Worten iſt eigentlich ſchon eine ganze Fülle zum Ausdruck gebracht, aber dennoch muß ich bei den einzelnen Punkten etwas länger verweilen. Lorito iſt zu Land der Ausdruck für einen jeden kleinen Papagei und würde ſo viel wie „Lorchen“ bedeuten. Nächſt dem Petzſittich gehört der Toviſittich zu den gewöhnlichſten Erſcheinungen des Vogelmarkts, kommt allerdings nur periodiſch, zu beſtimmten Zeiten, aber dann äußerſt zahlreich in den Handel. Gegenwärtig (April) iſt kein Mangel an dieſen Vögeln, jeden Tag kommt neue Zufuhr. Im Preis hält er gleiche Rangſtufe mit dem Petzſittich, wird aber nicht ſo gern wie letzterer gekauft. In der Gefangenſchaft lebt der Grasſittich nicht lange, richtiger geſagt, die Wenigſten verſtehen ihn richtig zu behandeln. Er iſt allerdings ſehr zart und weichlich; die meiſten Vögel ſterben noch in Händler Hand, wenn nicht möglichſt raſch für geeignete Verpflegung geſorgt wird. Iſt aber dieſer Sittich erſt einmal eingewöhnt, ſo zeigt er ſich mindeſtens ſo ausdauernd wie der Petzſittich, und mir wurde von einigen Familien verſichert, daß ſie Pärchen länger als 15 Jahre im Beſitz gehabt hätten.

Der Toviſittich iſt mehr ein Vogel der Küſte, verſteigt ſich nur bis zu einer Höhe von 800 m; wird er dann plötzlich nach Guatemala, 1450 m hoch, gebracht, ſo wird es der vernünftige Vogelliebhaber begreiflich finden, daß dieſe Luftveränderung für einen ſo kleinen Sittich nicht gerade förderlich ſein kann. Die Temperatur ſinkt in der Nacht oft ganz bedeutend, finden die Vögel alsdann keinen Schutz, ſo ſind am andern Morgen die meiſten krank und ſchon nach wenigen Stunden tot. Im übrigen ſind ſie mit ihren beſchnittenen Flügeln in der Gefangenſchaft viel eher einer Erkältung ausgeſetzt, als in der Freiheit und in dem Vollbeſitz ihres Gefieders.

Um den Toviſittich gut einzugewöhnen, darf ihm für die Nacht ein warmes Plätzchen nicht fehlen. Wo ihm dies mangelt, ſuchen ſich die Vögel gegenſeitig zu wärmen und ſitzen entweder auf dem Boden der Stube oder des Käfigs in einer Ecke im Halbkreis mit den Köpfchen nach der Mitte oder auf einem

Zweig eng aneinander geſchmiegt. Möglichſt mannigfaltiges Futter, beſonders auch Früchte, wie Bananen und Aquacetes, ſollten ſtets vorhanden ſein.

Nach Deutſchland kommende Toviſittiche haben im Grunde genommen ganz anſehnliche Strapazen durchgemacht. Ich ſollte daher meinen, daß die Vögel, welche die Reiſe einmal überſtanden haben, ſchon genügend abgehärtet ſind und ſich bei guter Pflege raſch erholen müßten.

Wie bereits geſagt, entſcheiden bei eintretender Krankheit nur wenige Stunden über Leben und Tod. Ich kann es nicht verhehlen, daß auch ich anfangs recht trübe Erfahrungen mit dem Toviſittich gemacht habe und die Sterblichkeitsziffer bei friſch eingefangenen Vögeln mir noch heute ein Schrecken iſt. Einmal eingewöhnt, hält er ſich ganz vorzüglich und entwickelt dann ein allerliebſtes Leben. Der Toviſittich gehört zu den kleinſten Papageien und iſt oft überaus drollig. Unter meiner ganzen Vogelſchar möchte ich ihn wie den Poſſenmenſchen im Circus „Auguſt den Dummen“ nennen. Nicht, daß er thatſächlich dumm iſt, ſondern ſeine Einfälle ſind immer burſchikos. Ich höre dieſen kleinen Kerl ordentlich ſprechen und ſchimpfen, wenn er ſich an einem harten Maiskolben vergeblich abmüht. Der andere ſieht zu, bis ihm die Zeit zu lang wird und er zu ſeinem Genoſſen ſagt: „Komm einmal her, das verſteh ich beſſer, wie Du und das wird ſo gemacht“. Der erſte tritt zurück und läßt den zweiten arbeiten, aber auch dieſer fällt mit dem rollenden Maiskolben auf den Rücken. Dann erheben ſie gleichzeitig ein Raiſonniren und ſuchen ſich eine andere Beſchäftigung.

Alle Handlungen werden von den Zuſammengehörigen gleichzeitig ausgeführt, was der eine thut, kann der andre nicht laſſen. Stets halten ſie ſich in enger Gemeinſchaft, ohne Unterſchied, ob es Pare oder gleiche Geſchlechter ſind, ſelbſt die letzteren üben unzertrennliche Freundſchaft bis in den Tod. Iſt einmal der eine krank, ſo iſt es entſchieden ein Fehler, denſelben abzuſondern, dann ſtirbt er ganz beſtimmt und der Geſunde folgt ihm in wenigen Tagen. Soll ein Kranker geneſen, ſo muß er unbedingt einen Geſellſchafter haben, der ihn erwärmt und zum Freſſen und Trinken aufmuntert; bei dieſen Sittichen kommen ſo recht die Worte zur Geltung „Getheilte Freude iſt doppelte Freude -- getheilter Schmerz nur halber Schmerz.“

Befindet ſich der Toviſittich allein unter anderen Papageien, ſo ſucht er ſofort die Freundſchaft eines andern. Mit ihrer Stimme werden ſie manchmal etwas laut; wenn einer zu ſchreien anfängt, fällt natürlich die ganze Sippe ein. Meiſtens iſt es der Ausdruck der Freude und ein Zeichen des Wohlbehagens, oftmals aber auch die Angſt und der Aerger, immerhin genügt ein freundlich zugerufenes Wort, die kleine Schar zu beſchwichtigen. Ich wundere mich oft, wie zahm der Toviſittich wird; befinde ich mich in der Vogelſtube, ſo kommen die kleinen Schelme mir ſofort an den Beinkleidern von innen und außen heraufgeklettert. Der Grasſittich beißt nie oder nur in den ſeltenſten Fällen, wenn er ungeſchickt angefaßt wird. Für alle Verrichtungen hat er ein gewiſſes Verſtändniß, das ihm außerdem ermöglicht, auch einige Worte ſprechen zu lernen, ohne daß dies beſondere Mühe verurſacht.

In der Freiheit lebt der Toviſittich geſellig und ſtreicht in kleineren Zügen umher. Seine Hauptnahrung beſteht in Früchten, mit denen er vorherrſchend die Jungen auffüttert. Der junge Sittich hat ſchon im Jugendkleid den gelben Fleck am Unterſchnabelwinkel und unterſcheidet ſich von alten Vögeln nur durch das düſtere Grün am ganzen Körper. Die Geſchlechter laſſen ſich ſchwer beſtimmen. Das Männchen zeigt eine mehr gelbgrüne Bruſt und die erſten Stirnfederchen ſind, am Oberſcheitel eine Linie bildend, am Grunde von ausgeſprochen gelber Färbung. Unter mehreren Köpfen ſondern ſich die einzelnen Pare, laſſen ſich wenigſtens ohne große Mühe als ſolche erkennen.

In einem großen Flugraum halte ich unter anderen Vögeln auch eine Anzahl Toviſittiche in ausgeſuchten Paren. Jedes Pärchen behauptet als Schlafplatz einen Niſtkaſten und diejenigen Käſten, welche am Strauchwerk hangen und durch Klettern erreicht werden können, ſind die bevorzugten. Von ſeiner Flugkraft macht der Sittich wenig Gebrauch.

Bei Tagesgrauen beginnt das Geſpräch mit einem halblauten Durcheinander. Zuerſt ſchauen die Männchen aus dem Flugloch; nach gegenſeitiger Begrüßung kommen ſie auf die äußere Sitzſtange, das Weibchen folgt, die Flügel und Beine werden gereckt und geſtreckt und dann klettert die ganze Schar gemeinſchaftlich zum Futterplatz. Bevor ſie ſich mit dem noch daliegenden Mais beſchäftigen, verlangen ſie durch wiederholtes lautes Schreien die gewohnte Frühfütterung, beſtehend aus Weißbrot, welches man hier in eigener Art aus Maismehl, ähnlich wie Kakes gebacken, kaufen kann. Iſt der Hunger geſtillt, ſo folgt eine Beſchäftigung der andern und mit Intereſſe kann man die kleinen Papageien lange beobachten. Iſt die Schar müde, wird nach einem Aſt aufgeklettert und das Gefieder in Ordnung gebracht. Gegen Mittag wird gebadet, nicht ein einziger bleibt zurück und am Abend gehts wie auf Kommando zum Schlafen. Tagsüber wird der Niſtkaſten nur ſelten aufgeſucht, zum Niſten hat ſich überhaupt noch kein Pärchen angeſchickt, hoffentlich geſchieht es bald.

In den Hafenſtädten wird von den Schiffsmannſchaften der Toviſittich nicht gern gekauft, jedenfalls weil er zart iſt und leicht eingeht. Wie die deutſchen Importeure mit ihm zufrieden ſind, entzieht ſich meiner Beurtheilung, jedenfalls werden auch ſie über große Verluſte klagen. Um die Verluſte herabzumindern und dem Grasſittich größeren Eingang zu verſchaffen, iſt es meines Erachtens unbedingt nothwendig, daß die den Transport begleitenden Wärter reichlich mit Kakes verſehen ſind, denn dieſe leicht mit ſich zu führende geſunde Nahrung wird von den Vögeln gern genommen. Sucht alsdann ein Importeur geſchäftliche Beziehungen, welche ihm gewährleiſten, daß die Vögel bereits an die Gefangenſchaft gewöhnt ſind, ſo müßten auch dieſe zarten Sittiche in Europa gut ankommen. Wenn ich mir aber vergegenwärtige,

Beobachtung leicht, wenn man die nöthige Ausdauer beſitzt, in einem Verſteck ſein Erſcheinen abzuwarten. Dabei darf man natürlich nicht ſprechen, nicht huſten und auch nicht rauchen.

In hieſiger Gegend findet ſich am meiſten der gewöhnliche graue Kukuk. Dieſer hat aſchgrauen Oberkörper, Vorderhals und Kropf. Der Unterkörper iſt weißlich mit ſchwarzbraunen Querbändern, während Schwungfederſpitzen und Schwanz auf ſchwarzem Grund verdeckte weiße Flecke haben. Beim alten Männchen zeigen Augen und Füße ein helles Gelb, während der Schnabel glänzend ſchwarz erſcheint. Doch findet man verſchiedene Varietäten in der Färbung, beſonders bei jüngeren Vögeln. Die rothbraune Varietät des Kukuks konnte ich nur zweimal zu Geſicht bekommen.

Ueber ſeine Raubvogelähnlichkeit wird viel geſtritten, ich will nur hervorheben, daß ſelbſt kleinere Vögel durch ſeine Sperber- oder (bei der rothbraunen Varietät) von ſeiner Thurmfalken ähnlichen Zeichnung getäuſcht werden und ihm ſchreiend nachfliegen. Dagegen ſcheinen die Krähen, die in der Nähe dieſes Waldes eine große Kolonie haben, in dieſer Hinſicht ein ſchärferes Unterſcheidungsvermögen zu beſitzen, da ſie den Kukuk in Ruhe laſſen, ſelbſt wenn mehrere zuſammen ſind. Neſter, die einen Kukuk enthielten, fand ich im Jahr 1898 vier Stück. Auf einer Waldwieſe hatten zwei Grasmücken in einer Entfernung von 25 Schritten ihre Neſter gebaut. In einem derſelben fand ſich nach einiger Zeit ein Kukuksei und bald ein junger Kukuk ein, der ſo prächtig gedieh, daß er bald eines der jungen Schwarzplättchen auf den Rand des Neſtes und ſo an den Rand des Verderbens brachte. Da machte ich einen intereſſanten Verſuch. Mittels zweier Rindenſchalen (damit kein menſchlicher Geruch an dem Thierchen haften bleibe) trug ich daſſelbe in das Nachbarneſt. Meine Freude war groß, als ich in den nächſten Tagen ſah, daß der kleine Fremdling wirklich als Kind angenommen und gepflegt wurde, beſonders da bekanntlich gerade verſchiedene Grasmückenarten ihre Neſter manchmal im Stich laſſen, wenn ſie nur von einem Menſchen berührt wurden.

Recht intereſſant war auch ein ähnlicher Verſuch, bei welchem ein junger Kukuk Verſuchsobjekt war. Dieſer wurde mir von einem Knaben gebracht, der ihn dem Neſt der gelben Bachſtelze entnommen hatte. Der kleine dicke Burſche riß zwar fortwährend ſeinen Schnabel auf, war aber im eigentlichen Sinn des Worts „zu dumm, um zu freſſen“. Vor meinem Schlafzimmerfenſter aber hing ein Starkaſten mit abnehmbarem Deckel, der ein Neſt halbflügger Jungen enthielt. Zu dieſen brachte ich den jungen Kukuk, und ſetzte mich hinter das Fenſter auf die Lauer. Nach etwa zehn Minuten kam auch Freund Star mit einem Wurm, ſah in's Loch hinein und ließ den leckern Wurm fallen. Dazu ſchrie er aus Leibeskräften. Bald kam Frau Star hinzu, und nun mußte ich ſchnell einſchreiten, ſonſt wäre der arme Kukuksſprößling mit Glanz zum Loch hinaus geworfen worden. Der Star ſcheint alſo mit dem Gebrauch des Kukuks, ſeine Eier in andere Neſter abzulegen, nicht einverſtanden zu ſein, und ſeinerſeit keine Luſt zu haben, Pflegevater oder Pflegemutter zu ſpielen. Dagegen nahm ſich ein Rothkehlchen des Kleinen an und ätzte ihn durch. Ebenſo wurde meiner Schweſter ein junger Kukuk von einem Steinbrecher mitgebracht, der, in Ermangelung eines Pflegevogels von ihr ſelbſt gefüttert, eine Zeitlang fortvegitirte, dann aber einging.

Einen Anblick zum Todtlachen aber bot ein beinahe ganz erwachſener junger Kukuk, den ich im Jahr 1884 im Neſt eines Zaunkönigs fand. Bekanntlich iſt das Neſt des Zaunkönigs ziemlich kugelförmig mit einem kleinen Eingangsloch, und aus Grashalmen, Mos u. a. hübſch zuſammengeflochten. Dieſe Neſtkugel bot nun einen wunderlichen Anblick. Das kleine Flugloch war völlig durch den Hals des jungen Kukuks ausgefüllt, und umſchloß ihn wie eine Krauſe, während der Kopf vollſtändig außen bleiben mußte. Die Beine hatten ſich nach unten durchgearbeitet, wo ſie in der Erregung, z. B. wenn die Pflegeeltern Futter brachten, umherpendelten wie ein Par Radfahrerbeine. Der Schwanz und die Flügelſpitzen guckten aus anderen Löchern und Ritzen heraus. Da ich ſehr geſpannt darauf war, zu ſehen, wie das Thier von dieſem Panzer befreit werden würde, kam ich wol eine Woche lang jeden Tag hin. Plötzlich wurde ich denn auch von dem jungen Kukuk bemerkt; er verſuchte zu fliehen und fiel mit dem ganzen Neſt herunter. Dabei ging dieſes ganz in die Brüche und Freund Kukuk ſchlug ſich halb fliegend, halb hüpfend in die Büſche. Die Zaunkönige eilten ſchreiend hinter ihm her. Zwei Tage ſpäter bekam ich ihn wieder zu Geſicht, als er noch von den Pflegeeltern gefüttert wurde. Dann ſah ich ihn nicht mehr.

Merkwürdig iſt die Widerſtandsfähigkeit und Anpaſſungskraft der jungen Kukuke. So findet man ſie hier z. B. im Neſt der Bachſtelze, des Zaunkönigs, des Rothkehlchens, des Rohrſpatzes und der Braunelle. Wer nun die Verſchiedenheit dieſer Neſter, die der Natur ihrer Erbauer angepaßt ſind, kennt, der kann kaum begreifen, daß derſelbe Vogel, der ſich z. B. im Neſt des Zaunkönigs, dieſem kleinen heißen Backofen, wohl fühlt, auch im Neſt der Bachſtelze, in einem feuchten Loch neben einem Binſenbüſchel, das kaum mit einigen Grashalmen ausgekleidet iſt, gedeihen kann. Aber trotzdem iſt es ſo, und das Kukukskind gedeiht in einem Neſt ſo gut wie im andern.

Warum der Kukuk aber ſeine Eier in die fremden Neſter legt, will ich heute garnicht erörtern. In jedem Buch findet man ja andere Gründe dafür angegeben, und erwieſen iſt, daß er ſeine Eier nicht ausbrüten kann. Dies zeigt deutlich, daß die Natur ihm eine Stellung angewieſen hat, welche das Brutgeſchäft ausſchließt. —

Durch einen glücklichen Zufall aber habe ich ein Par andere Kukuksarten kennen gelernt, und ich glaube, daß einige Mittheilungen hierüber noch manchen Vogelfreund intereſſiren werden. Bei einer Wanderung durch Holland blieb ich plötzlich wie gebannt vor einem Häuschen ſtehen, aus deſſen geöffneten Fenſtern die verſchiedenſten Vogelſtimmen, darunter mir vollſtändig unbekannte herausdrangen. Mein Intereſſe wurde bald bemerkt, und ein blaß und kränkelnd ausſehender Mann in mittleren Jahren lud mich freundlich zum Eintreten ein. Der Einladung folgend, befand ich mich ſchnell im Innern des Häuschens, und ſah nun hier mein blaues Wunder. Alles, alles voll Vögel, wol 70 bis 80 Stück. Die meiſten waren Papageien der verſchiedenſten Arten, aber am meiſten intereſſirten mich die verſchiedenen Kukuksarten. Die ſchönſte Art davon nannte mein freundlicher Führer Kokil (Zanclostomus tristis). Er hatte einen ziemlich ſtark gebogenen Schnabel, kurze Flügel und einen langen, abgeſtuften Schwanz. Vorderhals und Bruſt zeigten blaßgrauen Farbenton, während die Unterbruſt weiß und die Oberſeite grünlich gefärbt war. Alle Steuerfedern zeigten weiße Spitzen. Er fraß Inſekten, beſonders gern Mehlwürmer. Gleichfalls wie dieſer ſtammte eine zweite Art, der Koel (Eudynamis orientalis) aus Indien. Derſelbe war unſcheinbarer gefärbt, glich an Geſtalt mehr als ſein Vorgänger unſerm Kukuk, und war ſehr zutraulich. Er läßt ſich leicht in Gefangenſchaft halten, frißt aber nur Früchte, beſonders Feigen. Auch Amerika hatte einen Vertreter hier, nämlich einen Regenkukuk, deſſen „Kau, kau“ mir von außen am meiſten aufgefallen war. Dieſer Vogel ſoll nach der Verſicherung ſeines Pflegers zum Theil ſelbſt brüten und zwar in der Weiſe, daß er zu brüten beginne, wenn das erſte Ei gelegt iſt. Da er aber noch Eier dazu lege, ſo käme es vor, daß man Neſter finde, die friſche Eier und Junge zugleich enthielten. Außer dieſen lebenden Vertretern der Familie Kukuk zeigte der Eigenthümer noch mehrere ausgeſtopfte Exemplare. So den Rieſenkukuk, der auf Neuholland vorkommt, und durch ſeinen ungewöhnlich großen Schnabel faſt an den Pfefferfreſſer erinnert. Bei dieſem Vogel ſind Rücken, Flügel und Schwanz von beinah undefinirbarer Farbe, von einem grünlichen Grau, die Unterſeite iſt heller; alle Federn haben ſchwarzbraune Spitzen. Prachtvoll gefärbt war beſonders der Goldkukuk (Chrysococcyx auratus), deſſen Rücken wie grünliches Kupfer ſchillert, und deſſen Heimath die afrikaniſchen Urwälder ſind.

Der Beſitzer dieſes Vogelhauſes war ein Mann von etwa 40 Jahren. Derſelbe hatte lange Jahre in den holländiſchen Kolonien gedient, auf holländiſchen Schiffen Allerwelts-Länder geſehen, und ſeine Vögel verſetzten ihn in jene Gegenden zurück. Er hatte eine ſchöne Penſion, war aber auch durch den Einfluß des Tropenklimas fortwährend kränkelnd und leidend. Ein Bruder, der noch als Steuermann die Meere befährt, ergänzte bei jeder Reiſe ſeinen Vogelbeſtand. Es ſtarben ihm viele Vögel.

Der Ruf dieſer ausländiſchen Kukuke klingt manchmal ähnlich dem Ruf unſeres Frühlingsverkünders, aber das eigentliche ſcharfe „Kukuk“ bringt doch nur unſer Kukuk hervor, der ſo auch der ganzen Sippe den Namen gegeben hat.

Die Lerchen und deren Haltung und Pflege in Gefangenſchaft.

Von A. Reuter.

I. Die Feldlerche.

Die Feldlerche iſt ein ſehr bekannter und beliebter Sänger unſerer Fluren und Felder, der allenthalben, beſonders in Bayern, vielfach im Käfig gehalten wird, ſowol auf dem Lande als auch in den Städten, wo die Käfige meiſtentheils vor dem Fenſter angebracht werden. Ich habe ſolche am häufigſten in Nürnberg angetroffen. In Stunden, wo der Lärm der Straßen ruht, glaubt man nicht in einer Großſtadt zu ſein, wenn man all dieſe Feld- und Haidelerchen vor den Fenſtern ſingen hört, dazwiſchen auch die verſchiedenartigſten Finkenſchläge, ſowie auch die der Nachtigalen, Grasmücken und Schwarzplättchen, ein reines Vogelparadis. Es macht einen ungemein zauberiſchen Eindruck auf den Vogelkenner und -Liebhaber, durch ſolche Straßen zu wandeln. Von weitem erkennt man ſchon an den mit grüner Drahtgaze vergitterten Fenſterflügeln, was ſie bergen. Die Stadt Nürnberg iſt überhaupt großartig inbezug auf die Vogelliebhaberei und man darf ſicher annehmen, daß ſich faſt in jedem Hauſe zum mindeſten ein Vogelfreund befindet. Auf dem Land haben die Lerchen gewöhnlich ihren Platz unter der Ofenbank, oder ſie laufen frei im Zimmer mit geſtutzten Flügeln. Es ſind dies meiſt jung aufgezogene Vögel, welche von Kindern mit leichter Mühe im Feld aufgefunden werden, und da ſie äußerſt anſpruchslos ſind, auch von den Kindern aufgezogen werden. In der Regel erhalten ſie in Milch geweichtes Schwarzbrot, ſo lange ſie geätzt werden müſſen. In einem Fall wurde mir erzählt, daß ſie nur im Waſſer aufgequellten Weizen fütterten, trotzdem befand ſich die Lerche wohl dabei. Später erhalten ſie bei den Landleuten geriebene Gelbrübe mit Semmel gemiſcht, Hafer und etwas gequetſchten Hanf, außerdem auf dem Käfigboden Heugeſäme, woraus ſie vieles ausleſen. In manchen Gegenden Bayerns werden die Lercheneier von abergläubiſchen Müttern mit nach Haus genommen und den Kindern zum Austrinken gegeben, wodurch ſie gute Singſtimmen erhalten ſollen. Vor Jahren antwortete mir ein Mann, welcher einen nichts weniger als gewünſchten, Aller Ohren beleidigenden Geſangsvortrag hielt, auf mein Befragen, wie er zu dieſer ſchönen Stimme komme, ſeine Mutter hätte ihm als Kind viele Dutzend Lercheneier vom Feld mit heimgebracht. Er war alſo ſicher von der guten Wirkung der Lercheneier überzeugt; wir aber auch!

Der Fang der Lerchen geſchieht meiſtens im Frühjahr, wenn ſie zurückkommen, was oft ſchon um Lichtmeß der Fall iſt. Es wird dazu ein etwa 3 qm großer Platz mitten im Feld mittelſt eines ſtumpfen Beſens abgekehrt, bis aller vorhandene Schnee entfernt iſt und der Grund zum Vorſchein kommt. Darauf wird Hafer und Heugeſäme (in Bayern Heublumen genannt) geſtreut, und entweder Leimruthen geſteckt oder Roßharſchlingen gelegt. Hier fallen nun die Lerchen in Flügen von oft hundert Stück und darüber ein und werden ſo dutzendweis gefangen, worunter ſo ziemlich die Hälfte Haidelerchen ſind. Jedoch wird mit den Lerchen nicht ſo grauſam umgegangen, wie mit den Droſſeln und Amſeln in den Weingegenden, denn die Lerchen werden nur zum Zweck der Käfigung gefangen und man kauft ſie bei den Fängern das Stück zu 30 bis 50 ₰. Sie werden in der Regel unter der Ofenbank oder unter den alten auf vier Beinen ruhenden Kachelöfen untergebracht, wo ſie allerdings oft eng zuſammengepfercht werden. Ich ſelbſt ſah in ſo einem kleinen Raum etwa 40 Stück Feld- und Haidelerchen untereinander. Als Futter erhielten dieſe alle möglichen Sämereien, auch Hafer, welchen ſie ſehr geſchickt zu ſpelzen wiſſen, außerdem Mohn, gequetſchten Hanfſamen, ſowie Gelbrübe und Mehlwürmer. Man gebe jedoch einer Lerche auch Fleiſch und Ameiſeneier unter das Futtergemiſch, und täglich acht bis zehn Mehlwürmer, welche ſie ſehr liebt; auch von Käſequark iſt ſie ein Freund. Als Sämereien gab ich meinen Lerchen meiſt das für Kanarienvögel beſtimmte gemiſchte Futter.

Die Lerche iſt ein ſehr dankbarer Stubenvogel; obwol anfangs etwas ſcheu, wird ſie doch bei ruhiger Behandlung leidlich zahm, und unterſcheidet ihren Pfleger ganz genau von Fremden. Jung aufgezogen iſt ſie zum Aus- und Einfliegen zu gewöhnen, wird jedoch für einen Kenner geſanglich nicht werthvoll, daher man ſie beſſer alt eingefangen kauft.

Junge Lerchen werden mit in Milch geweichter Semmel, Quarkkäſe, Ameiſenpuppen und Kerbthieren, hartgekochtem Hühnerei, auch mit rohem geſchabtem Rindfleiſch aufgefüttert. Der Lerchenkäfig habe mindeſtens eine Länge von 60 cm, eine Höhe von 30 cm und eine Tiefe von 25 cm. Die Decke ſei entweder mit Tuch überſpannt oder gepolſtert, weil die Feldlerche beim Geſang jäh in die Höhe ſteigt, und ſich ſonſt den Kopf einſtoßen würde. Futter- und Waſſergefäße bringe man an den zwei Schmalſeiten des Käfigs an, und man nehme hierzu längliche Geſchirre. Da nun die Lerche gern durch Futter und Waſſer läuft, ſo habe ich die Geſchirre durch eine dünne Holzwand vom Laufraum getrennt, und damit die Vögel zu Futter und Waſſer gelangen können, in dieſe Zwiſchenwand je zwei Oeffnungen, 8 cm hoch und 4 cm weit, wie nebenſtehende Zeichnung veranſchaulicht, geſchnitten. Auf dieſe Weiſe gelangen ſie zu Futter und Waſſer, können jedoch nicht durchlaufen und daſſelbe verunreinigen. Die Reinigungsſchublade ſei etwa 10 cm hoch und bis zur Hälfte mit feinem Sand angefüllt, da die Lerche im Sand badet, und man kann ihr in der Mitte des Käfigs auch ein Häufchen Sand beſonders auffüllen, um ihr entgegenzukommen. Ich ſtellte auch gewöhnlich einen bemoſten Stein in die Mitte, da ſie ſich gern beim Geſang auf einer erhöhten Stelle niederläßt. In eine Ecke ſtellte ich einen Blumentopfunterſatz mit grünem Raſen, dann braucht man ihr kein Grünzeug unter das Futter zu miſchen. Der Sprunghölzer bedarf die Feldlerche keines, ſie wären ihr nur hinderlich im Weg. Peinliche Reinlichkeit iſt anzuempfehlen, da ſich ſehr leicht an den langen Hinterzehen Schmutz anhängt und den Vögeln ſehr läſtig wird. Kommt es einmal vor, ſo weiche man den Schmutz in lauwarmem Seifenwaſſer auf, wende aber keine Gewalt an, denn er wird ſchnell weich und fällt bei leichter Berührung ab. Bei guter Behandlung iſt die Lerche einer der ausdauerndſten und dankbarſten Käfigvögel; mir ſind Fälle von 12 bis 15jährigem Beſitz bekannt. Es iſt ſehr zu loben, daß die Lerchen jetzt nicht mehr wie früher zum jagdbaren Wild gerechnet werden.



II. Die Haide- oder Dull-Lerche.

Ich habe mir früher kein größeres Vergnügen gewußt, als im Frühling in mondhellen Nächten das Revier zu begehen und dem ſchönen Geſang der Haidelerchen zu lauſchen. Dabei begegneten mir einmal zwei Herren, welche mich befragten, wo denn die Nachtigalen wären, die da ſingen; ich klärte ſie auf, daß dies Haidelerchen ſeien, worauf ſie herzlich lachten, ſie waren nämlich von einem Freund dort hingeſchickt worden zur Abhörung des Nachtigalſchlags. Im Käfig iſt die Haidelerche gleich wie die Feldlerche zu füttern, auch gebe man ihr den gleichen Käfig, jedoch mit einem Sprungholz verſehen. In einem Fall wurde eine Haidelerche 9 Jahr lang mit nur gequetſchtem Hanfſamen und Mehlwürmern gefüttert. Dies iſt jedoch nicht richtig, abwechſelndes oder gemiſchtes Futter iſt ihr jedenfalls zuträglicher; die Gelbrübe mit Semmel ſoll nie fehlen. Die Haidelerche ſingt im Käfig auch des Nachts, gleichviel ob Mondſchein, Lampenlicht oder auch ſtockfinſtere Nacht, jedoch meiſtens erſt im zweiten Jahr, es kommt dabei viel auf das Alter des Vogels an.

Aeltere Vögel ſind häufig der Epilepſie unterworfen; ich hatte ſelbſt einen ſolchen. Dieſer wurde während der epileptiſchen Anfälle gleich einem Gummiball im Käfig herumgeworfen, trotzdem hatte ich ihn vom erſten Ausbruch der Krankheit an noch volle zwei Jahre. Während der Fallſucht ſtoßen ſie ängſtliche Rufe aus, ſobald die Krämpfe jedoch vorüber ſind, ſingen ſie gleich wieder. Auffallend war mir das Gebahren des meinigen während dieſer Krankheit; ſobald er nur einen Augenblick hatte, wo er ſich willkürlich bewegen konnte, lief er zum Futtertrog, um ſich etwas zu holen, was er jedoch nie verſchluckte, bzl. nicht verſchlucken konnte, ſondern er preßte es krampfhaft zwiſchen die beiden Schnabelhälften ein. Im Lauf der Zeit gehen ſie, wenn von dieſer Krankheit einmal befallen, an Auszehrung zu Grunde, weshalb man ſie in dieſem Fall am beſten gleich nach dem erſten Ausbruch frei läßt. Ich glaube, daß ſie meiſt von unbefriedigtem Geſchlechtstrieb herrührt. Der Fang der Haidelerche iſt der gleiche, wie der der Feldlerche, da ſie auch meiſt in Geſellſchaft mit dieſer im Frühjahr die Felder beſtreicht. Ihre Brut hat ſie ſehr verborgen im Haidekraut, ſodaß dieſe nicht leicht aufzufinden iſt. Hier in den Schwarzwaldbergen ſind die Haidelerchen ſehr zahlreich.

Nun möchte ich noch der Hauben- oder Schopflerche erwähnen. Auch dieſe hat einen ſehr angenehmen und leidlichen Geſang, wird aber an vielen Orten wenig oder garnicht angetroffen. Meiſtens iſt ſie in ſandigen Ebenen zu finden, wandert auch wol mit dem Bahnbau fort. In der Gegend von Nürnberg, Schwabach, Roth am Sand, in Mittelfranken habe ich ſie an den Bahnböſchungen ſehr zahlreich angetroffen. Dort niſtet ſie auch gern in dieſen ſandigen Lagen. Im Uebrigen läuft ſie auf den Straßen der Städte und Dörfer umher, beſonders im Winter, um den Hafer aus dem Pferdedung herauszupicken. Auf Hausgiebeln ſitzt ſie ſehr gern und läßt von dort aus ihr Lied erſchallen. Gefüttert und gepflegt wird ſie ebenſo wie die beiden Erſtangeführten, und iſt auch gleich der Feldlerche lange in Gefangenſchaft zu erhalten. In Bayern wird dieſe Lerche einfach Kopplerch oder auch Saulocker genannt.

Aus meiner Vogelſtube.

Mit Bezug auf die gütigſt in der „Gefiederten Welt" beantwortete Frage bezüglich der Todesurſache des Gouldsamandinen-Weibchen gebe ich Ihnen nachſtehend noch die Futterſorten an, welche dem Thierchen in der Vogelſtube zur Verfügung ſtanden. Das Futter iſt in der Hauptſache in zwei Schindlerſchen Futterkäſten größter Sorte incl. Hülſenfang enthalten, und die Hülſen werden täglich mehrmals abgeblaſen, die Käſten nach Bedarf gereinigt und neu gefüllt. Hier die Aufſtellung: 1. rothe algeriſche Hirſe, 2. Senegalhirſe, 3. weiße Hirſe, 4. Glanz, 5. Rübſamen, 6. Bennyſamen, 7. Negerſamen, 8. Hanf, ganz und gemahlen, 9. ungeſchälter Reis, 10. geſchälter Hafer und Weizen (Wachtelfutter), 11. Kolbenhirſe (reichlich), 12. geſtoßene Eierſchalen und Sepia, an verſchiedenen Stellen aufgehängt. Dazu als Aufzuchtfutter gequellte Ameiſenpuppen, abwechſelnd mit Eierbrot oder zerſtoßenem Zwieback bzl. harter Semmel gemiſcht, in letzter Zeit friſche Ameiſenpuppen. Statt des Eierbrots wird von Zeit zu Zeit auch geriebne Semmel mit einem hartgekochten Ei angemacht. Neben den friſchen Ameiſenpuppen (rein) habe ich in der erſten Zeit das Miſchfutter mit gequellten weiter gegeben. Ich weiß allerdings nicht, wie groß man die Gabe friſcher Ameiſenpuppen bei einer Kopfzahl von 20 Stück bemeſſen darf.1) Als Grünfutter erhalten die Vögel Gräſerriſpen und Vogelmiere, ganz vereinzelt ein Stengelchen Kreuzkraut dazwiſchen. Die Vogelmiere laſſe ich mindeſtens einen halben Tag liegen, manchmal iſt ſie auch zwei Tage alt geworden. Vielleicht iſt dieſe übertriebene Vorſicht ſchädlich geweſen?2) Alle vier Tage laſſe ich das Grünfutter ganz fort. Grünes finden die Vögel verſchiedentlich ſonſt in der Vogelſtube, z. B. auch an den Waſſerpflanzen im Baſſin des Springbrunnens.3)

Bis vor drei Wochen wurde das Waſſer, abgeſtanden, in einem automatiſchen Trinkgefäß gereicht und Badegelegenheit möglichſt nur bei Sonnenſchein gewährt. Dann kam der Springbrunnen. Derſelbe iſt mit Tuffſtein, Porphyr und verſteinertem Holz umgeben. Stücke von dieſen drei Materialien befinden ſich in beiden Baſſins des Springbrunnens, um das Baden und Trinken zu erleichtern. Zwiſchen den Steinen des Aufbaues iſt Mos gepflanzt, welches in gleicher Weiſe wie die grasartigen Waſſerpflanzen im Baſſin etwas naß wird. Dem Springbrunnen wird das Waſſer direkt aus der Leitung durch einen weißen Gummiſchlauch zugeführt.

Die neue Einrichtung wurde natürlich von den Inſaſſen der Vogelſtube freudig begrüßt und fleißig benutzt. Speziell die Gouldsamandinen gehen in der Regel ziemlich tief ins Waſſer, ſodaß der Unterleib faſt ganz verſchwindet, und laſſen ſich dann unter zitternden Bewegungen der halbausgebreiteten Flügel von dem herabfallenden Waſſer des Springbrunnens naß regnen. Die Prozedur dauert manchmal wol eine Minute. Nachdem ich zu bemerken glaubte, daß einige der beſſeren Vögel kurz nach der Aufſtellung des Springbrunnens rauher im Gefieder erſchienen, ließ ich denſelben nur von 11—5 Uhr, während die Sonne ins Zimmer ſcheint, funktioniren. Dann ſtarb das Weibchen rothköpfige Gouldsamandine. Ich dachte zunächſt an den Springbrunnen und ſtellte die Temperatur des Waſſers in der obern Schale mehrfach feſt. Sie ſchwankte von 10-12° R. bei einer Zimmerwärme von 13—16°. Iſt dieſe Waſſerwärme auch nicht niedrig, ſo wird ſie doch immerhin etwas tiefer liegen als die Temperatur des frühern über Nacht geſtandenen Bade- und Trinkwaſſers. Vielleicht war der Uebergang zu plötzlich.4) Jetzt habe ich nun durch Aufſtellung eines kleinen Zinnbaſſins außerhalb der Vogelſtube eine Einrichtung getroffen, die es ermöglicht, entweder direkt mit der Waſſerleitung zu arbeiten, oder abgeſtandenes Waſſer zu benutzen. Dies wird auch für den Winter richtig ſein.

Im Uebrigen bin ich für den Verluſt durch die Anſchaffung von 5 Stück neuer Gouldsamandinen getröſtet, ſodaß ich wieder 9 Stück beſitze, welche ich demnächſt noch auf zwei volle Par rothköpfige und drei Par ſchwarzköpfige zu ergänzen hoffe. Ob ich nach den bisherigen Erfahrungen mit dieſer Art wol je ein Par durchbringen werde.5)

Nebenbei befindet ſich unter den neuen Vögeln ein Exemplar (völlig ausgefärbt), über deſſen Geſchlecht ich im Zweifel bin, was mir unter den mehr als 400 Stück Goulds, die ich ſchon geſehen habe, noch nicht vorgekommen iſt. Die Bruſt iſt nämlich blauviolett, nur mit ganz zartem roſa Anhauch, der Unterleib kräftig gelb, dagegen die helle blaue Binde und auch der Rücken gleicht mehr dem der Weibchen, während dieſe ſonſt eine ausgeſprochene roſaviolette Bruſt und blaßgelben Unterleib beſitzen. Nun es wird ſich ja bald zeigen, ob es ein außergewöhnlich ſchönes Weibchen oder ein ſchlecht gefärbtes Männchen iſt.6)

Nun zum Schluß noch etwas von einer Zebrafinkenbrut, die in vielen Stücken abweichend von der Regel verlaufen iſt. Das Pärchen hat es nämlich durch unaufhörliches Niſten in verſchiedenen Käſtchen und anſcheinendes Verlaſſen der Eier und erneutes Niſten in einem anderen Bauerchen zunächſt verſtanden, mich derart über ſeine Thätigkeit zu täuſchen, daß ich plötzlich von fünf flüggen Jungen überraſcht wurde, als ich ſicher an eine Fehlbrut glaubte und ſchon überlegte, ob eine Abſonderung in einem Käfig ohne Niſtgelegenheit nicht angebracht wäre. Nachdem das Pärchen ſechs Neſter fertig gebaut hatte, brütete das Weibchen anſcheinend vier bis fünf Tage — das Neſt zu unterſuchen, wage ich bei dieſer Art nicht —, dann ſchlüpften Beide, ſobald ich in der Vogelſtube war, abwechſelnd in verſchiedene Neſter, ſo daß ich ſie nicht weiter beobachtete, eben im Glauben an eine Fehlbrut. Nachts benutzten ſie das alte Neſt zum Schlafen; bei Tage ſaßen ſie dagegen häufig zuſammen, und als ich das Weibchen einige mal vermißte, fand ich es entfernt vom Neſt im Dickicht. Vor drei Wochen erregten ſie wieder meine Aufmerkſamkeit durch erhöhte Emſigkeit und verſtärkte Trompetentöne. Einige Zeit darauf glaubte ich ein mehrſtimmiges Echo aus dem erſten Neſt zu vernehmen, wenn das Männchen hineinſchlüpfte, während das Weibchen auf einem benachbarten Zweig ſaß, doch zerſtörte der Umſtand, daß ſie diesmal die Nacht im Dickicht zubrachten, wieder meine Hoffnung. Am darauffolgenden Morgen flatterten fünf junge Zebrafinken in der Vogelſtube herum, anfangs fleißig von beiden Alten gefüttert. Vier Tage darauf bemerkte ich durch einen Zufall zwei Eier in einem anderen Harzer Bauerchen, in welches das Weibchen eifrig hineinſchlüpfte und ſeitdem brütet es fleißig, während das Männchen ausſchließlich die Jungen füttert und gelegentlich eine kleine Ruhe in einem dritten Neſte hält. Zur Zeit hat die Geſellſchaft vier Neſter belegt, nämlich außer den vorgenannten noch ein viertes, in welchem abwechſelnd die Jungen ſitzen, je nachdem ich es mir habe einfallen laſſen, einem von beiden Neſtern etwas zu nahe zu kommen oder auch nur ein Neſt aus der Nähe ſcharf anzuſehen. Heute füttert auch das Männchen nur widerwillig; die Jungen freſſen bereits allein.

Hugo Dicker.

Anmerkung der Leitung: 1) Bringen Sie Gefäße mit Ameiſenpuppen an verſchiedenen Stellen der Vogelſtube an, damit jeder Bewohner derſelben ſich ſolche holen kann, ohne von einem ſtärkeren verdrängt zu werden. Die Größe der Gabe muß natürlich nach der Art der Vögel bemeſſen werden. 2) Die Vogelmiere zwei Tage liegen laſſen, iſt nicht richtig; dagegen iſt es erforderlich, ſie in heißes Waſſer zu tauchen und, an Fäden aufgereiht, wieder lufttrocken werden zu laſſen, ehe man ſie den Vögeln gibt. 3) Meiner Anſicht nach ſind Waſſerpflanzen den Vögeln ſchädlich; ſie können leicht Unterleibsentzündung herbeiführen. 4) Das Waſſer war für die zarten Vögel zu kalt; es muß die Temperatur der Zimmerluſt haben. 5) Zweifellos. 6) Der Vogel iſt ein junges Männchen, das noch in der Verfärbung begriffen iſt; dafür ſpricht beſonders das Fehlen des himmelblauen Randes um den Kopf, der ſtets zuletzt auftritt.

An die Leſer.

Wir bitten zu beachten, daß Anfragen, die in der laufenden Nummer beantwortet werden ſollen, ſpäteſtens bis Sonntag bei Dr. Ruß eintreffen müſſen. D. L.

Anfragen und Auskunft.

Herrn **A. Knepperges**: Pflaumenkopfſittiche können Sie ohne Bedenken in geſchützter Voliere im Freien halten.

Herrn **Dr. J. Lauterer**: Die eingeſandte Probe von kondenſirtem Eigelb war nach Geruch und Geſchmack gut. Sie können das Eigelb nach meiner Ueberzeugung dem Univerſalfutter ohne Bedenken beimengen.

Herrn Pfarrvikar **Georg Bürgel**: Den Umſtand, daß in der erſten Auflage meines Buches „Die Prachtfinken" über die Fütterung der Silberfaſänchen andere Angaben gemacht ſind als in meinen ſpäter erſchienenen Werken, erkläre ich Ihnen dahin, daß die von mir anfangs beobachteten Silberfaſänchen Mehlwürmer verſchmähten, während die in ſpäteren Jahren von mir gehaltenen Vögel dieſer Art ſie gern fraßen. Man hat überhaupt beobachtet, daß die Prachtfinken in dieſer Beziehung verſchiedene Neigungen haben.

Briefwechſel.

Herrn **Fr. Anzinger**: Beitrag mit Dank erhalten.

Fräulein **Fanny Heinz**: Beſten Dank für die Zuſendung des Zeitungsausſchnitts.

Zu unſerm Bilde.

Als eine Art Gegenſtück zu dem grauen Fliegenſchnäpper, den wir in der vorigen Nummer unſeren Leſern im Bild vorgeführt haben, bringen wir diesmal die Dorngrasmücke (Sylvia cinerea, *L.*).

Während das Neſt des Fliegenſchnäppers unweit von unſeren Behauſungen zu finden iſt, meidet die Dorngrasmücke bei ihrem Brutgeſchäft die Nähe menſchlicher Wohnungen. Sie wählt dorniges, dichtes und nicht zu hohes Gebüſch, beſonders gern Schwarzdorn- und Kratzbeerbüſche. Doch iſt ſie nicht zu wähleriſch, ſondern begnügt ſich mit dichten Gebüſchen überhaupt oder dazwiſchen ſtehenden Pflanzen, mit Neſſeln, hohem Gras, ſelbſt dichten Erbſenranken; auch in Kornfeldern baut ſie ſich an, die mit Unkraut durchwachſen ſind. Nur gebüſchloſes Stangen- oder Nadelholz ſucht ſie niemals auf. Das Neſt, 0,5 bis 2 m hoch geſetzt, iſt um ſo leichter zu finden, je höher es ſteht. Verſteckt iſt es ja immer, bisweilen aber ſehr ſchwer auffindbar; das iſt der Fall in jungen Holzſchlägen, wenn altes Gras eine Decke darüber bildet. Gebaut iſt es leicht. Es beſteht aus Halmen, Baſtfaſern, Grasriſpen; Mos findet ſich ſelten, und nur an der äußeren Wandung, dagegen recht häufig Pflanzenwolle und Kerbthiergeſpinnſte. Zur Ausrundung ſeines von außen rauhen und unanſehnlichen Neſtes benutzt der Vogel Pferdehare.

Die Brutzeit reicht von Mitte Mai bis Juli. Die Eier ſind gelb, bläulich- oder grünlichweiß, hellbraun beſpritzt und gefleckt, am ſtumpferen Ende meiſt mit Fleckenkranz verſehen. Die Brutdauer beträgt vierzehn Tage; vom Mittag ab brütet das Männchen. Die Jungen, welche nackt aus dem Ei kommen, ſich aber bald mit Stoppeln bedecken, ſehen dem Weibchen ziemlich gleich. Dieſes (auf unſerm Bild unten) iſt trüber und im ganzen unanſehnlicher gefärbt als das Männchen. Es hat nicht die rein weiße, nach unten leicht fleiſchfarbene Kehle, nicht ſo lebhafte roſtrothe Flügelkanten; Kopf und Hinterhals zeigen ein braunes Grau, das ein wenig in's Röthliche ſpielt.

K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Ameiſeneier,

getrocknete, ſchon 1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigte goldgelbe Ware, liefert per Liter 90 Pf.

Gottlieb Wanek,
[1176] Thierhandlung, Prag 411, I.

Die Samen-Großhandlung
von
Carl Capelle, Hannover
(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [1177]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Alle Vogelfutter,
Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig,
Königsplatz 7.

Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche. Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1178

Friſche Ameiſeneier,

ſaubere helle Ware, à Liter 1 ℳ, 10 Liter 9 ℳ gegen Nachnahme. [1179]
J. Nullmeyer, Vogelhandl., Mannheim.

Frische Ameiseneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt der einzige Erſatz: **Zecke** mit heißem Waſſer übergoſſen und dann ausgedrückt. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zecke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Droguerien. Man verlange Zecke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1180]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Frische Ameiseneier

liefere den ganzen Sommer hindurch, in beſter Qualität, à Ltr. 1 ℳ, 10 Ltr. 9 ℳ. [1181]
Joseph Böhning, Braunſchweig, Klint Nr. 3.

Mehlwürmer, 1000 St. geg. Einſ. v. 1,70 in deutſch. Reichsp.-Mrkn. verſ. franko
[1182] **D.Waschinsky, Berlin NW, Wilsnackerſtr.63.**

Lager von **Ameiſeneiern.**
Direkter Import bei
[1183] **H. Drefalt, Lübeck.**

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter
für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1184] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Friſche Ameiſeneier, à Liter 1 ℳ, 99er getr., à Ltr. 1,20, jeden Poſten. ff. Weichfreſſer vorräthig u. empf. [1185]
A. Seyfert, Magdebg.-Neuſt., Morgenſtr. 4.

Vögel.

Empfehlen garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende

Sproſſer
à Stck. 9–12 ℳ, [1186]

Wachtelhähne,
à Stück 1,50 ℳ, 6 Stück 7 ℳ, ſowie

Nachtigalen
4–6 ℳ und alle Arten

Grasmücken
unter Garantie lebender Ankunft. Preisliſte gratis.

Prima friſche Ameiſeneier
und 99er getrocknete, à Liter 1 ℳ.

Gebr. Haus, Vogelexportgeſchäft,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Nonpareils,

à P. 8,50, à Mch. 5,50, 2 Mch. 10 ℳ.
Indigos, à P. 7,50, à Mch. 4,50, 2 Mch. 8,50 ℳ.
Orangebäcks, à P. 1,75, 3 P. 5, 10 P. 15, 20 P. 28 ℳ.
Goldbrüſtchen Cordonbleus, à P. 2, 5 P. 9 ℳ.
Edelſänger, à St. 4, à P. 6 ℳ.
Kl. Alexanderſittiche, à Stück 3,50 ℳ.
Goulds Amandinen, à P. 20 ℳ.
Nymphenſittiche, à P. 9 ℳ.
Auroraaſtrilde, à P. 10, 2 P. 18 ℳ.
Hüttenſänger, à St. 3 ℳ. [1187]

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Wecker kann man sparen,

wenn man ſich ſchlagende Wachteln kauft. Dieſe ſind bei uns zu haben à 1,50, Dtzd. 12 ℳ, Sproſſer, gut abgehört, 9 bis 10 ℳ. Garantie lebender Ankunft, Preisverzeichniß über Vögel gratis. [1188]

Gebr. Mengler, Vogelexport,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Harzer Kanarienvögel,

Hohlroller-Stamm, diesjährige Hähne, à 5 ℳ, Dtz. 48 ℳ, Weibchen à 80 ₰, Dtz. 8 ℳ. Garantie für Hähne und leb. Ankunft.

Wilhelm Kaye,
[1189] Thale (Harz).

Verkaufe

mein Aquarium, für Vogelſtube geeignet, ſechseckig, Goldbronze-Verzierung, vollſtänd. zwei Spritzröhren, ſpringt bis 1 m hoch, Baſſin, bevölkert mit 4 Arten fremdländiſche Salamander, feſter u. reeller Preis 13 ℳ franko. Tauſche Sittiche oder alte Jahrgänge der „Gef. Welt“. Verp. frei. [1190]

Heinrich Schneider.
Freiburg (Baden), Erwinſtraße 7.

Pariſer Trompeter

0,4 gelb oder grün, hochgeſtellt, gut in Federn, zu kaufen geſucht.

Gefl. Offerten mit genauer Beſchreibung und Preisangabe erbittet
[1191] **Alfred Zuntz,**
Frankfurt a. M., 31 gr. Eſchenheimerſtr.

Schamadroſſel,

großartiger Sänger, tadellos im Gefieder, hat 2 mal bei mir gemauſert, frißt aus der Hand, freifliegend in der Vogelſtube, durchaus verträglich, für 45 ℳ zu verkaufen.

Ferner **rother Kardinal,** ebenfalls vorzüglicher Sänger, 2 Jahre hier, ſelten ſchönes Gefieder, 8,50 ℳ. [1192]

Overhamm, Apotheker,
Werden (Ruhr).

---

ff. Harzer Kanarien-Vögel,

Hohl- u. Knorr-Vögel, gute Klingel- u. Schaukel-Roller ohne Fehler 15, 20 u. 25 ℳ, geb. dieſelb. 14 Tage a. Probe, jedoch p. Nachn. od. Betrg. vorher, nicht gefall. Vögel tauſche um od. zahle zurück. Preisliſte frei. [1193]

L. G. Müller, Vogelzüchterei, **Nordhauſen a. H.**

NB. Junge von dieſem Jahr à Stck. 5 ℳ, 6 Stck. 25 ℳ, 12 Stck. 48 ℳ, frei dort.

1898 erhielt mein Stamm Harzer Kanarienvögel 1. Staatspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10–25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.
Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [1194

Vogelkatze,

2 Jahre alt, bei Vögel aufgezogen, wegen Umzug für 25 ℳ zu verkaufen.

Aug. Meyer, Vogelhandlung,
[1195] **Straßburg i. E.**

Rothe u. gelbe Kreuzſchnäbel

verſende 6 Stück 4 ℳ, Dutzend 6 ℳ. Tauſche auch auf friſche Ameiſeneier, Sproſſer, Schwarzblättchen, Nachtigalen u. Käfige.

A. Jaumann,
[1196] **Großbreitenbach,** Thür.

Wachteln,

nur Hähne, gute Schläger, Dtzd. 7,50 ℳ. Garantie für Männchen und lebende Ankunft. [1197]

N. Muschna, Temesvar, Ungarn.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1198]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Zwei

firm gelernte Dompfaffen (1 Jahr alt) hat noch zu ſehr mäßigen Preiſen verkäuflich

F. Schlag,
[1199] **Steinbach-Hallenberg.**

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1200]

Zeiſige u. Kreuzſchnäbel

à 1 *M.*, Amſeln u. Singdroſſeln à 3 *M.*, Edle Harzer Rollerhähne, Januarbrut, à 3,50 *M.* Unter Garantie für Hähne und lebende Ankunft gegen Voreinſendung oder Nachnahme. Prima [illegible] und getrocknete Ameiſeneier, [illegible] 1 *M.*, getrockner 1,20 *M.* [1201]

Gebrüder Haas,
Hoffſtetten b. Gemünden a. M.

Hochgelbe Pirole,

[illegible] à 6 *M.*, **eine Singdroſſel,** [illegible] 10 *M.*, **Amſeln** à 4 *M.*, 1 kleiner **Buntſpecht,** Paar mit rother Platte 8 *M.*, **Zaunkönige** à 3 *M.*, 1 [illegible] 20 *M.* Garantie lebender Ankunft.

Rud. Meier, [illegible]
[1202] **Neuendorf** b. [illegible]

Verkaufe:

1 [illegible] Amſel für 10 *M.*, 1 [illegible] Schwarzplatte für 8 *M.*, 1 [illegible] Grasmücke für 8 *M.*, 2 [illegible] Rothkehlchen, à Stück 5 *M.* Die Vögel pfeifen ſchön und laut und ſind bei Doppelt[illegible], [illegible] auf Hellenhof. [1203]

Aron Richter, Eibenſtock i. S.

Prachtvolle Amazone,

ganz zahm, großart. Sprecher, iſt Umſtände halber preisw. zu verk. [1204]

R. Thatemuth, Leipzig-Anger, Wurznerſtr. 8.

Verkaufe

4 Par

1—2jährige Pfauen

billigſt, auch einzelne Exemplare. Anfragen zu richten an

Max Wilke,
[1205] **Bielitz,** Oeſterr.-Schleſien

Verkaufe: 1,1 chin. **Mandarin-Enten** [illegible]

Rudenburg.
[1206] **Charlottenburg,** [illegible]

Bücher-Anzeigen.

Für Aquarienliebhaber!

Im unterzeichneten Verlage erſcheint

Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde

herausgegeben von **Dr. E. Bade.**
(Monatlich zwei Nummern.)
Preis halbjährlich Mk. 2.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in **Magdeburg.**

Der Deutſche Geflügelhof

Abonnement vierteljährlich 75 Pfg.

Inſerate: die einſpaltige Zeile 15 Pfg.

Amtliches Organ des Sonderausſchuſſes für Geflügelzucht der Landw. Kammer für die Prov. Brandenburg und der demſelben angeſchloſſenen Vereine.

Redaction:
Bruno Dürigen, Charlottenburg.

Der „Deutſche Geflügelhof" bringt alles Wiſſenswerthe auf dem Gebiete der landw. Nutzgeflügelzucht, ſowie rationellen Tauben- und Kaninchenzucht, auf den Sport dabei gebührend Rückſicht nehmend, belehrende Artikel für den Anfänger, Beſchreibungen und Abbildungen.

Probenummern koſtenlos durch die Geſchäftsſtelle

Otto Koobs Verlagsanſtalt,
Forſt i. L.

„Gef. Welt", 5 Jahrg. 1894/98 mit Originaleinband, tadellos gehalten, 12 *M.* 4 Jahrg. „Natur u. Haus" 6 *M.* verkauft

[1207] **Alwin Heinrich,** Zittau i. S.

Seewaſſer-Aquarien im Zimmer.

Von **Reinhold Ed. Hoffmann.**
Mit vielen Abbildungen. Preis Mk. 3.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

In unserem Verlage erschien:

Das Huhn als Nutzgeflügel.

Von
Dr. Karl Russ.
Zweite, reich illustrirte Auflage.
Preis M. 2.—; geb. 2.50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg

Für Beſitzer des

Handbuch für Vogelliebhaber

von **Dr. Karl Ruß**

in früheren Ausgaben ſtehen die dem Werke jetzt beigegebenen Illuſtrationen beſtehend in

28 Vollbildern fremdländiſcher Stubenvögel
(zu Band I) ſowie
25 Vollbildern einheimiſcher Stubenvögel
(zu Band II)

für den Preis von je nur 1 Mark

durch jede Buchhandlung, ſowie in der unterzeichneten Verlagsbuchhandlung ſelbſt zu Gebote.

Das **Illuſtrirte Handbuch** koſtet auch jetzt noch, wie bisher, für

Bd. I (Fremdl. Stubenv.) broch. 6.50, geb. 8 *M.*
„ II (Einh. Stubenv.) „ 6.—, „ 7.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.

Zeitschrift für Elektrotechnik und Maschinenbau,

Poſtzeitungsliſte 8178 a.

sowie für ***Metall- und Montanindustrie.*** •

Abonnementspreis: pro Monat 20 Pf. durch jede Buchhandlung, bei der Poſt 60 Pf. für das Vierteljahr.

Bereits erſchienene Nummern des Quartals werden koſtenlos nachgeliefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervorragenden Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und bereitet unendlichen Nutzen zu ſtiften.

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik und dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montaninduſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt, Alles, was [illegible] für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elektrotechnik und Maſchinenbau" ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in [illegible] leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle ſpeziellen Zweige der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des Auslandes hat die Zeitſchrift **zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute als Mitarbeiter,** welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues ꝛc. ſofort Kenntnis geben und über [illegible] Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten. Jede Nummer der Zeitſchrift wird daher eine Reihe **elektrotechniſch-wiſſenſchaftlicher und maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel** aus der Feder [illegible] Autoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten [illegible] eine größere Anzahl **kleiner Mittheilungen** aus dem [illegible] der Elektrotechnik, des **Maſchinenbaues** und der **Metall- und Montaninduſtrie** [illegible] durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und [illegible] welche neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die **Patentnachrichten,** die von uns ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den [illegible] über die neuen Erfindungen ꝛc. zu geben. Der **techniſche Briefkaſten** ertheilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden [illegible] zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner [illegible] Leitartikel, die eigens für die Intereſſen der [illegible] Unter der Rubrik „Kleine Handelsnachrichten, Mittheilungen" [illegible] alles dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau [illegible] Metall- u. Montaninduſtrie Bezug hat. Ebenſo finden die **Submiſſionen, geſchäftlichen Mittheilungen** ꝛc. ꝛc. eine gebührende Stätte in unſerem Blatte. — [illegible] *Unterhaltungsbeilage* [illegible] das Intereſſe mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt.

[illegible] wird die „Zeitſchrift für Elektrotechnik und Maſchinenbau, ſowie für Metall- und Montaninduſtrie" ein unentbehrliches Organ [illegible] die Beſitzer [illegible] und elektrotechniſcher Fabriken und Werkſtätten, [illegible] Hüttenwerke, Schloſſereien und anderen Gewerbe der Metallinduſtrie [illegible] für Ingenieure, Techniker und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.

Probenummern koſtenlos und franko von der
Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechnik u. Maſchinenbau,
ſowie für Metall- und Montaninduſtrie, *Leipzig.*

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 27.

Mittheilungen aus Centralamerika (Fortſetzung).
Die Sängergrasmücke (Sylvia orphaea, *Tm.*) als Stubengenoſſe.
Ein neuer Wanderzug des Roſenſtars (Sturnus roseus, *L.*).
Die Wachtel.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechſel.
An die Leſer.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

99er Ameiſeneier,

friſch getrockn., allerfeinſte, reinſte deutſche Ware, Lt. 90 ₰, 10 Lt. frco., do. 98er gute Ware, Lt. 65 ₰, Ko. 2,60 ℳ. Pa. friſche, nicht blau werdende Ameiſeneier, Lt. 1,50 ℳ, Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahren ſelbſt erprobt, Ko. 2 ℳ, 3 Ko. frco., ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- und Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 mit Sack. Prompte, gewiſſenhafte Bedienung.

Bitte beachten Sie meine Vogelofferte in Nr. 24 letzte Seite, alles noch vorhanden. Ferner beſitze ich den in Nr. 26 ausführlich beſchriebenen

Tovi-Schmalſchnabelſittich

in einigen vollſtändig fingerzahmen, abſolut geſunden, ſeit akklimatiſirten, gut befiederten, etwa ½ Jahr in meinem Beſitz befindlichen Pärchen, à Par 23 ℳ. [1208]

Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

Käfige
jeder Art
(Preisliſte gratis)
fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1209] **Oſchatz** i. S.

C. L. Flemming

Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1210]

Holzwaarenfabrik.

Holzwaarenfabrik.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Für alle Arten Vögel fertige ich **ſachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1211]

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 80 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1212]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Hermann Schramm's

mechaniſche

Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [1213]

Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 60 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [1214]

Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Ltr. 1 ℳ Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen,** M.-Gladbach 112.

Neu! Senſationell!

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. R.-M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [1215] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit f. Ref. zu dienen.



50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt.**
[1216] Waren i. Mecklenb.
Proſpekte gratis.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei.
R. Schröter (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1217]

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1218]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in **praktiſcher** Anordnung,
großer Auswahl u. billigem Preis. [1219]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!

August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Futtermittel.

Mehlwürmer, 1000 St. geg. Einſ. v. 1,70 in deutſch. Reichsp.-Mrkn. verſ. franko
[1220] **O. Waschinsky, Berlin NW, Wilsnackerſtr. 63.**

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 27. Magdeburg, den 6. Juli 1899. XXVIII. Jahrg.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Einführung fremdländiſcher Vögel.

Es gilt kein Prophet im eigenen Land, oder iſt es von mir nur Vorurtheil, wenn ich ſage, daß in Deutſchland wie in Guatemala die Vogelliebhaberei für fremdländiſche Vögel eine größere iſt, als die für die einheimiſchen. Hier zu Land hätte man ja nun einen großen Theil derjenigen Gattungen, welche in Deutſchland importirt werden müſſen, aber an den Vögeln des Landes findet der hieſige Liebhaber wenig Intereſſe. Es ſind ja die tagtäglichen Erſcheinungen des Vogelmarkts und für wenig Geld jederzeit zu haben. Dagegen machen die Extrangeros, wie ſie der hieſige nennt, einen ganz anderen Eindruck. Wie die Verhältniſſe in Deutſchland liegen, mag die Liebhaberei für ausländiſche Vögel ihre Erklärung darin finden, daß viele Sorten faſt das ganze Jahr hindurch das Pärchen für 3 bis 4 Mark zu kaufen ſind. Die überaus große Billigkeit geſtattet Jedermann das Vergnügen, ſich fremdländiſche Vögel zu halten. Dieſe Folgerung bekommt aber in Guatemala eine ganz andere Wendung, denn die großen Transportkoſten vertheuern den Vogel ungemein. Die nach hier eingeführten Vögel haben durchweg ihren Weg über San Franciſco gefunden, ganz gleich aus welchem Erdtheil der Vogel ſtammt. Im Preiſe ſtehen nach europäiſchem Maßſtab die Vögel Afrikas am höchſten, während die von Auſtralien am billigſten, aber immerhin noch theuer genug ſind.

Die weiteſte Verbreitung hat der Kanarienvogel gefunden; er wird regelmäßig hier eingeführt, theilweiſe ſogar über Panama. Oftmals kommen aber auch deutſche Kleinhändler, welche Kanarien und Goldfiſche verkaufen und für Europa meiſtens Amazonen einhandeln. Es iſt ja nichts Neues, daß der Kanarienvogel ſchon längſt ſeine Verbreitung über die gauge Erde gefunden hat und überall ſeine Liebhaber findet. In Guatemala wird das Hähnchen mit 20 bis 30 Mark bezahlt (ich wende überall die Umrechnung in Mark an, weil ſolches leichter verſtändlich und in der Wertbemeſſung ein richtigeres Bild gibt). Der hohe Preis einestheils und die leichte Züchtbarkeit andererſeits haben auch ſchon hieſige Liebhaber auf den Gedanken gebracht, den Kanarienvogel im Land zu züchten, und mir ſind in dieſer Saiſon drei Flugbecken bekannt geworden, welche insgeſammt mit etwa 50 Hähnchen beſetzt ſind. Die nach hier importirten Kanarien ſind durchweg deutſchen Urſprungs und kommen in Originalverpackung, in Harzer Bauerchen, hier an und werden mit dieſen auch weiter verkauft. Nächſt dem Kanarienvogel werden von Deutſchland der Diſtelfink, Edelfink, Hänfling, Zeiſig und der Gimpel herübergebracht. Die Preiſe dieſer fünf Vögel ſind ziemlich gleich. Je nach der Jahreszeit und der Einführung koſtet der Kopf 12 bis 18 Mark. Weichfutterfreſſer traf ich mit Ausnahme eines Rothkehlchens nicht.

In größerer Anzahl werden alsdann durch chineſiſche Kaufleute die japaniſchen Mövchen und Reisfinken eingeführt, von den letzteren allerdings vorherrſchend die reinweiße Abart. Im Preiſe halten auch dieſe Vögel gleiche Lage, und das Pärchen koſtet 20 bis 30 Mark. Zur Zeit iſt der Markt mit weißen Reisvögeln etwas überfüllt und ich ſah in einigen Vogelhandlungen mehr als hundert Köpfe.

Ferner werden Wellenſittiche zahlreich importirt, und dieſe Vögel finden, trotzdem der Preis von 30 bis 40 Mark fürs Pärchen ſehr hoch iſt, regelmäßig flotten Abſatz. Anfang April dieſes Jahres trafen 160 Köpfe hier ein, von denen die Hälfte in wenigen Tagen verkauft war. Zu den übrigen regelmäßigen Einführungen zählen alsdann noch Zebrafinken, Gürtelgrasfinken, Tigerfinken, kleine Elſterchen, ſchwarz- und weißköpfige Nonnen. Der Preis für das Pärchen dieſer Vögel iſt faſt durchweg 15 Mark. Ich wundere mich, daß der Gürtelgrasfink ſo oft ſeinen Weg nach hier findet. Dabei iſt dieſer Vogel ſtets im ſchönſten Gefieder und körperlich in beſter Beſchaffenheit. — Der rothe Kardinal wird auch hin und wieder von San Francisco gebracht, kommt aber auch ſchon als Zugvogel in Guatemala vor. Für gewöhnlich koſtet er 30 Mark. Vorübergehend erſcheint alsdann noch der Nymphenſittich, doch wird er ſelten in Paren, ſondern ſtets per Stück mit 15 bis 20 Mark verkauft.

Als beſonders werthvolle Vögel gelten ferner der Graupapagei und der große Gelbhaubenkakadu. Beide werden indeſſen nur ſelten herübergebracht und koſten, ohne daß ſie ſprechen können, 100 bis 200 Mark.

Die züchteriſche Thätigkeit der hieſigen Vogelliebhaber iſt nicht bedeutend. Außer bei Kanarien und weißen Reisfinken dürften keine Erfolge zu verzeichnen ſein.

Die Artenzahl aller nach hier eingeführten Vögel iſt allerdings recht beſcheiden, aber immerhin für die hieſigen Verhältniſſe ausreichend. Würden erſt beſſere Verkehrswege, Eiſenbahnen, die Küſte des atlantiſchen Oceans mit der des ſtillen Oceans verbinden, würde noch ſo manches eingeführt, aber auch ausgeführt werden können. So lange aber die Vögel 6 Tage und länger auf den Rücken der Maulthiere oder der Indianer transportirt werden, durch Gegenden, wo kaum für den Menſchen das Nothdürftigſte beſchafft werden kann, wird ſich die Ein- und Ausfuhr in kleinen Grenzen bewegen müſſen.

(Fortſetzung folgt.)

* * *

Die Sängergrasmücke (Sylvia orphaea, *Tem.*) als Stubengenoſſe.

Von Fr. Anzinger.

Seit einigen Jahren ſchon warte ich vergeblich auf eine eingehendere Mittheilung aus der Feder eines bewährten und verläßlichen Vogelwirths über den Geſangswerth, ſowie über die Eingewöhnung und weitere Verpflegung der Sänger- oder Orpheusgrasmücke. Zum Mindeſten durfte ich annehmen, daß ſich unter den zahlreichen Leſern der „Gefiederten Welt“ einmal Jemand findet, der dieſes Thema wenigſtens nach allgemeinen Geſichtspunkten behandeln würde.*) Soweit mir nun noch andere Fachlitteratur zur Verfügung ſteht, konnte ich auch in dieſer nichts derartiges finden, und es ſcheint ſomit, daß bei der Haltung und Pflege dieſes Vogels noch kein vollkommen günſtiges Ergebniß erzielt wurde, und analog auch über die Geſangsleiſtung kein endgiltiges Urtheil abgegeben werden konnte. (Vergleiche auch die Mittheilungen auf den in der Fußnote angeführten Buchſeiten dieſer Zeitſchrift.)

Ich ſelbſt habe dieſen Vogel noch nicht beſeſſen, doch mehrmals, namentlich in der letzten Zeit, Gelegenheit gehabt, denſelben bei anderen Liebhabern beobachten zu können. Beſonders die im Beſitz unſers Schriftführers Herrn Teiſer befindliche Orpheusgrasmücke konnte ich eingehender ſtudiren. Da ſich der genannte Herr zu einer Veröffentlichung ſeiner Erfahrungen nicht entſchließen kann, will ich es auf freundliche Einladung des Herrn Dr. Ruß verſuchen, meine Beobachtungen und erhaltenen Mittheilungen hier wiederzugeben. Vielleicht gibt dieſes Wenige Veranlaſſung zu weiteren Erörterungen, welchen die Leitung der vorliegenden Zeitſchrift gewiß gern Raum geben wird.**)

Die in den ſüdöſtlichſten Theilen Mitteleuropas, in Südeuropa und Nordafrika heimiſche, auch noch in Belgien vorkommende Sängergrasmücke iſt ein ſtattlicher Vogel von nahezu Nachtigalengröße. Beim adulten Männchen ſind Oberkopf und Kopfſeiten mattſchwarz, beim Weibchen und Jungen grauſchwarz; der Hinterkopf iſt graubraun, die übrige Oberſeite fahlbraungrau, die Backen ſind bläulichweiß, die Unterſeite iſt weiß mit roſtgelblichem Anflug; die Steuerfedern ſind braunſchwarz, die äußerſten mit weißer Spitze und Außenfahne; der Unterſchnabel iſt an der Wurzel braungelb.

Die Urtheile über den Geſang dieſes Vogels ſind in auffälliger Weiſe verſchieden, und es ſollen einzelne derſelben, von denen ich Kenntniß habe, hier nebeneinander geſtellt werden.

A. E. Brehm fertigt die Sängergrasmücke in Bezug auf ihren Geſang kurz ab, indem er ſagt: „Ich habe den Vogel ſehr oft in Spanien gehört, ihn aber niemals mit dem Mönch oder der Gartengrasmücke vergleichen können“. — Dr. König, welcher dieſen Vogel in Tunis beobachtete, äußert ſich folgendermaßen: „Ich halte ſeinen Geſang für den ſchönſten und anmuthigſten aller Grasmücken. In jeder Strofe herrſcht eine Fülle der wohlklingendſten Töne vor, die ſehr kräftig vorgetragen werden und weit vernehmbar ſind. Dabei wird der Vogel nicht müde zu ſingen, als wüßte er, wie gern ſeine ſchönen Geſangsweiſen gehört werden. Gewöhnlich auf einem Olivenzweig aufrecht ſitzend, nimmt er die Kehle ſo recht voll, bläſt ſie auf, daß die Kehlfedern abſtehen und bringt nun die köſtlichſten Töne hervor, die unter dem Schatten der Oelbäume dem müden Wanderer wunderbar kräftigend und ermuthigend entgegenſchallen.“ — A. v. Homeyer hat den Sänger als Käfigvogel abgehorcht und gibt folgende Aeußerung ab: „Der Geſang

---

*) Bruchſtückweiſe Mittheilungen, namentlich kurz ſkizzirte Geſangsbewerthungen finden ſich auf Seite 251 vom Jahr 1897, Seite 48, 122, 131, 170 und 201 vom Jahr 1898 der „Gefiederten Welt“.

**) Selbſtverſtändlich mit Freuden. D. L.

nach und Rauſch bezeichnet ſie kurzweg als Miſcher. Hierin hätte man bereits einen Beleg für die Verſchiedenheit der Urtheile. Kommen ſchon bei ſogenannten Original- oder Charakterſängern gut merkbare Abweichungen im Vortrag ihrer Lieder vor, ſo treten ſolche Unterſchiede bei den Miſchern, d. h. ſolchen Vögeln, welche die Pfiffe, Rufe und einzelnen Strofen anderer Vogelarten nachahmen, bzl. ihr Lied damit bereichern, um ſo ſchärfer hervor, weil nicht alle zu den Miſchern gehörigen Individuen die Auffaſſungs- und Nachahmungsgabe, ſowie die Gelegenheit haben, fremde Weiſen annehmen und kopiren zu können. Deshalb gibt es gerade unter den Miſchern, wie mancher erfahrene Vogelliebhaber ſchon erfahren haben wird, die meiſten und die elendeſten Stümper. Dies dürfte auch bei der Orpheusgrasmücke der Fall ſein, denn daß gerade die Käfigung — ich ſpreche hier nur von einer ſachgemäßen — und ihre Begleitumſtände einen ſo verderblichen Wechſel in der Geſangsleiſtung dieſes Vogels hervorbringen ſoll, kann ich nicht gut glauben. Sie kann den Geſang nur inſoweit beeinfluſſen, als ſie die Kraft und das Feuer des Sängers herabmindert und ſo einzelne Theile des Lieds nicht zur vollen Geltung kommen läßt, aber ummodeln kann ſie denſelben nicht.

Im Zuſammenhang mit dem hier Erwähnten ſteht auch die Art und Weiſe der Erlangung, bzl. des Fanges und Verſandts dieſes Vogels. Wie oben erwähnt, kann derſelbe kaum mehr zu unſerer mitteleuropäiſchen Ornis gerechnet werden, und dort, wo er ſeine Heimat hat, geſchieht der Fang nicht wie bei uns planmäßig für beſondere Liebhaberei. Unter letzterm iſt nämlich zu verſtehen, daß die Vögel einer Art vor ihrer erſten Brutzeit im Frühling auf ihren Geſang hin geprüft, die beſten in's Auge gefaßt, gefangen und, falls ſie als Verkaufsobjekte dienen, transportfähig eingewöhnt und verſchickt werden.

(Fortſetzung folgt).

Ein neuer Wanderzug des Roſenſtars (Sturnus roseus, *L.*).

Wie die Direktion des Agramer zoologiſchen Muſeums dem „Agramer Tagblatt" mittheilt, hat ſich in dieſem Jahr in Kroatien abermals der Roſenſtar gezeigt, der von ſeiner Heimath Centralaſien aus bekanntlich von Zeit zu Zeit unregelmäßige Wanderzüge nach Europa unternimmt. Der letzte derſelben fand im Jahr 1890 ſtatt. Wir bitten daher alle unſere Leſer, zumal in Oeſterreich-Ungarn und Süddeutſchland, wenn ſie dieſen intereſſanten Vogel in der Freiheit beobachten ſollten, uns freundlichſt davon Mittheilung zu machen. Der Roſenſtar iſt an Kopf, Hals, Flügeln und Schwanz ſchwarz, im übrigen Gefieder roſenroth. D. L.

Die Wachtel.

Von A. Reuter.

Auch über dieſen, dem Hühnergeſchlecht angehörenden Vogel möchte ich, um der gewiß großen Zahl von Wachtelliebhabern entgegen zu kommen, in der „Gefiederten Welt" meine ſeit vielen Jahren geſammelten Erfahrungen mit dieſer Vogelart kund geben, und es ſollte mich freuen, den Wachtelliebhabern damit dienen zu können, ſowie ich auch damit diejenigen Vogelfreunde, die noch keine Wachtel gehalten haben, dazu aufmuntern möchte. Die Wachtel iſt ein äußerſt anſpruchsloſer und reinlicher Vogel. Anfangs wol ſehr ungeſtüm, wird ſie jedoch ſchon nach kurzer Zeit ganz zahm, ſodaß ſie von ihrem Pfleger dargereichtes Futter, hauptſächlich Mehlwürmer, aus der Hand nimmt. Sie iſt ja kein Singvogel, doch klingt ihr Ruf ſehr angenehm. beſonders wenn der Käfig vor das Fenſter geſtellt wird, oder in einem hohen Zimmer oder Gang hängt. Es iſt bei den einzelnen Individuen ſehr verſchieden, wie oft ſie ihren Ruf, der ſich ungefähr durch die Silben hui-hui wit! ausdrücken läßt. hintereinander hören laſſen, manche drei bis fünf Mal, die Beſten neun Mal. Morgens früh und abends ſchlägt ſie mehr als während des Tags, und bei großer Hitze meiſt gar nicht. Sie iſt ein zuverläſſiger Wetterprophet. Schlägt ſie z. B. zu irgend einer Tageszeit unaufhörlich fort, ſo kann man ſicher darauf rechnen, daß in einigen Stunden ein Gewitter kommt, badet ſie dabei auch viel im Sand, ſo gibt es einen Landregen. Während eines Gewitters ſchlägt ſie unaufhörlich fort, und zwar ſo laut und ſtark, als wollte ſie das Rollen des Donners übertönen. In vielen Gegenden Bayerns, beſonders in Mittelfranken, wird ſie hauptſächlich als Wetterprophet gehalten, und die Landleute richten ſich in der Erntezeit nach dem Wachtelſchlag.

Ihr Fang geſchieht mit der Locke (dem nachgeahmten Ruf des Weibchens) und dem Steckgarn. Der Fänger begibt ſich mit ſeinem Zeug in das Feld und hört die Hähne ab. Dann ſucht er ſich den beſten, alſo denjenigen, der am häufigſten hintereinander ruft, heraus. Er kann auch mit Beſtimmtheit darauf rechnen, daß er dieſen fängt, wenn er ſein Garn dort anbringt, wo der Hahn gerufen hat; jedoch muß er ſich nach dem Wind richten, wie der Jäger bei der Rebhühnerjagd. Iſt jedoch alles glatt, und der Ruf des Weibchens täuſchend nachgemacht, ſo läuft der Hahn in wenigen Minuten in das Garn. Ein einziger Mißton oder ein Verſagen des Lockinſtruments bringt ihn zur Umkehr, und dann iſt er „vergrellt" und nicht mehr leicht zu täuſchen. Geſchulte Fänger jedoch wiſſen ſeiner auch da noch habhaft zu werden, indem ſie ſich auf die andere Seite ſtellen und den Hahn dann förmlich in das Garn treiben. Leider werden dieſe anmuthigen Thiere, hauptſächlich in Italien, zu Tauſenden in großen Treibgarnen gefangen und zum Verſpeiſen in aller Herren Länder verſchickt. Jedoch iſt dagegen eben nichts zu machen, da die Wachtel zum jagdbaren Wild zählt. Obwol der Braten ein ſehr kleiner, ſo iſt er doch zu den feinſten Biſſen zu zählen, und wird zum Glück nur bei ausgeſuchten Diners gegeben. Die Italiener verſtehen die Wachteln auch gut zu mäſten, und zwar mit gequellter Hirſe. Des Nachts iſt der Raum, wo die Wachteln ſtehen, beleuchtet, ſodaß dieſe jederzeit Futter zu ſich nehmen können. Auf dieſe Weiſe wird die Wachtel, die ohnedies zur Fettſucht neigt, in kurzer Zeit wie in Speck gewickelt. Dann iſt ſie zum Braten oder zum Verſandt fertig. Es kommt häufig vor, daß ſich eine Wachtel ganz unwillkürlich fängt, und zwar aus verſchiedenen Urſachen. Wird ſie z. B. am Tage von einem Raubvogel verfolgt, ſo fliegt oder läuft ſie, wenn Menſchen in der Nähe ſind, direkt auf dieſe zu und ſucht ſich zu verbergen, oder ſie läuft unter eine Herde Schafe oder Kühe, die ſich auf der Weide befinden, um ſich den Fängen des Hühnerhabichts zu entziehen. Oft kommt man auch auf ganz unerwartete Art in den Beſitz einer Wachtel. Die Vögel ſtreichen des Nachts über Dörfer und Städte oft ſehr niedrig dahin, wobei ſich viele an Telegraphen- und elektriſchen Leitungen beſchädigen und töten. Andere wieder fliegen dem Licht zu, ſodaß oft einzelne direkt bei offenem Fenſter in das hell erleuchtete Zimmer gelangen. Auch auf Bahnhöfen mit elektriſcher Beleuchtung laſſen ſie ſich nieder. In Bern (Schweiz) ſah ich eine Wachtel durch das Gitter der Fallthür in einem Abwaſſer-Kanal. Wie ſie da hinein kam, war mir ein Räthſel. Im Jahre 1887, es war im Monat Auguſt, war ich gegen 10 Uhr abends im Hof eines Hotels in Bamberg, als gerade der Hotelomnibus zur Abfahrt nach dem Bahnhof bereit ſtand. Plötzlich kam etwas aus der Luft geflogen und zwiſchen die Pferde hinein. Als wir mit der Laterne auf den Boden leuchteten, ſahen wir einen Vogel weglaufen, und gerade dem offenen beleuchteten Stall zu. Wir folgten ihm und fanden unter der Pferdekrippe eine Wachtel. Dieſe wurde natürlich von dem Stallperſonal für ein Rebhuhn gehalten, in die Küche gebracht und zum Tode verurtheilt. Aber meine Bitte, das Thierchen mir zu überlaſſen, das ich lebend behalten wollte, wurde mir gern gewährt. Ich brachte es auf mein Zimmer und ſetzte es über Nacht in einen Korb. Am andern Morgen verſchaffte ich mir den nöthigen Käfig, und meine Wachtel hatte Begnadigung gefunden. Wer könnte auch ein ſo ſchönes Thier kalten Bluts umbringen? Gewiß kein fühlender Menſch! Ich hatte nun dieſe Wachtel bis zum nächſten Frühjahr, ohne zu wiſſen, ob es ein Hahn oder eine Henne ſei. Doch dies genirte mich nicht. Ich bin in dieſer Hinſicht viel zu ſehr Vogelfreund. Eines ſchönen Morgens nun, und zwar an keinem geringeren als am Oſterſonntag, ließ mein Thierchen ſein „bui bui wit!“ zum erſten Mal hören, fünf bis ſechs Mal hintereinander. Bald rief es aber bis neun Mal; alſo hatte ich obenein noch einen Hauptſchläger. Es war ſomit meine Ausdauer glänzend belohnt worden, beſonders da der Vogel auch fingerzahm wurde. Ihr Käfig hing meinem Bett gegenüber. Wenn ich nun des Morgens aufſtand, ſo ſprang die Wachtel in das Erkerthürmchen ihres Käfigs, um ihre Gabe Mehlwürmer aus meiner Hand in Empfang zu nehmen. Sie war auch ein zuverläſſiger Wecker, denn vor Tagesanbruch fing ſie immer zu ſchlagen an. Leider ging ſie mir nach vierjährigem Beſitz an Verfettung zu Grunde. Sie lag eines Morgens tot im Käfig. Bei der Sektion konſtatirte ich eine fingerdicke Fettſchicht; auch Herz, Leber und Eingeweide waren ganz in Fett gehüllt. Ich hatte ſie zu gut gefüttert. Eine Wachtel ſoll man von Zeit zu Zeit auf ihr Fett hin unterſuchen. Sobald ſie ſich butterweich anfühlt, laſſe man ſofort jede Sämerei weg und gebe ihr nur Grünzeug, als Kohl, Wirſing, Vogelmiere, klein zerſchnittene Gras- und Getreidehälmchen u. a., nur ab und zu einige Weizen- oder Hirſekörner, bis ſie wieder abgemagert iſt. Dann gebe man ihr allmählich alle möglichen Sämereien, ihr volles Futter, wieder, dabei aber immer Grünes. Täglich einige Mehlwürmer, ſowie im Frühjahr friſche Ameiſenpuppen bringen ſie frühzeitig zum Schlagen, doch gebe man ihr von beiden Reizmitteln nicht zu viel, ſonſt wird ſie zu „frech“ und ſchlägt ſich zu Tode. Krankheiten iſt die Wachtel nach meiner Beobachtung in der Gefangenſchaft mit Ausnahme der ſchon erwähnten Fettſucht nicht unterworfen, bisweilen allerdings auch der Darre oder Abzehrung. Bei letzterer iſt leicht zu helfen, indem man die Fettdrüſe des Vogels am Bürzel behutſam ausdrückt, aber ja nicht auſſticht oder gar wegſchneidet. Ich nehme bei dieſer Operation den betreffenden Vogel in die hohle Hand, blaſe die Bürzelfedern zurück, lege unter die Fettdrüſe etwa ein beinernes Papiermeſſer und drücke dann die Fettdrüſe mit einem glattgeſchnitzten Hölzchen behutſam und ſachte auf, träufle einen Tropfen Olivenöl oder etwas Butterſchmalz darauf, und die Sache iſt erledigt. Infolge von ſchlechter Ernährung und damit verbundener Erkältung, die ſich die Wachtel leicht zuzieht, wenn z. B. der Käfig vor dem Fenſter hängt, und das Dach des Käfigs nicht waſſerdicht iſt, ſodaß der Vogel unausgeſetzt im Regen iſt, kann auch Typhoid eintreten. Ferner möchte ich die Wachtelbeſitzer noch auf einen andern Umſtand aufmerkſam machen. Da die Wachteln zur Zugzeit ſehr ungeſtüm im Käfig umhertoben, ſo brechen die meiſten einen oder beide Flügel, in der Regel am Ellbogengelenk. Man wird dies bei einiger Aufmerkſamkeit leicht gewahr, da der Vogel dann den gebrochenen Flügel nicht mehr oben zu halten vermag, ſondern ihn gleich einem Schleppſäbel nachſchleift. Ich legte in ſolchen Fällen einen Verband an. Sobald ich gewahr wurde, daß ein Flügel gebrochen war, pinſelte ich die Bruchſtelle mit Bleieſſig, um die Hitze wegzubringen, eine Stunde lang ein; darnach legte ich einen Nothverband an, bis der Flügel trocken war. ~~Nun nahm ich den Verband wieder ab, und pinſelte mit~~ Arnikatinktur wieder während einer Stunde ein (dieſes Mittel iſt nämlich in ſolchen Fällen vorzüglich), hiernach umgab ich die Bruchſtelle mit Tiſchlerleim und legte einen dauernden Verband von ſteifem Pappdeckel an. Ueber den Rücken machte ich einen Sattel, um den Flügel in die richtige Lage bringen zu können; endlich band ich noch mit Bindfaden die Spitzen der beiden Flügel zuſammen, damit der Patient dieſe nicht bewegen konnte. Nach 14 Tagen entfernte ich regelmäßig den Verband, und der Flügel war jedesmal tadellos geheilt. Es iſt ja eine mühevolle Arbeit, bis ſo ein Verband richtig angebracht iſt, doch wird man auch darin geübt, und wer ſeine Thiere liebt, und ihnen ein wahrer Freund und Beſchützer iſt, der wird auch die größte Mühe nicht ſcheuen, auf irgend welche Art, wenn nöthig, helfend einzugreifen.

Der Käfig, in dem man die Wachtel beherbergt, iſt ja zur Genüge bekannt. Deſſen ungeachtet will ich eine kurze Beſchreibung von ihm geben. Seine äußere Anſicht iſt gewöhnlich die eines Häuschens, entweder mit doppeltem Dach, oder nach Art einer Sennhütte gebaut. Da iſt nun entweder die Rückwand des Käfigs höher, ſodaß das Dach auf der Lichtſeite einige Centimeter Gefäll hat, oder es bleibt auf der Lichtſeite höher und das Gefäll wird auf die Rückwand verlegt. Dies ſind nur Geſchmacksſachen, und dem einen gefällt dieſes, dem andern jenes. Beim Gebrauch ſind alle gleichviel werth. An der Lichtſeite befindet ſich ein Erkerthürmchen, welches ſo hoch ſein muß, daß ſich die Wachtel vollſtändig in die Höhe richten kann, und dies thut ſie beim Schlagen, und geht dabei jedes Mal in den Erker. Dieſes Erkerthürmchen, ſowie das Dach des Käfigs müſſen inwendig unbedingt weich, gleichviel mit welchem Material, ausgepolſtert ſein, denn während des Schlagens ſtößt die Wachtel jäh in die Höhe, und würde ſich den Kopf ſicher einſtoßen, wenn die Decke nicht weich wäre. Ich ſah ſchon viele Wachteln bei den Liebhabern mit kahlen blutrünſtigen Köpfen, und fand bei näherer Beſichtigung des Käfigs, daß die Decke einfach aus Holz war und jeder Polſterung entbehrte. Dies iſt jedoch ſehr fehlerhaft, und man ſoll die geringe Mühe nicht ſcheuen, den Wachtelkäfig auszupolſtern, denn bei der Wachtel iſt eine harte Decke ebenſowenig gut angebracht, wie bei Lerchen und allen übrigen Weichfreſſern. Der Sprunghölzer bedarf die Wachtel nicht. Der Käfig mit einfachem Dach habe 40 bis 45 cm in der Länge, 25 cm in der Höhe und 25 cm in der Tiefe. Er habe eine Schublade zum Reinigen von 10 cm Höhe, und dieſe ſei am beſten aus Zinkblech gemacht; es ſchadet aber auch nicht, wenn ſie aus Holz iſt, da die Exkremente der Wachtel trocken ſind und von der dicken Sandlage ſofort eingehüllt werden. Es iſt ſchließlich gleich, wo die Schublade angebracht wird, am beſten entweder auf der Seite oder an der Vorderfront. Futter- und Waſſergeſchirr iſt bei dieſem Käfig am bequemſten auch an der Seite angebracht, und zwar ſoll es auf einer kleinen Bank ſtehen, die nach innen gewendet iſt. Zum Ein- und Ausnehmen derſelben muß er mit einem Fallthürchen verſehen ſein. Die Hauptthür für den Vogel, um ihn aus- und einzulaſſen, kann entweder auf der entgegengeſetzten Seite oder an der Rückwand angebracht ſein. Links und rechts von dem Erkerthürmchen ſchneide man ein hübſches Bogenfenſter, welches man mit Draht oder Holzſtäbchen vergittert, aus. Schließlich ſtreicht man den ganzen Käfig mit Oelfarbe an, und zwar das Dach ziegelroth (es können da auch die Ziegel mit der Oelfarbe markirt oder aus Holz geſchnitzt und aufgenagelt werden) und die Wände ſelbſt mit blauer, grauer oder beliebiger Farbe. An den Fenſtern bringe man aus dünnen Brettchen Läden an, welche man in der Regel grün anſtreicht. Solch ein Häuschen nimmt ſich ſehr gut aus und iſt wetterfeſt. Man bringe aber den Vogel erſt hinein, wenn der ſtarke Geruch der Oelfarbe vollſtändig beſeitigt iſt, denn dieſer iſt allen Vögeln zuwider. Man ſetze deshalb den leren Käfig eine Zeit lang der friſchen Luft aus, denn wenn die Oelfarbe vollſtändig eingetrocknet iſt, ſo iſt auch der ſtarke Geruch verflogen. Der Käfig mit doppeltem Dach kann mehr im Quadrat als länglich gebaut ſein, und betrage 35 cm im Quadrat; Seitenhöhe 25 cm, Mittelhöhe 30 cm. Die übrige Einrichtung ſei die gleiche wie bei erſterm.

Die Mauſer geht bei der Wachtel ohne weiteres leicht von ſtatten. Man füttere ſie jedoch während dieſer etwas kräftiger als gewöhnlich und reiche ihr unter das übrige Geſäme gemiſcht auch Hanfkörner und Mohn, jedoch nicht zu viel, außerdem hartgekochtes geriebenes Hühnerei, Ameiſenpuppen und Mehlwürmer, gekochtes klein geſchnittenes Rindfleiſch, auch Rinds- oder Kalbsherz, welches man am beſten mit Morrübe und Semmel miſcht. Auch Käſequark liebt ſie. Ueberhaupt nimmt ſie allerlei Hausmannskoſt, wenn nur nicht zu ſtark gewürzt oder zu ſcharf geſalzen. Davor möchte ich warnen, denn es iſt unbedingt ſchädlich. Die Grieben vom ausgeſottenen Schweinefett klein zerſchnitten nimmt ſie ſehr gern als Fleiſchfutter an.

Im Ganzen genommen iſt die Wachtel ein ſehr intelligenter und angenehmer Stubenvogel. Obwol immer etwas ſcheu umherſchauend, iſt ſie doch im Käfig bald zu Haus. Ihr ganzes Betragen gleicht dem des Rebhuhns. In entſprechend großer Gartenvoliere ſind auch Züchtungsverſuche von Erfolg. Jedoch ſoll ein Hahn drei bis ſechs Hennen erhalten; mit einer Henne würde man nie zu Reſultaten gelangen, da der Hahn gleich wieder verderben würde, was er gut gemacht hat. Der Wachtelhahn lebt in Polygamie und würde eine einzelne Henne zu Tode martern bei ſeinem vielen Verlangen nach Geſchlechtsbefriedigung. Man findet ſogar oft im Freien Wachtelhennen mit kahlen blutrünſtigen Köpfen und zerrupftem Gefieder, und dies machen die Hähne. Es finden oft hitzige Kämpfe unter den Hähnen ſtatt, wobei der Stärkſte Sieger bleibt. Bei etwaigen Züchtungsergebniſſen verſehe man ſich mit einer genügenden Menge von Ameiſenpuppen, da die jungen Wachteln dieſer mindeſtens zwei Monate lang ausſchließlich als Nahrung bedürfen. Hat man nicht genügend Puppen der Waldameiſen zur Hand, ſo thun die der Feld- oder Sandameiſen die gleichen Dienſte. Die Wachteln verzehren die Ameiſen ſammt den Puppen. Man thut indeſſen gut, die Feldameiſen vor der Fütterung anfangs ſammt dem Sand in einer auf Kohlenfeuer erhitzten Pfanne zu röſten, bis ſämmtliche Ameiſen abgetötet ſind, was in der Regel ſchnell geſchieht, beſonders wenn man die Pfanne nach Art des Omelettebackens ſchwingt und dabei die ganze Maſſe umwendet. Der Sand wird ſo ſchnell erhitzt, wodurch die Ameiſen keine lange Qual zu erdulden haben; die Puppen werden auf dieſe Weiſe ebenfalls gedörrt. Wendet man den Inhalt der Pfanne nicht auf eben beſchriebene Art um, ſo laufen die armen Thiere eben ſo lange auf der Oberfläche umher, bis auch da die Hitze ſo groß wird, daß ſie ſterben. Dies Verfahren wäre einerſeits eine zu große Quälerei, und andererſeits würden die unten in der Pfanne befindlichen Puppen auch anbrennen. Wenn die jungen Wachteln acht Tage alt ſind, kann man ihnen die Ameiſen lebend vorwerfen. Dann reiche man auch Hirſe, Weizen und andere Sämereien, ſowie auch Grünzeug.

Sobald die Hennen zu legen beginnen, entferne man den Hahn aus der Voliere mittels eines Fangkäfigs oder eines Garns, damit die brütenden Hennen nicht mehr geſtört werden, und man nicht Gefahr läuft, alle gehabte Mühe unbelohnt zu ſehen. Die Voliere ſelbſt ſei mit allem möglichen Buſchwerk ausgeſtattet, wie auch mit Farrnkraut, Epheu, Roßkartoffeln, Welſchkorn, Erbſen, Weizen, Buchweizen ꝛc. bepflanzt, um den Hennen lauſchige Brutplätze zu bieten. Selbſtredend muß auch für genügend Waſſer geſorgt ſein. Auch bringe man auf der von der Mittagsſonne beſchienenen Seite einen Haufen feingeſiebten Flußſand, mit Wald- oder Haideerde vermiſcht, an, worin die Wachteln ihr Badebedürfniß befriedigen können. Wer ſich dieſer Mühe unterzieht und es ſich leiſten kann, wird ſicher befriedigende Zuchtergebniſſe erzielen. In dieſe Voliere kann man auch einige Pare unſerer Weichfutter- oder Körnerfreſſer ſetzen, oder auch ein Par Gold- oder Silberfaſanen, oder einen Rebhahn mit einigen Hennen. Die Vögel ſtören ſich gegenſeitig nicht im geringſten, ſondern das Unternehmen geſtaltet ſich um ſo intereſſanter.

Briefliche Mittheilungen.

... Zum Artikel der Frau Siegmund möchte ich aus meiner langjährigen Erfahrung einiges beifügen. Einſt fand ich morgens meinen wunderſchönen Orangeweber am Boden mit kläglich zerbiſſenem Bein, das nur noch an einem Fetzen Haut hing. Offenbar eine Leiſtung meiner Reisfinken. Ich befand mich in einer Zwangslage, da ich mutterſeelen allein zu Hauſe war, mir alſo Niemand bei der von mir gedachten Heilthat helfen konnte. Ich fing den armen Kerl heraus, der mich wüthend biß, renkte das zerbiſſene verdrehte Bein zuſammen bis die Bruchränder genau ſich berührten, umwickelte ſodann das Bein mit weichem Stopfgarn, auf welches ich einige Tropfen Gummi arabicum goß; dann machte ich Schindeln vom Holz einer Schwedenſchachtel, umwand auch dieſe mit Stopfgarn nebſt Guß von Gummi. Dann ſetzte ich den Vogel in einen kleinen Käfig, aus dem ich alle Stäbe herausnahm, belegte den Boden mit Mos, flachen Steinen und Rindeſtückchen und hatte die Freude, nach acht bis zehn Tagen den Vogel wieder richtig hüpfen zu ſehen. Nun nahm ich in warmem Waſſer den Verband ab und fand ein tadellos verheiltes Bein. Der Vogel iſt noch ſieben Jahre eine Zierde meiner Sammlung geweſen. Eine ähnlich gute Kur habe ich ſeither allerdings nicht mehr aufzuweiſen gehabt, da meine neueren Patienten meiſt Papageien waren, deren ungemein kurze Beinchen viel ſchwerer zu behandeln ſind und mehr noch, da deren Schnabelleiſtungen jeder Verband erliegt. Doch erzielte ich in den meiſten Fällen wenigſtens, daß das Bein erhalten blieb, wenn auch die Zehen in Verluſt geriethen, das Thier jedoch ungemein behend hüpfte und kletterte.

Meine Blutſchnabelweber brüten wieder (3 Eier bis heute). Der Erſtgeborene, der erſte in Deutſchland Gezüchtete, fängt jetzt an, in Pracht zu kommen (3. Jahr). Er iſt ein unglaublicher Krakehler und Nichtsnutz. Von Wellenpapageien, Hüttenſänger und Helenafaſänchen iſt die Brut ausgeſchlüpft. Mein lieber Organiſt iſt leider in Folge der kalten Witterung tot.

Frau von S.

... Nehmen Sie dies als Beweis dafür, daß ich auch in der nördlichſten Stadt Schwedens an die „Gefiederte Welt“ denke, und Beobachtungen anſtelle, um ſpäter den geehrten Leſern etwas mittheilen zu können. Das Wetter iſt augenblicklich ſehr ſchön warm, ſodaß man ſich nicht im nördlichen Klima fühlt, vielmehr als wäre man in den Südalpen. Aber die Vegetation iſt noch nicht weit gediehen; Bäume und Sträucher fangen erſt an, grün zu werden. Im großen Ganzen zeigt ſich das Vogelleben ſehr arm hier, trotz der prächtigen Fichtenwaldungen, im Verhältniß zu Norwegen. Auch Möven und Lummen ſind wenig hier. Ich werde noch von Gellivara zu Fuß und mit Kähnen nach Norwegen wandern.

Joſef Wagner.

... Hierdurch mache ich Ihnen die ergebene Mittheilung, daß heute, den 22. Juni, der erſte junge Graupapagei ausgeſchlüpft iſt. Ich erwarte beſtimmt, daß die anderen beiden folgen werden. Das Weibchen füttert ſchon fleißig mit Ei und altem Weißbrot.

Frau Lotze.

... Ich theile Ihnen gleichzeitig mit, daß hier, in einer Stadt von über 5000 Einwohnern, nur höchſtens 15 Schwalbenpare herumfliegen, während vor 40 Jahren an jedem Hauſe zwei bis ſechs Neſter waren. Auch auf den Feldern ſieht man ſelten eine Schwalbe, und alle ſind Rauchſchwalben, keine einzige Hausſchwalbe. Den Thurm unſerer über 500 Jahre alten Kirche umſchwärmten früher Hunderte von Mauerſchwalben (Cypselus apus), jetzt vielleicht 15 bis 20.

Dr. Poſchmann, Sanitätsrath.

... Ihnen die ergebene Mittheilung, daß ich am 28. Juni ein Zaunkönigneſt, enthaltend einen etwa 14 Tage alten Kukuk mit dem alten Zaunkönig erhalten habe. Es iſt ſehr intereſſant zu beobachten, wie der kleine Zaunkönig dem jetzt ſchon ziemlich großen Kukuk fleißig die friſchen Ameiſeneier und Mehlwürmer zuträgt.

Wilh. Greite.

Anfragen u. Auskunft.

Fräulein C. Lattermajer: Spritzen Sie dem Graupapagei das Gefieder mit einer Miſchung von lauwarmem Waſſer und Cognak (auf ein Waſſerglas voll Waſſer ein Spitzglas voll Cognak) täglich mittelſt des Rafraichiſſeurs gründlich durch. Selbſtverſtändlich müſſen Sie ihn dabei vor Erkältung hüten. Bedecken Sie nach dem Abſpritzen ſeinen Käfig ſorgfältig mit einem Tuch, das Sie erſt allmählich wieder fortnehmen.

Herrn Dr. Poſchmann, Sanitätsrath: Ihren Wunſch, Herrn Reuter aufzufordern, den in ſeinem Artikel erwähnten Schlafkäfig zu beſchreiben, habe ich erfüllt. Ihre Frage inbetreff der Nachtigalen muß ich mit nein beantworten. Die beiden Vögel würden ſich befehden.

Herrn Caspari: Das Weibchen der chineſiſchen Zwergwachtel zeigt ſich leider häufig recht wenig brütluſtig. Ich würde Ihnen nun rathen, ſobald das Ihrige wiederum Eier gelegt hat, den Hahn herauszufangen, ihn aber wieder zum Weibchen zu ſetzen, ſobald die Jungen ausgeſchlüpft ſind.

Herrn F. Schalaudek: 1. Füttern Sie den jungen Thurmfalken mit Kerbthieren aller Art, mit Schneckenarten, friſchem, rohem Rindsherz und auch anderem rohem, aber auch gekochtem Fleiſch, ſowie allerlei Abfällen. Hin und wieder, beſonders ſpäterhin, geben Sie ihm ein Mäuschen. Da er erkältet iſt, reichen Sie ihm vorläufig lauwarmen, täglich friſch gekochten Haferſchleim ſtatt Waſſer und hüten Sie ihn vor Kühle, beſonders Naßkälte. 2. Der Thurmfalk wird in der Gefangenſchaft ſehr zahm und anhänglich, iſt überhaupt als angenehmer Zimmergenoſſe ſehr zu empfehlen.

Herrn James Mc. Gregor, Vize-Konſul, Philippopel: Baden Sie den Fuß des Sonnenvogels täglich in warmem Seifenwaſſer, dann in reinem, warmem Waſſer nach und trocknen ihn durch vorſichtiges Andrücken eines weichen Leinentuches. Darauf kühlen Sie die entzündete Stelle mit Bleiwaſſer, bepinſeln ſie mit verdünntem Glycerin und beſtäuben ſie dick mit feinſtem Stärkemehl. Im hartnäckigen Fall beſtreichen Sie die Geſchwulſt mit Bleiſalbe. Der Fuß iſt dann aber in ein Lederbeutelchen zu ſtecken, welches der Vogel mit dem Schnabel nicht leicht zerreißen kann, während es doch weich genug iſt, daß er mit der Klaue die Sitzſtange zu erfaſſen und ſich darauf zu halten vermag.

Herrn H. Maier, Kaſſirer: Der Käfig von angegebener Größe iſt für das Pärchen Mozambikzeiſige groß genug, um darin zur Brut ſchreiten zu können. Bringen Sie in dem Käfig ein bis zwei Neſtkörbchen an, die überall bei den Händlern zu kaufen ſind, und bieten Sie den Vögeln als Niſtmaterial trockene Grashalme, Charpiefäden, Schweins- und Pferdehaare, Agavefaſern u. drgl. Als Aetzfutter geben Sie ſpäter gequellte trockene oder friſche Ameiſenpuppen, kleingeſchnittene Mehlwürmer, hartgekochtes und geriebenes Hühnerei (Weiß und Gelb) und eingequellte Sämereien.

Herrn C. J. Schmidt: Ihre Wünſche inbetreff der Angaben der Fortſetzungen ſollen berückſichtigt werden.

Herrn E. Röben: Der Wellenſittich muß infolge eines plötzlichen Schrecks oder ſonſt irgend einer Beängſtigung mit dem Kopf gegen eine ſcharfe Kante geflogen ſein; anders läßt ſich der Tod des ſonſt geſunden Vogels nicht erklären. Dafür ſpricht auch ſeine blutunterlaufene und kahle Schädeldecke.

Herrn Adolf Büchner: Die eingeſandte Gould's Amandine war infolge von Lungenentzündung eingegangen. Im Uebrigen rathe ich Ihnen, dieſen Vögeln das Weichfutter, beſonders das Eierbrot, zu entziehen, das man ja nur während der Brutzeit reicht.

Fräulein Marie von Gorska: Daß Ihre Prachtfinken nicht mit Erfolg niſten, liegt einerſeits wahrſcheinlich daran, daß die Voliere übervölkert iſt, andrerſeits daran, daß einige Arten ſich mit den übrigen nicht vertragen, ſodaß die Inſaſſen des Käfigs ſich gegenſeitig ſtören. Dabei iſt es kein Wunder, wenn die Weibchen an Legenoth eingehen. Beobachten Sie alſo ſorgfältig, welches die Störenfriede ſind, und entfernen Sie dieſelben. Die rothe Hirſe iſt den Vögeln nicht beſonders zuträglich; nehmen Sie ſtatt dieſer Senegalhirſe.

Herrn F. Burkhardt: 1. Die von Ihnen zuerſt gefundenen Vögel waren, nach Ihrer Beſchreibung zu ſchließen, Schwarzplättchen. 2. Die Vögel, die jetzt in Ihrem Beſitz ſind, ſind junge Eichelheher. Füttern Sie dieſelben mit Semmel in Milch, Käſequark, gebacktem Fleiſch und allerlei kleinem Gethier, Inſekten und drgl. Später können Sie ſie an allerlei menſchliche Nahrung gewöhnen. 3. Das Weibchen des Eichelhehers iſt von kaum bemerkbar geringerer Größe, in allen Farben etwas matter und mit kleinerer Tolle.



Briefwechſel

Herrn Fr. Anzinger und Herrn A. Rettich: Beiträge mit Dank erhalten.

◆

An die Leſer.

Wir bitten zu beachten, daß Anfragen, die in der laufenden Nummer beantwortet werden ſollen, ſpäteſtens bis Sonntag bei Dr. Ruß eintreffen müſſen. D. L.

◆

Zu unſerm Bilde.

„Hübſch iſt er nicht, aber drollig!“ So werden unſere Leſer rufen, wenn ſie dieſen Vogel ſehen. Es iſt der Schrift-Araſſari (Pteroglossus inscriptus, *Swains.*) aus dem nördlichen Südamerika. Er iſt wenig bekannt, da er nur ſelten bei uns eingeführt wird. Dies iſt umſomehr zu bedauern, weil er leicht zahm wird. Er gehört zu der Gattung der Tukane oder Pfefferfreſſer. Ihr eigenthümlichſtes Merkmal iſt der gewaltige Schnabel. Dieſer iſt faſt ſo lang wie der eigentliche Rumpf, am Grund ſo breit wie der ganze Kopf und mit einem großmaſchigen Knochennetz in Form eines Schwamms angefüllt, das von den Naſenlöchern her die Luft bezieht, wodurch der Schnabel trotz ſeiner Größe ſehr leicht gemacht wird. Der Oberſchnabel, wie ihn der Schrift-Araſſari aufweiſt, hat an der Spitze die Breite von etwa 2 cm; der Firſt iſt ſchwarz bis zum Kopfgefieder hin, doch zeigt ſich auf jeder Seite des letztern ein breiter gelber Streif. Der Oberſchnabel iſt ſägeartig eingeſchnitten, und dieſe Einſchnitte tragen vorn einen großen und breiten ſchwarzen Saum. Der Unterſchnabel hat an der Spitze nur ein ſchmales mattes Schwarz; längs der Mitte verbindet ſich aber ein ſchwarzer Streif halbmondförmig mit dem ſchwarzen Firſtenſtreif, ſodaß das Gelb des Ober- und Unterſchnabels auf jeder Seite umrahmt iſt; oberhalb der ſchwarzen Binde am Schnabelgrund findet ſich noch Gelb bis zum Auge hin. Die Augen mit nacktem türkisblauem Augenkreis ſind braunſchwarz; vor dem Auge hat der Vogel einen kleinen blauen, hinter dem Auge einen kleinen rothen Keilfleck. An Kopf und Kehle iſt er ſchwarz, während der übrige Oberkörper ſchwärzlich grün, und der Unterkörper gelb iſt; die Füße tragen eine ſchmutzige Bleifarbe.

Der Schrift-Araſſari lebt geſellig wie die Papageien, fällt in Trupps auf die Waldbäume, von deren Früchten er ſich nährt, und läßt dabei allerhand eigenthümliche knarrende Laute hören, bis er aufgeſcheucht mit Geſchrei davoneilt. Aber ſeine Stimme iſt nicht ſo durchdringend kreiſchend wie die der Papageien. Im Flug ähnelt er denſelben; in der Luft iſt er an den kurzen breiten Flügeln leicht zu erkennen. Den Schnabel trägt er dabei vorgeſtreckt, den Hals etwas eingezogen. Seine Nahrung beſteht in Baumfrüchten und zum Theil auch in Inſekten; er zieht aber weiche, mehlhaltige Früchte den harten Kernen vor. Es wird vielfältig behauptet, daß er dieſelben emporwirft, ehe er ſie hinunterſchluckt. Mit Sicherheit hat man es aber weder bei freilebenden, noch bei gefangenen Araſſaris beobachtet.

Der Schrift-Araſſari niſtet, wie die Papageien, in Baumlöchern, und legt zwei weiße Eier; ſein Neſt iſt aber ſtets mit großer Vorſicht verſteckt und wird ſelten gefunden. Den wenigſten Forſchern iſt es geglückt, Eier und Neſter dieſes Vogels zu erhalten. Jung eingefangen wird er bald zahm und läßt ſich leicht ernähren. Der zoologiſche Garten von Berlin beſitzt unter ſeiner reichhaltigen Sammlung von Tukanen auch einen Schrift-Araſſari. Es iſt der erſte, der bisher lebend eingeführt worden. Er erhält dort folgendes Futter: Reis, gekochte Kartoffeln, in Waſſer erweichte Semmel, gekochte Möre, das Ganze mit Zucker überſtreut; dazu Frucht je nach der Jahreszeit, von der er beſonders gern friſche Weinberen nimmt. Auch Biskuit und Eierbrot bekommt er, und hin und wieder eine junge Maus. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [1221]

Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos)

Ameiſeneier,

getrocknete, ſchon 1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigte goldgelbe Ware, liefert per Liter 90 Pf.

Gottlieb Wanek,

[1222] Thierhandlung, Prag 411, I.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko. 4½, à Ltr. 1 ℳ.

Muska, hochf. 98er, à Ko. 3, 5 Ko. 14 ℳ.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 5, à Ko. 9.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.

Bisquit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack	5	Ko.	no.	1,50
Hanfſat	„	„	„	„	1,80
Hafer geſchält	„	„	„	„	2,25
Mohn blau	„	„	„	„	3,75
Hirſe weiß Pa.	„	„	„	„	2,20
do. Senegal	„	„	„	„	2,25
do. do. i. Kolb.	„	„	„	„	5,—
do. algeriſche	„	„	„	„	2,—
do. indiſche	„	„	„	„	1,75
Sonnenblumen	„	„	„	„	2,—
Kürbiskerne	„	„	„	„	3,25
Reis i. Hülſen	„	„	„	„	2,25
Zirbelnüſſe	„	„	„	„	5,—

Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [1223]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen **inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel** pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [1224]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Lager von Ameiſeneiern.

Direkter Import bei
[1225] **H. Drefalt, Lübeck.**

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1226] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Alle Vogelfutter, Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1227

Friſche Ameiſeneier,

ſaubere helle Ware, à Liter 1 ℳ, 10 Liter 9 ℳ gegen Nachnahme. [1228]

J. Nullmeyer, Vogelhandl., **Mannheim.**

Frische Ameiseneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt der einzige Erſatz: **Zecke** mit heißem Waſſer übergoſſen und dann ausgedrückt. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zecke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Drogerien. Man verlange Zecke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1229]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Mehlwürmer

zum Tagespreiſe bei [1230]
Theodor Frank, Barmen.

Vögel.

Kanarien-Vorsänger!

Vorzügliche tieftourenreichſte, noch nie zur Zucht benutzt und flott durchſingend, nach Geſangsgüte à 12, 15, 20, 25 und 30 ℳ, noch in großartiger Auswahl da. Verſandt überallhin gegen Vorherkaſſe oder Nachnahme mit voller Garantie für Werth, Geſundheit und Probezeit.

[1231] **Julius Häger,**
St. Andreasberg (Harz).
Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864.
Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Schamadroſſeln

in vollem Geſang,
Dayaldroſſeln,
Gebirgsloris,

160 junge ſchwarzäugige Graupapageien,

voll im Gefieder, zahm, an Hanf und Waſſer gewöhnt,

130 junge Blauſtirn-Amazonen, tadellos ſchön befiedert, jung, fingerzahm, ſehr gelehrig, anfangd. zu ſprechen, bezw. etwas ſprechend,

18 junge gelehrige Gelbnacken, fingerzahm, tadellos ſchön befiedert, anfangend zu ſprechen, bezw. etwas ſprechend,

Buſchmaina,
Ufermaina,
Javaniſche Maina,
Hirtenſtare,
Pagodenſtare,
graaköpf. Mainaſtare,
Auroraaſtrilde,
Larvenaſtrilde

hat billigſt abzugeben

August Fockelmann,
Thierhandlung, [1232]
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Empfehlen garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende

Sproſſer

à Stck. 9—12 ℳ, [1233]

Wachtelhähne,

à Stück 1,50 ℳ, 6 Stück 7 ℳ, ſowie

Nachtigalen

4—6 ℳ und alle Arten

Grasmücken

unter Garantie lebender Ankunft. Preisliſte gratis.

Prima friſche Ameiſeneier

und 99er getrocknete, à Liter 1 ℳ.

Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Wecker kann man sparen,

wenn man ſich ſchlagende Wachteln kauft. Dieſe ſind bei uns zu haben à 1,50, Dtzd. 12 ℳ, Sproſſer, gut abgehört, 9 bis 10 ℳ. Garantie lebender Ankunft, Preisverzeichniß über Vögel gratis. [1234]

Gebr. Mengler, Vogelexport,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Harzer Kanarienvögel,

Hohlroller-Stamm, diesjährige Hähne, à 5 ℳ, Dtz. 48 ℳ, Weibchen à 80 ₰, Dtz. 8 ℳ. Garantie für Hähne und leb. Ankunft.

Wilhelm Kaye,
[1235] **Thale** (Harz).

Rothe u. gelbe Kreuzſchnäbel

verſende 6 Stück 4 ℳ, Dutzend 6 ℳ. Tauſche auch auf friſche Ameiſeneier, Sproſſer, Schwarzblättchen, Nachtigalen u. Käfige.

A. Jaumann,
[1236] **Großbreitenbach,** Thür.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer, **Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,** alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf., Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1237]

Graue Kardinäle, à St. 4,50 ℳ,
Blaudroſſel, ſingd. Männchen, à 12 ℳ,
Larvenaſtrilde, à P. 9, 2 P. 16 ℳ,
Auroraaſtrilde, à P. 9, 2 P. 16 ℳ,
kl. Alexanderſittiche, à St. 3 ℳ,
weiße Reisvögel, à P. 6,50 ℳ,
rothe Kardinäle, defekt, à 6 ℳ,
Grauedelſänger, abgehörte Männchen, à 5 ℳ,
Singſittiche, Weibch., à 12 ℳ,
Graue Reisfinken, à P. 2,50 ℳ,
Chineſ. Zwergwachteln, à Mch. 4 ℳ. [1238]

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Schamadroſſel,

großartiger Sänger, tadellos im Gefieder, hat 2 mal bei mir gemauſert, frißt aus der Hand, freifliegend in der Vogelſtube, durchaus friedlich, für 45 ℳ zu verkaufen.

Ferner **rother Kardinal,** ebenfalls vorzüglicher Sänger, 2 Jahre hier, ſelten ſchönes Gefieder, 8,50 ℳ. [1239]

Overhamm, Apotheker,
Werden (Ruhr).

---

ff. Harzer Kanarien-Vögel,

Hohl- u. Knorr-Vögel, ſowie Klingel- u. Schaukel-Roller ohne Fehler 15, 20 u. 25 ℳ, geb. dieſelb. 14 Tage a. Probe, jedoch p. Nachn. od. Betrg. vorher, nicht gefall. Vögel tauſche um od. zahle zurück. Preisliſte frei. [1240]

L. G. Müller, Vogelzüchterei, Nordhauſen a. H.

NB. Junge von dieſem Jahr à Stck. 5 ℳ, 6 Stck. 25 ℳ, 12 Stck. 48 ℳ, frei dort.

☛ 1898 erhielt mein Stamm Harzer Kanarienvögel 1. Staatspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.

Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [1241

Steinröthel

von der erſten Brut, garantirt Männchen, 7 ℳ, **weiße Dohlen,** Stück 15 ℳ, **Steinkauze,** à 5 ℳ, **Bartmeiſen,** P. 6 ℳ, **rothe Gimpel,** à 3,50 ℳ, **prachtvolle Goldfiſche,** 100 Stück 4—6 ℳ. Alle Arten **Schlangen, Schildkröten, Chameleon, Grottenolme** liefert [1242

G. Findeis, Wien I, Wollzeile 25.

Einen hochprima, ſchon 1 oder 2 Mal überwinterten **Sproſſer** ſucht zu kaufen oder gegen Ia Gelbſpötter und Schwarzkopf zu tauſchen. [1243]

Rud. Drinnenberg, Hünfeld.

Zu kaufen geſucht:

Weiße Schwäne,
ſchwarze do.,
Zierenten,
Faſanen.

Offerten mit Preisangabe erbeten an

August Fockelmann
Thierhandlung [1244]
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Wachteln,

nur Hähne, gute Schläger, Dtzd. 7,50 ℳ. Garantie für Männchen und lebende Ankunft. [1245]

N. Muschun, Temesvar, Ungarn.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1246]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

☛ Vogelkatze, ☚

2 Jahre alt, bei Vögel aufgezogen, wegen Umzug für 25 ℳ zu verkaufen.

Aug. Meyer, Vogelhandlung,
[1247] **Straßburg i. E.**

Verkaufe: 1,1 chin. **Mandarin-Enten** f. 25 ℳ.

Rüdenburg,
[1248] **Charlottenburg,** Weſtend.

Schamadroſſel,

Ia Sänger, voll befiedert, verkaufe zu 35 ℳ.
[1249] **L. Häcker,**
München, Hans Sachs-Straße 13.

Rothkehlchen, laut. Wipfelſ. 3,50 ℳ, Blaukehlchen 2 ℳ, Stgl.-Baſtard, fl. S., 4,50, zahm. Fink 1 ℳ. Alle 1 J. i. Bauer. Verp. frei.

R. Hoppe, Kim.,
[1250] **Magdeburg,** Bismarckſtr. 17.

Ueberw. Wachtel, Ia Schläger, m. ſchönem Wachtelhäusch. (Deckenpolſt.), ſtatt 7,50 u. 4,75 ℳ. [1251]

Johann Richter, Neuſtadt, O.-Schl.

☛ 1 echt. reinſch. 2jähr. **Reitzugfinken** m. lang. Zug u. Endſilbe „Schnapp" 20 ℳ, 1 ff. Hochgeb.-**Gelbſpötter** 5 ℳ. B. im v. Schl. b **Markert, Scheibenberg,** Erzgb. [1252

Zur Einrichtung einer Vogel- u. Vogelfutter-Handlung ſuche mit größerem Exporthaus u. Käfigfabrikanten in Verbindung zu treten. Werthe Offerten erbeten **Dresden-Tolkewitz,** Dresdenerſtr. 26, Ir. [1253

Loden für Sport-, Reiſe- u. Hauskleider in praktiſchen Farben, à Mtr. 1 ℳ. [1254]

Breuel, Leipzig, Comeniusſtr. 1.

Bücher-Anzeigen.

Gelegenheitskauf!

Bilz, Heilverfahren, wie neu, ſtatt 12,50 für 8 ℳ.
Bismarck's Gedank. u. Erinnerungen, wie neu, ſtatt 20 für 13 ℳ.
Bock, Buch vom geſund. u. krank. Menſchen, wie neu, ſtatt 13 für 8 ℳ.

[1255] **M. Seidel,**
Dresden, Pfotenhauerſtr. 10, part. r.

„Gef. Welt", 5 Jahrg. 1894/98 mit Origin.-Einband, tadellos gehalten, 12 ℳ, 3 Jahrg. „Natur u. Haus", 6 ℳ, verkauft

Alwin Heinrich, Zittau i. S.

Der

Deutſche Geflügelhof

Abonnement vierteljährlich 75 Pfg.

Inſerate: die einſpaltige Zeile 15 Pfg.

Amtliches Organ des Sonderausſchuſſes für Geflügelzucht der Landw. Kammer für die Prov. Brandenburg und der demſelben angeſchloſſenen Vereine.

Redaction:
Bruno Dürigen, Charlottenburg.

Der „Deutſche Geflügelhof" bringt alles Wiſſenswerthe auf dem Gebiete der landw. Nutzgeflügelzucht, ſowie rationellen Tauben- und Kaninchenzucht, auf den Sport dabei gebührend Rückſicht nehmend, belehrende Artikel für den Anfänger, Beſchreibungen und Abbildungen.

☛ Probenummern koſtenlos ☚
durch die Geſchäftsſtelle

Otto Koobs Verlagsanſtalt,
Forſt i. L.

In unſerm Verlage erſchien:

Naturgeſchichte der deutſchen Sumpf- u. Strandvögel

von **Dr. Curt Floericke.**

Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck.

Broch. ℳ 4.50, geb. ℳ 5.50.

Dieſes, eine höchſt intereſſante, noch wenig bekannte Vogelgruppe behandelnde Werk iſt in der Hauptſache auf Grund eigener Beobachtungen des Verfaſſers entſtanden, und ſo reizvoll geſchrieben, daß es das volle Intereſſe jedes Naturfreunds, Jägers oder Landmanns in Anſpruch nehmen muß.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Bei uns erſchien:

Vogelzucht-Buch,

Stubenvogelpflege und -Zucht
zum Vergnügen, zum Erwerb und für wiſſenſchaftliche Zwecke.

Von **Dr. Karl Ruß.**

2. Auflage, mit 13 Tafeln u. 30 Textabbildungen.
Preis Mk. 1.50, geb. Mk. 2.—.

Creutz'ſche Verlagsbuchhdlg.
in Magdeburg.

Bei uns erschien:

Der Dompfaff,

seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht.

Von
F. Schlag.

4. Auflage. — Preis M. 1.—.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 28.

Das Schwarzkehlchen (Pratincola rubicola, *Kch.*).
Mittheilungen aus Centralamerika (Fortſetzung).
Die Sängergrasmücke (Sylvia orphaea, *Tm.*) als Stubengenoſſe (Schluß).
Beſchreibung eines Beruhigungs= oder Schlafkäfigs für die des Nachts tobenden Weichfuttervögel.
Briefliche Mittheilungen.
Ornithologiſche Verſammlung in Sarajevo.
Anfragen und Auskunft. — Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.

50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,** [1256] Waren i. Mecklenb.
Proſpekte gratis.

Grottenſtein=Aquarien=Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1257]

Käfige
jeder Art
(Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1258] **Oſchatz** i. S.

Verkaufe Platzes halber billige Vogelbauer:
Neuntheiligen Geſangskäfig zum Anlernen junger Kanarienvogel, 10 ℳ, Heckbauer 75×40×37 cm groß, 8 ℳ, Wachtelbauer 8 ℳ, Lerchenbauer 8 ℳ, Papageibauer, 1 m hoch u. ½ m Durchmeſſer, 10 ℳ. Die Bauer ſind noch wie neu, tauſche auch Nützliches.
[1259] **L. Brock,**
Eisdorf b. Lützen (Prov. Sachſen).

Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Netzfallen,** kleine 80 ₰, größ. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ. **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [1260]
Gebr. Jansen, M.=Gladbach 112.
Illuſtrirte Preisliſte gratis.

Neu! **Senſationell!**
Kanarien=Lehr=Orgeln,
auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer= und Luft=Keſſel, in elegantem Renaiſſance=Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt
[1261] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit f. Ref. zu dienen.

Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in **praktiſcher** Anordnung,
großer Auswahl u. billigem Preis. [1262]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Bitte!

In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt“ beſtimmten **Zuſchriften** und **Sendungen** (tote Vögel) an **Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin SW., Belleallianceſtraße 81,**

b) **alle Beſtellungen** auf Abonnements, Inſerate u. dgl. Geſchäftliches nur an die **Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg**

zu richten ſind.

Holzwaarenfabrik.
C. L. Flemming
Globenstein, Poſt Rittersgrün, Sachſen
empfiehlt: [1263]
Flug= und Heckbauer, Einſatzbauer, Geſangskaſten.
Muſterpackete 9 St. ſort. f. Kanarienzüchter M. 6 franko.
Holzwaarenfabrik.



Man verlange Preisliste.

Für alle Arten Vögel fertige ich fachgemäße
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Staatspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial=Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1264]

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung, ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823). Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg. Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Alliance-Straße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Beſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 28. Magdeburg, den 13. Juli 1899. **XXVIII. Jahrg.**

Das Schwarzkehlchen (Pratincola rubicola, *Kch.*).

Von Karl Kullmann.

Unter den in den letzten Nummern der „Gefiederten Welt“ von Herrn Reuter genannten „ſelten gehaltenen Vögeln“, vermiſſe ich einige, welche es verdienten, als ſelten gehalten bezeichnet zu werden und ich will deshalb heute einen auch wirklich ſelten gekäfigten Vogel hier einreihen. Ich meine damit den ſchwarzkehligen Wieſenſchmätzer, der nicht allein ein ſehr ſcheuer Vogel iſt, welcher ſich ſchwer berücken läßt, ſondern auch nicht ſehr häufig vorkommt, da ſein Standort in Deutſchland ein engbegrenzter iſt.

In unſerer Gegend (Frankfurt a. M.), niſtet das Schwarzkehlchen ſtets ganz vereinzelt, um nicht zu ſagen, — verſtohlen, in der Nähe von Homburg v. d. Höhe im Hardtwald, d. h. an den Ausläufern oder an den Rändern deſſelben, wo Wieſen und Brüche an alte Buchen und Tannen angrenzen. Außerdem kommt der Pratincola rubicola in unſerer nächſten Nähe, etwa eine Stunde von hier (Frankfurt a. Main) im Fochenheimer Wald vor, woher auch mein heute zu ſchilderndes Vögelchen ſtammt. Schon lange war es mein Wunſch, das Schwarzkehlchen, dieſes ſchöne Vögelchen, zu käfigen, ſchon um daſſelbe auf ſeinen Geſang hin zu prüfen und letzteren feſtſtellen zu können, weil in keinem ornithologiſchen Werk etwas über die Leiſtungen dieſes Schmätzers zu finden iſt. Es heißt da faſt in jedem Handbuch, ſelbſt im alten Brehm und Friedrich und Ruß: „Geſang unbedeutend, dem des Vorigen ähnlich“. damit iſt das Braunkehlchen (Pr. rubetra) gemeint. Thatſächlich iſt der Geſang des Letzteren nichts weniger als unbedeutend; im Gegentheil, das Vögelchen verdient weit mehr Beachtung und es würde viel häufiger gekäfigt, wäre es nicht zu hinfällig. Nur ganz gewiegte Vogelpfleger ſind im Stande, es mehrere Jahre in der Gefangenſchaft gut zu erhalten. So erinnere ich mich eines Krautvögelchens, welches mein Freund Gottſchlag vor Jahren auf der „Aegintha“-Ausſtellung in Berlin hatte. Der Vogel war etwa drei Jahre alt und geſanglich leiſtete er Hervorragendes, deſſen ſich gewiß viele Leſer dieſer Zeilen, welche die genannte Ausſtellung beſuchten, noch mit Freuden erinnern werden, denn das Vögelchen fiel jedem einigermaßen verſtändnißvollen Liebhaber durch ſeinen wundervollen lauten Geſang auf. Zwar ſind es ſchon viele Jahre her, daß ich dieſen Vogel abhören konnte, und mittlerweile habe ich Gelegenheit gehabt, viele Hunderte anderer Vögel auf ihren Geſang hin prüfen zu können, dieſer Geſang des P. rubetra des Herrn Gottſchlag iſt mir aber immer noch in den Ohren. Erfreulicherweiſe war der Vogel, wie es bei jedem echten Liebhaber ſein ſollte, unverkäuflich, blieb alſo in den rechten Händen und dürfte ſeinem Pfleger noch viele Freude bereitet haben.

Die Eingewöhnung des Schwarzkehlchens macht wenig Mühe. Mein Freund, welcher es gefangen hatte, beſaß es einige Tage, bevor es in meinen Beſitz (Ausgang April) überging. Ein gewöhnlicher Nachtigalen-Kiſtenkäfig, verhüllt, täglich friſche Ameiſenpuppen, ſechs bis acht Mehlwürmer, dazu als Delikateſſe eine Gabe Speck- und Pelzkäferlarven — und der Vogel ließ mich nur zwei Tage auf ſeinen Geſang, welcher recht fleißig vorgetragen wurde, warten. Der Lockruf, welcher dem Singen ſtets und mehr wie zur Genüge, gleichſam um darauf aufmerkſam zu machen, vorausgeht, iſt: „Fid, fid, dkrr,“ ähnlich dem

„Wit kerr“ der Nachtigal, nur daß der Tonlaut a weggelaſſen wird und das Locken etwas rauher klingt, als bei unſerer Sangeskönigin. Der Geſang beſteht aus zuſammenhängenden Strofen und erinnert viel an denjenigen eines halblaut ſingenden Rothkehlchens und vor Allem an den Vortrag des Blaukehlchens; an Letzteres umſomehr, als während des Singens ſtets das „dkrr, dkrr“ mit in das Lied eingeflochten wird, das ſich an das ſpinnradähnliche Schnurren „brr, brr“, im Blaukehlchengeſang anlehnt. Erfahrene Vogelliebhaber, die mich beſuchten und nicht wußten, was für einen Vogel ich in dem Bauer hatte, meinten denn auch häufig, daß ich ein Blaukehlchen darin käfigte, bis ich ihnen ſagte, ſie ſollten aus dem Blau ein Schwarz machen. So viel Aehnlichkeit iſt im Geſang dieſer beiden Vögel vorherrſchend.

Wenn ich den Geſang des Schwarzkehlchens nun näher erklären ſoll, ſo muß ich ſagen, daß derſelbe weit unter demjenigen des Braunkehlchens ſteht. Ohne geradezu hervorragend genannt werden zu können, iſt er lieblich und angenehm anzuhören. Er beſteht zum Theil aus kürzeren trillernden Strofen, rothkehlchenähnlich und bruchſtückweiſe in ſeinen Touren an andere Sänger anlehnend, z. B. mit dem Lockruf ſibdkrr zuſammengehängt an das Blaukehlchen erinnernd, mit deſſen Geſang der ſeine deshalb am meiſten zu vergleichen iſt, wie ſchon weiter oben geſagt.

Mein Schwarzkehlchen ſang fleißig bis zum 26. Juni, alſo etwa zwei Monate. Ich nahm nach und nach die Leinwand zum Verhüllen ab, und der Vogel, welcher anfänglich, als der Käfig ganz offen, furchtbar ungeſtüm und wild war, ergab ſich bald in ſein Schickſal und iſt jetzt ganz ruhig. Dabei bemerke ich, daß es ein ganz altes, ausgefärbtes Exemplar iſt, mit tiefſchwarzem Kopf und Hals und ſchön ausgeprägten weißen Epauletten mit roſtbraunem Bauch.

Charakteriſtiſch iſt die Stellung des Vögelchens, die es gegen Menſchen, die durch das Zimmer gehen, oder überhaupt gegen etwas Fremdes, einnimmt; es bleibt gleich einem Raubvogel, unverwandt mit dem Hinterkörper nach oben gerichtet, den Kopf lang geſtreckt, tief nach vorn gebeugt auf ſeinem Sprungſtabe, wie angeleimt, ſitzen und verfolgt mit Argusaugen, ohne ſich im geringſten zu bewegen, alles ihm Auffallende. Es ſieht dies bei der merkwürdigen Farbenzuſammenſtellung des Schwarzkehlchens ganz gelungen aus, und der Vogel erinnert mit dem lang vorgeſtreckten ſchwarzen Kopf dann an das Bild eines Teufelchens. Das Uebergewöhnen des Vogels an mein gewöhnliches Miſchfutter ging raſch vonſtatten; ohne Schwierigkeit nahm er daſſelbe an. Ich gab täglich immer weniger friſche Ameiſenpuppen unter das Gemenge, und heute erhält er nur außer letzterem, nebſt fünf bis ſechs Mehlwürmern, als Leckerbiſſen einige Larven von Speck- und Pelzkäfern dazu.

Dies wäre in kurzem Rahmen Alles, was über das Schwarzkehlchen zu ſagen und zu ſchreiben iſt. Jedenfalls wäre es von Intereſſe für die Leſer der „Gefiederten Welt“ und nicht am wenigſten für mich, Mittheilung von anderer Seite über dieſes allerliebſte Vögelchen zu erhalten, da es womöglich doch noch Gegenden in Deutſchland, hauptſächlich im Süden deſſelben geben dürfte, wo der ſchwarzkehlige Wieſenſchmätzer noch zahlreicher auftritt, als dies hier bei uns der Fall iſt. Im Norden Deutſchlands, auf meinen weiteren ornithologiſchen Ausflügen, habe ich das Vögelchen niemals geſehen und auch nirgends von ſeinem Vorkommen daſelbſt etwas gehört. Am Rhein, z. B. auf dem Rochusberg bei Bingen, ebenſo bei Lorch und Caub im Wisperthal habe ich es häufiger, wenn auch ſtets vereinzelt und ſehr ſcheu in der Nähe von Weinbergen ſchon vor mehr als dreißig Jahren beobachtet und, wie ich mich im vergangenen Jahr überzeugen konnte, kommt es heute noch daſelbſt vor. Merkwürdigerweiſe trifft es am Rhein bereits Ende März mit dem Blaukehlchen ein, alſo etwa vierzehn Tage früher als in unſerer Gegend, wo es ſtets mit der Nachtigal zwiſchen dem 15. und 18. April erſt Einkehr hält.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Der Morgenammerſperling (Passer pileatus, *Bdd.*).

In Guatemala wie in Coſta Rica iſt in den Sammlungen mein zu behandelnder Spatz als „Zonotrichia pileata“ wiſſenſchaftlich feſtgeſtellt. Ob nun der Name meiner Ueberſchrift oder die hieſige Bezeichnung mehr Berechtigung hat, mag dahingeſtellt bleiben, ſchließlich iſt keines richtig. Aber hoffentlich erkennt der Leſer den Vogel, den zu ſchildern der Zweck der nachfolgenden wenigen Zeilen ſein ſoll. Bevor ich jedoch zu meinem Thema übergehe, möchte ich meinem Unwillen, nein, dazu habe ich kein Recht, aber meiner Verwunderung Ausdruck geben, in welcher Zerfahrenheit ſich die wiſſenſchaftlichen Benennungen befinden. Jeder Autor und Naturforſcher hat für ſich ein Recht in Anſpruch genommen, dem Ding einen wiſſenſchaftlichen Namen zu geben. Vielfach mag wohl hierfür eine Begründung vorgelegen haben, nichtsdeſtoweniger aber glaube ich ausſprechen zu dürfen, daß der Wirrwarr der Nomenclatur und die Unſicherheit der Beſtimmung mit jeder neuen Bezeichnung größer geworden iſt. Sollte ſich aber für meine Benennung eine andere wiſſenſchaftliche Bezeichnung mehr Geltung verſchafft haben, ſo erſuche ich die Leitung, das von mir Verſäumte zu ergänzen.*)

---

*) Die Nomenclatur der Ammerſperlinge liegt ſehr im Argen; wir kommen einmal darauf zurück; den beſtehenden Namen (Zonotrichia) wollen wir vorläufig beibehalten. D. L.

Trotzdem der Morgenammerſperling über ganz Central- und Südamerika verbreitet iſt, dürfte er doch wenig oder gar nicht in Deutſchland eingeführt werden. Warum? Man hat eben für Sperlinge und Ammern weniger Intereſſe und glaubt, daß dieſe Vögel in der Züchtung undankbarer wie andere Vögel ſeien, man urtheilt oberflächlich und nach dem Schein.

Auf den erſten Blick macht der Vogel einen unſcheinbaren Eindruck. In ihm ſind gewiſſermaßen alle Farben des männlichen Hausſperling vertreten, nur kommt mit der weißen Kehle etwas mehr Kontraſt, mehr Leben in die Farben. Der Geſang beſteht in einer kurzen, aber lieblich anzuhörenden Strofe, dui, dui, dui, dui—i oder dui i di di di. Recht oft kann man die bekannte Stimme hören; ſogar mitten in der Nacht fängt der Morgenammerſperling an zu ſingen und gleich darauf antwortet der Kollege vom nächſten Baum. Nach Angaben der Eingeborenen ſingt nur das Männchen, andere behaupten dagegen, daß von beiden Geſchlechtern die kurze Strofe vorgetragen werde. Ich ſelbſt konnte mir nie die Gewißheit verſchaffen, da die beiden Geſchlechter zu große Aehnlichkeit mit einander haben.

Den in der Freiheit am häufigſten vorkommenden Vogel bringt man doch ſelten zum Verkauf, und er koſtet dann verhältnißmäßig viel. Die Liebhaberei für ihn als Stubenvogel iſt hier wie in Deutſchland nicht groß, obgleich er in der Gefangenſchaft ſehr ausdauernd iſt und abſolut keine Schwierigkeiten inbetreff der Verpflegung und Ernährung verurſacht. Würde ſich früher oder ſpäter eine größere Nachfrage nach dem Morgenammerſperling fühlbar machen, ſo würde auch dieſer Vogel ſicherlich von den Großhändlern mehr eingeführt werden, denn das Material iſt jederzeit reichlich zu beſchaffen. (Fortſetzung folgt.)

Die Sängergrasmücke (Sylvia orphaea, *Tem.*) als Stubengenoſſe.

Von Fr. Anzinger.

(Schluß).

Dies trifft bei unſerer Orpheusgrasmücke wie es ſcheint nur in ganz ausnahmsweiſen Fällen zu. Erſt im Auguſt, wo auch die Jungen bereits reiſefähig ſind, und mit den Alten in größeren Trupps umherſtreifen, wird dieſer Vogel in Maſſen gefangen und tot oder lebendig auf den Markt geſchleudert. Nachdem eine Unterſcheidung des Geſchlechts bei dieſer Grasmückenart, namentlich bei jungen, noch nicht voll ausgefärbten Vögeln, dem Laien abſolut unmöglich iſt, und der Geſang um dieſe Zeit nicht mehr gehört wird, werden die Vögel ohne Unterſchied, ob Männchen oder Weibchen, um einen gleichen, meiſt billigen Preis abgegeben. Gelangen ſie nun in die Hände eines kenntniß- oder gewiſſenloſen Händlers, ſo darf der bei demſelben beſtellende Liebhaber froh ſein, wenn er ein Männchen erhält. Ob und wie daſſelbe dann ſingen wird, bleibt eine oft ungelöſte Frage, denn es hängt dies von der Eingewöhnung und hauptſächlich von der Ueberwinterung des Vogels ab.

Eingewöhnung und Ueberwinterung ſind zwei Begriffe, welche ſtreng auseinander gehalten werden müſſen. Es gibt Vögel, deren Eingewöhnung große Schwierigkeiten bereitet, z. B. Bachamſel, Zaunkönig, Goldhähnchen, verſchiedene Meiſenarten ꝛc. Sind ſie aber einmal futterfeſt, ſo iſt für ihr weiteres Fortkommen bei aufmerkſamer, gleichmäßiger Behandlung nichts mehr zu befürchten. Dagegen gibt es wieder Sänger, welche ſich ſehr leicht eingewöhnen, d. h. unſchwer an das übliche Käfigfutter bringen laſſen, ſich hierbei bis Ende Januar ganz wohl befinden, dann aber, ohne daß der Laie irgend einen Grund anzugeben weiß, hinfällig werden und den April oft nicht mehr erleben. Hierzu gehören jene Arten, welche eine zweimalige, vollſtändige Mauſer zu beſtehen haben, von welcher die erſte noch im warmen Winterquartier vor ſich geht. Hierzu gehören unter Anderen die Würger, Rohrſänger und Grasmücken, alſo auch unſere Orpheusgrasmücke. Dieſe erſte „Wintermauſer“ im Käfig iſt es eben, welche bekanntlich von ſo vielen derartigen Sängern nicht überſtanden wird. Es fehlt ihnen nämlich das feuchtwarme Klima der Winterherberge und die Auswahl der dortigen Nahrung, um den den Organismus des Vogelkörpers ſo ſtark beeinfluſſenden Federwechſel überſtehen zu können. Iſt es der Fürſorge des erfahrenen Vogelpflegers möglich, annähernden Erſatz für die vorerwähnten Bedingungen zu bieten, ſo kann es ihm gelingen, ſeinen Liebling über dieſe gefährliche Periode hinüber zu retten; andernfalls iſt der Vogel faſt ausnahmslos dem Tod geweiht.

Grundbedingung iſt es daher, den Vogel von vornherein bei feſtem Fleiſch zu erhalten. Dies wird erzielt durch Verabreichung mäßiger Gaben von einfacher, dabei kräftiger Nahrung, welche weder den Magen verdirbt, noch ein Fettwerden geſtattet. Häufiges Darbieten von beſonders ſüßem, alſo ſehr zuckerſtoffhaltigem Obſt, in Milch erweichtem Weißbrot, viel ſüßem Käſequark und größeren Quantitäten Mehlwürmer bildet bei keinem Vogel ſo ſchnell einen Fettanſatz als bei den Grasmücken, und ein fetter Körper hat bekanntlich nicht mehr jene Widerſtandskraft wie der magere. Selbſtverſtändlich darf eine derart empfohlene Diät nicht übertrieben oder gar mit Aengſtlichkeit geübt werden, da ſie zur vollſtändigen Abmagerung des Pfleglings führen würde. Es muß hier auch einige Kenntniß walten, welche allerdings nur durch eine mehrjährige Praxis erworben wird. Ich beſichtigte einmal die Vögel eines hieſigen Liebhabers und fand dort eine Gartengrasmücke (Sylvia hortensis) mit aufgebauſchtem Gefieder trübſelig im Käfig ſitzen. Als der Liebhaber bemerkte, daß mein Blick längere Zeit bei dieſem Vogel verweilte, ſagte er: „Ich weiß nicht, was der Vogel hat; ich halte ihn ſehr ſchmal in der Koſt, und trotzdem iſt er nudelfett. Er ſitzt immer kugelrund im Käfig.“ „Und ich ſage Dir, daß der Vogel nicht fett, ſondern ſehr mager iſt“, erwiderte ich. Ohne weiters nahm er den Vogel aus dem Käfig, unterſuchte ihn und fand das Unglaubliche beſtätigt. Nun beendigte der gute Mann allerdings die verſtändnißlos fortgeſetzte Hungerkur, wonach der „nudelfette, kugelrunde“ Vogel wieder ſchlanker wurde. Für den Magen feinerer Grasmücken ſehr verderblich wird ſauer gewordener Käſequark, ſchlecht ausgebackenes, daher beſonders germ-(hefe)haltiges Brot und unreiner Weißwurm, namentlich ſolcher, welchem die ſogenannten Teignudeln beigemengt ſind, wahrſcheinlich um ſein Gewicht für den Verkauf zu erhöhen. Wenn ſolcher Weißwurm über Nacht im Waſſer aufgeweicht wird, ſinken die meiſt in 40prozentiger Menge beigemiſchten „Nudeln“ zu Boden und löſen ſich in eine mehlige, breiige Maſſe auf, welche ich ſtets abſondere.

Als zuträglichſtes Futter für die Sylvia orphaea glaube ich folgendes Gemiſch empfehlen zu dürfen: Geriebenes, beſtes, hefeloſes Eierbrot oder Bisquit, friſche oder doch „vollkörnige“, nicht über ein Jahr alte Ameiſenpuppen, geriebene, wenig ausgedrückte Gelbrübe, einerlei, ob hell- oder dunkelgelb, und friſcher, ſüßer Käſequark; alle dieſe Stoffe in möglichſt gleichgroßen Mengen vermiſcht. Auf einen guten Eßlöffel voll ſolchen Futters (Tagesration für einen Vogel) kommt noch etwa ein Fingerhut voll zu Pulver zermahlener Hanf. Nach der Winterſonnenwende (Ende Dezember), wo die Singzeit faſt aller Stubenvögel ſchon begonnen hat oder doch mindeſtens beginnen wird, kann auch mit der Fütterung von Mehlwürmern begonnen werden, wovon ſechs bis acht Stück am Tag verabreicht werden dürfen. Zur kritiſchen Zeit, nämlich im Februar, wo bei der Sylvia orphaea die Mauſer beginnt, empfiehlt es ſich, der Miſchkoſt auch „engliſch“*) geſottenes Kalbs- oder Rinderherz beizumengen.

Der bekannte Wiener Vogelliebhaber A. Schumann empfiehlt ein ähnliches Futter, will aber auch, daß zur Mauſerzeit geriebene Sepia unter die Koſt gemiſcht werde. Doch iſt hierbei Vorſicht geboten, und Dr. Ruß warnt nicht umſonſt vor dem Ankauf dieſes nicht immer in guter Qualität erhältlichen Hilfsmittels. Eine zeitweilige mäßige Verabreichung von ſüßem Obſt, aufgeweichten und zerſchnittenen Kranzfeigen, Weinberen u. a. ſoll nur bei Liebhabern geſchehen, welche keinen Quark füttern, weil Milchprodukte und derlei Obſt hinſichtlich der Verdauung nicht im Einklang ſtehen.

Zur Beherbergung dieſer großen, ziemlich langſchwänzigen Grasmücke empfiehlt ſich ein Nachtigalenkäfig von jener Größe und Konſtruktion, wie ich ihn in meinem frühern Aufſatz über Nachtigal und Sproſſer (ſiehe Nr. 23 dieſer Zeitſchrift) beſchrieben habe. Sehr praktiſch dürfte der für ſolche Vögel nach den Ausführungen des Herrn Joh. Gabl (Nr. 21 bis 23 dieſer Zeitſchrift) herzuſtellende Käfig ſein. Der Standort deſſelben ſei womöglich an einem zugfreien Fenſter, welches von der Sonne getroffen wird und wo auch im Winter eine Durchſchnitts-Temperatur von 14 bis 16 Grad Celſius vorherrſcht, denn gleichmäßige Wärme iſt für dieſen Vogel, namentlich während der Mauſer, abſolut nothwendig.

Nun noch einmal zurück zu der im Beſitz des Herrn Teiſer befindlichen Sylvia orphaea. Der genannte Herr bezog dieſelbe im Oktober vorigen Jahres von Rauſch in Wien in bereits vollkommen eingefüttertem Zuſtand und in beſter Verfaſſung. Daß der Vogel bei Rauſch reichlich mit beſten, friſchen Ameiſenpuppen gefüttert wurde, war im voraus zu denken, denn kein Wiener Liebhaber, und ſei es auch ein Händler, läßt ſeine Vögel an dieſem köſtlichen Futter Mangel leiden. Dementſprechend wurde auch das weitere Verfahren eingerichtet, und in dem obenerwähnten Futtergemiſch waren die Ameiſenpuppen ſtets in größter Menge vorhanden.

Bereits im November begann der Vogel zu ſingen und ſetzte ſeinen Geſang bis zum Beginn der Mauſer in der erſten Hälfte des Februar fort. Das Abwerfen der alten Federn ging ſehr ſchnell von ſtatten, um ſo langſamer dagegen der Nachwuchs der friſchen, ſodaß die Mauſer bis in die zweite Hälfte des März dauerte. Erſt in der zweiten Hälfte der Mauſerungsperiode ſtellte ſich ein merkbares Unbehagen ein, welches allmählich in große Hinfälligkeit überging. Mit geſträubtem Gefieder hockte der Vogel entweder in einer Käfigecke, oder er ſaß ſtundenlang am Futtertrog ohne zu freſſen. Da ſich der Pfleger nicht bewußt war, eine magenverderbende Koſt gereicht zu haben, lag die Annahme nahe, daß es dem Vogel an einem bisher nicht erhaltenen, mehr zuſagenden Futter gebrach. Es wurde nun Verſchiedenes verſucht, und endlich gelang es mit rohem Herz, von welchem wenigſtens ſo viel verzehrt wurde, daß ein Verhungern des Vogels nicht zu befürchten ſtand. Die Mauſer ging nun wenigſtens, zwar langſam, doch ſo weit vor ſich, daß eine vollſtändige Befiederung erzielt wurde. Nach einigen Wochen begann auch wieder ein zeitweiſer, ſchüchterner Geſang, welcher ſich bis jetzt nicht verbeſſert hat.

Es darf nun angenommen werden, daß dem weiteren Fortkommen dieſes Vogels, nachdem er die erſte Mauſer überſtanden hat, nichts mehr hinderlich ſein wird. Es bleibt nur noch die Frage offen, ob ſich der Geſang dieſer Sylvia orphaea im nächſten Jahr in Hinſicht auf Fleiß, Kraft und Abwechslung derart verbeſſern wird, um von einer nennenswerthen Leiſtung dieſes Vogels ſprechen zu dürfen. Vielleicht bietet ſich ſpäter einmal die Gelegenheit, darauf zurückzukommen.**)

---

*) Hierunter iſt zu verſtehen, daß das Herz in ſiedendes Waſſer gegeben wird, wodurch ſich die äußere Muskelſchicht ſchnell zuſammenzieht und den Saft des Fleiſches weniger entweichen läßt.

**) Wir bitten ſehr darum. D. L.

* * *

Beſchreibung eines Beruhigungs- oder Schlafkäfigs für die des Nachts tobenden Weichfuttervögel.

Von A. Reuter.



Um den Wünſchen der Abonnenten der „Gefiederten Welt“ zu entſprechen, will ich hiermit in leichtverſtändlicher Weiſe die Konſtruktion des in meinem vorigen Artikel genannten Käfigs beſchreiben, mit dem Wunſch, daß ihnen derſelbe bei Anwendung gleich gute Dienſte erweiſe, wie mir ſelbſt. Beſagter Schlafkäfig hat die denkbar einfachſte Konſtruktion. Er beſteht aus dünnwandigen Brettchen in Form eines Kiſtchens und mißt im Quadrat ein Drittel des Tageskäfigs des betreffenden Vogels. Die vier Wände, ſowie die Decke ſind inwendig mit feinem, nicht faſerndem oder harigem Tuch überſpannt und ungefähr 3 cm ſtark ausgepolſtert. Als Material hierzu nehme man Reh- oder Kälberhare, Wolle, Watte oder Mos. Die Polſterung muß natürlich auch über die Winkel gehen, oder ähnlich wie bei einem Sopha in den Ecken eingezogen ſein. Einer Schublade bedarf es nicht, doch muß der Boden des Käfigs 6 cm hoch mit weichem, trockenem Mos, welches man feſt andrückt, belegt ſein. An der Vorderſeite befinden ſich drei $1\frac{1}{2}$ cm weite Luftlöcher, wie nebenſtehende Zeichnung veranſchaulicht. Dieſe genügen vollkommen für Luftzufuhr. Sprungſtäbe werden nicht angebracht, ſodaß der Inſaſſe gezwungen iſt, im Mos zu ſitzen, und gerade durch dieſes beruhigt er ſich am erſten, da er dann nicht die Kraft hat, ſo ſtark in die Höhe zu ſtoßen, als wenn er auf Sprungſtäben ſitzt, welche ihm Halt bieten, ſodaß er mit aller Macht hin- und hertoben kann, wobei er ſich nicht ſelten erheblich verwundet, im günſtigſten Fall aber Schwung- und Schwanzfedern verſtößt und abbricht und ſomit ein erbärmliches Ausſehen erhält. Dies iſt bei vorbeſchriebenem Käfig ausgeſchloſſen. Nach einigen Nächten ſchon erkennt der Vogel die ihm gebotene Wohlthat und ſitzt ruhig im weichen Bettchen bis zum Morgen, wo er in ſeinem Wohnraum gedeckten Frühſtückstiſch vorfindet. In der Regel geht er ſofort an den Futtertrog, ſobald er in den Tagkäfig überſpaziert iſt. Die Vögel gewöhnen ſich überhaupt in ſehr kurzer Zeit an dieſe Art der Behandlung, doch verfahre man dabei ſtets ruhig und beſonnen und wende keine Gewalt an, ſonſt erzielt man das Gegentheil. Meine ſo behandelten Vögel ſangen im nächſten Moment, ſobald ſie wieder im großen Käfig waren. Ein Gelbſpötter ließ ſich ſchon hören, während er herüberhüpfte. Die Thür dieſes Käfigs befinde ſich an der linken Seitenwand und entſpreche an Größe derjenigen des großen Käfigs, ſodaß der Vogel gern herübergeht. Es kann dieſelbe in Charniren gehen, oder in Haken angebracht ſein; erſteres iſt beſſer, da ſie dann mit leichter Mühe auf- und zugemacht werden kann, gepolſtert muß dieſe ebenfalls ſein. Will man den Schlafkäfig mit dem Wohnkäfig in Verbindung bringen, ſo wird er einfach an dieſen angehängt, ähnlich wie die Badehäuschen, und man kann es etwa ſo einrichten, daß man am Abend das Badehäuschen abhängt und an deſſen Stelle den Schlafkäfig bringt. Will man denſelben aber mit der Käfigthür in Verbindung bringen, ſo muß dieſelbe zweckentſprechend auch an einer Seite angebracht ſein, ſodaß der Vogel dann willkürlich auch während des Tags hinein kann, was er auch thut, beſonders wenn er der Ruhe pflegen will. Bekanntlich werden alle gekäfigten Vögel oft müde. Ein jeder Vogelfreund wird ſchon bemerkt haben, daß ſich der eine oder der andere ſeiner befiederten Lieblinge, wenn er auch kein eigentlicher Erdſänger iſt, während des Tags auf den Käfigboden geſetzt hat. Da war er alſo müde und wollte ſeine Ständer ausruhen laſſen. Er wird alſo ſicher auch den Schlafraum während des Tags benützen und ruht dort gewiß beſſer aus, als auf dem Käfigboden. Rothkehlchen und Nachtigalen lieben überhaupt auch dieſen Nebenkäfig, da er entſprechendes Dunkel bietet, und ſie ſingen dort oft im Sitzen ſehr anhaltend. Daß das Mos auf dem Käfigboden öfters erneuert werden muß, brauche ich wol nicht erſt zu erwähnen.

Briefliche Mittheilungen.

... In Anlehnung an den intereſſanten, in Nr. 24 dieſer Zeitſchrift erſchienenen Artikel des Herrn M. Dankler: Wie bekomme ich Vögel in meinen Garten? möchte ich auf eine Fangvorrichtung aufmerkſam machen, welche bei richtiger Anwendung im Dienſt des Vogelſchutzes Treffliches zu leiſten imſtande iſt.

Die Umhegung der Gärten und Wieſen mittels Drahtgeflecht, wie es Herr Dankler empfiehlt, iſt allerdings zur Abhaltung kleinerer vierfüßiger Raubthiere recht gut, aber an manchen Orten nicht durchführbar. Ebenſo wird auch ein offener Krieg mit Pulver und Blei, wie ich ihn auf unſerm etwas abſeits des Dorfs gelegenen Grundſtück mit beſtem Erfolg betreibe, nicht überall geführt werden können.

Wo nun weder eine zweckentſprechende Umhegung des Areals, noch die Anwendung einer Schießwaffe ſtattfinden kann, da bleibt uns in der Kaſtenfalle ein anderes vorzügliches Hilfsmittel, den Uebergriffen der mordenden, ſchleichenden Strolche im Pelzrock zu ſteuern, und deren Uebelthaten am Leben unſerer Lieblinge zu ſühnen.

Vor den übrigen Fangvorrichtungen hat die Kaſtenfalle die hoch anzurechnenden Vortheile: erſtens, daß ſie für Menſch und Thier abſolut ungefährlich iſt, und zweitens, daß ſich das Wild in ihr lebend, ohne jegliche Verletzung fängt. In ihrer Anwendung liegt ſomit keine Thierquälerei, und verirrt ſich einmal ein unſchuldiges Geſchöpf oder ein werthvolleres, liebgewordenes Hausthier hinein, ſo hat der Fänger nicht, wie leider etwa bei Gebrauch der Tellereiſen, einen halb zu Tode gequälten Krüppel zu beklagen; das Thier kommt lediglich mit dem Schrecken davon und kann heil und geſund gleich wieder in Freiheit geſetzt werden.

Die beſte mir bekannte Kaſtenfalle liefert die Raubthierfallenfabrik Grell u. Co. in Haynau in Schleſien unter dem Namen „Triumph" in fünf verſchiedenen Größen: zum Fang wildernder Hunde, Dachſe, Füchſe bis zu den kleinſten Marder- und Nagerarten.

Für unſere Zwecke entſpricht am beſten Größe III, welche Falle von der Katze abwährts bis zum Wieſel und zur Ratte alle Vierfüßler gleich ſicher fängt. Eine genaue Anleitung zum Fängiſchſtellen wird ſtets der Beſtellung beigelegt; es iſt dieſe Manipulation übrigens ſo leicht und einfach, daß jeder intelligente Knabe damit fertig wird.

Ihren richtigen Platz hat die Katzenfalle in engen Lichtungen, Wegen, Wechſeln und Lücken im Strauchwerk, vor Mauern, Hecken und Zäunen. Wo eine paſſende Stelle zum Legen der Falle nicht bereits exiſtirt, da ſchaffe man ſie künſtlich und unterlaſſe nie, rechts und links vom Falleneingang an eine Strecke hin durch Dornen und dichtes Geäſt einen ſchwer durchbrechbaren, etwa gut einen Fuß hohen Zaun zu bilden, der das ſeitliche Abgehen des ſtrolchenden Geſindels verhindert und ſolches direkt dem verhängnißvollen Kaſten zuweiſt.

Die Kaſtenfalle ſteht ſeit Langem faſt in allen Faſanerien im Gebrauch, und die überaus günſtigen Reſultate, welche dort mit ihr erzielt werden, berechtigen auch zu den beſten Hoffnungen bei ihrer Anwendung in Gärten, Wieſen und den angrenzenden Gehölzen zur Sicherung und zum Schutz der Bruten und Vögel. —

Bei dieſer Gelegenheit will ich Ihnen auch mittheilen, daß ich dies Jahr den Bergleinfink, Linaria rufescens, als Standvogel im Wiggisgebiet, auf den reich mit Tannenwald beſtandenen Alpen von etwa 1000 m Höhe an bis faſt zur Baumgrenze hinauf, gefunden habe.

F. Hauſer.

... Als Eigenthümlichkeit meiner Loris bemerke ich noch, daß dieſelben, allerdings an Sämereien gewöhnt, jede Art von Frucht, Salat, Grünem und auch Eierbrot verſchmähen und unberührt laſſen, während ſie die Sämereien, beſtehend aus Glanzhirſe, Spitzſamen, Hanf, Hafer und Sonnenblumen in erſtaunlicher Menge zu ſich nehmen.

Max Glaubitz.

... Da es Sie vielleicht auch intereſſirt, ſo theile ich Ihnen des Ferneren noch mit, daß ich augenblicklich im ganzen 26 Vögel verſchiedener Arten beſitze, darunter auch einen Jako, wofür mir einmal vor einem halben Jahr ein Vogelhändler 250 ℳ bot. Dieſen Vogel habe ich vor vier Jahren mit noch vier anderen für den Preis von 17 ℳ für das Stück als friſch vom Schiff kommend gekauft. Außer einem, der anfangs krank war, hat den Vögeln noch nie etwas gefehlt, alle ſind großartige Sprecher geworden. Drei davon habe ich verſchenkt und einen verkauft.

B. Koeppen, Ingenieur.

Ornithologiſche Verſammlung in Sarajevo

vom 25. bis 29. September 1899.

Ein gutes Luſtrum iſt verſtrichen, ſeitdem die Ungariſche Ornithologiſche Centrale in Budapeſt ins Leben gerufen wurde. Das Zuſtandekommen dieſer Anſtalt, vereint mit der Zeitſchrift „Aquila", deren ſechſter Jahrgang ſoeben beginnt, hatte die Folge, daß auch das Komité für ornithologiſche Beobachtungen in Oeſterreich, mit dem Sitz in Wien, ſeine Thätigkeit wieder aufnahm und durch Hinzuthun der Verwaltung von Bosnien und Herzegovina auch dort die Beobachungen des Vogelzugs eingeleitet wurde. Der zuſammenhängende Länderkomplex, welcher auf dieſe Weiſe durch Beobachtungsnetze bedeckt wird, erſtreckt ſich vom 42° 16' bis 51° 10' nördlicher Breite, umfaßt Küſtengebiet, Hochgebirge, Tiefebene, nebſt allen nur denkbaren Uebergängen, Binnengewäſſer, Fluß-Syſteme, kurz geſagt, alle Bedingungen für eine reiche Ornis und eine wechſelvolle Entwicklung ihres Lebens. Das Gebiet iſt alſo für die Beobachtung des Zugs der Vögel ausnehmend günſtig geſtaltet und die hierauf verwendete Mühe verſpricht reichen Lohn. Die Hauptbedingung für ein wiſſenſchaftliches Reſultat hängt jedoch weſentlich von einer einheitlichen Methode ab, welche für den ganzen Komplex feſtgeſtellt und ſtreng angewendet werden müßte. Dieſer feſten Ueberzeugung, welche hauptſächlich aus den Bearbeitungen des Vogelzugs in der Zeitſchrift „Aquila" ihren Urſprung nahm, entſprang auch die Nothwendigkeit einer Zuſammenkunft der Funktionäre der oben angeführten drei Beobachtungsnetze im laufenden Jahr, und zwar im Intereſſe der Sache, aber auch mit Rückſicht auf den III. internationalen ornithologiſchen Kongreß; in letzterer Hinſicht zu dem Zweck, um dort ein geklärtes Subſtrat für die einſchlägige Berathung beizuſteuern. Es einigten ſich daher die Gefertigten dahin, Schritte zu unternehmen, um eine Zuſammenkunft zu ermöglichen, und da von vielen Seiten der Wunſch ausgeſprochen wurde, eine Verſammlung von Ornithologen an irgend einem Punkt der Balkanhalbinſel zu veranſtalten, wurde für die Zuſammenkunft der drei Beobachtungsnetze Sarajevo, die Hauptſtadt von Bosnien und Herzegovina, ins Auge gefaßt, und zwar auch aus dem Grund, weil das dortige Landesmuſeum ſich zum „locus credibilis" für die Balkan-Ornis entwickelt hat und der Gebietskomplex ornithologiſch vom höchſten Intereſſe iſt. Die maßgebendenorts geſtellten Anträge führten zu einem vollkommen günſtigen Reſultat, indem die bosniſch-herzegoviniſche Landesverwaltung der für den 25. bis 29. September 1899 in Ausſicht genommenen Verſammlung die weiteſtgehenden Zuſicherungen des Entgegenkommens und der Beihilfe gemacht und es ferner ausgeſprochen hat, daß alle Anfragen und Informationen durch das Landesmuſeum in Sarajevo bereitwilligſt erledigt werden, mithin der adminiſtrative Theil in Sarajevo konzentrirt werden darf. Dieſe höchſt dankenswerthe Entſchließung machte es möglich, ſowol das wiſſenſchaftliche, als auch das ſonſtige Programm feſtzuſtellen. Für das erſtere haben in erſter Reihe die Leitungen der Beobachtungsnetze zu ſorgen, natürlicher Weiſe ſoweit es ſich um den fauniſtiſchen und aviphänologiſchen Theil handelt.

Daſſelbe enthält im Weſentlichen Folgendes: 1. Die Ungariſche Ornithologiſche Centrale ſtellt bei: a) Zugskarten und Tabellen, ſammt dazu gehörigen Vorträgen. b) Referat, als Subſtrat zur Feſtſtellung der einheitlichen Methode der Beobachtung und Bearbeitung des Vogelzugs. 2. Das Komité für ornithologiſche Beobachtungsſtationen in Oeſterreich ſtellt bei: Zugskarten nebſt Vorträgen. 3. Seitens des bosniſch-herzegoviniſchen Landesmuſeums kann gewärtigt werden: a) Zugskarte des Gebiets nebſt Vortrag. b) Referat über den Stand der Balkan-Ornis, nebſt ſich anſchließender Ausſtellung. Prinzipiell wird jedoch ausgeſprochen, daß außer dieſen Materien auch andere ornithologiſche Vorträge gern zugelaſſen werden, daß ſomit außer der Geſammtheit der Funktionäre der drei Beobachtungsnetze auch die Geſammtheit der Ornithologen und der auch Phänologie pflegenden Meteorologen mit der Verſicherung größten Zuvorkommens hiermit freundlichſt zu Gaſt geladen wird.

Das Programm der Veranſtaltungen iſt im Allgemeinen folgendes: Erſter Tag, 25. September 1899. Vormittags 10 Uhr 30 Minuten: Empfang und Begrüßung der Gäſte in Sarajevo. Einquartirung wird beſorgt. Nachmittags: Zuſammenkunft im Muſeum, zwangloſe Beſprechung für die Eintheilung der folgenden Tage. Rundgang durch die Stadt. Abends Souper im Vereinshaus.

Zweiter Tag, 26. September. Vormittags 9 Uhr: Verſammlung im Muſeum, Beſichtigung der Sammlung und speziellen ornithologiſchen Ausſtellung der Balkanländer. Nachmittags 3 Uhr: Im Regierungspalais Beginn der Berathungen, Vortrag der Referate der drei Beobachtungsnetze.

Dritter Tag, 27. September. Vormittags: Fortſetzung der Berathungen. Vorträge. Nachmittags: Ausflug nach Ilidze und zu den Bosnaquellen. Nachtmahl.

Vierter Tag, 28. September. Früh zwiſchen 6 und 7 Uhr: Ausflug zum Skakavac-Waſſerfall mit Brutplatz des Gypaëtos barbatus. Mittageſſen.

Fünfter Tag, 29. September. Vormittags: Schluß der Verſammlung. Mittags: Abreiſe der Theilnehmer an dem Ausflug nach der Herzegovina, eventuell Dalmatien. Nachmittags: Abreiſe der übrigen Theilnehmer.

Die Anmeldung der Theilnahme und der Vorträge hat bis 15. Auguſt 1899 zu erfolgen. Die Theilnahme an der Exkurſion in die Herzegovina iſt beſonders anzumelden. Falls ſich eine gewiſſe Anzahl von Theilnehmern rechtzeitig meldet, könnte die Rückreiſe von Sarajevo zur See über Dalmatien arrangirt werden. Die Anmeldung hierfür wäre gleichfalls bis zum 15. Auguſt erwünſcht.

Sämmtliche Anmeldungen ſind zu richten: An das Bosniſch-herzegoviniſche Landesmuſeum in Sarajevo, Bosnien.

Die Gefertigten ſind bereit, auf ſpeziell wiſſenſchaftliche Anfragen jede Auskunft zu ertheilen.

Wien und Budapeſt, Anfang Juni 1899.

Für die	Für das Komité für Ornithol.
Ungariſche Ornithologiſche	Beobachtungsſtationen in
Centrale:	Oeſterreich:
Der Chef:	Der Obmann:
Otto Herman.	**Dr. Ludwig Lorenz v. Liburnau.**
(Budapeſt, Nationalmuſeum.)	(Wien I, Burgring 7.)

Anfragen u. Auskunft

Fräulein W. v. Daum: Der Käfig von angegebener Größe iſt für ein Par Sonnenvögel zur Zucht groß genug.

Fräulein Anna Hübner: Geben Sie dem Papagei zunächſt etwas Honig oder reinen Lakritzenſaft und täglich zweimal ½ bis 1 Theelöffel voll Dulkamara-Extrakt. Ferner laſſen Sie ihn gelinde Theer- oder Holzeſſigdämpfe einathmen. Dann pinſeln Sie ihm den Mund bis tief in den Schlund hinein, auch die Naſenlöcher mit Salicylſäure-Waſſer. Sollte ſich der Zuſtand des Vogels nicht beſſern, ſo pinſeln Sie bis tief in den Schlund hinein mit einer Auflöſung von chlorſaurem Kali oder Tannin, unter Zugabe von etwas einfacher Opiumtinktur. Statt des Trinkwaſſers geben Sie ihm Haferſchleim, wie Sie es bis jetzt gethan haben. Halten Sie ihn auch in warmer, feuchter Luft, die Sie herſtellen können, indem Sie Blattpflanzen um ſeinen Käfig ſtellen, über die Sie täglich mehrmals hin, vermittels eines Verſtäubers, lauwarmes Waſſer ſpritzen. Die Wärme des Zimmers muß etwa 18 bis 24° R. betragen.

Herrn C. J. Schmidt: Der eingeſandte Vogel war an Luftröhrenkatarrh geſtorben, den er ſich wahrſcheinlich auf der Reiſe zugezogen hat. Ueber den genannten Händler ſind bisher noch keine Klagen eingelaufen. Ob er in dieſem Fall den Vogel krank abgeſchickt hat, kann ich nicht beurtheilen. Es trifft ihn aber inſofern eine Schuld, als er den Vogel nicht gut verpackt hat.

Herrn Armin Quehl: Der eingeſandte Vogel war infolge eines Gehirnſchlags geſtorben.

Herrn Vikar Meuwſen: Ihr Graupapagei war wirklich an Lungenentzündung eingegangen. Einen Reißnagel hatte er übrigens nicht verſchluckt, die Unterſuchung des Magens ergab keinen Fund. So lange hätte er auch nicht danach leben können.

Herrn Max Glaubitz: 1. Reichen Sie ihren jungen kaliforniſchen Schopfwachteln in den erſten acht Tagen ausſchließlich friſche Waldameiſenpuppen und erſt nach dieſer Zeit auch etwas gekochtes, geriebenes Ochſenherz und dazu geſchälte Hirſe und klein geſchnittene Schafgarbe. Wenn die jungen Wachteln vollſtändig befiedert ſind, erhalten ſie ein Miſchfutter aus gekochtem, geriebnem Ochſenherz, Maisſchrot und Chamberlin's Faſanenfutter, welches mit ſiedendem Waſſer angefeuchtet und dem nach dem Erkalten noch eine tüchtige Gabe Ameiſenpuppen beigemengt wird. Dazu bekommen ſie Kanarienſamen, weiße Hirſe, Weizen, etwas Hanf und zeitweiſe Grasſämereien. Im Auguſt und Anfang September tritt bei den Jungen die Mauſer ein, während welcher ſie kräftiger Nahrung und ſorgſamer Pflege überhaupt bedürfen. Haben ſie dieſe glücklich überſtanden, und das Gefieder der Alten angelegt, ſo entwöhnen Sie ſie von dem Weichfutter und geben ihnen ausſchließlich Körnernahrung. 2. Die Loris von den blauen Bergen können Sie in der Voliere im Freien halten, beſonders da ſie ja bei ſchlechtem Wetter im Zimmer Schutz ſuchen können.

Herrn Emil Elert: Füttern Sie die Elſter zunächſt mit den Abfällen von der täglichen menſchlichen Nahrung: Brot, Kartoffeln, Gemüſe, gekochtem Fleiſch u. a. m., nur vor ſcharf gewürzten, ſtark geſalzenen, ſehr ſauren Stoffen und auch zu vielem Fett muß ſie bewahrt werden. Dazu geben Sie eine Hand voll rohen Hafers. Im Sommer ſpenden Sie Maikäfer, Heuſchrecken, Schmetterlinge u. a. m. Zu ihrem vollen Wohlſein trägt es bei, wenn Sie ihr von Zeit zu Zeit ein friſch getödtetes Thier, eine Maus oder einen Sperling u. a. zuwenden. Können Sie ſolche Thiere garnicht erlangen, ſo geben Sie ihr ein entſprechendes Stück rohes, friſches Fleiſch, welches vorher in friſch gezupften Hühnerfedern tüchtig gewälzt worden, ſodaß es mit denſelben rings beklebt iſt. Empfehlen kann ich Ihnen auch eine andere Art der Fütterung. Sie beſteht aus einem Miſchfutter aus Garnelenſchrot, Bohnenmehl und geriebnem Schwarzbrot zu gleichen Theilen, zu welchem Sie auch hin und wieder lebende Maikäfer u. a. Kerbthiere fügen. Die oben erwähnten menſchlichen Nahrungsmittel fügen Sie jedoch nicht zu reichlich hinzu.

◆

Zu unſerm Bilde.

Unſer Bild zeigt die ſchwarzköpfige Grasmücke (Sylvia atricapilla, *L.*). Sie gehört fraglos zu den feinſten und beliebteſten unſerer Sänger und iſt leicht einzugewöhnen. Der Schwarzkopf baut ſich in dichtem Dorngebüſch an, in Hagebuchen, Weiß- und Schwarzdorn, in Fichtendickicht, Haſeln, Hecken und Lauben, ſeltener auf kleinen buſchreichen Bäumchen. Bisweilen findet man das Neſt auf Kaſtanienbäumen ſchon im äußeren Gezweige. Das Neſt, bis 1 m hoch, iſt nicht gerade verſteckt und fällt ziemlich leicht in die Augen. Es iſt zuſammengeſetzt aus dürren Hälmchen und ganz feinen Würzelchen und Stengelchen, um ſo feiner, je mehr nach innen; dieſe ſind loſe verbunden mit Kerbthiergeſpinnſten und — allerdings nur ſehr wenig — Pferdeharen. Selten kommt es vor, daß der Vogel grünes Erdmos für ſein Neſt verwendet; dann hat dieſes ein dichteres Ausſehen als gewöhnlich, wo es zwar etwas dichter und dickwandiger als das Neſt anderer Grasmücken, aber doch recht durchſichtig iſt.

Zur Brutzeit, die eine zweimalige iſt, im Mai und Juli, findet man etwa vier bis ſechs Eier von bräunlicher, weißlicher oder graugrünlicher Grundfarbe, ſtark mit Flecken, Punkten und Gekritzel verſehen, wobei die Fleckenfarbe je nach der Grundfarbe verſchieden iſt. Das Brüten dauert zwei Wochen und wird mittags vom Männchen beſorgt. Beim Brüten läßt der Vogel ſehr nahe an ſich herankommen und verläßt ſein Neſt nicht ſo leicht. Falls das Weibchen getödtet iſt, füttert das Männchen die Jungen allein auf.

Die Jungen ſehen dem Weibchen ziemlich gleich. Dieſes (auf unſerm Bilde oben) hat ſtatt der ſchwarzen Kopfplatte des Männchens eine roſtbraune. Ueberhaupt iſt es im ganzen etwas heller und auf der Bruſt ſanft gelbgrau angeflogen. Gewöhnlich iſt das Weibchen auch etwas größer als das Männchen, eine Erſcheinung, die unter Singvögeln ſelten iſt. Die Jungen ſind unterſeits leichter gelb; die Platten auf dem Kopf, nicht ſehr ſcharf abgegrenzt, ſind braun, bei den Männchen ſchon im Neſt etwas dunkler. Nach der Mauſer ſehen die Jungen den Alten gleich. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1265]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1266]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Futtermittel.

Ameiſeneier,

getrocknete, ſchon 1899er **hochprima,** ſorgfältigſt gereinigte goldgelbe Ware, liefert per Liter 90 Pf. [1267]

Gottlieb Wanek,
Thierhandlung, **Prag** 411, I.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Staats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [1268]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Frische Ameiseneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt der einzige Erſatz: **Zecke** mit heißem Waſſer übergoſſen und dann ausgedrückt. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zecke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Droguerien. Man verlange Zecke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1269]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1270] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
☞ Muſter und Proſpekte koſtenlos. ☜

Friſche Ameiſeneier,

ſaubere helle Ware, à Liter 1 ℳ, 10 Liter 9 ℳ gegen Nachnahme. [1271]

J. Nullmeyer, Vogelhandl., **Mannheim.**

Alle Vogelfutter, Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig,
Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1272

Mehlwürmer,

1000 Stück gegen Einſendung von 1,50 ℳ franko. Gefl. Anfragen unter **P. 172** an
Haasenstein & Vogler, A.-G.,
[1273] **Breslau.**

Vögel.

ff. Harzer Kanarien-Vögel,

Hohl- u. Knorr-Vögel, ſowie Klingel- u. Schaukel-Roller ohne Fehler 15, 20 u. 25 ℳ, geb. dieſelb. 14 Tage a. Probe, jedoch p. Nachn. od. Betrg. vorher, nicht gefall. Vögel tauſche um od. zahle zurück. Preisliſte frei. [1274]

L. G. Müller, Vogelzüchterei, **Nordhauſen a. H.**

NB. Junge von dieſem Jahr à Stck. 5 ℳ, 6 Stck. 25 ℳ, 12 Stck. 48 ℳ, frei dort.

Vogelkatze,

2 Jahre alt, bei Vögel aufgezogen, wegen Umzug für 25 ℳ zu verkaufen.

Aug. Meyer, Vogelhandlung.
[1275] **Straßburg i. E.**

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

Geſetzl. geſchützt.

„Insectiverous“,

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die
Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1276]
Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Geſetzl. geſchützt.

Empfehlen garantirt ſofort nach Ankunft ſchlagende

☞ Sproſſer ☜

à Stck. 9—12 ℳ, [1277]

Wachtelhähne,

à Stück 1,50 ℳ, 6 Stück 7 ℳ, ſowie

Nachtigalen

4—6 ℳ und alle Arten

☞ Grasmücken ☜

unter Garantie lebender Ankunft. Preisliſte gratis.

Prima friſche Ameiſeneier

und 99er getrocknete, à Liter 1 ℳ.

Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft,
Hoffstetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Wachteln,

nur Hähne, gute Schläger, Dtzd. 7,50 ℳ. Garantie für Männchen und lebende Ankunft. [1278]

N. Muschna, Temesvar, Ungarn.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1279]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Harzer Kanarienvögel,

Hohlroller-Stamm, diesjährige Hähne, à 5 ℳ, Dtz. 48 ℳ, Weibchen à 80 ₰, Dtz. 8 ℳ. Garantie für Hähne und leb. Ankunft.

Wilhelm Kaye,
[1280] **Thale** (Harz).

Rothe u. gelbe Kreuzſchnäbel

verſende 6 Stück 4 ℳ, Dutzend 6 ℳ. Tauſche auch auf friſche Ameiſeneier, Sproſſer, Schwarzblättchen, Nachtigalen u. Käfige.

A. Jaumann,
[1281] **Großbreitenbach,** Thür.

Wachtelhähne,

prima Sänger, empfehle à 1,50, Dtzd. 12 ℳ, **rothe Kreuzſchnäbel** 1 ℳ. Garantie leb. Ankunft. **Friſche Ameiſeneier,** à Liter 1 ℳ, **Heidelberen,** à Pfd. 12 ₰, 50 Pfd. 5,50 ℳ, à Ztr. 10 ℳ, reell. [1282]

Gebr. Mergler, Vogelexport,
Hoffstetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Diamantfinken,

2 tadelloſe Pärchen, à 12 ℳ incl. Verpackung. [1283]

A. Grunicke, Altenburg i. S.-A.

Kleine
Gelbhauben-Kakadus,

Stück 12 ℳ, empfiehlt [1284]

S. Risius, Bremerhaven.

Zu kaufen geſucht:

Ein Pärch. oder **einzelnes** Männch. **Dompfaffen,** ſchön befiedert und zahm. **Ziervögel.** [1285]

P. Mantes, Poſtſchaffner, **Merzig.**

Verkaufe ſofort:

2 hochfeine Nachtigalen à 6 ℳ, 1 Spottvogel, gelb, 5 ℳ, 1 Zippe 5 ℳ, 1 Amſel 5 ℳ, 1 Feldlerche 3 ℳ; nur vorjährige hervorragende Sänger, unter Garantie. [1286]

Hilmar Rosenberg,
Meerane, Thalſtr. 46.

Anzeigen.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.
Jll. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1287]

Alexander-Papagei, nicht ganz ausgef. Mch., 3 ℳ. **Goldſtirnſittich,** ſelten, 5 ℳ. 0,2 **jap. Mövch.,** gelb u. braunb., 2,50 ℳ. 1,0 **Zebrafink** 2 ℳ. Auch entſpr. Zuchtkfg. verkauft **H. Schmidt, Gelsweid, Weſtf.** [1288]

☞ 1898 erhielt mein Stamm **Harzer Kanarienvögel** 1. Staatspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ. u. Gar., 8 T. Pr. **Paul Holzky,** Cöthen (Anhalt). [1289

Goldſtirnigen, blaubärtigen Blattvogel, Phyllornis aurifrons, vorzügl. Sänger u. Spötter, tadellos hier vermauſert u. überwintert, daher akklimatiſirt u. futterfeſt, verk. inkl. Verſandtkäfig für 60 ℳ. [1290]
Franz Mühlbock, Diſtriktsarzt,
Villach (Kärnten, Oeſter.), Widmanngaſſe 35.

Grau-Papageien

junge große kräftige, geſundeſte, ſchön befiederte Thiere, jetzt 8 Wochen hier, habe noch abzugeben à Stück nur 18 ℳ, dito ſolche, jetzt ſchon ¼ Jahr hier, echte Kongo-Grau-Papageien, bildſchöne Exemplare, ſchön flötend und ſchon ſchön zu ſprechen anfangend, nur 25 ℳ, einige ſolche, jetzt ½ Jahr hier, nur 30 ℳ, einige ganz vorzügliche Sprecher, ſehr viel ſprechend, 50, 60, 80, 100, 150 ℳ. **1 Taubenhals-Amazone,** viel und auf Kommando ſprechend, 50 ℳ. **Junge Amazonen, Blauſtirn,** à 20 ℳ. ſchon gut ſprechend, 25, 30, 35, 40 ℳ. **Große Doppelgelbköpfe** und **Goldnacken,** anfang. zu ſprech., 30 ℳ.

Papageienkäfige ſtets auf Lager!

F. Rejsek, Hamburg, Peterſtr. 28.

[1291] ☞ **Specialität: Papageien.** ☜

[1292] **Geſucht:**

1 Par Granataſtrilde, 200 ℳ offer.
J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.).

☞ **Geſucht:** ☜

Eine circa 2—3 Monat alte **Rehgais,** womöglich von der Gattung der Damhirſche. Zu erfragen unter **W. S.** bei der Exped. dieſes Blattes. [1293]

Bücher-Anzeigen.

Verkaufe oder vertauſche

gegen **leicht**niſtende ausländ. Vögel: Mayer, geogr. Bilder; Krieg 1870/71 v. Profeſſ. Lindner; Leſſings Werke; 1. Schuljahr v. Dr. Rein; Kolbe, Katechismuserklärung; ſchöne Lieder für 1 Singſt. m. Klavier; Orgelpräludien u. a. Bücher u. Noten.

Offert. erb. an Kantor **Th. Müller** in **See** b. Niesky O.-L. [1294]

Für 55 Mk. franko

verkaufe ich Dr. Ruß' Prachtwerk: „Die fremdl. Stubenvögel“, Band I, III u. IV, Band II theilweiſe. [1295]
Ew. Frommhold,
Zwickau i. S., Moritzſtraße.

Für Beſitzer des

Handbuch für Vogelliebhaber

von **Dr. Karl Ruß**

in früheren Ausgaben ſtehen die dem Werke jetzt beigegebenen Illuſtrationen, beſtehend in

28 Vollbildern fremdländiſcher Stubenvögel
(zu Band I), ſowie
25 Vollbildern einheimiſcher Stubenvögel
(zu Band II)

für den Preis von je nur 1 Mark durch jede Buchhandlung, ſowie in der unterzeichneten Verlagshandlung ſelbſt zu Dienſten.

Das **Illuſtrirte Handbuch** koſtet auch jetzt noch, wie bisher, für
Bd. I (Fremdl. Stubenv.) broch. 6,50, geb. 8 ℳ
„ II (Einh. Stubenv.) „ 6,—, „ 7.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.

Für Aquarienliebhaber!

Im unterzeichneten Verlage erſcheint

Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde

herausgegeben von **Dr. E. Bade.**
(Monatlich zwei Nummern!)
Preis: halbjährlich Mk. 2.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in **Magdeburg.**

Der
Deutſche Geflügelhof

Abonnement vierteljährlich 75 Pfg.

Inſerate: die einſpaltige Zeile 15 Pfg.

Amtliches Organ des Sonderausſchuſſes für Geflügelzucht der Landw. Kammer für die Prov. Brandenburg und der demſelben angeſchloſſenen Vereine.

Redaction:
Bruno Dürigen, Charlottenburg.

Der „Deutſche Geflügelhof“ bringt alles Wiſſenswerthe auf dem Gebiete der landw. Nutzgeflügelzucht, ſowie rationellen Tauben- und Kaninchenzucht, auf den Sport dabei gebührend Rückſicht nehmend, belehrende Artikel für den Anfänger, Beſchreibungen und Abbildungen.

☞ Probenummern koſtenlos ☜
durch die Geſchäftsſtelle
Otto Koobs Verlagsanſtalt,
Forſt i. L.

In unserem Verlage erschien:

Das Huhn als Nutzgeflügel.

Von
Dr. Karl Russ.
Zweite, reich illustrirte Auflage.
Preis M. 2.—; geb. 2.50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Bei uns erschien:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von **Dr. Karl Russ.**
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhdlg.
in Magdeburg.

Bei uns erschien:

Der Sprosser oder die Aunachtigal
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber und Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 29.

Mittheilungen aus Centralamerika (Fortſetzung).
Engliſche Vogelliebhaberei (Fortſetzung).
Der Sumpfrohrſänger (Acrocephalus palustris, *Bchst.*) in ſeiner Bedeutung als Stubenvogel.
Ornithologiſches vom Danziger Stadtgraben.
Ein neuer Wanderzug des Roſenſtars (Sturnus roseus, *L.*).
Die Waſſeramſel oder der Waſſerſtar.
Briefwechſel.
Zu unſerm Bilde.

Anzeigen.

[illegible] Anzeigen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg ſowie in allen Annoncen-Geſchäften.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1296]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Als wohlthät. Bedürfn. f. Papageien off.
1 Salon-Kletterständer,
zweckm. u. dauerh. konſtr. (mehrproſſ., zerlegb.), ſpottbillig für 12 ℳ. Tauſche auch Nützliches. [1297]
A. Schlegelmilch, Zerbſt, A.

50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,** [1298] Waren i. Mecklenb.
Proſpekte gratis.

Grottenſtein-Kanarien-Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei.
R. Schröter (vorm. C. A. Dietrich, Heilter.), **Clingen** bei **Greußen.** [1299]

Käfige
jeder Art
(Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1300] **Oſchatz** i. S.

Neu! **Senſationell!**
Kanarien-Lehr-Orgeln,
auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. R.-M. 108181 **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden empfiehlt
[1301] **Edmund Schiewick**, Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit f. Ref. zu dienen.

Bitte!

In eigenem Intereſſe wollen die pp. Einſender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt“ beſtimmten **Zuſchriften** und **Sendungen** (tote Vögel) an **Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin SW., Belle-allianceſtraße 81,**

b) **alle Beſtellungen** auf Abonnements, Inſerate u. drgl. Geſchäftliches nur an die **Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg**

zu richten ſind.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes
Schlagnetz
m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1302]
K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Für alle Arten Vögel fertige ich fachgemäße
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1303]

Der beſte Fangapparat
für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1304]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Vogelkäfige
aller Art
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in praktiſcher Anordnung
großer Auswahl u. billigem Preis. [1305]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Verkaufe Platzes halber billige Vogelbauer:
Neuntheiligen Geſangskäfig zum Anlernen junger Kanarienvogel, 10 ℳ, Heckbauer 75×40×37 cm groß, 8 ℳ, Wachtelbauer 8 ℳ, Lerchenbauer 8 ℳ, Papageibauer, 1 m hoch u. ½ m Durchmeſſer, 10 ℳ. Die Bauer ſind noch wie neu, tauſche auch Nützliches.
[1306] **L. Brock,**
Eisdorf b. Lützen (Prov. Sachſen).

Alle Vogelfutter,
Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.
E. Schreiber, Leipzig,
Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1307]

[illegible]

in ein Hochzeitskleid oder die von mir gekauften Vögel waren alle junge Thiere. Ebenſo dürfte es kaum dem Zufall zuzuſchreiben ſein, daß mein Indianer nur Männchen zum Verkauf brachte, umſo weniger als ſich ſolche von den Weibchen kaum unterſcheiden. Ich nehme vielmehr an, daß die hierher kommenden Züge Biſchöfe nur aus Männchen beſtehen. Alle meine Nachfragen nach Weibchen blieben bis auf die Erwerbung eines einzigen Exemplars ohne Erfolg. — Iſt es alsdann Thatſache, daß das einmal ausgefärbte Männchen ſein ſchönes blaues Gefieder behält, d. h. ſich nicht wieder verfärbt, ſo beſteht meines Erachtens darüber kein Zweifel, daß die nach Guatemala ziehenden hellblauen Kernbeißerfinken ohne Ausnahme aus jungen unausgefärbten Männchen beſtehen. Verfärbt ſich dagegen der Biſchof in den Frühlingsmonaten, bzl. zieht er ein Hochzeitskleid an, ſo wäre mir auch dieſe Thatſache noch unbekannt geweſen und ich wüßte mich nicht zu entſinnen, jemals darüber geleſen zu haben. Dieſen letzteren Ausführungen betreffs des Wechſels zum Prachtgefieder möchte ich mich vollſtändig anſchließen. Um Gewißheit in dieſer Angelegenheit zu erhalten, habe ich überall, wo ich einen Ruiz finden konnte, Anfragen nach ſeiner Verfärbung gehalten. Die meiſten Beſitzer hatten den Vogel im braunen Gefieder gekauft und dieſer verfärbte ſich erſt im Käfig, in welchem er ſich erſt ſeit einigen Monaten befand. Einige Male wurde mir aber auch von glaubwürdiger Seite verſichert, daß der Ruiz im vergangenen Jahre ſchon einmal blau geweſen ſei. Selbſtredend nehmen jetzt meine Biſchöfe alle Aufmerkſamkeit in Anſpruch und mit Intereſſe ſehe ich der weiteren Entwickelung entgegen.

Der Ruiz, wie ihn der Eingeborene nennt, gilt bei ihm als guter Sänger, doch habe ich ſolches abſolut nicht finden können. Einen Stümper möchte ich ihn nennen, deſſen Geſangsleiſtungen den Eindruck machen, als ſeien es nur Verſuche. Betreffs des Geſanges der hieſigen Vögel und des Sprechens der Papageien begegnet man überhaupt hier zu Land den wunderlichſten Anſchauungen.

In der Vogelſtube und in Gemeinſchaft mit anderen Vögeln iſt der Hellblaue verträglich, höchſtens am Futterplatz ſperrt er einmal gegen andere Mitbewohner ſeinen Schnabel. In der Hand gehalten, kann man aber von dem ſperlingsgroßen Vogel ganz barbariſch gebiſſen werden. Ich finde den Vogel ausdauernd, ſogar hart, er frißt alles Mögliche, Körner- und Weichfutter, ebenſo Inſekten. Als Univerſalfutter für alle Vögel werden von den Eingeborenen Bananen verabreicht, und merkwürdiger Weiſe kann man mit dieſer Frucht auch Körnerfreſſer eine ganze Zeit lang beim beſten Wohlſein erhalten. So ergeht es auch dem Ruiz. Hier wird er mit Bananen, Tomaten und Maisſchrot gefüttert, und ich ſah bei dieſer Fütterung die ſchönſten blauen Männchen. In Mexiko ſoll der Vogel noch weit gewöhnlicher als in Guatemala und ſo recht der Käfigvogel der Eingeborenen geworden ſein.

Wollte ich dem hellblauen Kernbeißerfink noch einige Worte über ſein Gefieder widmen, ſo müßte ich von rechtswegen das Männchen im braunen und blauen Kleid beſchreiben und da erſteres hinlänglich vom Weibchen verſchieden iſt, auch dieſes folgen laſſen. Zu einer ſo großen Seltenheit gehört aber nun der Vogel nicht, daß er nicht ſtets in einigen Köpfen in Deutſchland eingeführt werden ſollte und ſomit ſchon hinlänglich bekannt iſt. Eine Verwechſelung des blauen Vogels erſcheint mir vollſtändig ausgeſchloſſen. Das Männchen im braunen Gefieder zeigt weſentlich mehr rothbraune Farbe als das Weibchen, namentlich heben ſich zwei rothbraune Flügelbinden deutlich ab, die beim Weibchen als verwaſchen Gelbbraun erſcheinen. Außerdem hat als charakteriſtiſches Zeichen das Männchen einen intenſiv ſchwarzen Zügel und einen auffallenden hellen Kehlfleck, was beides dem Weibchen vollſtändig fehlt. Letzteres iſt außerdem an Kopf, Nacken und Rücken bronzeartig gelbbraun, untere Seite weſentlich heller. Dem Weibchen fehlt jede Spur von blau. Leider ſind Weibchen in Guatemala ſehr ſelten, alle zum Verkauf kommenden braunen Vögel verfärben ſich über kurz oder lang in blau. Derartige Vögel konnte ich in dieſem Winter zahlreich kaufen, dagegen gelang es mir, wie geſagt, nur ein einziges Mal ein Weibchen zu erwerben. Nach dieſem lebenden, ſowie nach dem im Muſeum befindlichen, gab ich die vorſtehende Beſchreibung.

Die nach Guatemala kommenden hellblauen Kernbeißer halten ſich hauptſächlich in den bereits abgeernteten Maisfeldern auf. Bei der Maisernte werden nur die Fruchtkolben ausgebrochen, das Stroh bleibt ſtehen und wird ſpäter im Februar bis April abgebrannt. In dieſen Feldern finden die Vögel reichlich Nahrung und Schutz, da nächſt den vielen Unkrautſämereien immerhin noch viele Maiskolben aus Verſehen, oder da ſolche noch nicht ausgereift waren, ſtehen geblieben ſind. Am Abend fliegen die Trupps nach naheſtehenden Bäumen und Waldrändern. Gefangen wird dieſer ſchöne Kernbeißer durch einen Lockvogel mit Leim in den Maisfeldern und an Tränkplätzen. (Fortſetzung folgt).

* * *

Engliſche Vogelliebhaberei.

Von Albert Rettich.

(Fortſetzung von Nr. 25).

Als wir in die zweite Vogelſtube der Villa des Herrn Fulljames traten, wurde unſere Aufmerkſamkeit ſofort auf eine Rothſchnabel-Dohle (Fregilus graculus) gelenkt, die mit geräuſchvollem Flügelſchlag vom Boden aufflog. Sie hatte ſich wieder einmal aus ihrem Käfig befreit, woran ihre Wärter ſchon gewöhnt ſind, weshalb man ſie meiſtens unbehelligt läßt. Das Thier kam auch bald wieder trotz unſerer Gegenwart herunter und trippelte mit ſeinen karmoiſinrothen Beinen gravitätiſch im Zimmer umher.

Die Dreiſtigkeit und die Neugier der Dohlenfamilie iſt zum Sprichwort geworden, und iſt auch bei

[illegible]

[illegible]

Sein Hauptgegner bei dieſen Gelegenheiten iſt Mr. Fulljames zweiter Star, der wenigſtens ſechs Jahre alt und ein ſprachkundiger, erſtaunend zahmer Neſtling iſt. Durch den Beſitz wunderſchönen Gefieders und anmuthiger Dreiſtigkeit (die Sprechfähigkeit zählt nicht) trägt er gewöhnlich den erſten Preis davon.

Ein dritter Star im ſelben Zimmer, aber in die Albino-Klaſſe gehörig, fällt dem Beſchauer durch ſeine ungewöhnliche Grundfarbe auf. Anſtatt ſchwarz und grau iſt dieſer zimmetbraun, die weißen Tupfen ſind unverändert. Das erſte Mal, als er in der Oeffentlichkeit erſchien, gewann er die höchſte, erzielbare Auszeichnung, ging dann zum vollen Katalogpreis in Mr. Fulljames Beſitz über und hat für ihn ſeither regelmäßig die erſten Preiſe gewonnen. Dies will viel heißen, da die Albino-Klaſſe immer neue Naturſpiele bringt und ſtets ſehr beſetzt iſt. Der genannte Star muß alſo über alle ſeltenfarbigen Vögel, groß und klein, ſiegen, nicht nur über weiße, ſilbergraue, fahlgelbe und dunkelbraune Stare, wie ſie ſchon ſeit Jahren zu ſehen waren. Der hellbraune übertrifft ſie alle durch die Seltenheit der Grundfarbe und beſitzt außerdem alle die Vorzüge, die ein Sieger haben ſoll.

Eine weiße Amſel, eine ſilbergraue Feldlerche, ein zimmtbraunes Rothkehlchen, zwei fahlgelbe Buchfinken und ein weißer Sperling kommen zunächſt vor den Beſchauer, aber es kann ſich keiner dieſer Vögel mit dem hellbraunen Star meſſen. Erſtens ſind ſie alle Weibchen und verlieren dadurch an Werth, zweitens ſind ſie entweder ſo unbändig, daß das Gefieder leidet, oder ſie ſind zu ſchwächlich, ſich glatt zu halten, und ohne feſtanliegendes Gefieder und geſundheitsſtrotzende Erſcheinung in es unnütz, konkurriren zu wollen. Die Seltenheit der Farbe allein thut's nicht mehr; andere Vorzüge müſſen auch reichlich vorhanden ſein, ehe ſie zur Beachtung des Preisrichters gelangen. Doch will ich mir eine eingehende Abhandlung der äußerſt intereſſanten Albinoklaſſen auf Weiteres vorbehalten.*)

In demſelben Zimmer, das beiläufig geſagt bedeutend größer als das ſchon beſuchte Papageien-Zimmer iſt, finden wir auch die britiſchen Repräſentanten und deren Miſchlinge vor, die meiſtens in zwei geräumigen Wandvolieren fliegen, und worunter ich ein Pärchen deutſcher Girlitze hervorhebe, weil ſie wahrſcheinlich die einzigen ſind, die in der britiſchen Ausſtellungswelt zu finden ſind. Einheimiſch ſind ſie auf unſeren Inſeln abſolut nicht, und die vereinzelten Exemplare, die hie und da vom Continent als grüne Zeiſige herüberkommen, finden keine Liebhaber. Grund genug, warum ſie bei Mr. Fulljames gute Aufnahme finden.

Ich übergehe einige zwanzig einheimiſche Finken, die meiſt nur mittelmäßig in Qualität ſind, und komme zu einem Hänfling-Blutfink-Baſtard, der ſehr ſchön iſt und eine recht erfolgreiche Laufbahn hinter ſich hat. Ich ſage ausdrücklich „hinter ſich", denn obgleich nur drei Jahre alt, iſt ſeine Glanzperiode ſchon vorüber. Bei ſolchen Beiſpielen fragt man ſich immer wieder, iſt der Cayennepfeffer an dem frühen Rückgang der Geſundheit Schuld? Zwei Zeiſig-Baſtarde, die durch ihren ſchrillen Geſang ſofort die Blutverwandtſchaft mit Kanarien verrathen, nehmen unſere Aufmerkſamkeit zunächſt in Anſpruch. Ihr Werth liegt darin, daß ſie nicht von unſerm gewöhnlichen, ſondern von dem amerikaniſchen ſchwarzköpfigen Zeiſig und einem Norwich-Weibchen abſtammen, wodurch ſie an hochgelber Farbe und Körpergröße bedeutend gewinnen. Zum Ausſtellen ſind dieſe zwei Raritäten ganz nutzlos, denn trotz der koloſſalen Reichhaltigkeit unſerer Klaſſen haben wir noch keine für Baſtarde zwiſchen fremdländiſchen und europäiſchen Finken. Es dürfte aber bald dazu kommen, denn die Züchter dieſer oft ſehr ſchönen und immer intereſſanten Miſchlinge werden ſtets zahlreicher.

(Fortſetzung folgt).

---

*) Wir bitten ſehr darum. D. L.

Der Sumpfrohrſänger (Acrocephalus palustris, *Bchst.*) in ſeiner Bedeutung als Stubenvogel.

Von Fr. Anzinger.

Nicht viele, ja ich darf behaupten, ſehr wenig Vogelfreunde gibt es, welche den Sumpfrohrſänger oder Rohrſpötter im Freien beobachtet und in dieſem Fall auch als die richtige Art angeſprochen haben. Faſt ebenſowenig wird der Vogel im Käfig gehalten und die Mittheilungen über ſein Gefangenleben fließen daher ziemlich ſpärlich. Manchem Leſer dieſer Zeitſchrift dürfte es daher nicht ungelegen kommen, über dieſe ſehr intereſſante Art, namentlich über ihren Werth als Sänger und als Käfigvogel einiges zu vernehmen.

Für unſer engeres Beobachtungsgebiet kommen nur fünf eigentliche Rohrſängerarten (Acrocephalus) in Betracht, welche zuſammen eine Gattung präſentiren, die ſich einerſeits von der Gattung der Droſſeln und droſſelartigen durch die getäfelten Läufe und von den Gattungen Grasmücken und Laubſänger andrerſeits durch am Kieferrand ſtehende, ſtarre, abwärts gerichtete Borſten und durch ſtark abgerundeten Schwanz unterſcheiden. Wie ſchon ihr Name beſagt, bewohnen ſie ſumpfige Gegenden oder Gewäſſer, welche mit Schilf, Rohr und Gebüſch beſtanden ſind, führen hier ein ſehr verſtecktes Leben und ſind daher der Beobachtung viel weniger zugänglich als andere Sänger. Es ſind Zugvögel, welche im ſpätern Frühjahr ankommen und im September und Oktober wieder abziehen. Als Sänger und daher ſpeziell für die Liebhaberei für ſolche kommt — wohlgemerkt — nur der Sumpfrohrſänger in Betracht, da der Geſang der übrigen Arten kaum erwähnenswerth iſt, d. h. den Anforderungen eines Vogelgeſangskenners nicht entſpricht.

Im Allgemeinen ſollte es daher für unſern Zweck genügen, nur Geſtalt und Gefieder dieſes einen Sängers zu beſchreiben, doch leitet mich hier ein anderes Motiv. Es iſt nämlich eine unleugbare Thatſache, daß viele Händler, welche ſonſt faſt jeden im Handel vorkommenden Exoten kennen, über unſere heimiſchen Vögel am ſchlechteſten unterrichtet ſind und mit ihren bezüglichen Kenntniſſen über diejenigen des allerbeſcheidenſten Liebhabers gar nicht hinausreichen. Daß ein ſolcher Händler zwiſchen dem Sumpfrohrſänger und dem ſehr ähnlich gefärbten, viel häufiger vorkommenden, aber für die Liebhaberei vollkommen werthloſen Teichrohrſänger nicht zu unterſcheiden vermag, iſt dann wol ſelbſtverſtändlich. Ja ſogar Schilf- und Binſenrohrſänger werden, wie ich mich auf einer unſerer Ausſtellungen überzeugte, als Rohrſpötter ausgeboten. Ob in ſolchen Fällen Unkenntniß oder Gewiſſenloſigkeit zu Grunde liegt, iſt einerlei, der unerfahrene Käufer wird einfach geprellt.

Ich finde es daher nicht überflüſſig, der eigentlichen Beſchreibung des Rohrſpötters eine leichtfaßliche Ueberſichtstabelle zum ſchnellen und richtigen Beſtimmen aller fünf Rohrſängerarten vorauszuſchicken, wie ich ſie ähnlich für meine Arbeit „Die unterſcheidenden Kennzeichen der Vögel Mitteleuropas in analytiſchen Beſtimmungstabellen“*) kombinirt habe.

Die Oberſeite des Vogels auf hellerem Grund dunkel geſtrichelt.		Die Schwanzfeder-Enden lanzettförmig zugeſpitzt; Oberkopf mit drei ſcharf markirten Längsbinden, von welchen die beiden ſeitlichen ſchwarzbraun ſind und die mittelſte blaß ockergelb iſt; Hauptfarbe roſt- oder braungelb, oben ſchwarz geſtreift; beim alten Vogel auch die Bruſt fein geſtrichelt; Länge ca. 13 cm: Binſenrohrſänger (Acroceph. aquaticus, *Gm.*).
		Die Schwanzfedern nicht lanzettlich zugeſpitzt, der hellolivenbraune, ſchwarzbraungefleckte Scheitel ohne Längsbinden; Oberſeite graubraun, dunkelbraun geſtrichelt; Augenbrauenſtrich und Unterſeite weiß; Größe des Vorigen: Schilfrohrſänger (Acroceph. schoenobaenus, *L.*).
Die Oberſeite des Vogels einfarbig, nicht dunkelgeſtrichelt.		Geſammtlänge 21 cm (Starengröße); Oberſeite gelblichroſtgrau; Unterſeite grauweiß: Rohrdroſſel (Acroceph. arundinaceus, *L.*).
	Geſammtlänge ca. 13,5 cm (Stieglitzgröße).	Flügellänge ca. 7 cm; Mundwinkel orangegelb; Unterflügeldecken blaßgelblichweiß; Oberſeite grünlichbraungrau; Kehle weiß, Unterſeite trübweiß, ockergelb angeflogen: Sumpfrohrſänger (Acroceph. palustris, *Bchst.*).
		Flügellänge ca. 6 cm; Mundwinkel orangeroth; die kleinen Unterflügeldecken lichtroſtbräunlich; Oberſeite gelblichroſtgrau; Unterſeite weiß, an den Seiten mit ſtark roſtgelblichem Anflug: Teichrohrſänger (Acroceph. streperus, *Vieill.*).

Unſer Rohrſpötter iſt alſo vom Schilf- und Binſenrohrſänger durch die Färbung, und von der Rohrdroſſel hauptſächlich durch die geringere Größe unterſchieden. Nur ſein nächſter Vetter, der Teichſänger, hat große Aehnlichkeit mit ihm, und es ſind daher die oben erwähnten Unterſcheidungsmerkmale genau zu reſpektiren.

Wer Gelegenheit hat, die verſchiedenen Rohrſängerarten im Freien zu beobachten, wird übrigens finden, daß ſich der Rohrſpötter in ſeinen Lebensäußerungen vom Teichſänger weſentlich unterſcheidet. Während der Letztere ſich ſeinen Brutbezirk faſt ausſchließlich nur in mehr oder weniger zuſammenhängendem Rohrdickicht wählt, ſcheint unſer Rohrſpötter an eine ſolche Aufenthaltsbedingung nicht gebunden zu ſein. Ihm genügt dichtes Gebüſch, am liebſten von Weiden, welches mit hochaufſchießenden, ſtarkſtengeligen Gräſern durchwachſen und umgeben iſt, vorausgeſetzt, daß ſich daſſelbe an einem Gewäſſer oder doch wenigſtens in einer tiefliegenden, ſumpfigen Wieſe befindet. Wo ihm die Oertlichkeit zuſagt, theilt er das Wohngebiet auch mit anderen Gattungsverwandten. Hier unterſcheidet er ſich vom Teichſänger durch weniger verſtecktes Weſen, etwas abweichenden Neſtbau, anders gefärbte Eier, vor allem aber durch ſeinen Geſang. Neſtbau und Gelege behufs Unterſcheidung von anderen Arten zu beſchreiben, würde etwas zu weit führen, ohne in den wenigen Fällen ein Reſultat zu erzielen, dafür ſoll der Geſang des Rohrſpötters als Hauptmoment hervorgehoben werden.

Soweit wir den Rohrſpötter in Innsbrucks Umgebung beobachten können, fällt das Mittel ſeiner Ankunftszeit zwiſchen den 29. April und 5. Mai. Eine frühere Ankunftszeit wird ſelten, eine ſpätere dagegen viel häufiger beobachtet. Einige Tage währt es, bis ſich der Vogel von ſeiner Reiſe erholt und ſich entſprechend geſättigt hat, und nun erſt beginnt ſein Geſang mit jenem Feuer und kommt derart zur Geltung, daß er vom lauſchenden Kenner nach der jeweiligen Leiſtung gewürdigt werden kann. Hat der Horchende einen tüchtigen Sänger vor ſich, ſo wird er ihm wol Stunden lang mit Vergnügen lauſchen, andern Falls aber wenigſtens zur Ueberzeugung gelangen, daß der Vogel über einen zuſammenhängenderen Geſang und über viel ſchönere Stimmmittel verfügt, als ſeine übrigen Gattungsgenoſſen.

Im Geſang der letzteren herrſcht ein faſt wechſelloſes Gleichmaß, und zwar in der Tonlage ſelbſt, als auch in der Zuſammenſetzung der verſchiedenen Lautſilben. Iſt eine Lautſilbe angeſchlagen, ſo folgt ſie oft in ſechs- bis neunfacher Wiederholung, in gleicher Tonhöhe und in unverändertem Zeitmaß hintereinander, ſteigt dann etwas in die Höhe, wiederholt ſich hier ebenſo oft und ſinkt vielleicht am Schluß wieder herab. Eine weiterfolgende Klangfigur, welche ſich höchſtens durch andere Konſonanten unterſcheidet, wird mehr oder weniger oft wiederholt, und ſo reihen ſich die kunſtlos gebildeten Geſangsſätze aneinander, ohne irgend einen Anſpruch auf Melodik erheben zu können. Nur der Schilfſänger macht eine beſcheidene Ausnahme, indem ſich aus ſeinem Geſang kräftig angeſetzte ſteigende Triller und flötenartige Pfiffe hervorheben, welche ſehr hübſch klingen.

---

*) Herausgegeben vom Verein für Vogelkunde in Innsbruck, zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Anders der Rohrſpötter. Er verfügt über eine ſo tonreiche Kehle, wie ſie nur unſeren Edelſängern eigen iſt und vermag dieſen Tonſchatz je nach ſeiner Begabung zu den verſchiedenſten Geſangsfiguren, zu den eigenartigſten und zum Theil ſehr ſchönen, melodiöſen Strofen zu verwerthen. In regelloſer Folge, ohne Einhaltung eines bei anderen Sängern oft üblichen Schema, reihen ſich die verſchiedenen theils lebhaft theils ernſt und ſchwermüthig klingenden Weiſen ziemlich raſch aneinander, und es dünkt uns, daß der Sänger während des Vortrags komponirt, und die Ergebniſſe ſeiner Stegreifmuſe in der leichtfertigſten Weiſe zum Beſten gibt. Aber er iſt nicht nur Stegreifdichter, ſondern er entlehnt auch Bruchſtücke und kurze Liederſätze aus dem Geſang anderer Vögel und bringt ſolche Kopien, meiſt allerdings etwas oberflächlich, mit ſeinem eigenen Lied in einen mehr oder weniger harmoniſchen Einklang.

Bringt der Vogel nicht zu viel zwitſchernde, ſchleifende und ſchirkende Rohrſängerlaute, bewegt ſich ſein Geſang vielmehr in klangſchönen Figuren, welche durch Beigabe hübſcher Kopien aus fremden Vogelgeſängen vermehrt und gehoben werden, ſo hört man wol eines der ſchönſten Vogellieder, und der Wunſch, einen ſolchen Sänger zu beſitzen, liegt dann für den Liebhaber ſehr nahe. Aber nicht immer und nicht überall ſind ſolche Künſtler zu treffen, und wo man ſie findet, iſt ihnen vielleicht durch den gewählten Standort ſehr ſchwer beizukommen, ohne den hoch- und langklafternden Stecknetz faſt gar nicht.

Es iſt daher einerſeits zu beklagen, daß ſolch ausgeſuchte Sänger viel weniger in den Beſitz der Liebhaber kommen, als andere Arten aus Wald und Flur. Rauſch und Scherzer in Wien bringen übrigens alljährlich im Frühjahr Sumpfrohrſänger in den Handel, und von dieſen Herren darf man wenigſtens hoffen, daß ſie wirklich Rohrſpötter und nicht Teichſänger als erſtere zum Kauf anbieten. (Fortſetzung folgt.)

Ornithologiſches vom Danziger Stadtgraben.

Von Fritz Braun.

Wol nirgends in der Danziger Gegend finden wir ein ſo reiches Vogelleben wie an dem verſchilften, größtentheils mit Röhricht beſtandenen Stadtgraben zwiſchen dem Werder- und Legethor (etwa 1,5 km lang und 9 bis 14 m breit).

Auf der einen Seite des Grabens zieht ſich ein weidenbeſchatteter Werderweg dahin, auf der andern erklimmt hier und da dichtes Buſchwerk den Hang des grünen Walles. So finden wir denn auch die Charaktervögel des Werder, der Buſchvegetation und des Sumpfes hier auf gar engem Raum zahlreich bei einander.

Näherſt du dich dem Röhricht des alten Grabens, ſo grüßt dich zuerſt der laute, knarrende Geſang der Rohrdroſſel. Erkundigt man ſich bei dem Mann aus dem Volk nach dem ſonderbaren Künſtler, ſo heißt es „das iſt ein Regenvogel“, wofern er nicht wie viele ſeiner Verwandten unter dem Kollektivnamen Rohrſpatz mit einbegriffen wird (der hier nicht den Rohrammer bezeichnet). Von den Verwandten des Droſſelrohrſängers finden wir nur den Teichſänger, doch ſtellt ſich die Kopfzahl dieſes Vogels zu jener der Rohrdroſſel höchſtens wie 1 : 3.

Von Zeit zu Zeit vernehmen wir auch den ſtammelnden Geſang des Rohrammer, der zumeiſt von der Spitze eines Rohrkolbens ſein unzuſammenhängendes Lied vorträgt. Mitunter finden wir ſie jedoch auch fünfzig, ja hundert Meter von dem Röhricht entfernt in einer Weidenkrone.

Viel ſchwerer als alle dieſe Thiere bekommt man das Pärchen Zwergrohrdommeln zu Geſicht, das in unſerm Graben niſtet. Prächtige, durchaus nicht ſcheue Beobachtungsobjekte ſind dagegen die grünfüßigen Rohrhühner (das Bläßhuhn fehlt), die jetzt im Juni gerade ihre junge Brut durch's Rohr führen. Ungemein ſelten nur vermag man ſich dem Zwerglappentaucher unbemerkt zu nahen. Zumeiſt ſieht man nur, wie ein kleiner Gegenſtand in ſchräger Linie in's Waſſer ſchießt. Hat man ſcharfe Augen und ein wenig Glück, ſo taucht nach einiger Zeit ſein ſpitzer Kopf hier oder dort über die ſtille Fluth empor, aber an unbehinderte Beobachtung dieſes Vögelchens iſt kaum mehr zu denken. Natürlich ſind neben dieſen ſeltenen Gäſten die Wildenten ſtändige und zahlreiche Bewohner unſeres Gebiets.

Ganz und gar zum Sumpfvogel wurde hier auch die weiße Bachſtelze (Wippſtert im Volksmund) und die ebenſo anmuthige Schafſtelze, die ſich Tag für Tag auf dem Entenflott und den Aloepolſtern herumtreiben und den Inſekten nachſtellen.

Am meiſten drängen ſich die Bezirke der Vögel an einer Stelle zuſammen, wo der Graben einen Bogen beſchreibt und am Wall halbwüchſige Bäume, Hollunder- und Weidenbüſche bis zu dem Röhricht herabſteigen. Hier wohnt der Sproſſer neben der Dorn- und Zaungrasmücke, der Weidenlaubvogel (der hier nur ſeine erſterbende Weiſe, ſelten ſeinen Pink-Pank-Ruf erſchallen läßt) neben dem Sumpfſänger und Blaukehlchen, trotzdem recht häufig kreiſchende Elſtern (ihre Neſter ſind Gott ſei Dank in dieſem Jahr leer) durch die Büſche fliegen. Vielleicht gelingt es den kleinen Vögeln, ihre Neſter in der dichten Buſch- und Krautvegetation ſo gut zu verſtecken, daß jene Unholde ſie nicht auffinden. Wie überall in ähnlicher Gegend fehlt auch der Kukuk nicht, und neben dem Grünfinken laſſen ſelbſt Stiglitz und Buchfink (der letztere iſt im Werder ſonſt ſehr ſelten) ihre markigen Lieder hören.

Die Stiglitze ſieht man recht häufig in den Blößen des Rohrwaldes ihrer Nahrung nachgehen, namentlich dort, wo umfangreiche Bündel trockenen Rohres kreuz und quer herumliegen und die Suche nach Sämereien weſentlich erleichtern.

Zur Sommerszeit treibt ſich auch die junge Brut der Stare in dem Buſchwerk herum und unternimmt an den ſchlanken Rohrhalmen die erſten Kletterverſuche.

Damit ſind wir ſchon bei jenen Arten angelangt, die im Werder hauſen und ſich nur zeitweiſe gerade hier einſtellen, als da ſind Goldammern, ſeltener Grauammern (die weiter ſüdlich im Werder neuerdings recht häufig ſind), Wieſenpieper, Kiebitze, Kohl- und Blaumeiſen (namentlich zur Winterszeit im Rohr) und ſtellenweiſe auch das Gartenrothſchwänzchen.

Da es über dem Röhricht von Inſekten wimmelt, nützen natürlich auch die ſchnellen Schwalben dieſe Jagdgründe nach Kräften aus, Rauch-, Haus- und Uferſchwalben ſchießen über den Halmen des Rohres dahin und ſtreichen tief über den ruhenden Spiegel der freieren Waſſerflächen.

Kaum hundert Schritt von dieſer ornithologiſchen Herrlichkeit hämmern die Fabriken, rollen die Wagen, lärmen ſpielende Kinder, ſpielt ſich das ganze geräuſchvolle Leben der Großſtadt ab. Da iſt denn dieſes Dorado der gefiederten Welt um ſo auffälliger, und der Naturfreund kann dem Geſchick gar nicht genug danken, daß es ihm hier vor den Thoren der Stadt ein Feld für Beobachtungen eröffnete, wie er es ſich beſſer kaum wünſchen kann.

Ein neuer Wanderzug des Roſenſtars (Sturnus roseus, *L.*).

Den Roſenſtar betreffend leſe ich im Juliheft der „Heimat, Monatsſchrift des Vereins zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holſtein“ folgendes:

„Ein ſeltener Gaſt unter unſeren Vögeln iſt der Roſenſtar. Vor einigen Tagen wurde mir ein Weibchen des Roſenſtars, das von einem Landmann in Ottendorf bei Kiel geſchoſſen war, zum Beſtimmen überwieſen. Der Vogel hatte in Geſellſchaft unſers gemeinen Stars den Garten des Landmanns beſucht.“ (Hierauf folgt dann Beſchreibung). Kiel, Juni 1899.

Jedenfalls iſt es intereſſant, daß der Roſenſtar ſich bis in unſere Provinz verflogen hat. L. Frahm.

. . . Auch vom Rhein iſt mir bereits ein Fall vom Vorkommen des Roſenſtars bekannt.*)

O. Kleinſchmidt.

---

*) Wir bitten um nähere Mittheilung. D. L.

Die Waſſeramſel oder der Waſſerſtar.

Von A. Reuter.

Ein an den Gebirgsbächen des Schwarzwalds, des Rench- und Acherthals ſehr häufig anzutreffender Vogel wird von Natur- und Vogelfreunden neuerdings mehr in Schutz genommen, und wird für die Forellenbrut nicht mehr für ſo ſchädlich gehalten, wie früher. Dieſer, die Schwarzamſel, hält ſich auch hauptſächlich nur an Forellenbächen auf, weshalb man irrthümlich meinte, ihre ausſchließliche Nahrung ſeien kleine Fiſchchen. Wer ſie aber einer näheren und eingehenderen Beobachtung unterzieht, vorausgeſetzt, daß man die Mühe nicht ſcheut, die Waſſeramſel in ihrem Thun und Treiben täglich zu beobachten, wird anderer Anſicht werden. Es iſt ja nicht in Abrede zu ſtellen, daß ſie auch gelegentlich ein Fiſchchen ergreift, ihre Hauptnahrung aber beſteht in Waſſerinſekten, wie Libellenlarven, allerlei Kruſtenthieren, Waſſerſchnecken, Waſſerkäfern, ſowie auch hauptſächlich dem gewöhnlichen Flußegel. Dieſer Egel hält ſich mit Vorliebe in ganz klaren Forellenbächen auf; mit dem Hinterleib an einem Stein hängend ſtreckt er ſich aus ſo lang er iſt, nach Nahrung ſuchend. Er ergreift, was kommt, Würmer oder kleine Fiſchchen. Dabei wird er ſelbſt von der Waſſeramſel herausgeholt, und dieſe nimmt es mit fingerlangen Exemplaren auf.

Die „Mittelbadiſchen Nachrichten“ vom 27. April 1899 bringen einen ſehr ſchönen und lobenswerthen Artikel zum Schutz dieſes hübſchen und die Gebirgsbäche belebenden Vogels. Ich laſſe des Intereſſes halber dieſen Artikel hier folgen, denn er verdient geleſen zu werden, und alle Hochachtung vor dem Verfaſſer dieſer Vertheidigungsrede eines vielfach zum Tode verurtheilten Vogels. „Von der Acher. Daß Wildenten, natürlich Hausenten nicht ausgenommen, der Fiſcherei ſchädlich ſind, wurde letzthin beobachtet. Nämlich ein Flug der ſogenannten Krickenten war in die Acher eingefallen, und zwar an einem Platz, wo kurz vorher Forellenbrut eingeſetzt wurde. Durch den Jagdberechtigten wurden zwei Stück erlegt, wobei die nähere Unterſuchung ergab, daß Kropf- und Mageninhalt nur Forellenbrut war. Wie viel Stück dieſer Fiſchchen ſind wol von der ganzen Geſellſchaft weggeſchnappt worden! Auch Hausenten wurden geſehen, wie ſie Forellen bis zu einem Viertelpfund zu verſchlingen ſuchten. Im Intereſſe der Fiſchereiberechtigten liegt es daher, dafür zu ſorgen, daß Hausenten nicht in's Fiſchwaſſer kommen. Die Wildenten kommen im Gebirge weniger in Betracht, weil dieſelben höchſt ſelten vorkommen.

Bei dieſer Gelegenheit ſei auch für einen viel verfolgten Vogel ein gutes Wort geredet, nämlich für die Waſſeramſel. Naturforſcher behaupten, daß dieſelbe für die Fiſcherei ſehr ſchädlich ſei, aber nach Beobachtungen iſt dieſer Schaden nicht ſo groß, wie behauptet wird. Die Waſſeramſel beſucht mit Vorliebe die Laufplätze der Forellen, hier findet ſie auch die Lieblingsnahrung, nämlich Waſſerinſekten, welche an der Vernichtung der Fiſchbrut ihr Beſtes beitragen. Aber hier hat die Mutter Natur wieder ein Halt geboten, und zwar durch die Waſſeramſel. Sie ſoll auch hin und wieder ſich an einem Fiſchchen verſündigen; wer wollte gleich Droſſel oder Star 'runterknallen, wenn ſie ſich einmal an ſüßen Früchten vergehen. Denn der Schaden, den ſie anrichten, wird ja reichlich durch den Nutzen, welchen dieſe Inſektenfreſſer wieder ſchaffen, ausgeglichen. Ungläubige, betrachten Sie ſich nur einmal eine Waſſeramſel näher, die ganze Kopf- und Schnabelbildung iſt wie bei anderen zarten Inſektenfreſſern, und nicht wie bei uns bekannten Fiſchräubern. In allem dieſen verleiht die Waſſeramſel auch den Gebirgsthälern im Winter einen unbeſchreiblichen Reiz. Wenn alles durch Kälte erſtarrt, wenn bei Schnee und Eis kein Lebeweſen zu ſehen, kein Laut eines Vogels zu vernehmen iſt, ſo iſt es doch die Waſſeramſel, die zum Gurgeln und Toſen des Gebirgsbachs ihren ſchönen, hellen und jubelnden Geſang ertönen läßt. Beobachtet man auch noch die zierlichen, munteren Bewegungen, dann kommt einem unwillkürlich die Frage: Iſt der Menſch auch berechtigt, dieſen einzigen bei uns vorkommenden Winterſänger zum Ausſterben zu bringen? Daher, ihr Jäger, da ihr mehr wie jeder andere durch Erlegen verſchiedener Thiere berufen ſeid, in den Haushalt der Natur einzugreifen, die ihr doch alle ſo große Freunde der Natur und auch ſo vielen Sinn für alles Edle und Schöne in ſo reichem Maß habt, verſchont dieſen Vogel."

Die Waſſeramſel dürfte bis jetzt noch ſehr wenig in Gefangenſchaft gehalten worden ſein, da ſie äußerſt ſchwer zu erhalten iſt, und ihre Käfigung an den Liebhaber große Anforderungen ſtellt, in Betreff des Futters als auch der Unterbringung. Allerdings iſt ſie mit kleinen Fiſchchen, Kaulquappen und Schalenthieren am leichteſten einzugewöhnen, und nur nach und nach an ein Erſatzfutter zu gewöhnen. Nimmt ſie einmal dieſes eine Zeitlang, ſo kann man wenigſtens die Fiſchchen nach und nach weglaſſen, das Bedürfniß darnach verliert ſich von ſelbſt, gleich wie dieſes auch bei anderen Vögeln der Fall iſt, ſodaß ſie ihr früher in Freiheit auserleſenes Futter in Gefangenſchaft meiſtentheils verſchmähen und nicht mehr berühren. Als Käfig ſoll die Waſſeramſel eine mindeſtens zwei Quadratmeter große Voliere erhalten, wovon die eine Hälfte nur Waſſer-Baſſin mit Fontaine ſein ſoll; ringsum, ſowie im Baſſin ſelbſt müſſen bemoſte Steine gelegt, auf der Trockenſeite grüner Raſen, ſowie allerlei an Bachesufern vorkommende Pflanzen in Blumentöpfen untergebracht werden. Ueberhaupt ſoll die ganze Voliere eine der Natur abgelauſchte Kopie ſein, dann wird ſich auch dieſer ſchwierig zu haltende Vogel wohl und behaglich fühlen und mit der Zeit mehr Liebhaber gewinnen. Ein Pärchen dieſer Gattung wird in vorbeſchriebener Voliere die Zierde des ganzen Zimmers ſein. Das Gebahren und Benehmen dieſes ſchönen Vogels iſt höchſt intereſſant und lehrreich.

Briefwechſel

Herrn Lehrer W. Hennemann: Beſten Dank für Ihre Grüße aus Tirol.

◆

Zu unſerm Bilde.

Der **kleine Alexanderſittich**, auch **Halsband-Edelſittich** genannt (Psittacus torquatus, *Bdd.*), iſt in Aſien und Afrika zugleich heimiſch; in Südafrika hat er ſich, zufällig oder abſichtlich eingeführt, zum Brutvogel eingebürgert.

Das Freileben iſt je nach den beiden Welttheilen verſchieden. Während der Vogel in Afrika in den Wäldern lebt, ſieht man ihn in Indien inmitten der Ortſchaften und des Menſchengewühls, auf Bäumen an den Straßen und auf den Dächern der Gebäude. Ganze Schwärme, kleine oder größere, fliegen abends aus allen Richtungen auf die Kokosnußbäume, um darin, beſonders in Höhlungen, zu übernachten, und dann beginnt ein wüſtes Zanken um die Spitze auf den Bäumen. Feuert man einen Schuß ab, ſo fliegen ſie auf, ſo laut, als wenn ein Sturmwind daher brauſt. Erſt wenn es völlig finſter iſt, verſtummt der gewaltige Lärm, den ſie durch ihr Geſchrei verurſachen. Sie nähren ſich von mancherlei Sämereien, von Feigen, Datteln, Dattelpflaumen u. a. m. Die Neſter finden ſich in den Aſtlöchern von Akazien und anderen Bäumen, beſonders von Affenbrotbäumen, und zwar brüten oft zahlreiche Pärchen nebeneinander. In Indien hat man auch in den Mauerlöchern alter Pagoden oder anderer Baulichkeiten ihre Brut gefunden, ſelbſt in Erdlöchern an ſteilen Ufern.

Nicht leicht wird ein Papagei ſo zahlreich aus den Neſtern gehoben und aufgefüttert, wie der Edelſittich. Daher findet man ihn ſo zahlreich im Handel. Die Händler unterſcheiden die Vögel beider Welttheile darin, daß die alten ausgefärbten Halsbandſittiche aus Aſien rothe Schnäbel, die aus Afrika röthlichſchwarze haben. Die meiſten Sittiche, die in den Handel kommen, ſind ſchon fingerzahm und haben unterwegs etwas ſprechen gelernt. Als Stubenvogel iſt der Halsbandſittich von jeher beliebt und geſchätzt, als Sprecher ſowol wie als Schmuckvogel. Er wird, gleichviel ob aus dem Neſt genommen oder alt eingefangen, leicht zahm und lernt vorzüglich klar und deutlich ſprechen, bisweilen hundert Worte und ganze Redensarten, ſogar in mehreren Sprachen. Beſonders bemerkenswerth iſt, daß man dieſen Vogel bereits mehrfach im Freien überwintert hat. Ueberhaupt hat man ſich in neuerer Zeit viel mit ſeiner Züchtung abgegeben, trotzdem er ein ziemlicher Schreier, Holzzerſtörer und Beißer iſt.

Der Preis für den Vogel iſt ſehr gering, die Fütterung einfach: Hanf, Hafer, Kanarienſamen und Mais, nebſt Zugabe von guter Frucht und allenfalls etwas Bisquit oder Eierbrot.

Das alte Männchen iſt an Stirn, Oberkopf und Kopfſeiten grasgrün; der ſchmale Zügelſtreif iſt ſchwarz, Hinterkopf und Nacken ſchwach lilablau. Um den Hinterhals ſieht man ein breites roſenrothes Band, an der Kehle ein hellgelbes. Von dem ſchwarzen Bartfleck aus zieht ſich an den Kopfſeiten entlang und, allmählich ſchmaler werdend, bis zum Hinterkopf hin ein ſchwarzer Streif. Der Rücken trägt gelblicholivengrüne, der Unterrücken und die oberen Schwanzdecken grasgrüne Farbe. Die unterſeits aſchgrauen Schwingen ſchimmern dunkelgrasgrün. Die beiden mittelſten Schwanzfedern ſind bläulichgrün, die übrigen gelbgrün; unterſeits ſind ſie alle mattgelb. Die ganze übrige Oberſeite iſt grün, die Oberbruſt meerbläulichgrün; die ganze übrige Unterſeite gelblichgrün. Ein blutrother Schnabel, ein hellgelbes, von einem nackten rothen Ringe umgebenes Auge und ſchwärzlichgraue Füße mit ſchwarzen Krallen tragen ihrerſeits dazu bei, dem Vogel ein noch bunteres Ausſehen zu verleihen. Beim alten Weibchen ſind Oberkopf und Kopfſeiten dunkler grün gefärbt als beim Männchen, mit ſchwach bemerkbarem gelbem Ton. Das roſenrothe Halsband und der ſchwarze Bartfleck fehlen; man ſieht nur ein ſchmales graues Nackenband. Die ganze Oberſeite iſt matter olivengrün, der Unterrücken matt hellgrün, der Oberſchnabel roth, der Unterſchnabel ſchwärzlichgrau, das Auge hellgelb. Das junge Männchen ſieht dem alten Weibchen gleich, doch iſt es fahler grün. Das Halsband und den Bartfleck bekommt es erſt im zweiten Jahr.

K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [1308]

Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Lit. 1 ℳ Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen,** M.-Gladbach 112.

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [1309]

Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Futtermittel.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko. 4½, à Ltr. 1 ℳ.

Muska, hochf. 98er, à Ko. 3, 5 Ko. 14 ℳ.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 5, à Ko. 9.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.

Bisquit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,80
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Ia.	„ „ „ „	2,20
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,—
do. algeriſche	„ „ „ „	2,
do. indiſche	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	5,—

Oſſa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [1310]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Ameiſeneier,

getrocknete, ſchon 1899er hochprima, ſorgfälligſt gereinigte goldgelbe Ware, liefert per Liter 90 Pf. [1311]

Gottlieb Wanek,
Thierhandlung, Prag 411, I.

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpaketen franko, garantirt ſandfrei. [1312]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Friſche Ameiſeneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt **Zeke** der einzige Erſatz. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zeke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Drogerien. Man verlange Zeke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1313]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**

Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen! [1314] Allein angefertigt von

Ernst Hanke, Trier, Moſel.
Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Friſche Ameiſeneier,

ſaubere helle Ware, à Liter 1 ℳ, 10 Liter 9 ℳ gegen Nachnahme. [1315]

J. Nullmeyer, Vogelhandl., **Mannheim.**

Mehlwürmer,

1000 Stück gegen Einſendung von 1,50 ℳ franko. Gefl. Anfragen unter **P. 172** an **Haasenstein & Vogler,** A.-G., [1316] **Breslau.**

Mehlwürmer, 1000 St. geg. Einſ. von 1,50 in Mrkn. verſ. franko [1317]
D. Waschinsky, Berlin NW, Wilsnackerſtr. 63.

Vögel.

Junge Nachtigalen

kauft **H. Fügner,** [1318] **Hübitz** bei Eisleben.

Die Samen-Großhandlung
von
Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [1319]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

---

ff. Harzer Kanarien-Vögel,

Hohl- u. Knorr Vögel, ſowie Klingel- u. Schaukel-Roller ohne Fehler 15, 20 u. 25 ℳ, geb. dieſelb. 14 Tage a. Probe, jedoch p. Nachn. od. Betrg. vorher, nicht gefall. Vögel tauſche um od. zahle zurück. Preisliſte frei. [1320]

L. G. Müller, Vogelzüchterei, **Nordhauſen a. H.**

NB. Junge von dieſem Jahr à Stck. 5 ℳ, 6 Stck. 25 ℳ, 12 Stck. 48 ℳ, frei dort.

Wachteln,

nur Hähne, gute Schläger, Dtzd. 7,50 ℳ. Garantie für Männchen und lebende Ankunft. [1321]

N. Muschnu, Temesvar, Ungarn.

Vogelkatze,

2 Jahre alt, bei Vögel aufgezogen, wegen Umzug für 25 ℳ zu verkaufen.

Aug. Meyer, Vogelhandlung,
[1322] **Straßburg i. E.**

Kanarien-Vorſänger!

Vorzügliche tieftourenreichſte, noch nie zur Zucht benutzt und flott durchſingend, nach Geſangsgüte à 12, 15, 20, 25 und 30 ℳ, noch in großartiger Auswahl da. Verſandt überallhin gegen Vorherkaſſe oder Nachnahme mit voller Garantie für Werth, Geſundheit und Probezeit.

[1323] **Julius Häger,**
St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864. **Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.**

Harzer Kanarienvögel,

Hohlroller-Stamm, diesjährige Hähne, à 5 ℳ, Dtz. 48 ℳ, Weibchen à 80 ₰, Dtz. 8 ℳ. Garantie für Hähne und leb. Ankunft.

Wilhelm Kaye,
[1324] **Thale** (Harz).

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1325]

C. G. Vodel, Leipzig, Straſſendorferſtr. 16.

Wachtelhähne,

prima Sänger, empfehle à 1,50, Dtzd. 12 ℳ, **rothe Kreuzſchnäbel** 1 ℳ. Garantie leb. Ankunft. **Friſche Ameiſeneier,** à Liter 1 ℳ, **Heidelbeeren,** à Pfd. 12 ₰, 50 Pfd. 5,50 ℳ, à Ztr. 10 ℳ, reell. [1326]

Gebr. Mergler, Vogelexport,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Rothe u. gelbe Kreuzſchnäbel

verſende 6 Stück 4 ℳ, Dutzend 6 ℳ. Tauſche auch auf friſche Ameiſeneier, Sproſſer, Schwarzblättchen, Nachtigalen u. Käfige.

A. Jaumann,
[1327] **Großbreitenbach,** Thür.

Edle Harzer Kanarien, Hohlroller-Stamm, Frühbrut, Hähne à 4,50 ℳ, 6 Stck. 24 ℳ, Weibchen à 1 ℳ, 6 Stck. 5 ℳ. Ferner **Steindroſſeln** à 8 ℳ, **Blaudroſſeln** à 12 ℳ, unter Garantie für Hähne und lebende Ankunft. Preisl. ü. a. V. gratis. Prima friſche **Ameiſeneier** u. 99er getrocknete à Ltr. 1 ℳ, **Zeke** à Kilo 3 ℳ. Probeſendung zu 10 ₰, 25 ₰ u. 1 ℳ. [1328]

Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Geſucht:

Eine circa 2—3 Monat alte **Rehgais,** womöglich von der Gattung der Damhirſche. Zu erfragen unter **W. S.** bei der Exped. dieſes Blattes. [1329]

Digitized by Google

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Alliance-Straße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 30. Magdeburg, den 27. Juli 1899. XXVIII. Jahrg.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Der gelbe Kernbeißer (Coccothraustes tibialis, *Brd.*).

Gleichzeitig mit dem hellblauen Kernbeißer erſcheint in Centralamerika als Zugvogel vom Norden kommend noch ein zweiter Geſelle ſeines Geſchlechts, der gelbe Kernbeißer. In der Liſte von Coſta Rica wie Guatemala iſt er als „Pheucticus tibialis“ aufgeführt und Dr. Frantzius glaubt, daß ſein Verbreitungsgebiet nur Coſta Rica und Panama ſei; dem iſt jedoch keinesfalls ſo. Der Volksmund in Guatemala hat ihn richtig als Zugvogel vom Norden (Mexiko) erkannt und ihn „Pico grueso amarillo del Norte“ (Gelber Großſchnabel vom Norden) benannt. In der hieſigen Liſte fehlt dem Vogel die ſonſt übliche kurze Beſchreibung, dagegen iſt er in drei Exemplaren und zwar mit einem alten und einem jungen Männchen, ſowie einem Weibchen im Muſeum vertreten.

Der gelbe Kernbeißer zählt jedenfalls mit zu den größten Arten ſeines Geſchlechts. Er iſt von reichlicher Größe der Schwarzdroſſel und ſein großer Kopf mit dem maſſiven Schnabel gibt ihm ein noch viel ſchwerfälligeres Ausſehen. Der Oberſchnabel iſt nicht gradlinig, ſondern verfolgt die gebogene Linie des Kopfes ohne Einſenkung zwiſchen Stirn und Schnabel. Der Schnabel iſt der beſtentwickelte Körpertheil und dieſerhalb wurde ihm in manchen Provinzen der Name „Eiſenbeißer“ zugelegt.

Die Farbe des Vogels iſt gefällig und ſchön. Männchen: Kopf, Rücken, Hals, Bruſt und Unterleib leuchtend rothgelb ohne Beimiſchung von ſchwarz, Schultern tiefſchwarz, Flügel ſchwarz mit breiter weißer Binde. Schwanz ſchwarz, die Deckfederchen mit weißen Spitzen. Der Schnabel iſt blaugrau, das Auge ſchwarz und die Füße graugrün.

Weibchen: Die ſchwarze Färbung des Männchens erſcheint hier ſchwarzgrau und die rothgelbe Färbung iſt in reingelb mit einem Schein ins Grünliche verwandelt. Kopf, Hals und Rücken fein grauſchwarz geſtrichelt, die weiße Flügelbinde nur angedeutet. Die Bruſt iſt citronengelb, nach dem Unterleib matter werdend. Schnabel, Auge und Füße ſind gleich.

Das junge Männchen des Muſeums gleicht mehr dem Weibchen, doch läßt ſich eine rothgelbe Bruſt feſtſtellen.

Der gelbe Kernbeißer ſoll in derſelben Weiſe wie der hellblaue Biſchof in Guatemala niſten, er ſei ſogar mehr wie der hellblaue als ein Vogel des Landes zu betrachten, da er im Peten häufiger anzutreffen ſei. Ueber ſeine Lebensweiſe und ſeine Thätigkeit während der Zeit des Niſtens, über Beſchaffenheit des Neſtes, des Geleges u. a. konnte ich noch nichts feſtſtellen. Die Angaben der Indianer ſind zu unzuverläſſig, als daß man ihnen Glauben ſchenken könnte, dabei ſind die Ausſagen noch nicht einmal übereinſtimmend und vielfach widerſprechend. Im Handel erſcheint der Vogel in den Monaten Februar und März. Der Preis ſtellt ſich fürs Pärchen auf etwa 3—5 Mark, je nachdem der Vogel in größerer oder kleinerer Anzahl auf den Markt gebracht wird. Zu den Seltenheiten zählt er nicht und da er ebenfalls nicht zu den geſchätzten Stubenvögeln gerechnet werden kann, hauſiren oftmals die Indianer mit einer zehnköpfigen

Schar länger als zwei Tage in der Stadt umher, bis ſie ihre lebende Ware an den Mann gebracht haben. — Von Seiten der Eingeborenen iſt die Verpflegung dieſelbe wie beim hellblauen Kernbeißerfink, nur bekommt der Gelbe ganzen Mais. Der Vogel iſt hart und ausdauernd, in der Vogelſtube verträglich, faſt etwas ſtupid zu nennen. Er ſucht ſich mit Vorliebe einen hohen Standort in möglichſt geſchützter Ecke. Der Geſang iſt unbedeutend.

Im Freileben benimmt ſich hier der gelbe Gaſt, wie die anderen Starkſchnäbel und hält ſich während ſeines hieſigen Winterbeſuchs hauptſächlich in den Maisfeldern auf.

Bis jetzt ſcheint der Vogel wenig oder gar nicht nach Deutſchland gekommen zu ſein, was vielleicht mehr dem Zufall, wie einer anderen Urſache zuzuſchreiben iſt, da er an der Weſtküſte von Coſta Rica aufwärts bis Mexiko in den Wintermonaten immer und in genügender Anzahl zu kaufen, und die Annehmlichkeit damit verbunden iſt, ſtets Männchen und Weibchen kaufen zu können.

Noch bevor ich meine Mittheilungen über den gelben Kernbeißer beendigte, beſichtigte ich die Bälge in der Sammlung des Herrn Juan Rodriguez und genannter Herr theilte mir mit, daß er auf zwei verſchiedene Arten des gelben Kernbeißers aufmerkſam gemacht worden ſei. Engliſche Autoren ſeien der Anſicht, daß die in Coſta Rica und ſüdlicher vorkommende Art „tibialis“ ſei, während die in Guatemala und Mexiko angetroffene Art „aurantiacus“ zu nennen wäre. Inwiefern ſich die beiden Arten unterſcheiden ſollen, konnte ich nicht erfahren. Nach Salvin und Dr. Frantzius ſoll vom Tibialis das Männchen an Kopf und Hals ebenfalls ſchwarz geſtrichelt ſein, das iſt jedoch bei dem von mir in vorliegendem Fall beſchriebenen Vogel vollſtändig ausgeſchloſſen. Hierin wäre wohl nun ſchon eine Verſchiedenheit zu finden, ob es ſich aber nur um zwei Lokalraſſen handelt, oder eine Trennung und wiſſenſchaftliche Bezeichnung nothwendig iſt, vermag ich nicht zu beurtheilen. Ich habe die beiden Arten für übereinſtimmend gehalten und aus dem Grunde laſſe ich die Bezeichnung Coccothraustes tibialis beſtehen. Es würde mir aber angenehm ſein, könnte ich hierüber eine Aufklärung und Richtigſtellung finden.*) (Fortſetzung folgt.)

---

*) S. unter „Mancherlei“ in dieſer Nummer. D. L.

Der Sumpfrohrſänger (Acrocephalus palustris, *Bchst.*) in ſeiner Bedeutung als Stubenvogel.

Von Fr. Anzinger.

(Schluß ſtatt Fortſetzung).

Einen im Herbſt vor dem Abzuge gefangenen Rohrſpötter für die Liebhaberei zu wählen, wird wol Niemanden in den Sinn kommen, weil bei dieſer Art äußerlich merkbare Geſchlechtsunterſchiede kaum wahrgenommen werden können und der Geſang um dieſe Zeit auch bei jungen Vögeln bereits verſtummt iſt.

Die Eingewöhnung des Rohrſpötters auf das übliche Käfigfutter geht noch leichter vonſtatten wie bei den Erdſängern, weil der Vogel ohne weiteres auf die vorgeſetzten lebenden Mehlwürmer losgeht, von denſelben ſtets eine beträchtlich große Zahl verzehrt und mit dieſem Futtermittel, falls es in reichlicher Menge klein zerſchnitten unter die Miſchkoſt kommt, ſehr bald auch an das letztere gebracht wird. Selbſtverſtändlich muß die Eingewöhnung in einem verhüllten Käfig geſchehen. Die Größe deſſelben iſt diejenige des Grasmückenkäfigs: 45 cm Länge, 22 bis 23 cm Tiefe und 30 bis 35 cm Höhe mit dem bereits mehrmals beſchriebenen Kreuzſprung. Liebhaber, welche ihrem Vogel durch ſchief geſtellte Sitzſtangen eine früher mehrfach anempfohlene Wohlthat erweiſen wollen, müßten nach meiner Anſicht noch größere Käfige wählen. Ich halte übrigens eine derartige Aufſtellung der Sitzſtangen nicht für nothwendig. Das Käfigfutter beſteht aus dem gleichen Gemiſch, wie es bei der Sängergrasmücke beſchrieben. Die etwaige Zugabe von Obſt bleibt weg. Dafür dürfen vom Dezember ab täglich mindeſtens 15 bis 20 große Mehlwürmer gereicht werden. Man hat hierbei durchaus nicht zu befürchten, daß der Vogel zu fett wird. Auch die Beigabe von etwas mehr ſtark gemahlenem Hanf und kleine Gaben von geriebenem, hartgekochtem Hühnerei iſt um dieſe Zeit zu empfehlen, um den Vogel früher zum Singen zu bringen. Bei ſingenden Vögeln iſt die Blutzirkulation, mithin auch der Stoffwechſel ein regerer, die Mauſer dürfte hierdurch früher herbeigeführt werden und dies muß als das Hauptmoment für das weitere Wohlbefinden des Rohrſpötters angeſehen werden.

Wie den meiſten Liebhabern bekannt iſt, mauſert der Rohrſpötter zweimal im Jahre, und zwar zeitig im Frühling und im Juli bis Auguſt. Ueber die erſte Frühjahrsmauſer im Käfig iſt nun, wie wir wiſſen, kein anderer Sänger ſo ſchwer hinüber zu bringen wie der Rohrſpötter. Fraglos hängt dies weniger vom Futter, als vom veränderten Aufenthaltsort, nicht zum Mindeſten aber auch von dem Befinden des Vogels ſelbſt ab. Aus dieſem Grunde glaube ich, daß wir der Anſicht eines hieſigen alten Vogelwirths beipflichten dürfen, welcher annimmt, daß Vögel, welche ihre Frühjahrsmauſer bereits mehrmals im Winterquartier durchgemacht haben, dieſelbe zum erſtenmale im Käfig überhaupt nicht beſtehen. Je älter alſo ein ſolcher Vogel in Gefangenſchaft geräth, umſo ſchwieriger wird er dieſe Mauſer bei uns überwinden. — Es bleibt alſo, bei ſonſt ſachgemäßer Pflege, dem Zufall überlaſſen, ob der Pflegling überwintert werden kann oder nicht.

Digitized by Google

Vogelleben in der Großſtadt.

Von M. Dankler.

In früheren Jahren war ich oft ärgerlich enttäuſcht, wenn die mich beſuchenden Freunde, die in der Großſtadt wohnten, ſich bei dem prachtvollen Vogelgeſang meiner Umgebung ſo paſſiv verhielten, als ob derſelbe für ſie etwas alltägliches wäre. Beobachtungen aber, die ich ſpäter anſtellte, brachten mir ſchnell des Räthſels Löſung. Ich fand, daß gerade die Großſtadt unſeren Vögeln ein ſo ſicheres und angenehmes Heim bietet, wie ſie es auf dem Lande manchmal vergeblich ſuchen. Dies ſind die Anlagen und Alleen, denen von Jahr zu Jahr mehr Sorgfalt zugewendet wird.

Dieſe Anlagen bieten den Vögeln aber auch alles, was ſie zu ihrem freien, fröhlichen Leben bedürfen, Schutz und Nahrung. Die Spaziergänger bleiben ſtehen und lauſchen den lieblichen Tönen. Keinem fällt es ein, ſie zu beläſtigen und zu verfolgen, und ſollte es einem einfallen, ſo ſind Park- und Raſenwärter ſchnell bei der Hand, ſolche Einfälle zu hintertreiben, da ja allgemein ſelbſt das Betreten des Raſens verboten iſt.

Die Vögel ſind ſchlau genug, ſchnell einzuſehen, daß ſie hier nichts zu befürchten haben, und ſie vergelten den Schutz durch die größte Zutraulichkeit. Sie laſſen den Menſchen faſt auf Armeslänge an ſich herankommen, und beinah keine Art macht eine Ausnahme. Einige Beiſpiele und Beobachtungen mögen folgen.

Am 19. Mai d. J. beſuchte ich auf einer Rheinreiſe die „Flora“ in Köln, und ließ mich nach langem Umherwandern an einem Tiſch der mit hochragenden Palmen und erotiſchen Blattpflanzen geſchmückten Hauptreſtaurationshalle nieder. Trotzdem an dem Tiſch ein lebhaftes Geſpräch geführt wurde, ſo waren wir doch bald von kleinen Vögeln umringt. Eine Amſel kam bis unter den nebenſtehenden Stuhl gehüpft, und auf den Lehnen der umſtehenden Stühle faßten eine Partie Spatzen ſo ungenirt Poſto, als ob ſie mit zum Inventar gehörten und die Sitze mit dem größten Recht beanſpruchen konnten. In Ermangelung eines beſſern Futters warf eine am Tiſch ſitzende Dame einige Bröckchen Zucker auf den Boden, und dies war das Zeichen zu einem allgemeinen Angriff. Von allen Seiten ſchoſſen Vögel hinzu, und bald drängte ſich eine ganze Geſellſchaft am Boden herum, außer Spatzen noch Ammern, Buchfinken, mehrere Amſeln und ein Star. Das Völkchen war ſo unverfroren, daß es den vorübergehenden Kellnern nur eben Platz machte und ſich dann ſofort wieder niederließ. Wie uns der Kellner mittheilte, wäre es an Sonntagen, wenn die großen Hallen mit Menſchen angefüllt ſind, gerade ſo. Dann ſchlüpften die Thierchen mit bewunderungswürdiger Gewandtheit durch Beine und Füße der Gäſte, und ließen ſich ſelbſt bettelnd auf die Tiſchkanten nieder. Dieſer kleine Vorfall, dieſes Zutrauen der Thiere zum Menſchen hat mich ſo intereſſirt, daß ich von hier ab doppelt Obacht gab, und ſchon nach kurzer Zeit konnte ich wieder ähnliches bemerken. In einem Laubgang ſaß eine Nachtigal auf einem dürren Reis, welche uns bis auf 20 Schritte herankommen ließ. Da wir nun ſtehen blieben, ſo ſetzte ſie ſich erſt recht in Poſitur und nun ſchmetterte ſie, ungedeckt ſitzen bleibend, ihre ſchönſten Strofen. Es war ein lieblicher Anblick, das ſchlanke Vögelchen mit halboffenen Flügeln und zitternder Kehle ſitzen zu ſehen, während die ſüßen Töne ſich faſt ununterbrochen aneinander reihten. Dazu wurde ihr Geſang von allen Seiten beantwortet. Das war ein Singen und Jubiliren in den Bäumen und Laubgängen der ganzen Floraanlagen, daß ich es wol begreifen konnte, daß die Städter ſelbſt in dieſer Hinſicht verwöhnt werden. Ich konnte außer den Orgeltönen des Pirols, der tiefen Flöte der Amſel, dem hellen Geſchmetter des Buchfinken noch eine Singdroſſel, mehrere Grasmücken, Rothkehlchen, Blaukehlchen und noch eine ganze Anzahl minderwerthiger Sänger feſtſtellen.

In dem naheliegenden zoologiſchen Garten aber trieben ſich unſere Vögel überall in Scharen zwiſchen dem fremden Geflügel herum. An der Spitze ſtand natürlich Freund Spatz, der zu allen Käfigen und Stallungen ein Freibillet zu haben ſchien, und dies auch weidlich ausnutzte. Zuerſt bemerkte ich ihn im Löwenkäfig, wo ein altes Männchen auf einem abgenagten Knochen Platz gefaßt hatte, und luſtig darauf loshämmerte, kaum zwei Schritte von einem männlichen Löwen, den er jedenfalls für ein großes Mähnenſchaf anſah. Der Leu blinzelte mit halbgeſchloſſenen Augen mehrmals herüber, nahm aber weiter keine Notiz von dem Kecken. Spatzen ſaßen natürlich bei allen Thieren, die Körnernahrung und Heu freſſen, Spatzen bei allen Geflügelarten, und zwar war ihr Betragen keineswegs ein beſcheidenes zu nennen, ſondern ſie griffen wacker zu, und proteſtirten ganz energiſch, wenn ſie ſich im geringſten benachtheiligt fühlten. Einen wirklichen Mordsſkandal aber verübte eine vielköpfige Vogelſchar in dem ſtillen Winkel, wo die Eulenkäfige aufgeſtellt waren. Hier war ein Finkenpar am lauteſten. Es klammerte ſich an die Stangen, welche die Käfige der Uhus abſchließen, und ſchrie aus Leibeskräften. Ein Par Kohlmeiſen unterſtützten ſie nach Kräften, und die Spatzen bildeten den Schlußchor. Auch die Amſel war ſehr zahlreich vertreten, und ſchien ſich unter all den fremden Vögeln ſehr mollig zu fühlen. Was dieſe aber ſelbſt anbetrifft, nämlich die Vögel des zoologiſchen Gartens ſelbſt, ſo wäre hierüber jedes Wort vergebens geſchrieben, ſchon einer der großen Weiher könnte einen Vogelfreund ſtundenlang feſſeln. Da waten die langbeinigen Waſſervögel, die Flamingos u. a. gravitätiſch durch das Waſſer, da ziehen die verſchiedenen Arten der Schwäne vorüber, da tummeln ſich Enten von wunderbarer Farbenpracht, da ſind Taucher, Möven, kurz alles, was das Waſſer und den Strand der verſchiedenen Erdtheile belebt, zuſammen. Beſonders bei ſinkender Sonne bietet ein Ausblick auf einen ſolchen mit Wald umgebenen Teich ein Bild von märchenhafter Wirkung, ein Bild, welches an die Beſchreibung der bewegten und belebten Tropenländer erinnert.

Ich habe ſchon oft zoologiſche Gärten beſucht, aber niemals ſolche Stimmungsbilder gefunden, wie ſie der Kölner zoologiſche Garten am Abend des 19. Mai mir darbot. Dieſen Anblick hätte ich jedem Leſer und Vogelfreund von Herzen gegönnt, ich kann jedem nur anrathen, ſich bei Gelegenheit einen ſolchen Hochgenuß zu verſchaffen. Das Beſtrickende des Anblicks liegt hier in dem Anſchein der Freiheit, da auf dem Waſſer weder Eiſengitter noch Käfig ſtörend eingreifen. Ich konnte mich von dem bewegten Leben und Treiben kaum trennen. Von ganz überwältigender Wirkung war auch das große Adler- und Raubthierhaus, aber die Wirkung war ganz die entgegengeſetzte. Statt lebendiger Thiere glaubt man hier Kunſtwerke vor ſich zu ſehen. Den Hintergrund bildet in Halbrelief und Malerei eine groteske Gebirgslandſchaft, die am Fuß in eine Felspartie übergeht. An dieſe Hinterwand hat man nun an verſchiedenen Stellen Sitzpunkte angebracht, und zwar in ſymmetriſcher Ordnung. Bei einem zweiten Rundgang traf ich gerade einen Moment, in dem die ſämmtlichen Sitze beſetzt waren. Eine ganz eigene Anſicht! Die mächtigen Geſtalten der Adler ſaßen ſo ruhig zu beiden Seiten, daß man glauben konnte, ſie ſeien ausgeſtopft und ſo zu beiden Seiten in gleicher Entfernung angebracht worden. Wol 10 Minuten blieben die Thiere auch ſo unbeweglich ſitzen, dann reckte einer die mächtigen Schwingen und flog zur Felſengruppe, und nun wechſelte die Anordnung der Thiere in ſchneller Aufeinanderfolge. Auch ein Gang an den Zwingern der See- und Fiſchadler, der vielen Geierarten u. a. iſt lohnend und intereſſant. Tauben- und Hühnerliebhaber finden ihre Lieblinge in den verſchiedenſten Arten und Varietäten; aber auch die exotiſche Vogelwelt iſt in reicher Auswahl und in den merkwürdigſten Geſtalten vertreten. Ich erwähne hier nur noch den Tukan oder Pfefferfreſſer, den unbeweglichen Marabut, und die Kaſuar- und Kranicharten. Doch kehren wir nun zu unſerer wilden Vogelwelt und ihrem Großſtadtleben zurück.

Dieſelbe findet in den Städten, beſonders in rheiniſchen, viel mehr Unterſchlupf, als man ſich denken ſollte. Die Häuſerblöcke enthalten noch manchen kleinen Garten, und in dieſen Gärten, welche in dem Häuſermeer wie Oaſen in der Wüſte verſtreut liegen, ſchlagen die Vögel beſonders gern ihr Quartier auf. Dies wird durch die Natur dieſer Gärten erleichtert. Es ſind meiſt Ziergärten mit Gehölzgruppen und Baumwuchs. Von allen Seiten ſind ſie manchmal von Häuſern eingeſchloſſen, deren Wände vom Beſitzer nutzbar gemacht wurden, indem ſie mit Reben, hochgehenden Spalierbäumen oder mit wildem Wein und Epheu bekleidet wurden, und dieſe Bekleidung (beſonders im Epheu) bietet dann eine ſo prächtige und hübſche Niſtgelegenheit, wie man ſie ſich nur denken kann. So ſah ich ſowol in Köln als auch in Koblenz Gärten, die in dieſer Hinſicht wahren Vogelkolonien glichen. In Bonn ſind die Alleen mit ihren gewaltigen Bäumen Heimſtätten der verſchiedenſten Vogelarten, die ihnen nicht nur Niſtgelegenheit, ſondern auch Schutz vor jedem Unwetter bieten. Bei einer Wintertour zählte ich hier in einer Nußbaumallee auf einem Baum ſieben Buchfinkenneſter, und Bäume mit drei bis vier Neſtern waren gar keine Seltenheit. Die Vögel erhalten in dieſen ſtädtiſchen Aſylen von Seiten der Verwaltungen allen Schutz, da gerade durch die Vögel den Alleen und Anlagen ein Reiz verliehen wird, der durch nichts erſetzt werden kann.

Auch die Kirchthürme, die aus alten Zeiten, von Feſtungswerken u. drgl. herſtammenden alten Bauten, Thore und Thürme bieten einer ganz erſtaunlich großen Anzahl von Vögeln Schutz und Unterkunft. Ich habe alte Thürme beſtiegen, die hunderten von Vögeln als Wohn- und Niſtſtätten dienten. Am meiſten waren Thurmſchwalben, Krähen, Dohlen, Rothſchwänzchen, Hausſchwalben und Eulen vertreten, andere Vögel waren ſeltener, Sperlinge natürlich überall.

In einem alten Kirchthurm zählte ich allein 54 Starenneſter, und im Umwallungsthor einer alten Stadtmauer 7 Eulenneſter.

Daß ſich in der Nähe der Städte tauſende von Vögeln herumtreiben, die beſonders in dem Straßenkehricht und den nach außen geſchafften Küchenabfällen reiche Nahrung finden, iſt wol allgemein bekannt.

So bieten ſelbſt die Großſtädte den Vögeln ein Heim, und dieſe erzeigen ſich dafür dankbar, indem ſie das Ohr der Bewohner mit ihrem lieblichen Geſang erfreuen, daß ſie ſeine Gartenraſen beleben, verſchönern und vom Ungeziefer frei halten, kurz, ſich nach Kräften nützlich machen.

Beſonders die Bäder wiſſen dies zu ſchätzen. Sie wiſſen, daß das Herz des leidenden Menſchen durch das Lied der kleinen Gefiederten erfreut und gehoben wird, und da die Freude nach dem Ausſpruch eines berühmten Arztes als Medizin wirkt, ſo kann man ruhig behaupten, daß die Vögel hier zur Geneſung indirekt beitragen. Daher iſt es eine Forderung der Vernunft, die Vögel auch hier auf alle Weiſe zu ſchützen, und beſonders in der kalten Winterzeit nicht zu vergeſſen.

Mein Sperling.

Von F. Schütte.

Es iſt ſchon Vieles über Vögel und manches Buch zum Beſten der gefiederten Welt geſchrieben worden, doch handelt es ſich dabei ſtets um Schmuck- und Singvögel. Noch keinem iſt es eingefallen, einmal eine Lanze für den armen, verachteten Sperling zu brechen,*) der ſo muthig und frohſinnig alle Unbilden des Winters erträgt und ſo zutraulich ſich den Menſchen nähert, die ihn zum Dank dafür als frech und gemein bezeichnen, ihn nur für ſchädlich und vollſtändig überflüſſig halten und in roher, herzloſer Weiſe auf jede nur erdenkliche Art Jagd auf ihn machen. (Las ich doch in der Zeitung, daß der Magiſtrat eines gewiſſen Ortes für jeden Spatz 5 Pfg. zahlt, welcher von Knaben durch Steinwürfe oder drgl. getötet wurde.)

---

*) Wir haben hier noch im Jahre 1890 eine Sperlings-Debatte gehabt. D. L.

Da dieſe armen, allzu zahmen, ſchutzloſen Vögel mir in der Seele leid thun, ſo möchte ich durch folgende Mittheilung dazu beizutragen ſuchen, daß man ſie künftig mit ein wenig mehr Liebe und Achtung behandelt (wenn ich mich ſo ausdrücken darf), ſie wenigſtens ihrer Eigenſchaften wegen nicht für geringer hält, als andere Arten von Vögeln, die man als amüſant, klug, oder als werthvolle Sänger preiſt. Es gibt eben zu viele Sperlinge bei uns, deswegen ſchätzt man ſie nicht. Ich bin jedoch zu der Ueberzeugung gelangt, daß der Sperling ein äußerſt intelligenter und im höchſten Grade gelehriger Vogel iſt, der in dieſer Beziehung wahrhaftig Seinesgleichen ſucht, will man ſich nur die Mühe geben, ſich mit ihm zu beſchäftigen. Ich weiß dies aus eigener Erfahrung.

Vor einem Jahr im April fand ich im Garten einen ganz jungen Spatz, der offenbar aus dem Neſt gefallen war und weder allein fliegen, noch freſſen konnte, auch noch keine Federn beſaß. Ich nahm ihn mit in mein Zimmer und es iſt mir gelungen, ihn groß zu füttern. Er iſt jetzt etwa ein Jahr alt und ein ſchöner großer Vogel geworden, mit ſchneeweißen Federn in den Flügeln, ſchwarzer Kehle, ein richtiges Spatzen-Männchen. Er fliegt frei im Zimmer umher; an einem der Fenſter habe ich eine große Birke befeſtigt, in deren Zweigen er gewöhnlich ſitzt. Er frißt Hirſe und Weißbrot, ſonſt nichts. Dieſer Vogel iſt nicht nur ſo zahm geworden, daß er mir aufs Wort folgt, wie ein Hund, auf ſeinen Namen „Netti“ hört und ſich ſtreicheln läßt, er hat auch gelernt Melodien nachzupfeifen, ja ſogar verſchiedene Stimmen, z. B. Lachtöne nachzuahmen, wie ein Papagei.

Ich wurde zuerſt darauf aufmerkſam, welch' muſikaliſches Talent er beſitzt, als ich hörte, wie er die melodiſchen Töne meiner kleinen Tigerfinken täuſchend nachzuahmen ſuchte, was ihm großartig gelang.

Mein Pärchen Tigerfinken fliegt ebenfalls frei im Zimmer umher und es iſt rührend zu ſehen, wie gutmüthig der viel größere Spatz gegen die Kleinen ſich benimmt, welche ihn ihrerſeits bösartig anzugreifen ſuchen.

Das Männchen der Tigerfinken ſingt ſtets ſeine beſondere Melodie, ebenſo wie das Weibchen, und beide pflegen, bevor ſie ſingen, erſt länger „Probier-Töne“ zu machen, gerade ſo, wie ein Geiger ſein Inſtrument zu ſtimmen pflegt. Vernimmt nun der Spatz dieſe Töne des Männchens, welches Luſt zu ſingen hat, dann beendet er ſeinerſeits ſofort ſchnell die Melodie desſelben, ehe es dazu kam, überhaupt wirklich anzufangen. Und ebenſo fällt er ſchnell ganz richtig ein, wenn das Weibchen anfängt zu üben, um ſeine Lockmelodie erklingen zu laſſen. Es iſt äußerſt intereſſant, dieſen Sperling zu beobachten und ich bin reichlich für die Mühe belohnt, die ich an ſeine Auffütterung wandte. Für die Nacht beſitzt er ein Neſt, in Form eines Bienenkorbes, welches an der Wand befeſtigt iſt. Von ſelbſt geht er nie hinein, ſondern bettelt jeden Abend, daß ich ihn zu Bett bringen ſoll. Er ſteigt alsdann auf meine Hand und von dort in das Neſt hinein. Im Winter ließ er ſich ſogar mit einem Stückchen Watte zudecken und blieb ruhig ſitzen, bis es am Morgen hell wurde. Er iſt ganz unbeſchreiblich klug, ſeine Augen können förmlich verſchiedene Ausdrücke annehmen, je nachdem er luſtig, traurig oder ärgerlich iſt. Oftmals ſpielt er faſt wie ein Kätzchen, verſteckt ſich unter dem Fenſtervorhange und beißt dann kreiſchend in meine Finger, wenn ich ihn finde und anfaſſen will. Man ſieht offenbar, er thut es nur aus Scherz, um zu ſpielen.

Um Melodien richtig nachzupfeifen oder gewiſſe Töne nachzuahmen, ſtrengt er ſich oft derart an, daß er dabei ſcheinbar ins Huſten kommt.

Ich könnte viele Seiten ſchreiben, um alle die allerliebſten Züge und Eigenthümlichkeiten zu erzählen, welche ich an ihm beobachtet und entdeckt habe und täglich noch neu entdecke. Ich würde den Vogel nicht für hundert Mark hergeben, ſo lieb iſt er mir geworden.

(Anfang dieſes Jahres ging eine Notiz durch die Zeitungen, die umſo ſchnellere Aufnahme fand, als ſie aus Frankreich ſtammte. Danach hatte ein franzöſiſcher Profeſſor in einem wiſſenſchaftlichen Blatte berichtet, daß ein Sperling bei ihm ſowol den Geſang des Stiglitz, wie des Zeiſigs tadellos nachahmen gelernt hätte. Die Nachahmungsfähigkeit des Hausſpatzes ſcheint demnach weiter zu reichen, als man bisher annahm, und wir bitten auch unſere Leſer, wenn ihnen ähnliche Fälle bekannt ſind, ſolche hier mitzutheilen. D. L.)

Von meinen Stubenvögeln und Züchtungsergebniſſen.*)

Von P. Emmeram Heindl O. S. B.

(Fortſetzung).

3. Ueber Haltung, Pflege und Zucht des weißbürzeligen Graugirlitz (Fringilla musica, *Vieill.*). (Abbildung ſ. „Gefied. Welt“ 1894, S. 195.)

a. Haltung und Pflege im Allgemeinen.

Durch die Schilderungen in den Werken des Herrn Dr. Ruß und in der „Gefiederten Welt“ aufmerkſam gemacht, war es ſchon längſt mein ſehnlicher Wunſch geweſen, endlich einmal dieſen dem Ruf nach ſo vorzüglichen Sänger mein Eigen nennen zu können. Am 6. Januar 1896 erhielt ich zwar einen ſolchen

---

*) Vgl. „Gefied. Welt“ 1898, S. 381 u. 385.

Vogel, doch verſicherte der Händler ſchon im Voraus, er könne nicht dafür garantiren, daß es ein Männchen ſei, obwol er ihn bereits zwei Jahr in Geſellſchaft anderer Vögel im Beſitz gehabt habe; das ſprach alſo von vornherein eher für ein Weibchen. Trotzdem bereute ich es nicht, ihn erworben zu haben: für etwaige Züchtungsverſuche konnte er ja immerhin werthvoll werden, und zudem erwies er ſich bald als ein harm- und argloſer, ungemein zahmer und zutraulicher Vogel, der indeſſen im Gefieder äußerſt ruppig und auch ſonſt recht herabgekommen war. Im März genannten Jahres befiel ihn ein eigenthümliches Leiden; er erſchien recht matt und ſchläfrig und ſteckte tagsüber viel den Kopf unter die Flügel. Nachts hingegen wurde er öfter unruhig und fiel vom Sprungholz herab, beſonders ſo oft ich Licht machte. Nach ein par Wochen verlor ſich jedoch dieſer Zuſtand gänzlich wieder, nachdem ich mehrmals den Käfig — welcher 57 cm lang, 36 cm hoch und 25 cm tief war und worin der Vogel vorläufig allein ſich befand — von Vogelläuſen, deren er viele mit ſich gebracht, geſäubert hatte. Einen weitern Vogel dieſer Art erhielt ich am darauffolgenden 5. April — ebenfalls in recht elendem, theilweiſe (beſonders an Hals, Nacken und Hinterkopf) entfedertem Zuſtand — und ſetzte ihn mit erſterem im gleichen Käfig zuſammen. Trotzdem wurde er — natürlich bei beſter und aufmerkſamſter Pflege — ſchon nach wenigen Tagen viel lebhafter als jener, und ließ faſt bis zum Ueberdruß ſeinen Lockruf vernehmen. In der nun eintretenden Mauſer erhielten beide Vögel wieder ein tadelloſes Federkleid und erholten ſich auch ſonſt vollſtändig zu geſunden und kräftigen Vögeln. Da der zuletzt erhaltene vom erſtern öfter gefüttert wurde, und ſie überhaupt recht zärtlich miteinander thaten, ſo glaubte ich bereits, nun endlich ein Pärchen zu beſitzen; doch erwies ſich dieſe Hoffnung leider ſpäter als trügeriſch — es waren zwei Weibchen. Das iſt eben das einzig Leidige bei dieſer Vogelart, daß die Geſchlechter dem Gefieder nach ſich gar nicht mit Sicherheit unterſcheiden laſſen. Die Angaben des Herrn Dr. Ruß in ſeinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (3. Aufl.), S. 97 f.: „Männchen: Seiten weiß mit dunkelgrauen Schaftſtrichen. Weibchen: Nur fehlen ihm die ſcharfen, dunklen Schaftſtriche an den Seiten“, erwies ſich nach meinen Erfahrungen als nicht ſtichhaltig (vgl. „Gefied. Welt“ 1896, S. 281). Richtiger iſt die Angabe im „Vogelzuchtbuch“ (1. Aufl.), S. 55: „Wbch. übereinſtimmend; Mnch. nur am Geſang zu erkennen.“ Es iſt dieſe Unterſcheidung bei dieſem Vogel noch ſchwieriger als ſelbſt bei dem ihm nahe verwandten Mozambikzeiſig. Ich gab aber nicht nach, bis es mir am 12. März 1898, nachdem inzwiſchen eines der beiden Weibchen an Legenoth eingegangen war, glückte, von einem Münchener Händler um den Geſammtpreis von 10 Mk. zwei ſichere Männchen — die ſich bald durch ihren Geſang als ſolche erwieſen — zu erhalten. Sie befanden ſich, obwol friſch importirt, in ziemlich gutem Zuſtand, nur ſtarrte ihr Gefieder von Schmutz und war auch am Kopf etwas abgeſtoßen. Doch waren ſie recht munter und erſchienen geſund. Ich ſetzte anfangs beide zum Weibchen hinein; das that aber nicht gut, weshalb ich das kräftigere, das im Kampf mit dem andern Sieger blieb, allein beim Weibchen ließ, um Zuchtverſuche zu unternehmen, über deren Verlauf und Erfolg, ſo bald es Zeit und anderweitige Geſchäfte erlauben, ich unter b berichten werde. Das ſchwächere, auch wirklich kleiner erſcheinende Männchen ſetzte ich in einen Käfig von 90 cm Länge, 36 cm Höhe und 42 cm Tiefe mit zwei kleinen Elſterchenmännchen, einem Par Zebrafinken und einem Mövchenmännchen zuſammen, wo es ſich bald heimiſch fühlte, wohlauf und guter Dinge war. Mit dem Singen begann es indeſſen erſt am Morgen des 11. Juni, nach beendeter Mauſer, bereits ziemlich ſchön und laut, aber noch abgebrochen.

Die **Mauſer** fällt in die Frühlingsmonate, etwa von Mitte März bis anfangs Juni. Eines der Weibchen machte jedoch einmal (1898) — wol infolge ſeines unausgeſetzten Bruteifers — ſeine Mauſer erſt im Juli durch und wurde dabei ſonderbarer Weiſe am ganzen Unterleib (mit Ausnahme des Hinterleibs von den Beinen an) ſchwärzlichgrau gefleckt, mit nur wenigen weißlichen Stellen dazwiſchen. Die Mauſerzeit dauert 1 bis 1½ Monat. Während der Hauptmauſer ſchweigt der Geſang der Männchen; ſonſt ſingen ſie, wenn einmal gut eingewöhnt, das ganze Jahr, wenn auch nicht immer mit gleichem Eifer und Feuer, denn ihre eigentliche Brütezeit (alſo auch ihre eigentliche Geſangszeit) ſind unſere Herbſtmonate bis in den Winter hinein.

(Schluß folgt.)

Briefliche Mittheilungen.

... Die Notiz in Nr. 27 betreffend die Abnahme der Schwalben kann ich für unſern Ort (Bocholt) nicht unterſchreiben. Daß ſich die Rauchſchwalben innerhalb des Weichbildes einer Stadt vermindern, iſt ganz natürlich: Geſteigerter Verkehr, Telephondrähte! Die Hausſchwalben aber nehmen in unſerer raſch aufblühenden Induſtrieſtadt eher zu als ab, und was Segler anbelangt, ſo kann ich nach 13jähriger Beobachtung konſtatiren, daß ſie pünktlich am 1. Mai vollzählig erſcheinen. Dann hat die Leitung etwas über die Wanderung des Roſenſtars gebracht. Da iſt es ihr auch jedenfalls intereſſant, wenn ich berichte, daß ich in zwei Vorſommern hier einen Trauerfliegenſchnäpper (Muscicapa atricapilla) angetroffen habe. **Plümpe**, Lehrer.

... Von Intereſſe dürfte es ſein, daß bei einem mir befreundeten Vogelfreund ein Par Muskatfinken und ein Par Mövchen gemeinſam ein Neſt bewohnen, Eier legen und die Mövchen dann ſämmtliche Junge tapfer aufziehen. Jetzt ſind ſchon wieder Eier von beiden im Neſt. **Otto Schneider**.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein **M. Dietrich**: Baden Sie die Füße Ihres Kanarienvogels in warmem Waſſer ab, kühlen Sie ſie mit Bleiwaſſer, bepinſeln Sie die betr. Stellen täglich mit verdünntem Glycerin (1 : 10) und beſtäuben Sie ſie dick mit feinſtem Stärkemehl. Sollte keine Heilung eintreten, ſo beſtreichen Sie die Stellen mit Bleiſalbe oder, wenn die Wunden näſſend ſind, mit Bleiweißſalbe. Dann muß der Fuß aber in ein Beutelchen aus weichem Leder geſteckt und dieſes feſt verbunden werden, weil die Salbe giftig für den Vogel iſt.

Herrn Kurt Müller: 1. Inbetreff der Haltung und Fütterung der Wachtel verweiſe ich Sie auf den Artikel des Herrn Reuter in Nr. 27. 2. Das Zeichen ♂ bedeutet „Männchen", das Zeichen ♀ bedeutet „Weibchen". 3. „D. L." heißt „Die Leitung" (Redaktion).

Fräulein Julie S.: Die entzündeten Zehen Ihres Kanarienvogels behandeln Sie, wie ich in meinem Buch, „Der Kanarienvogel", das Sie ja beſitzen, angegeben. Dabei füttern Sie ihn wieder wie früher und unterlaſſen Sie jetzt die magere Fütterung.

Herrn Otto Schneider: 1. Der fragliche Vogel iſt meiner Anſicht nach der ſtahlblaue Widafink mit verlängerten Schwanzfedern (Vidua splendens, *Rchnw.*), der ſehr ſelten eingeführt wird. Unterſuchen Sie, ob er an den Bürzelſeiten über jedem Schenkel ein verdecktes Büſchel weißer, ſeidenweicher Federn hat. Andernfalls handelt es ſich thatſächlich um eine bisher unbekannte Art der Wittwen. Es gibt zwar eine ſog. Trauerwittwe (Vidua macroura, *Gm.*), aber dieſe iſt nicht einfarbig ſchwarz, ſondern beſitzt am Oberrücken gelbe Färbung. 2. Die Larvenaſtrilde ſind bereits einigemal gezüchtet worden; Näheres finden Sie in meinem Buch „Die Prachtfinken", 2. Auflage. 3. Friſche Ameiſenpuppen halte ich als Aufzuchtfutter für Papagei-Amandinen nicht für zu hitzig. Daß die Vögel zu keiner erfolgreichen Brut gelangen, muß eine andere Urſache habe, die ich nicht ergründen kann, da Sie über Haltung, Fütterung ꝛc. Ihrer Vögel nichts genaueres angegeben haben. 4. Für die briefliche Mittheilung beſten Dank.

Herrn P. in W.: Die Urſache der Erkrankung Ihres Vogels ſind nach meiner Ueberzeugung doch mikroſkopiſch-kleine Schmarotzer, denn alle von Ihnen angegebenen Erſcheinungen ſprechen dafür. Sondern Sie ihn zunächſt von den übrigen Vögeln ab, gewähren Sie ihm aber in ſeinem neuen Käfig warmen Unterſchlupf zur Nacht. Halten Sie ihn nun in gleichmäßiger feuchter Wärme und bepinſeln Sie die betr. Stelle einen Tag um den andern mit Perubalſam und an dem dazwiſchen liegenden mit verdünntem Glycerin. Nach je drei oder vier Tagen waſchen Sie die Stelle mit einem in warmes Seifenwaſſer getauchten weichen Pinſel ab. Dies Verfahren wiederholen Sie 8 bis 14 Tage.

Frau Marie von Moeller: 1. Beſten Dank für Ihren kleinen Aufſatz, der in einer der nächſten Nummern zum Abdruck gelangen wird. Der Artikel über den Gelbhauben-Kakadu wird uns willkommen ſein. 2. Spezialfutter für Raubvögel gibt es in den Vogelhandlungen bis jetzt noch nicht. Füttern Sie Ihre Sperber mit friſchem, rohem Rindsherz und auch anderem rohem, aber auch gekochtem Fleiſch, ſowie allerlei Abfällen. Hin und wieder geben Sie ihnen ein Mäuschen oder in Federn gewälztes rohes Fleiſch. Reichen Sie aber von allem Futter nur ſo viel, als die Vögel zur Befriedigung ihres Hungers gerade brauchen.

Mancherlei

Zur Ergänzung der Schilderung des Herrn Eichlam in dieſer Nummer ſei Folgendes bemerkt. Man kennt drei, in der Gattung Pheucticus zuſammengefaßte, unſerm europäiſchen Kernbeißer verwandte Arten, deren Grundfarbe gelb und deren Heimat Centralamerika iſt. Dies ſind der röthlich-gelbe Kernbeißer (Coccothraustes aurantiacus, *Gm.*), der hochgelbe (pirolgelbe) Kernbeißer (C. chrysopeplus, *Vig.*) und der graugelbe Kernbeißer (C. tibialis, *Brd.*). Alle drei ſind an Kopf, Rücken, Hals, Bruſt und Unterleib gelb gefärbt, Schultern tiefſchwarz, Flügel ſchwarz mit breiter weißer Binde, nur erſcheint die gelbe Farbe bei dem erſten röthlichgelb, bei dem zweiten pirolgelb und bei dem dritten graugrünlichgelb.

Der von Herrn Eichlam beſchriebene Vogel iſt nach meiner Ueberzeugung, nach der rothgelben Farbe zu ſchließen, unzweifelhaft die röthlich-gelbe Art (C. aurantiacus). Auffallend iſt allerdings die geſtrichelte Zeichnung der Bruſt, die mit den bisherigen Beſchreibungen nicht übereinſtimmt; indeſſen ſoll dieſe auch keine der anderen Arten aufweiſen. Möglicherweiſe handelt es ſich noch um eine neue Art (oder Lokalraſſe).

Lebend eingeführt wurde bisher nur eine Art, welche in den Berliner zoologiſchen Garten gelangte und die ich nach eigener Anſchauung für den pirolgelben Kernbeißer (C. chrysopeplus) hielt. Im zoologiſchen Muſeum ſtellte man ſie indeſſen als C. tibialis feſt, obgleich das Gelb rein pirolfarbig erſchien. K. R.

Abſonderlicher Neſtplatz: Ein Bachſtelzenpaar hat ſich hier (Delitzſch) auf dem Berliner Güterbahnhof mitten in einer Weiche, und zwar unter dem Herzſtück derſelben, ſein Neſt gebaut, und liegt gegenwärtig, obgleich Hunderte von Güterwagen täglich beim Rangiren über die Weiche hinwegſauſen, mit Eifer und ohne jede Furcht der Fütterung und Beſchützung der bereits ausgebrüteten Vögelchen ob. (Saale-Ztg.)

Briefwechsel

Herrn Dankler und **Herrn P. Emmeram Heindl**: Beiträge mit Dank erhalten.

Herrn Armin Quehl: Beſten Dank für Ihre Grüße vom Brocken.

Zu unſerm Bilde.

Wie viele unſerer einheimiſchen Vögel, die alte, hohle Bäume als Brutſtätten wählen, iſt auch die **Hohltaube** (Columba oenas, *L.*) in Deutſchland recht ſelten geworden. Nur in Gegenden, wo dies Haupterforderniß ihres Gedeihens vorhanden und außerdem wenig Verkehr iſt, findet ſie ſich noch häufig. Hier bevorzugt ſie gemiſchte Waldungen und hält ſich gern da auf, wo dieſe an Felder und Wieſen grenzen, die ihr Nahrung bieten. Sie niſtet nur in Baumhöhlen. In der Regel ſteht das Neſt in Waldbäumen, doch auch in alten hohlen Apfel- und Birnbäumen, hohlen Weiden und einzelnen Feldbäumen in der Nähe der Dörfer. Das Neſt ſelbſt, das oft in den hohen Gipfeln der Bäume, oft aber auch nur in Manneshöhe liegt, iſt eine kunſtloſe Unterlage von dürren Blättern oder Reiſern, auch wol von Laubmos oder Würzelchen. Meiſt brütet die Hohltaube nur zweimal im Jahr, zunächſt in der erſten Hälfte des April, dann im Juni. Häufig aber ſchreitet ſie anfangs Auguſt noch zum dritten Mal zur Brut. Jedesmal wählt das Pärchen eine andere Höhle, weil der Unrat der Jungen, der das verlaſſene Neſt erfüllt, eine abermalige Benutzung deſſelben unmöglich macht. Im nächſten Jahr jedoch werden die alten Wohnungen wieder bezogen. Das Gelege enthält zwei weiße Eier, die bald länglich eiförmig, bald kurzoval und ziemlich glanzlos ſind; in der Regel ſind ſie 36 mm lang und 27 mm dick. Die Brutdauer beträgt ungefähr 17 Tage. Der Täuberich betheiligt ſich beim Brüten etwa von vormittags 10 bis nachmittags 3 Uhr, während die Täubin ſich Nahrung ſucht. Beide Alten brüten ungemein feſt, oft ſo, daß man ſie von den Eiern abheben kann; auch wenn ſie mehrmals geſtört werden, verlaſſen ſie die Brut nicht. Die Jungen werden in den erſten acht Tagen ſorgfältig von den Alten bedeckt und warm gehalten und, wie dies bei allen Taubenarten der Fall iſt, von beiden mit einem zarten, milchartigen Futterbrei aus dem Kropf gefüttert. Unſer Bild zeigt das Weibchen (unten), das ſich vom Männchen nur durch geringere Größe und mattere Farben des Gefieders unterſcheidet, und einen jungen Vogel, der ſich als ſolcher durch den braungrauen, vorn gelblichen Schnabel und das Fehlen des ſchönen grünen Federnſchillers am Hals erweiſt. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1350]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Holzwaarenfabrik.

C. L. Flemming

Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen
empfiehlt: [1351]

Flug- und Heckbauer, Einſatzbauer, Geſangskaſten.
Muſterpackete 9 St. ſort. f. Kanarienzüchter M. 6 franko.

Holzwaarenfabrik.



Man verlange Preisliste.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in **praktiſcher** Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1352]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Frische Ameiseneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt **Zeke** der einzige Erſatz. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zeke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Drogerien. Man verlange Zeke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1354]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Futtermittel.

Friſche Ameiſeneier,

ſaubere helle Ware, à Liter 1 ℳ, 10 Liter 9 ℳ gegen Nachnahme. [1353]
J. Nullmeyer, Vogelhandl., Mannheim.

Ameiſeneier,

getrocknete, ſchon 1899er **hochprima,** ſorgfältigſt gereinigte goldgelbe Ware, liefert per Liter 90 Pf. [1355]

Gottlieb Wanek,
Thierhandlung, **Prag 111, I.**

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten
echten Kayenne-Pfeffer,
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [1356]
Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.
Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos)

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [1357]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche **inſektenfreſſende Singvögel** von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1358] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Zecke, Marke Amſel, Ltr. 1 ℳ, 10 Ltr. 7,50 ℳ. [1359]
R. Schneider, Kempten, Bayern.

Mehlwürmer, 1000 St. geg. Einſ. von 1,50 in Mrkn. verſ. franko [1360]
O. Waschinsky, Berlin NW, Wilsnackerſtr. 63.

Vögel.

Auroraaſtrilde, prachtvoll, à P. 8, 2 P. 14, 3 P. 20 ℳ,
Wellenſittiche, prachtv. Zuchtpare, à 7, 3 P. 20, 5 P. 30 ℳ,
Goulds Amandinen, à P. 21 ℳ,
Chineſ. Zwergwachtel, Männch. à 3,50 ℳ,
Tigerfinken, à P. 2, 5 P. 8, 10 P. 14, 20 P. 26 ℳ,
Graue Reisfinken, à P. 2 ℳ,
Zebrafinken, à P. 4, 3 P. 10,50 ℳ,
Goldbrüſtel, Schmetterlingsfinken, Elſterchen, à Par 2,25 ℳ,
Orangebäcks, Aſtrilde, à P. 1,75 ℳ,
Silberbäcks, Blutſchnabelweber, à P. 1,75 ℳ,
10 P. ſortirt 16 ℳ.
Nonpareils, à Mch. 5, à Wbch. 3 ℳ,
Indigos, à Mch. 4, à Wbch. 3 ℳ,
Roſenbr. Kernbeißer, à Mch. 15 ℳ,
Rebhuhn u. Bergtauben, à P. 12 ℳ,
Edelſänger, à P. 6, à Mch. 5 ℳ,
kl. Alexanderſittiche, à St. 3 ℳ,
Nymphenſittiche, à P. 10 ℳ,
Graue Kardinäle, à Stück 4 ℳ
offerire freibleibend [1361]
J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1362]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1363]

Citronenfinken,

junge und alte Männchen, à Stck. 3 ℳ, **Dompfaffen,** junge und alte Männchen, à Stck. 3 ℳ, junge **Steinröthel,** Mnch. 8 ℳ, Wildfang **Blaudroſſel** 18 ℳ. **Gebirgsſchwarzblättchen, Gartengrasmücken** à Stck. 4 ℳ, **Zeiſige** à 90 ₰, ſehr ſchön gezeichnete **Stiglitz-Baſtarde** mit viel Weiß, à 10 ℳ ꝛc. ꝛc. Anfragen auf Doppelkarte. [1364]

Beck's Vogelverſandt,
Stuttgart, Telephon 4104.

Ia Blaudrossel

12 ℳ, Steinröthel 8 ℳ, Roſen- u. Heuſchreckenſtar à 8 ℳ, 2 Schwarzplättchen à 3,50 ℳ, 4 Königsortolane à 2,50 ℳ, zuſ. 8 ℳ. 2 Mehlwurmhecken, koloſſal bevölkert, große Kiſten, à 10 ℳ. [1365]

R. Schneider, Vorſt. d. Ver. f. Vgl. u. Geflg., **Kempten** (Bayern).

Edm. F. Gierke,

Thierhandlung, **Hamburg 5.**

Offerire alle Arten **in- u. ausländiſche Sing- u. Ziervögel,** ſowie ſprechende und nichtſprechende **Papageien,** als Surinams, Roth- u. Blauſtirn-Amazonen, Graupapageien, Gelbnacken ꝛc. Empfehle einen hochfeinen **Blauflügel-Arara,** gutſprechend und zahm, mit etwas hängendem rechten Flügel, ſonſt ohne Tadel, Preis 100 ℳ, eine hochfeine **Amazone,** gutſprechend 40 ℳ, desgleichen **Graupapagei,** ſehr feiner Sprecher, 150 ℳ, ein ſprechender **Surinam** 36 ℳ. Ferner ſind abzugeben: **Weiße Schwäne,** à Par 35—40 ℳ, junge zahme **Elſtern** à 3 ℳ, **Meerſchweine** à 1 ℳ, **Seehunde,** große 40 ℳ, junge à 18—25 ℳ. Gebe den Arara auch gegen Hirſch oder Rehe oder Waldvögel in Tauſch. Suche Hirſche, Rehe, Kraniche, Störche ꝛc. zu kaufen. **Verſandt unter weitgehender Garantie.** [1366]

Edle Harzer Kanarien, Hohlroller-Stamm, Frühbrut, Hähne à 4,50 ℳ, 6 Stck. 24 ℳ, Weibchen à 1 ℳ, 6 Stck. 5 ℳ. Ferner **Steindroſſeln** à 8 ℳ, **Blaudroſſeln** à 12 ℳ, unter Garantie für Hähne und lebende Ankunft. Preisl. ü. a. V. gratis. Prima friſche **Ameiſeneier** u. 99er getrocknete à Ltr. 1 ℳ, **Zeke** à Kilo 3 ℳ. Probeſendung zu 10 ₰, 25 ₰ u. 1 ℳ. [1367]

Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Rothe u. gelbe Kreuzſchnäbel

verſende 6 Stück 4 ℳ, Dutzend 6 ℳ. Tauſche auch auf friſche Ameiſeneier, Sproſſer, Schwarzblättchen, Nachtigalen u. Käfige.

A. Jaumann,
[1368] **Großbreitenbach,** Thür.

Offerire

Kubafinken,

Par 15 ℳ,

Roſenbrüſtige Kernbeisser,

Männchen 15 ℳ.

Gustav Voss, Hoflieferant,
Köln. [1369]

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft. Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [1370

Verſende vom 1. Auguſt an

junge Nachtigalen,

Dutzend 12 ℳ, auch einzeln; ferner

Schwarzblättchen.

Suche außerdem eine Firma, die mir jede Woche 200 Körnervögel abnimmt, gegen reelle Bedingung. [1371]

Frau **Varga Agnes,** Vogelſendung,
Lugos in Ungarn.

---

300 Stück 99. Junghähne,

garantirt Hohlroller-Stamm, fleißig am Studiren zum Selbſtausbilden, verſendet gegen Nachnahme à Dtz. 48 ℳ, Packung und Porto frei. Garantie für lebende Ankunft. **W. Schöndorf,** [1372]
Schriftführer des Zucht-Vereins „Kanaria“
in **Holzhauſen** b. Pyrmont (Waldeck).

Harzer Kanarienvögel,

Hohlroller-Stamm, diesjährige Hähne, à 5 ℳ, Dtz. 48 ℳ, Weibchen à 80 ₰, Dtz. 8 ℳ. Garantie für Hähne und leb. Ankunft.

Wilhelm Kaye,
[1373] **Thale** (Harz).

Verk. 6,0 junge Zeiſige, à 50 ₰, 2,0 Buchfinken, à 80 ₰, 1,0 Ringelſpatz 40 ₰, 1,0 Stiglitz 1,20 ℳ. Tauſche 1,0 zahm. Eichelheher. [1374]

H. Geisthardt, Coburg, Leopoldſtr. 37.

Geſucht:

Eine circa 2—3 Monat alte **Rehgais,** womöglich von der Gattung der Damhirſche. Zu erfragen unter **W. S.** bei der Exped. dieſes Blattes. [1375]

Für Vogel- oder Zoologiſche Handlungen, auch Thierparks!

Geſucht von gebild. 38 jähr. verh. Mann, im Verkehr mit erſten Klaſſen bewandert, dauernde Stelle als Pfleger oder Futtermeiſter von Vögeln, Geflügel, Säugethieren u. ſ. w. Derſelbe hat 20 jährige Erfahrung in der Vogelpflege und würde auch die Geſchäftskorreſpondenz übernehmen. Prima Referenzen zur Seite. Sprachkenntniſſe.

Gefällige Offerten mit Gehaltsangabe erbeten unter Adreſſe [1376]

A. Reuter,
Ringelbach, Poſt Oberkirch, Baden.

[1377]

Geſucht:

1 Par Granataſtrilde, 200 ℳ offer.

J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.).

1898 erhielt mein Stamm **Harzer Kanarienvögel** 1. Statspreis, 3 gold., 1 gr. ſilb. Medaille. Empfehle tourenr. edle Hohl- u. Knorr-Vögel à 10—25 ℳ u. Gar., 8 T. Pr.

Paul Holzky, Cöthen (Anhalt). [1378

Eichhörnchen,

Zuchtpar 3,50 ℳ, junge, Stück 2,25 ℳ, **Elſtern,** ſehr gelehrig, 2 ℳ. [1379]

R. Rebentisch,
Berlin, Willibald-Alexis-Straße 33.

Bücher-Anzeigen.

Der

Deutſche Geflügelhof

Abonnement vierteljährlich 75 Pfg.

Inſerate: die einſpaltige Zeile 15 Pfg.

Amtliches Organ des Sonderausſchuſſes für Geflügelzucht der Landw. Kammer für die Prov. Brandenburg und der demſelben angeſchloſſenen Vereine.

Redaction:
Bruno Dürigen, Charlottenburg.

Der „Deutſche Geflügelhof“ bringt alles Wiſſenswerthe auf dem Gebiete der landw. Nutzgeflügelzucht, ſowie rationellen Tauben- und Kaninchenzucht, auf den Sport dabei gebührend Rückſicht nehmend, belehrende Artikel für den Anfänger, Beſchreibungen und Abbildungen.

Probenummern koſtenlos durch die Geſchäftsſtelle

Otto Koobs Verlagsanſtalt,
Forſt i. L.

Für Beſitzer des

Handbuch für Vogelliebhaber

von **Dr. Karl Ruß**

in früheren Ausgaben ſtehen die dem Werke jetzt beigegebenen Illuſtrationen, beſtehend in

28 Vollbildern
fremdländiſcher Stubenvögel
(zu Band I), ſowie
25 Vollbildern
einheimiſcher Stubenvögel
(zu Band II)
für den Preis von je nur 1 Mark

durch jede Buchhandlung, ſowie in der unterzeichneten Verlagshandlung ſelbſt zu Dienſten.

Das **Illuſtrirte Handbuch** koſtet auch jetzt noch, wie bisher, für
Bd. I (Fremdl. Stubenv.) broch. 6.50, geb. 8 ℳ
„ II (Einh. Stubenv.) „ 6.—, „ 7.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 27.

Die gefiederte Welt

Wochenschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler

von

Dr. Karl Ruß

Preis vierteljährlich
(13 Nummern)
M. 1.50

Magdeburg
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretschmann)

Einzelpreis der Nummer
15 Pfg.

Inhalt der Nr. 31.

Ergänzungen zu meinen früheren Zuchtergebniſſen.
Von meinen Stubenvögeln und Züchtungsergebniſſen (Fortſ. ſtatt Schluß).
Unſere Würger, hauptſächlich in ihrer Bedeutung als Käfigvögel.
Schwalbenzüchtung im Zimmer.
Unwiſſende Vogelliebhaberei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der **Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1380]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten. Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko. Man verlange Preisliste.

Den erſt mit dem Beginn des III. Vierteljahres neu hinzugetretenen Abonnenten der „Gefiederten Welt" theilen wir mit, daß wir **bei Nachbezug des erſten Vierteljahres** (1,50 ℳ)

eine Farbendrucktafel,

darſtellend:

1. Sproſſer, 2. Nachtigal, 3. Schwarzköpfige Grasmücke, 4. Sperbergrasmücke, 5. Gartengrasmücke, bei Nachbezug des zweiten Vierteljahres (1,50 ℳ)

eine Tafel in Schwarzdruck,

darſtellend:

1. Alpenſchneehuhn, 2. Alpenmauerläufer, 3. Alpenbraunelle,

als Extra-Prämie beifügen. Wir ſtellen anheim, ſich dieſe Vortheile rechtzeitig durch Nachbeſtellung bei der nächſten Buchhandlung zu ſichern, da die Vorräthe in abſehbarer Zeit vergriffen ſein dürften.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [1381]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1.50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1384]
K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [1382]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Ltr. 1 ℳ Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen.** M.-Gladbach 112.

Für alle Arten Vögel fertige ich **fachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1385]

Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1383]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Verkaufe Platzes halber billige Vogelbauer:

Neuntheiligen Geſangskäfig zum Anlernen junger Kanarienvogel, 10 ℳ, Heckbauer 75×40×37 cm groß, 8 ℳ, Wachtelbauer 8 ℳ, Lerchenbauer 8 ℳ, Papageibauer, 1 m hoch u. ½ m Durchmeſſer, 10 ℳ. Die Bauer ſind noch wie neu, tauſche auch Nützliches.
[1386] **L. Brock,**
Eisdorf b. Lützen (Prov. Sachſen).



Käfige
jeder Art
(Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1387] **Oſchatz** i. S.

Die gefiederte Welt.

Wochenschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

[illegible]

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

[illegible]

Magdeburg, den 3. August 1899. XXVIII. Jahrg.

Ergänzungen zu meinen früheren Zuchtberichten.

[illegible]

1. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Verhältniß der Miſchlinge und reinraſſigen Vögel zu einander inbezug auf Anzahl und Geſchlecht wol ſtellen möge, hielt ich die Jungen jeder einzelnen Brut unter ſich zwar zuſammen, aber brutweiſe von einander geſondert in Einzelkäfigen, die niedrig und derartig aufgeſtellt waren, daß ſie vom vollen Tageslicht beſchienen waren und die Beobachtung in nächſter Nähe ermöglichten.

Obgleich nun ſämmtliche jungen Gouldsamandinen genau den gleichen Licht- und Wärmeeinflüſſen ausgeſetzt waren, in jeder Hinſicht auch die gleiche Behandlungs- und Ernährungsweiſe erfuhren und, wie geſagt, auch ſämmtlich demſelben Zuchtpar entſtammten, auch nach Augenſchein und Verhalten in gleich gutem, vollem Geſundheitszuſtand ſich befanden, ſo verlief doch die Veränderung zum Prachtgefieder nicht einmal bei zwei Individuen in ganz gleicher Weiſe, was Anfang und Ende der Mauſer, bzl. Verfärbung, die Dauer derſelben und Jahreszeit, in der ſie ſtattfand, ſowie das Geſchlecht und den Federwechſel betrifft.

Reihenfolge der Bruten	I.	II.	III.	IV.	V.
Geburtszeiten der Jungen	1898 20. Juni	18. Auguſt	14. bis 16. September	14. u. 15. Oktober	17. bis 19. November
Anzahl und Geſchlecht der Jungen	2 ♂	1 ♂ 1 ♀	1 ♂ 2 ♀	2 ♀	2 ♂ 2 ♀
Alter bei Beginn der Mauſer	7½ bzl. 8 Monat	5½ bzl. 6 Monat	3½ bzl. 4 Monat	4 bzl. 4½ Monat	4½ Monat
Jahreszeit derſelben	1899 Anfang bis Mitte Februar	Anfang bis Mitte Februar	Anfang bis Mitte Januar	Mitte bis Ende Februar	Anfang April
Alter am Ende der Mauſer	11½ bzl. 12½ Monat	10 bzl. 11 Monat	5½ bzl. 6 bzl. 6½ Monat	8 bzl. 9 Monat	6½ bzl. 7 bzl. 7½ Monat
Jahreszeit hierzu	Anfang Juni bzl. Anfang Juli	Mitte Juni bzl. Mitte Juli	Anfang März bzl. Mitte März bzl. Ende März	Mitte Juni bzl. Mitte Juli	Anfang bis Mitte bzl. Ende Juni
Dauer der Mauſer	4 bis 4½ Monat	4½ bis 5 Monat	2 bzl. 2½ Monat	4 bzl. 4½ Monat	2 bis 3 Monat
Verfärbung betreffend	mit Federwechſel	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.
Anzahl und Geſchlecht der mirabilis	2 ♂	1 ♂	1 ♂ 1 ♀	—	1 ♂
Anzahl und Geſchlecht der Gouldae	—	—	—	1 ♀	1 ♂
Anzahl und Geſchlecht der Miſchlinge	—	1 ♀	1 ♀	1 ♀	2 ♀
Bemerkungen		Liegen eigentlich noch zwei Bruten, Juni und Juli, dazwiſchen.			Folgt eigentlich noch eine achte Brut

So erklärlich es erſcheint, daß importirte Vögel je nach der nördlicheren und ſüdlicheren Lage ihrer heimathlichen Geburtsſtätten zu verſchiedenen Zeiten mauſern, ſo iſt dies doch bei gezüchteten Vögeln verwunderlich. An der Hand der obenſtehenden Tabelle ſehen wir, daß der Eintritt in die Mauſer, als frühſter Zeitpunkt, ſchon in einem Lebensalter des Vogels von nur dreieinhalb Monaten erfolgte, und zwar bei den Jungen der dritten Brut, die mit denen der erſten Brut um gut vier Monate auseinander ſtanden und die bereits ihr volles Prachtgefieder in einem Alter angelegt hatten, wo die letzteren noch lange in ihrem allerdings auffallend kräftig gefärbten Uebergangskleid verharrten. Bei den übrigen Jungen ſchwankt der Beginn des Federwechſels, mit dem überhaupt die Verfärbung hauptſächlich zuſammenfällt, in allen möglichen Abſtufungen bis zu einem Höchſtalter der Jungen von acht Monaten. Aehnlich liegen die Verhältniſſe hinſichtlich des Alters zur Zeit der Beendigung des Federwechſels. Auch in dieſem Falle erreichen die Jungen der erſten Brut das höchſte Alter, nämlich zwölfeinhalb Monate; hierin ihnen ſehr nahe kommen die der zweiten Brut, wie überhaupt dieſe beiden Bruten von allen übrigen in jeder Beziehung ſehr überflügelt werden, namentlich von der dritten und fünften, während die vierte mehr einen Mittelweg innehält. Dementſprechend währt auch die Dauer der Mauſer ſehr verſchieden lange, indem ſie bei den einzelnen Individuen zwiſchen zwei und fünf Monaten ſchwankte. Hierbei iſt eine gewiſſe Uebereinſtimmung zu erkennen, indem wir ſehen, daß je früher ſie eintritt, ſie deſto ſchneller verläuft und umgekehrt, um ſo langſamer, je älter der Vogel war, was dadurch geſchah, daß gewiſſermaßen eine Unterbrechung, bezl. ein längerer Stillſtand im Federwechſel eintrat. Hierbei muß ich aber ausdrücklich betonen, daß dies keineswegs etwa mit einer ſtockenden Mauſer zu vergleichen war oder ſonſtwie in einem krankhaften Zuſtand gelegen hätte. Die Vögel befanden ſich während der ganzen Zeit in tadelloſem Gefieder und beſter Geſundheit. Desgleichen ſcheint auch die Jahreszeit weder einen hemmenden noch fördernden Einfluß auf den langſameren oder ſchnelleren Gang der Mauſer, bzl. Verfärbung auszuüben, denn wir ſehen bei der dritten und fünften Brut den gleich kurzen Verlauf derſelben, obgleich ſie bei erſterer in die Wintermonate, bei letzterer in die warme Jahreszeit fiel, und umgekehrt der langſame Federwechſel der erſten, zweiten und vierten Brut im Winter beginnt und im Sommer endet.

(Schluß folgt.)

Von meinen Stubenvögeln und Züchtungsergebnissen.

Von F. [illegible]

3. Rother Hänfling, Pflege und Zucht des rothbrüstigen Gerstenfinks (Fringilla cannabina, Linn.). [illegible]

a. Haltung und Pflege im Allgemeinen.

(Fortsetzung statt Schluß.)

[illegible]



[illegible]

[illegible]

Digitized by Google

In den langen Winternächten waren die Graugirlitze nächſt dem Mövchen die erſten, welche morgens das Lampenlicht benutzten und ſogleich ihr Tagesleben begannen — ſie waren jedesmal die erſten am Freßtrog. Eigenthümlich erſcheint es, daß dieſe Vögel bei mir nicht recht an's Baden gehen wollten. Nur ſelten machten ſie einige Badeverſuche — auch wenn ihre Käfiggenoſſen vor ihren Augen in den Napf ſprangen und pudelnaß wieder herauskamen — und ein eigentliches Baden fand kaum je einmal ſtatt. Sie treiben es hierin wie die Wellenſittiche. Deß ungeachtet ſind ſie völlig geſund, munter und in beſtem Gefieder. Drollig geſtaltete ſich die Sache, als ich einmal eines der Männchen für einige Wochen in einem ziemlich großen Käfig (90 cm lang, 74 cm hoch und 36 cm tief) mit drei jungen, doch bereits ſelbſtſtändigen Wellenſittichen zuſammenhielt. Anfangs fürchteten ſich die einen vor den anderen, der Graugirlitz vor den Wellenſittichen, und dieſe vor ihm, aber mehr noch das Letztere. Schon nach wenigen Tagen jedoch waren ſie ſo zuſammengewöhnt, daß die Wellenſittiche den „Edelſchläger“ ignorirten, und ihr altes Thun und Treiben fortſetzten, während ſie die erſten Tage ſich ganz ſchüchtern und furchtſam geberdet und ſtill dageſeſſen hatten. Auch der Grauedelfink fühlte ſich in ihrer Geſellſchaft bald heimiſch und behaglich, ja er wurde nach kurzer Zeit ſo frech, ſeine viel größeren Genoſſen, wenn ſie ihn im Freſſen, beſonders beim Benagen der Sepienſchale ſtören wollten, abzubeißen oder gar mit geöſſnetem Schnabel kampfluſtig auf ſie loszufahren. Dieſe aber machten keine Miene, ihm etwas zu Leide thun zu wollen; nur ein einziges Mal konnte ich beobachten, wie einer der Sittiche nach dem vorüberfliegenden Girlitz ſchnappte, ihn auch am Flügel erwiſchte und einige Sekunden in der Luft baumeln ließ, ohne ihn jedoch zu beſchädigen. Ob ſich nun allen, auch älteren Wellenſittichen gegenüber — beſonders in einem engen Käfig, wo ſie ſich weniger ausweichen können — die Dinge ebenſo geſtalten würden, will ich hiermit keineswegs behauptet haben. Mißlich bei der Haltung des Graugirlitz — übrigens auch vieler anderer Vogelarten — iſt der Umſtand, daß die Männchen (auch wenn keine Weibchen darunter ſind) ſich nicht recht miteinander vertragen wollen; jedenfalls ſingen ſie dann nur wenig, da ſie einander viel beißen und jagen, mitunter aber dann gleich wieder auch gegenſeitig ſich füttern und zärtlich thun, und wenn ſie getrennt ſind, einander locken — ein ſeltſamer Gegenſatz! Will man ſich alſo an ihrem Geſang erfreuen, ſo halte man nicht mehrere Männchen zuſammen in einem Käfig, zumal in einem kleineren. Umgekehrt geht es jedoch, wenigſtens nach meinen Erfahrungen, recht wohl; Weibchen kommen — mindeſtens ſolange keine Männchen unter ihnen oder in der Nähe ſind — vortrefflich miteinander aus und thun, wie bereits oben angedeutet, faſt ſo zärtlich miteinander wie Pärchen. Die Grauedelfinken, beſonders die Weibchen, zeigen die ſonderbare Gewohnheit, oftmals nach unten gegen die Füße hin zu blicken, als ob ſie nach Art eines eitlen Mädchens, das alle Augenblicke ſeinen Anzug muſtert, ſich beſtändig vergewiſſern wollten, ob an ihrer Gefiedertoilette auch alles in Ordnung ſei. Hinfällig an ſich haben ſich dieſe Vögel, ſelbſt die friſch eingeführten, bei mir durchaus nicht gezeigt; im Gegentheil, auch die in recht elendem Zuſtand angekommenen erholten ſich — natürlich bei entſprechender Pflege — raſch wieder.

Die Verpflegung, insbeſondere die Fütterung meiner Graugirlitze richtete ſich anfangs genau nach den Vorſchriften des Herrn Dr. Ruß (Handb. f. Vogell. I, 3. Aufl. S. 404). Nach und nach aber erlaubte ich mir, je nach den gemachten Erfahrungen und Beobachtungen, einige kleine Zuſätze und Abänderungen, wodurch allem Anſchein nach die Munterkeit und das Wohlbefinden meiner kleinen, grauen Pfleglinge nur geſteigert wurde. Ich reichte wöchentlich ein- bis zweimal zerſchnittene Mehlwürmer, die meiſt recht gern genommen wurden; dazu täglich ein Stückchen altbackene, in Waſſer erweichte und wieder ausgedrückte Semmel, welche einige Zeit kaum beachtet, ſpäter aber, beſonders von einem der Weibchen, mit Vorliebe verzehrt wurde. An der Sepia, die ich ihnen in ganzen Stücken in den Käfig hing, pickten ſie ſehr fleißig. Auch einem Gemiſch von gehacktem Hühnerei und eingequellten Ameiſenpuppen, das ich ihnen als Ueberreſte meiner eben brütenden Wellenſittiche zeitweilig vorſetzte, waren ſie nicht abhold. An die aufgeſteckten Aehren des Wegerich (Plantago), der Wegwarte (Cichorium), an Obſt, Grünkraut und Kolbenhirſenähren gingen ſie ebenfalls. Von den ſonſtigen Sämereien lieben ſie unſtreitig am meiſten die Senegal-(Kolben-)Hirſe, die wol in ihrem Vaterland die Hauptnahrung ausmacht, und denn auch in der Gefangenſchaft ausmachen ſoll, ſodann die kleine rothe (algeriſche) Hirſe. Auch weiße Hirſe nebſt wenig zerquetſchtem Hanf nehmen ſie an; alles Uebrige aber, was etwa der anderen Vögel wegen noch im Futternapf ſich vorfand, ließen die meinigen ziemlich unberührt, ſo insbeſondere den Spitz-, Rübſen- und Leinſamen.

Ich beſitze gegenwärtig (9. Juli) noch zwei Männchen, ein altes, bereits oben geſchildertes, das z. Z. wieder in vollkräftigem Geſang ſteht, und ein ſelbſtgezüchtetes, $^3/_4$ Jahr altes junges, von welchem ich den geehrten Leſern näheres unter b erzählen werde. Das andere alte Männchen habe ich am 25. Juni an einen Freund abgetreten, wie ich auch meine Wellenſittiche und rothköpfigen Inſeparables fortgab, da ich mich von jetzt ab hauptſächlich der Haltung und Zucht feiner Harzer Kanarien zuzuwenden gedenke.

(Fortſetzung folgt).

Unſere Würger, hauptſächlich in ihrer Bedeutung als Käfigvögel.

Von Fr. Anzinger.

Die artenreiche Ordnung der Singvögel Oscines weiſt eine Sippe auf, welche ſo wie diejenige der Raben in derſelben eine gewiſſe Sonderſtellung einnimmt. Dies iſt die Familie der Würger Laniidae, welche infolge ihrer Fuß- und Schnabelbildung an die Raubvögel erinnert und von früheren Syſtematikern auch hinzugerechnet wurde. Von über 200 Spezies dieſer Familie, welche ſich hauptſächlich über die öſtliche Erdhälfte verbreiten, finden ſich bei uns nur vier gut unterſcheidbare Arten. Es ſind kräftige Vögel von mindeſtens Kreuzſchnabelgröße, mit großem, ſchön geformtem Kopf, langem oder mindeſtens mehr als mittellangem Schwanz, ſtämmigen, ſcharf bekrallten Füßen und kräftigem, hochrückigem Schnabel; die Oberſchnabelſpitze iſt ſcharfhakig herabgebogen und am Oberkiefer befindet ſich, wie bei den Edelfalken. ein kerbenartiger Ausſchnitt, der ſogenannte Zahn. Das Gefieder iſt ſchön oder doch mindeſtens anſprechend gefärbt. Ein beſonders hervorſtechendes Merkmal in ihrer Färbung iſt der breite, bei dem Männchen ſchwarze, bei Weibchen und Jungen meiſt trübbraune Augenſtrich, welcher an der Schnabelwurzel beginnt und ſich durch's Auge bis über die Schläfengegend hinzieht. Die Größen- und Farben-Unterſchiede, ſowie die plaſtiſchen Merkmale der vorerwähnten vier Arten will ich hier behufs Vergleichung und Beſtimmung einer fraglichen Art in überſichtlicher Darſtellung bringen:

1 a: Geſammtlänge des Vogels 18 bis 22 cm (Kreuzſchnabel- bis Starengröße); Schwanzende abgerundet: Siehe **2 a** und **b**.

1 b: Geſammtlänge etwa 25 cm (Amſelgröße); Schwanzende keilförmig abgeſtuft; Oberſeite hellaſchgrau; Unterſeite ſchmutzigweiß; Flügel und Schwanz ſchwarz; die äußeren Steuerfedern mit weißer Spitze, bisweilen bis zur Wurzel weiß; Armſchwingen mit weißem Spitzenſaum; ein weißer Flügelſpiegel durch die weiße Baſis der Handſchwingen und vorderen Armſchwingen gebildet. Weibchen und junge Vögel mit grauen Querbinden auf der Bruſt: **Raubwürger (Lanius excubitor, *L.*).***)

2 a: Geſammtlänge etwa 28 cm; die Oberſeite mit braunrothen Parthien: Siehe **3 a** und **b**.

2 b: Geſammtlänge 22 cm; Oberſeite einfarbig hellaſchgrau; Unterſeite weiß, an Bruſt und Seiten roſenroth angeflogen; Stirn und Schwingen ſchwarz, letztere mit weißem Fleck an der Wurzelhälfte; die vier mittelſten Schwanzfedern ſchwarz, die nächſten bis zur Mitte, die übrigen ganz weiß; Junge oben bräunlichgrau, licht gewellt, Bruſt gelblichweiß, dunkelgrau gewellt; Weibchen mit weniger Roſenfarbe auf der Unterſeite und mehr Schwarz im Steuer: **Schwarzſtirnwürger (Lanius minor, *Gm.*).**

3 a: Kopf, Nacken und Bürzel hellaſchgrau, Rücken braunroth; der zuſammengelegte Flügel ohne weißen Fleck; Naſenfedern ſchwarz; Kehle und Unterſchwanzdeckfedern weiß; Bruſt und Bauch roſafarbig; mittelſte Schwanzfedern ſchwarz, die übrigen weiß mit breitem ſchwarzem Ende. Bei Weibchen und Jungen iſt die Oberſeite licht roſtbraun, weißlich und dunkelbraun gewäſſert, die Unterſeite gelblichweiß mit braungrauen Mondflecken auf der Bruſt: **Rothrückiger Würger (Lanius collurio, *L.*).**

3 b: Oberkopf und Hinterhals zimmtrothbraun; Stirn, Mantel, Flügel und Schwanz ſchwarz, auf dem Flügel ein weißer Spiegel; Naſenfedern, Bürzel und Unterſeite weiß, ebenſo die äußeren Steuerfedern an der Wurzel und Spitze. Bei jungen Vögeln ſind die weißlichen Schultern ſchwarz geſchuppt, die Oberſeite auf braungrauem Grund mit ſchwärzlichen und ſchmutzigweißen Mondflecken, die gelblichweiße Bruſt ſchwärzlich geſchuppt: **Rothkopfwürger (Lanius senator, *L.*).**

Die Verbreitung und Häufigkeit dieſer Würgerarten variirt ziemlich ſtark. Der Raubwürger iſt in ganz Mitteleuropa, aber nirgends in größerer Zahl, zu treffen. Er überwintert bei uns und ſein Verbreitungsbezirk dehnt ſich bis zum Norden Europas aus. Der Rothkopf- und Schwarzſtirn-Würger verbreiten ſich gegen den Süden hin, treten in den wärmeren Ländern zahlreicher auf als bei uns und ſind in einzelnen Bezirken Deutſchlands und Oeſterreichs gar nicht zu treffen. Bei uns am häufigſten und daher auch wol am bekannteſten iſt der rothrückige Würger. Die letzteren drei Arten ſind Zugvögel, welche anfangs Mai aus der Winterherberge hier eintreffen und in der erſten Hälfte September wieder abziehen.

In ihrem Betragen, ſpeziell in der Suche nach Nahrung, ſtimmen unſere Würger faſt vollſtändig überein. Dieſelbe beſteht aus fliegenden Inſekten, Laufkäfern, kleineren Kriechthieren und je nach der Stärke und dem Muth des Würgers auch aus Mäuſen und kleineren oder größeren Vögeln. Der Raubwürger greift ſogar die kräftigen Droſſeln an und überwältigt ſie meiſt nach längerem Kampf. Aus letzterer Urſache muß es leider auch der Naturfreund zugeben, daß dieſe in ihrer Erſcheinung ſo hübſchen Vögel als ſchädlich erklärt und auf die Abſchußliſte geſetzt werden. Dagegen eignen ſich einzelne Mitglieder dieſer Vogelfamilie infolge ihrer vorzüglichen Auffaſſungs- und Nachahmungsgabe, welche ſie befähigt, eine oft ſtaunenswerth große Zahl verſchiedener Kopien aus dem Stimmenvielerlei der ſie umgebenden Thierwelt mit täuſchender Aehnlichkeit wiederzugeben, als ſehr empfehlenswerthe Stubengenoſſen, deren Haltung, wenn auch mit einzelnen Schwierigkeiten verbunden, ſich reichlich lohnt.

Die Frage, welcher von den vorerwähnten vier Vögeln als der hervorragendſte Nachahmer, als der beſte, vielſeitigſte Spötter gelten darf, iſt bis jetzt noch nicht in vollkommen befriedigender Weiſe gelöſt worden, denn die Anſichten hierüber, welche auf dem Halten verſchieden veranlagter Sänger bei verſchiedenen Pflegern baſiren, gehen ebenſo weit auseinander, wie jene über die zuträglichſte Fütterung und Pflege dieſer Sänger in der Gefangenſchaft. Während z. B. der Geſang des Raubwürgers nach dem Urtheil der meiſten

---

*) Die durch minimale Abweichungen in der Gefiederfarbe bedingten Unterarten var. major, *Pall.* und var. Homeyeri, *Cab.* kommen für einfache Liebhaber nicht in Betracht.

Geſangskenner als vollkommen werthlos bezeichnet wird, haben ſich doch ſchon einige Liebhaber gefunden, welche ihm ein ziemlich großes Lob zollten. Einzelne Liebhaber taxiren den Schwarzſtirnigen (gewöhnlich kleiner Grauwürger genannt) als Spötter höher als den Dorndreher, und wieder andere haben gefunden, daß ſich der letztere von dem gewöhnlich ſehr geringgeſchätzten Rothkopfwürger geſanglich nicht unterſcheidet.

Ich habe bereits in meinem Artikel über die Sängergrasmücke betont, daß ſich unter den Spottvögeln die häufigſten und elendeſten Stümper befinden und dieſe Thatſache macht ſich bei den Würgern wol am meiſten bemerkbar. Ein auf eine Würgerart erpichter Liebhaber iſt z. B. vom Zufall begünſtigt und erhält ſofort einen tüchtigen Sänger; ein anderer dagegen darf, und zwar in den meiſten Fällen, ziemlich lange fahnden, bis er ſich einen Vogel gleicher Art „erobert“, der ſeinen Anforderungen entſpricht. Aus dieſem Grund, glaube ich, darf ſich niemand das Recht zueignen, ein ganz beſtimmtes Urtheil über den Geſangswerth der einen oder andern Würgerart zu fällen. Aus den übereinſtimmenden Mittheilungen bewährter Vogelgeſangskenner iſt übrigens zu entnehmen, daß unſer Dorndreher als der beſte Spötter gilt; nach demſelben kommen in abſteigender Folge der kleine Grauwürger, der Rothkopfwürger und als letzter der Raubwürger.

Der kleine Grauwürger iſt in Nordtirol ſelten, der Rothkopfwürger garnicht zu finden und der Raubwürger, wie anderwärts, nur in einzelnen Köpfen vorhanden; dagegen iſt der rothrückige, nämlich unſer Dorndreher, hier ſehr häufig. Hiernach ergibt ſich auch meine Kenntniß über das Käfigleben dieſer Arten. Den Schwarzſtirnigen habe ich nur vorübergehend beſeſſen, den rothköpfigen und den Raubwürger ein par Mal bei anderen Liebhabern beobachtet, mit dem Dorndreher aber ziemlich genaue Bekanntſchaft gepflogen. Nach der oberflächlichen Beobachtung der drei erſteren Arten kann ich leider nur mittheilen, daß mir ihr Geſang durchaus nicht gefiel, namentlich der Rothkopf- und der Raubwürger brachten ein furchtbares Zeug daher. Hätten dieſe Vögel über die Stimmgewalt unſerer Singdroſſel verfügt, ſo hätte ihr Lied „Stein und Bein erweichen, Menſchen raſend machen können“.

Allſeitig wird, und zwar mit Recht, angenommen, daß ſich Vögel mit Nachahmungsgabe nur dort zu vielſeitigen Spöttern heranbilden können, wo ſie in ihrer Jugendzeit Gelegenheit haben, eine größere Anzahl verſchiedener fremder Vogellieder, Rufe und Pfiffe zu hören und in ihr Gedächtniß aufzunehmen. Sind die fremden Lehrmeiſter ſolche Vögel, deren Strofen und Rufe ſich durch ſcharfe Prägung auszeichnen, ſo wird der durch ſolche Klangbildkopien bereicherte Geſang des Spötters um ſo ſchöner und ausdrucksvoller. Aus dieſem Grund werden Spötter, welche Sproſſer-, Nachtigalen-, Finken- oder Wachtelſchläge, Schwarzkopfüberſchläge, Pirolruf, Motive aus dem Sing- und Schwarzdroſſellied u. a. imitiren, beſonders hochgeſchätzt. Mehr originell als werthvoll ſind ſolche Spötter, welche hauptſächlich den „kleinen“ Geſang minderer Sänger, z. B. das Wetzen der Kohl- und Tannenmeiſe, kurze hartklingende Strofen verſchiedener Körnerfreſſer, oder den zweiſilbigen Ruf des Wachtelkönigs, das Krähen des Haushahnes, das Gackern eierlegender Hennen, den mehrmaligen Ruf der Dohle, der Raben oder der Saatkrähe und dergleichen Kunterbunt in oft komiſcher Zuſammenſetzung bringen. In den meiſten Fällen wird ſelbſtverſtändlich Werthvolles mit Werthloſem vermiſcht zum Beſten gegeben, und in ſolch einem Potpourri behält das Schöne ſelten die Oberhand.

Daß es unter den Dorndrehern ausgezeichnete Spötter gibt, die es nicht ſelten bis zu 15 bis 20 verſchiedenen Kopien bringen, iſt eine Thatſache, die heute nicht mehr unbekannt iſt. Bilden ſolche Vögel auch eine Ausnahme, ſo kann doch konſtatirt werden, daß der Dorndreher, ſei er in der Annahme fremder Weiſen auch noch ſo karg, beſſer kopirt als der Rohr- und Gelbſpötter.

Während die beiden Letztgenannten ihre erborgten Weiſen gewiſſermaßen nur zum Spaß in ziemlich oberflächlicher, oft kaum mehr erkennbarer, verfilzter Form hervorſprudeln, ſcheint ſich der Dorndreher mit dem Erlauſchten ernſtlich zu befaſſen, und ſich behufs möglichſt deutlicher Wiedergabe deſſelben Mühe zu geben. Die erlernten Stücke werden meiſt vollkommen zu Gehör gebracht und derart abgegrenzt, daß jede folgende Nachahmung ſehr deutlich hervortrittt. Werden auch verſchiedene Nachahmungen in der regelloſen Folge des Geſangsganzen mehrmals wiederholt, ſo wird man an dem mehrmaligen Hören derſelben doch nicht müde; umſo weniger dann, wenn der Sänger ein umfangreiches Kopienkonvolut zu entfalten im Stande iſt.

Schade, daß dieſer Sänger über keine ſtärkeren Stimmmittel verfügt, und daher unter einem Chorus ſcharfſingender Stubenvögel, wie Nachtigal und Sproſſer, Schwarzplattl und Gartengrasmücke u. a. faſt ganz verſchwindet! Ebenſo ungünſtig erweiſt ſich auch die Thatſache, daß ſich dieſer Vogel im Freien nur in den ſeltenſten Fällen belauſchen und auf dieſe Art für die Liebhaberei gewinnen läßt. Eine Gewähr für die mögliche — wohlgemerkt — nur für die mögliche Leiſtungsfähigkeit eines Dorndrehers hat man daher nur in dem einen Fall, wenn man dieſen Vogel aus einer Gegend erhält, von der man weiß, daß ſie mit guten Sängern verſchiedener Arten möglichſt reich beſetzt iſt. Einen Durchſchnittsvogel käfigen lohnt nämlich nicht die Mühe, welche er verurſacht.

(Schluß folgt.)

Schwalbenzüchtung im Zimmer.

(Briefliche Mittheilung.)

Ich wollte Ihnen über meine Schwalbenzucht nicht eher Mittheilung machen, als bis ich von einem gelungenen Erfolg zu berichten haben würde. Heute iſt dies zu meiner herzlichen Freude der Fall.

Am 15. Juni begann das Schwalbenweibchen auf fünf Eiern zu brüten, und am 29. Juni ſchlüpften drei Junge aus. Am 18. Juli ſodann flogen die drei Jungen, die ſich prächtig entwickelten, ſämmtlich aus. Es ſind drei reizende Vögel, jetzt ſchon ſo ſtark wie die Alten und kugelrund. Bis jetzt ſah ich nur immer das Weibchen füttern, das auch das Brutgeſchäft ganz allein beſorgte; doch iſt es wol möglich, daß auch das etwas weniger zahme Männchen ſich der Kleinen annimmt, wenn niemand im Zimmer anweſend iſt. Das Neſt, in dem die jungen Schwalben erbrütet wurden, war auf einem an die nackte Wand genagelten Lattenſtück errichtet und wurde von mir durch einen nebenan auf eine kleine Etagère geſetzten Blumentopf ein wenig vor den direkten Blicken der Eintretenden geſchützt. Das brave Weibchen ließ ſich übrigens in ſeinem Brutgeſchäft durch niemand ſtören, flog tagsüber fortwährend ab und zu und ſaß nur nachts feſt auf den Eiern. Es nahm es auch durchaus nicht übel, wenn ich die Eier betaſtete, um zu ſehen, ob ſie warm ſeien, und ſpäter die Jungen ſtreichelte; das herzige Thierchen iſt eben von wahrhaft rührender Zahmheit.

Als Aufzuchtfutter kann ich der tropiſchen Hitze wegen lediglich friſche, d. h. gedämpfte oder geſchwellte Ameiſenpuppen und Mehlwürmer verwenden, da Eifutter in wenigen Stunden verderben würde. Die jungen Schwalben gedeihen aber bei dieſer Fütterung ſichtlich auf's Beſte. Frau R. Siegmund.

◆

Unwiſſende Vogelliebhaberei.

Von Armin Quehl.

Als Vertreter einer bedeutenden älteren Buch- und Steindruckerei Leipzig's iſt es mir täglich vergönnt, die freie Natur und in ihr das Leben und Treiben unſerer Lieblinge aus der Vogelwelt zu genießen.

Wenn ich nun die bei meinen Reiſen gemachten Erfahrungen hier ſchildere, ſo iſt es lediglich deshalb, um die Meinungen der verehrten Leſerinnen und Leſer mit den meinigen auszutauſchen. —

Es war am Freitag, den 5. Mai d. J., einem ſturm- und regenreichen Tage, wie ſolche uns ſeit Anfang Mai beſchieden waren, als ich auf meinen Geſchäftswegen die Roßſtraße unſerer Sachſenhauptſtadt paſſirte und meine Gedanken plötzlich an einem nördlich gelegenen Hauſe durch das klägliche Piepen von Kanarienvögeln vom Geſchäft abgelenkt wurden. Um mich ſehend, bemerkte ich über der Eingangsthür einer unbedeutenden Reſtauration (mehr Deſtillation), in einem von höchſtens 10 cm Breite, 70 bis 80 cm Länge und 15 bis 20 cm Höhe, vorn mit Maſchendraht und hinten mit Glaswand verſehenen Raume einige Kanarienvögel, die durch Kälte und Näſſe aufgeſträubt unglücklich hin- und herhockten und in klagender Weiſe ihrem Unbehagen durch unaufhörliches Piepen Ausdruck verliehen. Neben einem in der Glaswand angebrachten Schlupfloch, aus welchem ſich bald ein rother Kardinal in beſagten Raum begab, und in ſeiner Verfolgung an dem Hin- und Herfliegen der geängſteten Kanarienvögel beſonderen Gefallen zu finden ſchien, ſah ich ein Stiglitz- und Hänflingmännchen, die den Kanarienvögeln den Gebrauch des Schlupfloches unmöglich machten. Zwecks weiterer Orientirung über dieſen ſonderbaren Aufenthalt dieſer Vögel begab ich mich nun in das erwähnte Haus. Eintretend, bat ich, mir näheren Einblick in dieſe unwiſſende Vogelliebhaberei zu geſtatten. Dieſes wurde mir auch nicht vorenthalten. Ueber dem inneren Raum der Eingangsthür befand ſich hinter der ſchon erwähnten Glaswand eine weitere mit Maſchendraht umſponnene Fläche von etwa 20 cm Breite und ebenſolcher Länge und Höhe wie außerhalb. Die Sitzſtangen bildete ein vielſeitig beäſteter Stamm, deſſen Zweige durch die Glaswand gehend, die äußere kleinere Fläche mit berührten. Mehrere kleinere Vogelkäfige, die im Innern dieſes ſonderbaren Vogelhauſes Aufſtellung gefunden hatten, verliehen dem an und für ſich ſchon kleinen Flugraum einen wenig einladenden Anblick. Außer den oben erwähnten Vögeln friſteten zwei Zeiſige, einige Reisfinken und Stiglitze (in Summa etwa 15 Vögel) ihr trauriges Daſein. Mein Vorſchlag, den Vögeln einen beſſeren und größeren Raum, von Ruhe und Sonnenlicht umgeben, zu gewähren, und ſie von einander in ihren Klaſſen abzuſondern. mußte wohl oder übel der Behauptung in der Unwiſſenheit des Beſitzers unterliegen, daß die Vögel doch gar keinen beſſeren und luftigeren Aufenthalt (meiner Meinung nach aber äußerſt zugigen) haben könnten, und er beabſichtige, daß zwiſchen den Kanarienvögeln (ein Männchen und drei Weibchen) eine Parung ſtattfände, welche ſich auch anſcheinend mit dem einen Stiglitzmännchen und einem Kanarienweibchen vollziehen würde, da dieſe beiden Letzteren bereits eifrig mit dem Neſtbau und den Vorarbeiten beſchäftigt wären. Dieſes belachte ich natürlich in zweifelhafter Meinung und bat, mir zu geſtatten, in nächſter Zeit mich wieder einmal nach dem Leben und Treiben ſeiner bedauernswerthen Lieblinge erkundigen zu dürfen.

Nach weiteren Erfahrungen werde ich mir erlauben, mit meiner Schilderung fortzufahren.

(Fortſetzung folgt.)

◆



Herrn **Moritz Mende**: 1. Die amerikaniſche Spottdroſſel eignet ſich ſehr gut als Stubenvogel (im Wohnzimmer zu halten). 2. Im Käfig zeigt ſie ſich ungemein kräftig und ausdauernd und hält ſich bei einfachſter, anſpruchsloſer Verpflegung viele Jahre hindurch vortrefflich. 3. Sie iſt ein hervorragender Sänger und Spötter, natürlich iſt aber die Begabung des einzelnen Vogels verſchieden. 4. Geben Sie ihr ein Droſſelfutter, alſo eins der bekannten Gemiſche, welches in der Hauptſache aus getrockneten Ameiſenpuppen und geriebenen Mören oder Gelbrüben mit Zuſatz von einem Univerſalfutter beſteht. Im Sommer fügen Sie dieſem Futtergemiſch friſche Ameiſenpuppen hinzu, im Winter aber anſtatt deſſen Mehlwürmer und zwar je nach der Körperbeſchaffenheit 6 bis höchſtens 10 Stück täglich. Als Zugabe iſt immerfort irgend welche Frucht nothwendig, abwechſelnd, je nach der Jahreszeit, kleine oder große Roſinen, beſonders die ſogen. Sultanina-Roſinen, fein zerſchnittene Feigen, kleine Würfel von ſüßer geſchälter Birne oder Apfel, friſche oder angequellte Fliederberen, Vogelberen, Heidelberen, Kirſchen, Weintrauben u. a. Hin und wieder, beſonders in der Mauſerzeit, reichen Sie auch ein wenig feingehacktes mageres Rindfleiſch oder ebenſolches hartgekochtes Hühnerei dazu, bzl. unter das andere Futter gemiſcht. 5. Am zweckmäßigſten beherbergen Sie dieſen Vogel in einem beſonders eingerichteten Droſſelkäfig, wie er, in unſeren großen Käfigfabriken nach der Vorſchrift meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ angefertigt, käuflich iſt; doch muß er für die Spottdroſſel möglichſt geräumig ſein.

Herrn General v. Stwoeninski, Wiesbaden: Einen Regenpfeifer können Sie mit anderen einheimiſchen Vögeln ſehr wohl zuſammenhalten. Am beſten pflegen und füttern Sie ihn (ich nehme an, es iſt ein Fluß-Regenpfeifer) mit Nachtigalfutter nebſt Zuſatz von Mehlwürmern und Ameiſenpuppen. Seinen Aufenthaltsort beſtreuen Sie ſtark mit grobem Waſſerſand und ſtellen ein großes flaches Waſſergefäß dazu. Im übrigen kann ich Ihnen dieſen Regenpfeifer ſehr empfehlen, da er ſeinen Pfleger bald durch Zutraulichkeit erfreut.

Herrn Erich Mendelsſohn: Vor allen Dingen haben Sie den Fehler gemacht, daß Sie die Eier dem Kanarienweibchen zu früh fortgenommen haben, denn die Kanarienvögel brüten in der Regel 13 bis 15 Tage. Das genannte Futter iſt gut. Woran es liegt, daß Ihre Kanarienvögel nicht mit Erfolg brüten, kann ich nicht erſehen, da Sie gar keine Angaben über die Haltung der Vögel (Zuchtraum u. a.) gemacht haben.

Briefliche
Mittheilungen.

. . . Vorläufig die beiläufige Mittheilung, daß behufs Heilung aller Darmkrankheiten bei Papageien bzl. Jakos das „Nährſalzextrakt“ (beſtehend aus Kali, Natron und Eiſen), von Horch u. Werthen in Köln, das einzige und beſte Mittel iſt, und wunderbare Erfolge hat. Es iſt identiſch mit den „Blutnährſalzen“, die allen kranken Papageien fehlen. Darum iſt der Erfolg großartig bei blutkranken Menſchen und Papageien.

Dr. med. Otto, Arzt für naturgemäße Heilweiſe.

Zu unſerm Bilde.

Der die Mitte unſeres Bildes einnehmende Papagei, der ſchwarzkäppige oder Breitſchwanzlori (Psittacus atricapillus, *Wgl.*) gehört zu den begabteſten und am längſten bekannten Loris. Er iſt abſonderlich ſchön. An Stirn und Scheitel erſcheint er tiefſchwarz, Hinterkopf mit kaum bemerkbar ſchopfartig verlängerten Federn violettſchwarz, Zügel, Kopfſeiten, Kehle, Hals und Nacken dunkelkarminroth; Mantel, Rücken, oberſeitige Flügel- und Schwanzdecken heller blutroth, Flügel dunkelgrasgrün, Schultern gelbbräunlich, Schwingen grün, Innenfahne gelb, Spitze ſchwarz, Schwingen unterſeits ſchwarzgrau mit breiter gelber Querbinde, Flügelbug und kleine unterſeitige Flügeldecken dunkelblau; Schwanz karminroth, breiter Endrand purpurbraun, Schwanz unterſeits etwas heller; ganze Unterſeite hell karminroth, Bruſtſchild hochgelb, Schenkel zyanblau; Schnabel orangeroth, Wachshaut ſchwärzlich; Auge braun, bräunlichgelb bis gelbroth, um die Pupille ein ſchmaler hellgelber Ring, nackter Augenkreis ſchwärzlich; Füße ſchwärzlichgrau, Krallen ſchwarz. Er hat ungefähr Dohlengröße. Seine Heimat ſind die Molukken, insbeſondere Ceram und Amboina. Dort lebt er ebenſowohl in der Einſamkeit des Waldes, wie in der Nähe menſchlicher Wohnungen. In kleinen Familien ſchweift er raſchen Flugs von Ort zu Ort. Seine Nahrung beſteht außer Pflanzenhonig in weichen Baumfrüchten, zumal denen des Piſangs. Das Neſt ſteht in Baumhöhlen, die Eier ſind etwas größer als die unſerer Amſel. Leider wird er nur ſelten eingeführt. In der Gefangenſchaft zeigt er ſich ziemlich ausdauernd und beſonders dadurch angenehm, daß ſein Geſchrei nicht ſo ſchrill wie das anderer Loris, ſondern mehr pfeifend iſt. Sprechen lernt er nur einzelne Worte, allenfalls einige kurze Sätze, mit hoher und klarer Stimme raſch und haſtig nachplappern.

Zu den ſchönſten, liebenswürdigſten und ungemein zahm und zutraulich werdenden Loris gehört der auch ſprachbegabte Lori von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni, *Jard. et Slb.*). Der prächtige Vogel (auf unſerm Bild oben), der in ganz Auſtralien und Tasmania heimiſch iſt, erſcheint an Kopf und Kehle lilablau, Hinterkopf ſchwach bräunlich ſcheinend; breites Nackenband gelbgrün, ganze Oberſeite dunkelgrasgrün; Oberrücken olivengrünlich, manchmal mehr oder minder gelb und roth geſcheckt (jede Feder mit rothem oder gelbem Querfleck); Schwingen an der Außenfahne grün, Innenfahne ſchwarz, unterſeits ſchwarzgrau, mit breiter hellgelber Querbinde; Achſeln und unterſeitige Flügeldecken zinnoberroth, Flügelbug grün, Flügelrand roth und gelb geſchuppt; Schwanzfedern grün, Innenfahne gelb, unterſeits düſterbräunlichgelb, an der Innenfahne hellgelb; Hals und Bruſt zinnoberroth, Bruſtſeiten gelb; Bauch dunkelblau, Bauchſeiten, Schenkel, Hinterleib und untere Schwanzdecken roth, gelb und grün geſcheckt; Schnabel glänzend roth, Naſenhaut bläulich bis dunkelbraun; Auge orange- bis amethyſtroth, Augenkreis röthlichbraun, Füße braungrau, Krallen ſchwärzlich. Stark Dohlengröße. Er iſt einer der beſten Zuchtvögel.

In der Gefangenſchaft müſſen dieſe beiden Loris an Samenfutter gewöhnt werden, obwol man ſie auf der Ueberfahrt mit allerlei Früchten, gekochtem Reis, Honig u. a. ernährt. Dies geſchieht mit erweichtem Weißbrot, gekochtem Mais und Hafer oder allerlei anderm Getreide und Gräſern in halbreifen, milchigen Körnern, an trockene Sämereien, Kanarienſamen, verſchiedene Hirſen, trocknen Hafer, auch gequetſchten Hanf u. a. m. Daneben gibt man regelmäßig beſte Früchte je nach der Jahreszeit, Kirſchen, Birnen u. a.

Eine der zierlichſten und reizendſten Erſcheinungen in der Papageienwelt iſt das blauſcheitelige Papageichen (Psittacus galgulus, *L.*). Es gehört zu den Fledermauspapageien (Coryllis, *Ill.*), welche die Gewohnheit haben, ſich zur Nachtruhe an den Füßen mit dem Kopf nach unten aufzuhängen. Es iſt grasgrün, Unterſeite ſchwach heller; großer runder Scheitelfleck ultramarinblau; Binde über dem Oberrücken orangefarben; Querband über dem Unterrücken hochgelb; Bürzel, obere Schwanzdecken und Fleck an Kehle und Oberbruſt ſcharlachroth; Schwingen an Außenfahne dunkelgrün, Innenfahne an Spitze und unterſeits Außenfahne rußſchwarz, Innenfahne blaugrün (merblau); oberſeitige Flügeldecken dunkelgrün, große unterſeitige merblau; Schwanzfedern oberſeits dunkelgrün, unterſeits blaugrün; Schnabel ſchwarz, Wachshaut hellgelblich- bis horngrau; Augen dunkel- bis gelbbraun, ſchmale nackte Haut grau; Füße hell- bis ſchwärzlichgrau; Krallen ſchwarz. Das Weibchen iſt etwas heller grasgrün; Scheitelfleck und Kehlfleck fehlen; orangefarbne Binde am Oberrücken nur angedeutet; Bürzel und obere Schwanzdecken dunkelblutroth. Das blauſcheitelige Papageichen iſt etwa ſo groß wie der Edelfink, trägt ſich aber etwas höher aufgerichtet. Sein Verbreitungsgebiet erſtreckt ſich über Borneo, Sumatra, Banka und das ſüdliche Malakka. Sein Freileben iſt erſt wenig erforſcht. Wie alle Fledermauspapageien fliegt es ſchlecht, bewegt ſich dagegen gewandt, hurtig ſchlüpfend und ſpringend, doch auch kletternd im Gebüſch und läuft geſchickt und flink auf der Erde. Knoſpen, Blüthen, Beren u. a. Früchte, Sämereien, auch wol Inſekten bilden ſeine Nahrung. Seit altersher iſt es bei den Eingeborenen als Käfigvogel beliebt. Zu uns kommt es nicht häufig, erweiſt ſich dann aber als angenehmer, harmloſer und zutraulicher Stubenvogel. Beſonders hervorzuheben iſt, daß es einen wirklichen Geſang, und zwar ſpät abends und früh morgens, hören läßt. Im geräumigen Käfig mit grünem Strauchwerk, doch auch freifliegend in der Vogelſtube, hält es ſich gut, iſt aber gegen geringſte Fütterungsfehler empfindlich. Es muß gleichfalls nach und nach an Körnerfutter gewöhnt werden. Den Weg dazu hat Herr Oberleutnant Hauth im Jahrgang 1891 der „Gef. Welt“ in ſeinem Artikel über die ceyloniſchen Fledermauspapageichen genau angegeben.

K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.



50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung. **Knochenmühlen** für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,** [1388] **Waren i. Mecklenb.**
Proſpekte gratis.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1389]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Neu! Senſationell!

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [1390] **Edmund Schiewick, Zittau, Sachſen.**
Bitte Proſp. zu verlangen, mit f. Ref. zu dienen.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1391]

Futtermittel.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.
Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ
Weißwurm, 98er hochprima, à Ko 4½, à Ltr. 1 ℳ.
Muska, hochf. 98er, à Ko. 3, 5 Ko. 14 ℳ.
Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 5, à Ko. 9.
Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.
Bisquit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.
Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.
Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,80
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,20
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,—
do. algeriſche	„ „ „ „	2,—
do. indiſche	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	5,—

Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [1392]
Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter
Poſtſack 5 Ko. no. 2,—
Ausführl. Preisliſten ſämmtl. **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Pa. friſche Ameiſeneier, haltbare, jeden Poſten, à Ltr. 1 ℳ, bei Voreinſ. v. 70 ₰ ⁴/₁₀ Ltr. frc. **Mehlwürmer,** à L. 5 ℳ. Trockne pa. **Ameiſeneier,** à L. 90 ₰, empf. [1393
A. Wenisch, Vogelh., **Breslau,** Schuhbr. 23.

Zecke, Marke Amſel, Ltr. 1 ℳ; 10 Ltr. 7,50 ℳ. [1394]
R. Schneider, Kempten, Bayern.

Geſetzl. geſchützt.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die
Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1395]
Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Geſetzl. geſchützt.

Alle Vogelfutter,

Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1396

Mehlwürmer,

1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ **Paul Bienzeisler,**
[1397] **Tillowitz,** O.-S.

Friſche Ameiſeneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt **Zeke** der einzige Erſatz. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zeke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Drogerien. Man verlange Zeke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1398]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Ameiſeneier,

getrocknete, ſchon 1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigte goldgelbe Ware, liefert per Liter 90 Pf. [1399]

Gottlieb Wanek,
Thierhandlung, Prag 411, I.

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt [1400] ſandfrei.
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Mehlwürmer, 1000 St. geg. Einſ. von 1,50 in Mrkn. verſ. franko [1401]
D. Waschinsky, Berlin NW, Wilsnackerſtr. 63.

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1402] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Vögel.

Wie alljährlich, habe ich auch in dieſem Jahre mehrere echt ruſſiſche hoch Ia **Frühjahrs-David-Weiden-Sprosser** bei mir im Käfig **vermauſern** laſſen und gebe nun dieſelben an wirkliche Kenner des guten Sproſſerſchlages ab um den billigen aber feſten Preis von 25 ℳ franko.

Der Schlag dieſer Vögel bewegt ſich hauptſächlich in Glocken-, Baß-, Moll-, Lach-, Knarr- und Waſſer-Touren und ſchließt jede Geſangsſtrofe mit dem gebührenden Schnapper. Der Vortrag iſt hohl und tief, äußerſt langſam, gewiſſermaßen tragend, ja zur Nachtzeit geradezu feierlich! — **Dieſe Sproſſer ſind ausſchließlich eine Spezialität meines Geſchäftes; ſie haben mit den gewöhnlichen Händler-Sproſſern nichts gemein, ſind auch nur durch mich allein erhältlich und daher ohne jede Konkurrenz!** [1403]

Mathias Rausch,
Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.
NB. Einige gute Frühjahrsſproſſer ohne David, à 15 ℳ, bereits vermauſert, ſind auch lagernd.

Citronenfinken,

junge und alte Männchen, à Stck. 8 ℳ, **Dompfaffen,** junge und alte Männchen, à Stck. 3 ℳ, junge **Steinröthel,** Mnch. 8 ℳ, Wildfang **Blaudroſſel** 18 ℳ, **Gebirgsſchwarzblättchen, Gartengrasmücken** à Stck. 4 ℳ, **Zeiſige** à 90 ₰, ſehr ſchön gezeichnete **Stiglitz-Baſtarde** mit viel Weiß, à 10 ℳ ꝛc. ꝛc. Anfragen auf Doppelkarte. [1404]

Beck's Vogelverſandt,
Stuttgart, Telephon 4104.

Edle Harzer Kanarien, Hohlroller-Stamm, Frühbrut, Hähne à 4,50 ℳ, 6 Stck. 24 ℳ, Weibchen à 1 ℳ, 6 Stck. 5 ℳ. Ferner **Steindroſſeln** à 8 ℳ, **Blaudroſſeln** à 12 ℳ, unter Garantie für Hähne und lebende Ankunft. Preisl. ü. a. V. gratis. Prima friſche **Ameiſeneier** u. 99er getrocknete à Ltr. 1 ℳ, **Zeke** à Kilo 3 ℳ. Probeſendung zu 10 ₰, 25 ₰ u. 1 ℳ. [1405]
Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Gebe ab: Zebraf. à P. 4 ℳ, Mövchen à P. 3,50 ℳ, Schmetterlingsf. à P. 5 ℳ, ♂ Gürtelgrasf. 6 ℳ, ♂ Rieſenelſter 4 ℳ. [1406]
Blume, Paſtor,
Großeutersdorf (Kahla).

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Jll. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1407]

Grau-Papageien

(Jakos), garantirt junge, leicht lernende, an Hanf und Waſſer ſchon gewöhnte, ſtarke, recht geſunde Thiere, à Stück nur 12 ℳ, ausgeſuchte Exemplare nur 15 ℳ, ſolche ſchon ½ Jahr hier, nur 30 ℳ, ſolche ſchon gut und viel ſprechend, je nach Leiſtung, 40, 50, 60, 80, 100, 150 ℳ. Junge Amazonen mit viel gelb und roth, anfang. z. ſprech., 20 ℳ, ſolche ſchon ſprech. 25, 30, 35 bis 100 ℳ. **Brillenamazonen,** ſprechend, 20 ℳ. Große **Doppelgelbköpfe** und **Goldnacken,** anfang. z. ſprech., 25 ℳ. Kleine weiße **Gelbhaubenkakadus** 12–15 ℳ. **Inkakakadus** 30 ℳ. Zahme **hochamüſante**

Affen Stück 20 ℳ. Verſandt gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft. [1412]

F. Rejsek, Hamburg, Peterſtr. 28.

Orpheus-Grasmücken,

ſchöne, garantirte Männchen, à 9 ℳ, dito minder ſchöne, à 5–6 ℳ, dito ohne Gewähr fürs Geſchlecht, à 3 ℳ.

Frühjahrswildfänge

von Blaukehlchen à 7 ℳ, Gebirgsſchwarzköpfe à 6 ℳ, Gelbſpötter à 7 ℳ, Gartengrasmücken à 6 ℳ, Pirole, ausgefärbt, à 10 ℳ, ſofort lieferbar. Ferner von Mitte Auguſt ab

Herbſtwildfänge

von Blaudroſſeln à 15 ℳ, Steinrötheln à 10 ℳ, Sproſſern à 5 bis 7 ℳ, je nach Herkommen, Nachtigalen à 2,50–4 ℳ, Gelbſpöttern à 3 ℳ, Gebirgsſchwarzköpfen und Gartengrasmücken à 3–4 ℳ, junge Sperbergrasmücken à 2 ℳ empfiehlt

Mathias Rausch,
Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten
[1408] Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Kanarien-Vorsänger!

Vorzügliche tieftourenreichſte, noch nie zur Zucht benutzt und flott durchſingend, nach Geſangsgüte à 12, 15, 20, 25 und 30 ℳ, noch in großartiger Auswahl da. Verſandt überallhin gegen Vorherkaſſe oder Nachnahme mit voller Garantie für Werth, Geſundheit und Probezeit.

[1409] **Julius Häger.**
St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864.
Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25–30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft.

Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen.
Kataloge gratis u. franko. [1410]

Ausgezeichnete **Harzer Kanarienſänger,** hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1411]

C. G. Vodel, Leipzig, Plagwitzerſtr. 16

Zu verkauf. aus Liebhaberhand

weg. Auflöſg. d. Inſektenvogelliebhaberei: 1 bukowinaer Sproſſer 12 ℳ, 1 rheiniſche Nachtigal 8 ℳ, 2 Gartengrasmücken à 7 ℳ, 1 Droſſel, Wildfang von 1897, 10 ℳ, 1 Gelbſpötter, dreimal überwintert, 6 ℳ, 1 Schwarzkopf 6 ℳ, 1 Wachtel 2 ℳ, 1 Feldlerche 3 ℳ, 1 Rothkehlchen 2 ℳ, 1 Gartenrothſchwanz 1,50 ℳ. Hierzu 10 egale neue Kiſtenkäfige, praktiſch eingerichtet mit abnehmbarer Decke u. ſ. w., à Stück 4,50 ℳ. Sämmtliche Vögel zwei bis dreimal überwintert, vermauſert und tadellos im Geſang und Gefieder unter jeder Garantie. Anfragen mit Rückporto. [1413]

Carl Müller,
Frankfurt a. M., Gr. Kornmarkt 25.

Harzer Kanarienvögel,

Hohlroller-Stamm, diesjährige Hähne, à 5 ℳ, Dtz. 48 ℳ, Weibchen à 80 ₰, Dtz. 8 ℳ. Garantie für Hähne und leb. Ankunft.

Wilhelm Kaye,
[1414] **Thale** (Harz).

Gelbe Wellenſittiche,

[1415] à Stück 12 ℳ,

Tigerfinken,

à P. 1,50, 5 P. 6,50, 10 P. 12 ℳ

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Rothe u. gelbe Kreuzſchnäbel

verſende 6 Stück 4 ℳ, Dutzend 6 ℳ. Tauſche auch auf friſche Ameiſeneier, Sproſſer, Schwarzblättchen, Nachtigalen u. Käfige.

A. Jaumann,
[1416] **Großbreitenbach,** Thür.

Für Vogel- oder Zoologiſche Handlungen, auch Thierparks!

Geſucht von gebild. 38 jähr. verh. Mann, im Verkehr mit erſten Klaſſen bewandert, dauernde Stelle als Pfleger oder Futtermeiſter von Vögeln, Geflügel, Säugethieren u. ſ. w. Derſelbe hat 20jährige Erfahrung in der Vogelpflege und würde auch die Geſchäftskorreſpondenz übernehmen. Prima Referenzen zur Seite. Sprachkenntniſſe.

Gefällige Offerten mit Gehaltsangabe erbeten unter Adreſſe [1417]

A. Reuter.
Ringelbach, Poſt Oberkirch, Baden.

Seltenheiten!

1 Alpenkrähe (rothſchnäbl.), ſelbſtgezücht., 32 ℳ, **3 Schneefinken,** diesjähr., ſelbſtgezücht., p. St. 8 ℳ, **1 Steinſchmätzer,** jung aufgezog., p. St. 5 ℳ, **Schneemäuſe** (Arvicola nivalis), p. St. 4 ℳ, hat **lebend** (von letzteren auch friſche **Bälge**) abzugeben

Präparator **Zollikofer,**
[1418] **St. Gallen** (Schweiz).

Gebe ab: hochfeine vorjährige **Blaudroſſel** in herrlichem Gefieder für 12 ℳ.

Suche: **Zwerg- u. Halsbandfliegenfänger.** [1419]

Dr. Koenigsberger,
Breslau, Kloſterſtraße 53, I.

Bücher-Anzeigen.

In unſerm Verlage erſchien:

Naturgeſchichte der deutſchen Sumpf- u. Strandvögel

von **Dr. Curt Floericke.**

Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck.

Broch. ℳ 4.50, geb. ℳ 5.50.

Dieſes, eine höchſt intereſſante, noch wenig bekannte Vogelgruppe behandelnde Werk iſt in der Hauptſache auf Grund eigener Beobachtungen des Verfaſſers entſtanden, und ſo reizvoll geſchrieben, daß es das volle Intereſſe jedes Naturfreunds, Jägers oder Landmanns in Anſpruch nehmen muß.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Bei uns erſchien:

Vogelzucht-Buch,

Stubenvogelpflege und -Zucht
zum Vergnügen, zum Erwerb und für wiſſenſchaftliche Zwecke.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Auflage, mit 15 Tafeln u. 30 Textabbildungen.
Preis Mk. 1.50, geb. Mk. 2.

Creutz'ſche Verlagsbuchhdlg.
in Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. – Druck von Auguſt Hopfer in Burg b

Digitized by Google

Die gefiederte Welt.

Wochenschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler

von

Dr. Karl Ruß.

Preis vierteljährlich
[illegible]
Mk. 1.50.

Magdeburg.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretschmann).

Einzelpreis der Nummer
20 Pfg.

Inhalt der Nr. 32.

Ergänzungen zu meinen früheren Zuchtberichten (Schluß).
Mittheilungen aus Centralamerika (Fortſetzung).
Unſere Würger, hauptſächlich in ihrer Bedeutung als Käfigvögel. (Schluß).
Plauderei für Rothkehlchen-Liebhaber und -Liebhaberinnen.
Zum Wanderzug des Roſenſtars.
Zum Vogelſchutz.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechſel. — Zu unſerm Bilde.

Anzeigen.

Annahme von Anzeigen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Neue!!! Ameiseneier,
gute, ſchöne, geſiebte Ware, Ko. 2,80 ℳ, hochprima neue feinſte, weiße Tiroler, Ko. 4,30 ℳ, Lt. 90 ₰, Muska od. Zeke, Ko. 2,60 ℳ, vorgenannte 3 Sort. 5 Ko. fr. Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahr. ſelbſt erprbt., Ko. 2 ℳ, 3 Ko. fr., ſowie fachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtliche Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- und Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ mit Sack und alle Futterſorten in unübertroffener Ia Qualität. Reelle Beding. Preisl. gr. [1420]
Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1421]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Neu! Senſationell!
Kanarien-Lehr-Orgeln,
auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, ohne Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden empfiehlt [1422] Edmund Schiewick, Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

50% Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,**
[1423] **Waren i. Mecklenb.**
Proſpekte gratis.

Der beſte Fangapparat
für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1424]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Geſangskäſten, [1425]
Geſangsſpinde, Harzer Vogelbauer, liefert (Preisl. fr.) **A. Bothe,** Weddersleben, Harz.

Den erſt mit dem Beginn des III. Vierteljahres neu hinzugetretenen Abonnenten der „Gefiederten Welt“ theilen wir mit, daß wir **bei Nachbezug des erſten Vierteljahres** (1,50 ℳ)

eine Farbendrucktafel,

darſtellend:
1. Sproſſer, 2. Nachtigal, 3. Schwarzköpfige Grasmücke, 4. Sperbergrasmücke, 5. Gartengrasmücke,
bei Nachbezug des zweiten Vierteljahres (1,50 ℳ)

eine Tafel in Schwarzdruck,

darſtellend:
1. Alpenſchneehuhn, 2. Alpenmauerläufer, 3. Alpenbraunelle,
als Extra-Prämie beifügen. Wir ſtellen anheim, ſich dieſe Vortheile rechtzeitig durch Nachbeſtellung bei der nächſten Buchhandlung zu ſichern, da die Vorräthe in abſehbarer Zeit vergriffen ſein dürften.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1426]
K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Für alle Arten Vögel fertige ich ſachgemäße
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Staatspreis). Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1427]

Verkaufe Platzes halber billige Vogelbauer:
Neuntheiligen Geſangskäfig zum Anlernen junger Kanarienvogel, 10 ℳ, Heckbauer 75×40×37 cm groß, 8 ℳ, Wachtelbauer 8 ℳ, Lerchenbauer 8 ℳ, Papageibauer, 1 m hoch u. ½ m Durchmeſſer, 10 ℳ. Die Bauer ſind noch wie neu, tauſche auch Nützliches.
[1428] **L. Brock,**
Eisdorf b. Lützen (Prov. Sachſen).

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1429]

Geflügel-Fußringe
für Hühner 3, 5 u. 6 ₰, für Tauben und Kanarien 2, 3 u. 4 ₰. [1430]
H. D. Becker, Iſerlohn.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung, ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823). Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg. Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Alliance-Straße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Beſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 32. Magdeburg, den 10. Auguſt 1899. XXVIII. Jahrg.

Ergänzungen zu meinen früheren Zuchtberichten.

Von Hauth, Oberleutnant z. D.

I. Miſchlingszucht zwiſchen rothköpfiger (Spermestes mirabilis, *Hombr. et Jacq.*) und ſchwarzköpfiger Gouldsamandine (Sperm. Gouldae, *Gld.*).

(Schluß).

Aber alle Jungen ohne Ausnahme zeigten darin Uebereinſtimmung, daß das Ausfallen der Federn langſam und allmählich beginnt, und dann zu beſtimmten Zeiten in ein ſehr lebhaftes Tempo fällt, das entweder bald zur Beendigung der Mauſer führte oder wieder verlangſamte bzl. faſt ſtillſtand, um beim nächſten Anſtoß ebenſo lebhaft wieder fortzuſchreiten. Dieſe Zeitpunkte lagen gegen Anfangs Januar, April und Juli; ſie wurden in gleicher Weiſe auch von den früher gezüchteten Jungen, wie von den importirten alten Vögeln eingehalten. Einen recht merkwürdigen Verlauf, bei dem ganz bedeutende Abweichungen vorkamen, nahm die Verfärbung bei den jüngſten Miſchlingen, d. h. denen der fünften Brut. Während bei allen vorhergegangenen Bruten dieſelbe ausſchließlich mittelſt Federwechſels vor ſich ging, der ja auch in der Hauptſache ebenſo bei der fünften ſtattfand, lief bei dieſer noch eine theilweiſe Umfärbung einzelner Federchen bzl. ein Zwiſchenſchieben neuer an einzelnen Stellen im Kleingefieder nebenher bzl. voraus. Wie ich ſchon im vorjährigen Bericht den Uebergang aus dem eigentlichen Jugendgefieder zur Zeit des Flüggewerdens in diejenige Gefiederfärbung, die ich das Uebergangsgefieder nennen möchte, in dem ſie dann unverändert längere oder kürzere Zeit bis zum Eintritt des eigentlichen Altersgefieders verweilen, eingehend beſchrieb, findet thatſächlich eine unmittelbare Umfärbung, d. h. ohne Wechſel der Federn, des geſammten Jugendgefieders bis zu einem Grad ſtatt, wo es alsdann dem Alterskleid des Weibchens annähernd ähnlich geworden iſt, und zwar bei beiden Geſchlechtern. In der Regel ſind aber die jungen Männchen etwas kräftiger gefärbt. In dem vorliegenden Fall aber ſchritt dieſe Umfärbung bei einem Männchen, das ſpäter eine reinraſſige Gouldsamandine wurde, und das noch in dem jugendlichen Alter von nur zweieinhalb Monaten ſtand, allmählich an Stirn, Zügel, Bruſt- und Bauchſeiten (bei dieſen nur an einzelnen Stellen) bis zur vollen Ausfärbung des Alterskleids. Dies iſt bisher der einzige Fall unter 23 Jungen (einſchließlich 10 Stück aus 1897). Die andere Abweichung beſtand darin, daß ſowohl dieſes Männchen, wie noch ein zweites und ein Weibchen, ſämmtlich derſelben fünften Brut entſtammend, im dritten Lebensmonat einzelne neue kleine Federn auf Rücken, Bruſt und Bauch erhielten, das ich nur als eine Verdichtung des Gefieders anſehen kann; ein ähnlicher Vorgang, wie ich ihn ausführlich hier bei den gezüchteten weißbrüſtigen Schilffinken im Jahr 1894 (Nr. 3) bekannt gab. Ich konnte wenigſtens zu jener Zeit bei den jungen Gould's kein Abwerfen alter Federchen bemerken; auch trat die richtige Mauſer bei ihnen ſichtlich erſt Anfang April, d. h. im Alter von viereinhalb Monaten, ein. Dieſe beiden Vorgänge waren bei täglicher Beobachtung unſchwer von einander zu unterſcheiden, d. h. das Dunklerfärben ſchon vorhandener, ausgebildeter Federn von dem Hervorſprießen neuer und ebenſo von dem eigentlichen Mauſern. Das Hervorkommen neuer Federn auf Stellen, an denen ein Ausfallen ſolcher nicht voranging, mag wol im allgemeinen während der eigentlichen Mauſer ſtattfinden, daher für gewöhnlich der Beobachtung ſich entziehen. Was nun noch den übrigen

Verlauf des Hervortretens des Prachtgefieders inbezug auf die Reihenfolge des Erſcheinens der verſchiedenen Färbung anbelangt, ſo vollzog ſich derſelbe in genau derſelben Weiſe, wie ich dies in Nr. 13 bis 15 v. J. bereits berichtete. Am ſpäteſten kam ſie am Kopf zum Abſchluß; hier trat zuerſt der ſchmale ſchwarze Streif, rings um den Kopf verlaufend (nur bei S. mirabilis ſich abhebend), auf, daran ſchloß ſich faſt gleichzeitig der ſchmale, blaue Streif und den Beſchluß bildete ſtets das Roth bzl. Schwarz des Vorderkopfs und der Wangen. Intereſſant iſt ferner die Wahrnehmung, daß ſtets die Männchen, die ſchon ſehr frühzeitig durch eifriges Singen zu erkennen waren, aus einundderſelben Brut ſich zuerſt verfärbten und mit alleiniger Ausnahme des Weibchens der zweiten Brut auch ſtets früher damit fertig waren, während die Weibchen derſelben zu verſchiedenen Zeitpunkten in ſie verfielen und meiſtens auch mit großen Abſtänden ſie beendeten, insbeſondre im Verhältniß zu den Männchen, obgleich ſie doch untereinander nur um einen bis zwei Tage im Alter differirten.

Wie bekannt, ſind alle meine jungen Gouldsamandinen Miſchlinge der beiden Arten, und dementſprechend wäre zu erwarten geweſen, daß ſie auch die Merkmale beider Arten in der Kopffärbung aufweiſen würden. *Merkwürdigerweiſe aber zeigt ſich bei ſämmtlichen jungen Männchen gar keine Vermiſchung; ſie ſind im Gegentheil von aus der Freiheit importirten in nichts unterſchieden*; dagegen weiſt der größere Theil der jungen Weibchen zwar eine ſolche auf, aber auch nur in geringem Maß, wenigſtens bei den meinigen, die in dem tiefen Schwarz am Kopf düſterrothe Färbung zeigen, in der Hauptſache aber nach der Stammmutter ſchlagen, wie ebenſo der größte Theil der Männchen nach dem Stammvater. Danach ſcheint es alſo, daß bei dieſen Miſchlingszuchten die Männchen nach dem Vater, die Weibchen nach der Mutter vorwiegend ausfallen. Aber nicht weniger merkwürdig iſt, daß nicht nur bei den Männchen, ſondern auch den Weibchen reinraſſige Exemplare auftreten, und nicht allein dies, ſondern daß auch *beide* Amandinen-Arten in *beiden* Geſchlechtern *reinraſſig* vertreten ſind; denn von den 13 Jungen ſind 5 Männchen und 1 Weibchen reinraſſige mirabilis, 1 Männchen und 1 Weibchen reinraſſige Gouldae, 5 Weibchen ſind gemiſchte. Hiermit iſt wol bewieſen, daß auch die unter den importirten Vögeln vorkommenden, an Vorderkopf und Wangen ſchwarzrothgefärbten Exemplare Miſchlinge ſein müſſen, und faſt könnte man geneigt ſein, die beiden Gouldsamandinenarten nicht nur als nahe verwandt, ſondern vielleicht gar als nur in eine Art zuſammenfallend anzuſehen. Allein der Umſtand, daß eben auch Miſchlinge aus derartigen Züchtungen über Kreuz hervorgehen, ſpricht meiner Anſicht nach ſchon allein dafür, ſie als zwei ſelbſtſtändige gute Arten anſprechen zu ſollen, was ja auch fernerhin einerſeits die beſtändige Abweichung der Färbung des betreffenden Kopfgefieders bei zahlreichen importirten Exemplaren von beiden Geſchlechtern beweiſt, wie andererſeits die Thatſache, daß die Nachkommen, wenn reinraſſig gezüchtet worden, auch nur ſolchergeſtalt wieder ausfallen.

Hält man dieſer Annahme die erfahrungsmäßige Erkenntniß gegenüber, daß bei Kreuzungszuchten die jungen Baſtard-Männchen in Zeichnung und Färbung nicht nur dem männlichen Vogel von der Art der väterlichen Abſtammung, ſondern auch dem Männchen von der Art der mütterlichen Herkunft nachſchlagen, wie ich dies beſonders deutlich bei den in Nr. 1 und 2 v. J. geſchilderten Ringelaſtrildzebrafink-Miſchlingen nachweiſen konnte, ſo wird es erklärlich, weshalb gerade bei den ſich ſo naheſtehenden beiden Gouldsarten auch vereinzelt reinraſſige Exemplare der andern Art unter den Gouldsmiſchlingen vorkommen können, zumal der einzige Unterſchied bei den reinraſſigen eben nur in der verſchiedenen Kopffärbung beſteht.

Betreffs des Nachſchlagens der jungen weiblichen Baſtarde glaube ich daſſelbe, wie eben von den männlichen geſagt, vorausſetzen zu können, worin ich noch beſonders durch die hohe Wahrſcheinlichkeit beſtärkt werde, daß ſelbſt die gemiſchtgefärbt vorhandenen Baſtard-Weibchen ſich mit der Zeit in reinſchwarze, alſo in S. Gouldae bei meinem Fall, umwandeln werden, da, wie mir wenigſtens bei einigen bisher ſcheint, das ſchwache Roth am Kopf immer mehr ſchwindet, und zwar ohne dabei die erſt kürzlich neu erhaltenen Federchen zu wechſeln. Auf den gleichen Vorgang ſcheint nun auch die von Herrn J. Abrahams in London und von mir in Nr. 15 d. J. berührte Angabe zu beruhen, wonach ſich bei ihm junge importirte Goulds am Kopf zuerſt in ſchwarz und dann in roth, alſo zu mirabilis verfärbten; es waren dies eben vermuthlich Miſchlingsweibchen, deren Stammmutter die Mirabilisart geweſen. Ich werde natürlich nicht unterlaſſen, über dieſen intereſſanten Fall eventuell weitere Mittheilung zu machen.*) Sollte ſich thatſächlich in längerer oder kürzerer Zeit eine ſolche Umwandlung vollziehen, ſo *dürften die beiden Gouldsraſſen doch nur in eine Art zuſammenfallen*.**)

---

*) Wir bitten ſehr darum. D. L.

**) Wenn ſich dies durch Züchtung feſtſtellen ließe, ſo wäre es eine, auch für die Wiſſenſchaft neue, hochintereſſante Thatſache. Wir bitten alle erfahrenen Züchter um Kundgabe ihrer Meinung hierüber. D. L.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Der weißſtirnige Amazonenpapagei (Psittacus albifrons, *Sparm.*).

Nächſt der Gelbnackenamazone iſt die weißſtirnige der bekannteſte Papagei des Landes. Das Muſeum nennt ihn Chrysotis albifrons und widmet ihm nachfolgende Worte der Erklärung: „Dieſer Papagei iſt hinlänglich bekannt unter dem Namen Cotorra, er iſt von hübſcher apfelgrüner Färbung; der Schwanz

[illegible]

[illegible]

[illegible]

grünen aufzeigt, außerdem hat der Vogel ein klares und ein geflecktes Auge, das letztere nicht krank oder durch Krankheit hervorgerufen, ſondern es iſt, wie man in der Taubenzucht ſich auszudrücken pflegt, ein Schönheitsfehler.

Im Freileben iſt die Brillenamazone übereinſtimmend mit der Gelbnackenamazone, auch ſie treibt ſich nach beendeter Niſtzeit in kleinen Trupps umher. Die beſten Futterplätze ſuchend, plündert ſie vielfach die Anpflanzungen von Mais und Bananen, bei welcher Gelegenheit ſie oft geſchoſſen wird. Die im Handel vorkommenden Vögel ſind faſt durchweg aus dem Neſt genommen und aufgefüttert.

In der Gefangenſchaft iſt der Papagei hart und ausdauernd und mit Mais, Bananen und Weißbrot leicht zu erhalten. Im Handel iſt er das ganze Jahr hindurch anzutreffen und der Preis bleibt für einen Nichtſprecher 4 bis 5 Mark. Die Weißſtirnamazone lernt leicht ſprechen und ich finde, daß ſie vornehmlich Thierlaute nachahmen kann. Ich habe einige Vögel dieſer Art, unter denen es ein Männchen beſonders weit gebracht hat. Mit täuſchender Aehnlichkeit wiehert es wie ein Pferd, ſchreit wie ein Maulthier, kräht wie ein Hahn, und am vortrefflichſten ahmt es den Hennenruf „gack gack gack-gri“ nach. Dieſer Vogel iſt mit einem Weibchen verpart, läuft im Hof frei herum und hat ſich in aufgeſchichtetem Stockholz eine Höhlung, gewiſſermaßen ein Neſt ausgeſucht. Ich habe dieſe Gelegenheit thunlichſt unterſtützt und ſo eingerichtet, daß die Vögel niſten könnten. Doch ſcheint mir das Weibchen, welches ich vor Jahresfriſt als Neſtvogel erhielt, noch zu jung zu ſein, denn es ſchenkt vorläufig den Liebeswerbungen noch wenig Aufmerkſamkeit. Den ganzen Tag lockt das Männchen zu Neſt und bringt dabei murkſende Töne, wie junge Hunde zu thun pflegen, hervor. Befinden ſich die beiden Vögel etwas weiter von einander entfernt, ſo lockt das Männchen mit einem kurzen ſchrillen Pfiff. Im übrigen iſt das Geſchrei der Vögel das bei den Jungen bereits erwähnte „trak trak“. Die Männchen bringen den Weibchen ſtets große Aufmerkſamkeit entgegen, verfolgen ſie auf Schritt und Tritt und vollführen des öfteren ein ganz intereſſantes Liebesſpiel. Dabei ſpreizen ſie die Schwanzfedern, drücken den Kopf tief nach unten, ſodaß er bald den Boden berührt, ſträuben Kopf- und Halsfedern, lüften in kurzen Zuckungen die Flügel und laſſen ein eigenthümliches Knurren, wie trrrk trrrk. hören. Ich ſollte meinen, die weißſtirnige Amazone müßte bei richtiger Auswahl der Pare in der Gefangenſchaft leicht zu züchten ſein.

Der weißſtirnige Amazonenpapagei wird ſehr zahm und zutraulich, verbindet alle guten Eigenſchaften, welche man von einem Papagei im allgemeinen zu fordern pflegt. Er iſt außerdem hübſch und intereſſant im Gefieder, ſodaß ich ihm wegen all dieſer Vorzüge eine größere und regelmäßigere Einführung nach Deutſchland wünſchte.

(Fortſetzung folgt.)

Unſere Würger, hauptſächlich in ihrer Bedeutung als Käfigvögel.

Von Fr. Anzinger.

(Schluß).

Ueber die Art und Weiſe einer dem Weſen und Betragen der Würger angemeſſenen Eingewöhnung und weitern Verpflegung ſind die Anſichten noch ziemlich verſchieden, ebenſo auch über ihre leichtere oder ſchwierigere Zähmbarkeit und ihre Widerſtandsfähigkeit für ein längeres Käfigleben. Der eine Liebhaber will ſie, und zwar nach Anſicht der meiſten Pfleger, als weichliche Vögel betrachtet, der andere hingegen in der oberflächlichſten Weiſe wie einen gewöhnlichen Weichfreſſer behandelt wiſſen; dieſer klagt darüber, daß ſein Friſchfang ein unzähmbarer Racker ſei, und jener lobt ſeinen Neuling als einen liebenswürdigen und zuthunlichen Stubenvogel; hier wird über die Hinfälligkeit, dort über die erfreuliche Ausdauer dieſer Vögel im Käfig geſprochen.

Die Deutung ſolcher Gegenſätze iſt meines Erachtens nicht ſchwer. In erſter Linie kommt das Alter des Vogels und je nach ſeinem Alter die dem Raubvogeltypus anhaftende Eigenart in Betracht; in zweiter Linie iſt der Umſtand maßgebend, in welche Hände der Friſchfang geräth, d. h. wie er von vornherein gefüttert und nebenbei behandelt wird. Je jünger ein Würger in Gefangenſchaft geräth, deſto leichter wird er ſich dem Käfigleben anpaſſen und um ſo länger wird er in demſelben ausdauern, auch wenn er weniger ſorgfältig behandelt würde. Das Umgekehrte iſt bei alten Friſchfängen der Fall, und es gelingt oft den raffinirteſten Mitteln eines erfahrenen Pflegers nicht, die Wildheit eines ſolchen Vogels zu mildern und ihn zum Singen zu bringen. Iſt ſolch ein Fall bei ſonſt ſachgemäßer Pflege, wie ich ſie unten erklären werde, zu konſtatiren, dann iſt auch jede ſpätere Mühe vergeblich und das Einfachſte iſt dann, den Vogel zu beſeitigen.

Jeder Würgerfriſchfang, ob alt oder jung in Gefangenſchaft gerathen, zeigt ſich von vornherein als ein ſtürmiſcher, unbändiger, mehr ſtörriſcher als ſcheuer Vogel. Es iſt daher unbedingt nothwendig, denſelben in einem mit lichtem Stoff gut verhüllten Käfig unterzubringen und in einem möglichſt ruhigen Wohnraum zu plaziren. Die Form des in Verwendung kommenden Bauers hat der Type eines großen Nachtigalenkäfigs zu entſprechen, welcher mindeſtens 26 bis 30 cm tief ſein ſoll, um dem ziemlich langſchwänzigen Vogel möglichſt freie Bewegung zu geſtatten. Für den Raubwürger eignet ſich am beſten ein Droſſelkäfig. Bei einer Einfütterungskoſt, welche der Nahrung im Freien (ſiehe oben) entſpricht, kann es in den ſeltenſten Fällen bleiben, bzl. zu einer ſolchen kommen, denn wann und wo immer ſolch „lebendes Futter“ hernehmen? Dagegen beſitzen wir in unſerm Mehlwurm das vortrefflichſte Mittel, den Vogel zum Freſſen zu reizen und gleichzeitig damit, wenigſtens in den erſten Tagen, ein vollſtändiges Wohlbefinden deſſelben zu erzielen, vorausgeſetzt, daß lebendes Futter, ſei es welches immer, überhaupt angenommen wird. Wird nämlich der Würger gleich nach ſeiner Ankunft gefangen, ſo geht er ohne Weiteres an dieſes Futter, denn er kann der dringenden Mahnung ſeines bisher ſchlecht geſättigten Magens nicht widerſtehen; wird er dagegen ſpäter, vielleicht gar erſt nach ſchon erfolgter Parung gekäfigt, dann geſtaltet ſich die Sache viel kritiſcher. Der Würger frißt dann entweder nur ſo viel, um den peinigenden Hunger zu ſtillen, tobt dabei unausgeſetzt und kommt nicht zum Singen, oder er nimmt gar keine Nahrung zu ſich, ſitzt, ſtill vor ſich hinbrütend, im Käfig und geht nach einigen Tagen zugrunde. Bei einem ſolchen Vogel, an deſſen Erhaltung mir beſonders gelegen war, verſuchte ich es mit dem Stopfen, doch meine Mühe und meine von den ſcharfen Biſſen des Vogels blutrünſtig gewordenen Finger waren umſonſt geweſen. Ich hatte erfahren, daß ſich ein größerer, wirklicher Raubvogel dieſe Prozedur eher gefallen läßt und dabei leichter am Leben erhalten werden kann als ſolch ein Trotzkopf.

Zehrt der Würger die vorerſt auf den Schubladenſand geworfenen Mehlwürmer ſchon nach einigen Stunden ſeiner Käfigung auf, was bei den meiſten von mir ſelbſt gefangenen Vögeln der Fall war, ſo iſt für die erſte Zeit gewonnen. Der Mehlwurm muß dann aber auch in reichlicher Menge gefüttert werden und ich betone es nachdrücklich, daß 60 bis 80 große Mehlwürmer am Tag für die kleineren Würger eine Kleinigkeit ſind. Der Raubwürger verlangt noch mehr. Mit dieſer Tagesration fährt man fort zu füttern, bis der Vogel vollkommen geſättigt iſt, was ſich durch Abnahme der Freßgier und den Beginn des Geſangs kundgibt. Dies tritt gewöhnlich vier bis ſechs Tage nach der Käfigung, oft ſpäter, ſelten früher ein. Ein Dorndreher-Friſchfang begann bei mir ſchon am zweiten Tage zu ſingen, benahm ſich überhaupt ſchon von vornherein ſehr verſtändig, brachte aber nichts als einige Kopien aus dem minderwerthigen Geſang verſchiedener Finkenvögel und wurde aus dieſem Grunde abgeſchafft. Läßt der Würger einmal ſeine halblauten Weiſen hören, ſo kann man mit der Fütterung von Miſchkoſt beginnen. Dieſelbe beſteht aus ſüßem, möglichſt trockenem (nicht ſchmierigem) Käſequark, geriebener Möre oder angefeuchtetem Karottengries, ziemlich viel zu Pulver zermahlenem Hanf und wenig Gries von altbackener Semmel. Ungefähr ein Drittel von den früher lebend gereichten Mehlwürmern wird klein zerſchnitten und mit den Beſtandtheilen gut vermengt. Empfehlenswerther als der Semmelgries iſt engliſch geſottenes Rinderherz, welches bei ſtarker Herdhitze ſcharf getrocknet und dann ſehr klein gerieben wird. An Stelle der Mehlwurmtheile treten ſpäter friſche Ameiſenpuppen. Während der Gewittermonate Juni, Juli und Auguſt wird ſüßer Quark trotz Fürſorge (Halten in friſchem mehrmals zu wechſelndem Quellwaſſer) ſauer und ſoll dann nicht mehr verfüttert werden. Als Erſatz hierfür kommt rohes, beſtes Muskelfleiſch von Kalb oder Rind in Verwendung. Um einerſeits die Fleiſchtheilchen mundgerechter zu machen und andererſeits dem Magen des Vogels kalkhaltige Stoffe zuzuführen, ließ ich Eiſchalen auf dem Küchenherd ſcharf trocknen, zerrieb ſie dann zu Pulver und beſtäubte damit das zu verfütternde Fleiſch. In dieſem Fall kann das getrocknete Rindsherz ſelbſtverſtändlich wegbleiben. Bei der Beigabe des Hanfs blieb ich immer, weil derſelbe ſowol ſehr nahrhaft iſt, als auch die beim Würger nothwendige Gewöllbildung fördert.

Der Geſang des Frühjahrswildfangs dauert gewöhnlich bis Mitte Juli. Bald darauf beginnt auch die Sommermauſer, welche gewöhnlich ohne Hinderniß verläuft. Nach dem Verſtummen des Geſangs decke man den Käfig ab. Zeigt ſich der Vogel noch ſo wild und ſtürmiſch wie zu Beginn ſeiner Käfigung und ändert er dieſes Benehmen auch in den nächſten Tagen nicht, ſo gibt es nach meiner Erfahrung ein gutes Zwangsmittel, um denſelben binnen kurzer Zeit kirre zu machen. Der Käfig mit ſeinem Inſaſſen wird an einen Platz des Zimmers auf den Fußboden geſtellt, wo man viel verkehrt. Hier beſchäftige man ſich mit dem Vogel, außer der Abwartung, gar nicht, laſſe ihn vollkommen unbehelligt, kurz, laſſe ſeine Gegenwart ſo unbeachtet, als wenn er gar nicht exiſtirte. Oft ſchon nach einigen Tagen ſaß bei mir ſolch ein Wildfang ſo ruhig und furchtlos im Käfig, wie jeder andre eingewöhnte Sänger.

Zur Winterszeit, namentlich aber im Vorfrühling, wo ſehr häufige Temperaturſchwankungen eintreten und zudem auch der Würger in die Frühjahrsmauſer kommt, iſt für einen zugfreien, warmen, möglichſt ſonnigen Standort zu ſorgen. Regelmäßige und zeitgerechte Fütterung, ausreichende Badegelegenheit und ſtete Reinlichkeit des Käfigs ſind überdies Momente, welche bei den Würgerarten ſtets im Auge zu behalten ſind. Hinſichtlich des letzteren Punktes iſt, weil der Würger als ſtarker Freſſer viel miſtet, Torfmull als Schubladenbelag zu empfehlen. Die von manchen Vogelpflegern älteren Datums anempfohlene Ausſtattung des Würgerkäfigs mit Dornruthen oder mit Querhölzern, aus denen eingeſchlagene Drahtſtifte hervorragen, um der Eigenart des Würgers, lebende Beute aufſpießen zu können, entgegenzukommen, halte ich für ein ſehr fragliches Hilfsmittel, da es in vielen Fällen, weil nicht richtig angewendet, dem Vogel eher ſchaden als nützen kann.

Der Geſang von ſolchen Frühjahrs-Friſchfängen beginnt, wenn ſie gut durchwintert worden ſind, gewöhnlich Ende Januar, bei älteren Vögeln meiſt nach Beendigung der Frühjahrsmauſer, bei im Herbſt gefangenen jungen Vögeln aber ſchon vor der Winterſonnenwende. Zur Beförderung der Frühjahrsmauſer empfiehlt ein hieſiger Liebhaber reines, wenn möglich ſelbſt bereitetes Knochenmehl. Friſche Rinderknochen, am beſten dicke Gelenkſtücke werden in einem Glühofen gebrannt und dann zu Pulver gerieben. Von demſelben ſoll täglich eine Meſſerſpitze voll unter die Würgerkoſt gemiſcht werden. Vor Allem iſt, um die Mauſer zu regeln, dafür zu ſorgen, daß der Würger nicht zu fett werde. Dies tritt bei manchen Vögeln ſchon oft im Oktober ein. In dieſem Fall iſt der Quark, bzl. das rohe Fleiſch aus dem Futter wegzulaſſen und dafür das nach oben beſchriebener Methode zubereitete Rindsherz zu füttern.

Ob und wie ſich ganz junge, aus dem Neſt geraubte Würger aufbringen und unter hervorragenden

Geſangslehrern in der Gefangenſchaft zu guten Spöttern heranbilden laſſen, kann ich aus eigenen Erfahrungen nicht beſtätigen. C. G. Friedrich lobt ſolch aufgezogene Vögel ganz beſonders; andere urtheilen wieder abfällig über dieſelben. Mehrfache, alſo ausreichend ſich deckende Erfahrungen liegen indeß, wie es ſcheint, bis heute nicht vor. Ein ſicheres Ergebniß dürfte mit jungen bereits ſelbſtſtändigen, aber noch das Jugendkleid tragenden Vögeln erzielt werden, was auch durch folgendes Beiſpiel eine Beſtätigung findet.

In den erſten Tagen des Monats Oktober 1896, alſo zu einer auffallend ſpäten Zeit, wurde mir ein Dorndreher im Jugendkleid übermittelt, der in einem offenſtehenden Güterwagen auf dem hieſigen Bahnhof vor der Verfolgung eines Sperbers Schutz geſucht hatte und dort von einem Wagenputzer ergriffen wurde. Da die Unterſeite des Vogels ein ziemlich reines Weiß zeigte und der noch graubraune Backenſtreif ſehr ſtark entwickelt war, ſo hoffte ich, ein Männchen erhalten zu haben und käfigte daſſelbe. Binnen Kurzem legte der Vogel ſeine urſprüngliche Wildheit ab und nach Ablauf von etwa 3 Wochen begann er halblaut zu ſingen, d. h. grasmückenartig zu wälſchen. Dieſer Geſang, in welchem ſich noch keine Entlehnung aus fremden Vogelliedern wahrnehmen ließ, wurde bis zum Beginn des kommenden Frühjahrs beibehalten. Nun erſt begann er zu kopiren und zwar ſowol aus dem Geſang meiner Stubenvögel, als auch der in der Nähe im Freien vorhanden geweſenen. Er imitirte das Schilpen des Hausſperlings, den Lockton vom Gartenrothſchwanz und Buchfink, von der Kohlmeiſe und vom Harzerroller, brachte eine Rolltour des Letzteren, den kurzen Geſang des Erlenzeiſig, zwei hübſche Klangbilder aus dem Feldlerchenlied, zwei Strofen aus dem Nachtigalenſchlag, eine längere Weiſe aus dem Lied der Gartengrasmücke, das hübſche Zwitſchern der Rauchſchwalbe, das Girren eines Haustäubers, das Tuten des Wendehalſes und den Schrei des Mäuſebuſſard. Von meinen beiden Rothkehlchen ſowie von den vor den Fenſtern meiner Wohnung fleißig ſchlagenden Buchfinken nahm er ſonderbarerweiſe nichts an.

Er ſetzte ſeinen Geſang auch während der Frühjahrsmauſer fort. Dieſelbe war kein eigentlicher Federwechſel (es wurden nur einige abgeſtoßene Steuerfedern erſetzt), vielmehr eine gänzliche Umfärbung des Gefieders. Der Verlauf derſelben war intereſſant zu verfolgen. Sie begann am Kopf und dehnte ſich von da über den übrigen Körper aus. Nach Verlauf von vier Wochen ſtand der Vogel in ſeinem prächtigen Hochzeitskleide vor mir. Es war aus dieſem Dorndreher ein zwar etwas zudringlicher und eigenſinniger, im Ganzen genommen aber ein liebenswürdiger und dabei ſangesfreudiger Stubenvogel geworden. Es bedurfte daher eines mehrmaligen Anlaufs von Seite eines Kollegen, bis er den Vogel eroberte.

Plauderei für Rothkehlchen-Liebhaber und -Liebhaberinnen.

Von F. Schlag.

„Jedes Thierchen hat ja ſein Pläſirchen!“ Warum ſollte es der Menſch, als Herr der Schöpfung, nicht auch haben? Von den hundert- und tauſendartigen Pläſirchen der Menſchen greife ich für diesmal nur die Vogelliebhaberei heraus. Der Eine liebt die Samen- oder Körnerfreſſer (das ſind die Finkenvögel), der Andere dagegen die Inſektenvögel (die Weichfutterfreſſer). Ein Dritter vermag nur den ausländiſchen Prachtfinken, Papageienarten und anderen ausländiſchen Weichfutterfreſſern Geſchmack abzugewinnen, obgleich wieder ein Anderer faſt gar kein Intereſſe für letztere hat, weil dieſe trotz Farbenſchiller und Schönheit, einige Ausnahmen abgerechnet, meiſt gar nicht oder doch nur dürftig ſingen; häufig aber auch aus klimatiſchen und Futterverhältniſſen frühzeitig eingehen. Ein Vierter mag nur Vogelgeſang im Freien hören und genießen, und bekämpft uns Vogel-Pfleger und -Liebhaber nicht nur, ſondern bezeichnet uns wol gar als herzlos, trotzdem ſich unſere Pfleglinge ſo wohl in unſerer Pflege fühlen, daß ſie aus vollſter Kehle jubiliren. Dies thun ſie doch ſicherlich nicht aus Deſperation oder Lebensüberdruß und Lebensmüdigkeit. Was nun die einzelnen Arten deutſcher Vögel anbetrifft, ſo liebt abſonderlich der Thüringer Stiglitze, Zeiſige, Hänflinge, Kreuzſchnäbel, Dompfaffen u. a. Ein Anderer findet ſein höchſtes Vergnügen an einer oder zwei Nachtigalen, Sproſſern, Grasmücken, Rothkehlchen u. a. Schreiber dieſer Zeilen verachtet beide Vogelgattungen, Samen- wie Weichfutter-Vögel, nicht, und ſucht vor allem jedes Jahr auf's neue namentlich Dompfaffen und Rothkehlchen nach ihren Talenten und Eigenheiten zu ſtudiren. Ausländiſche kleine Prachtfinken hatte ich früher auch ſchon wiederholt in Pflege und Beobachtung, desgleichen einen grauen Jako. Allein ich hatte kein Glück damit, weil mir beide Arten nicht ſtandhielten, vielmehr bald eingingen. Aus dieſem Grund habe ich letztere ganz fallen laſſen! Da ich fürchte, zu weit von meinem geſtellten Thema abzuirren, ſo will ich nunmehr mit meiner Rothkehlchen-Plauderei beginnen. Unter unſeren Thüringer Inſektenvögeln ſind mir eben keine lieber und angenehmer als Rothkehlchen. Grasmücken ſchmettern mir zu ſehr, gehen häufig bei beſter Wartung und Pflege im Februar ein und bieten mir nicht den gewünſchten Erſatz (von Mitte März bis Mitte Juni), wenn meine gelernten Dompfaffen veräußert ſind. Das Rothkehlchen aber dauert in der Gefangenſchaft beſſer aus als Grasmücken u. drgl. Nachtigalen ſind hier nur zur Zugzeit — Frühling und Herbſt —, doch nur ſchwer und ſelten käuflich. Auch läßt das Rothkehlchen zumeiſt während und nach der Mauſer einen prächtigen, melancholiſchen Geſang mit mannigfach abwechſelnden Strofen hören, iſt fleißig, zutraulich und höchſt liebenswürdig und dankbar gegen ſeinen Pfleger. Dazu kommt noch das ſchöne elaſtiſche Schwanzwippen und das degenartige Flügelſchlagen und Tragen. Will man aber wirkliche Freude an Rothkehlchen haben, ſo darf man nicht alte Frühjahrs- oder Herbſt-Wildfänge anſchaffen, da dieſe in der Regel ſcheu ſind und bleiben, ſchwer an's Futter zu bringen und faule Schläger (ſog. Trotzer) ſind. Mir ſind die allerliebſten ganz graue, noch im Jugenkleid ſteckende, vier bis ſechs Wochen alte Rothkehlchen, welche bei Mehlwürmern, Trauben-Hollunderberen oder bei der Waldtränke gefangen, und äußerſt zahm und liebenswürdig werden, d. h. wenn ſie erſt an Miſchfutter gewöhnt ſind. Derartige Vögel ſind ſchon Mitte bis Ende Juli zu haben, und ich beſitze augenblicklich zwei Stück derſelben. Beim Fangen iſt die Hauptſache, daß die zarten Thierchen ſofort aus dem Wald vom Vogelſteller in einem luſtigen Gaze-Säckchen nach Haus getragen und ſchnell geräumig eingegittert werden. Läuft erſterer jedoch erſt noch zwei bis drei Stunden im Wald oder Wirtshäuſern herum und kommt erſt Abends nach Haus, ſo ſind die Thierchen ſchon ganz marode, hungrig und durſtig, und gehen in der Regel andern Tags ein, weil ſie vor Mattigkeit kein Futter (nicht einmal Mehlwürmer) mehr annehmen. Höchſtens eine bis eineinehalbe Stunde nach dem Fang muß der zarte Vogel in einen größern Käfig eingeworfen und ihm zugleich drei bis vier totgedrückte Mehlwürmer mit auf den Käfigboden, nicht in's Freßgeſchirr, gelegt werden. Nimmt der Neuling noch deſſelben Abends, längſtens aber andern Morgens die eingeworfenen Mehlwürmer an, dann iſt er ſchon halb gerathen. Badet erſt der junge Vogel das erſte Mal, dann iſt er vollſtändig futterfeſt und eingewöhnt. Trotzt er aber vor Scheu und Müdigkeit zwei Tage lang, ehe er Mehlwürmer und Futter annimmt, dann jage man ihn ſo ſchleunig wie möglich in's Freie, ſonſt geht er ſicherlich über kurz oder lang ein.

Eingewöhnte junge Rothkehlchen fangen ſchon den dritten oder vierten Tag an, im Käfig ihre Sangesweiſen leiſe zu üben, andere dagegen trotzen acht bis vierzehn Tage lang. Je größer die Sonnen-Hitze, deſto ſtummer und träger die jungen Vögel. Weibchen ſingen nach genannter Zeit gar nicht und werden wieder in's Freie geſetzt. Es iſt aber gar nicht ſo leicht, dieſe jungen Thierchen an den Futternapf zu gewöhnen. An's Trinkwaſſer in der Unterhälfte der ſog. Drehſcheibe gehen dieſe leichter und raſcher. Wenn ſelbige die toten Mehlwürmer vom Käfigboden genommen und gefreſſen haben, darf man das Futternäpſchen nicht ſogleich in die Drehſcheibe ſetzen, ſondern vielmehr noch einen bis zwei Tage auf den Käfigboden. Das Univerſalfutter, dem friſche oder getrocknete Ameiſeneier zugemiſcht werden, wird mit Waſſer breiartig angefeuchtet (Milch ſäuert im Sommer zu leicht) und umgerührt.. Dann werden drei bis vier Mehlwürmer totgedrückt, jeder in zwei oder drei Stückchen (je nach Größe) zerſchnitten und dieſe mit unter das Futter gemiſcht, ſo daß die Stückchen ſenkrecht etwas nach oben herausſpitzen, damit ſie leicht geſehen werden. Haben die niedlichen Grauröcke erſt einige Stückchen, an denen zugleich immer etwas Univerſalfutter haftet, herausgeholt, dann hat man ganz und gar gewonnen, und nach 24 bis 36 Stunden freſſen ſich die Kerlchen ſatt und fangen ſchon leiſe an zu „ziſpeln“, d. h. wenn es Männchen ſind. Bei Mehlwürmer-Mangel zupſt man einige rothe Hollunderberen (ſog. Traubenhollunder) ab und rührt dieſe mit unter das Hauptfutter, woraus ſie nach und nach herausgeholt werden. Von Tag zu Tag werden die Vögel dann zutraulicher und liebenswürdiger. Ende Juni bis Mitte Auguſt kann man ganz graue Rothkehlchen beziehen. Später aber, gegen Ende September, ſind dieſe ſchon halb oder ganz roth, aber regelrecht auch ſcheuer als die ganz jugendlichen grauen. Beim Frühlingszug gefangene habe ich auch ſchon beſeſſen, aber ihr Geſang ertönte nicht ſo fleißig und kräftig als in der Natur.

Rothkehlchen, welche eine ſog. „Diskantpfeife“ haben (d. h. in zu hoher Tonlage pfeifen), mag ich nicht leiden; vielmehr müſſen dieſe tiefe Baßrollen, ähnlich Nachtigal-Schlägen, hören laſſen, ſo daß man gar nicht weiß, was man eigentlich für einen Vogel vor ſich hat, wenn man ihn nicht ſieht. Dergleichen Exemplare fallen aber höchſtens zehn Prozent aus, obwol Mittel-Tonlage auch nicht zu verachten iſt. Läßt mich ein durchwintertes Rothkehlchen betreffs ſeines Geſanges unbefriedigt, ſo ſetze ich es im Frühjahr wieder in's Freie, und ſchaffe mir einen Wildfang oder einen bis zwei ſommergraue Junge an. Somit für heute genug meiner Rothkehlchen-Plauderei.

Zum Wanderzug des Roſenſtars

bringt das „Ornithologiſche Jahrbuch“, Organ für das palaearktiſche Faunengebiet, herausgegeben von Viktor, Ritter von Tſchuſi zu Schmidhoffen, nachſtehende zwei intereſſante Mittheilungen:

So berichtet E. von Hetzendorf aus Torna in Oberungarn unterm 2. Juni d. J.: „Am 25. Mai 1899 beobachtete ich in einer ſumpfigen Niederung in Torna einen Flug von 12 Roſenſtaren. In hieſiger Gegend wurde die Art noch nie geſehen und auch mir kam während einer mehr denn dreißigjährigen Beobachtungszeit in Oeſterreich-Ungarn niemals ein Roſenſtar zu Geſicht.“

Einen andern Fall theilt V. Roberti auf Rittergut Baumgarten in Oberſchleſien mit: „Etwa am 8. Mai ſah meine Frau vom Fenſter aus auf einer Linde im Park eine Anzahl auffallend gefärbter Vögel, die ſie eine zeitlang mit dem Glaſe beobachtete, ohne in ihnen eine bekannte Art erkennen zu können. Später berichtete ſie mir davon, vermochte jedoch keine ſo genaue Beſchreibung zu geben, daß ich den Vogel hätte feſtſtellen können. Am 27. genannten Monats vormittags bemerkte auch ich, wenn ich recht gezählt habe, ſechs Stück, die unter unſeren Staren umherliefen. Bei meiner Annäherung flogen ſie auf und davon. Um ſo größer war meine Freude, als ich nachmittags vier bis fünf dieſer Vögel längere Zeit durch das Glas beobachten konnte, die ſich mit Zuhilfenahme von Brehm's „Thierleben“ als Roſenſtare erwieſen. Gegen Abend trat heftiger Regen ein und die Vögel verſchwanden. Seitdem habe ich ſie nicht wieder geſehen und auf Anfragen nur von einem meiner Nachbarn erfahren, daß er um die gleiche Zeit auf einem kleinen Alleebaum einen Roſenſtar beobachtet habe.“

Zum Vogelſchutz.

Der Bund der öſterreichiſchen Vogelfreunde richtet an alle nach Italien Reiſenden die wohlbegründete Mahnung, ſich des Genuſſes von aus kleinen Vögeln (uccelli) bereiteten Gerichten zu enthalten, da dieſe Speiſen oft gifthaltig ſind. In dieſem Frühjahr ſind wiederholt Hotel- und Gaſthausbeſucher nach dem Verzehren von Polenta con uccelli oder Risotto con uccelli in Rom, Neapel und Genua von heftigem Unwohlſein befallen worden. Die Behörden fanden es für überflüſſig, dieſen verdächtigen Erkrankungen ihr Augenmerk zuzuwenden und nach ihrem Grunde zu forſchen. Nun hat ſich aber kürzlich in einer Oſteria in Neapel ein Fall von Maſſenvergiftung ereignet, der Licht in die Sache brachte. Ein deutſcher Kaufmann mit Frau und drei Kindern, ſowie acht andere Gäſte der Oſteria wurden nach dem Eſſen von furchtbaren Leibſchmerzen befallen. Ein im Reſtaurant zufällig anweſender Arzt nahm die Erkrankten in Behandlung und konſtatirte bei den dreizehn Perſonen ſchwere Vergiftung durch Arſenikſublimat als Krankheitsurſache. Nach erſtatteter Anzeige konfiszirte die Polizei in der in der Via Roma gia Toledo gelegenen Oſteria die noch vorhandenen Speiſen und Speiſenüberreſte. Die Unterſuchung der Lebensmittel ergab, daß die Uccellini, die kleinen Vögel, ganz bedeutende Quantitäten von Arſenikſublimat enthielten. Eine Nachſchau bei den Vogel- und Geflügelhändlern der Stadt ergab, daß auch die dort vorhandenen Vorräthe an kleinen Vögeln Gift enthielten. Die Unterſuchung führte nun zu folgendem Reſultat: Die Vogelhändler in Italien, die die befiederten Sänger zu Tauſenden fangen, ſtreifen den ſchön befiederten Vögeln die Bälge ab, um ſie an Modewarenhändler zu verkaufen. Damit ſie ſich halten, werden die Bälge mit Arſenikſublimat, und zwar gleich an Ort und Stelle, präparirt. Die Vogelfänger reinigen ſich nachher nicht die Hände, ſondern manipuliren gleich mit den zu Eßzwecken gefangenen Vögeln herum, die durch das an den Fingern haftende Arſenik infizirt werden. Der Bund öſterreichiſcher Vogelfreunde warnt daher alle Italienreiſenden vor dem Genuſſe aller Nationalſpeiſen, die Uccellini enthalten.

Briefliche Mittheilungen.

... Bezüglich der Graupapageien die Nachricht, daß zwei Junge ausgekommen ſind und ein Ei unbefruchtet war. Eins der Jungen iſt vom Männchen totgebiſſen, das andre gedeiht vortrefflich, iſt jetzt über vier Wochen alt und ſchon faſt ganz befiedert. Das alte Par macht bereits Anſtalten zu einer weiteren Brut. Ich werde dann vorſichtiger ſein und das alte Männchen nach dem Ausſchlüpfen der Jungen einige Tage in eine beſondere Abtheilung des Niſtraumes ſetzen, wie ich auch diesmal gethan habe; leider erſt, nachdem das eine Thier verloren war.

Eine genauere Darſtellung der Zucht werde ich in nächſter Zeit Ihnen zuſchicken.*) **Lotze.**

... Daß die erſte Brut der weißen Stelze ihren Eltern bei Fütterung der zweiten Brut behülflich iſt, habe ich in dieſen Tagen wieder deutlich durch den Feldſtecher beobachten können. Kollege Huskamp in Crommert behauptete geſtern ein Gleiches von den Rauchſchwalben. **Plümpe, Lehrer.**

... Von der Daube, 7000 Fuß über dem Meer, ſende ich Ihnen herzlichen Gruß. Ich fand hier **Alpenlerchen** und **Brachpieper**, letztere mit Jungen, alſo hier niſtend, ebenſo eine **Gebirgsſtelze** (Weibchen). Heute geht's noch nach dem Faulhorn. Allen Freunden herzlichen Gruß!

Karl Kullmann.

---

*) Herzlichen Dank im Voraus. D. L.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Otto Uhlig: 1. Die genannten Vögel können im ungeheizten Zimmer überwintert werden. Meinen Sie mit der „Spottdroſſel" die nordamerikaniſche gemeine? Dieſe muß im geheizten Zimmer im Winter gehalten werden. 2. Ich empfehle Ihnen das Geſäme der Gänſediſteln, des Löwenzahns, Wegerichs, Mohns, Leins, Rübſen, Habichtkrautes, der Kletten, Wegwarten, vieler Flockenblumen, auch Erlen- und Birkenſamen. 3. Dieſe Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Wenden Sie ſich doch an die Firma ſelbſt. 4. Meiner Anſicht nach ſind die Läuſe durch die Kreuzſchnäbel in Ihre Käfige eingeſchleppt worden. 5. Entziehen Sie der Mehlwurmhecke, nachdem Sie die Käfer herausgefangen haben, was am beſten geſchieht, indem man ein Glas mit wenig geriebnen Mören ſo in den Kaſten ſtellt, daß es genau am Rand der Füllung ſteht, für einige Zeit, ungefähr ſechs Wochen lang, alle Feuchtigkeit. Die Milben gehen dann zu Grunde, während die Mehlwürmer die Trockenheit vertragen können. Neuerdings hat man auch die Erfahrung gemacht, daß getrocknete, mit den Fingern zerriebene Blätter des Königs-Mottenbaumes in die Hecke gelegt, das Ungeziefer vertreiben. Wenige Blätter ſollen ſchon genügen. 6. Nur das Dompfaffmännchen hat die ſchöne rothe Bruſt; das Weibchen iſt auf der Bruſt grau, mit röthlichem Schimmer. Die „rothen Dompfaffen" ſind alſo ſtets Männchen. Unter den ſog. grauen Vögeln kann man dagegen auch Männchen verſtehen, denn dieſe verlieren in der Gefangenſchaft häufig die rothe Färbung der Bruſt und erſcheinen dann unſcheinbar röthlichgrau. In der Freiheit hingegen iſt dies nie der Fall, ſondern Männchen und Weibchen ſind ſcharf zu unterſcheiden.

Herrn M. Glaubitz: Ihren jungen Schopfwachteln war das bisher gegebene Futter nicht bekommen. Füttern Sie ſie nur genau nach den Angaben, die ich in Nr. 28 gemacht habe. Andere Rathſchläge, als die ſchon ertheilten, kann ich Ihnen nicht geben. Nur möchte ich Sie noch darauf aufmerkſam machen, daß die jungen Wachteln vor den ſengenden Sonnenſtrahlen zu hüten ſind.

Herrn F. M. in B: 1. Verſuchen Sie doch einmal die Aufzucht der Grasmücken nach den Vorſchriften des Herrn Reuter in Nr. 20 d. J.; die bisherige Fütterung war zu einförmig. Dem Dampfbad iſt der Vogel ungefähr eine Viertelſtunde lang auszuſetzen.

Briefwechſel.

Herrn A. Lindner: Beſten Dank.

Zu unſerm Bilde.

Der **Feldſperling** (Fringilla montana, *L.*) niſtet eigentlich nur ſelten unter dem Hausdach, wie es hier unſer Bild zeigt Denn ſein Aufenthalt ſind Laubwälder in der Nähe von Feld und Wieſen, Weidenpflanzungen und Obſtgärten, und in Dörfer und Städte kommt er nur bei großer Wintersnoth. Baumhöhlen, beſonders in Eichen, Kopfweiden, Apfel- und Birnbäumen ſind ſeine bevorzugten Niſtplätze. Zuweilen findet man ſein Neſt auch in Felsſpalten und Uferhöhlen, oft auch in Holzklaftern im Wald. Gern wählt er auch Miſtelbüſche, jenes bekannte hübſche Schmarotzergewächs. Gelegentlich vertreibt er andere Vögel, hauptſächlich Meiſen, aus ihren Niſthöhlen. Eine merkwürdige Vorliebe hat dieſer kecke Spatz für die großen Horſte der Raubvögel, der Geier, Adler u. a. und der Waldſtörche, zwiſchen deren Reiſighaufen er ohne Furcht vor den gewaltigen Räubern ſein Neſt baut. Wie der Hausſperling verwendet er Stroh, Papierſchnitzel, Läppchen, Fäden u. drgl. als Neſtbauſtoffe, die er unordentlich in die Niſthöhle ſtopft; das Innere iſt mit Federn und Haaren ausgerundet. Das Gelege beſteht aus fünf bis ſieben bläulich-, gelblich- oder röthlichweißen, grau und braun gepunkteten und gefleckten, oft auch geſtrichelten oder über und über marmorirten Eiern. Die erſte Brut findet Ende April, die zweite Ende Mai oder Juni, die dritte Juli bis Auguſt ſtatt. Nach 13 Tagen ſchlüpfen die Jungen aus, die dem Weibchen ſehr ähnlich ſind. Dieſes unterſcheidet ſich vom Männchen durch mattere Färbung des Gefieders; Ohr- und Kehlfleck, den es wie dieſes beſitzt, ſind kleiner und nicht ſo tiefſchwarz; das Weiß der Kopfſeiten und der Querbinden über den Flügeln iſt trüber; der Halsring iſt weniger geſchloſſen und die helle kupferrothe Kopffarbe iſt etwas bleicher. K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Käfige
jeder Art
(Preisliſte gratis)
fabrizirt u. empfiehlt
preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1431] Oſchatz i. S.



Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren,
Niſtutenſilien,
unerreicht in
praktiſcher
Anordnung,
großer Auswahl u. billigem Preis. [1432]
☛ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☚
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Netzfallen,** kleine 80 ₰, größ. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ. **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [1433]
Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112.
Illuſtrirte Preisliſte gratis.

Futtermittel.

AVOL Nachtigallen- u Drosselfutter
(Gesetzl. gesch.)
mit und ohne Garneelen
per Pfd. 80 Pfg. 9 Pfd. Mk. 7.20 fco.

Dieſes Futter, — in Folge langjähriger Liebhaberei ſachkundig nur aus beſten Zuthaten hergeſtellt u. nach eingehender probeweiſer Fütterung durch Herrn

Karl Kullmann, Frankfurt a. M.
auf der großen allgem. Geflügel- u. Vogel-Ausſtellung hier mit dem
I. Preis prämiirt
iſt das Beſte, was es für Inſektenfreſſer gibt.

Auf Verlangen Gratisproben an Liebhaber.
Fſt. deutſche handbeleſene Ameiſeneier 1899
p. Ltr. 80 Pfg., 10 Ltr. Mk. 7,50, 20 Ltr. Mk. 14.—
F. Grünewald, Offenbach a M.
Markt 5.
[1434]

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt
[1435] ſandfrei.
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Ameiſeneier,
getrocknete, ſchon 1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigte goldgelbe Ware, liefert per Liter 90 Pf. [1436]
Gottlieb Wanek,
Thierhandlung, **Prag** 411, I.

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter
für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1437] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
☛ Muſter und Proſpekte koſtenlos. ☚

Frische Ameiseneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt ☛ **Zeke** ☚ der einzige Erſatz. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zeke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Drogerien. Man verlange Zeke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1438]
Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Alle Vogelfutter,
Praktiſche Käfige und
fremdländ. Vögel.
E. Schreiber, Leipzig,
Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1439

☛ **Mehlwürmer,** ☚
1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ **Paul Bienzeisler,**
[1440] Tillowitz, O.-S.

Pa. friſche Ameiſeneier, haltbare, jeden Poſten, à Ltr. 1 ℳ, bei Voreinſ. v. 70 ₰ 4/10 Ltr. frc. **Mehlwürmer,** à L. 5 ℳ. Trockne pa. Ameiſeneier, à L. 90 ₰, empf. [1441
A. Wonisch, Vogelh., Breslau, Schuhbr. 23.

Neue getr. Ameiseneier,
deutſche, hochprima, helle Qualität, p. Ltr. 1 ℳ, p. 10 Liter 9 ℳ, empfiehlt [1442]
Carl Kämpf, Mainz.

Mehlwürmer, 1000 St. geg. Einſ. von 1,50 in Mrkn. verſ. franko [1443]
D. Waschinsky, Berlin NW, Wilsnackerſtr. 63.

Vögel.

Harzer Kanarienvögel,
Höhlroller-Stamm, diesjährige Hähne, à 5 ℳ, Dutz. 48 ℳ, Weibchen à 80 ₰, Dutz. 8 ℳ. Garantie für Hähne und leb. Ankunft.
Wilhelm Kaye,
[1444] Thale (Harz).

Wie alljährlich, habe ich auch in dieſem Jahre mehrere echt ruſſiſche hoch Ia **Frühjahrs-David-Weiden-Sprosser** bei mir im Käfig vermauſern laſſen und gebe nun dieſelben an wirkliche Kenner des guten Sproſſerſchlages ab um den billigen aber feſten Preis von 25 ℳ franko.

Der Schlag dieſer Vögel bewegt ſich hauptſächlich in Glocken-, Baß-, Moll-, Lach-, Knarr- und Waſſer-Touren und ſchließt jede Geſangsſtrofe mit dem gebührenden Schnapper. Der Vortrag iſt hohl und tief, äußerſt langſam, gewiſſermaßen tragend, ja zur Nachtzeit geradezu feierlich! — Dieſe Sproſſer ſind ausſchließlich eine Spezialität meines Geſchäftes; ſie haben mit den gewöhnlichen Händler-Sproſſern nichts gemein, ſind auch nur durch mich allein erhältlich und daher **ohne jede Konkurrenz!** [1446]

Mathias Rausch,
Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.
NB. Einige gute Frühjahrsſproſſer ohne David, à 15 ℳ, bereits vermauſert, ſind auch lagernd.

1 Höhlenpapagei (Kea)
Helmkakadu,
Lears Arara
hat abzugeben
August Fockelmann
Thierhandlung [1447]
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Wunderſchöner Papagei,
rabengroß, 2 Jahre alt, hellgrau mit rother Bruſt und Haube, gut angelernt, 12 ℳ, mit hohem neuen Salonkäfig 19 ℳ, 2 Grüne Papageien, jung und ſehr gelehrig, à 6 ℳ, zuſammen 9,50, mit Käfig 15 ℳ, hohe Papagei-Salonkäfige mit Meſſing-Aufſatz, ganz von Metall, à 8 bis 10 ℳ, Papageien-Futter, 10 Pfd. 2,50 ℳ, Afrik. Prachtfinken, Par 2 bis 4 ℳ, alle Sorten hochedle Kanarien-Hähne 6 bis 8 ℳ, Weibchen auf Wunſch gratis. Verpackung frei. Gute Ankunft. Per Poſtnachn. 1200 Vögel am Lager.
W. Lembcke,
[1448] Schwerin i. M., Stiftſtr. 9.

Hochfeine ruſſiſche
☛ **Sprosser,** ☚
welche ſchon ſeit Frühjahr am Lager und ſchon übermauſert haben, ſehr gute Sänger, wofür ich die volle Garantie übernehme. **1 Nachtigal,** welche ſchon 2 Jahre im Käfig iſt, ſingt ſehr fleiß. bei Tag u. Nacht, 8 ℳ. Die obenerwähnten Sproſſer koſten à St. 8 ℳ. Ferner Herbſtſproſſer, Hähne, à St. 3 ℳ. Nachtigalen, à St. 2 ℳ
Alles unter Nachnahme. Garantie für Männchen und lebende Ankunft. [1449]
J. Rösner, Temesvar, Ungarn.

Die Samen-Großhandlung
von
Carl Capelle, Hannover
(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [1445]
hält ſich zum Bezug ſämmtlicher **Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Anzeigen.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1450]

Orpheus-Grasmücken,

ſchöne, garantirte Männchen, à 9 ℳ, dito minder ſchöne, à 5—6 ℳ, dito ohne Gewähr fürs Geſchlecht, à 3 ℳ

Frühjahrswildfänge

von Blaukehlchen à 7 ℳ, Gebirgsſchwarzköpfe à 6 ℳ, Gelbſpötter à 7 ℳ, Gartengrasmücken à 6 ℳ, Pirole, ausgefärbt, à 10 ℳ, ſofort lieferbar. Ferner von Mitte Auguſt ab

Herbſtwildfänge

von Blaudroſſeln à 15 ℳ, Steinrötheln à 10 ℳ, Sproſſern à 5 bis 7 ℳ, je nach Herkommen, Nachtigalen à 2,50—4 ℳ, Gelbſpöttern à 3 ℳ, Gebirgsſchwarzköpfen und Gartengrasmücken à 3—4 ℳ, junge Sperbergrasmücken à 2 ℳ empfiehlt

Mathias Rauſch,
Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten
[1451] Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Edle Harzer Kanarien, Hohlroller-Stamm, Frühbrut, Hähne à 4,50 ℳ, 6 Stck. 24 ℳ, Weibchen à 1 ℳ, 6 Stck. 5 ℳ. Ferner Steindroſſeln à 8 ℳ, **Blaudroſſeln** à 12 ℳ, unter Garantie für Hähne und lebende Ankunft. Preisl. ü. a. V. gratis. Prima friſche **Ameiſeneier** u. 99er getrocknete à Ltr. 1 ℳ, **Zeke** à Kilo 3 ℳ. Probeſendung zu 10 ₰, 25 ₰ u. 1 ℳ. [1452]

Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Floten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft.

Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen.
Kataloge gratis u. franko. [1453]

---

1 extra hochf. Schama-Droſſel, 30 ℳ, 1 f. g. **Gebirgs-Amſel,** 98. Wildf. u. 1 f. ſch. Silberdrahtkäfig m. 2 Glasbänſch., 6 ℳ, 1 ſ. rothrück. **Würger,** großart. Geſangskünſtl., u. 1 ſ. ſch. Käfig m. 2 Glasbänſch., 6 ℳ, 1 f. t. u. [illegible] 98er **Gebirgs-Rothkehlchen,** m. Käfig 2 ℳ, 1 ſ. Rohrweiſer [illegible] Holunder- u. Ebereſchenbeeren billigſt. [1454]

Adolf Markert, [illegible]

Verk. u. a. Liebhab. weg. Ueberſiedl. meine 1—2 J. gekäf. hochprima Sänger: Schwarzplättch. 4 ℳ, Heidelerche 3 ℳ, Rothkehlch., Wpſli., 3 ℳ, Stiglitzbaſtard, ſchön u. hochpr. Säng. 10 ℳ, Hänfling, pr., 2 ℳ, Wachtel, ſehr zahm, 7 Schläger, 3 ℳ, roſenbrüſt. Kernbeißer (etw. def. i. Gef.) 10 ℳ, 1,1 Stiglitz 1,50 „, 0,1 roth. Kardinal 1 ℳ, 0,1 Sonnenvogel 2 ℳ. Leb. Ank. garant.

A. Olszewski, Forſtbetriebsleiter,
[1455] **Uścieryki** (Galizien.)

Dompfaffen,

kleine Gebirgsvögel, beſte Sorte zum Anlernen, jung aufgezogen, ſo lange Vorrath reicht, verſende à Hahn 5 ℳ, Weibchen, ebenſo lernfähig, à 1,50 ℳ inkl. Verpackung [1456]

Paul Groeſch,
Dahlherda im Rhöngebirge.

Graupapagei, jung u. zahm, fängt an zu ſprechen. 25 ℳ, mit ſeinem Salonkäfig 38 ℳ, „Gefied. Welt" 1898 mit Einbanddecke 3,50 ℳ, Feines Schweizer Muſikwerk, ſelbſtſpielend, ſchön im Ton, mit 28 Platten, nur ſchöne Stücke (noch neu), Anſchaffungspreis 120 ℳ, für 80 ℳ, umſtändehalber ſofort zu verkaufen. Bei Anfragen Rückporto erbeten. [1457]

Alwin Heinrich, Zittau i. S.

Steinröthel,

fingerzahme, ſind mit den Käfigen 80×45×70 verkäuflich für 50 ℳ. [1458]

G. Hanſten,
Gieſing b. München, Deidenhofenerſtr. 14.

Bubo maximus,

für die Jagd, zu kaufen gesucht. [1459]

Conte **Luigi Balbo,**
8 Via Bogino. **Torino.**

Billigſt zu verkaufen od. zu vertauſchen: 1 P. Nymphenſittiche u. 1 P. Wellenſittiche.

C. Fränkle,
[1460] **Ludwigsburg,** Eberhardſtr. 27.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1461]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Harzer Hohlroller,

diesjährige Hähne, à 4,50 ℳ, 6 St. 24 ℳ, 12 St. 44 ℳ. Weibchen à 50 ₰. Garantie für Hähne und leb. Ankunft. [1462]

Herm. Härtel,
Dresden-Neuſt., Alaunſtr. 22, II.

Verkaufe:

1 Zaunkönig, 1 Rothkehlchen, Lautſänger, mit Käfigen zuſammen für 20 ℳ

P. Richter,
[1463] **Berlin SO 26,** Naunynſtr. 58.

Ein Pärchen ſelbſtgezüchtete ſchwarzkehlige

Laufhühnchen

für 15 ℳ abzugeben. [1464]

Apotheker **Jaeger, Dieburg.**

Zu verkaufen:

Zuchtpar **Hakengimpel,** haben dies Jahr gebrütet, 16 ℳ. Packung inbegr. [1465]

Friedrich Veltin,
Baſel (Schweiz), Feldbergſtraße 89.

Rothe u. gelbe Kreuzſchnäbel

verſende 6 Stück 4 ℳ, Dutzend 6 ℳ. Tauſche auch auf friſche Ameiſeneier, Sproſſer, Schwarzblättchen, Nachtigalen u. Käfige.

A. Jaumann,
[1466] **Großbreitenbach,** Thür.

Suche ♀ **Gürtelgrasfink.** [1467]
Blume, Paſtor,
Großeutersdorf (Kahla).

Heirath. Tüchtiger, in weiten Kreiſen bekannt. Ornithologe, ſtattl. Erſcheinung, Ende d. 20. J., in geſich. Lebensſtellung, ſucht gebild., ſchlicht u. einf. gewohnte **Natur- u. Thierfreundin,** gleich. od. jüng. Alters als **Lebensgefährtin.** Größ. Vermög. Beding. Strengſte Diskretion Ehrenſache. Briefe befördert die Expedition unter Chiffre „Glück". [1468]

Weil jetzt doppelt, verkaufe „**Die gefiederte Welt**" 1897, XXVI. Jahrg., 3 ℳ, 1898, Heft 1—39, 2 ℳ. „**Die vorzüglichſten Beſchäftigungen des Dilettanten**", ſehr geeignet zum Geſchenk für Knaben, ganz neu, 2 ℳ. [1469]

F. Otto, Trebatſch.

Demnächst erscheint in unserem Verlage und ist durch alle Buchhandlungen oder gegen frankirte Einsendung des Betrages direkt von der Verlagsbuchhandlung zu beziehen

Praxis der Aquarienkunde.

Aus der Praxis für die Praxis

von

Dr. E. Bade,

Herausgeber der „Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde".

Gross 8°. Mit einer Farbendruck-, 12 Schwarzdrucktafeln und 165 Abbildungen im Text.

Preis: Elegant brochirt Mk. 3.—, gebunden Mk. 4.—.

Aus der Praxis für die Praxis giebt hier der Verfasser Anweisungen und Belehrungen für die gesammte Aquarienkunde [Süss- und Seewasser-, Terraaquarien und Aquaterrarien], bei deren Benutzung sich ein jeder Liebhaber, sei er Anfänger oder bereits ein Kundigerer, viel Aerger und Verdruss ersparen, jedoch viel Freude an der schönen Liebhaberei verschaffen wird. Repräsentirt doch das Buch keineswegs die Erfahrungen eines Einzelnen allein, sondern vielmehr die im Laufe eines Jahrzehntes gewonnenen Erfahrungen aller Vereine für Aquarienkunde.

Ist nun **nach unserer vollen Ueberzeugung** der Inhalt des Buches ein ganz vortrefflicher, auf der Höhe der Aquarienkunde stehender, so haben wir auch das äusserliche Gewand des Buches ganz hervorragend ausgestattet, sodass wir mit Recht glauben dürfen, dass dasselbe wegen seines ausserordentlich geringen Preises und seiner tadellosen Ausstattung allen Aquarienfreunden willkommen sein wird.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (Max Kretschmann).
Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 35.

Die gefiederte Welt
Wochenschrift für
Vogelliebhaber,
Züchter und Händler
von
Dr. Karl Ruß

Preis vierteljährlich
(13 Nummern mit Abbildungen)
M. 1,50

Magdeburg
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
(R. & M. Kretschmann).

Einzelpreis der Nummer
15 Pfg.

Inhalt der Nr. 33.

Mittheilungen aus Centralamerika (Fortſetzung).
Noch ein Wort zu Gunſten des Waſſerſchmätzers.
Der Gartenlaubvogel.
Die Schwalbe im Ziegenſtall.
Zur Kenntniß der Thurmſchwalbe.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechſel.
Berichtigung.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Neue!!! Ameiseneier,

gute, ſchöne, geſiebte Ware, Ko. 2,80 ℳ, hochprima neue feinſte, weiße Tiroler, Ko. 4,30 ℳ, Lt. 90 ₰, Muska od. Zeke, Ko. 2,60 ℳ, vorgenannte 3 Sort. 5 Ko. fr. Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahr. ſelbſt erprbt, Ko. 2 ℳ, 3 Ko. fr., ſowie fachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtliche Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- und Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ mit Sack und alle Futterſorten in unübertroffener Ia Qualität. Reelle Beding. Preisl. gr. [1470]
Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1471]
☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Käfige jeder Art (Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1472] **Oſchatz** i. S.

Neu! **Senſationell!**

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt
[1473] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
☞ **Knochenmühlen** ☜
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,**
[1474] **Waren i. Mecklenb.**
▬ Proſpekte gratis. ▬



Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [1475]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Lit. 1 ℳ. Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen,** M.-Gladbach 112.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1476]
K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

☞ Für alle Arten Vögel fertige ich fachgemäße
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). – – Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1477]

C. L. Flemming

Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1478]

Holzwaarenfabrik.

Holzwaarenfabrik.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1479]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Hermann Schramm's

mechaniſche

Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [1480]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Verkaufe Platzes halber billige Vogelbauer:

Neuntheiligen Geſangskäfig zum Anlernen junger Kanarienvogel, 10 ℳ, Heckbauer 75×40×37 cm groß, 8 ℳ, Wachtelbauer 8 ℳ, Lerchenbauer 8 ℳ, Papageibauer, 1 m hoch u. ½ m Durchmeſſer, 10 ℳ. Die Bauer ſind noch wie neu, tauſche auch Nützliches.
[1481] **L. Brock,**
Eisdorf b. Lützen (Prov. Sachſen).

Grottenſtein-Kanarien-Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei.
R. Schröter (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1482]

Hunde-Halsbänder

in ff. vernick. Metall mit Lederunterlage u. Namensgravur per Stück von 3–8 ℳ.
[1483] **H. D. Becker,** Iſerlohn.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2923).
Preis vierteljährlich 1 Mark 40 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 33. Magdeburg, den 17. Auguſt 1899. XXVIII. Jahrg.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Die Trupiale (Icterus) von Guatemala.

Wenn in Deutſchland nach ſtrenger Winterszeit die erſten Zugvögel eintreffen, iſt vielfach die Witterung noch recht unfreundlich. Schnee und Eis bedeckt noch oftmals die Felder und Wieſen, und wundern muß man ſich, wie die erſten gefiederten Frühlingsboten ihre Nahrung finden können. Traurig ergeht es ihnen leider oft genug und viele finden in den ſpäten Schneeſtürmen ihren Tod.

Den hieſigen Zug- und Strichvögeln geht es nun viel beſſer, für ſie iſt ſtets der Tiſch gedeckt und von den Unbilden der Witterung bleiben ſie verſchont. Was ſind nun eigentlich die Beweggründe, daß auch die Vögel der Tropen ſo oft ihre Standquartiere ändern und an einer Stelle verſchwinden, um an anderer zu erſcheinen? Vielfach liegt der Wechſel nur in der Trockenzeit und in der Regenzeit, wobei mehr oder weniger die Ernährungsverhältniſſe eben doch mitſprechen. Erſcheinen im Oktober die ſchönen rothen Tangaren, ſo iſt der Winter vor der Thür, kommen dagegen im Februar und März auf die Hochebene von Guatemala die herrlichen gelbſchwarz gezeichneten Vögel, ſo wird der Frühling bald ſeinen Einzug halten und die Regenzeit wird beginnen. Wie in Deutſchland der Star der erſte Verkünder des nahenden Frühlings iſt, ſo ſind es hier ſeine Verwandten, die Trupiale.

Einen wunderbaren Reiz gewährt es, ſich beim Morgengrauen in die Nähe einer Bananenpflanzung, welche möglichſt mit Cypreſſen umſäumt iſt, auf den Beobachtungspoſten zu begeben. Mit den erſten Sonnenſtrahlen laſſen ſich die ſchnurrenden Töne der Trupiale, welche in ziemlicher Höhe fliegen, vernehmen und in wenigen Minuten ſind die Baumſpitzen mit den herrlichen Vögeln beſetzt. Der kurze Geſang beſteht aus pfeifenden Tönen und iſt angenehm zu hören; dabei fliegen die Vögel von einer Baumſpitze zur anderen, ſind geſchickt und gewandt in allen Bewegungen. Einzeln ſind die Trupiale ſelten anzutreffen, ſondern ſtets in mehreren Köpfen.

Wird ſich der Leſer dieſes entzückende Bild vergegenwärtigen können, wenn auf einer Baumſpitze ſich zehn Männchen niedergelaſſen haben, von der Morgenſonne beſchienen, und ihren Geſang vortragen? Steigt die Sonne höher, ſo kommen die Vögel tiefer auf die Bananenblüthen herab. Wo eine reife Frucht zu finden iſt, da wird ſolche angefreſſen, hauptſächlich aber wird den Bananenblüthen, der ſich darin aufhaltenden Inſekten wegen, die Aufmerkſamkeit zugewendet. Eine jede Blume wird durchſucht.

Die Männchen erſcheinen ſchon im Monat Februar auf der Hochebene von Guatemala; viel ſpäter, im März und April, kommen die Weibchen. Vorher lebten die Männchen verſchiedener Arten recht friedlich nebeneinander, mit dem Eintreffen der Weibchen kommt ſchon etwas Rauferei in die ganze Geſellſchaft. Die Nachtquartiere befinden ſich in benachbarten Waldungen, woſelbſt auch während der heißen Mittagsſtunden der Ruhe gepflegt wird. Am Morgen und gegen Nachmittag erſcheinen die Trupiale an den Futterplätzen in den Bananenpflanzungen. Kommt die Brutzeit näher, ſo werden die geeigneten Niſtplätze ausgeſucht. Dieſe Orte ſind vielfach nur ſchwer zugänglich. Centralamerika iſt zerklüftet und zerriſſen; aus tiefen Schluchten und ſteilen Abhängen beſteht das ganze Gebirge. Die Abgründe oder Barrancos, wie ſie der Bewohner nennt, ſind mit dichtem Strauchwerk, namentlich Eichen, bewachſen. Vereinzelt ragen die Baumſtämme an unzugänglichſter Stelle hervor und dieſe einzelnen Bäume bilden meiſtens eine ganze Kolonie für einige Arten der Gelbvögel oder Kaſſiken. In langen Beuteln hängen die Neſter von den Aeſten herab und man kann die Vögel ein- und ausfliegen ſehen. Verſucht man den Baum zu beſteigen, oder befindet ſich ein Raubthier auf dem Baum oder in der Nähe, ſo umſchwirrt die ganze Schar mit einem ſchrecklichen Gekrächz den Räuber.

Mehrere Arten niſten vielfach nebeneinander, doch ſind die Neſter weder in der Form noch in dem Material auffallend verſchieden. Neſter habe ich mehrere in meinem Beſitz, leider aber nicht ein einziges, das direkt am Baumaſt befeſtigt iſt, alle ſind abgeriſſen. Die beutel- oder keulenförmigen Neſter haben das Flugloch immer 25 bis 30 cm über der Neſtmulde. Ein größerer Theil der Trupiale niſtet jedoch in offenen Neſtern.

Ueber das Brutgeſchäft, und namentlich über den Neſtbau wird noch wenig bekannt geworden ſein. Leider ſtehen auch mir nur über einige Arten genaue Beobachtungen zur Verfügung, welche ich bei der Behandlung einer jeden derſelben bekannt geben werde. Wiederholt möchte ich jedoch darauf hinweiſen, daß der größere Theil der in Guatemala lebenden Icterusarten in offenen Neſtern niſtet und ich nur drei Arten kenne, welche die kunſtvollen langen Beutel anfertigen.

Wenn mich nicht alles trügt und ich mich auf einige Jahre zurück recht entſinne, befindet ſich in Brehms Thierleben eine farbige Abbildung des Baltimore-Vogels und in ſeiner Umgebung viele beutelförmige Neſter. Sollte etwa damit der hier lebende Icterus baltimoro gemeint ſein, ſo ſtieße ich gleich auf einen Widerſpruch, denn der Icterus baltimoro, wenn der von mir ſpäter beſchriebene Vogel mit dieſem identiſch iſt, niſtet in einem offenen Neſt. In meinen Angaben kann auch ein Irrthum unterlaufen, inſofern als ich einen wiſſenſchaftlichen Namen verwechſele oder falſch anwende. Schon aus dieſem Grunde muß ich die Beſchreibung eines jeden Vogels folgen laſſen, um den Leſer nicht auf eine falſche Bahn zu führen.

Eier und Neſtjunge hatte ich noch nicht in Händen, doch iſt es nicht ausgeſchloſſen, über kurz oder lang auch hierüber berichten zu können.*)

Im Freileben ſind die Beutelſtare, wie ſie vielfach genannt werden, jederzeit anzutreffen, ſtets bleiben einige Vögel ihrem Standort treu, während ſonſt die Trupps im Land umherſtreichen. In der Gefangenſchaft dagegen trifft man dieſe Vögel ſeltener, obgleich ſie in den Frühlingsmonaten oft zum Verkauf angeboten werden. Man glaubt, ſie ſeien hinfällig und zart; dies mag jedoch in der ſchlechten Behandlung begründet ſein, bevor ſie in die Hände der Liebhaber gelangen und auch da finden ſie meines Erachtens eine ungenügende und unzweckmäßige Behandlung und Ernährung. Ich kann es nicht glauben, daß die Vögel nur bei Bananenfütterung lange aushalten, obgleich man ſchon die größeren Arten drei Jahre und länger nur mit dieſem Futter hingehalten hat. In Guatemala gibt man ſich mit dem Fang der Trupiale weniger ab, doch kommen zur Frühlingszeit Mexikaner über die Grenze, welche mit einem Lockvogel und Schlagbauer die Vögel fangen und auf dem Rücken nach Guatemala transportiren.

Der Preis für die gelben Vögel iſt etwa 2 bis 3 Mk., die grünen ſind etwa um die Hälfte billiger. Die gefangenen Trupiale ſind meiſtens gut im Gefieder, höchſtens mit etwas an dem Käfig verſtoßener Stirn, körperlich aber ſo herunter, daß der Bruſtknochen ſo ſcharf wie ein Meſſerrücken hervorragt und man ſtets berechtigten Zweifel an dem weiteren Fortkommen haben muß. Kauft man gar noch Vögel mit verklebtem und verſchmutztem After, ſo ſind die Verluſte unausbleiblich. Die übrigen, wenn auch noch ſo abgemagert, erholen ſich bei geeigneter Pflege auffallend raſch. Vor allem muß den Vögeln viel Ruhe gegönnt werden und ſie müſſen nächſt Bananen ein kräftigeres Futter erhalten. Lebende Inſekten ſind ihnen ein Leckerbiſſen, doch Vorſicht bei der Verfütterung! Die größeren Arten ſind darauf ſo gierig, daß ſie oft zu viel freſſen und die Käfer lebend verſchlucken. Eine fleiſch- oder eihaltige Fütterung kennt man hier nicht, doch ich wende ſolche an und bin mit der Erhaltung meiner Trupiale recht zufrieden. In der Gefangenſchaft ſind die Beutelſtare verträglich, doch darf der Raum nicht zu klein ſein. Um einen guten Biſſen ſind ſie ſtets furchtbar neidiſch. Wirft man nur einen Käfer vor, ſo kann dieſen allerdings nur ein Vogel erhalten, fünf bis ſechs andere verfolgen aber den Glücklichen unaufhörlich, ſodaß er keine Ruhe finden kann, ſeine Beute zu verzehren. Nicht genug damit, einige beißen ſich ſogar im Gefieder feſt und werden förmlich umhergeſchleift.

Der Geſang iſt annehmbar, wenngleich die Trupiale darin keine Meiſter ſind. Abrichten laſſen ſie ſich leicht, ſind alsdann zutraulich und zahm und zeigen in ihrem ganzen Weſen die Vorzüge und Nachtheile des gewöhnlichen Stars. Jung aufgezogen, ſollen ſie eine Melodie nachpfeifen lernen und ich hörte thatſächlich einen St. pectoralis, welcher Bruchſtücke der Guatemalteſer National-Hymne pfiff.

Im großen Ganzen iſt das Weſen ſämmtlicher Icterus-Arten übereinſtimmend; wo mir nennenswerthe Unterſchiede aufgefallen ſind, werde ich ſie bei der Beſprechung der einzelnen Arten erwähnen.

In der Größe wechſeln die einzelnen Arten zwiſchen der eines Sperlings und der eines Kramtsvogels. Bis auf eine zimmtbraune Art ſind alle gelb und ſchwarz. Viele erſcheinen auf den erſten Blick übereinſtimmend, inwiefern ſich dieſelben jedoch unterſcheiden, das zu ſchildern ſoll die Aufgabe einer Fortſetzung ſein.

(Fortſetzung folgt).

---

*) Wir bitten ſehr darum. D. L.

Noch ein Wort zu Gunsten des Wasserschmätzers.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ſind es, daran der Waſſerſchmätzer ſich ſättigt*) und welche er ſich Sommer und Winter, zu allen Jahreszeiten, ſo lange als es eben die Umſtände geſtatten, an den nämlichen Plätzen ſammelt.

Innerhalb der letztvergangenen drei Jahre habe ich 18 Waſſerſchmätzer in den Monaten Dezember und Januar an ſolchen Futterplätzen erlegt, welche gleichzeitig der Forelle als Laichplätze dienten und als ſolche bezogen waren und zwar ſchoß ich dieſe Vögel ſtets während ſie auf dem Bachgrunde Nahrung aufnahmen. Die genaue und ſofort angeſtellte Durchſuchung des Kropf- und Mageninhalts förderte aber bei keinem dieſer Exemplare irgend welche Laich- oder Fiſchreſte zu Tage.

Ferner durchſuchte ich den Inhalt der Verdauungswerkzeuge von etwa 30 zu anderer Zeit und an anderen Orten geſammelten Stücken und wol mehrere 100 Gewöllballen des Vogels, ohne je auf eine Spur von Gräten, Fiſchſchuppen u. a. zu ſtoßen.

Wer den Waſſerſchmätzer nicht als nützlichen Vogel gelten laſſen will, der übe wenigſtens doch ſo viel Gerechtigkeit und zähle ihn den „harmloſen“ bei. Schädlich iſt die Bachamſel gewiß nicht!

Dieſe feſte Ueberzeugung ließ mich denn auch vor einem Jahre zu Gunſten des Vogels in die Schranken treten. Der hieſige Fiſchereiverein beſchloß eine Eingabe an die Regierung: es ſei auf den Waſſerſchmätzer, als der Fiſcherei ſchädlichen Vogel, 20 Rappen Schußgeld zu entrichten. Glücklicherweiſe erwies ſich die Regierung nun aber nicht ſo kurzſichtig wie unſere Fiſcher und meine kleine Mühe fand darin reichliche Belohnung, daß die betreffende Eingabe einfach unberückſichtigt blieb.

---

*) In unſeren Forellenbächen kommt kein Egel vor, ſondern nur in Sümpfen und morartigen Waſſergräben, welche der Waſſerſchmätzer aber meidet, lebt der Roßblutegel (Haemopis vorax).

❧

Der Gartenlaubvogel.

Vortrag, gehalten im Verein der Liebhaber einheimiſcher Vögel zu Berlin

von Joſef Wagner.

Der Gartenlaubvogel oder gelbe Spötter, in vielen Gegenden auch Sprachmeiſter genannt, dürfte wol jedem Naturbeobachter ſchon durch ſein zutrauliches Weſen, das er in der Nähe der Häuſer, in Gärten und Parkanlagen zeigt, und durch ſein reichhaltiges Spotten, d. h. die Nachahmung des Geſangs anderer Vögel, die er in ſeinen Geſang mit einflicht und zum Vortrag bringt, jedem Vogelfreund bekannt ſein.

Viel iſt ſein Freileben ſchon beobachtet worden, zumal er auch in unſerer Gegend häufig vorkommt. Auch iſt er beſonders die letzten Jahre hindurch zahlreich von uns Liebhabern im Käfig gehalten und gepflegt und ſehr günſtige Ergebniſſe ſind dabei erzielt worden. In den früheren Jahren hörte man öfter ſagen, daß dieſer Vogel ſehr ſchwer zu halten wäre und noch ſchwerer in die Mauſer käme, und die Monate Januar und Februar öfter nicht überlebe; das kann aber nur in unrichtiger Behandlung und falſcher Fütterung begründet gelegen haben.

Wir wiſſen wol alle, daß dieſer Vogel nicht ſo häufig auf den Ausſtellungen, welche bei uns regelmäßig im Januar und März abgehalten wurden, vorkam, wie andere Arten; öfter brachte uns Herr Arthur Herrmann aus Oſchatz ſchön vermauſerte ſingende Gelbſpötter zur Schau.

Wir kämpften früher gegen kleine Käfige für Gelbſpötter, aber Herr Arthur Herrmann hatte uns mit ſeinen Spötter-Käfigen den Beweis geliefert, was er erzielt hatte, denn tadelloſe Stücke ſtellte er uns zur Schau. Auch die Wiener Vogelliebhaber, welche ſich beſonders mit dem Halten von Gelbſpöttern beſchäftigen, haben mir bei meinem Dortſein unzählige Beweiſe geliefert, was ſie in ihren kleinen Zweiſprung-Käfigen für gute Erfolge erreicht hatten.

Schon vor Jahren hatten ſich einige meiner Freunde und ich eine Anzahl Wiener Käfige aller Art beſchafft, und beſonders war es uns darum zu thun, in den kleinen Käfigen Gelbſpötter zu halten. Heute kann ich ſagen, daß ſich in den kleinen Zweiſprung-Käfigen die Vögel am beſten hielten, ſelbſtverſtändlich bei regelrechter guter Pflege, und dieſe Erfahrung werden Sie von allen meinen Freunden beſtätigt hören.

Was nun die Fütterung anbetrifft, da gehen die Anſichten ſehr weit auseinander. Im Folgenden gebe ich eine Reihe Meinungen wieder; nach jedem dieſer Verfahren ſollen ſehr gute Erfolge erzielt worden ſein.

A. Morrübe, angequellten Weißwurm, zur Hälfte gute getrocknete Ameiſenpuppen, etwas Bisquit, allerhand zerſchnittene Beren; Mehlwürmer nur, um den Vogel an das Futter zu gewöhnen; ſonſt nur als Leckerbiſſen.

B. Weißwurm und „Muska“ mit geriebener Möre gemiſcht, im Saft anquellen laſſen, dann den überflüſſigen Saft ausdrücken und gute Ameiſenpuppen dazwiſchen miſchen, das Futter klein wiegen, kleine Stückchen rohes Rindfleiſch; gegen Mitte November anfangen mit Mehlwürmern bis zu 30 Stück; während der Mauſer Sepiaſchale und fein gemahlenen Hanf als Beigabe und etwas hartgekochtes Hühnerei.

C. Morrübe, aufgequellte Ameiſenpuppen und aufgequellten Weißwurm, gemahlenen Hanf, klein geſchnittenes rohes Ochſenherz oder geriebenes Rindfleiſch; Mehlwürmer von Mitte November, dann vormittags zehn Stück und abends zehn Stück; gegen Weihnachten etwas gekochtes Hühnerei.

D. Vier Theile Ameiſenpuppen, aufgequellten Weißwurm, Bisquit, wenig Morrübe, 20 bis 25 Mehlwürmer.

E. Aufgequellte Ameiſenpuppen, Eierbrot, gekochtes Hühnerei, aufgequellte „Muska“, zehn bis zwölf Mehlwürmer.

F. Aufgequellte Ameiſenpuppen, aufgebrühte „Muska“, Morrübe und Eierbrot, zehn Mehlwürmer.

G. Garneelenſchrot, Ameiſenpuppen und Morrübe an 20 Mehlwürmer gemengt. Beim letztern nehme ich an, daß der Vogel wol von den Mehlwürmern leben dürfte, denn Garneelenſchrot betrachte ich mehr als Futter für Enten.

Mein Freund Guſtav Müller reicht Ameiſenpuppen und Weißwurm zu gleichen Theilen gebrüht, hartgekochtes Hühnerei, Bisquit, fein gemahlenen Hanf, 12 bis 15 Mehlwürmer, und hat großartige Erfolge erzielt.

Ich füttere meine Spötter mit gekochtem Kalbsherz, auch geſchmorter Kalbsmilch, Kalbs- und Hammelbraten; auch Rinderbraten nehmen ſie gern. Nach meiner Erfahrung nahmen alle meine Vögel lieber Braten als gekochtes Fleiſch. Zum Braten nehme ich trockene Ameiſenpuppen und etwas Möre; die Maſſe wird fein gehackt, dazu vier bis ſechs Mehlwürmer.

Ich gebe ab und zu zur Abwechſelung geſchnittenes rohes Kalbsherz, von abgekochter Sahne die Haut fein zerſchnitten, auch rohes Kalbfleiſch, manchmal etwas geriebenen Napfkuchen, zur Winterszeit öfter während der Mauſer Fliegen, welche ich mir im Sommer fange, trockne und dann mit Milch anfeuchte und täglich drei bis vier davon reiche. Ich habe ſchon Proben gemacht und habe Spötter überwintert und ſchön vermauſerte dabei, ohne daß ich einen Mehlwurm gereicht hätte. Jedoch will ich das nicht als Norm hinſtellen; ob ein jedes Individuum dabei gedeihen würde, bleibt dahin geſtellt. Ich habe ſchon meine Spötter den ganzen Sommer hindurch mit angegebenem Futter gefüttert, ohne daß ſie eine friſche Ameiſenpuppe geſehen hätten, und zwar weil ich lange auf Reiſen war, und ich meiner Frau, die ohnedies im Geſchäft ſein muß, die Plage mit dem Beſchaffen von friſchen Ameiſenpuppen bei kalter, naſſer Witterung nicht übertragen konnte.

Gute Mauſerung habe ich ſchon erzielt bei trockener Wärme, wie auch in feuchter Wärme, bei warmer und kühler Temperatur. Das, was bei dieſen Vögeln manchem Liebhaber vorkommt, daß ſie nicht in die Mauſer gehen und dann auch ſterben, liegt nach meiner Beobachtung viel mit darin begründet, daß die Vögel viel zu ſpät gefangen, wie ich mich ſelbſt überzeugt habe, mitunter ſogar vom Neſt genommen werden. Solche Vögel, im Brutgeſchäft geſtört, werden dann womöglich noch, wie ich ſelbſt geſehen, im offenen Käfig gehalten, kommen nicht mehr zum Geſang, ihre Naturanlagen können ſich nicht entwickeln, und ſie erleben das zweite Jahr ſehr oft nicht mehr. Wer ſich einen Spötter im Frühjahr einkäfigen will, der trachte danach, daß er einen Vogel gleich nach ſeiner Ankunft bekommt, der noch nicht gepart iſt, umhülle den Käfig mit dünner weißer Leinwand, gebe ihm einen hellen zugfreien Standort, möglichſt ungeſtört, und halte ihn bei ausſchließlicher Fütterung von friſchen guten Ameiſenpuppen. Dann wird der Vogel noch zum Geſang kommen, wird ſich, wie wir ſagen, auch ausſingen, und der Vogelfreund wird dann zum bevorſtehenden Winter anbei Mauſer, bei richtiger Pflege die gewünſchten Erfolge erzielen. —

Was nun das Freileben des Gelbſpötters anbelangt, ſo dürfte er wol mit zu denjenigen Arten gehören, welche in Europa im Verhältniß ein kleines Brutgebiet einnehmen. Ich hatte genügend Gelegenheit, den Vogel in ſeiner Geſangsweiſe und ſeinem ſonſtigen Benehmen im Freien zu beobachten.

In Deutſchland und Oeſterreich kommt er wol überall vor, aber an der Südſeite der Alpen, z. B. beim Gardaſee, bei Deſſenjano, Mailand, Turin, Genua iſt er nicht mehr Brutvogel, ebenſo geht er nur bis zum Savefluß, und in Bosnien iſt er ebenfalls nicht mehr anzutreffen. Nach meiner eigenen Beobachtung kann ich ſagen, daß er ungefähr vom 46. Breite-Grad bis zum 63. nördlicher Breite ſein Brutgebiet inne hat, jedoch in Skandinavien nur vereinzelt vorkommt. So hörte ich ihn auch auf meiner diesjährigen Nordlandsreiſe wieder bei Drontheim fleißig ſingen, aber nur ein Pärchen. Er iſt in Norwegen am Golfſtrom eher anzutreffen als im öſtlichen Schweden. Schon bei Stockholm iſt mir dieſer liebliche Sänger nicht mehr vorgekommen, und öſtlicher dürfte er überhaupt nicht anzutreffen ſein.

Was den Geſang anbelangt, ſo kann ich wol von Oertlichkeitsraſſen ſprechen, denn ich habe mich ſelbſt überzeugt, daß die Gelbſpötter in den Gegenden Skandinaviens, die ich gehört habe, einen andern Geſang bringen als die unſrigen hier in Brandenburg; ebenſo abweichend ſind diejenigen, welche in Mittel-Böhmen vorkommen, von denen in Siebenbürgen, und den Bukowina-Prima-Sänger hört man auch in Ungarn. Alle die genannten Raſſen bringen in der Regel in ihrem Geſang die Rufe mit von den Sängern anderer Vögel, welche in der Umgegend ihrer Brutgebiete vorkommen. Es iſt wol nur Geſchmacksſache, daß man den einen oder den andern Ruf vorzieht; infolgedeſſen iſt es mir kaum möglich, zu ſagen, ein guter Spötter muß dies oder das in ſeinem Vortrag bringen. Da käme es immer darauf an, von welcher Oertlichkeitsraſſe er abſtammt, ob in derſelben überhaupt die Rufe vorkommen oder nicht. Denn mag es ſein wie es will, ein jeder Vogelfreund kann ſchon zufrieden ſein, wenn ſein Spötter ſchön vermauſert, bei Zeiten anfängt zu ſingen, lange mit dem Geſang anhält, zahm dabei iſt und ihm jahrelang erhalten bleibt.

Die Schwalbe im Ziegenſtall.

Von A. Reuter.

Es kommt zuweilen vor, daß ein Zugvogel durch irgend eine Veranlaſſung nicht mit ſeinesgleichen auf die Wanderung nach dem Süden kommt. Iſt einmal die Zugzeit vorüber, ſo geht ein vereinzelter Vogel nicht mehr fort, ſondern ſchlägt ſich im günſtigen Fall wintersüber innerhalb menſchlicher Wohnſtätten kümmerlich durch, wie es bei Rothkehlchen, Bachſtelzen u. a. der Fall iſt. Der hier angeführte Fall hätte aber ſicher den Tod des zurückgebliebenen Vogels zur Folge gehabt, wenn derſelbe nicht durch eine ſchickliche Fügung in gute Hände gekommen wäre. Es war ein rauher, mit Schnee- und Regenſchauern reichlich bedachter Tag zu Ende Oktober, ich war im Bayeriſchen Hochland, als plötzlich eine Hausſchwalbe erſtarrt mir vor die Füße fiel. Ein Herzloſer oder Unkundiger hätte den Vogel vielleicht gar nicht beachtet, ſo kam er aber an die richtige Adreſſe. Ich nahm ihn ſofort auf, erwärmte ihn in der Hand und brachte ihn in der Joppentaſche nach Haus. Dort angelangt, wurde eine nähere Unterſuchung auf die Lebensfähigkeit der Erſtarrten angeſtellt, und ſiehe da, ſie lebte und blickte neugierig umher. Wo aber nun unterbringen? In einen Käfig paßt die Schwalbe nicht, im Zimmer frei fliegen zu laſſen iſt ebenſo ausſichtslos, denn über kurz oder lang entwiſcht ſie durchs offene Fenſter, und das gleiche Los wie vorher ereilt ſie wieder, aber vielleicht mit ungünſtigerem Ausgange. Doch halt, jetzt naht Hülfe, wir haben ja einen geräumigen hellen Ziegenſtall, dort wird das Thierchen über Winter Wärme genug haben, und für die nöthige Nahrung iſt theilweiſe in Form von unzähligen Fliegen und Spinnen, welche ſich bekanntlich im Spätjahr dorthin flüchten, geſorgt. Geſagt, gethan, ich brachte das Schwälbchen dort unter und machte ihm verſchiedene Ruheplätze am Gebälk zurecht, und nach Verlauf von einer Stunde machte es ſchon Jagd auf Fliegen und that, als ob es ſchon längſt da zu Haus wäre. Am Fenſter brachte ich ein Brettchen für Futter- und Trinkgeſchirr an; nach und nach gewöhnte ich es an ein Erſatzfutter, und reichte ihm kleine Mehlwürmer, welche ich lebend in ein gläſernes Gefäß that, um das Vögelchen damit zu reizen. Es ließ auch nicht lange auf ſich warten, bis es zulangte; ſpäter nahm es auch gehacktes Ei, in Milch geweichte Semmel und Ameiſenpuppen an, jedoch alles mit zerſchnittenen Mehlwürmern, ſowie auch mit Fliegen und Spinnen geſpickt. So erhielt ich die Schwalbe den ganzen Winter über munter und geſund, und zum Dank dafür ſang ſie ſchon vom März ab ihr munteres Liedchen. Ich muß das Gezwitſcher einer Schwalbe immer mit dem unſerer kleinen Plappermäulchen vergleichen, iſt es doch, als wollten ſie uns ihre ganze Lebensgeſchichte erzählen, und das mit einem Eifer, der keinem andern Vogel eigen iſt.

Zu Ausgang April öffnete ich nun das Fenſter, um ihm die Freiheit zurückzugeben, jedoch erſt nach acht Tagen machte es zum erſten Mal von der goldenen Freiheit Gebrauch, und jeden Abend fand es ſich wieder auf ſeinem gewohnten Ruheplätzchen ein. Bald brachte es ſich auch eine Lebensgefährtin mit, ſie bauten ihr Neſt an einen Balken, und zogen bei der erſten Brut fünf, bei der zweiten vier Junge groß. Endlich kam der Herbſt und mit ihm auch die Wanderluſt unſerer Schwalbenfamilie, welche nunmehr aus elf Köpfen beſtand. Es war ein rührender Abſchied; ſchon einige Tage vorher zeigten ſie große Unruhe, ſie flogen durchs ganze Haus, ſogar in die Wohnſtube, ſetzten ſich mitunter auf Spiegel und Bilderrahmen oder auf die an der Wand hängenden Hirſch- und Rehgeweihe. Die Männchen zwitſcherten dabei emſig, als wollten ſie uns ihr Vorhaben erzählen. Endlich eines Mittags, nach Beendigung ihres letzten Konzerts, ging es zu allen Oeffnungen hinaus und auf die nahe Kirche, wo hunderte Ihresgleichen auf den am Dachfirſt gezogenen Blitzableitungsdrähten ſaßen. Wir beobachteten ſie lange, bis ſie alle aufflogen und einige Male die Luſt durchkreuzten; dann ſahen wir ſie nicht mehr, jedoch erhofften wir ein Wiederſehen im künftigen Frühling, aber leider umſonſt, wir ſahen keines wieder. Ob ſie ſich irgendwo anders angeſiedelt hatten, oder ob ſie in einen italieniſchen Magen wanderten? Letzteres wird wol das Wahrſcheinlichſte geweſen ſein.

Zur Kenntniß der Thurmſchwalbe.

In den letzten 21 Jahren habe ich in Bromberg und hier (Berlin) ſtets Wohnungen gehabt, von denen aus ich bei freier Ausſicht in die Weite das Treiben der Thurmſchwalben beobachten konnte. Die Thiere kamen am 1. Mai und zogen am 31. Juli abends ab. Nur einmal bemerkte ich in Bromberg noch am 2. Auguſt einige Thurmſchwalben, die aber auch am nächſten Tage verſchwunden waren. Hier in Berlin wohne ich dem großen Moabiter Exerzierplatz gegenüber und hatte fünf Jahre hinter einander das Vergnügen, die Luſt mit Hunderten von Thurmſchwalben angefüllt zu ſehen. Ein ziemlich hoher und dicker Eckthurm des Hauſes an der Ecke der Rathenower- und der Birkenſtraße wurde ſtets von einigen Dutzend Thurmſchwalben umſchärmt, wie ich es in meiner Jugend an einem freiſtehenden hohen Thurm meiner Vaterſtadt erlebt habe.

Am 20. Juli 1897 abends ſah ich die Thurmſchwalben, die ſich ſonſt um dieſe Zeit noch in den unteren Luftſchichten lebhaft umhertummelten, ſo hoch aufſteigen, daß ſie nur noch wie Punkte erſchienen und oft auch von meinen ſonſt guten Augen nicht mehr zu erkennen waren. Langſam und bedächtig, niemals ſtürzend und ſelten wirbelnd wie ſonſt, ſegelten ſie hin und her. Ich ſagte ſogleich zu meiner Frau, daß etwas Außerordentliches bevorſtehen müſſe, da die Schwalben ſich offenbar zur Abreiſe entſchloſſen hätten. Am nächſten Tage, alſo elf Tage vor dem gewöhnlichen Termin, waren die Thurmſchalben verſchwunden: an demſelben Tage brach das furchtbare Unwetter herein, das in Sachſen, in Schleſien und in anderen Gegenden ſo entſetzliches Unheil angerichtet hat.

Im vorigen Jahr, alſo ein Jahr nachher, ließ ſich nicht eine einzige Thurmſchwalbe über dem Moabiter Exerzierplatz ſehen! Nur in der letzten Woche des Juli flog abends ein geſchloſſener Schwarm von etwa acht bis zehn Thurmſchwalben in wildem Jagen zweimal vor meinem Fenſter vorüber und kehrte dann nicht wieder.

Ich war nun voll Erwartung, wie es in dieſem Jahr werden würde. Meine Freunde, wenn ich dies unharmoniſch kreiſchende Gezücht mit dieſem Namen beehren darf, begrüßten mich in den erſten Maitagen noch nicht, weshalb ich glaubte, daß ſie, wie im Jahre vorher, ausbleiben würden. Allmählich jedoch fanden ſich einzelne ein, nach und nach auch mehrere; und wenn die Zahl auch nicht ſo groß wurde wie früher, ſo war ſie doch größer, als man ſie nach den erſten Anfängen vorausſetzen konnte. Aber um den Thurm an der Birkenſtraßenecke kümmerte ſich den ganzen Sommer über nicht eine einzige Thurmſchwalbe.

Am 25. Juli ſah ich die letzten Thurmſchwalben, denn ſie ſchienen verſchwunden zu ſein. Umſomehr war ich überraſcht, als ich ſie am 2. Auguſt in den oberſten Luftſchichten, für das Auge kaum erreichbar, langſam hin und her ſtreichend und ebenſo zahlreich ſah wie in früheren Jahren. Drei Pare jagten ſogar in den unteren Schichten fortwährend an meinen Fenſtern vorüber. Wenn ich aber glaubte, daß ſie uns nun verlaſſen wollten, ſo hatte ich mich geirrt; denn am 3. Auguſt abends bis fünfzehn Minuten nach Sonnenuntergang war die Erſcheinung einſchließlich der drei vereinzelten Pare ganz dieſelbe. Erſt am 4. Auguſt zeigte ſich keine Thurmſchwalbe mehr.

Die hier in Rede ſtehenden Vögel ſind ſo ſehr an beſtimmte Tage des Kommens und Gehens gebunden, daß die angeführten Abweichungen von der Regel einer Erklärung bedürfen.

Die Thurmſchwalben, die am 20. Juli 1897 zur höchſten ſichtbaren Höhe aufſtiegen, hatten offenbar Witterung von dem bevorſtehenden Unwetter und flogen ſo hoch ſie konnten, um Beobachtungen anzuſtellen und ſich zu unterrichten. Darauf traten ſie in der nächſten Nacht, alſo lange vor dem üblichen Termin, ihre Reiſe an und gingen in dem fürchterlichen Unwetter ſo vollſtändig unter, daß nichts von ihnen übrig blieb. Anders kann man kaum erklären, weshalb im Sommer 1898 die Thurmſchwalben über dem Moabiter Exerzierplatz ohne Ausnahme fehlten.

Was das von dem früheren abweichende Verhalten der Thurmſchwalben in dieſem Jahre 1899 angeht, ſo waren die hier erſcheinenden Schwalben höchſt wahrſcheinlich neu. Sie kamen ſpäter als gewöhnlich an, waren mit den Verhältniſſen unbekannt, fanden aber Spuren ihrer Vorgänger und nahmen endlich deren Bezirk ein, ließen jedoch in ihrer Unkenntniß den Thurm an der Birkenſtraße unbeachtet und blieben auch, weil ſie die Zeit noch nicht richtig zu bemeſſen wußten, drei bis vier Tage über den geſetzmäßigen Termin der Abreiſe.

Kurz und gut, das Verhalten der Thurmſchwalben in den drei letzten Jahren iſt abweichend von Allem, was die fleißigſten und einſichtigſten Beobachter über dieſe Vögel feſtgeſtellt haben.

Niemann, Regierungs- und Baurath a. D.

Briefliche Mittheilungen.

Hier in Mürren, 5600 Fuß hoch, angetroffen: Alpendohlen, Rothkehlchen, Hausrothſchwanz, Kohlmeiſen und Gebirgsbachſtelzen. Auch der Sperling kommt hier oben vor, während derſelbe auf der ſchyniger Platte nicht vorkommt.

Karl Kullmann.

... Richtet ein rothrückiges Würgerpar in einem größeren Garten (10 bis 12 Morgen) weſentlichen Schaden an, ſodaß ſeine Vernichtung nöthig iſt?*)

Mitte Mai beobachtete ich wiederholt einen Würger, der mit ſeinem Weibchen mit beſonderer Vorliebe auf einem trocknen Aſt ſaß. In einem Dornengebüſch in nächſter Nähe hatten ſie ihr Neſt erbaut. Die Vögel waren garnicht ſcheu, blieben ſtillvergnügt ſitzen, wenn ich in einer Entfernung von drei bis vier Schritt an ihnen vorüberging. An einem Chriſtusdorn hatten ſie unzählige Maikäfer aufgeſpießt. Ein Bekannter, dem ich die Ueberreſte ihrer Mahlzeiten zeigte, rieth mir, die Vögel zu erſchießen, denn: „bald werden ſie an den Dornen junge Vögel aufſpießen“. Eines Nachmittags wurde ich durch heftiges Geſchrei junger Vögel in die Nähe des Chriſtusdorns gelockt. Richtig, durch den Hals geſpießt hing ein ſchon befiedertes junges Vögelchen an einem Dorn. Den Kopf des Thierchens hatte der Würger bereits an ſeine fünf ihn unter lebhaftem Geſchrei beſtürmenden Jungen vertheilt. Schwanzwippend und drehend ſaß das Weibchen auf bewußtem Aſt, ab und zu ließ ſie ein warnendes „täck täck“ ertönen. Der Prophezeihung meines Freundes hatte ich nicht recht geglaubt. Einerſeits that es mir leid, die Vögel zu erſchießen, und dann hatte ich oft geſehen, wie der alte Würger eifrig vom Raſen allerlei Kerbthiere aufpickte. Nach dieſem Beweis ſeiner Mordluſt beſchloß ich jedoch die Thiere zu töten. Als ich mich am nächſten Tag bewaffnet dahin begab, war die Geſellſchaft wieder beim Verſpeiſen eines aufgeſpießten Etwas. Nachdem ich den Alten und zwei Junge geſchoſſen, beſah ich das

---

*) Antwort unter Anfragen und Auskunft. D. L.

Opfer, das diesmal eine junge Maus war. Die Hirnſchale war zertrümmert und das Gehirn herausgepickt. Das Weibchen bewachte nun die Jungen mit größter Aufmerkſamkeit. Kaum nahte ich, ſo ertönte ihr warnender Ruf und fort waren ſie im Nu. Sehr gern hielten ſich die Vögel im Gemüſegarten in den Schotenbeeten auf. Einer ſaß Wache haltend auf einem Stock; ſowie ich mich ſehen ließ, fing er an, mit dem Schwanz zu drehen. Erſchien ihm meine Nähe gefährlich, ſo ertönte ſein rauhes „ſchrärä“. Oft auch noch, ehe ich den Vogel geſehen, ließ er ſeinen Warnruf erſchallen. Ich gab es daher auf, die Vögel weiter zu verfolgen. Hier ſcheinen die Würger ziemlich häufig vorzukommen, denn ich bemerkte ſie bei Spaziergängen wiederholt auf Tannenbäumchen ſitzend in Remiſen.

E. Knaps.

. . . Meine jungen Schwalben freſſen bereits allein und ſind prächtig befiedert.

Frau R. Siegmund.

Anfragen u. Auskunft.

Herrn B. Mantes: 1. Inbetreff der Verpflegung der Nachtigalen verweiſe ich Sie auf den Artikel des Herrn Anzinger in Nr. 21 und 23 d. J. Das Aufzuchtfutter für Schwarzplättchen beſteht aus Semmel in Milch, friſchen Ameiſenpuppen, zerſchnittenen Mehlwürmern, allmählich hartgekochtem geriebnem Ei; ſpäter geben Sie getrocknete aufgequellte oder friſche Ameiſenpuppen, oder Weißwurm mit geriebner Möre und geriebnem Eierbrot oder Weißbrot gemiſcht. 2. Nach meiner Erfahrung haben die Verſuche, einen feinen Harzer Kanarienvogel zum Lehrer der Nachtigal zu machen, keine glücklichen Erfolge gehabt; es wurden ſtets nur Stümper erzielt. 3. Aufgepäppelte Schwarzplättchen und Stiglitze dagegen lernen den Geſang des Kanarienvogels ſehr gut.

Herrn E. Knaps: 1. Sie haben Ihren Kanarienvogel bisher zu fett gefüttert. Laſſen Sie das Ei eine Zeit lang, beſonders während der großen Hitze, fort und geben Sie häufig Dolbenrieſche oder Tradescantia, die natürlich nicht feucht, ſondern lufttrocken ſein muß. 2. Der rothrückige Würger kann allerdings in einem Garten durch Plündern der Neſter nützlicher Vögel recht ſchädlich werden. Ich rathe Ihnen nun, die Würger, anſtatt ſie abzuſchießen, lieber zu fangen und als Stubenvögel zu halten.

Fräulein N. Enke: Das mir überſandte Citronfinkenweibchen war bereits in Verweſung übergegangen, alſo nicht mehr unterſuchungsfähig, was in Anbetracht der weiten Reiſe bei der herrſchenden Hitze nicht zu verwundern iſt. Die Fütterung war richtig; nur bedarf dieſe Art auch der Zugabe von wenig friſchen Ameiſenpuppen oder Weichfutter und hin und wieder eines Mehlwurms. Als Leckerei geben Sie Birken- und Erlenſamen.

Frau R. Siegmund: Ich rathe Ihnen, ein Pärchen chineſiſcher Zwergwachteln (15 bis 20 ℳ) oder ein Pärchen ſchwarzkehliger Laufhühnchen (15 bis 20 ℳ) in die Vogelſtube zu ſetzen. Sie werden an den reizenden Vögeln viele Freude haben.

Herrn L. Totte: Der eingeſandte Graupapagei war an heftiger Darmentzündung geſtorben.

Herrn Erich Mendelsſohn: 1. Ihre erſte Anfrage iſt bereits in Nr. 31 beantwortet worden. 2. Der Name Hypolaïs philomela, *L.*, s. H. icterina, *Vll.*, für den Gelbſpötter iſt richtig; ich nenne jedoch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimiſche Vögel) der einfacheren Ueberſicht wegen alle den Grasmücken verwandten Vögel Sylvia. Daher konnte ich auf den von Linné gegebenen Namen Sylvia hypolaïs zurückgreifen. 2. Einen Vogelſchutzverein, wie Sie ihn meinen, gibt es meines Wiſſens nicht.

Briefwechſel.

Den Herren Oberleutnant **Hauth**, **Joſef Wagner**, **Fr. Anzinger**, **Hauſer**, **Dankler**, **Aelbert**, Revierförſter **Rohl**: Beſten Dank für Ihre Beiträge.

Herrn K. Kullmann: Herzlichen Dank für Ihre Grüße aus der Schweiz.

Herrn Federico Eichlam: Wir bringen die „Trupiale“ vor den „Organiſten“ zum Abdruck.

Berichtigung.

Die in Nr. 31 von Herrn Dr. med. Otto erwähnte Fabrik für Nährſalzextrakt gehört der Firma **Hewel und Veithen** in Köln (nicht Horch und Verthen).

Zu unſerm Bilde.

Unſer Bild zeigt einen der bekannteſten und einen der ſeltenſten Araras. **Der hellrothe Arara** (Psittacus macao, *L.*) oder Arakanga iſt eine der gewöhnlichſten Erſcheinungen in den zoologiſchen Gärten und auf den Vogelausſtellungen faſt regelmäßig vertreten. Er iſt an Kopf und Kopfſeiten ſcharlachroth; Hinterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken, himmelblau; Schwingen nebſt Deckfedern blau, an der Innenfahne ſchwärzlich; die größten oberſeitigen Flügeldecken nebſt den langen Schulterfedern orangegelb mit grünem Endfleck, Eckflügel blau; ganze übrige Oberſeite ſcharlachroth; Schwanzfedern am Ende himmelblau, die beiden äußerſten ganz blau, dann dieſe Farbe allmählich abnehmend, ſodaß ſie auf den beiden mittelſten nur noch als kleiner Punkt erſcheint; ganze Unterſeite gleichfalls ſcharlachroth, nur die unteren Schwanzdecken blau; Oberſchnabel horngrauweiß, am Grund mit ſchwarzem Fleck, Unterſchnabel ſchwarz; Auge gelblichweiß, die nackten Wangen fleiſchfarbenweiß; Füße ſchwärzlichgrau mit ſchwarzen Krallen. Faſt Haushahngröße. Ueber ſein Freileben iſt von den Reiſenden, und zwar ſchon von altersher, ausführlicher berichtet worden, als über das anderer Vögel ſeiner Art. In den Urwäldern ſeiner Heimat, die ſich von Mexiko über Mittelamerika und das nördliche Südamerika bis Peru erſtreckt, lebt der prächtige Vogel zur Niſtzeit pärchenweiſe. Die Höhlungen uralter rieſiger Bäume enthalten ſein Neſt, und zwar bezieht jedes Pärchen alljährlich wieder daſſelbe, vorher erwählte. Das Gelege beſteht in nur zwei weißen Eiern, die vom Weibchen allein erbrütet werden. Ein ſolcher Baum mit dem Neſt des Arakanga, das ſich durch den lang daraus hervorragenden Schwanz des brütenden Weibchens verräth, wird von den Indianern ſehr geſchätzt. Er vererbt ſich vom Vater auf den Sohn, denn obwol alljährlich ausgeraubt, wird er von den Vögeln doch immer wieder bezogen. Die von den Indianern aus dem Neſt genommenen Jungen werden aufgefüttert und, meiſt ſchon völlig zahm, in den Hafenſtädten verkauft. Auch um der bunten Federn willen werden die Arakangas von den Eingeborenen verfolgt. Ihre größten Feinde aber ſind die Anſiedler, die ſie förmlich haſſen und erbarmungslos niederſchießen, wo ſie ſie finden. Hervorgerufen wird dieſe Wuth gegen die ſchönen Vögel durch den Schaden, den ſie an Mais u. a. Nutzgewächſen verurſachen. Denn wenn die Niſtzeit vorüber iſt, verſammeln ſich die Araras zu großen Schwärmen, verlaſſen den Urwald und ſtreichen an der Küſte umher, wo ſie die Anpflanzungen nach Nahrung ſuchend, die in allerlei Baumfrüchten und Sämereien beſteht, räuberiſch überfallen. In der Gefangenſchaft wird der hellrothe Arara bei ſachgemäßer, liebevoller Behandlung oft ungemein zahm, läßt ſich leicht zum freien Ein- und Ausfliegen gewöhnen, zeigt ſich liebenswürdig und ſprachbegabt. Man füttert ihn wie die Amazonen.

Sehr ſelten iſt der aus dem Innern Braſiliens und Paraguays ſtammende Azara's Arara (Psittacus Azarae, *Rchw.*). Auf der ganzen Oberſeite iſt er blau, Stirn grünlich angeflogen; ganze Unterſeite mit Ausnahme der blauen Unterſchwanzdecken und Schenkel goldgelb. Er iſt etwas kleiner als der Arakanga.

K. R.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Futtermittel.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko 4½, à Ltr. 1 ℳ.

Muska, hochf. 98er, à Ko. 3, 5 Ko. 14 ℳ.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 5, à Ko. 9.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.

Bisquit u. Eierbrot, beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,80
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,20
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,—
do. algeriſche	„ „ „ „	2,
do. indiſche	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	5,—

Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, -Dtz. 45 ₰. [1484]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Weißwurm, ganz rein, à Ltr. 60 ₰, bei 20 Ltr. franko. 1 gute **Haidelerche,** Nachtſänger, 5 ℳ, geg. Nachn. [1485]

Jos. Ehrlich,
Würzburg, Weißenburgerſtraße.

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [1486]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Friſche Ameiſeneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt **Zeke** der einzige Erſatz Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zeke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Drogerien. Man verlange Zeke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1487]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Neue getr. Ameiſeneier,

deutſche, hochprima, helle Qualität, p. Ltr. 1 ℳ, p. 10 Liter 9 ℳ, empfiehlt [1488]

Carl Kämpf, Mainz.

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [1489]

Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos)

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche **inſektenfreſſende Singvögel** von Apotheker **Max Kruel.**

Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!

[1490] Allein angefertigt von

Ernst Hanke, Trier, Moſel.

Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Mehlwürmer,

1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ **Paul Bienzeisler,** Tillowitz, O.-S. [1491]

Pa. friſche Ameiſeneier, haltbare, jeden Poſten, à Ltr. 1 ℳ, bei Voreinſ. v. 70 ₰ 4/10 Ltr. frc. **Mehlwürmer,** à L. 5 ℳ. Trockne pa. Ameiſeneier, à L. 90 ₰, empf. [1492

A. Wenisch, Vogelh., Breslau, Schuhbr. 23.

AVOL

Nachtigalen- u Drosselfutter
(Gesetzl. gesch.)
mit und ohne Caretten
per Pfd. 80 Pfg. 9 Pfd. Mk. 7.20 fco.

Dieſes Futter, — in Folge langjähriger Liebhaberei fachkundig nur aus beſten Zuthaten hergeſtellt u. nach eingehender probeweiſer Fütterung durch Herrn

Karl Kullmann, Frankfurt a. M.

auf der großen allgem. Geflügel- u. Vogel-Ausſtellung hier mit dem

I. Preis prämiirt

iſt das Beſte, was es für Inſektenfreſſer gibt.

Auf Verlangen Gratisproben an Liebhaber. Ff. deutſche handbeleſene Ameiſeneier 1899 p. Lit. 70 Pfg., von 10 Liter an franco

F. Grünewald, Offenbach a. M.
Markt 5.

[1493]

Vögel.

Kanarien-Vorſänger!

Vorzügliche tieftourenreichſte, noch nie zur Zucht benutzt und flott durchſingend, nach Geſangsgüte à 12, 15, 20, 25 und 30 ℳ, noch in großartiger Auswahl da. Verſandt überallhin gegen Vorherkaſſe oder Nachnahme mit voller Garantie für Werth, Geſundheit und Probezeit.

[1494] **Julius Häger,**
St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864. Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Empf. gut pfeif. **Schwarzamſeln** à 4 ℳ, gut ſchlag. **Wachteln, Rothhänflinge, Stiglitze u. Grasmücken** à 2 ℳ, **Girlitze u. Goldammern** à 1 ℳ, **Grünfinkl** à 75 ₰, **Zeiſige,** rothe Kreuzſchnäbel u. **Edelfinken** à 1,50 ℳ, 1,0 **Rothrck. Würger,** ff. **Spötter,** à 3 ℳ, dito 1,0 junge **Würger** 1,50 ℳ, **Lachtauben,** Zuchtpar 2 ℳ. Garantie für Geſchlecht und gute Ankunft. [1495]

A. F. Schulz, Breslau I, Altbüßerſtr. 36.

Kanarien-Roller, echte Harzer tourenreiche Sänger, verſ. Junghähne à 3 bis 5 ℳ. Garantie für Hähne u. leb. Ank. **Rud. Weinz,** Idar. [1496]

Neue 1899er

Tyroler Ameiſeneier,

hochfein, weiß und rein, à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk.

Neuer 99er Elbe-Weißwurm

à Ko. 3½ Mk., à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk. [1497]

Zeke (Muska)

à Ko. 3, 5 Ko. 13, 10 Ko. 25 Mk.

J. O. Rohleder
Leipzig-Gohlis
Vogelfutter-Groß-Handlung.

Ameiſeneier,

getrocknete, ſchon 1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigte goldgelbe Ware, liefert per Liter 90 Pf. [1498]

Gottlieb Wanek,
Thierhandlung, **Prag 411, I.**

Alle Vogelfutter, Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig,
Königsplatz 7.

Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1499

Mehlwürmer, 1000 St. geg. Einſ. von 1,50 in Mrkn. verſ. franko [1500]

D. Waschinsky, Berlin NW, Wilsnackerſtr. 63.

Hochfeine ruſſiſche

Sproſſer,

welche ſchon ſeit Frühjahr am Lager und ſchon übermauſert haben, ſehr gute Sänger, wofür ich die volle Garantie übernehme. **1 Nachtigal,** welche ſchon 2 Jahre im Käfig iſt, ſingt ſehr fleiß. bei Tag u. Nacht, 8 ℳ. Die obenerwähnten Sproſſer koſten à St. 8 ℳ. Ferner Herbſtſproſſer, Hähne, à St. 3 ℳ. Nachtigalen, à St. 2 ℳ.

Alles unter Nachnahme. Garantie für Männchen und lebende Ankunft. [1501]

J. Rösner, Temesvar, Ungarn.

Gebe ab: Zebraf. à P. 4 ℳ, Mövchen à P. 3,50 ℳ, Schmetterlingsf. à P. 5 ℳ, ♂ Gürtelgrasf. 6 ℳ, ♂ Rieſenelſter 4 ℳ. [1502]

Blume, Paſtor,
Großeutersdorf (Kahla).

---

1 Par Schafſtelzen	2,50	ℳ,
1 Kohlmeiſe	1,40	„
1 Par Mönchsſittiche	12,00	„
1 Graudroſſel, Ia Sänger,	12,00	„

Joh. Seherr-Thoss,
[1503] Gadderbaum-Bielefeld.

Einen zahmen Buſſard 10 ℳ, **5 Bartmeiſen,** ½ Jahr im Käfig, tadellos befiedert, à 5 ℳ, **1 Blaudroſſel** 12 ℳ, gibt ab **A. David,**
[1504] **Breslau,** Ohlauerſtr. 32.

Inhalt der Nr. 34.

Mittheilungen aus Centralamerika (Fortſetzung).
Ergänzungen zu meinen früheren Züchtungsberichten (Fortſ.).
Vogelliebhaberei und Vogelſchutz.
Brieſliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Berichtigung.
Zu unſerm Bilde.

Anzeigen.

Annahme von Anzeigen in der **Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Neue!!! Ameiseneier,

gute, ſchöne, geſiebte Ware, Ko. 2,80 ℳ, hochprima neue feinſte, weiße Tiroler, Ko. 4,80 ℳ, Lt. 90 ₰, Muska od. Zeſe, Ko. 2,60 ℳ, vorgenannte 3 Sort. 5 Ko. fr. Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahr. ſelbſt erprbt., Ko. 2 ℳ, 3 Ko. fr., ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtliche Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- und Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ mit Sack und alle Futterſorten in unübertroffener 1a Qualität. Reelle Beding. Preisl. gr. [1518]
Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1519]
☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Netzfallen,** kleine 80 ₰, größ. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ, **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [1520]
Gebr. Jansen, M.-Gladbach 112.
Illuſtrirte Preisliſte gratis.



Käfige jeder Art

(Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1521] **Oſchatz** i. S.

Neu! Senſationell!

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausdrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [1522] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

30 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
☞ **Knochenmühlen** ☜
für Hühnerzüchter v. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,**
[1523] Waren i. Mecklenb.
Proſpekte gratis.

Geſangskäſten, [1524]

(Geſangsſpinde, Harzer Vogelbauer, liefert (Prsl. fr.) **A. Bothe,** Weddersleben, Harz.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



Fängisch gestellt.
Zugeschlagen.

ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 8 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1525]
K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

☞ Für alle Arten Vögel fertige ich fachgemäße

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1526]

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1527]

Holzwaarenfabrik.

Holzwaarenfabrik.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1528]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Kautſchukſtempel

von 1,25 bis 2,50 ℳ, Farbkiſſen dazu 50 ₰ liefert [1529]
H. D. Becker, Iſerlohn.

Verkaufe Platzes halber billige Vogelbauer:

Neuntheiligen Geſangskäfig zum Anlernen junger Kanarienvögel, 10 ℳ, Heckbauer 75×40×37 cm groß, 8 ℳ, Wachtelbauer 8 ℳ, Lerchenbauer 8 ℳ, Papageibauer, 1 m hoch u. ½ m Durchmeſſer, 10 ℳ. Die Bauer ſind noch wie neu, tauſche auch Nützliches.
[1530] **L. Brock,**
Eisdorf b. Lützen (Prov. Sachſen).

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze

à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1531]

Futtermittel.

Ameiſeneier,

getrocknete, ſchön 1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigte goldgelbe Ware, liefert per Liter 90 Pf. [1532]
Gottlieb Wanek,
Thierhandlung, Prag 411, I.

Mehlwürmer,

1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ **Paul Bienzeisler.**
[1533] **Tillowitz,** O.-S.

Digitized by Google

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung, ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823). Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg. Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Allianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Beſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 34. Magdeburg, den 24. Auguſt 1899. XXVIII. Jahrg.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Die Trupiale (Icterus) von Guatemala.

II.

Bevor ich zur Behandlung der einzelnen Icterusarten übergehe, möchte ich zuerſt eine Zuſammenſtellung aller hier vorkommenden Spezies vorausſchicken.

Die Liſte des zoologiſchen Muſeums zählt im ganzen elf Arten auf, wovon nur ſieben in der Sammlung vertreten ſind. Feſtgeſtellt ſind bis jetzt als in Guatemala vorkommend jedoch zwölf Arten, und wenn ſich meine Vermuthungen verwirklichen ſollten, käme noch eine dreizehnte Art hinzu, und ich werde am Schluß noch eingehend auf die erwähnte Nr. 13 zurückkommen.

Die Liſte der hieſigen Icterus-Arten ſtellt ſich wie folgt zuſammen:

1. Icterus spurius, *Bp.*
2. ,, Wagleri, *Sclater.*
3. ,, maculiatus, *Selt.*
4. ,, baltimore, *Licht.*
5. ,, Giraudi, *Css.*
6. ,, prosthemelas, *Selt.*
7. ,, pectoralis, *Wagl.*
8. Icterus Sclateri, *Cassin.*
9. ,, Graysoni, *Cassin.*
10. ,, gularis, *Licht.*
11. ,, cucullatus, *Sws.*
12. ,, mesomelas, *Selator.*

13. ? ,, pustulatus, *?.*

Um die Beſtimmung zu erleichtern, habe ich mir eine Liſte ausgearbeitet, wobei nur die ſtichhaltigſten Unterſchiede Berückſichtigung gefunden haben. Nach dieſem Schema können allerdings nur die Männchen beſtimmt werden, betreffs der Weibchen wäre alsdann in den betreffenden Abſchnitten nachzuſehen.

Die Beſchreibungen erfolgen ausſchließlich auf Grund der in meinem Beſitz befindlichen, theils lebenden, theils erlegten und präparirten Vögel. Meine Aufzeichnungen habe ich alle genau nach dem Befund vorgenommen, und namentlich beim Abſtreifen der Bälge meine größte Aufmerkſamkeit den Geſchlechtstheilen zugewendet.

Beſtimmung der in Guatemala vorkommenden Icterus-Arten nach den Männchen.

Hauptfarbe braun und ſchwarz } . . . . I. spurius.

- Hauptfarbe gelb und ſchwarz
  - kein Gelb am Kopf
    - Flügel ohne Weiß . . . . I. Wagleri.
    - Flügel mit Weiß
      - Schwanz ſchwarz . . . . I. maculatus.
      - Schwanz ſchwarz und gelb . . . . I. baltimore.
  - Gelb am Kopf
    - Stirn ſchwarz und Scheitel gelb
      - Schultern gelb, Flügel ſchwarz . . . . I. Giraudi.
      - Schultern grünlich, ſchwarz geſtrichelt, Flügel ſchwarzbraun . . . . I. prosthemelas.
    - Stirn und Scheitel gelb
      - Bruſt ſchwarz geperlt . . . . I. pectoralis.
      - Schultern grünlich oder gelblich mit ſchwarz getuſchter Zeichnung
        - Oberarm weißer Spiegel I. Sclateri.
        - Oberarm gelber Spiegel I. Graysoni.
      - Schultern ſchwarz
        - Schwanz ſchwarz, am Grunde $^1/_8$ gelb . . . . I. gularis.
        - Nur die beiden mittleren Schwanzfedern ſchwarz, die äußeren gelb und ſchwarz
          - Oberarm ohne Spiegel I. cucullatus.
          - Oberarm gelber Spiegel I. mesomelas.
- Hauptfarbe grünlich . . . . I. pustulatus ?.

Der Gartentrupial (Icterus spurius, *L.*). Dieſer abweichend von allen anderen Icterusarten zimmtbraun gefärbte Vogel kommt in ganz Centralamerika vor, und iſt faſt gemein zu nennen. Weniger dagegen trifft man ihn im Handel. Der Volksmund nennt den spurius „chorcha cajete" (ſpr. Tſchortſcha cachete). Cajete iſt außerdem der Ausdruck für die Blüthe einer Campanulacee und ſoll darauf hinweiſen, daß der Vogel kein beutelförmiges Neſt, ſondern ein napfartiges Neſt in der Form einer Glockenblume erbaut. Das oben offene Neſt iſt aus Baſt, Fiber und Grashalmen in niedrigem dichtem Gebüſch freiſtehend errichtet und mit feinen Riſpen und Haren ausgepolſtert. Dichte Kaffeebäume bilden für den spurius einen beliebten Niſtplatz. Der Vogel iſt in der Größe eines Sperlings. Die Geſchlechter ſind verſchiedener Zeichnung.

Männchen: Kopf und Hals tiefſchwarz, nach der Bruſt einen verlängerten ſchwarzen Latz, Bruſt, Leib und Rücken zimmtbraun, die einzelnen Federchen ſchwach hellbraun umſäumt. Nacken und Schulter ſchwarz, jede Feder breit graubraun eingefaßt. Schwanz ſchwarz, die Spitze hellbraun eingefaßt. Obere und untere Schwanzdecken braun. Flügel: Schwungfedern erſter Ordnung grauſchwarz linienartig, heller eingefaßt, die der zweiten Ordnung ſchwarz, am Grunde braun, an den Spitzen grauweiß eingefaßt. Die Deckfederchen erſter Reihe ſchwarz, an den Spitzen weiß geſchuppt und über den Flügeln ſchöne breite weiße Binde bildend. Am Oberarm ein zimmtbrauner Spiegel. Unterſeits die Schwungfedern grau, die unteren Flügeldecken zimmtbraun. Schnabel oben ſchwarz, unten grau, Füße grauſchwarz.

Weibchen: In der Größe mit dem Männchen übereinſtimmend. Die ganze obere Seite von der Stirn bis zum Rücken grünlich, an den Schultern etwas dunkler. Von der Kehle nach der Bruſt 1 cm breiter ſchwarzer Latz. Wangen gelblich, Bruſt und Leib ſchmutzig gelb, Schwanz und Schwanzdecken oberſeits grünlich, unterſeits beides gelblich. Flügel und Schwungfedern bräunlichgrau, Außenfahne linienartig eingefaßt, die Deckfedern ſchwarzgrau mit breiterem ſchmutzigweißem Endſaum und Binden bildend. Deckfederchen am Oberarm ſchwarz, grünlich geſäumt. Schnabel dunkelgrau, unterſeits heller. Auge ſchwarz. Füße grau.

Junges Männchen. Das Jugendkleid des Männchens iſt dem Weibchen täuſchend ähnlich, doch entgehen der aufmerkſamen Unterſuchung verſchiedene Unterſchiede nicht. Zunächſt ſind mit Ausnahme der Wangen alle gelblichen Theile des Weibchens hier viel lebhafter, an der Bruſt ins Ockerbräunliche übergehend, untere Schwanzdecke die künftige zimmtbraune Farbe deutlich zeigend. Am Oberarm ſind die Deckfederchen nicht ſchwarz, ſondern verwaſchen grau.

Waglers Trupial (Icterus Wagleri, *Scl.*). Mehr wie die anderen Icterusarten iſt der vorbenannte Trupial als ein Zugvogel zu betrachten. Er erſcheint in den Frühlingsmonaten in kleinen Zügen und bleibt den Sommer über auf der Hochebene von Guatemala, um zu niſten. Der Lieblingsaufenthalt dieſes Vogels ſind die Kaffeepflanzungen, in welchen des Schattens wegen viele Bananen angepflanzt ſind. Möglichſt

[illegible]

[illegible]

Der Baltimorevogel (Icterus baltimore, L.) [illegible]

[illegible]

eine ſchwarze Binde bildend. Obere und untere Schwanzdecken rothgelb. Schwungfedern erſter Ordnung grauſchwarz, an der Spitze ganz fein linienartig geſäumt. Schwungfedern zweiter Ordnung ſchwarz, die Außenfahne breit weiß eingefaßt. Deckfederchen erſter Reihe ſchwarz, die erſten an der Spitze der Außenfahne weiß gefleckt. Die übrigen Deckfederchen ſchwarz, am Oberarm einen gelben Spiegel. Die unteren Flügeldeckfederchen hellgelb. Oberſchnabel ſchwarzgrau, unterhalb blaugrau, Augen ſchwarz, Füße grauſchwarz.

Weibchen: mit dem Männchen ſehr übereinſtimmend. Die ſchwarzen Schulterfederchen ſchwach gelb geſäumt. Die ſchwarzen Flügeldeckfederchen hell geſäumt, die äußeren hellgrau, die inneren gelb. Beide Geſchlechter variiren hinſichtlich der gelben Färbung, aber auch mit der ſchwarzen Schwanzbinde, welche bald breiter, bald ſchmaler erſcheint.

Jugendkleid: Stirn, Hals, Schultern und Rücken grau mit gelblichem Schein. Kehle und Bruſt ſchmutziggelb, Leib hellgelblichgrau. Schwanz und Schwanzdecken oberhalb olivengrünlich, unterhalb etwas heller, untere Schwanzdecken gelblich. Flügel grau, Schwungfedern erſter und zweiter Ordnung kaum bemerkbar linienartig hell geſäumt. Deckfederchen erſter Reihe wenig weiß geſäumt, die der zweiten Reihe weiß geſpitzt, eine Binde bildend. Oberſchnabel dunkel, Unterſchnabel hellbläulichgrau. Augen ſchwarz. Füße grauſchwarz.

Auch von dieſer Spezies ſind im Muſeum als Weibchen nur Vögel im Jugendkleid ausgeſtellt. Daß ſich auch hierunter Weibchen befinden, will ich nicht bezweifeln, aber die von mir erlegten alten Vögel zeigten in den Geſchlechtern nur die oben erwähnten Unterſchiede. (Fortſetzung folgt.)

Ergänzungen zu meinen früheren Züchtungsberichten.

Von Hauth, Oberleutnant z. D.

II. Züchtung der Paradis-Amandine (Spermestes erythrocephala, *L.*), bzl. Argus-Amandine (Sp. Argus, *Rchb.*)

Anknüpfend an das am Schluß meiner Schilderung in Nr. 6 ds. J. gegebene Verſprechen, noch einmal auf den weiteren Brutverlauf bei obengenanntem, ſeltenen afrikaniſchen Prachtfink zurückzukommen für den Fall, daß mir ſeine volle Züchtung noch glücken ſollte, bitte ich zunächſt eine kurze Wiederholung über das früher Geſagte machen zu dürfen.

In Nr. 1 u. ff. d. J. beſchrieb ich das Gelingen und Mißlingen der Züchtung dieſer ſchönen Amandine für's Erſte mit einem reinraſſigen Weibchen ihrer Art, das zwar ſchon nach einer Woche ſeit dem Einſetzen in die Hecke am 28. Nov. v. J. legte, aber dabei leider mit dem Tode abging. Die alsdann mit einem i. J. 1895 von mir gezüchteten Weibchen Baſtard Paradis-Bandfink fortgeſetzten Zuchtverſuche ſcheiterten zunächſt an allerlei eingetretenen Mißgeſchicken. Auch dieſes Weibchen legte ſchon am 4. Dez. v. J. nach erſt dreiwöchigem Zuſammenſein mit obigem Männchen. Bis Ende Januar war aber noch kein Erfolg zu verzeichnen geweſen. Schließlich geſellte ich dieſem Par auch noch ein Weibchen Bandfink bei, um wenn nicht anders, wenigſtens mit dieſem etwas zu erreichen. So der Stand der Zucht am Schluß meines letzten Berichts. Doch noch vielerlei Schwierigkeiten mußten überwunden werden, bevor ein günſtiges Ergebniß erreicht werden ſollte, welches nunmehr natürlich mit umſo größerer Freude begrüßt wurde.

Schon der nächſte Schritt brachte aber wieder eine neue Enttäuſchung. Noch aus dem erſten Gelege her hatte ich nämlich 2 Eier vom Miſchlingsweibchen an zwei Par japaniſche Mövchen zum Ausbrüten gegeben; je einem Par ein Ei zu den ſchon vorhandenen eigenen, um ja recht ſicher zu gehen. Die ſonſt ausgezeichneten Zuchtvögel verſagten jedoch, indem das eine Par nach einiger Zeit das Brüten vorzeitig aufgab und das andere bei einer nächtlichen Störung gerade das bewußte Ei herauswarf. Beide Eier enthielten bereits weitentwickelte, abgeſtorbene Junge.

Hierauf folgten von Mitte Februar bis Anfang Mai von Seiten des Weibchens Paradis-Bandfink-Miſchling vier Gelege, die beiden erſten aus je zwei Eiern, die anderen aus nur je einem Ei beſtehend. Das Weibchen Bandfink machte in der gleichen Zeit drei Gelege mit je drei Eiern. Aus früher erörterten Gründen ließ ich ſämmtliche Eier von verſchiedenen Mövchenparen erbrüten. Sie zeitigten aus 15 Eiern 10 Junge nach zwölf bis fünfzehntägiger Brutdauer. Drei Stück ſtammten vom erſten, ſieben vom zweiten Weibchen. Acht der Jungen gingen im Alter von vier bis vierzehn Tagen, ſtets an heftiger Darmentzündung ein, und nur aus dem jedesmaligen letzten Gelege der beiden Weibchen wurde je ein Junges nach etwa fünfundzwanzig Tagen flügge; ſie erfreuen ſich noch jetzt beſter Geſundheit.

Ueber das Verhalten der Zuchtvögel ſelbſt iſt zunächſt erwähnenswerth, daß ſowol das Männchen Paradisfink mit beiden Weibchen, wie auch dieſe ſelbſt unter ſich im beſten Einvernehmen lebten und niſteten, abgeſehen von einigen unbedeutenden Beißereien, die anfänglich vorkamen. Trotzdem das Männchen auch mit dem zweiten Weibchen, dem Bandfink, verpart war, lebte es mit dieſem ſozuſagen doch nur in wilder Ehe, d. h. ſie bekümmerten ſich im übrigen nicht ſonderlich um einander; dagegen ſtand es zum Baſtardweibchen im innigſten Verhältniß. Das ruhige, zärtliche, gegen die oft derben Liebkoſungen deſſelben nachſichtige Weſen des Männchen Rothkopf-Amandine hat mich für ſeine Art ſehr eingenommen und ſteht mit ſeinem raufboldigen, neſterzerſtörenden Verhalten freifliegend in der Vogelſtube, wie ich ſolches an einem andern Männchen ſeiner Art früher erlebte, in ſchroffem Gegenſatz. Es empfiehlt ſich alſo, dieſe Art im Einzelkäfig zu halten, zum mindeſten während der Niſtzeit. Daß auch die beiden Weibchen ſo gut mit einander auskamen, war mir eigentlich verwunderlich. Aber ſelbſt zur Zeit, wo ich ſie ſelbſt einige Tage brüten ließ, verfeindeten ſie ſich nicht; doch ſtörten ſie ſich dabei inſofern, als gewöhnlich auch das eine mit dem andern gleichzeitig brüten wollte, wenn es ſich, wie meiſtens, ſo traf, daß die Gelege nicht zur ſelben Zeit erfolgten. Dies veranlaßte aber das rechtmäßige Weibchen, vom Neſt aufzuſtehen und da das andere den rechten Bruttrieb nicht beſaß, ſo lagen die Eier mitunter frei, weshalb ich ſie lieber in den Neſtern der Mövchen vertheilte.

Jedenfalls iſt mit dieſer Züchtung die noch ſo häufig angezweifelte Fruchtbarkeit von Miſchlingen abermals erwieſen, die in dieſem Fall bemerkenswerther iſt, als ja die früher mißlungenen und in dieſer Zeitſchrift erwähnten, gerade mit dieſem Weibchen angeſtellten Zuchtverſuche mit Männchen von verſchiedenen anderen Arten, den Gegnern Recht zu geben ſchienen.

Ich deutete ſchon gelegentlich auf die außergewöhnliche Schwierigkeit hin, der namentlich die Aufzucht der jungen Paradisfink-Miſchlinge begegnete. Dies lag aber keineswegs in einer beſondern Schwierigkeit in der Aufzucht der Art an ſich, als vielmehr in dem Umſtand, daß die Jungen ſtets aus irgendeiner, damals noch nicht aufgeklärten Urſache an ſchwerer Erkrankung der Verdauungsorgane eingingen. Schon ſeit mehreren Monaten kam nämlich in meiner geſammten Vogelhecke kein einziges Junges irgendwelcher Art mehr auf; in allen Neſtern zeigten ſich die gleichen Krankheitserſcheinungen, ohne daß dabei auch nur ein einziger alter Vogel ſie ebenfalls gezeigt hätte. Der Urſache dieſer traurigen Erſcheinung aber auf die Spur zu kommen, war nicht ſo einfach und außerdem ſehr zeitraubend. Natürlich war am nächſten liegend die Annahme, daß ein Futterbeſtandtheil die ſchädliche Wirkung hervorrufen mußte; aber warum blieben dann die anderen Vögel alle wohl und munter, zumal ich an dem Futter nichts auszuſetzen fand. So konnte ich nur auf dem Wege des Verſuchs Aufklärung erhoffen. Da bei den gegenwärtig von mir gehaltenen Vögeln als Futterſtoffe nur Weißhirſe, Spitzſat, Reis und Hafer und ferner gekochtes Hühnerei, Ameiſenpuppen und Weißbrot in Betracht kommen, ſo ließ ich bei den jeweilig wieder ausgekommenen Jungen während der ganzen Dauer der Aufzucht den einen oder den andern Futterſtoff weg, bald das Eifutter, bald die Ameiſenpuppen oder auch beides zugleich und blieb nur beim Körnerfutter allein, ſchließlich nur noch bei Weißhirſe und Spitzſamen, doch alles blieb beim Alten. Indirekt war damit die Unſchädlichkeit der weggelaſſenen Futtermittel erwieſen. Wie ſollte aber die Weißhirſe oder der Spitzſamen ſchlecht ſein, die doch von beſter Beſchaffenheit zu ſein ſchienen; wenigſtens nach ihren äußeren Anzeichen; blieben ja doch, wie geſagt, die alten Vögel dabei geſund. Vielleicht lag alſo der Erkrankung eine Erkältungsurſache zu Grunde? Das Waſſer, das nie anders als gut ſtubenwarm verabreicht wird, konnte ſie ſchwerlich abgeben; aber dennoch gab ich ihnen jetzt nur abgekochtes, lauwarmes Waſſer; umſonſt. Alſo lag es vielleicht an den meiſtens recht dünn hergeſtellten Neſtern? Von nun an polſterte ich ſelbſt die Mulden in allen Neſtern dick mit Bauſtoffen aus, entweder bevor die Brut begann oder unmittelbar nach dem Ausſchlüpfen der Jungen. Auch die Temperatur in der Vogelſtube, es war noch Winterzeit, wurde nun höher gehalten. Abermals alles ohne den gewünſchten Erfolg. Auch einer zur ſelben Zeit eingeſchleppten Milbenplage ging es mit größter Energie mittelſt Lyſol zu Leibe. Mit unheimlicher Gewißheit trat auch weiterhin, nach wie vor ihre Opfer verlangend, die Krankheit auf. Nun war es kein Zweifel mehr. Die Urſache mußte dennoch bei der Weißhirſe oder dem Spitzſamen zu ſuchen ſein. Erſtere war zweifellos gut, aber bei genaueſter Prüfung eines jeden einzelnen Korns vom Spitzſamen, der nebenbei bemerkt vor dem Verfüttern vom Staub und den ihm häufig beigemengten fremden Unkrautkörnern ſorgfältigſt gereinigt wird, fand ich nun viele Körner darunter, die an der Spitze ein wenig ſchwarz erſchienen, auch ſonſt durch mattes Ausſehen von den guten, ſtark glänzenden ſich abhoben; ſie ließen ſich leicht zerreiben und waren ſicherlich durch einen Schmarotzerpilz zerſtört. Der Schimmelpilz kann es nicht gut ſein, denn der Samen war im übrigen völlig frei von dumpfem, ſchimmligem Geruch, ſchien überhaupt von beſter Beſchaffenheit zu ſein, was auch betreffs des größten Theils der Körner der Fall war. Offenbar handelt es ſich um einen Pilz, der ähnlich wie es beim Getreide vorkommt, ſchon auf dem Halm den Spitzſamen befallen hatte und der nun in kleinen Mengen mit unter die geſunde Spitzſat gelangt iſt, die im übrigen aus vollen, großen, ſtark glänzenden, geruch- und ſtaubfreien Körnern, wie eben guter Kanarienſamen ſein ſoll, beſtand. Der nunmehr aus verſchiedenen Bezugsquellen bezogene Spitzſamen war von keiner beſſern Beſchaffenheit und ſo ließ ich ihn bei nächſter ſich bietender Gelegenheit bei der Aufzucht völlig weg. Seitdem kamen in ſämmtlichen Neſtern die Jungen wieder glücklich auf und als die erſten unter ihnen die vorerwähnten zwei Miſchlinge Paradisfink. Da ich auch ſonſt dieſelben Futterſtoffe, wie ſchon ſeit vielen Jahren, in gleicher Weiſe verabreichte und trotzdem jetzt jede Brut wieder regelrecht gedieh, ſo iſt es unzweifelhaft, daß die vom Pilz befallenen Körner die Verdauungsſtörungen hervorgerufen hatten, die wol ſchon in geringen Mengen genügten, um den zarten Organismus der kleinen Jungen zu zerſtören, die aber von den widerſtandsfähigeren alten Vögeln, die möglicherweiſe zum Theil ſie auch gemieden haben mögen, anſcheinend ohne Schaden vertragen wurden. — Ich hoffe, durch dieſe genaue Schilderung zu Nutz und Frommen der armen Vögelchen nicht minder, wie zu dem der Züchter vielleicht den Weg gewieſen zu haben, wo in ſo häufigen Fällen die oft ſcheinbar unerklärlichen Verluſte an Neſtjungen zu ſuchen ſind. (Fortſetzung folgt.)

Vogelliebhaberei und Vogelſchutz.

Von M. Dankler.

Von Zeit zu Zeit geht ein Alarmruf durch die Tagespreſſe, ein Alarmruf zum Schutze der Vögel. Von allen Seiten verlangt man einen wirkſamen Vogelſchutz, und ganz wahrſcheinlich wird in kurzer Zeit unſere Geſetzgebung ſich mit der Frage zu beſchäftigen haben. Bravo, ſo iſt's recht, und ich bin überzeugt, daß ſowol die Leitung als auch die Leſer unſerer Zeitſchrift ſolche Beſtrebungen nach Kräften unterſtützen werden.

Allein, da dieſe Bewegung von den verſchiedenſten Geſichtspunkten ausgeht, ſo werden auch die verſchiedenſten Forderungen geſtellt. Darunter iſt nun eine, die ſchon mehrmals in unſerer Zeitſchrift geſtreift wurde, die ich aber heute einmal etwas genauer betrachten will. Es iſt dies eine Frage, die von allen Seiten beleuchtet und klargeſtellt werden muß, wenn nicht in dem kommenden Geſetze das Kind mit dem Bade ausgegoſſen werden ſoll. Die Forderung jener lautet nämlich dahin, *das Halten und den Handel mit einheimiſchen Singvögeln zu verbieten*. Das wäre ein Schlag für den Vogelliebhaber, aber in Beziehung auf den Vogelſchutz ein Schlag ins Waſſer.

In den nun folgenden Abſätzen will ich das Unhaltbare und Widerſinnige eines ſolchen Verbots zeigen, dann aber im zweiten Theile der Arbeit jenen Eiferern ein Feld (beſſer Felder) zeigen, auf denen ſie ihre Kräfte entfalten können und ſollen, und worauf ihre Arbeit auch reichen Nutzen bringen wird.

Alſo das Halten und Verkaufen inländiſcher Singvögel ſoll verboten werden! Warum denn? Unſere Gegner haben beſonders zwei Antworten bereit. Sie ſagen: 1. Das Halten der Singvögel iſt Quälerei, 2. durch das Fortfangen der Vögel zu Liebhaberzwecken wird der Beſtand derſelben immer mehr verringert.

Betrachten wir zuerſt die Antwort: „Das Halten der Singvögel iſt Quälerei." Wer ſchreibt das? Natürlich ſolche, die ſelbſt keine Vögel halten und von der ganzen Vogelliebhaberei ſo viel Ahnung haben, daß ſie wiſſen, daß die Vögel in Körben ſitzen. Zeigen wir Solchen ein par Momentbilder aus dem Leben eines Vogelliebhabers! Da hat er z. B. eine gut ſchlagende Nachtigal entdeckt, die er für ſein Heim zu gewinnen ſucht. Schon früh am Morgen und früh im Jahr ſchleicht er mit ſeinem Schlagnetzchen hinaus, und o Freude, nach ein par Stunden hat er die erſehnte kleine Sängerin in ſeiner Gewalt. Wol pocht das Herz des kleinen Thierchens ängſtlich gegen ſeine Hand; aber wie zärtlich und vorſichtig trägt er es nach Haus, und welche Pflege wartet dort ſeiner! Die beſten Leckerbiſſen werden ihm angeboten, und in kurzer Zeit hat das Thier ſeinen Pfleger kennen und lieben gelernt. Und nachdem es eingewöhnt iſt, beweiſt ſein Geſang, wie wohl es ſich fühlt. Iſt eine derartige Behandlung etwa Thierquälerei? Ja, aber der Vogel wäre doch lieber frei, wirft unſer Gegner ein. Mag ſein; aber der Verluſt der Freiheit wird ja bezahlt durch gute Pflege, und die Freiheit iſt ein ſehr relativer Begriff. Wer genießt volle Freiheit? Etwa der Menſch, der Herr der Schöpfung? Jawohl, der größte Theil der Menſchheit iſt in einer Lage, die ſeine Freiheit zu einer ſchönen Illuſion macht. In dumpfen Fabrikräumen eingeſchloſſen, von ſtampfenden, raſſelnden, brüllenden Maſchinen umgeben, verlebt ein großer Theil der Menſchen ſeine Tage, andere kriechen mühſelig und in den größten Gefahren durch den Bauch der Erde, Tauſende braten als Heizer und Kohlenſchieber im Schoße der großen Dampfſchiffe. Und wer zwingt ſie dazu? Die gebieteriſche Nothwendigkeit. Nur Gefühlsduſelei vermag daher einen gutgepflegten Vogel für unglücklich zu erklären, eben weil er eingeſperrt iſt. Aus denſelben Gründen könnten die Aufſteller jener Forderung fordern, daß wir allen Hausthieren die Freiheit gäben. Unzweifelhaft würde das ſtolze Pferd lieber durch Feld und Wald ſtreifen, als die eine Hälfte ſeines Lebens im Stalle, die andere bei ſchwerer Arbeit zuzubringen; aber daraus die Forderung abzuleiten, nun das Pferd frei laufen zu laſſen und auf die Vortheile zu verzichten, die es uns bietet, eine ſolche Forderung wird wol keiner ſtellen, und wer ſie ſtellte, der würde damit ein ſonderbares Lächeln hervorrufen. Aehnlich iſt es bei allen anderen Hausthieren. Nun alſo, wenn ihr tauſende und abertauſende Thiere im Dienſte des Menſchen ſeht, alle mehr oder weniger gefangen, ſo ſchlagt doch nicht um ein Thierchen, um den Singvogel, der gerade zu den am beſten behandelten Thieren gehört, Lärm.

Studire doch einmal jeder die Futterſtoffe, welche die Vögel erhalten! Vielleicht iſt der Arbeiter froh, wenn er jeden Mittag ein Stück Speck hat; aber ſein Vogel, ſein Liebling bekommt geſchabtes Rindfleiſch, Rinderherz, Zucker, Eigelb und wie die leckeren Dinge alle heißen mögen. Iſt das Thierquälerei? Ich will natürlich nicht im geringſten beſtreiten, daß Ausnahmen vorkommen, wo die Vögel durch ſchlechte Pflege und unpaſſende Käfige zu leiden haben; aber das ſind Ausnahmen. Denn auch der Dümmſte weiß oder erfährt bald, daß ſeine Vögel in dieſem Falle nicht ſingen und bald eingehen, und ſucht Abhilfe. Dieſer Ausnahmen wegen aber das Halten von Singvögeln im allgemeinen verbieten zu wollen, iſt daſſelbe, als wenn man z. B. den Jagdhund zu halten verböte, weil er von einzelnen rauhen Jägern hart behandelt wird. Ja, werden die Gegner ſagen, da kommt der ſchon wieder mit einem Vergleich! Aber ſachte, gerade an Vergleichen kann man ſo recht nett die Unhaltbarkeit der Einwürfe beweiſen. (Wo allerdings offenbare Quälerei vorfällt, wo z. B. Liebhaber auf Irrwege gerathen, da kann die Polizei ja auf Grund des Thierſchutzparagraphen einſchreiten, wie es ſtets geſchehen ſollte, wenn Vögel zu irgendeinem Zweck geblendet werden. Ein derartiges Verfahren (alſo das Blenden) kann ich garnicht ſcharf genug verurtheilen, es iſt eine gemeine Rohheit und durch keine Sophismen zu entſchuldigen. Hier ſollte jeder die Thierſchutzvereine unterſtützen und ihm bekannte Fälle rückſichtslos zur Anzeige bringen. Gefängniß iſt der einzig richtige Lohn für ſolche Rohheit.) Aber das Halten der Singvögel zu verbieten, weil unter 1000 Vogelliebhabern vielleicht ein roher, herzloſer Patron iſt, das wäre ein großes Unrecht.

Was die Käfigfrage angeht, ſo darf man dreiſt behaupten, daß hier der Fortſchritt ein ſtetiger war und iſt. Nur ſelten findet man noch, daß Vögel in zu kleine, enge Käfige gepfropft werden, vielmehr geht jeder Liebhaber darauf aus, den Käfig ſeiner Lieblinge deren Natur anzupaſſen und ſtets zu vervollkommnen.

Ueberblicken wir das bis jetzt Beſprochene einmal, ſo werden wir finden, daß gerade der Singvogel dasjenige Thier iſt, welches ſich in der Gefangenſchaft, ſowol was Behandlung als auch Futter und Wohnung anbetrifft, ſich der allerbeſten Pflege erfreut, einer Pflege, die keinem andern Hausthier auch nur in entferntem Maß zu Theil wird. Der Vorwurf der Thierquälerei iſt demnach null und nichtig.

Gehen wir jetzt zum zweiten Punkte über, welcher lautet: „Durch die Vogelliebhaberei, durch Handel und Halten einheimiſcher Singvögel wird der Beſtand an Singvögeln in einer Gegend arg gemindert.“ Dieſer Grund ſcheint im erſten Moment etwas für ſich zu haben; aber bei genauerer Betrachtung und Ueberlegung wird man finden, daß gerade das Gegentheil der Fall iſt. Verſchiedene Umſtände tragen dazu bei. Zunächſt iſt es die Sorge aller Vogelliebhaber, einen guten Vogelſtamm in ihrer Gegend zu erhalten, um daraus ihren Beſtand ergänzen zu können. So kenne ich eine ganze Anzahl Vogelliebhaber, die durch ſchwere Arbeit an geeigneten Waldſtellen in der Nähe rieſelnder Gewäſſer für Nachtigalenbrutſtätten ſorgen, indem ſie ſchier undurchdringliche Dornendickichte anlegen. Ich kenne ſolche, die im Frühling nicht ausgehen, ohne die Taſchen voll Samen und Stecklinge von Futterpflanzen zu haben und dieſe anſäen und pflanzen, wo ſich ein paſſendes Plätzchen bietet. Ich kenne ſolche, die ganze Nachmittage dazu verwenden, Stöcke auszuhöhlen, um Höhlenbrüter heranzuziehen. Und wenn erſt der ſtrenge Winter kommt, dann begnügt der Liebhaber ſich nicht damit, einige Brotkrumen und Kartoffelreſte zum Fenſter hinauszuwerfen, wovon ſich hauptſächlich die Spatzen mäſten, ſondern dann legt er im Garten einen Futterplatz an und bietet darauf gerade jenen Vögeln Nahrung, die nur in größter Not an die Fenſter und auf den Hof kommen.

Mit Schaufel und Futterſtückchen wandert er durch den kniehohen Schnee dem Walde zu und errichtet auch hier einen Futterplatz, den er noch durch Reiſig und Nadelholzzweige vor dem Zuſchneien ſchützt. Hier ſtreut er den Unkrautſamen, den er beim Bauern eingehandelt, aber auch Speckreſte, Sonnenblumenkerne und Haſelnußkerne, an die umherſtehenden Bäume nagelt er an der geſchützten Seite mächtige Speckſchwarten. Ich wünſche jedem Gegner der Vogelliebhaber, daß er wol das Treiben und Speiſen auf einem ſolchen Futterplatze in bitterer Winterzeit beobachten könnte. Dann würde er einſehen, daß ein ſolcher Vogelfreund in einem Winter mehr Vögel am Leben erhält und durchfüttert, als er vielleicht im ganzen Leben fängt und ſo der Natur entzieht. Ja, könnte hier einer einwerfen, das Füttern iſt wol gut, aber das kann jeder, dazu braucht er keine Vögel zu halten. Das ſollte man meinen, aber es iſt nicht ſo. Nur derjenige, der die Bedürfniſſe der Vögel, ihre Arten und die Art ihrer Nahrung kennt, kann wirkſam füttern, vor allem ſo, daß alle etwas paſſendes erhalten. Was es heißt, einen wilden Vogel zu füttern, hat wol ſchon jeder erfahren, der einem in's Zimmer verirrten Vogel Gaſtfreundſchaft erwies. In wie vielen Fällen muß der Vogel die Gaſtfreundſchaft mit ſeinem Leben bezahlen. Ein par Beiſpiele: Eine alte Dame meiner Bekanntſchaft hat ein ſo gutes Herz, daß ſie alles, was da fleucht und kreucht, in ihr Haus aufnimmt und es zu füttern verſucht. So kommt auch kein verflogener Vogel aus ihrem Hauſe, ohne ordentlich geſpeiſt worden zu ſein. So fand ſie vor einiger Zeit ein par junge Meiſen, die kaum flügge waren und fortwährend weit die Schnäbel aufriſſen. Das war ihr Fall. Sie wurden mit Weißbrot, Kartoffeln und Rübſamen bewirthet, bis ſie die Augen verdrehten und ſtarben. „Trotzdem ſie tüchtig gefreſſen, gingen ſie kaput“, ſagte ſie nächſten Tages ganz traurig, daß ſie ſtatt „Trotzdem“ hätte „weil“ ſagen ſollen, und daß der Magen junger Meiſen nicht auf Weißbrot, Kartoffeln und dergl. eingerichtet ſein könnte, daran dachte ſie nicht. Alte Meiſen hätten das Futter auch nicht genommen. Ganz genau daſſelbe ſchlechte Reſultat erzielte ein alter Gewürzkrämer, der einem jungen Kukuk, den ſein Sohn mit vieler Mühe zwei Wochen mit Räupchen und Ameiſeneiern erhalten, den Balg mit Wurſt füllte, worauf dieſer ſo ſchnell wie möglich Flügel und Beine ſtreckte und verendete. Alſo ſcheint es doch, daß das Füttern gekannt ſein muß. Wenn ich auch die beiden Beiſpiele mehr als Kurioſa anführe, wol jeder Vogelzüchter hat ſchon Erfahrungen damit gemacht.

(Schluß folgt.)

Briefliche Mittheilungen.

... Seit drei Jahren eifrigſter Papageienliebhaber und ſelbſtverſtändlich Beſitzer Ihres vortrefflichen Buches: „Die ſprechenden Papageien“, ſowie Abonnent der „Gefiederten Welt“, machte ich vor einigen Tagen die briefliche Bekanntſchaft eines Herrn N. Wieſe, erſter Vorſitzender des „Vereins für Vogelfreunde“ der drei ſkandinaviſchen Länder. Dieſer Herr ſeit Jahren Vogelliebhaber und neuerdings Züchter von gelben Wellenſittichen und Singſittichen, theilt mir in ſeinem heutigen Brief vom 14. d. M. folgendes mit: „Es wird Sie gewiß intereſſiren, daß es hier im Lande einen Vogelfreund gibt, der eine ganze Reihe Papageien beſitzt, wie Hyazinth-Arara, hell- und dunkelrothen Arara, kleinen blauen Arara, Zwerg-Arara, zwei Arten Schwarz-Papageien, Jako, diverſe Kakadu's, einen ſchwarzköpfigen Lori, weiter mehrere Amazonen und Edelpapageien. Alle dieſe Vögel fliegen das ganze Jahr jeden Tag frei aus und ein, ganz wie Tauben. Sie ſind über die ganze Stadt bekannt und fliegen meilenweit in's Land hinaus; doch hat er noch nie einen Verluſt gehabt. Dieſer Fall dürfte einzig daſtehen! — Eben wurden einige dieſer Vögel auf einer hieſigen Ausſtellung mit zwei Ehrenpreiſen belohnt!"

Vielleicht gelingt es mir, den Namen dieſes Herrn zu erfahren und ihn ſelbſt zu näheren Angaben über ſeine „Freiheitshelden" zu bewegen. —

Dagegen bin ich mit meinem zahmen Zwergarara, Kubaamazone, ſprechenden Elfenbein- und Feuerflügelſittich — alles Vögel, die im Zimmer frei ſitzen und taubenzahm ſind — nur ein Kind!

Rich. Engelhardt, Mitglied des Reſidenztheaters.

... Sie ſagen in Nr. 32 vom **Feldſperling** (Passer montanus), er niſte nur ſehr ſelten unterm Hausdach (in Gebäuden). Bei mir zu Haus bei Nierſtein brütet er ſtets in Menge in Mauerlöchern von Scheunen und Fabrikgebäuden. Freilich liegen die Gebäude einſam und ſind nicht von Menſchen bewohnt. Passer domesticus brütet in dieſen Gebäuden wenig oder gar nicht, ſondern nur in den weit offenen Ritzen über den Fenſtern des Wohnhauſes. So frei wie auf dem übrigens hübſchen Bilde fand ich Passer montanus noch nie brütend. Fragen Sie doch einmal in der „Gefiederten Welt" an, ob dies öfter auch in anderen Gegenden beobachtet wird.

O. Kleinſchmidt.

... Vielleicht wird es Sie intereſſiren, daß ich in dieſem Frühjahr von einem hieſigen Liebhaber einen vorjährigen Kanarienhahn gekauft habe, welcher Touren des Schwarzplättchens wie auch des Rothkehlchens in ſeinem Naturgeſang vorträgt. Auch bringt er 7 bis 8 mal nach einander das Tack, tack der Amſel wirklich prachtvoll. Das Ganze hört ſich ſehr ſchön an und man glaubt oft mitten in die Natur verſetzt zu ſein, ſo täuſchend ahmt er den Geſang nach. **P. Mautes.**

Anfragen u.
Auskunft

Herrn Hugo Schroeder: 1. Um Ihre Rothbugamazone zu zähmen, beachten Sie Folgendes: Der Papagei darf ſeinen Stand niemals höher, ſondern er muß ihn ſtets niedriger als das menſchliche Auge haben. Er iſt immer ſo zu ſtellen, daß der Verpfleger ſich zwiſchen ihm und dem Licht befinde. Namentlich aber machen Sie ihn möglichſt hilflos, d. h. Sie ſetzen ihn in einen recht engen Käfig (aber nicht etwa für immer). Nachdem Sie ihm für einige Stunden das Trinkwaſſer entzogen, halten Sie ihm daſſelbe ſo hin, daß er, um dazu zu gelangen, nur über die Hand hinwegreichen kann. Unſchwer gewöhnt er ſich ſo an dieſe, kommt freiwillig auf den Finger, läßt ſich dann auch das Köpfchen krauen, nach und nach ſtreicheln, zuletzt völlig anfaſſen und hätſcheln. Beim Füttern wie bei jedem Nahen verhalten Sie ſich immer gleichmäßig ruhig und freundlich und vermeiden Sie es, ihn durch plötzliches haſtiges Herantreten zu erſchrecken. Laſſen Sie ſich auch nie zur Heftigkeit hinreißen. 2. Von den genannten Vögeln können Sie die einheimiſchen Finken, die Wellenſittiche und die rothen Kardinäle im Winter in der Garten-Voliere halten, Sonnenvögel und Indigofinken aber nicht. Da Sie nicht angegeben haben, welche einheimiſchen Weichfreſſer Sie beſitzen, kann ich Ihnen auch nicht rathen, welche Sie draußen überwintern können. Jedenfalls dürfen Zugvögel nicht darunter ſein. 3. In der Voliere von angegebener Größe können Sie ungefähr 6 Zuchtpare halten, natürlich nur ſolche Vögel, die ſich untereinander vertragen. Einzelne Vögel dürfen Sie darunter nicht halten.

Herrn Fr. Anzinger: Daß Ihr Jako nur Hanf und Mais frißt, iſt ein ſehr gutes Zeichen. Wäre er daran gewöhnt, Fleiſch, Gemüſe u. a. Leckerbiſſen zu nehmen, ſo würde er bald zu Grunde gehen. Bieten Sie ihm, einerſeits um ihm eine ihm dienliche und nothwendige Erfriſchung zu gewähren, andererſeits um ihn an Sie zu feſſeln und zutraulich zu machen, oftmals ein Stückchen gutreife, beſte Frucht, ſüße Kirſchen, Birnen, Aepfel, Weintrauben u. dergl.

◆

Berichtigung.

In dem Artikel des Herrn Anzinger: Unſere Würger, hauptſächlich in ihrer Bedeutung als Käfigvögel, muß es auf S. 245 in der 22. Textzeile von oben beim Gegenſatze 2a ſtatt 28 cm richtig heißen 18 cm; S. 246, 23. Zeile von unten ſoll nach dem Worte Raben ein Bindeſtrich ſtehen.

◆

Zu unſerm Bilde.

Alljährlich wird der **Nymphenkakadu** (Psittacus Novae-Hollandiae, *Gml.*) in bedeutender Anzahl aus ſeiner Heimat Auſtralien bei uns eingeführt. Als Stubenvogel hat er viel für und viel wider ſich. Sein eintöniges, anhaltendes Geſchrei, ſein oft dummſcheues Weſen ſchrecken manchen Liebhaber ab; ſeine ſchöne Erſcheinung, im angenehm aſchgrauen Gefieder, mit gelbem Geſicht, hübſch rothen Bäckchen und dem ihm ein ſeltſames Anſehen gebenden Schopf, ſeine kräftige Natur, die ihn im ungeheizten Raum, ja ſelbſt im Freien im Winter ausdauern läßt, ſeine Verträglichkeit anderen Käfigbewohnern gegenüber, ſeine leichte Züchtbarkeit vor allem haben ihm hingegen eine nicht unbedeutende Beliebtheit erworben. In den letzten Jahren namentlich, ſeitdem ſeine Sprachbegabung bekannt, hat man ſich eingehender mit ihm beſchäftigt. Auf der Ausſtellung des Vereins „Ornis" i. J. 1893 war ein ausgezeichneter ſprechender ſelbſtgezüchteter Nymphenkakadu, und ſchon mehrere Jahre vorher beſaß ein Vogelliebhaber in Krakau einen polniſch ſprechenden Vogel dieſer Art. Seitdem taucht hin und wieder die Kunde von ſprechenden Nymphenkakadus auf. Immer aber waren es ſelbſtgezüchtete Vögel, die ſoeben erſt völlig flügge geworden, überraſchend bald zahm und zutraulich wurden und alsbald einzelne Worte, allerdings nur mit dünner Kinderſtimme nachſprechen, auch Melodien nachflöten und manchmal allerlei Vogellieder nachſingen lernten. Die Erhaltung des Nymphenkakadus erfordert keine Schwierigkeit. Man füttert ihn mit mehlhaltigen wie öligen Sämereien, vor allem halbreifem Hafer und gleichen Grasſamen in Rispen. Als Zugabe erhält er wenig friſche Ameiſenpuppen oder Ameiſenpuppengemiſch.

Auch in ſeiner Heimat iſt er als gut abrichtungsfähiger und ſprachbegabter Käfigvogel geſchätzt. Die Jungen werden zahlreich aus den Neſtern geraubt und aufgezogen, die Alten aber in ganzen Schwärmen in Netzen an der Tränke gefangen. Die Anſiedler verfolgen ſie eifrig, nicht weil ſie den Nutzgewächſen beſonders ſchädlich ſind, ſondern weil ſie ein wohlſchmeckendes Wildbret liefern. Den Aufenthalt der Nymphen bilden hauptſächlich die weiten Ebenen im Innern, doch kommen ſie als Zug- oder wol nur Strichvögel zeitweiſe in großen Schwärmen unregelmäßig in den verſchiedenſten Oertlichkeiten vor. Sie ſind ausgezeichnete Flieger. Hurtig auf der Erde umherlaufend ſuchen ſie ihre Nahrung, welche vornehmlich in Gräſerſämereien (Känguruh- und wildes Kanariengras) beſteht; aufgeſcheucht fliegen ſie nur auf die nächſten Gummibäume, in deren Höhlungen auch, jedoch ſtets nur in der Nähe des Waſſers, das Neſt ſich befindet. Die Niſtzeit fällt in die Monate Februar bis März. Das Gelege beſteht aus 6 bis 8, ja bis zu 11 Eiern. **K. R.**

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Prima !!! Ameiſeneier,

99 er Tyroler, hochfeine, weiße, handgeleſene Ware, Ko. 4,50 ℳ, Lt. 85 ₰, 10 Ltr. 8,00 ℳ. 99 er Ameiſeneier, ſchöne geſiebte, Ko. 3 ℳ, Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6,50 ℳ. 99 er Muska od. Zeke, Ko. 2,60 ℳ. Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahr ſelbſt erprbt., Ko. 2 ℳ, 3 Ko. fr., ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtliche Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- und Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ, mit Sack und alle Futterſorten in unübertroffener Ia Qualität. Reelle Beding. Preisl. gr.

Brühl's Vogelexporthaus,
[1534] **Kötzſchenbroda.**

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt [1535] ſandfrei.

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Friſche Ameiſeneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt ☞ **Zeke** ☜ der einzige Erſatz. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zeke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Drogerien. Man verlange Zeke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899 er Ware zu erhalten. [1536]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Alle Vogelfutter,
Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig,
Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1537

AVOL

Nachtigallen- u Droſſelfutter
(Geſe'zl. geſch.)
mit und ohne Carotten
per Pfd. 80 Pfg. 9 Pfd. Mk. 7.20 fco.

Dieſes Futter, — in Folge langjähriger Liebhaberei ſachkundig nur aus beſten Zuthaten hergeſtellt u. nach eingehender probeweiſer Fütterung durch Herrn

Karl Kullmann, Frankfurt a. M.

auf der großen allgem. Geflügel- u. Vogel-Ausſtellung hier mit dem

I. Preis prämiirt

iſt das Beſte, was es für Inſektenfreſſer gibt.

Auf Verlangen Gratisproben an Liebhaber.
Ff. deutſche handbeleſene Ameiſeneier 1899
p. Ltr. 70 Pfg., von 10 Liter an franco

F. Grünewald, Offenbach a. M.
Markt 5.

[1538]

Pa. friſche Ameiſeneier, haltbare, jeden Poſten, à Ltr. 1 ℳ, bei Voreinſ. v. 70 ₰ 4/10 Ltr. frc. Mehlwürmer, à L. 5 ℳ. Trockne pa. Ameiſeneier, à L. 90 ₰, empf. [1539
A. Wenisch, Vogelh., Breslau, Schuhbr. 23.

Geſetzl. geſchützt

„Insectiverous“,

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die
Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1540]
Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Geſetzl. geſchützt.

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1541] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
☞ Muſter und Proſpekte koſtenlos. ☜

Neue getr. Ameiſeneier,

deutſche, hochprima, helle Qualität, p. Ltr. 1 ℳ, p. 10 Liter 9 ℳ, empfiehlt [1542]
Carl Kämpf, Mainz.

Vögel.

Wie alljährlich, habe ich auch in dieſem Jahre mehrere echt ruſſiſche hoch Ia **Frühjahrs-David-Weiden-Sproſſer** bei mir im Käfig vermauſern laſſen und gebe nun dieſelben an wirkliche Kenner des guten Sproſſerſchlages ab um den billigen aber feſten Preis von 25 ℳ franko.

Der Schlag dieſer Vögel bewegt ſich hauptſächlich in Glocken-, Baß-, Moll-, Lach-, Knarr- und Waſſer-Touren und ſchließt jede Geſangsſtrofe mit dem gebührenden Schnapper. Der Vortrag iſt hohl und tief, äußerſt langſam, gewiſſermaßen tragend, ja zur Nachtzeit geradezu feierlich! — **Dieſe Sproſſer ſind ausſchließlich eine Spezialität meines Geſchäftes; ſie haben mit den gewöhnlichen Händler-Sproſſern nichts gemein, ſind auch nur durch mich allein erhältlich und daher ohne jede Konkurrenz!** [1543]

Mathias Rausch,
Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.
NB. Einige gute Frühjahrsſproſſer ohne David, à 15 ℳ, bereits vermauſert, ſind auch lagernd.

S. Risius, Bremerhaven,
empfiehlt: ein Par prachtv. impt. **ſchwarze Schwäne,** 125 ℳ, kleiner ganz zahmer **Hufeiſenbär,** 80 ℳ, **hellroth. Arara,** ganz zahm, 75 ℳ, **Blauſtirn-Amazonen,** Lieder in Worten ſingend u. gut ſprechend, 35 bis 85 ℳ, prachtvolle **Inka-Kakadus** Stck. 35 ℳ, gr. **Gelbh.-Kakadus** Stck. 16 ℳ, kleine **dito** 12 ℳ, 2 Stck. 22 ℳ, **Roſellas** P. 25 ℳ, **Königsſittiche,** mit I. Preis prämirt, P. 65 ℳ, große **Alexanderſittiche** P. 25 ℳ, **Mönchsſittiche** P. 10 ℳ, **Grasſittiche** P. 10 ℳ, 1 **rothbrüſt. Edelſittich** 10 ℳ. [1544]

Im Freien gehaltene und wirklich

geſunde,

kräftige, tadelloſe, ſchöne Vögel kommen zum Verſandt, unter Garantie lebender Ankt. u. ſtreng gewiſſenhafter Bedienung.

Schwarzk. Gouldamandinen, Zuchtp. 22 ℳ
Gelbwangenſittiche, Par 15 „
Pflaumenkopfſittiche, a. Mch. i. Pr., 8,50 „
Peruſittiche, größte Seltenheit, Par 50 „
Rothbrüſt. Edelſittiche, Zuchtpar 12 „
Feuerflügelſittiche, ſingz., St. 13, P. 25 „
Roſenpapageien, richtige Zuchtpare, 25 „
Nymphenſittiche, imp. Zuchtp. 10.50 „
Grauk. Zwergpapageien, P. 3,50, 5 P. 15 „
Halsbandſittiche, Mch., lern. ſpr., St. 5.— „
Wellenſittiche, prachtvolle, echt auſtraliſche, große, ſtarke, ſofort zur Brut ſchreitende Zuchtp. 6 ℳ
Wellenſ.-Naturniſtkäſten, Stück 1.50 „
Beo, Ia, anfangend zu ſprechen, 12.— „
Ind. Sperbertäubch., tadell. ſchön, P. 5 „
Aurora-Aſtrilde, richtige Zuchtp. 6,50 „
Olivengelbgrüne Aſtrilde, Zuchtp. 4.50 „
Braſil. Elſtern, zahm, lern. ſpr., St. 12 „
Imp. Zebrafinken, Zuchtpar 4.50 „
Jap. Mövchen, gelb- u. braunb. P. 3.- „
Braunk. Ammern, Mnch. 3 ℳ, P. 4,50 „
Königs-Ortolan, Mch. i. Pracht, St. 3.— „
Papſtfinken, Mnch. 5.50, Zuchtpar 9 „
Indigofinken, Mnch. 4.50, Zuchtpar 8 „
Safranf. (Goldkanar.), Mch. 4.50, P. 6.50 „
Jamaika Trupial, fingerz., Ia Säng., 16 „
Feuerr. Kardinäle, Ia Säng., Mnch. 9 „
Dominikaner-Kardinäle, Mch., St. 5.50 „
Graue rothgehäubte Kardinäle, Mnch. 5 „
Schneewſ. Reisfinken, zahm, Zp. 6.50 „
do. graue, prachtvolle Zuchtp. 2.50 „
Geſtreifte Malabar-Amand., Zchtp. 2.50 „
Kl. Textorweber in Pracht, Zuchtp. 3 „
Bayweber in Pracht Zuchtp. 8 „
Hartlaub-Zeiſige, Mnch. 3 ℳ, Par 5 „
Grauedelſänger, Mnch. 4, Zuchtp. 6 „
Weißſtirn-Amazon., zahm, ſprechend, 20 „
Etw. ſprech. Amazon., Ia Ia, 25—40 „
Gelbnack.-Amaz., fingerz., ſprech., 40—60 „
Gutſprech. Graupapageien 50—150 „
Graupapageien, akklim., zahm., ſpr., 25—30
Kl. Gelbhaubenkakadu, fingerzahm, 22 ℳ
Roſakakadus, zahm, lernen ſprech., 10 „
99er edle Hohlroller 5—6 „
99er edle Weibchen, 80 ₰, Dtzd. 8.50 „
Weiße Lachtauben, Zuchtp. 5 „
Gelbe Lachtauben, Zuchtp. 2.50 „

In richtigen, kräftigen Zuchtparen: **Schmetterlingsfink.** 2.50, **Helenafaſänch.** 2.00, **Chineſerfinken** 1.80, **Aſtrilde** 2.00, **Goldbrüſtchen** 2.50, **kl. Elſterchen** 2.50, **Orangebäckchen** 1.50, **Muskatfinken** 2.00, **Silberfaſänchen** 2.50, **Bandfinken** 2.00, in Pracht kommend. **Paradiswittwen** 3.50, **Atlasfinken** 2.50, **Napoleonsweber** 2.00, **Orangeweber** 2.00, **Blutſchnabelweber** 2, **Tigerfinken** 2.00 ℳ. Von dieſen Senegalvögeln, gemiſcht nach meiner Wahl in reizendem Sortiment, 5 Par 9 ℳ, 10 Par 16 ℳ, 20 Par 30 ℳ.

Goldfiſche, pr. hochroth, abſolut geſunde Ware, 5—8 cm lang, 6 ℳ, 8—12 cm lang, 9 ℳ, 5—12 cm lang, 8 ℳ, per 100 franko mit Kanne. [1545]

Alle Sorten pr. Vogelfutter. Preisl. gratis.

Georg Brühl, Vogel-Exporthaus,
Kötzſchenbroda b. Dresden,
Größtes Spezialgeſchäft dieſer Branche.

Orpheus-Grasmücken,

ſchöne, garantirte Männchen, à 9 ℳ, dito minder ſchöne, à 5—6 ℳ, dito ohne Gewähr fürs Geſchlecht, à 3 ℳ

Frühjahrswildfänge

von Blaukehlchen à 7 ℳ, Gebirgsſchwarzköpfe à 6 ℳ, Gelbſpötter à 7 ℳ, Gartengrasmücken à 6 ℳ, Pirole, ausgefärbt, à 10 ℳ, ſofort lieferbar. Ferner von Mitte Auguſt ab

Herbſtwildfänge

von Blaudroſſeln à 15 ℳ, Steinrötheln à 10 ℳ, Sproſſern à 5 bis 7 ℳ, je nach Herkommen, Nachtigalen à 2,50—4 ℳ, Gelbſpöttern à 3 ℳ, Gebirgsſchwarzköpfen und Gartengrasmücken à 3—4 ℳ, junge Sperbergrasmücken à 2 ℳ empfiehlt

Mathias Rausch,

Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten
[1546] Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Bartmeisen,

P. 8 ℳ, Schwanz-, Specht- u. Haubenmeiſen à P. 4 ℳ, Tannen- u. Blaumeiſen à P. 2 ℳ, Zaunkönige u. Baumläufer à P. 6 ℳ, Kl. Buntſpecht (Picus minor) à Stck. 10 ℳ, Mittelbuntſpecht à Stck. 6 ℳ, junger, ganz zahmer Eichelhäher, lernt leicht ſprechen, 6 ℳ, Strandläufer à Stck. 10 ℳ, Schwarz- u. Erandroſſeln à Stck. 6 ℳ, Blaukehlchen u. Hausrotſchwanz à Stck. 4 ℳ, Wbch. 2 ℳ, Baum- u. Wieſenſpringer, weiße u. gelbe Bachſtelzen, Krappen- und Gartenammern à Stck. 3 ℳ, Fliegenſchnäpper u. Dorngrasmücken, Lerchen, j. Staar à Stck. 2 ℳ, 1 hochfeine Dayaldroſſel im Geſang 36 ℳ, liefert unter jeder Garantie die allſeitig bekannte Handlung von **W. Hiltmann,**
[1547] **Berlin S.,** Dresdenerſtr. 23.

Harzer Kanarienvögel,

Hohlroller-Stamm, diesjährige Hähne, à 5 ℳ, Dtz. 48 ℳ. Weibchen à 80 ₰, Dtz. 8 ℳ. Garantie für Hähne und leb. Ankunft.

Wilhelm Kaye,
[1548] Thale (Harz).

Gelbe Erlenzeiſige, prachtv., futterf. Vögel, 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Junge Dompfaffen zum Anlernen à Stck. 2 ℳ, 4 Stck. 6 ℳ, Kreuzſchnäbel 6 Stck. 4 ℳ, Schwarzmeiſen 6 Stck. 4 ℳ, Dtzd. 6 ℳ, Blau- u. Finkenmeiſen 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Garant. leb. Ank. In Gegenrechnung nehme Sproſſer und Schwarzblatten. **A. Jaumann,**
[1549] **Großbreitenbach,** Thür.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei. Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft.
Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen
Kataloge gratis u. franko. [1550]

F. Rejsek, Hamburg, Peterſtr. 28.



Papageien-Großhandlung.

Prämirt auf allen beſchickten Ausſtellungen

Spezialität und Verſandt von ſprechenden und noch nicht ſprechenden allen Arten **Papageien, Kakadus, Araras, Zwerg-Papageien, Sittiche, Prachtfinken,** äußerſt zahmen **Affen** u. eleganten, praktiſchen **Papageien-Salonkäfigen** mit Porzellannäpfchen ſchon von 4½ ℳ an. Verſandt jederzeit und nach allen Orten des In- und Auslandes unter Garantie lebender und geſunder Ankunft dort. [1551]

Bedienung ſehr ſtreng reell! Umtauſch gern geſtattet!

Hochfeine ruſſiſche

Sprosser,

welche ſchon ſeit Frühjahr am Lager und ſchon übermauſert haben, ſehr gute Sänger, wofür ich die volle Garantie übernehme. **1 Nachtigal,** welche ſchon 2 Jahre im Käfig iſt, ſingt ſehr fleiß. bei Tag u. Nacht, 8 ℳ. Die obenerwähnten Sproſſer koſten à St. 8 ℳ. Ferner Herbſtſproſſer, Hähne, à St. 3 ℳ. Nachtigalen, à St. 2 ℳ

Alles unter Nachnahme. Garantie für Männchen und lebende Ankunft. [1552]

J. Rösner, Temesvar, Ungarn.

Einen zahmen Buſſard 10 ℳ. **5 Bartmeiſen,** ½ Jahr im Käfig, tadellos befiedert, à 5 ℳ, **1 Blaudroſſel** 12 ℳ, gibt ab **A. David,**
[1535] **Breslau,** Ohlauerſtr. 32.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.



Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1554]

Edle Harzer Kanarien, Hohlroller-Stamm, Frühbrut, Hähne à 4,50 ℳ, 6 Stck. 24 ℳ, Weibchen à 1 ℳ, 6 Stck. 5 ℳ. Ferner **Steindroſſeln** à 8 ℳ, **Blaudroſſeln** à 12 ℳ, unter Garantie für Hähne und lebende Ankunft. Preisl. ü. a. V. gratis. Prima friſche **Ameiſeneier** u. 99er getrocknete à Ltr. 1 ℳ, Zeke à Kilo 3 ℳ. Probeſendung zu 10 ₰, 25 ₰ u. 1 ℳ. [1555]

Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft,
Hoffſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1556]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Nachtigal,

Wildfang, 1½ Jahr im Käfig, vorzügliche Sängerin, ganz zahm, vollſtändig vermauſert, verkauft zu annehmbarem Preis, unter Garant.

Rico. Schelling, Photograph,
[1557] **Brackenheim** (Württemberg).

Verk.: Gefied. Welt 1883 bis 98, Natur u. Haus 1892 bis 98, Blätter für Aquarienfreunde 1891 bis 94, Käfige für Inſektenvögel. [1558]

Nöbeling, Goslar.

Blauſtirn-Amazone,

großartiger Vogel, kein Schreier, fingerzahm gegen Jedermann, läuft wie ein Hund dem Pfleger nach, ſingt klar und deutlich: „Wir halten feſt und treu zuſammen u. ſ. w.“, ſpricht etwa 50 Worte in Sätzen, lernt leicht Neues zu, pfeift, lacht, weint. Lora iſt einzig in ihrer Art. Preis 150 ℳ. Sprachverzeichniß auf Wunſch. Bei Anfr. Marke erbeten. Sende p. Nachn. unter Garantie leb. Ankunft.

Joh. Scherr-Thoss,
[1559] **Gadderbaum-Bielefeld.**

Verk.: **1 Stiglitzmännchen** 1,20 ℳ, **1 Hänflingmännchen** 1,20, **1 Par Zeiſige** 1,50, **1 Par Leinzeiſige** 0,75, **1 Dompfaffenweibchen** 1,00 ℳ. Zuſammen 5 ℳ. [1560]

Else Voerster,
Sternfelde bei Angermünde.

Verkaufe oder Tauſche:

1 prima **ruſſ. Weidenſproſſer** 15 ℳ, 1 pr. **ung. Nachtigal** 12 ℳ, 1 pr. **tiroler Schwarzblattel** 6 ℳ, 1 pr. **chineſiſche Nachtigal** 6 ℳ, tauſche auf diesjährige Kanarienhähne. Bei Anfrage Rückporto erbet.

H. Voigt,
[1561] **Flensburg,** Johannisſtr. 81.

Gelbe Wellensittiche.

Verkaufe ein ſchönes Par für 25 ℳ [1562]
Oskar Heise, Frankfurt a. M., Humboldtſtr. 86.

Röthelammern

(Emberiza rutila) Par 10 ℳ,

Rieſenelſterchen Par 6 ℳ,
Auroraaſtrilde Par 6 ℳ,

offerirt

August Fockelmann
Thierhandlung [1563]
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Eigentl. Papagei-Amandine

(Erythrura psittacea) à Paar 36 ℳ, **Gürtelgras- u. Diamantfinken** P. 12, **Siebenfarb. Tangaren** à Stck. 22 ℳ, **Scharlachtangaren** à Paar 25 ℳ, **Pflaumenkopfſittiche** à P. 8 ℳ. [1564]

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Neuer Elbeweißwurm,

hochprima, das beſte und ſchönſte, was es in dieſem Futter gibt (Eintagsfliege), für alle Inſekten freſſende Vögel, gut trocken u. ſauber, per Lt. 80 ₰, billigſt [1565]

Karl Schwertner, Kaufmann,
Auſſig a. E. (Deutſchböhmen).

Suche ♀ **Gürtelgrasfink.** [1566]

Blume, Paſtor,
Großeutersdorf (Kahla).

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 18.

Die gefiederte Welt

Wochenschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler

von Dr. Karl Ruß

Preis vierteljährlich
(13 Nummern mit Abbildungen)
Mk. 1,50.

Magdeburg.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretschmann).

Einzelpreis der Nummer
15 Pfg.

Inhalt der Nr. 35.

Die Sepſis (Blutzerſetzung) der (jungen) Papageien bzl. Graupapageien.
Mittheilungen aus Centralamerika (Fortſetzung).
Ergänzungen zu meinen früheren Züchtungsberichten (Fortſ.).
Ungleiche Geſellen.
Zu unſerm Bilde.
Karl Ruß jun. †.

Annahme von Anzeigen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Prima 99er Elbe-Weißwurm, Kg. 3, 5 Kg. 13,50 ℳ, Ltr. 75 ₰, 10 Ltr. 7 ℳ.

Tyroler Ameiseneier, hochfein weiß u. rein, à Ko. 4,50 ℳ, L. 85 ₰, 10 L 8 ℳ fr.

Zeke (Musca), 99er, feinſte, fr. Ware, Ko. 2,60 ℳ, 5 Ko. 13 ℳ, franco. Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahren ſelbſt erprobt, Ko. 2 ℳ, 3 Ko. frco., ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- und Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ mit Sack, reelles Gewicht und Maaß.

Auroraaſtrilde Par 6 ℳ, Larvenaſtrilde, Zuchtp., Par 8 ℳ, Paradiswittwen in Pracht P. 4,50 ℳ, Dominikanerwittwen in Pracht 5 ℳ, Napoleonsweber in Pracht 3,50 ℳ, Orangeweber in Pracht 3,50 ℳ, Roſellaſittiche in Pracht P. 25 ℳ, Pflaumenkopfſittiche P. 8,50 ℳ und alle in Nr. 34 angeführten Vogelarten in tadelloſen, geſunden, kräftigen Exempl. Streng gewiſſenhafte Bedienung.

Brühl's Vogelexporthaus,
[1567] **Kötzſchenbroda.**

Käfige und Geräthſchaften.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1568]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [1569]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,60 ℳ [1570]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Ltr. 1 ℳ. Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen,** M.-Gladbach 112.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten


Fängisch gestellt. Zugeschlagen.

ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1571]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe.
Schlotheim i. Th.

Für alle Arten Vögel fertige ich fachgemäße

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1572]

Junge geſunde Graupapageien

(Jakos) gelehrigſter Art, an Hanf u. Waſſer ſchon gewöhnt, Stück **nur 15 ℳ, 6 Stück 75 ℳ;** ſolche ſchon ½ Jahr hier, Stück 30 ℳ; ſolche ſchon viel ſprechend, je nach Leiſtung 60, 80, 100, 150 ℳ. **Amazonen,** Bl.-Stirn (Rothbug) 20 ℳ, ſprechend 25, 30, 40 ℳ und höher; **Gelbnacken** 20 ℳ, ſprechend 30, 35, 60 ℳ; echte **Doppelgelbköpfe** 25—30 ℳ, ſprechend 45—50 ℳ; **Surinamamazone** 20 ℳ, ſprechend 25 ℳ; kl. **Gelbhaubenkakadus** St. 12 ℳ, **Brillenamazonen,** ſprechend, 25 ℳ, **Tigerfinken,** ganz roth ausgefärbt, Par nur 2 ℳ. Ganz zahme hochamüſante **Affen,** Stück nur 20 ℳ. Verſand gegen Nachnahme, lebende geſunde Ankunft garantirt. [1573]

Papageienkäfige von 4,50 Mk. an.
F. Rejsek, Hamburg, Peterſtr. 28.

Neu! Senſationell!
Kanarien-Lehr-Orgeln,
auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [1574] **Edmund Schiewick, Zittau, Sachſen.**
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

Der beſte Fangapparat
für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1575]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1576]

50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,** [1577] Waren i. Mecklenb.
Proſpekte gratis.

Geflügel-Fußringe
für Hühner 3, 5 u. 6 ₰, für Tauben und Kanarien 2, 3 u. 4 ₰. [1578]
H. D. Becker, Iſerlohn.

Die gefiederte Welt

Wochenschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

[illegible]

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
[illegible]

[illegible]

Nr. 35. Magdeburg, den 31. August 1899. XXVIII. Jahrg.

Die Sepsis (Blutvergiftung) der (jungen) Papageien bzl. Graupapageien.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Die Ernährung der Papageien iſt im Ruß'ſchen Werk ſehr richtig angegeben, und ich verweiſe Liebhaber hierauf; Hanf, Mais in Milch, Spitzſamen, Hafer, abgekochter Mais, ſodann gute Milch, beſonders Ziegenmilch (wegen des großen Nährſalzgehaltes), ferner Weinberen, Aepfel, Birnen (wegen des Nährſalzgehaltes) iſt die Hauptnahrung. Kein Waſſer (das Waſſerleitungswaſſer der großen Städte enthält ſtets Pilze, die den Ausbruch der Krankheit ſofort bewirken), dagegen dreimal täglich verdünnten Haferſchleim mit Nährſalzextrakt verſetzt (bei Hewell u. Veithen, Köln). Das Nährſalzextrakt beſteht aus Kali, Natron und Eiſen in löslicher Form und erſetzt dem Papagei gerade die Stoffe, die ihm eben im Blut fehlen und weshalb er krank wird. Als Hauptregel gilt immer, daß der Papagei möglichſt trocken zu halten iſt; jede dünne wäſſrige Nahrung neigt zur Blutzerſetzung bzl einfachem Magenkatarrh.

Das Nährſalz iſt dem Vogel ſofort zu reichen, wenn er auch äußerlich noch geſund erſcheint, da es in keinem Fall etwas ſchadet. Man kann auch das Nährſalz dem verdünnten Kaffe bzl. dem Waſſer zuſetzen, falls er daran gewöhnt iſt. Ich halte meine jungen Papageien, bis dieſelben ½ Jahr feſt eingewöhnt ſind, faſt ganz trocken. Den Durſt laſſe ich durch Semmel in Milch eingeweicht (früh), Tags über durch Weinberen (vier bis zehn Stück) oder anderes Obſt ſtillen. Bei Durchfall, falls ſie mit ſolchem ankommen oder ſpäter erhalten, „Haferſchleim mit Nährſalz“.

Der Papagei muß ferner ein hohes, luſtiges, ſonniges Zimmer haben, welches eine gleichmäßige (16—20 °) Temperatur beſitzt, und ſodann iſt das Aufſtellen von Eucalyptus-Bäumen (Eucalyptus globulus, Blaugummibaum, von Erfurter Gärtnereien zu beziehen) wol unerläßlich; einestheils, weil ſolches die natürlichen Verhältniſſe der Papageien in der Freiheit nachahmt (der Papagei niſtet in Eucalyptus-Bäumen) und andererſeits das in den Blättern enthaltene Oel kräftig desinfizirend wirkt.

Eine unerläßliche Bedingung für das Wohlbefinden der Papageien iſt auch das Benagen grüner Zweige, da in dem innern Theil der Rinde der Zweige die ihm ſo nothwendigen Nährſalze enthalten ſind; und das öftere Abſpritzen (Bad) des Vogels.

Faſſe ich die erörterten Hauptpunkte nochmals zuſammen, ſo kommt man zu folgenden Schlüſſen:

1. Die Fütterung der Neſt-Papageien muß von Anfang an eine andere ſein (durch Aufklärung rückwärts dahin zu wirken).

2. Die Ueberführung auf den Schiffen muß ſo eingerichtet ſein, daß die Thiere ſtets reine friſche Luft bekommen und athmen können.

3. Jeder neu angekommene, anſcheinend geſunde Papagei iſt ſo zu behandeln, als wäre er an Sepſis erkrankt, d. h. es iſt für regelmäßige Zufuhr von „Nährſalzen“ zu ſorgen. (Nährſalz, Zweige, Obſt).

4. Das kaufende Publikum ſoll nur dann kaufen, wenn der Großhändler eine auf Wochen hinaus dauernde Gewähr gibt.

5. Hierdurch würde der Großhändler gezwungen, die Papageien-Einfuhr in andrer, zweckmäßigerer Weiſe zu regeln.

Das vorher geſagte bezieht ſich hauptſächlich auf junge, noch nicht akklimatiſirte Papageien. Aber auch ältere, ſchon eingewöhnte Papageien erkranken an der Sepſis, bzl. einfachem Darmkatarrh, wenn ſie auf naturwidrige Weiſe mit allerhand menſchlichen Nahrungsmitteln ernährt werden; und ich betrachte dieſes gerade als Beweis dafür, daß die Sepſis als die Folge einer fehlerhaften Ernährung und Verpflegung ſich einſtellt.

Ich bitte alle Papageien-Liebhaber, zu dieſer Sache ſich zu äußern und eine lebhafte Diskuſſion in dieſer Zeitung anzuregen.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Die Trupiale (Icterus) von Guatemala.

II.

Gefleckter Trupial (Icterus maculatus, *Scl.*). Dieſer Vogel gleicht dem Wagleri in ſehr vielen Punkten und wird auch zu Land oft mit dem letztern verwechſelt, dennoch zeigt er untrügbare Unterſchiede gegen ſeinen Vetter, den Wagleri. Die ſchwarzgelbe Zeichnung hat er genau beibehalten, doch zeigt ſich von der gelben Bruſt eine etwas verlängerte gelbe Linie nach dem Rücken. Hauptſächlich iſt jedoch für ihn die Flügelzeichnung charakteriſtiſch, wogegen Wagleri nie ſchwarze Flügel hat.

Männchen: Wie Wagleri, jedoch mit Flügelzeichnung. Schwungfedern erſter Ordnung, mit Ausnahme der erſten, und Außenfahne am obern Drittel weiß geſäumt. Deckfederchen erſter Reihe am Rand weiß geſpitzt, am Oberarm kleiner gelber Spiegel.

Weibchen: Genau wie das Männchen, das Gelb etwas matter.

Jugendkleid unbekannt.

Im Muſeum fehlt der maculatus, auch ich habe keinen lebenden, ſondern nur einige erlegte und präparirte Vögel. Ueberhaupt iſt der Vogel ſelten und nur in der Gegend von Colum anzutreffen. Mitunter verſprengt ſich aber auch ein Trupp nach der Umgebung der Stadt Guatemala. Ueber das Freileben iſt mir nichts weiter bekannt, der Vogel wird aber wol von ſeinen Verwandten nicht abweichen, und ich glaube, daß auch er ein offenes Neſt errichtet.

[illegible]



[illegible]

vorzugter Leckerbiſſen für ihn, namentlich große Nachtſchmetterlinge und große Heuſchrecken. Fliegende Käfer und Ameiſen fängt er ſehr geſchickt im Flug.

Die beiden Hauptfarben rothgelb und ſchwarz ſind an dieſem Trupial am intenſivſten zu finden. Dabei ſind Männchen und Weibchen kaum von einander zu unterſcheiden, wenigſtens fehlt ein untrügbares Erkennungszeichen für beide Geſchlechter. Größe etwas kleiner wie die des gewöhnlichen Stars.

Vor allem aber hätten wir endlich einmal einen Gelbvogel vor uns, der ein beutelförmiges Neſt errichtet und den Namen Beutelſtar in der That verdient. Das Neſt iſt aus Baſtfaſern kunſtvoll gewebt, doch iſt es nicht in Kolonien mit ſeinesgleichen anzutreffen, ſondern immer nur vereinzelt an halbhohen Bäumen. Es kommt aber auch vor, daß er mit dem gularis, welcher die Geſelligkeit liebt, und mit Kaſſiken auf einem und demſelben Baum niſtet.

Männchen: Stirn, Scheitel, Nacken und Wangen leuchtend orangegelb. Geſicht ſchwarz, Kehle ſchwarz, nach der Bruſt erweiterten glänzend ſchwarzen Latz. Bruſt leuchtend orangegelb, an den Seiten dicht mit unregelmäßigen ſchwarzen Tupfen beſtreut. Leib orangegelb, Schultern glänzend blauſchwarz. Die Linie zwiſchen dem gelben Hals und den ſchwarzen Schultern ſcharf begrenzt. Die auf der Linie ſtehenden Federchen an der Grundhälfte gelb, die Spitzen ſchwarz. Rücken leuchtend rothgelb. Schwanz oben und unten ſchwarz, die äußerſten Schwanzfedern verkürzt, ſchwach weiß umſäumt. Obere und untere Schwanzdecken orangegelb. Flügel ſchwarz. Schwungfedern erſter Ordnung, mit Ausnahme der erſten Feder ganz am Grund, und Außenfahne weiß. Schwungfedern zweiter Ordnung an der Außenfahne breit weiß eingefaßt und auf dem geſchloſſenen Flügel einen weißen Streifen bildend. Am Oberarm einen gelben Spiegel. Unterflügel grau, untere Deckfederchen gelb. Schnabel oben ſchwarz, unten dunkelblaugrau. Auge ſchwarz, Füße grauſchwarz.

Weibchen dem Männchen in allen Theilen vollſtändig gleich, die orange Färbung weniger in's Rothe, ſondern mehr in's Gelbe fallend. Die ſchwarze Färbung nicht in's Blauſchwarze, ſondern in's Kohlſchwarze übergehend und ohne Glanz.

Jugendkleid kann ich erſt ſpäter beſchreiben, da ich erſt abwarten will, bis ſich meine jungen Vögel vollſtändig verfärbt haben, und über ihre Art kein Zweifel mehr beſteht.

Sclater's Trupial (Icterus Sclateri, *Cass.*). Leider kommt auch dieſer hübſche Trupial nur auf ſeinen Streifzügen vereinzelt hier vor; ſein beſchränktes Verbreitungsgebiet iſt Coban und Verapaz. Lebend habe ich den Vogel in meiner Sammlung noch nicht, ſondern nur einige präparirte Bälge. Schon lange habe ich mich nach dieſem Vogel umgeſehen, aber auf dem Markt noch nicht finden können. Der I. Sclateri macht einen überaus vornehmen Eindruck in der Zeichnung wie ein Lizard-Kanarienvogel, eidechſenartig grün geſtreift. Ueber ſeine Brut kann ich leider nichts berichten, doch liegt die Möglichkeit ſehr nahe, daß der Sclateri ein beutelförmiges Neſt errichtet, da auch er chiltote genannt wird, und dieſe Benennung nur diejenigen Vögel trifft, welche ein beutelförmiges Neſt errichten.

Männchen: Stirn, Scheitel und Wangen gelb, Geſicht ſchwarz, Nacken gelbgrünlich. Von der Kehle nach der Bruſt einen ſchwarzen Latz, Bruſt dunkelgelb, Leib gelb, Schultern grünlich, ſchwarz getupft, Rücken gelb, ſchwarz getupft, Schwanz oben und unten grünlich, Schwanzdecken oben und unten gelb. Flügel grau, Schwungfedern erſter und zweiter Ordnung linienartig weiß geſäumt, Deckfedern ebenſo, am Oberarm einen weißen Spiegel, Unterflügel grau, untere Deckfederchen gelb. Schnabel und Auge ſchwarz, Füße grau.

Weibchen ſtimmt mit dem Männchen überein.

Das Jugendkleid des Vogels kenne ich nicht.

(Fortſetzung folgt).

Ergänzungen zu meinen früheren Züchtungsberichten.

Von Hauth, Oberleutnant z. D.

II. Züchtung der Paradis-Amandine (Spermestes erythrocephala, *L.*), bzl. Argus-Amandine (Sp. Argus, *Rchb.*)

(Schluß).

Wie vorher bemerkt, beſtand auch in der Milbenplage eine bedeutende Schwierigkeit zu überwinden. Jedem erfahrenen Vogelpfleger iſt es bekannt, daß trotz aller Vorſicht und Aufmerkſamkeit, wie nicht minder ſorgſamſter Pflege und Wartung ſeiner kleinen, gefiederten Hausgenoſſen es ihm zeitweiſe unmöglich iſt, das Einniſten von Milben gänzlich zu vermeiden. Durch den Bezug von neuen Vögeln werden ſie gar zu leicht eingeſchleppt, wo ſie hauptſächlich in den Niſtkäſtchen ſich feſtſetzen und dann aus der einmal eingerichteten Hecke nicht ſo leicht wieder entfernt werden können, was aber unbedingt geboten iſt, weil ſonſt eine gedeihliche Entwicklung der Bruten geradezu unmöglich gemacht werden kann. Daher hoffe ich nur im Intereſſe der Anhänger unſerer ſchönen und intereſſanten Liebhaberei zu handeln, wenn ich von Neuem auf das in dieſer Zeitſchrift ſchon wiederholt gegriffene Lyſol hinweiſe als ein Radikalmittel, das in ſeiner Wirkung die läſtigen Blutſauger nicht nur zu vertreiben, ſondern auch zu vernichten von keinem andern auch nur annähernd übertroffen wird, ohne den Vögeln ſelbſt ſchädlich oder läſtig zu ſein; nur muß man natürlich darauf achten, daß die mit Lyſol behandelten Gegenſtände vor dem Gebrauch wieder gut getrocknet ſind (ſ. Nr. 28, 1898).

Ein weiteres Erſchwerniß bei der Aufzucht gerade der jungen Paradisfink-Miſchlinge, das mir bei meinen ſonſtigen Züchtungen meines Wiſſens noch nicht aufgefallen iſt, ſtellte ſich inſofern ein, als ſie zur Zeit, wo ſie ſehend wurden, alſo ungefähr vom achten Tage an, die Schnäbel nicht mehr zur Aetzung ſperren wollten. Wie erinnerlich, wurden ſie von Mövchen aufgefüttert. Vermuthlich unterſchieden die Jungen inſtinktiv die fremden Alten von ihrer eignen Art und ängſtigten ſich vor ihnen. Alles Mühen ſeitens derſelben blieb ein vergebliches und trotz entſetzlichen Schreiens nach Futer verweigerten ſie jegliche Futterannahme. Es blieb mir nichts anderes übrig, als ſie ſelbſt zu ſtopfen, was ich vier Mal täglich mit Eifutter, friſchen Ameiſenpuppen und geſchälter Hirſe that; hierauf legte ich ſie in's Neſt zurück. Natürlich ſträubten ſich die Jungen anfänglich ſehr gegen dieſe gewaltſame Fütterung; aber nachdem auf dieſe Weiſe gewiſſermaßen der Bann gebrochen war, hatte ich die Freude, zu ſehen, wie ſie nach zwei Tagen wieder richtig ſperrten und nun von den Mövchen glücklich großgezogen wurden.

Wie aus dem Inhalt der obigen Schilderung hervorgeht, waren die Jungen bekanntlich Miſchlinge, die von zwei verſchiedenen Weibchen abſtammten, einem Baſtard Rothkopf-Bandfink und einem reinraſſigen Bandfink; daher waren auch die ſoeben dem Ei entſchlüpften Neſtlinge ſchon verſchieden gefärbt, d. h. hinſichtlich des Fleiſchtons. Wie diejenigen der reinraſſigen Rothkopf-Amandine ſahen die vom Baſtardweibchen dunkelbraun aus, die vom Bandfinkweibchen tief dunkel blauſchwarz, und waren alle mit dichten, langen, dunkelgrauen Flaumfedern bedeckt. Auffallend groß erſcheint der Kopf und der Schnabelrachen, deſſen Wachshaut außergewöhnlich dickwulſtig und reinweiß ſich abhebt. Auch das Innere des Rachens iſt dunkel, oberſeits tief ſchwarz mit kleinen, regelmäßig vertheilten, weißen Flecken, unterſeits iſt er tiefviolett; innere Spitze des Unterſchnabels gelb. Mit zunehmendem Alter werden dieſe Farben noch intenſiver; ſomit erſcheint dieſes Vögelchen anfänglich recht abſonderlich. Gleich am erſten Tage machen ſie ſich auch ſtimmlich laut bemerklich; ihr Geziepe klingt recht täuſchend dem vom „Walker" genannten Laubkäfer mit Leib und Flügeln verurſachten Geräuſch. Von Tag zu Tag nimmt ihre Stimme an Stärke und Tiefe bemerkbar zu, ſo daß ſie bald, insbeſondere ſobald ſie flügge geworden, als ein rauhes Geſchrei alle übrigen Stimmen in der Vogelſtube übertönt.

Mit dem 12. Tage etwa brechen überall die Federſpitzen aus den großen und kleinen Kielen hervor, und nach weiteren zwölf Tagen verließen ſie voll befiedert das Neſt, als ſchlicht graugefärbte Vögelchen, die bereits ihre Pflegeeltern an Größe etwas übertrafen. Eins der Beiden weiſt einen viel helleren Farbenton des ganzen Gefieders auf, daſſelbe iſt mehr weißlichgrau, alſo dem jungen Bandfink nachſchlagend; das andere iſt mehr bräunlichgrau, wie die jungen Rothkopf-Amandinen. Obgleich Miſchlinge deſſelben Vaters, deutet alſo auch in dieſer Beziehung ſchon ihr Jugendgefieder auf die verſchiedene mütterliche Abſtammung hin. Mit Spannung ſehe ich daher der Zeit entgegen, ob letzteres ſich vielleicht zu einem reinraſſigen Rothkopffink entwickeln werde, was nicht unmöglich iſt, da die Erfahrung lehrt, daß bei Baſtardzuchten der junge Nachwuchs nach derjenigen Art des Stammpares zurückſchlägt, mit welcher die Baſtarde von Neuem verpart wurden, wie ich dies auch bei der Weiterzucht meiner Baſtarde von blauköpfiger und rothköpfiger Papagei-Amandine mit reinraſſigen Vögeln von erſterer Art wieder erzielte und und ſ. Z. mittheilte.

Beide Junge ſind anſcheinend Weibchen, da die jungen Männchen von beiden Arten ſchon beim Abfliegen vom Neſte die rothe Färbung an Kopf, bzl. Hals aufweiſen. Bei den Rothkopf-Amandinen iſt dieſes Unterſcheidungsmerkmal allerdings noch nicht nachgewieſen, aber nach dem ihm ſo naheverwandten Bandfink folgernd, mit hoher Wahrſcheinlichkeit anzunehmen. Das hellere Exempar ſtimmt mit dem von mir in Nr. 40, 1898 ausführlich beſchriebenen, gezüchteten Jungen überein. Das andere unterſcheidet ſich von jenem einzig in dem allerdings deutlich bemerkbaren, weit dunkleren, d. h. bzl. bräunlichen Farbenton, der an der Unterſeite weniger dunkel erſcheint.

Zum Schluß muß ich noch einmal auf die Rothkopf-Amandine als Art zu ſprechen kommen. Während manche Forſcher zwei Arten, eine braungefleckte, erythrocephala, und eine weißgefleckte, argus, aufſtellen, ſollen ſie nach andern in nur eine Art zuſammenfallen. Zur weiteren Klärung dieſer Frage können vielleicht eine Vergleichung der übereinſtimmenden und abweichenden Merkmale zwiſchen dem z. Z. bei mir befindlichen Exemplar des Berliner zoologiſchen Gartens und den beiden eingangs benannten Arten Paradisfink dienen. Daher möge ſie hier noch anſchließen; ſie erfolgt nach den in Dr. Ruß, großem Werke gegebenen Beſchreibungen.

Mit erythrocephala ſtimmt genanntes Männchen oberſeits in allem überein; unterſeits weicht es ab, indem die Tropfenflecken nicht braun, ſondern weiß, wie Perlmutter glänzend, ſind, bei ſonſtiger Uebereinſtimmung der übrigen Färbung.

Mit Argus-Amandine ſtimmt genanntes Exemplar überein auf der ganzen Unterſeite; oberſeits weicht es ab, inſofern als es ebenfalls zwei weißliche Flügelbinden beſitzt und nicht dunkler braunes Gefieder der Oberſeite, als erythrocephala, aufweiſt.

Dagegen abweichend von beiden Arten iſt es darin, daß über die Unterkehle von Hals- zu Halsſeite ein deutlich hellgraues, bis ½ cm breites Band verläuft, ähnlich wie beim nahe verwandten Bandfink das rothe Band über die Oberkehle; erſteres ſitzt auch etwas tiefer, und iſt an den Halsſeiten ein wenig breiter als über der Kehle. Es trennt die weißgeſchuppte Oberbruſt vom Roth des Kehlflecks und der Wangengegend. Ferner zieht ſich vom Schnabelgrund zum Auge ein fahlgrauer Streif, der das Roth an Stirn und der unteren Augengegend von einander ſcheidet. Iſt hierin abermals eine lokale Abänderung des Gefieders zu ſuchen, oder liegt vielleicht nur eine ungenaue Beſchreibung obiger beider Arten vor? Iſt letzteres nicht der Fall, ſo würde wegen der breiten, hellgrauen Halskrauſe thatſächlich eine dritte Spielart vorliegen; auch ſind die Oberſchwanzdecken an der Spitze nicht breit weißlich gebändert, wie es bei Argus ſein ſoll, ſondern reingrau und mit vielen ſchwärzlichen, feinen Zickzacklinien gezeichnet. Iſt aber die angeführte abweichende Färbung des Vorderhalſes bei beiden Arten anzutreffen, was ich für ſehr wahrſcheinlich halte, ſo würde als einziger Unterſchied zwiſchen den verſchiedenen Spezies Rothkopf-Amandine die verſchieden gefärbte Schuppenzeichnuug der Unterſeite beſtehen bleiben, der allerdings bedeutend genug erſcheint, um daraufhin zwei Arten zu begründen, umſomehr, als er doch ſtändig vorkommt und dem Ausſehen einer jeden Art ein beſonderes, kennzeichnendes Gepräge gibt.

Ungleiche Geſellen.

Von Fritz Braun.

Wenn man in enger Junggeſellenwohnung ein halbes Hundert gefiederter Gäſte, Papageien und Finken, Würger und Wendehälſe, Stare und Weber und wie ſie alle heißen mögen, wol oder übel beherbergen muß, dann nimmt die bunte Vogelſchar doch oftmals zu viel Platz fort, und man ſinnt hin und her, wie man dieſen oder jenen Käfig entbehren könnte. Bei ſolchen Gedanken reift bisweilen ein kühner Plan, und man ſetzt Geſchöpfe zuſammen, die eigentlich nicht für kameradſchaftliches Zuſammenleben geeignet ſcheinen.

Nur allzu gern habe ich ſtets ſolche Pläne verwirklicht und dabei nur ſelten Enttäuſchungen erlebt. Anfangs ſträubten ſich wol manchmal die Vögel gegen ihren neuen Mitbewohner, es gab viel Geflatter und Lärm und die Federn flogen, aber mit jeder Stunde wurde es ſtiller, und der nächſte Tag fand die Gegner bisweilen ſchon eng aneinander geſchmiegt, als könne das gar nicht anders ſein.

Von ſolch ungleichen Geſellen, die jetzt gute Freundſchaft halten, will ich auch hier berichten.

Vor einem Jahr erſtand ich von unſerm Danziger Vogelhändler einen Seidenſtar. Seit Monden ſchon zierte er das Schaufenſter und um ihn los zu werden, bot der Mann mir den ſchillernden Fremdling für einen einzigen Reichsthaler zum Kauf an. Und nicht vergebens, — nach einer viertel Stunde hielt der Starmatz ſeinen Einzug in meine Behauſung.

Nun kam die alte Gewiſſensfrage, wo ſollte ich den Vogel unterbringen. Mit dem Gedanken an einen neuen Käfig vermochte ich mich nicht zu befreunden, und ſo ſetzte ich ihn kurz entſchloſſen zu einem Pflaumenkopfſittich, da ich ihn ebenſo wie den Sittich verpflegen wollte. (Weichfutter hat der Starmatz nämlich weder bei dem Vogelhändler noch bei mir je berührt, mochte unſer Danziger Händler, ich ſelbſt die Miſchung bereiten. So fütterte ich ihn denn mit Kanarienſaat, Hanf, Hirſe, Mehlwürmern und kleinen, aber regelmäßigen Gaben friſcher Ameiſenpuppen, und er glänzt und ſchillert dabei, daß es eine Pracht iſt).

Anfänglich fürchtete ich wol für meinen Sittich, der ein ſelten ſittſames und ſchüchternes Weſen beſitzt, zumal der Star von dem Genoſſen nicht viel zu halten ſchien und ſeinen blauſchwarzen Schnabel ſperrangelweit gegen ihn aufriß.

Aber nur wenige Stunden dauerte das gegenſeitige Mißtrauen, dann ging jeder, ſoweit das in einem Käfig von 2 Kubikfuß möglich iſt, ſeine eigenen Wege.

Das gute Einvernehmen, das zwiſchen Star und Sittich herrſchte, brachte mich auf eine neue Idee. In einem meiner Flugbauer hauſte ein biſſiger und unverträglicher Kreuzſchnabel, mit dem ich Tag für Tag Aerger hatte. Eilends fing ich den Zänker aus dem Flugkäfig heraus, und ſetzte ihn zu den neuen Freunden.

Verdutzt blieb der gelbgrüne Kletterkünſtler am Boden ſitzen und ließ die größeren Genoſſen nicht aus dem Auge. Er mochte ahnen, daß ſeine Tyrannenrolle ausgeſpielt ſei. Als er ſich dann endlich entſchloß, ſeinen Platz zu verlaſſen, begann er überhaſtig und ängſtlich zu flattern, ſodaß der Pflaumenkopf unwillig brummte, und der Seidenſtar verdrießlich nach dem Störenfried hackte.

Aber guter Rath kommt über Nacht! Am nächſten Morgen herrſchte Friede im Haus; der Kreuzſchnabel hatte ſich von der Harmloſigkeit ſeiner Genoſſen und zugleich auch davon überzeugt, daß ſich in ſo erlauchter Geſellſchaft Beſcheidenheit für einen Krünitz ziemt.

Seitdem iſt das gute Einvernehmen zwiſchen den drei Geſellen nicht geſtört worden. Augenblicklich (27. Juli) iſt der Pflaumenkopf in der Mauſer (Verfärbungsmauſer: begann an der oberen Schnabelwurzel, jetzt iſt die Stirn roth, die Wangen rothfleckig, Halsband fehlt noch) und deshalb etwas mißgeſtimmt, ſodaß der Star von Zeit zu Zeit ſeinem Freund am Bauchgefieder und an den Füßen herumkraut, bis ihn ein harmloſer Biß in den Nacken belehrt, wie unpaſſend ſolches Gebahren iſt.

Der Kreuzſchnabel, der trotz einer Durchſchnittstemperatur von 25 Grad Celſius — für einen Krünitz ſonſt viel zu viel — wohl und munter iſt, kümmert ſich um den Seidenſtar nur dann, wenn ich ihnen die heißgeliebten Ameiſeneier ſpende, aber ſelbſt in dieſem Fall weiſt ihn der offene Schnabel des dunkeln Gefährten ſogleich in die gebührenden Schranken. —

Weniger raſch entwickelte ſich das gute Einvernehmen zwiſchen den Gefährten, als es neulich galt, einen Roſakakadu unterzubringen. Einen weitern Papageikäfig bei mir aufzuſtellen, ging nicht wohl an, und doch ſtach mir der rothe Geſell bei ſeinem billigen Preis ſo ſehr in die Augen, daß ich ihn ſogleich erwarb.

Platz war nur in einem, etwa 12 Kubikfuß haltenden, ſehr ſtarken Kiſtenkäfig vorhanden, aber dieſer beherbergte ſchon einen kleinen Alexanderſittich, von deſſen Biſſigkeit ich Proben erfahren habe. Trotzdem aber vertraute ich auf das imponirende Aeußere des Kakadu und ſetzte ihn zu dem grünen Afrikaner.

Und nur allzu ſehr imponirte der Ankömmling dem kleineren Grünrock. Unter fürchterlichem Geſchrei fuhr er im Käfig hin und her, bis ſein ſchöner Schwanz erbärmlich zerzauſt war und er erſchöpft in einer Ecke ſitzen blieb, aus der er ſich vorläufig gar nicht herauswagte.

Auch der Kakadu ſchien ſich nicht recht ſicher zu fühlen, denn er blieb bewegungslos auf der Stange. Als ihn endlich der Hunger zwang, auf den Boden zu kommen, begann der Hexenſabbath von neuem.

Ein anderer Liebhaber hätte die Thierchen wol ſogleich getrennt, ich aber ahnte, daß es nicht ſo bleiben konnte, und als ich am nächſten Morgen den Raum betrat, ſaß der Alexanderſittich dicht neben dem Kakadu, wenn er ihn auch ſo übelgelaunt von der Seite betrachtete, als wenn er ſagen wollte, du hätteſt auch wo anders bleiben können! Allmählich aber ſiegte das freche Naturell des Schwarzkragens, und heute geht er dem Kakadu ſchon ſelber zu Leibe.

Mich berührt dieſe Streitluſt wenig, denn der ganze Zwiſt verläuft recht harmlos. Der Sittich reckt ſich ſchier unnatürlich lang und grade aus, bis ſeine Haltung faſt der eines ſingenden Orangewebers ähnelt. Nachdem er ſo ſeines Leibes Länge eine Elle zugeſetzt, ſtolzirt er mit geſträubten Bartfedern auf den Kakadu zu. Dieſer läßt ihn dicht herankommen, lüftet dann die Haube und macht ſchnabelknackend eine haſtige Verbeugung, worauf der Sittich eilends zurückweicht.

Das ganze — iſt's Streit, iſt's Spiel? — macht einen überaus komiſchen Eindruck, wozu der eigenartig mürriſche Geſichtsausdruck des Sittichs nicht wenig beiträgt.

So herrſcht denn jetzt überall Eintracht und Friede, und der Leſer wird erſehen, daß Gleich und Ungleich auch in der Vogelwelt, ſo ungern ſie ſich auch geſellen, mitunter gar nicht ſo übel zu einander paſſen.

Zu unſerm Bilde.

Unſer Bild zeigt einige Arten der ganz beſonders beliebten, etwa ſeit der Mitte der ſiebziger Jahre der Liebhaberei zugänglichen Gattung der Plattſchweifſittiche. Sie gehören mit den Geſchlechtern Wellenſittich, Gras- oder Schönſittich und Erdſittich zu der großen Gruppe der auſtraliſchen Prachtſittiche, ausgezeichnet durch Farbenpracht, Beweglichkeit und Anmuth.

Im Freileben ſieht man die Plattſchweifſittiche während der Brutzeit parweiſe oder in kleinen Flügen, ſonſt in größeren, manchmal in ungeheuren Schwärmen, welche infolge Nahrungs- oder Waſſermangels umherſtreichen oder regelmäßig wandern. Sie ſind gewandte Flieger und gute Läufer, klettern aber ſchlecht. Auf Bäumen halten ſie ſich nur zur Nachtzeit auf. Ihre Nahrung beſteht aus Gräſerſämereien, Früchten, Blütenſaft, Raupen, auch Kerbthieren. Sie ſind dreiſt und leicht zu erlegen. Sie niſten wie der Wellenſittich; alljährlich mehrere Bruten; Gelege 4 bis 8, ſelbſt 12 Eier. — Als Stubenvögel ſind die Plattſchweifſittiche im ganzen nicht weichlich, ſondern im ungeheizten Raum, theilweiſe ſogar im Freien zu überwintern. Man gibt ihnen Mehlwürmer, Ameiſenpuppen u. dergl.

Voran ſteht, an Pracht und Mannigfaltigkeit der Farben von keinem übertroffen, der blaugrüne Plattſchweifſittich, auch Paradisſittich genannt (Psittacus pulcherrimus, *Gld.*). (Auf unſerm Bilde links oben.) Der Vogel iſt ſelten und theuer, nur durch ſorgfältigſte Verpflegung längere Zeit zu erhalten. Männchen: breite Stirnbinde roth; Oberkopf rußſchwarz, nach dem Nacken zu ſchwarzbraun; breiter Streifen von der Stirnbinde aus oberhalb des Auges bis hinters Ohr, Wangen und Halsſeiten blaugrün; Zügel und Gegend ums Auge matt ſtrohgelb; Mantel dunkelbräunlich aſchgrau; Schwingen bräunlich-ſchwarz, heller außengeſäumt, rothe Flügelbinde; Flügelrand und untere Flügeldecken dunkelblau; Bürzel blau; obere Schwanzdecken grünblau; die beiden mittleren Schwanzfedern fahl gelblichgrün, Endhälfte der Außenfahne ſchwach blaugrün, Innenfahne und das gerundete Ende bräunlichſchwarz, die nächſten ebenſo, doch an oberer Hälfte mehr blaugrün und mit langer weißer Spitze, auch die beiden folgenden noch an Innenfahne weiß geſpitzt, die übrigen hellblau, am Grund mehr grünlich, an der Spitze reiner blau, alle in der Mitte mit breiter ſchwarzer Querbinde, unterhalb letzterer an Außenfahne fahlgrau; Kopfſeiten, Kehle und Oberbruſt glänzend grasgrün, Unterbruſt grünblau, Bruſt- und Bauchſeiten bis zum Unterrücken rein hellblau; Bauch, Hinterleib, Schenkel und untere Schwanzdecken roth, weißgeflammt; die fünf ſeitlichen Schwanzfedern am Ende weiß; Schnabel bläulichſilberweiß, Unter- und Oberſchnabel am Grunde ſchwach dunkler; Wachshaut fleiſchfarbenweiß, nackt; Auge dunkelbraun, Füße fleiſchfarbengrau, Krallen ſchwärzlich.

Faſt ebenſo farbenſchön und ſelten iſt der vielfarbige Plattſchweifſittich (Psittacus multicolor, *Tmm.*). (Auf unſerm Bilde unten.) Doch iſt er viel weniger weichlich und hat ſich in manchen Vogelſtuben jahrelang vortrefflich erhalten. Er iſt ſanft und liebenswürdig, harmlos gegen kleinere Vögel. — Beſchreibung: Grün, oberſeits dunkler, unterſeits heller; Stirn gelb; Hinterkopf braun; Nackenfedern am Grund weiß; Unterrücken mit dunkelgrüner und ſchwarzer, Bürzel mit grüner und ſchwarzer, Oberſchwanzdecken mit bräunlichrother Querbinde. Schulterfleck gelb; große Flügeldecken, Flügelrand und untere Flügeldecken blau; Bauch und Schenkel roth; Hinterleib und untere Schwanzdecken grünlichgelb, die vier mittleren Schwanzfedern tiefblau mit ſchwarzer Spitze und dunkelgrünem Grundtheil, die vier ſeitlichen Schwanzfedern mit weißer Spitze; Schnabel bläulichhorngrau, Unterſchnabel heller; Auge rothbraun; Füße bräunlichhorngrau.

An Färbung, aber nicht an Anmuth kommt ihm gleich der Plattſchweifſittich mit blauem Unterrücken (Psittacus cyanopygus, *Vel.*), ſeiner Größe wegen auch Königsſittich genannt. (Auf unſerm Bild in der Mitte.) Kopf und ganze Unterſeite iſt ſcharlachroth; Nackenband, Unterrücken und Bürzel blau; Rücken und Flügel grün; Schulterbinde blaßgrün; untere Schwanzdecken roth und ſchwarz geſchuppt; Schnabel korallroth, Schneidenränder ſchwärzlich, Unterſchnabel ſchwärzlichroth, Schnabelgrund röthlichhorngrau; Auge gelb, Füße ſchwärzlichgrau, Krallen ſchwarz. Er gelangt alljährlich in den Handel, iſt ruhig und friedlich, ausdauernd und unempfindlich gegen Kälte, badet gern. Starke und trockne Stubenhitze kann er nicht vertragen, daher iſt er für große Flugkäfige im Freien zu empfehlen.

Nur zeitweiſe findet ſich im Handel der Plattſchweifſittich mit gelbem Halsband und rother Stirnbinde, auch Bandſittich genannt (Psittacus semitorquatus *Quoy et Gaim.*). (Auf unſerm Bilde rechts oben.) Er kommt eigentlich nur in zoologiſchen Gärten und großen Sammlungen vor. Beſchreibung: Kopf ſchwärzlichbraun; Stirnband roth; Wangenfleck blau; Nackenband gelb; ganze Oberſeite dunkelgrün; Schwingen blau, ſchwarz und grün gezeichnet; Deckfedern und Eckflügel blau, unterſeitige Flügeldecken grünblau; Unterſeite dunkelgrün; Bauch heller grün; Schnabel bläulich horngrau; Auge dunkelbraun; Füße braun.

Dagegen hat man viel gezüchtet den letzten Vogel unſeres Bildes, den rothſtirnigen Neuſeeländer-Plattſchweifſittich (Psittacus Novae-Zeelandiae, *Sprrm.*). Stirn, Vorderkopf, Zügel und Streif durchs Auge nebſt Ohrgegend ſcharlachroth; übriger Körper grasgrün, oberſeits dunkel, unterſeits heller gelbgrün, Bürzel jederſeits mit rothem Fleck; Schwingen ſchwarzbraun, Außenfahne blau, große Deckfedern und Eckflügel blau; Schnabel bleiblau, Spitze und Unterſchnabel ſchwärzlich; Auge orangegelb; Füße ſchwärzlichbraungrau, Krallen ſchwarz. Das Weibchen, kaum vom Männchen zu unterſcheiden, meckert ziegenähnlich, das Männchen hat einen Ruf, der wie „kladderadatſch“ klingt. Der Vogel iſt ſehr unruhig, zur Niſtzeit gegen ſeinesgleichen und Verwandte bösartig. Er iſt im Gegenſatz zu den vorangegangenen Papageien mehr hochbeinig und läuft auf dem Erdboden ungleich flinker und gewandter. Flug in kurzen Bogenlinien hüpfend, mit raſchem Flügelſchlag. D. L.

Karl Ruß jun. †.

Mein einziger Sohn Karl Ruß, der Mitredakteur dieſer Zeitſchrift, iſt am Mittwoch, den 23. Auguſt, im Alter von 32 Jahren geſtorben. Man wird mir als dem Vater und Mitarbeiter auf ornithologiſchem Gebiete einige Worte der Erinnerung verſtatten und einen kurzen Ausdruck des Schmerzes nicht verſagen, umſomehr als ich der Begründer und mehr als 25 Jahre ununterbrochen thätige Herausgeber dieſer Zeitſchrift bin, wodurch ich zu dem verehrten Leſerkreiſe mich in nähere Beziehungen gerückt glaube, als es ſonſt wohl der Fall wäre.

Mein Sohn hat von mir eine große Liebe zur Natur geerbt, die es ihn oft ſchmerzlich empfinden ließ, daß er als Berliner Kind nicht in ſo engem Zuſammenhang mit der Natur aufwachſen konnte, wie es mir ſelbſt beſchieden war. Da wo ſich ihm Gelegenheit bot, wie beſonders auf Reiſen, hat er dieſem Mangel mit vieler Luſt und regem Eifer Abhülfe zu ſchaffen geſucht. Auch war er von früh auf in der Lage, meine Jahre lang unterhaltene Vogelſtube zu betreten und ſo durch aufmerkſames Schauen Kenntniſſe zu erwerben, welche durch Bücher nie vermittelt werden können, weil ſie auf dem liebevollen Betrachten und Beobachten des Lebendigen beruhen und der unbewußt, aber um ſo kräftiger wirkenden Natur in einer wenn auch kleinen Ganzheit verdankt werden. Meine eigenen Aquarien und Terrarien feſſelten ihn lebhaft, und die vortrefflichen Sammlungen unſerer Reichshauptſtadt boten ihm ſtarke Anregung. Täglicher Umgang und immerwährender Gedankenaustauſch mußten ihn wie von ſelbſt in den Gebieten und Beſtrebungen heimiſch machen, welche ich wiſſenſchaftlich und praktiſch vertrete.

Allein es iſt ein oft bemerktes eigenthümliches Spiel der Natur und des geiſtigen Lebens, daß die Söhne zunächſt andere Bahnen einſchlagen als die Väter, mögen auch Intereſſe und Neigung dem Beſchreiten dieſer Bahnen garnicht abhold ſein; und es wäre ein thörichtes Unterfangen, dieſen Trieb einer ſtarken ſelbſtſtändigen Natur, auch in der Wahl des Berufes eigene Wege zu gehen, mit rauher Hand dämpfen zu wollen. Wir wiſſen, daß die Natur des Geiſtes geradeſowenig wie die Körperwelt etwa von der Laune des Zufalls und blinder Willkür abhängt, und ich habe mich nicht dagegengeſetzt, als mein Sohn beim Verlaſſen des Gymnaſiums den Wunſch äußerte, ſprachlich-geſchichtliche Studien zu betreiben. In der That bot ja der ſchulgerechte gymnaſiale Betrieb damals mehr noch als heute eine faſt zureichende Erklärung hierfür. Jedenfalls ſtudirte mein Sohn hier in Berlin, wo ihn die Nähe meiner Intereſſen und die Unterſtützung, welche er mir in dringlichen Fällen leiſtete, in enger Verbindung mit der Ornithologie erhielt. Im übrigen iſt ja jedwedes Studium zur Durchbildung und ſtraffen Schulung des Geiſtes geeignet, und als ſich mein Sohn allmählich von der Geſchichte ab und dann naturwiſſenſchaftlichem Fachſtudium zuwandte, mußte ihm dies nicht wenig zu ſtatten kommen.

Bald war er in der Lage, mich in der Leitung dieſer Zeitſchrift aufs Kräftigſte zu unterſtützen und als ſtändiger Mitarbeiter eine rege Thätigkeit zu entfalten, ſowie an den Neuauflagen meiner Werke ſich hervorragend zu betheiligen. Hier iſt in erſter Linie das Hand- und Lehrbuch „Die ſprechenden Papageien“ zu nennen, für deſſen 3. vermehrte und verbeſſerte Auflage (1898) er die Bearbeitung des Geſammttextes geleiſtet hat. Die gleiche Arbeit hat er für das Buch über die „Amazonenpapageien“ (1896) und für das über den „Graupapagei“ (1896) gethan. Die zweiten Auflagen des Vogelzuchtbuches (1896) und der „Prachtfinken“ (1898) ſind unter ſeiner weſentlichen Beihülfe entſtanden. Für die „Voſſiſche“ und „Berliner Zeitung“ hat er eine Reihe von Jahren hindurch Feuilletons geliefert, die vielen Beifall fanden.

Daß mein Sohn auch der praktiſchen Seite der Ornithologie vollauf gerecht wurde, beweiſt der Umſtand, daß er dem Komité für die vom Verein „Ornis“ veranſtaltete Vogel-Ausſtellung in Berlin (Sommer 1897) angehörte und ſeit Januar 1898 als Vorſitzender des Vereins „Ornis“ an meiner Stelle wirkte.

Allen dieſen Beziehungen des Lebens und der Wiſſenſchaft iſt er nun entriſſen, und es wird alle mir zu Gebote ſtehenden Kräfte erfordern, daß ich nun wieder allein, ohne ſeine Hülfe, für den übrigen Theil meines Lebens dem obliege, was den Inhalt meines Lebens ausmacht.

Dr. Karl Ruß.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

C. L. Flemming

Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1579]



Man verlange Preisliste.

Man verlange Preisliste.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten. Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko. Man verlange Preisliste.

Käfige jeder Art

(Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1580] Oſchatz i. S.

Futtermittel.

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [1581]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411, I.

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. 1 dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt [1582] ſandfrei.

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 3 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko. 4½, à Ltr. 1 ℳ.

Muska, hochpr. 98er, à Ko. 3, 5 Ko. 14 ℳ.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr. 5, à Ko. 9.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.

Biskuit u. Eierbrot, beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,80
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,20
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,—
do. algeriſche	„ „ „ „	2,—
do. indiſche	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	5,—

Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [1583]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1584] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
☛ Muſter und Proſpekte koſtenlos. ☚

Neuer Elbweißwurm,

hochprima, das beſte und ſchönſte, was es in dieſem Futter gibt (Eintagsfliege), für alle Inſekten freſſende Vögel, gut trocken u. ſauber, per Lt. 80 ₰, billigſt [1585]

Karl Schwertner, Kaufmann,
Auſſig a. E. (Deutſchböhmen).

Die Samen-Großhandlung

von

Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [1586]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Neue getr. Ameiseneier,

deutſche, hochprima, helle Qualität, p. Ltr. 1 ℳ, p. 10 Liter 9 ℳ, empfiehlt [1587]
Carl Kämpf, Mainz.

AVOL

Nachtigallen- u Drosselfutter
(Gesetzl. gesch.)
mit und ohne Carotten
per Pfd. 80 Pfg. 9 Pfd. Mk. 7.20 fco.

Dieſes Futter, — in Folge langjähriger Liebhaberei ſachkundig nur aus beſten Zuthaten hergeſtellt u. nach eingehender probeweiſer Fütterung durch Herrn

Karl Kullmann, Frankfurt a. M.

auf der großen allgem. Geflügel- u. Vogel-Ausſtellung hier mit dem

I. Preis prämiirt

iſt das Beſte, was es für Inſektenfreſſer gibt.

Auf Verlangen Gratisproben an Liebhaber.
Fſt. deutſche handbeleſene Ameiſeneier 1899 p. Lit. 70 Pfg., von 10 Liter an franco
F. Grünewald, Offenbach a. M.
Markt 5.

[1588]

Alle Vogelfutter, Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1589

Frische Ameiseneier!

Bei Verlegenheit um friſche Ameiſeneier iſt ☛ **Zeke** ☚ der einzige Erſatz. Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfe ꝛc. bleiben dabei im Geſang. **Zeke** iſt zu haben in allen Vogelhandlungen und Droguerien. Man verlange Zeke, **Marke Amſel,** da man dann ſicher iſt, friſche 1899er Ware zu erhalten. [1590]

Wo nicht erhältlich, wolle man ſich wenden an **Schiffer & Co., Köln.**

Neue 1899er Tyroler Ameiſeneier,

hochfein, weiß und rein, à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk.

Neuer 99er Elbe-Weißwurm

à Ko. 3½ Mk., à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk. [1591]

Zeke (Muska)

à Ko. 3, 5 Ko. 13, 10 Ko. 25 Mk.

J. O. Rohleder
Leipzig-Gohlis
Vogelfutter-Groß-Handlung.

Vögel.

1 prima Weidenſproſſer

v. Rauſch in Wien, 15 ℳ, hat 25 ℳ gekoſtet, 1 prima Nachtigal 6 ℳ, 1 Haidelerche 5 ℳ, 1 Blaukehlchen u. 1 Rothkehlchen, zuſ. 6 ℳ, 1 Schamadroſſel, vorzüglicher Imitator, 40 ℳ. Alle Vögel ſind fein befiedert und tadelloſe Sänger. Verp. fr. g. Nachn. Gar. leb. Ank.

[1592] **Jos. Ehrlich,**
Würzburg, Weißenburgerſtraße.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer, **Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,** alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1593]

Wie alljährlich, habe ich auch in dieſem Jahre mehrere echt ruſſiſche hoch in

Frühjahrs-David-Weiden-Sproſſer

bei mir im Käfig **vermauſern** laſſen und gebe nun dieſelben an wirkliche Kenner des guten Sproſſerſchlages ab um den billigen aber feſten Preis von 25 ℳ franko.

Der Schlag dieſer Vögel bewegt ſich hauptſächlich in Glocken-, Baß-, Moll-, Lach-, Knarr- und Waſſer-Touren und ſchließt jede Geſangsſtrofe mit dem gebührenden Schnapper. Der Vortrag iſt hohl und tief, äußerſt langſam, gewiſſermaßen tragend, ja zur Nachtzeit geradezu feierlich! — **Dieſe Sproſſer ſind ausſchließlich eine Spezialität meines Geſchäftes; ſie haben mit den gewöhnlichen Händler-Sproſſern nichts gemein, ſind auch nur durch mich allein erhältlich und daher ohne jede Konkurrenz!** [1594]

Mathias Rauſch,
Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

NB. Einige gute Frühjahrsſproſſer ohne David, à 15 ℳ, bereits vermauſert, ſind auch lagernd.

Einen zahmen Buſſard 10 ℳ, 5 **Bartmeiſen,** ½ Jahr im Käfig, tadellos befiedert, à 5 ℳ, **1 Blaudroſſel** 12 ℳ, gibt ab **A. David,**
[1595] **Breslau, Ohlauerſtr. 32.**

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft.
Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen.
Kataloge gratis u. franko. [1596]

Kanarienhähne

(St. Trute) à 3 ℳ, Weibchen 75 ₰. **Rothhänflinge** à 1,20 ℳ, Dutzend 10 ℳ, **Stieglitze** à 1,50 ℳ, Dutzend 12 ℳ. Garantie für Hähne und lebende Ankunft. Nachnahme. [1597]

H. Pfromm, Vogelhandlung.
Homberg, Bez. Caſſel.

Orpheus-Grasmücken,

ſchöne, garantirte Männchen, à 9 ℳ, dito minder ſchöne, à 5—6 ℳ, dito ohne Gewähr fürs Geſchlecht, à 3 ℳ

Frühjahrswildfänge

von Blaukehlchen à 7 ℳ, Gebirgsſchwarzköpfe à 6 ℳ, Gelbſpötter à 7 ℳ, Gartengrasmücken à 6 ℳ, Pirole, ausgefärbt, à 10 ℳ, ſofort lieferbar. Ferner von Mitte Auguſt ab

Herbſtwildfänge

von Blaudroſſeln à 15 ℳ, Steinrötheln à 10 ℳ, Sproſſern à 5 bis 7 ℳ, je nach Herkommen, Nachtigalen à 2,50—4 ℳ, Gelbſpöttern à 3 ℳ, Gebirgsſchwarzköpfen und Gartengrasmücken à 3—4 ℳ, junge Sperbergrasmücken à 2 ℳ empfiehlt

Mathias Rauſch,
Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten
[1598] Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Gelbe Erlenzeiſige, prachtv., futterf. Vögel, 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Junge Dompfaffen zum Anlernen à Stck. 2 ℳ, 4 Stck. 6 ℳ, Kreuzſchnäbel 6 Stck. 4 ℳ, Schwarzmeiſen 6 Stck. 4 ℳ, Dtzd. 6 ℳ, Blau- u. Finkenmeiſen 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Garant. leb. Ank. In Gegenrechnung nehme Sproſſer und Schwarzblatten. **A. Jaumann,**
[1598] **Großbreitenbach,** Thür.

Harzer Kanarienvögel,

Hohlroller-Stamm, diesjährige Hähne, à 5 ℳ, Dutz. 48 ℳ, Weibchen à 80 ₰, Dutz. 8 ℳ. Garantie für Hähne und leb. Ankunft.

Wilhelm Kaye,
[1600] **Thale** (Harz).

Edle Harzer Kanarien, Hohlroller-Stamm, Frühbrut, Hähne à 4,50 ℳ, 6 Stck. 24 ℳ, Weibchen à 1 ℳ, 6 Stck. 5 ℳ. Ferner **Steindroſſeln** à 8 ℳ, **Blaudroſſeln** à 12 ℳ, unter Garantie für Hähne und lebende Ankunft. Preisl. ü. a. V. gratis. Prima friſche **Ameiſeneier** u. 99er getrocknete à Ltr. 1 ℳ, **Zeke** à Kilo 3 ℳ. Probeſendung zu 10 ₰, 25 ₰ u. 1 ℳ. [1601]

Gebr. Haas, Vogelexportgeſchäft,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Wegzugshalber verkaufe:

1 Schwarzamſel, ausgez. Sänger, 4 ℳ, 1 gr. Käfig 3,50 ℳ, 1 Vogelorg. (wie neu), 7 Stücke ſpielend, 7 ℳ. [1602]

W. Weber, Leipzig, Waldſtr. 41.

Verk.: 1 Feldlerche, 1 Dorn- u. 1 Zaungrasmücke, 1 Trauerfliegenfänger u. 1 Sumpfrohrſänger, alle Frühjahrsfänge, zuſ. für 13 ℳ. Tauſche auch alles gleiche. Garantie für leb. Ankunft u. Männchen. [1603]

Karl Mayer, München, Parkſtr. 28/0.

Gebe ab: Zebraf. à P. 4 ℳ, Mövchen à P. 3,50 ℳ, Schmetterlingsf. à P. 5 ℳ, ♂ Gürtelgrasf. 6 ℳ, ♂ Rieſenelſter 4 ℳ. [1604]

Blume, Paſtor,
Großeutersdorf (Kahla).

Die beſten orientaliſchen

Sproſſer	à 3—5	Mark
Orpheusgrasmücken	3—5	„
Nachtigalen	3	„
Sperbergrasmücken	2	„
Gartengrasmücken	2	„
Sumpfrohrſänger	2	„
Schwarzblattel	2	„
Grauammer	1,50	„
Ortolanammer	1,50	„

per Stück, einſchl. Verpack., liefert ſofort die 30 Jahre als reellſte bekannte Firma [1605]

„Ornis“, Prag.

Gebe ab ein gutes erprobtes Zuchtpar **importirte Wellenſittiche** für 7 ℳ. Ein Männchen **rother Kardinal,** 2 Jahre im Beſitz, großartiger Sänger, 8 ℳ. Ferner 3 Männchen u. 2 Weibchen ſelbſtgezüchtete **Aurora-Aſtrilde,** prachtvoll ausgefärbte Vögel, à 5 ℳ. Nehme auch zwei Weibchen **Jap. Mövchen** in Tauſch. Verpackung frei.

[1606] **Günther,**
Liegnitz, Jochmannſtraße 7.

Tauſche einen ſehr ſchönen **Lori von den blauen Bergen,** an Samen gewöhnt, gegen 2 gute Zuchtpare **Wellenſittiche.**
[1607] **Glaubitz,** Danzig, Burgſtr.

Roſenkopfzwergpapageien,

Zuchtpar, eingewöhnt u. tadellos befiedert, 24 ℳ. Offerten unter **A. Z.** an die Exp. der „Gef. Welt“. [1608]

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1609]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Kanarien-Vorſänger!

Vorzügliche tieftourenreichſte, noch nie zur Zucht benutzt und flott durchſingend, nach Geſangsgüte à 12, 15, 20, 25 und 30 ℳ, noch in großartiger Auswahl da. Verſandt überallhin gegen Vorherkaſſe oder Nachnahme mit voller Garantie für Werth, Geſundheit und Probezeit.

[1610] **Julius Häger.**
St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864.
Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Harzer Kanarien-Hähne,

gar hochedler H.-Stamm, Dtzd. 33 ℳ, ½ Dtzd. 18 ℳ, kräftige Vögel, Farbe gelb.
[1611] **W. Brandt, Brüel** i. M.

Unterricht! [1612]

Wer nimmt einen **Doppelgelbkopf** in Pflege und **Unterricht?** Anerbieten mit Preisforderung an den Verlag unter **C. D.**

Junger kaufmänniſch gebildeter Mann, mit der Behandlung und Pflege lebender Thiere durchaus vertraut, ſowie einigermaßen bewandert im Geflügel- u. Wildbretgeſchäft, 19 Jahre alt, **ſucht** ſofort oder ſpäter **Stellung** auf Bureau oder im Verſandgeſchäft. Gefällige Offerten unter **K. S. 1** an den Verlag dieſes Blattes. [1613]

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 36.

Die gefiederte Welt

Wochenschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler

von Dr. Karl Ruß

Preis: vierteljährlich
bei Zusendung mit Kreuzband
M. 1.50.

Magdeburg.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretschmann).

Einzelpreis der Nummer
30 Pfg.

Inhalt der Nr. 36.

Mittheilungen aus Centralamerika (Fortſetzung).
Engliſche Vogelliebhaberei (Fortſetzung).
Vogelliebhaberei und Vogelſchutz (Schluß).
Einiges über den Zwergfliegenfänger (Muscicapa parva).
Brieſliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Berichtigung. — An die Leſer.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der **Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Prima 99er Elbe-Weißwurm, Kg. 3, 5 Kg. 13,50, 10 Kg. 25 ℳ, Lt. 85 ₰. **Tyroler Ameiseneier,** Lockfein, weiß u. rein, handgeleſen, Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ, ungeleſene Kg. 3 ℳ. [1614] **Zeke (Musca),** 99er, feinſte, fr. Ware, à Ko. 2,60 ℳ, 5 Ko. 12,50 ℳ. Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahren ſelbſt erprobt, Ko. 2 ℳ, ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- u. Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ mit Sack, reelles Gewicht u. Maß, ſtreng gewiſſenhafte Bedienung. Preisl. grat. **Brühl's** Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,** [1615] Waren i. Mecklenb.
Proſpekte gratis.

Der beſte Fangapparat für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1616]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.



Käfige
jeder Art
(Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1617] Oſchatz i. S.

Neu! Senſationell!

Kanarien-Lehr-Orgeln, auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G.-M. 108184, ohne Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [1618] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen. Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen. **Reparaturen** aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt.

Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1619]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Holzwaarenfabrik.

C. L. Flemming
Globenstein, Poſt Rittersgrün, Sachſen
empfiehlt: [1620]
Flug- und Heckbauer, Einſatzbauer, Geſangskaſten.
Muſterpackete 9 St. ſort. f. Kanarienzüchter M. 6 franko.

Holzwaarenfabrik.



Man verlange Preisliste.

Für alle Arten Vögel fertige ich **fachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1621]

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krahen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1622]
K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe.
Schlotheim i. Th.

Hunde-Halsbänder in ff. vernick. Metall mit Lederunterlage u. Namensgravur per Stück von 3–8 ℳ. [1623] **H. D. Becker,** Iſerlohn.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1624]

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Allianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 36. Magdeburg, den 7. September 1899. XXVIII. Jahrg.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

Die Trupiale (Icterus) von Guatemala.

II.

(Fortſetzung).

Grayſon's Trupial (Icterus Graysoni, *Cass.*). Dieſer Vogel iſt weder in der Liſte noch in der Sammlung des zoologiſchen Muſeums vertreten. Auch er zählt zu den Seltenheiten und hat nur ein beſchränktes Verbreitungsgebiet, Coban und Verapaz. Deſſen ungeachtet kommt er dennoch hin und wieder im Handel vor und die ihn bringenden Indianer behaupten, daß auch er ein beutelförmiges Neſt errichtet. Ueber ſein Freileben kann ich leider nichts weiter berichten, hoffe aber, ſobald mich geſchäftliche Angelegenheiten nach dieſen Diſtrikten rufen, auch dieſen, mir noch offenen Fragen, meine Aufmerkſamkeit zuwenden zu können. Die Beſchreibung kann ich jedoch nach den Vögeln meiner Sammlung vornehmen.

Männchen: Stirn, Scheitel, Wangen und Nacken rothgelb. Geſicht ſchwarz, Kehle ſchwarz, nach der Bruſt einen verlängerten Latz. Bruſt rothgelb. Leib gelb. Schultern ſchwarz, Untergrund gelb durchſchimmernd. Rücken gelb. Schwanz ſchwarz, Schwanzdecken gelb. Flügel ſchwarz, alle Federn außen weiß geſäumt. Am Oberarm einen unreinen gelben Spiegel mit einigen ſchwarzen Flecken. Unterflügel grau, Unterdeckfedern gelb. Schnabel, Auge, Füße ſchwarz.

Weibchen: Genau wie das Männchen, doch in der rothgelben Färbung etwas heller.

Jugendkleid iſt mir unbekannt.

Schwarzkehliger Trupial (Icterus gularis, *Lchtst.*). Dieſer Beutelſtar wird zu Land Chiltote genannt. Er vertritt die größte Art ſeines hier vorkommenden Geſchlechts, aber trotzdem ſcheint er mir hinfälliger wie alle anderen zu ſein, wenigſtens erfordert er in der Gefangenſchaft und beim Eingewöhnen große Aufmerkſamkeit. Einmal ſchlapp geworden, läßt der Vogel wochenlang die Flügel hängen und erholt ſich nur ſehr langſam. Mit lebenden Inſekten darf man dem gularis gegenüber in der erſten Zeit nicht ſparſam ſein; bis er ſich an ein Miſchfutter gewöhnt hat, bedarf er reichlich lebende Fleiſchnahrung. Mit einem Neſt noch junger, nackter Mäuſe mache ich meiner Sippſchaft von Icterusarten ein Hauptvergnügen. Aufgeſchnittene Apfelſinen ſind ihm ſehr willkommen, ſpäter frißt er aber auch wol mehr aus Zeitvertreib trockenes Weißbrot.

In Guatemala lebt der I. gularis mehr in zuſammenhängenden Laubwaldungen, iſt aber ebenſo auf der Hochebene anzutreffen und kommt von allen Arten am meiſten im Handel vor. Wie ſchon ſein hieſiger Name Chiltoto ſagt, gehört der gularis auch zu denjenigen, welche ein beutelförmiges Neſt errichten und die mir gebrachten Neſter ſind größtentheils von ihm. Viele, viele Pare niſten zuſammen auf einem Baum, ſogar neben den Kaſſiken. Strauch und Erde ſind unter den Niſtbäumen von Koth verſchmutzt. Anfangs Juni fand ich die Neſter leer und die Jungen waren ſchon ausgeflogen. Ich vermuthe, daß der gularis mehrere Male hintereinander niſtet, denn nachdem die Jungen ſelbſtändig geworden ſind, bleiben ſie von den Alten geſondert und treiben ſich in kleinen Trupps allein im Land umher, ſuchen aber alsdann vorherrſchend die Küſten auf.

Männchen: Stirne bis zum Nacken und Wangen rothgelb. Geſicht ſchwarz, von der Kehle nach der Bruſt breiter ſchwarzer Latz. Bruſt und Leib rothgelb, Schultern ſchwarz, Rücken grünlichgelb mit durchſcheinendem grauen Flaum. Beide Schwanzdecken rothgelb, unten etwas heller, Schwanz ſchwarz, am Grunde $^1/_3$ gelb. Flügel ſchwarz, Schwungfedern bräunlich fein geſäumt, die der erſten Ordnung mit Ausnahme der erſten am Grunde der Außenfahne kleinen weißen Fleck, Deckfederchen der 1. Reihe ſchmal weiß geſäumt, die hierdurch entſtehende, wenig auffallende weiße Zeichnung iſt ſehr veränderlich und nicht bei allen Vögeln übereinſtimmend. Am Oberarm einen gelben Spiegel, die hier zu unterſt liegenden Federchen weiß. Die unteren Flügeldecken weißgelb. Schnabel und Auge ſchwarz, Füße grauſchwarz.

Weibchen ſtimmt in allen Theilen mit dem Männchen überein; ich habe wiederholt Vögel geöffnet, welche ich von außen für Männchen gehalten habe und die ſich beim Seciren als Weibchen entpuppten. Die im Muſeum als Weibchen ausgeſtellten Vögel ſind alle im grünlichen Gefieder und ausſchließlich junge Vögel.

Jugendkleid. Das Neſtkleid iſt jedenfalls nochmals verſchieden von dem Kleid des Vogels im erſten Jahr. Eine Beſchreibung des Neſtgefieders kann ich leider nicht geben, da ich meiner Sache nicht ſicher bin, was für eine Art ich vor mir habe und ſomit eine weitere Verfärbung erſt noch abwarten muß. Dagegen habe ich vier lebende Vögel, welche unſtreitig alle I. gularis ſind, aber keiner dem andern gleicht. Die Beſchreibung eines beſonders ſchön gefärbten Vogels, vermuthlich ein Männchen, laſſe ich folgen.

Stirn, Scheitel, Wangen gelb, Nacken grünlich, Kehle nach der Bruſt ſchwarz, Latz von geringerer Ausdehnung. Bruſt gelb. Leib hellgelb, Schultern olivengrün, Rücken grüngelb. Schwanz grau olivengrün. Schwanzdecken grüngelb, Flügel grau, Schwungfedern I. und II. Ord. linienartig weiß geſäumt, Deckfedern I. Reihe grau, Außenfahne weiß, Deckfedern II. Reihe graugelbgeſäumt. Oberarm gelbgrünlich grau ohne Spiegel. Schnabel grauſchwarz. Augen ſchwarz, Füße grau. Die anderen Vögel gleichen in den Grundzügen dieſer Beſchreibung. Ein Vogel hat noch ſchwarz geſtrichelten Kopf und Nacken, der andere nur einen unreinen Nacken, und der dritte eine unreine geſtrichelte, oder vielmehr getuſchte Bruſt. Gularis ſind es alle, denn der Schwanz iſt ſchon am Grunde etwa $^1/_3$ gelb.

Orange-Trupial (Icterus cucullatus, *Sws.*). Leider ſind nur die Diſtrikte Coban und Verapaz mit dieſem hübſchen Vogel bevorzugt; nur ſelten kommt er auf ſeinen Zügen etwas ſüdlicher. Zu Land nennt man den cucullatus chorcha de garganta negra (ſchwarzkehlige Chorcha), was im Grunde genommen ein rechter Unſinn iſt, da alle Icterusarten eine ſchwarze Kehle haben. Ueber das Freileben, Neſt und Jugendkleid zu berichten muß ich auf eine ſpätere Zeit verſchieben, da ich darüber bis jetzt noch keine Beobachtungen gemacht habe.

Männchen: Stirn, Scheitel, Wangen und Nacken gelb. Geſicht ſchwarz, Kehle ſchwarz, nach der Bruſt einen verlängerten Latz. Bruſt hellgelb, Leib gelb, Schultern ſchwarz, Rücken gelb. Schwanz, die mittleren Federn ſchwarz, die äußeren gelb mit etwas ſchwarz gemiſcht. Schwanzdecken gelb. Flügel ſchwarz, Oberarm ohne Spiegel. Deckfedern erſter Reihe Außenfahne gelb, gelbe Binden bildend. Unterflügel grau, innere Fahne weiß. Untere Deckfedern hellgelb. Schnabel, Auge ſchwarz, Füße grauſchwarz.

Weibchen übereinſtimmend mit etwas weniger Feuer in der gelben Zeichnung.

Schwarzſtreifiger Trupial (Icterus mesomelas, *Sclater.*). Weder in der Liſte noch in der Sammlung des Zoologiſchen Muſeums iſt dieſe Art vertreten, aber dennoch zählt der mesomelas zu den Vögeln von Guatemala und iſt im Peten heimiſch. Lebend dieſen Vogel zu erhalten, wird nicht ſo leicht ſein, zumal da Peten ſehr abgelegen und faſt noch nicht erforſcht iſt, weder Verkehrswege noch dicht bewohnte Diſtrikte hat. Es iſt die Wildniß von Guatemala und unſtreitig für eine Expedition ein dankbares Gebiet. Sobald mir Gelegenheit geboten iſt, weitere Studien zu machen, werde ich meine Beſchreibungen fortlaufend ergänzen. Für heute kann ich nur die Beſchreibung des Gefieders folgen laſſen.

Männchen: Stirn, Scheitel, Wangen, Nacken gelb, Geſicht ſchwarz, Kehle ſchwarz, nach der Bruſt den bekannten ſchwarzen Latz. Bruſt und Leib gelb. Schultern ſchwarz, Rücken gelb. Schwanz, die Außenfedern kürzer und gelb, die mittleren länger und ſchwarz. Flügel ſchwarz. Schwungfedern zweiter Ordnung, Außenfahne weiß geſäumt. Deckfedern erſter und zweiter Reihe in der Außenfahne gelb getuſcht, Oberarm mit gelbem Spiegel. Unterflügel grau, untere Deckfedern gelb. Schnabel grau, Auge ſchwarz, Füße grau.

Weibchen mit dem Männchen übereinſtimmend.

In meiner Liſte habe ich noch einen Icterus unter No. 13 erwähnt, der mir in ſeiner Erſcheinung neu und unbekannt iſt. Das vorangeſetzte Fragezeichen ſoll ſagen, daß ich weder den **Geſprenkelten Trupial** (Icterus pustulatus) noch den ſpäter beſchriebenen Vogel kenne. In den hieſigen Sammlungen iſt er mit Unrecht immer nur als Weibchen irgend einer andern Art eingereiht, wohingegen ich auf das beſtimmteſte glaube, es mit einer ſelbſtändigen Art zu thun zu haben. Vielleicht komme ich ſelbſt dieſer Angelegenheit noch auf den Grund, vielleicht erhalte ich Aufſchluß aus dem Leſerkreis. Von der erwähnten mir unbekannten Art habe ich drei Exemplare, 1 Männchen und 2 Weibchen erlegt und präparirt, die ich eventuell zu einer Beſtimmung auch nach Europa ſenden würde.*) Das Männchen iſt etwas größer als das Weibchen. Die Beſchreibung des Gefieders ergiebt folgendes:

Männchen: Geſammteindruck gelbgrün. Stirn und Scheitel bronzeartig gelbgrün, Geſicht grau, Wangen dunkelgelb, ſchwarz geſtrichelt, Nacken dunkel gelbgrün, ſchwarz geſtrichelt. Kehle gelb, ſchwarz

---

*) Wir bitten um gefällige Ueberſendung des Männchens und eines Weibchens der zu beſtimmenden Art. D. L.

[illegible]



[illegible] (Fringilla [illegible])

[illegible]

[illegible]

* * *

Englische Vogelliebhaberei.

[illegible]

(Fortsetzung.)

[illegible]

einige Wochen lang lebte, war von ihm als preisgekrönter Neuling gekauft worden, alſo ein eingewöhnter und überwinterter Vogel, doch ſiechte er hin. Da wir denn doch einmal bei dem Kapitel der Todesfälle angelangt ſind, will ich hier einen Würger nennen, den bis jetzt wol ſehr wenige außer ihm zu halten ſuchten; es iſt Lanius rufus, ein ſchwarzrückiger Würger, der ſelbſt auf dem Kontinent ſelten ſein ſoll. Dieſer hielt ſich einige Monate lang gut im Stand, dann wurde er wilder als ſelbſt der graurückige Würger. Ohne Flügel- oder Schwanzfedern konnte er ſich nicht einmal der ihm angebotenen Freiheit bedienen und ging in der folgenden Mauſer ein. Nicht viel beſſer ging es mit zwei Exemplaren der größeren, graurückigen Abart, denn die hielten auch nicht lange aus, aber Mr. Fulljames hatte glücklicher Weiſe mit einem davon einen erſten Preis errungen, was ihn mit dem Verluſt dreier ziemlich koſtſpieliger Würger wieder ausſöhnte. Seine Ausdauer und ſein Gleichmuth ſind durch einige Todesfälle nicht gleich erſchöpft. Wenn er je einmal die Hoffnung aufgibt, mit irgend einem permanent beſchädigten, aber ſonſt intereſſanten Exemplar ſeinen Zweck zu erreichen, ſo kann er ſolche jederzeit unſerm Zoologiſchen Garten verehren, wo ſie dann bei noch größerer Pflege und Raumgewährung oft lange leben. Trotz einem etwaigen chroniſchen Defekt, der ſie alſo zur Prämirung unzuläſſig macht, erregen ſie doch die Bewunderung der Gartenbeſucher, und die Naturhiſtoriſche Geſellſchaft erkennt ſolche Geſchenke immer offiziell an. Ein fein lithographirtes durch die Poſt erfolgtes Dankſchreiben, eventuell Namens-Veröffentlichung des Gebers animiren zu weiteren Geſchenken.

Um nun wieder auf die geſunden Vögel in Mr. Fulljames zweitem Zimmer zurückzukommen, will ich noch einiger Arten erwähnen. die ſelten in engliſchen Sammlungen zu finden ſind, z. B. die gewöhnliche Wachtel. Dem Zahn des Epikurs verfallen, werden dieſe ſchockweiſe lebendig eingeführt, aber ſie als Käfigvogel gehalten fand ich ſeit Jahren nur bei unſerm Freund Fulljames. Den Schlag habe ich ſeit Jahren nicht mehr gehört; hingegen halten wir die andere Delikateſſe, die Ortolane, vielfältig, und ſie ſingen ihre einförmige Strofe Monate lang im Käfig oder in der Voliere, leben auch manchmal zwei bis drei Jahr trotz ihrer furchtbaren Trägheit.

Ferner notirte ich an jenem Sonntag eine ziemlich farbloſe Blaurake, einen Kibitz, ein Par Strandläufer oder Regenpfeifer (Tringafamilie), von Calais mitgebracht, und eine Rohrdommel (?) (Crex pratensis). Wie man ſolche Vögel in der Abſicht kaufen kann, ſie einſt als Käfig- oder Stubenvögel einem Preis-Richter vorführen zu können, iſt mir nicht ganz klar. So viel iſt ſicher, daß keiner mehr davon am Leben iſt.

Nachdem ich noch eine hübſche Elſter rühmlichſt erwähnt habe, wollen wir dieſes zweite Vogelzimmer und ſomit den erſten Stock der Villa verlaſſen und in's Erdgeſchoß hinabſteigen, wo ſich die dritte Stube befindet. Dieſe enthält beinahe ausſchließlich Fremdländer, wobei die mit A anfangenden Welttheile alle vertreten ſind. Auch hier ſind zwei geräumige Wandvolièren von 7 bis 8 Quadratmeter Flächeninhalt abgeſondert, laſſen aber freien Raum für 20 bis 30 große Käfige, die auf Bänken aufgethürmt ſtehen und für das Durchpaſſiren der vielen Beſucher, die von da aus durch Glasthüren in den Garten gehen, um auch die Gartenvolière zu inſpiziren. Im Vorderzimmer, Sallo à manger, finden wir einige Harzer Kanarien und eine Nachtigal, alle in feinen, deutſchen Zierbehältern und von Zimmervegetation umgeben.

Man ſollte meinen, daß die 150 unten lebenden Exemplare eben genug Platz wegnehmen. Aber, nein! Eine Wand der ſehr großen, etwas abgelegenen Küche iſt auch noch durch Käfige verdeckt und ſpielt eine große Rolle in dem Vogelweſen. Alle neuen Ankömmlinge paſſiren hier die Quarantaine, um das Ausbrechen einer Seuche möglichſt zu neutraliſiren. Entfernt von den andern Lokalitäten ſind neue Importen hier unter der direkten Beobachtung der Wärterin. Während 8 bis 14 Tagen wird alles als verdächtig angeſehen und bleibt nöthigenfalls noch länger in der Küche, bis man ſicher iſt, daß ſie keine Epidemie mit in das betreffende Vogelzimmer ſchleppen. Bis jetzt hat Mr. Fulljames nur einen Unfall derart gehabt, wodurch er ein Dutzend großer Sittiche und Papageien einbüßte. Der Umſtand, daß viele andere in derſelben Stube nicht angegriffen wurden und heute noch leben, wirft bei mir die Frage auf: Was für eine Plage gibt es, die nur gewiſſe Arten einer Sektion hinrafft und andere unverſehrt läßt? Oder war es nur überhaupt eine anſteckende Papageien-Krankheit?

An eine eingehende Beſchreibung der vielen Exoten, die alſo hier auf gleicher Erde gehalten werden, wage ich mich nicht. Genüge es den verehrten Leſern der Gefiederten Welt, daß hier nahezu hundert verſchiedene Arten einzeln oder parweiſe, hier und da auch halb dutzendweiſe vertreten ſind, die alle in andern Welttheilen gefangen und nach Europa exportirt wurden.

Vogelliebhaberei und Vogelſchutz.

Von M. Dankler.

(Schluß).

Werden ſchon durch den Schutz und durch zweckmäßiges Füttern viele Vögel indirekt erhalten, ſo ſorgen viele Vogelfreunde, überhaupt alle, die ſelbſt züchten, auch noch in direkter Weiſe für die Vermehrung des Vogelbeſtandes ihrer Gegend. Hier iſt dieſes wenigſtens allgemein der Fall. Züchter, die im Jahr 10—15 Bruten haben, ſetzen jährlich oft 30—40 Stück in Freiheit. Es ſind überzählige Thiere, beſonders Weibchen, die ſie natürlich nicht alle behalten und auch wenig verwerthen können. Es iſt dies für die

Vermehrung unſerer Vögel um ſo wichtiger, als gerade in der Freiheit an Weibchen Mangel iſt. Jedes freigelaſſene Weibchen iſt ſchnell gepart, und es ſind darauf eine oder mehrere Bruten zu rechnen. Auf ſolche Art und Weiſe iſt der Sproſſer in die hieſige Gegend eingeführt worden. Ein Liebhaber beſtellte ſich drei Pärchen, wenn ich nicht irre, aus Dalmatien, von denen im erſten Jahre zwei, im folgenden alle drei zur Brut ſchritten. Er ließ im ganzen 12 Stück fliegen, die Thiere haben ſich ganz in der Nähe in einem Wäldchen angeſiedelt und ſind mit ihrer Nachkommenſchaft der Gegend treu geblieben.

Daſſelbe erzählte mir ein Freund von der Singdroſſel. Derſelbe hatte zwei Pärchen, die in jedem Jahr brüteten. Er behielt jedesmal nur ein ſchönes Männchen und ließ die andern fliegen. Seit dieſer Zeit iſt die Singdroſſel in der Gegend heimiſch geworden und geblieben. Solche Beiſpiele ſtehen aber keineswegs vereinzelt, ſondern es iſt das gewöhnliche Verfahren der meiſten Liebhaber. Sie haben durchgängig keine Luſt und keine Verbindungen, ihren Ueberſchuß zu verwerthen, er wird in Freiheit geſetzt und gereicht dem Vogelbeſtande der Gegend zum Nutzen. Denkt man dann ferner darüber nach, wie gering die Zahl der Vögel iſt, die ſich in den Händen der Liebhaber befinden, im Vergleiche zu den Tauſenden (ich erinnere an meinen Aufſatz über das Schickſal der Vogelneſter) die auf andere Weiſe zu Grunde gehen, ſo wird man zu der Ueberzeugung kommen, daß durch die Vogelliebhaber der Beſtand der Singvögel abſolut nicht in nur etwa nennenswerther Weiſe geſchädigt wird, daß im Gegentheil der Vogelliebhaber viel dazu beiträgt, den Beſtand zu ſtärken und zu erhalten. Daß die Zahl der gehaltenen Vögel nicht groß iſt, kann jeder wieder leicht einſehen, wenn er die Häuſer ſeiner Bekanntſchaft an ſeinem Geiſte vorüberziehen läßt. Angenommen, in der Hälfte der Häuſer eines Dorfes würde ein Vogel gehalten, und es ſollen im ganzen 100 Vögel gehalten werden; dann ſind mindeſtens 85 Stück davon Kanarienvögel (dies kommt wol daher, weil ein Kanarienvogel leicht, die meiſten unſerer wilden Sänger jedoch nur mit großer Sorgfalt erhalten werden können). Heute Mittag hatte ich 54 Kinder eines kleinen Dorfes verſammelt, um über das Oertchen inbetreff der darin gehaltenen Vögel Notizen zu machen. Die 54 Kinder gaben an, daß in ihren Familien 17 Vögel gehalten würden. Davon waren 14 Kanarienvögel, ein Flachsfink und zwei Diſtelfinken. Dazu weiß ich, daß noch 2 Amſeln gehalten werden. Iſt denn das eine Schädigung des Beſtandes? Nein, dieſer Vorwurf hat gerade ſo wenig Halt, wie auch der der Quälerei, und demgemäß wäre es ein großer Fehler, das Halten von heimiſchen Singvögeln zu verbieten. Einwürfe und weitere Gründe bin ich gern bereit zu erwidern und zu widerlegen.

Nun aber etwas anderes. Nun wollen wir einmal ſehen, was denn zum Schutze unſerer Vögel erſtrebt werden kann und muß, und hier nenne ich an allererſter Stelle das Fortfangen der Singvögel zu Eßzwecken. Alſo:

1. Der Fang der Vögel zu Eßzwecken und das Feilhalten dieſer Vögel muß verboten werden. So harmlos der Fang einiger Vögel zu Liebhaberzwecken iſt, ſo verhängnißvoll für den Vogelbeſtand einer Gegend, ja für eine Gegend ſelbſt kann der Maſſenfang zu Eßzwecken werden. Ich erinnere hier an den Krammetsvogelfang. So lange derſelbe nicht verboten wird, haben wir gar keine Grundlage, von den Italienern den Schutz unſerer Singvögel zu verlangen. Und würden nur noch Krammetsvögel, alſo Wachholderdroſſeln gefangen! Aber ſchon eine Muſterung der Schaufenſter der einſchlägigen Geſchäfte einer Stadt zeigt, wie ſtark die Singdroſſel, eine unſerer beſten Sängerinnen, dabei in Mitleidenſchaft gezogen wird. Ich habe bei einem Rundgang durch Aachen an einem Tage 32 Singdroſſeln, in Köln 57 Singdroſſeln gezählt. Wie viel mögen alſo in einem Monate dort verkauft und verzehrt werden! Und wie viel andere Vögel werden noch in den Schlingen gefangen, beſonders Amſeln! Dieſe werden allerdings nicht bis in die Verkaufsläden gebracht, ſondern an Ort und Stelle verzehrt. So bleibt mir ein Erlebniß unvergeßlich. Ein Fuhrknecht meines Heimatsdorfes, der im Dienſte eines großen Kaufmannsgeſchäfts einen großen Planwagen fährt, welcher die kleineren Dörfer (bzl. die Geſchäfte derſelben) mit allen Kaufmannswaren verſieht, hatte ſich auf einer großen Tour, in der Nähe der holländiſchen Grenze verfahren. Es war ſpät in der Nacht, und als die Morgendämmerung graute, hatte er eine Waldſchneiſe, durch welche ein Fuhrwerk für Holzkarren ging, durchfahren. Da hatte er an den Bäumen zu beiden Seiten eine große Anzahl Vögel bemerkt, die nach ſeiner Auffaſſung und Ausdrucksweiſe an Pferdeharen „aufgehangen“ waren. Und ohne eine Ahnung von dem Sachverhalt zu haben, hatte er wol über hundert Stück abgepflückt und in die unter dem Wagen ſchwebende Futterkiſte, in das ſogenannte Car gethan. Darunter befanden ſich 17 Singdroſſeln, 12 Amſeln, mehrere Rothkehlchen und noch andere Vögel. Und das beim Theilfang einer einzigen Nacht. Hier ſollten die Forſtverwaltungen ſchon eingreifen, indem ſie ihre Förſter auf eine andere Weiſe für den Ausfall in ihrem Nebenverdienſt entſchädigen, denn der Wald hat an erſter Stelle den Schaden davon. Niemals würden die Inſekten ſolchen Rieſenſchaden anrichten können, wie es oft der Fall iſt, wenn die natürlichen Beſchützer des Waldes nicht in ſolchen Maſſen weggefangen würden. Ich bin überzeugt, daß z. B. in Aachen eine einzige große Wildpret- und Delikateſſenhandlung in einer Saiſon mehr einheimiſche Vögel verkauft als eine Vogelhandlung in einem ganzen Jahr, dabei iſt in Aachen nur eine beſondere Vogelhandlung, aber Handlungen, die Krammetsvögel verkaufen, gibt es an allen Ecken und Enden. Ebenſo iſt es in anderen größeren Städten; in jeder werden Tauſende in jedem Herbſte verſpeiſt, und die Zahl derer, die in jedem Jahre dadurch weggefangen werden, iſt wol nach Millionen zu zählen. Rechnet man dazu die ungezählten Tauſende von Amſeln, Singdroſſeln, Rothkehlchen u. ſ. w., ſo kann man ſich ungefähr einen Begriff machen, wie groß die Verheerungen ſind, die in jedem Jahre durch den Krammetsvogelfang, durch den ſogenannten „Dohnenſtieg“ angerichtet werden.

Die Art und Weiſe aber, wie dieſer Fang betrieben wird, iſt wahre und richtige Thierquälerei.

Wenn auch die Mehrzahl der Vögel mit dem Halſe in die Schlinge geräth und ſich dadurch raſch zu Tode zappelt, ſo bleiben auch viele mit Flügeln und Beinen darin hängen, und dieſe erleiden einen wirklich qualvollen Tod. Die zerbrochenen und ausgerenkten Beine und Flügel zeugen von ihren vergeblichen Anſtrengungen, ſich zu befreien. Iſt die Behandlung beim Liebhaber die denkbar beſte, ſo iſt der Fang für Eßzwecke der denkbar grauſamſte. Auch in moraliſcher Beziehung iſt der Unterſchied groß, denn während der Stubenvogel beſonders das Zimmer des einfachen Mannes belebt und ihm ſo nach harter Arbeit einen Genuß verſchafft, dient der zu Eßzwecken gefangene Vogel nur dazu, den Gaumen des Feinſchmeckers, dem doch tauſenderlei Genüſſe zugänglich ſind, zu kitzeln. Derartige Unterſchiede können nicht ſcharf genug hervorgehoben werden, denn ſonſt wäre es wirklich möglich, daß die Geſetzesberather dem Liebhaber ſein Vögelchen nehmen, aber des Feinſchmeckers Bratpfanne unangetaſtet ließen, während gerade das Gegentheil erſtrebt werden muß und das einzig Richtige iſt.

Ein zweiter Punkt, der bei dem Geſetze in's Auge gefaßt werden muß, iſt das Tragen der Vogelfedern auf den Damenhüten. Was die fremden Federn angeht, ſo kann uns dieſes hier ſehr gleichgültig ſein, denn wenn die Regierungen jener Länder die Augen nicht aufmachen und die Ausfuhr der Federn nicht verbieten, ſo iſt das ihre Sache. Häßlich ſind ja auch die ausgeſtopften Vogelleichen fremder Vögel auf jeden Fall, aber wenn die verdummende Mode in Betracht kommt, dann geht ja den Damen der Schönheitsſinn, ja man ſollte manchmal ſagen, die geſunde Vernunft und Ueberlegungskraft vollſtändig flöten, und ſie unterwerfen ſich ſklaviſch den Launen einiger hirnverbrannten Schneiderſeelen. Leider, daß man es ſo ſcharf ſagen muß, aber wenn es auch nichts nützt, man hat ſich doch etwas Erleichterung verſchafft. Was ſoll man aber ſagen, wenn man ſieht, daß Hüte mit Schwalbenbälgen und Schwalbenflügeln ausſtaffirt ſind? Und derartige Hüte habe ich in dieſem Frühjahr mehrere geſehen. Es ſollen ja alles ausländiſche Vögel ſein, die als Hutſchmuck gebraucht werden, aber bei genauerm Nachſehen entdeckt man eine ganze Anzahl von heimatlichen Vögeln und Federn darauf, bald ganz ungenirt im Naturzuſtande, bald gebrannt und gefärbt. Das ſollte wieder ſtrengſtens verboten ſein, und ein ſolches Verbot würde Tauſenden von Vögeln das Leben retten. Allerdings mehren ſich auch in Amerika und ſelbſt in Braſilien die Stimmen, welche die baldige Ausrottung beſonders ſchöner und begehrter Vögel vorausſagen und auch hier ſind Maßregeln zum Schutze derſelben zu erwarten. Es wäre nun allerdings Unrecht, wenn man verſchweigen wollte, daß auch in der Damenwelt Stimmen gegen den Vogelmord zu Modezwecken laut werden, ich erinnere nur an die Vorkämpferin derſelben, die berühmte Sängerin und Vogelfreundin Frau Lilli Lehmann, aber dieſe Ausnahmen ſind noch ſeltener wie weiße Raben.

Endlich iſt dann noch darauf hinzuwirken, daß der Maſſenfang im Süden aufhöre, deſſen verheerende Wirkungen wir am beſten an den Schwalben, bezl. an deren Abnahme beurtheilen können.

Außer dieſen Hauptpunkten wären dann noch eine Anzahl Nebenpunkte zu berückſichtigen. Dazu rechne ich die Verſchickungsart des Schlachtgeflügels, das qualvolle Liegen der Thiere mit zuſammengebundenen Füßen ohne Waſſer und Nahrung, das Taubenſchießen, Kaſtriren u. a. Das Mäſten bezl. Stopfen der Gänſe zur Erlangung großer (kranker) Lebern, kann auch nur als Quälerei bezeichnet werden. Eine Sache, die von Eltern und Lehrern nicht ſtreng genug verboten werden kann, iſt das Fangen der Vögel in der ſogenannten Spatzenfalle, einem Tellereiſen im kleinen, welches den Vögeln die Beine zerſchmettert. Dem Vogelfreund bietet ſich ſomit ein ſehr weites Feld, der gefiederten Welt Schutz und Hilfe angedeihen zu laſſen, er muß es nur nicht am falſchen Ende anfaſſen wollen.

Einiges über den Zwergfliegenfänger (Muscicapa parva).

Von Alfred Pohl.

Mit Rückſicht darauf, den Herren Vogelfreunden etwas Intereſſantes zu bieten, erlaube ich mir, einen Vogel zu beſchreiben, der wenigen ſowohl in der Freiheit wie auch als Stubenvogel bekannt ſein dürfte.

Der Zwergfliegenfänger (Muscicapa parva), auch ſpaniſches Rothkehlchen benannt, mißt von der Schnabelſpitze bis zum Schwanzende 11,7 cm. Seine Flugweite beträgt 20,3 cm, die Schwanzlänge 4,8 cm, die Länge des Schnabels 0,8 cm und das Fußrohr 1,8 cm.

Das alte Männchen im Hochzeitskleide ſieht einem Rothkehlchen täuſchend ähnlich. Der Schnabel iſt ziemlich ſtark, an der Wurzel breit und ſchwarz, der Rachen gelb. Die Augen ſind braun, groß und lebhaft, wie beim Rothkehlchen. Die Füße ſind ſchwächlich und ſchwarz gefärbt. Der Zwergfliegenfänger hat auf der Kehle einen röthlich orangegelben Fleck, welcher ſchmäler als beim eigentlichen Rothkehlchen iſt. Auf dem Rücken iſt er braungrau, auf der Unterſeite beim Kehlfleck ſchmutzig-weiß, auf dem Bauche gegen den After hin reinweiß. Die Federn des Schwanzes ſind mit Ausnahme der vier ſchwarzbraunen, mittleren Federn an der Wurzelhälfte weiß, im übrigen ebenfalls ſchwarzbraun gefärbt.

Beim Weibchen und jungen Männchen iſt das Orangeroth der Kehle nur angedeutet.

Als die eigentliche Heimat des Zwergfliegenfängers wird Oſteuropa, Aſien bis Kamtſchatka genannt. Im weſtlichen Europa ſoll er höchſt ſelten vorkommen.

Ich kenne den Vogel zwanzig Jahre, habe ihn jedoch bisher nur als ſeltenen Durchzügler wahrgenommen. Heuer am 5. Mai gelang es mir, ein ſchön ausgefärbtes Männchen beim Durchzuge im Schlaggarne, mit

Mehlwurm beködert, zu fangen. Ich ſetzte den Vogel in einen großen Flugkäfig von der Form eines Sproſſerkäfigs in großem Stile, deſſen Sprunghölzer 40 cm von einander entfernt ſind, was bei dieſem Vogel deshalb von Belang iſt, weil er — wie alle Fliegenfänger — von einem Sprungholze auf das andere einen Rundflug macht. Anfangs verhüllte ich das Vogelhaus, gab dem Vogel friſche Ameiſenpuppen, die er ſogleich annahm. Am zweiten Tage ließ der Zwergfliegenfänger bereits Locktöne hören, und ungefähr vierzehn Tage darauf begann er ſeinen Geſang.

Der Vogel hat ſich ganz gut eingewöhnt. Mit geräuſchloſer Behendigkeit macht er ſeinen Rundflug und iſt anſcheinend ſehr munter.

Auch gelang es mir im heurigen Jahre Mitte Mai zum erſten Male, ein angeſiedeltes Pärchen zu beobachten. Es benimmt ſich im Freien vorſichtig, ohne gerade ſcheu zu ſein. Das Pärchen bewohnt ein Altholz, aus Tannen und Buchen beſtehend, und treibt ſich den ganzen Tag, ein ziemlich großes Revier behauptend, nach Inſekten haſchend herum. Die Locktöne des Brutpärchens ſind: „Hoid, hoid, ſerr“. Der Geſang lautet: „Zink, zink, zink, zink, dai, dai, dai, daiba“ und ertönt fleißig den ganzen Tag.

Im Weſen und Treiben gleicht der Zwergfliegenfänger ſehr dem Fitislaubvogel (Sylvia trochilus). Dieſer Vogel geht auch bei warmer Witterung gerne auf den Boden herab, während andere Fliegenfängerarten dies mehr bei rauhem Wetter zu thun pflegen, um Inſekten aufzuheben.

Trotz emſigen Suchens konnte ich das Neſt nicht finden, weil das Pärchen eben ein zu großes Revier behauptet und das Altholz reich an Höhlen und Krebswüchſen iſt. Ende Juni fand ich vier ausgeflogene Junge, welche nach Art der Laubvögel dicht aneinander gedrängt auf einem Aſte ungefähr zwei Meter hoch über der Erde ſaßen und ſich von den Alten füttern ließen. Das beobachtete ich durch zwei Wochen täglich.

Jetzt treibt ſich die ganze Familie in dieſem Reviere herum. Der Geſang des Männchens verſtummte in den erſten Tagen des Monats Juli.

Die weiteren Beobachtungen betreffs Ueberwinterung werde ich zur entſprechenden Zeit berichten.*)

Schon in früheren Jahren habe ich den Zwergfliegenfänger zur Zugzeit in der erſten Hälfte Mai und der zweiten Hälfte des Monats Auguſt im Laubholze an Flußniederungen beobachtet.

---

*) Wir bitten darum.

Brieflich Mittheilungen.

. . . Die von Herrn Dr. med. Otto in Erinnerung gebrachte Sorge für gute und reine Luft, ſowie das Verbeſſern derſelben durch Aufſtellen von Eucalyptus-Bäumen im Papageienzimmer iſt nicht genug zu beherzigen! Je mehr wir unſerm Papagei ſeine Heimath zurückzaubern, um ſo wohler wird er ſich bei uns fühlen! — Nun, für gute Luft habe ich von jeher geſorgt, für mich ſowohl, als für meine Vögel; aber die Bedeutung der Eucalyptus-Bäume war mir noch fremd. Um nun meinen Fehler raſch wieder gut zu machen und meinen verwöhnten Pfleglingen auch noch das für ihre Lungen ſo wichtige „Parfum der Heimath“ zu verſchaffen, kaufte ich mir in Ermangelung eines Baumes eine Flaſche Skallers Auſtral. Eucalyptus-Oel, von dem ich kürzlich geleſen hatte. — Ich glaube beſtimmt, daß dieſes Oel mindeſtens dieſelbe desinfizirende Wirkung erzielen wird, wie ein oder mehrere Eucalyptus-Bäume; vor allem iſt es einfacher und billiger. Die Hauptſache bleibt doch die Verdunſtung! Um dies zweckmäßig zu erreichen, gieße man von dem Eucalyptus-Oel entweder einige Tropfen in das mit Waſſer gefüllte Gläschen eines Inhalationsapparates oder benutze, wenn es ſich um einen bereits erkrankten Vogel handelt, das von Herrn Hoflieferant Guſtav Voß in Köln erfundene „Sanatorium“ — eine Art Dampfbad für Vögel, in dem die verſchiedenſten Medikamente zu gelinder Verdunſtung gelangen können.

Wer aber augenblicklich keinen der angeführten Apparate zur Verfügung hat, der gieße einige Tropfen Eucalyptus-Oel auf die Außenſeite des betr. Käfigs oder noch beſſer in eine Schale mit kochendem Waſſer.

Bei dieſer Verdunſtung, die ſich ſofort im Zimmer wohlthuend bemerkbar macht, ſchlägt man ſozuſagen zwei Fliegen mit einer Klappe: 1. kommt ſie unſerem gefiederten Liebling zugute und 2. werden dieſe Dämpfe für uns Menſchen bei Aſthma (woran hoffentlich keiner der verehrten Leſer und Leſerinnen leidet!) Huſten, Schnupfen und Influenza auf das Wärmſte empfohlen!

Das Skaller'ſche Eucalyptus-Oel, das in jeder Drogerie zu haben iſt, koſtet 1 ℳ die halbe und 2 ℳ die ganze Flaſche, und wenn ich es hier empfehle, ſo geſchieht das nicht etwa, um der Stadt „Erfurt“ Konkurrenz zu machen — im Gegentheil, wenn man mir heute oder morgen einen echten Eucalyptus globulus verehrte, „gloobe“ ich, würden ich und meine Papageien ihn mit großem Dank acceptiren! — **Rich. Engelhardt**,

Mitglied des Reſidenztheaters.

Anfragen u. Auskunft.

Herrn Friedrich Beltin: Unter den weichfutterfreſſenden auſtraliſchen Sängern empfehle ich Ihnen zunächſt den Paſtorvogel (Prosthemadera Novae-Zeelandiae, *Gmel.*), der einen allerdings mehr wunderlichen als ſchönen, in ſeiner Mannigfaltigkeit und wechſelvollen Reichhaltigkeit kaum zu beſchreibenden Geſang hören läßt. Von den körnerfreſſenden Vögeln würden vielleicht folgende Ihrem Wunſch entſprechen:

der Schilffink (Spermestes castanothorax, *Gld.*), der einen bauchredneriſchen, langgezogenen Sang erſchallen läßt; der Zeresfink (Aegintha modesta, *Gld.*), deſſen Geſang mit kaum oder garnicht hörbaren Tönen beginnt und mit einigen laut flötenden Tönen ſchließt; der Gürtelgrasfink (Spermestes cincta, *Gld.*), der einen kleinen Geſang unter beſtändigem komiſchem Kopfnicken nebſt langgezogenen Lockrufen oft hören läßt. Die übrigen, die hier noch in Betracht kämen, werden zu ſelten eingeführt.

Frau Reg.-Baumeiſter **Reiczug**: Bei der Salicylſäure-Kur verfährt man folgendermaßen: Man taucht die Flaſche mit der Auflöſung (Salicylſäure in heißem Waſſer ohne Spirituszuſatz 1:300—500) vorſichtig, nachdem ſie entkorkt worden, in ein Gefäß mit warmem Waſſer, ſo lange bis die darin ſchwimmenden weißen Flocken verſchwunden, bzl. geſchmolzen ſind, ſchüttelt dann gut um und tröpfelt nun davon 30 Tropfen in den Trinknapf des Vogels, gießt ein Schnaps- oder Spitzgläschen voll deſtillirtes Trinkwaſſer oder beſſer ganz dünnen Haferſchleim hinzu und gibt ihm dies als Getränk. Natürlich darf er nicht früher weiteres Waſſer bekommen, als bis er dieſe Gabe völlig ausgetrunken hat. In der Regel vergehen bei dieſer Kur die Geſchwüre ganz von ſelber oder mindeſtens ſchrumpfen ſie allmählich ein, ſelbſt wenn ſie noch Jahr und Tag vorhanden bleiben, doch ſo, daß ſie dem Vogel keine Beſchwerden machen und ihn auch nicht bedeutſam verunſchönern. Sollten ſchon vor dem Beginn der Kur oder während derſelben einzelne größere Geſchwüre zu bedeutenderer Entwicklung gelangen, zumal an Stellen, wo ſie lebensgefährlich werden können, wie an der Zunge oder am Kehlkopf, im Schlunde u. a., ſo muß man natürlich, je nach der Ortsbeſchaffenheit, mit äußerer örtlicher Kur eingreifen. Man wendet hier auch von außen mit Ausſicht auf Erfolg Salicylſäure an. Das Geſchwür, gleichviel welches (auch jede entzündliche oder näſſende oder eiternde Stelle), wird mit erwärmtem Salicylſäureöl täglich zweimal bis dreimal ganz dünn bepinſelt, und wenn der Papagei dann daran lecken ſollte, ſo kann ihm dies nicht leicht ſchädlich werden.

Herrn **G. Kleinberger**: 1. Für den Käfig von angegebener Größe ſind 5 bis 8 Pärchen kleinſte, bzl. kleinere und je 2 bis höchſtens 3 Par größere Vögel ſchon eine reiche Bevölkerung, falls Sie glückliche Bruten erzielen wollen. Im Nachſtehenden bezeichne ich Ihnen all die Vögel, welche nach meiner Erfahrung als zur Bevölkerung eines großen Heckkäfigs geeignet erachtet werden dürfen. Wählen Sie ſich dann die Ihnen am meiſten zuſagenden Arten aus: Alle Aſtrilde ohne Ausnahme; Mövchen, weiße und bunte Reisvögel, Zebrafink, Elſterchen, Silber- und Malabarfaſänchen, Diamantamandinen, alle Nonnen u. a. (den Bandfink und den Gürtelgrasfink laſſen Sie fort); Paradis-Widafinken; Masken-, dottergelber, Blutſchnabel- und Ruß' Weber; die beiden Kubafinken (aber nur eine Art von beiden); Jakarinifink; der kleine Goldſperling; Karmin- oder Purpurgimpel; Sperlings-, Kap- und Diamanttäubchen (plötzliches Erſchrecken u. a. Beängſtigung müſſen bei dieſen Vögeln beſonders vermieden werden, ſonſt richten ſie durch ſtürmiſches Umhertoben Schaden an); aus der Sippe der Zwergpapageien die Unzertrennlichen; der grünbürzelige Sperlingspapagei; das Grauköpfchen (von dieſen Vögeln nur die eine oder die andre Art in einem Pärchen); allenfalls ein Pärchen einer Schönſittichart; Tovi-, Tui- und Tuiparaſittich; der ſchwarzgefleckte Dickſchnabel; der roſenrothköpfige Edelſittich; die kleinſten Loris bis zum Schwalbenlori hinauf; Fledermauspapageien (niemals mehr als ein Par). 2. Wellenſittiche dürfen Sie nicht in dieſe Geſellſchaft bringen, ebenſowenig irgendwelche einheimiſchen Finken. 3. Nicht tauglich für dieſen Heckkäfig ſind die Kerbthierfreſſer im allgemeinen. 4. Ein Par Sonnenvögel dagegen niſten im großen Heckkäfig, wenn nicht Papageien darin ſind, die ihr offenes Neſt zerſtören, vortrefflich; noch beſſer ein Par Hüttenſänger. 5. Daß die Temperatur in dem Raum, wo der Heckkäfig ſteht, niemals unter den Gefrierpunkt ſinken darf, iſt ſelbſtverſtändlich.

Herrn **A. de Heus**: Der lateiniſche Namen der Doldenrieſche iſt Tradescantia, der des Knöterich Polygonum aviculare. Klettenſamen erhalten Sie ſicher in jeder der in der „Gefiederten Welt“ annonzirenden Vogelhandlungen.

Herrn **H. Hoeſte**: Einen Star können Sie unſchwer mit friſchen Ameiſenpuppen, Mehlwürmern und allerlei anderen Kerbthieren, auch Schnecken und Regenwürmern, an ein Miſchfutter aus rohem Rindfleiſch oder anderem magerem Fleiſch, Ameiſenpuppen, etwas Maismehl und etwas Maikäferſchrot, abwechſelnd mit Mohnſamen und geſpelztem Hafer, bzl. ein Univerſalfutter-Gemiſch gewöhnen. Dazu bieten Sie ihm täglich 4 bis 5, zur Singzeit aber 8 bis 10 Mehlwürmer

Berichtigung.

In dem Artikel des Herrn Dr. med. Otto über die Sepſis der Papageien muß es S. 274, 2. Zeile heißen: eingeweichter Mais (nicht abgekochter Mais).

An die Leſer.

Für die zahlreichen Beweiſe herzlicher Theilnahme, welche mir anläßlich des Todes meines Sohnes Karl Ruß von Seiten vieler Abonnenten dieſer Zeitſchrift zugegangen ſind, ſage ich hiermit meinen tiefgefühlteſten Dank. Dr. Karl Ruß.

Zu unſerm Bilde.

Auf den Hochgebirgen Mitteleuropas und Mittelaſiens bis weit über die Grenzen des Holzwuchſes hinauf, erblickt der Wandrer den Alpenfink (Fringilla nivalis, *L.*), auch Schnee- und Steinfink genannt, auf Steinen oder Felskanten ſitzend, wie er lebhaft und munter ſich umhertummelt, aufgeſcheucht weit fort fliegt, aber im Bogen auf dieſelbe Stelle zurückkehrt. In Deutſchland bewohnt er nur die Bayriſchen und Tyroler Alpen. Er iſt an der ganzen Oberſeite grau, an Kopf und Hals reinaſchgrau, an Rücken und Schultern hell- und dunkelbraun gewölkt; der Bürzel iſt ſchwarz- und weißbunt; die oberen Schwanzdecken ſind ſchwarz, hellbräunlich gekantet; die Schwingen ſind ſchwarz, die mittleren weiß, und die letzten dunkelbraun mit hellen Kanten; alle Flügeldeckfedern ſind reinweiß; auch die Schwanzfedern ſind weiß, die beiden mittleren faſt reinweiß, die übrigen ſchwarz geſpitzt; die ganze Unterſeite iſt weißbunt, ein Fleck am Unterſchnabel reinweiß, die Kehle ſchwarz und weiß gefleckt, die Bruſtmitte iſt grauweiß und die Seiten ſind gelblichaſchgrau; der Schnabel iſt im Sommer blauſchwarz, im Winter gelb; die Augen ſind dunkelbraun und die Füße braunſchwarz. Das Weibchen iſt nur matter gefärbt mit kaum ſchwarzer Kehle. In der Größe gleicht er dem Edelfink, doch iſt er etwas höherbeinig. Im ganzen Weſen dem erwähnten Verwandten recht ähnlich, erſcheint er jedoch etwas beweglicher. Allerlei Krautſämereien, ſo namentlich Wegerich-, Hanf-, Neſſel-, Mohn- u. a., wie auch Nadelholzſamen, zeitweiſe hauptſächlich aber hochfliegende Kerbthiere bilden ſeine Nahrung. Sein Lockton erſchallt laut und hell kik und pfeifend titri, warnend ſchröh, und ſein Geſang iſt unbedeutend, nur leidlich angenehm zwitſchernd. Das Neſt wird im Mai in Felſenritzen, ſelten in Löchern verfallener Mauern aus Mos und Gräſern errichtet und mit Haren und Federn gepolſtert; es enthält reinweiße Eier. Das Jugendkleid iſt dem des alten Weibchens gleich und hat garkeinen ſchwarzen Kehlfleck. In allem übrigen ſtimmt dieſe Art, wie erwähnt, mit dem Edelfink faſt völlig überein. Von den Bewohnern einſamer Klöſter in den Bergen wird er manchmal wie der Hausſperling gefüttert, und dann zeigt er ſich zutraulich, während er ſonſt recht ſcheu und vorſichtig iſt. Nach der Brutzeit ſchweifen die Flüge von zehn bis zwölf Köpfen umher, und wenn dann tiefer Schneefall und ſtrenge Kälte eingetreten iſt, kommen ſie auch bis in die Ebenen hinab. Da er kaum gefangen wird, weil er für die Liebhaberei faſt garkeine Bedeutung hat, ſo iſt er auch nicht oder doch nur ſelten im Handel zu haben. Wer einen Alpenfink halten will, möge ihn wie die Verwandten, jedoch unter Zugabe von ein wenig erweichtem oder geriebnem Weißbrot und gehacktem friſchem Fleiſch ernähren. D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Geſangskäſten, [1625]

Geſangsſpinde, Harzer Vogelbauer, liefert (Prsl. fr.) **A. Bothe**, Weddersleben, Harz.

Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ, **Netzfallen**, kleine 80 ₰, größ. 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ, **Fangkäfige** 1 ℳ, gr. 1,50 ℳ. **Vogelleim**, à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [1626]

Gebr. Janſen, M.-Gladbach 112.

Illuſtrirte Preisliſte gratis

Futtermittel.

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [1627]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411, I.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen **inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel** pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [1628]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1629] Allein angefertigt von
Ernſt Hanke, Trier, Moſel.
Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Alle Vogelfutter, Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1630

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 5 ℳ, Kilo 8½ ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,50 ℳ. [1631]

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

AVOL

Nachtigallen- u. Drosselfutter
(Gesetzl. gesch.)
mit und ohne Carotten
per Pfd. 80 Pfg. 9 Pfd. Mk. 7.20 fco.

Dieſes Futter, — in Folge langjähriger Liebhaberei ſachkundig nur aus beſten Zuthaten hergeſtellt u. nach eingehender probeweiſer Fütterung durch Herrn

Karl Kullmann, Frankfurt a. M.

auf der großen allgem. Geflügel- u. Vogel-Ausſtellung hier mit dem

I. Preis prämiirt

iſt das Beſte, was es für Inſektenfreſſer gibt.

Auf Verlangen Gratisproben an Liebhaber.
Ff. deutſche handbeleſene Ameiſeneier 1899 p. Lit. 70 Pfg., von 10 Liter an franco

F. Grünewald, Offenbach a. M.
Markt 5.

[1632]

Neue getr. Ameiseneier,

deutſche, hochprima, helle Qualität, p. Ltr. 1 ℳ, p. 10 Liter 9 ℳ, empfiehlt [1633]

Carl Kämpf, Mainz.

Rheiniſches [1634]

Univerſalfutter

für feinere inſektenfreſſende Vögel, per Kilo 2 ℳ, für Amſeln, Droſſelarten 1,60 ℳ. Proſpekt und Gebrauchsanweiſung gratis.

J. Nullmeyer.
Vogel- u. Futterhandlung, **Mannheim.**

Vögel.

Scharlachtangaren,

à Mch. 20 ℳ,
Siebenfarb. Tangaren, à Mch. 22 ℳ.
Tanaquellas, à Mch. 25 ℳ,
Blaue Tanagra mit weißem Kopf und rother Haube, à Mch. 30 ℳ,
Lincdo-Tanagra, à Mch. 30 ℳ,
Jamaikatrupiale, à Mch. 20 ℳ
in ſchönen Exemplaren, offerirt [1635]

J. O. Rohleder. Leipzig-Gohlis.

Orphensgrasmücken,

prachtvoll vermauſerte Männchen, alte 7 bis 9 ℳ, junge 5—6 ℳ, Steinröthel, Roſenſtar u. Kalanderlerche à 7 ℳ, Blaudroſſel 10 ℳ, Gartengrasmücken und Schwarzplättchen à 2,50 ℳ, 3 St. 6 ℳ, Dtzd. 18 und 24 ℳ. [1636]

R. Schneider, Kempten, Bayern.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel für** den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1637]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [1638]

Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos)

Wie alljährlich, habe ich auch in dieſem Jahre mehrere echt ruſſiſche hoch Ia

Frühjahrs-David-Weiden-Sprosser

bei mir im Käfig vermauſern laſſen und gebe nun dieſelben an wirkliche Kenner des guten Sproſſerſchlages ab um den billigen aber feſten Preis von 25 ℳ franko.

Der Schlag dieſer Vögel bewegt ſich hauptſächlich in Glocken-, Baß-, Moll-, Lach-, Knarr- und Waſſer-Touren und ſchließt jede Geſangsſtrofe mit dem gebührenden Schnapper. Der Vortrag iſt hohl und tief, äußerſt langſam, gewiſſermaßen tragend, ja zur Nachtzeit geradezu feierlich! — **Dieſe Sproſſer ſind ausſchließlich eine Spezialität meines Geſchäftes; ſie haben mit den gewöhnlichen Händler-Sproſſern nichts gemein, ſind auch nur durch mich allein erhältlich und daher ohne jede Konkurrenz!** [1639]

Mathias Rauſch,
Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten Singvögel,
Wien VII 3, Schottenfeldgaſſe 95.

NB. Einige gute Frühjahrsſproſſer ohne David, à 15 ℳ, bereits vermauſert, ſind auch lagernd.

Mandarin-Enten,

Par 25 ℳ,
Smaragdenten, Par 25 ℳ,
Schwarze Schwäne,
Goldfaſanen,
Silberfaſanen,
Aegyptiſche Springmäuſe, Par 15 ℳ,
Flughörnchen, Par 18 ℳ,
hat abzugeben

August Fockelmann
Thierhandlung [1640]
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Gelbe Erlenzeiſige, prachtv., futterf. Vögel, 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Junge Dompfaffen zum Anlernen à Stck. 2 ℳ, 4 Stck. 6 ℳ, Kreuzſchnäbel 6 Stck. 4 ℳ, Schwarzmeiſen 6 Stck. 4 ℳ, Dtzd. 6 ℳ, Blau- u. Finkenmeiſen 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Garant. leb. Ank. In Gegenrechnung nehme Sproſſer und Schwarzblatten. **A. Jaumann,**
[1641] **Großbreitenbach,** Thür.

Kanarienhähne

(St. Trute) à 3 ℳ, Weibchen 75 ₰, **Rothhänflinge** à 1,20 ℳ, Dutzend 10 ℳ, **Stieglitze** à 1,50 ℳ, Dutzend 12 ℳ. Garantie für Hähne und lebende Ankunft. Nachnahme. [1642]

H. Pfromm, Vogelhandlung,
Homberg, Bez. Caſſel.

Verkaufe

einen 2 Lieder durchſingenden, gelernten, rothen Dompfaff unter Garantie für 15 ℳ franko. **Aden Mann.** [1643]
Steinamanger (Ungarn), Günsgaß 16.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1644]

Orpheus-Grasmücken,

ſchöne, garantirte Männchen, à 9 ℳ, dito minder ſchöne, à 5—6 ℳ, dito ohne Gewähr fürs Geſchlecht, à 3 ℳ

Frühjahrswildfänge

von Blaukehlchen à 7 ℳ, Gebirgsſchwarzköpfe à 6 ℳ, Gelbſpötter à 7 ℳ, Gartengrasmücken à 6 ℳ, Pirole, ausgefärbt, à 10 ℳ, ſofort lieferbar. Ferner von Mitte Auguſt ab

Herbſtwildfänge

von Blaudroſſeln à 15 ℳ, Steinrötheln à 10 ℳ, Sproſſern à 5 bis 7 ℳ, je nach Herkommen, Nachtigalen à 2,50—4 ℳ, Gelbſpöttern à 3 ℳ, Gebirgsſchwarzköpfen und Gartengrasmücken à 3—4 ℳ, junge Sperbergrasmücken à 2 ℳ empfiehlt

Mathias Rausch,
Spezialiſt für die Liebhaberei der beſten Singvögel.
[1645]
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft. Prämiirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [1646]

Einen zahmen **Buſſard** 10 ℳ, 5 **Bartmeiſen,** ½ Jahr im Käfig, tadellos befiedert, à 5 ℳ, **1 Blaudroſſel** 12 ℳ, gibt ab **A. David,**
[1647] **Breslau,** Ohlauerſtr. 32.

Ein ſehr gut befiederter **Graupapagei,** etwa 2 Jahr alt, ſpricht bereits in ſchönen Sätzen, ſchreit nicht, abzugeben unter Garantie für Leiſtungen ꝛc. [1648]

C. Volkmann,
Harburg a. E., Lindenſtr. 32.

[1649]

Geſucht:

Granataſtrilde, Buntaſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen u. ſeltene ausländ. Finken.
J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.).

Stiglitze,

Bluthänflinge à 1 ℳ, Zeiſige, Buchfinken u. Kreuzſchnäbel à 70 ₰, Schwarzplattl 2,50 ℳ, Steinröthel 7 ℳ, Blaudroſſeln 10 ℳ, alles Männchen. Zwergohreule 3 ℳ liefert unter Garantie. [1650]

Mehlwürmer à Ltr. 4 ℳ.
G. Findeis, Wien I, Wollzeile 25.

Harzer Kanarien,

tiefgehende tourenreiche Vögel, per Dtzd. 12 ℳ, einzeln 4,50 ℳ. [1651]
Joh. Kölbl, Coesfeld.

Gebe ab: 1 Par 2jährige **Wellenſittiche** 7 ℳ, 2 Par reinweiße **Reisfinken,** à 7 ℳ; die 3 Pare zuſ. 20 ℳ [1652]
M. Reger, Altheim, Niederbayern.

Junger kaufmänniſch gebildeter Mann, mit der Behandlung und Pflege lebender Thiere durchaus vertraut, ſowie einigermaßen bewandert im Geflügel- u. Wildbretgeſchäft, 19 Jahre alt, **ſucht** ſofort oder ſpäter **Stellung** auf Bureau oder im Verſandgeſchäft. Gefällige Offerten unter **K. S. 1** an den Verlag dieſes Blattes. [1653]

Unterricht! [1654]

Wer nimmt einen **Doppelgelbkopf** in Pflege und **Unterricht?** Anerbieten mit Preisforderung an den Verlag unter **C. D.**

Bücher-Anzeigen.

Seewaſſer-Aquarien im Zimmer.

Von **Reinhold Ed. Hoffmann.**
Mit vielen Abbildungen. — Preis Mk. 3.—
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in **Magdeburg.**

Der Deutſche Geflügelhof

Abonnement vierteljährlich 75 Pfg.

Inſerate: die einſpaltige Zeile 15 Pfg.

Amtliches Organ des Sonderausſchuſſes für Geflügelzucht der Landw. Kammer für die Prov. Brandenburg und der demſelben angeſchloſſenen Vereine.

Redaction:
Bruno Dürigen, Charlottenburg.

Der „Deutſche Geflügelhof“ bringt alles Wiſſenswerthe auf dem Gebiete der landw. Nutzgeflügelzucht, ſowie rationellen Tauben- und Kaninchenzucht, auf den Sport dabei gebührend Rückſicht nehmend, belehrende Artikel für den Anfänger, Beſchreibungen und Abbildungen.

Probenummern koſtenlos durch die Geſchäftsſtelle
Otto Koobs Verlagsanſtalt,
Forſt i. L.

Im unterzeichneten Verlage erſcheint

Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde

herausgegeben von **Dr. E. Bade.**
(Monatlich zwei Nummern!)
Preis: halbjährlich Mk. 2.50.
Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in **Magdeburg.**

Zeitſchrift für *Elektrotechnik* und *Maſchinenbau,*

Poſtzeitungsliſte 8178 a.

ſowie für ***Metall- und Montanindustrie.*** ●

Abonnementspreis: pro Monat 20 Pf. durch jede Buchhandlung, bei der Poſt 60 Pf. für das Vierteljahr.

Bereits erſchienene Nummern des Quartals werden koſtenlos nachgeliefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervorragenden Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und berufen, unendlichen Nutzen zu ſtiften.

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik und dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montaninduſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt, Alles, was irgendwie für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elektrotechnik und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in fachwiſſenſchaftlicher, leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle ſpeziellen Zweige der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des Auslandes hat die Zeitſchrift zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute als Mitarbeiter, welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues ꝛc. ſofort Kenntnis geben und über alle Verbeſſerungen, Erfindungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten. Jede Nummer der Zeitſchrift wird daher eine Reihe elektrotechniſch-wiſſenſchaftlicher und maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel aus der Feder erprobter Autoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten. Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl kleiner Mitteilungen aus dem Gebiete der Elektrotechnik, des Maſchinenbaues und der Metall- und Montaninduſtrie an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und [illegible] welche neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die Patentnachrichten, die von uns ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den Leſern einen Überblick über die neuen Erfindungen ꝛc. zu geben. Der techniſche Briefkaſten erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch [illegible] Mitarbeiter zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner [illegible] ſozialpolitiſche Leitartikel, die energiſch für die Intereſſen der deutſchen Induſtrie eintreten. Unter dem Titel: „Kleine handelsinduſtrielle Mitteilungen“ wird alles dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt Metall- u. Montaninduſtrie Bezug hat. Ebenſo finden die Submiſſionen, geſchäftlichen Mitteilungen ꝛc. ꝛc. eine gebührende Stätte in unſerem Blatte. — Jeder Nummer iſt eine *Unterhaltungsbeilage* hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeitſchrift das Inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt.

Nach alledem wird die „Zeitſchrift für Elektrotechnik und Maſchinenbau, ſowie für Metall- und Montaninduſtrie“ ein unentbehrliches Organ nicht bloß für die Beſitzer maſchineller und elektrotechniſcher Fabriken und Werkſtätten, Walz- und Hüttenwerke, Schloſſereien und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie ꝛc., ſondern auch für alle Ingenieure, Techniker und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.

● Probenummern koſtenlos und franko von der
Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechnik u. Maſchinenbau,
ſowie für Metall- und Montaninduſtrie, *Leipzig.*

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 37.

Die gefiederte Welt

Wochenschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler

von

Dr. Karl Ruß.

Preis vierteljährlich
[illegible]
Mk. 1.50.

Magdeburg
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
(R. & M. Kretschmann).

Anzeigen die 3gespalt. Petitzeile
20 Pfg.

Inhalt der Nr. 37.

Züchtung des ſpitzſchwänzigen Gürtelgrasfink (Spermestes Gouldi. *Rss.* [Sp. acuticauda, *Gld.*]).
Gefangene Meiſen.
Zur Geſangsgabe des Hausſperlings (Passer domesticus, *L.*).
Der gemeine Star (Sturnus vulgaris, *L.*).
Ein Verſuch zur nützlichen Verwendung der Wachsmotte (Galleria cerella) als Futter für inſektenfreſſende Singvögel.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft. — Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der **Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** ſowie in allen Annoncen-Geſchäften.

Anzeigen.

[illegible] für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Prima 99er Elbe-Weißwurm, Kg. 3, 5 Kg. 13,50, 10 Kg. 25 ℳ, Lt. 85 ₰. **Tyroler Ameiſeneier,** hochfein, weiß u. rein, handgeleſen, Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ, ungeleſene Kg. 3 ℳ. [1655]

Zeke (Musca), 99er, feinſte, fr. Ware, à Ko. 2,60 ℳ, 5 Ko. 12,50 ℳ. Univerſal-Nachtigalenfutter, 10 Jahre ſelbſt erprobt, Ko. 1,80, 5 Ko. 8 ℳ, ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- u. Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ mit Sack, reelles Gewicht u. Maß. Offerire 1 Par **Petz' Keilſchwanzſittiche** (wie in Nr. 25 ausführlich beſchrieben), vollſt. fingerzahm, 25 ℳ, ferner noch großer Vorrath von den in Nr. 34 angezeigten Vogelarten. Streng gewiſſenhafte Bedienung. Preisl. grat. **Brühl's** Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1656]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten. Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko. Man verlange Preisliste.

Neu! **Senſationell!**

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden empfiehlt [1657] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen. **Reparaturen** aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt.



50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,** [1658] Waren i. Mecklenb.
Proſpekte gratis.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1.50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1659]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Für alle Arten Vögel fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1660]



Natur-Schlafkäſten St. 60 ₰
Natur-Niſtkäſten „ 60 „
Univerſalfutter für Droſſeln und alle größeren Inſektenfreſſer Pfd. 50 ₰, für Nachtigal und alle kleineren Inſektenfreſſer, Pfd. 80 ₰ (genügt ohne Wurmfütterung). Singfutter für Kanarien u. andere Vögel, 10 Pfd. 2 ℳ, Heckfutter, dito 10 Pfd. 1,80 ℳ, Finkenfutter 10 Pfd. 1,60 ℳ, Papageifutter 10 Pfd. 2 ℳ, Lerchenfutter 10 Pfd. 3,50 ℳ [1661]
Mehlwurm-Heckkiſten 1,75 ℳ, Mehlwurmbrut, Heckanſatz Lit. 1 ℳ. Anlt. gratis verſ. **Gebr. Jansen,** M.-Gladbach 112.

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [1662]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Per **ſofort** abzugeben: [1663]

Eine Voliere,

2,80 × 1,10 × 70, zu jedem annehmbaren Gebot. Gefl. Anfragen befördert die Exped. der „Gefiederten Welt“ sub. Voliere.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. G. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1664]

Voliere oder Heckkäfig,

ſehr ſchön, mit eichenen Pfoſten, engem Stabgitter, Glasſchutzwände, Zinkſchubladen und Gefäßen, zweitheilig mechaniſch, 1½ m lang, ½ m breit u. hoch, ſammt 8 prima Rollerweibchen, vor- u. diesjährige, um 15 ℳ abzugeben. [1665]
Pfarrer **Fiſcher,** Winden (Pfalz).



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1666]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1667]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.



Käfige jeder Art

(Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1668] **Oſchatz** i. S.

Die gefiederte Welt

Wochenschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

[illegible]

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
[illegible]

[illegible]

Nr. 37. Magdeburg, den 14. September 1899. XXVIII. Jahrg.

Züchtung des spitzschwänzigen Gürtelgrasfink (Spermestes [illegible]) [Sp. acuticauda, Gld.].

[illegible]

[illegible]

linke und rechte Schwanzfeder weiß geſpitzt; zwei andere Exemplare dagegen ſind nicht nur auf der äußerſten, ſondern auch auf der zweiten und dritten Schwanzfeder von jeder Seite weiß gezeichnet, und zwar iſt bei dem einen Stück die erſte zur Hälfte auf der inneren und äußeren Fahne breit weiß geſtreift, während die zweite rechte und die dritte linke Feder nur wenig weiß außengeſäumt iſt. Bei dem andern Stück iſt wieder die äußerſte Feder jederſeits und die zweite linke breit weiß geſpitzt. Hiernach ſcheint alſo die weiße Färbung der Schwanzfedern unregelmäßig aufzutreten und bei den männlichen Vögeln vorherrſchender zu ſein, wenn ich nach meinen drei Exemplaren derart folgern darf.

Die übrige Geſammtfärbung, der des gewöhnlichen Bartfinken faſt gleichkommend, daher als bekannt vorausgeſetzt, iſt bei beiden Geſchlechtern des ſpitzſchwänzigen Gürtelgrasfinken im ſelben Maß wie bei all' den anderen obengenannten Arten dieſer Gattung wiederum ſo übereinſtimmend, daß es leider recht ſchwierig iſt, die verſchiedenen Geſchlechter mit Sicherheit herauszufinden. Vielleicht daß ein Unterſcheidungsmerkmal in der vorſtehend angegebenen weißen Saumfärbung einzelner Flügel- und Schwanzfedern zu ſuchen iſt; denn von meinen vier alten Amandinen zeigt das Weibchen des richtigen Pärchens gar keine weißen Außenſäume an der zweiten bis vierten Schwinge, während wieder bei dem richtigen Männchen nicht nur die äußerſte Schwanzfeder jederſeits, ſondern auch die zweite und dritte mehr oder weniger breit weiß geſpitzt iſt; vielleicht aber ſind hierin auch nur Altersunterſchiede zu erblicken.

Im Uebrigen iſt über das Weſen und Benehmen der Spitzſchwanz-Amandinen nicht viel zu ſagen, weil ſie eben in allem dem allbekannten Bartfink gleichen; doch wollen ſie mir ſchlanker und lebhafter erſcheinen. Desgleichen kann ich in ihrem kleinen Sang nur wenig Anklang an den des Bartfink finden, der von Herrn Dr. Lewek als mit dieſem völlig übereinſtimmend bezeichnet wird, und ebenſo wird dieſer von meinem Exemplar nur höchſt ſelten und ſehr leiſe vorgetragen, was wieder ganz im Gegenſatz ſteht mit dem Männchen des Herrn Nagel, das ihn laut und fleißig hören ließ. Ueberhaupt ſtehen ſich von den mehrerwähnten vier Arten Gürtelgrasfinken in allem, was äußere Erſcheinung und Haltung, Färbung und Weſen, Geſang und Lockruf betrifft, Bartfink und Spitzſchwanz-Amandine untereinander weit näher, als zu den weißbäckigen und Masken-Amandinen, die wieder unter ſich einander näher ſtehen, wie denn überhaupt eine jede dieſer beiden Gruppen neben vielen Uebereinſtimmungen doch auch in den obigen Eigenthümlichkeiten bemerkbare Abweichungen aufweiſt.

Meine vier Spitzſchwanz-Amandinen, die ich mir erſt im November v. J. von Herrn H. Fockelmann in Hamburg kommen ließ, waren von vornherein recht muntere und geſunde Thierchen, die aber, nach den damals noch mehr gelblichen Schnäbeln zu ſchließen, noch nicht recht geſchlechtsreif waren, weshalb ich ſie vorläufig auch noch alle beiſammenließ, um zugleich auf dieſe Weiſe deſto ſicherer die richtigen Pare herauszufinden, weil, wie ſchon geſagt, bis auf das Singen der Männchen kein äußeres Merkmal ſie zuverläßlich unterſcheidet. Anfänglich zeigten ſich die hübſchen Vögel wol verträglich, als aber nach etwa drei Monaten der Niſttrieb ſich bei ihnen einſtellte, war es auch mit dem Hausfrieden vorbei. Sie befehdeten ſich jetzt in genau der unermüdlichen und bösartigen Weiſe, wie es die gewöhnlichen Gürtelgrasfinken zu thun pflegen. Bald ſonderte ſich ein Pärchen ab und ſo konnte ich die beiden anderen Stücke, von denen ich heute noch nicht ſicher bin, ob es Männchen oder Weibchen ſind, von jenen trennen.

So ſehr ſchon dieſe gerade für den Züchter beſonders unangenehm empfundene Gleichfärbung beider Geſchlechter einer Züchtung dieſer Art hinderlich iſt, ſo wird ſie noch inſofern erſchwert, als ſie ſelbſt auch im Weſen nach meinen bisherigen Beobachtungen wenigſtens ſich völlig gleich kommen.

Während bei den gewöhnlichen Bartfinken der zur Niſtzeit insbeſondere, faſt ununterbrochen wiederholte, kurze, etwa „ück, ück“ lautende Ruf ausſchließlich vom Männchen ausgeht, iſt bei den Spitzſchwanz-Amandinen derſelbe Ruf, der übrigens auffallend mit jenem übereinſtimmend klingt, auch den Weibchen gegeben, desgleichen kann ich auch im ſonſtigen ganzen Weſen der beiden Geſchlechter keinen Unterſchied entdecken, und wenn nicht mitunter das Männchen ſeinen kleinen Geſang hören ließe und das Weibchen durch ein zufälliges kleines Merkzeichen zu erkennen wäre, ſo würde ich ſelbſt bei dem richtigen Zuchtpärchen oftmals in dieſer Hinſicht im Zweifel ſein.

Das in einem beſondern Heckkäfig untergebrachte Pärchen begann bereits Anfang Februar d. J. zu niſten; obgleich ziemlich ſcheu, brütete es doch recht gut in einem Harzerbauerchen, das außerhalb des Kiſtenkäfigs angebracht war. Das Neſt war ſauber und gut überwölbt von allerlei Faſern hergeſtellt. Bei Tage brütete faſt ausſchließlich das Weibchen, das nur zeitweiſe und auf kurze Dauer vom Männchen abgelöſt wurde, des Nachts ſaßen ſtets beide im Neſt. Die Gelege beſtanden aus vier bis fünf weißen Eiern, die auffallend langgeſtreckt erſcheinen. Die im Februar und März gemachten Bruten verliefen reſultatlos, indem die Eier hell blieben, offenbar weil das Männchen nach ſeinem Verhalten zu ſchließen noch nicht zur Fortpflanzung befähigt war. Erſt die vierte, im April d. J. gemachte Brut brachte nach dreizehntägiger Brutdauer drei Junge zum Ausſchlüpfen, von denen zwei Stück am 16. April, d. h. nach weiteren fünfundzwanzig Tagen, glücklich das Neſt verließen. Gleich gut wie ſich die Alten als Brüter bewährten, zeigten ſie ſich auch bei der Aufzucht ihrer Jungen, die mit großem Eifer von ihnen gefüttert und gewärmt wurden; auch häufiges Nachſehen ſtörte ſie nicht im geringſten. Nach etwa weiteren vierzehn Tagen hatten die Jungen ihre Selbſtſtändigkeit erlangt. Wider Erwarten ſetzte das Zuchtpar ſeitdem mit dem weiteren Niſten aus, anſcheinend wegen bevorſtehender Mauſer, die denn auch Anfangs Juli eintrat, aber vorläufig ſich nur auf die Schwingen und Schwanzfedern erſtreckte.

Nach den Angaben des Herrn Dr. Lewek ſind die Neſtjungen anfänglich dunkel und mit langen weißen Flaumfedern bedeckt. Die bei mir ausgekommenen kleinen Grasfinken waren dagegen, wie meine

[illegible]



[illegible]

* * *

Gefangene Meiſen.

[illegible]

Digitized by Google

als ausdauernd bezeichnen, denn bei der Vogelhaltung wie ſonſt im Leben dürfen nicht Ausnahmen die Regel verſchleiern.

Allerdings bin ich der Anſicht, daß auch in der Natur die Meiſen nicht zu den langlebigen Vogelarten gehören, ſelbſt dann, wenn Sperber und Rauhfroſt die geſchäftigen Thierchen gnädig verſchonen. Einmal ſpricht die Energie ihrer Lebensthätigkeit — eine ruhende Meiſe iſt ein Begriff, der ſchon in ſich ſelbſt einen Widerſpruch birgt — für eine nicht allzulange Lebensdauer, und neben dieſem ſchnellen Lebensprozeß ſcheint mir auch ihre große Vermehrung auf eine raſche Abnutzung des individuellen Lebens nicht undeutlich hinzuweiſen. Aber mag dem ſein, wie ihm wolle, das Leben der gefangenen Meiſen iſt wol in den meiſten Fällen ein arg verkürztes. Weshalb iſt dem ſo? —

Ich glaube, der Grund dafür liegt in der Fütterung und zwar weniger noch in der Qualität als in den Quantitäten der gebotenen Nahrung. Im Freien muß ſich die Meiſe Stunde um Stunde energiſch abmühen und findet doch in jedem Einzelfalle nur ein Futterminimum. In der Jahreszeit aber, wo der Nahrungsvorrath wächſt, wird infolge der Fortpflanzung das Futterquantum, deſſen die einzelne Meiſe habhaft werden muß, vervierfacht, ſelbſt verſechsfacht.

Von dieſer ſparſamen Ernährung, die mit großer Bewegungsenergie Hand in Hand geht, finden wir in der Gefangenſchaft nichts wieder. Hier hat die Meiſe alles, was ihr Magen begehrt, Futter in Hülle und Fülle, und kann ſich ihr kleines Wänſtchen wieder und wieder ſo kugelrund ſtopfen, wie es ihr im Freileben gar ſelten geſchieht. Zu der Zeit aber, wo ſie in der Freiheit im Dienſte der Familie harte Arbeit verrichten muß, in den Wochen der feiſteſten Mehlwürmer und der nahrhaften Ameiſenpuppen, wird ſie womöglich noch beſſer verpflegt als ſonſt.

Ein ſolches Daſein bedeutet für die Meiſen ſelbſtverſtändlich die ärgſte Unnatur; man füttert ſie nicht, man mäſtet ſie, mäſtet ſie faſt noch toller als die ſchnatternde Gans und die watſchelnde Ente. Da kann der Erfolg oder vielmehr der Mißerfolg nicht ausbleiben.

Nahrungsmangel regt auch in der Gefangenſchaft die Vögel zur Bewegung an. Wie ſie im Freileben auf das Gefühl des Hungers mit artlich verſchiedener Bewegung reagiren, ſo tritt dieſe Bewegung — zwar zweck- und erfolglos, aber doch immerhin Bewegung — auch in der Gefangenſchaft ein, ſobald ſich die Leere des Magens fühlbar macht. Dieſe Bewegung iſt aber bei Geſchöpfen, deren ganzer Körper nicht mehr und nicht weniger iſt als ein ſpezifiſcher Motor, eine der Hauptgrundlagen des Lebens.

Je geringer alſo die jeweilig verabreichten Futtermengen ſind und je länger die Pauſen zwiſchen den einzelnen Fütterungen ſich ausdehnen, deſto mehr werden ſich die Gefangenen bewegen. Meinen Erfahrungen zufolge iſt hier der Weg gezeigt, dem man folgen muß, um die Lebensdauer gefangener Meiſen zu verlängern. Es handelt ſich nicht darum, den Thierchen ein Futtermaximum zuzuführen, *ſie bedürfen* im Gegentheil *eines richtig vertheilten Minimums*, denn faſt noch wichtiger als die Nahrung iſt für ſie die Bewegung, und die Maſt iſt der Bewegung Feind.

Vielleicht regen dieſe Zeilen die bez. Liebhaber zu entſprechenden Beobachtungen an und ſchützen eine hochbegabte Vogelfamilie in der Gefangenſchaft vor unnatürlicher Vergewaltigung. Wie für den Menſchen, gilt auch für die meiſten anderen bewegungsfähigen Geſchöpfe jener alte Segen der Bibel, den nur Thoren für einen Fluch halten konnten, jenes ſchöne Wort, daß wir unſer täglich Brot erwerben ſollen im Schweiß unſeres Angeſichtes, das heißt, durch eine entſprechende Bewegung oder Arbeitsleiſtung.

Zur Geſangsgabe des Hausſperlings (Passer domesticus, *L.*).

Von Fr. Anzinger.

In Nr. 30 dieſer Zeitſchrift befindet ſich ein liebevoller Aufſatz über den Sperling (jedenfalls Passer domesticus) von F. Schütte, welcher ſpeziell die Geſangsgabe eines Pfleglings dieſer Art hervorhebt. Am Schluſſe dieſer Mittheilung erſucht die Leitung um Bekanntgabe ähnlicher Fälle, und dieſer Einladung Folge gebend, geſtatte ich mir Nachſtehendes mitzutheilen:

Als ich im Jahre 1894 mit der „Eintreibung“ von Anmeldungen für unſere erſte Innsbrucker Vogel-Ausſtellung beſchäftigt war, erhielt ich die Mittheilung, daß eine hier wohnende Beamtenwitwe einen Spatz beſitze, welcher ſingt. Selbſtverſtändlich lenkte ich meine Schritte dorthin, um mich vor allem von der Wahrheit der erhaltenen Mittheilung zu überzeugen und falls dieſelbe zuträfe, den Vogel als intereſſante Ausſtellungs-Nummer zu gewinnen.

Die Dame empfing mich mit großer Herablaſſung und „ſtellte mich einem vollkommen ausgefärbten Hausſperlings-Männchen vor“. Der Vogel war zwiſchen verſchiedenen anderen einheimiſchen Körnerfreſſern (Stiglitz, Erlenzeiſig, Dompfaff und mehreren gewöhnlichen Kanarien) placirt. Die Thür des Spatzenkäfigs war offen, ebenſo das in unmittelbarer Nähe befindliche Fenſter. Um mich von der Liebenswürdigkeit und „Geſangskunſt“ ihres beſonders hochgeſchätzten Pfleglings zu überzeugen, lockte ſie den Spatzen mit einigen Liebesworten aus dem Käfig. Der Spatz hüpfte ihr ohne Weiteres auf die Schulter, tänzelte hier herum, lüftete die Flügel und begann dann der Dame direkt in den halbgeöffneten Mund zu ſingen. Der Geſang war laut und von jener Härte, welche dem Stimmton unſerer meiſten Körnerfreſſer eigen iſt.

Er beſtand aus gut unterſcheidbaren Kopien aus den Liedern jener Vögel, welche ſeine Stubengenoſſen waren. Beſonders das bekannte langweilige „bibl, babl, bibl, däää“ des Erlenzeiſigs wurde gut imitirt. Der Geſang wurde häufig unterbrochen, aber ſchnell wieder aufgenommen und gewiſſermaßen mit großem Eifer vorgetragen.

Der ſo vielfach verläſterte Gaſſenbube ſtand hier vollkommen veredelt vor mir, und ich gratulirte der Dame zu ihrem ſchönen Erfolge. Nachdem der edle Spatzenjüngling wieder in ſeinen Käfig hineinkommandirt war, wurde mir mit vieler Liebe (d. h. mit vielen Worten) von dem Erhalt, der Eingewöhnung und den erzielten Reſultaten derſelben erzählt, was hier nur kurz angedeutet zu werden braucht. Nach einem heftigen Gewitterſturm wurde der Spatz als hilfloſer Neſtling von der Straße aufgehoben, nach Hauſe gebracht und aufgepäppelt. Die Nachahmungsgabe ſtellte ſich nach dem Selbſtändigwerden ein und hatte ſich allmählich bis zu jener Vollendung entwickelt, welche ich nun wahrzunehmen Gelegenheit hatte.

Als ich nach dem allmählichen Verſickern des Redefluſſes die beſcheidene Bitte ſtellte, das „Wunderthier“ als Ausſtellungsvogel katalogiſiren zu dürfen, kam ich aber ſchön an. Mit einem entſchiedenen „Nein! — Der Hanſi kommt mir nicht aus dem Hauſe, er könnte nicht exiſtiren ohne mich, und — wer weiß, wie er auf der Ausſtellung behandelt würde“, wurde ich abgefertigt. — „Ein ſchönes Kompliment für ein Ausſtellungs-Komite, dachte ich mir und trachtete, aus dem Bereiche dieſes unter ſolcher Obhut ſtehenden Künſtlers zu kommen.

Nachdem ich vor Jahren einen ähnlichen Fall, und zwar angeblich von einem Feldſperling (Passer montanus) gehört habe, nahm ich keinen Anſtand, in meiner jüngſt erſchienenen Arbeit „Die unterſcheidenden Kennzeichen der Vögel Mitteleuropas“ bei den Sperlingen die Bemerkung anzuführen: „Geſang nur bei erhaltenen Neſtlingen in der Gefangenſchaft zu erzielen.“

Der gemeine Star (Sturnus vulgaris, *L.*).

Von A. Reuter.

Dieſen drolligen, überaus menſchenfreundlichen Vogel möchte ich faſt wegen ſeines Benehmens mit dem Wiedehopf vergleichen. Gleich dieſem iſt er ein wahrer Hanswurſt, Tagsüber der tollſten Streiche voll, wenn er im Käfig oder freilaufend gehalten wird. Auch ſein Schnabel, bzl. wie er denſelben gebraucht, erinnert uns an den Wiedehopf; er öffnet denſelben beim Futterſuchen ſcherenartig, gerade wie Erſterer, auch ſucht er ſeinen Futtertrog gleich dieſem Vogel immer umzuwerfen, indem er den Schnabel hinunter ſchiebt. Er hört bekanntlich auf einen beſtimmten Namen, den er auch möglicherweiſe nachſpricht, wenn derſelbe oft wiederholt wird.

Ich hatte einen ſolchen, der auf den Namen „Jakob“ hörte und dieſen Namen auch deutlich nachſprach. Geſanglich war er ſehr begabt und ahmte den Geſang meines Gelbſpötters theilweiſe nach; außerdem hatte er ſchöne flötenreiche Töne ſeines eigenen Geſangs mit untermiſcht und ſang auf Geheiß. Zum Tiſch kam er ebenfalls gern, wurde auch gelegentlich etwas frech dabei, hüpfte in die Teller und einmal in eine Schüſſel voll heißem Sauerkraut, erlitt jedoch keinen Schaden dabei. Trank ich aus einer Taſſe oder einem Glas, ſo ſetzte er ſich mir auf die Schulter und ſteckte ſeinen Schnabel ebenfalls in die Flüſſigkeit. Ich machte mir deshalb einmal den Spaß und ließ ihn vom Bier trinken, welches ihm erſt nicht recht behagen wollte, und doch kam er immer wieder, ſo oft ich das Glas zum Mund führte. Nach öfteren Malen zeigte ſich aber bei ihm die Wirkung des Gerſtenſaftes, er machte ganz desparate Sprünge, begleitet von lautem Gekreiſch und taummelte herum, wie ein betrunkener Menſch. Ich mochte dieſes deshalb nicht mehr wiederholen; ihm ſcheint es jedoch nicht übel bekommen zu ſein, denn wenn er Bier auf dem Tiſch ſah, ſo pickte er immer an dem Glas herum und ſpreizte ſeinen Schnabel unter daſſelbe, um es umzuwerfen. Iſt er gewöhnt, ſich auf die Schulter zu ſetzen, ſo darf man keine beſſeren Kleider anhaben, denn er hinterläßt gewöhnlich „ſeine Abreiſe“ darauf. Als Liebhaber ſolcher Vögel muß man ſich eben vieles gefallen laſſen und ſolche Kleinigkeiten überſehen.

Jung aufgezogen wird der Star äußerſt zahm, und man darf ihn unbeſorgt frei laufen laſſen. Im Herbſt jedoch ſei man vorſichtig, denn trotz aller Zähmung geht er da leicht verluſtig. Es verſammeln ſich nämlich große Flüge von Staren gegen Abend, meiſt auf Kirchen und ſonſtigen hohen Gebäuden, mit großem Lärm; durch dieſen wird er dann angelockt, und einmal unter den Flug gerathen, kehrt er nicht mehr zurück. Mir paſſirte dieſes ſchon zweimal, weshalb ich aus Erfahrung ſprechen kann und die Herren Liebhaber darauf aufmerkſam machen will. Im Frühjahr alt eingefangen, werden die Stare bald zahm und zutraulich, obwol ſie anfangs ſehr ungeſtüm ſind. Oft iſt es auch nöthig, ſie einen oder zwei Tage lang zu ſtopfen, bis ſie an das Futter gehen. Am leichteſten gehen ſie an Würmer. Nehmen ſie dieſe, ſo kann man ſogleich mit Univerſalfutter beginnen, wie Gelbrübe mit Semmel gemiſcht, worunter man zerſchnittene Würmer mengt. Außerdem gibt man alles mögliche Fleiſch, auch Beren und Obſt. Man füttere ſie überhaupt genau ſo, wie bei den Droſſeln angegeben iſt. Man reiche ihnen auch in Milch geweichtes Brot und Quarkkäſe. Sehr gern nehmen ſie auch Maikäfer und deren Larven. Zur Zeit, wo ſie Junge haben, vertilgen ſie eine Unmaſſe dieſer ſchädlichen Thiere und werden dadurch äußerſt nützlich. Als Leckerei gebe man ihnen zuweilen Ameiſeneier und Mehlwürmer, beſonders zur Mauſerzeit, ſonſt auch allerlei menſchliche Koſt, wie ich beim Wiedehopf angeführt.

Ich hatte einmal einen alten Star, welchem beim Abſchuß der Krammetsvögel von einem jüngeren Nimrod der rechte Flügelknochen zerſchmettert wurde, aufgenommen, ihm einen Verband angelegt und in Pflege genommen. Es gelang mir, den verletzten Flügel zu heilen. Natürlich konnte er nicht mehr fliegen, doch wurde er mir ſehr zugethan und zeigte ſich äußerſt dankbar. Die Wunde heilte überraſchend ſchnell.

Im Februar oder März, wenn die Felder gepflügt werden, laufen die Stare zu Dutzenden hinter der Pflugſchar her und freſſen die zu Tage geackerten Würmer und Käfer weg, wobei ſich oft Knechte den rohen Spaß erlauben, mit der Peitſche ſeitlich nach hinten zu ſchlagen und ſo die Stare zu fangen, da ſich auf dieſe Weiſe, welche ich als ſehr verwerflich bezeichnen muß, die Peitſchenſchnur entweder um den Hals oder um die Ständer eines Vogels wickelt. Dieſe Leute machen ſich eigentlich nur einen Spaß daraus, um ihre Geſchicklichkeit zu zeigen, und laſſen die ſo gefangenen alsbald wieder frei; ſie überlegen jedoch nicht, daß ſie den Vögeln auch Schmerzen bereiten durch den Peitſchenhieb. Wer ſchon mit einer Peitſchenſchnur in unſanfte Berührung gekommen, wird dieſes ermeſſen können, abgeſehen davon, daß durch einen unglücklichen Hieb dem Vogel ſehr leicht ein Auge ausgeſchlagen werden kann. Der ländlichen Jugend wird überhaupt zu wenig eingeprägt: „Quäle nie ein Thier zum Scherz, denn es fühlt wie Du den Schmerz.“ Ich habe da ſchon unglaubliche Rohheiten mit angeſehen. Solche rohen Menſchen ſtehen nach meiner Meinung unter dem Thier, welches ſie mißhandeln, weil ſie doch Vernunft haben und denken können. Aber ſo iſt es eben: „Wie die Alten ſungen, ſo zwitſchern auch die Jungen“.

Junge Stare füttert man mit in Milch geweichter Semmel, worunter man Maikäferſchrot oder Fleiſchmehl mengt, ferner mit Käſequark, Würmern und Maikäfern, welche ſie auch ſpäter noch ſehr lieben. Gibt man ihnen letztere aber nicht von Jugend an, ſo berühren ſie dieſelben ſpäter nicht, und behagt ihnen dann das Miſchfutter beſſer. Es iſt ein Vergnügen, ſo einem Flug junger Stare zuzuſehen, wenn ſie in der Heuernte von Wieſe zu Wieſe fliegen und emſig unter den zahlreichen ſaftigen und fetten Heuſchrecken aufräumen, um ſich, wenn ſatt gefreſſen, in ein nahes Schilf- oder Binſendickicht für die Nachtruhe niederzulaſſen. Der Star liebt als Aufenthalt mehr die Ebenen. Ich habe hier auf dem Schwarzwald ſchon zu öfteren Malen Niſtkäſten ausgehängt, weil ich dies von zu Hauſe her gewöhnt war, wo man oft zehn und noch mehr an einem Hausgiebel ſehen kann. Jedoch hat ſich hier in den Bergen noch kein Star ſehen laſſen, trotzdem ſie eine Stunde von hier in der Ebene ſehr zahlreich vertreten ſind.

Im Frühling, hauptſächlich im März und April, leiden die Stare oft noch große Noth bei Schneegeſtöber und rauher naßkalter Witterung. Da kommen ſie dann auf Düngerhaufen und an die Gebäude, wo nur ein ſchneefreies Plätzchen iſt und ſtechen mit ihrem Schnabel nach Schnepfenart in den Grund, um nach Würmern zu ſuchen. Währt dieſe Witterung länger als einen oder zwei Tage, ſo ſind die meiſten verloren. Ich nahm mich einmal eines halbverhungerten an, der ſich mit der Hand ergreifen ließ, aber leider ſchon verſchied, ehe ich nur in meiner Wohnung anlangte. Er ließ noch einen Schmerzensruf vernehmen, ſperrte den Schnabel auf und ließ den Kopf auf die Seite hängen, dann hatte er ausgekämpft. Nach vorgenommener Sektion fand ſich außer einigen Steinchen nichts in ſeinem Magen. Deshalb Erbarmen allſeitig in ſolchen Zeiten, und Futter geſtreut, wenn es Noth thut! Es wäre gewiß nicht unangebracht, wenn ſich ein allgemeiner Verein unter Vogelfreunden gründen würde, der allerorts ſachverſtändige und zuverläſſige Kollegen fände, welche das Amt eines Futtermeiſters in ſolchen Zeiten übernähmen. Die Koſten des zu beſchaffenden Futters könnten leicht durch Monats- oder Jahresbeiträge ſämmtlicher Mitglieder gedeckt werden, eine gewiß nicht zu unterſchätzende Wohlthat für unſere geliebte Vogelwelt. Ich appellire deshalb an alle gleichgeſinnten Herren, mit allen Kräften dahin zu wirken, daß ein ſolcher Verein in's Leben gerufen werde. Wer ſelbſt die Futternoth ſolcher Vögel mit angeſehen, wird dieſe meine Zeilen gewiß zu würdigen verſtehen und die Sache gelegentlich unter gleichgeſinnten Freunden zur Sprache bringen.

Ein Verſuch zur nützlichen Verwendung der Wachsmotte (Galleria cerella) als Futter für inſektenfreſſende Singvögel.

Von Georg Wimmer.

Als Bienen- und Vogelfreund verſuchte ich, die der Bienenzucht ſo ſchädlichen Larven der Wachsmotte (Galleria cerella), welche ich bei meinen Arbeiten am Bienenſtande oft genug zu erlangen Gelegenheit hatte, als Futter für meine inſektenfreſſenden Vögel zu verwenden. Die dicken fetten und dabei ſehr weichen Larven wurden von allen meinen Weichfreſſern, als: Sonnenvogel, Spottdroſſel, Schwarzplättchen, Rothkehlchen u. ſ. w. nicht nur gern genommen, ſondern ſogar den härteren Mehlwürmern, ja ſelbſt den Speckkäferlarven vorgezogen. Goldhähnchen und Zaunkönige gewöhnte ich bei dieſem Beifutter leicht ein und erhielt ich ſie dabei lange geſund und eifrig im Geſang.

Nach dieſer Beobachtung ſammelte ich alle Abfälle beim Reinigen der Bienenſtöcke und gab dieſe ſowie alte nur noch zum Einſchmelzen geeignete Wachswaben, in welchen die Eier der Wachsmotte zumeiſt reichlich vorhanden ſind, in einen größeren gut verſchloſſenen Topf, ſtellte dieſen in die Nähe des Ofens möglichſt warm und wartete nun die weitere Entwicklung ab.

In nicht allzulanger Zeit war der ganze Inhalt des Topfes in Bewegung. Tauſende kleine Lärvchen waren eifrigſt dabei, den Vorrath aufzuzehren, wobei ſie ſich zu einem ganz vorzüglichen Futter für meine lieben Sänger heranmäſteten.

Ich bin mit dem Reſultat des Verſuchs wirklich ſehr zufrieden und ich glaube, daß dieſe bei der reinlichen Nahrung nicht ungeſunden Larven jedem Vogelfreund für ſeine Lieblinge ſehr willkommen ſein dürften, umſomehr, als die Mehlwürmer nicht ſelten knapp werden und gerade auch nicht billig ſind. Freilich ganz ohne Auslagen läßt ſich dieſes Erſatzfutter für den Nichtbienenzüchter auch nicht beſchaffen, doch wird alles Wachs und Abfälle davon jeder Imker gern billig abgeben.

Bei der Anzucht dieſer Larven in der Wohnung beſteht für Kleider und Pelze durchaus nicht die Gefahr, wie bei der Zucht der Pelz- und Speckkäferlarven, weil die etwa entſchlüpfenden Wachsmotten ihre Eier nur an Wachswaben oder in den Ritzen der Bienenſtöcke abzulegen bemüht ſind, und weil die Larven ſich ausſchließlich nur von Wachswaben und den darin befindlichen Bruthäutchen ernähren.

Es würde mich ſehr freuen, wenn ich durch dieſe Mittheilung den Vogelfreunden einen kleinen Dienſt erwieſen hätte, und wenn einer oder der andere derſelben einen Verſuch in dieſer Richtung machen wollte.

Briefliche Mittheilungen.

... Wenn es Sie, lieber Herr Doktor, intereſſirt, ſo gebe ich Ihnen nachſtehend noch aus meinen aufgezeichneten Notizen einige Angaben, die die Leſer der „Gefiederten Welt“ inſofern intereſſiren dürften, als ſie bei ihren event. Reiſen nach dem Berner Oberland alsdann leichter Beobachtungen anſtellen könnten. Alſo:

Am 8. Auguſt, am obern Grindelwaldgletſcher, beobachtet hunderte von Alpendohlen mit rothen Schnäbeln, wie diejenigen unſerer Amſel im Sommer, und gelben Füßen, ebenſo mehrere Hausrothſchwänzchen, in den Felſen niſtend. Dicht am Gletſcher, etwa 10 Minuten davon, im Buchen- und Kieferngeſtrüpp ein altes Rothkehlchenweibchen mit vier flüggen Jungen, außerdem Mauerſegler in großer Anzahl, daſelbſt Spyren genannt.

Am 11. Auguſt, auf dem Weg von Grindelwald nach der Großen Scheidegg beobachtet, bis 1980 m hoch, am weſtlichen Abhang des Wetterhorns mehrere Alpenlerchen, Waſſerpieper zu Hunderten in Geſellſchaft von Steinſperlingen, den Samen der Alpenblumen auspickend. Mir ſchien es, als ob der Waſſerpieper, wie ich es ſowol hier als auf dem Weg nach dem Faulhorn zu bemerken Gelegenheit hatte, hier oben den Haus- und Feldſperling erſetzt, denn keine Vogelart beobachtet man ſo häufig und in Scharen, als den Anthus aquaticus. Der Lockton des Letzteren iſt ein klägliches ſüd, ſüd, welches man überall vernimmt; beim Auffliegen läßt er dieſen Ton ſehr raſch und oft, wie ſüd, ſüd, ditüt, ditüt, vernehmen. Außerdem traf daſelbſt, etwa 2000 m hoch, zwei Wachholderdroſſeln und viele Hausrothſchwänze. Ueber die Letzteren war ich mehr wie erſtaunt, da ich dieſelben da antraf, wo überhaupt nur noch ein Vogel vorzukommen pflegt; ihr Neſt, ein ſolches fand ich, ſteht in Felſenriſſen mit ganz breitem Eingang, ſo daß ich bequem den Arm hineinſtecken konnte. Dicht am Felſengrat des Wetterhorns traf ich ausgeflogene Junge, welche auf einem Felsblock ſitzend von ihrer Mutter gefüttert wurden.

Am 13. Auguſt, an der kleinen Scheidegg beim Aufſtieg auf's Lauberhorn, bis 2400 m hoch, viele Waſſerpieper mit ihrem kläglichen ſüd, ſüd. Wie mir ein Schweizer Herr mittheilte, niſtet der Anthus aquaticus, in den Alpen und im Volksmund „Erdvögelchen“ genannt, hoch oben daſelbſt in Maſſen, legt bei der Mauſer ſein dickeres Winterkleid an und hält ſich in der kalten Jahreszeit an Flüſſen und Seen der Thalgegenden auf; dann fand ich noch mehrere Schneeammern im grauen Kleid, Alpenſegler (Cypselus melba) mit kreiſchenden Tönen die Luft durchſchwirrend, und vom Gipfel des Lauberhorns zwei prächtige mit weiter Flügelſpannung kreiſende Felſenſchwalben (Hirundo rupestris). Es war eine Pracht, die Flugſpiele dieſer beiden Vögel hoch im Aether beobachten zu können.

Am 17. Auguſt. Auf dem Pilatus mehrere prächtige Buſſarde, Schneefinken und wieder der unvermeidliche Waſſerpieper auf dem Weg nach dem höchſten Punkt des Pilatus, dem Tömlishorn, woſelbſt ich zum erſten Mal die langgeſuchten Alpenflüevögel (Accentor alpinus) in mehreren Stücken vorfand. Es waren dies die einzigen, welche ich auf einer vierwöchentlichen Alpenreiſe anzutreffen Gelegenheit hatte.

Vom Abendberg aus bei Interlaken beobachtete ich ſtundenlang vier Seeadler mit weißen Schwingen (Haliaetus albicilla) über dem Thuner See am Eingang des Kanals, dem Fiſchfang obliegend.

Von Vierfüßlern traf ich am Fuß des Faulhorns ebenſo nach dem Roſalaui zu viele Murmelthiere, ihre pfeifenden Töne hören laſſend, und vom Gießbach nach der Axalp mehrere Siebenſchläfer. Dies wäre ſo ziemlich Alles, was ich finden konnte.

Karl Kullmann.

... Zu meiner Freude kann ich Ihnen mittheilen, daß mein Grisbleu-Pärchen aus Agavefaſern ein beutelförmiges Neſt gebaut hat, und daß das Weibchen ſeit geſtern auf fünf winzigen Eierchen brütet. Einige mit Papier beklebte Harzer Bauerchen und ſonſtige Niſtkäſtchen haben die Vögelchen gar nicht beachtet. Da dieſe Art, ſoviel mir bekannt, nicht allzu leicht zur Brut ſchreitet, ſo würde ich mich herzlich freuen, auch mit ihr ſo viel Glück zu haben, wie mit meinen Schwalben. Dieſe letzteren gedeihen vorzüglich, ſie ſind wunderſchön befiedert, und die beiden jungen Männchen höre ich ſchon von Weitem ſingen, wenn ich mich meiner Wohnung nähere. Meine Edelſänger haben dieſen Sommer zwei Bruten gemacht, und jedesmal hat das Weibchen faſt drei Wochen feſt gebrütet, ohne daß ein Ei ausgeſchlüpft wäre, alle Eier waren hell. Frau R. Siegmund.

… Im Laufe des Sommers 1898 ſind nach dem Berichte des Promenaden-Polizeiaufſehers Herrn Walter in den öffentlichen Promenaden-Anlagen der Stadt Breslau 176 wildernde Katzen gefangen worden. A. Lindner.

Anfragen u. Auskunft.

Herrn Max Schluſche: 1. Zarte Weichfutterfreſſer mit Laufkäfern, die einen üblen Geruch abſondern, zu füttern, iſt nicht rathſam. 2. Die Verfärbung des Napoleon- und des Orange-Webervogels zum Prachtgefieder geht in der Gefangenſchaft zu der Zeit vor ſich, wenn in der Heimat die Niſtzeit naht, und dieſe wechſelt je nach dem Theil Afrikas, aus welchem der Vogel herſtammt, vom Juni oder Juli bis zum Auguſt. 3. Dieſe beiden Arten der Webervögel ſchreiten nicht ſo leicht zur Brut. Beachten Sie nur genau die Angaben, die ich in meinem Buch „Die Webervögel und Widafinken“, das Sie ja beſitzen, inbetreff der Fütterung und Züchtungsverſuche gegeben habe. 4. Setzen Sie Ihren friſch gefangenen Hänfling zunächſt in einen ſog. Eingewöhnungskäfig. Ein ſolcher Käfig muß recht klein ſein, weil ein einzelner Vogel im engern Raum ſich viel eher beruhigt und in ſein Schickſal fügt, als im weiten. Am vortheilhafteſten iſt der etwas abgeänderte Kiſtenkäfig, von dem nur die vordre Seite für das Licht offen bleibt und anſtatt mit Draht-, beſſer mit Holzgitter verſchloſſen wird, das aber keinenfalls ſo weit ſein darf, daß der Vogel den Kopf hindurchſtecken kann. Pfeiler und Rahmen des Käfigs ſeien gerundet, die Decke aus Tuch oder dergl., die Hinter- und die beiden kurzen Seitenwände aus Holzbrettchen oder auch aus Tuch, Drillich und dergl. hergeſtellt, das man über die Eckſäulen ſpannt. Der Eingewöhnungskäfig erhält nur zwei Sprunghölzer. Ein ſo eingerichteter Käfig verhindert ſelbſt beim ſchlimmſten Toben, daß der Vogel ſich beſchädigen kann. Späterhin ſetzen Sie den Hänfling natürlich in einen für ihn paſſenden geräumigen Käfig. 5. Das Dompfaffmännchen hat die rothe Färbung der Wangen, Kehle und ganzen übrigen Unterſeite, das Weibchen aber iſt dort nur fahl röthlichgrau. In der Gefangenſchaft verliert das Männchen indeſſen meiſt das ſchöne Roth des Gefieders und erſcheint dann dem Weibchen ähnlich.

Herrn Johann Schwaninger: 1. Daß Ihr Pärchen Wellenſittiche nicht zur Brut ſchreiten will, kann in verſchiedenen Urſachen begründet liegen. Wenn es alteingeführte Vögel ſind, ſo werden ſie ſicher, falls ſie richtig verpflegt und gehalten werden, im Dezember, Januar oder Februar niſten, denn dieſe Monate fallen mit ihrer heimatlichen Niſtzeit zuſammen, an der ſie, in den erſten Jahren wenigſtens, feſthalten. Andrerſeits mögen Ihre Wellenſittiche aber auch noch zu jung ſein, um erfolgreich niſten zu können. 2. Die beſten Niſtkaſten für Wellenſittiche ſind die ſechseckigen von 23 bis 25 cm Höhe und 14,5 bis 16 cm Weite, mit Flugloch 3,5 bis 4 cm, wie ſolche die großen Holzwaren- nnd Niſtkaſtenfabrikanten zum Preiſe von 1,50 bis 2,50 ℳ liefern. Da hinein geben Sie eine Lage von feinen, trocknen Sägeſpähnen. die den Boden aber nur 2 bis 4 mm hoch bedecken darf. Unterſuchen Sie doch Ihre Niſtkäſten ganz genau, ob ſie auch nicht zu eng ſind.

Herrn W. Nolte: Immer wird man die Erfahrung machen, daß unter den Zebrafinken einige Pärchen überaus ergiebig, andre aber uns zu unzuverläſſig niſten. Am beſten iſt in Ihrem Fall, den Vögeln die Niſtgelegenheit ganz zu entziehen und ſie etwa ſechs bis acht Wochen in einem Käfig ganz abgeſondert zu halten. Im Uebrigen iſt die von Ihnen verabreichte Fütterung zu einförmig. Leſen Sie darüber in meinem Werk „Die Prachtfinken“, das Sie ja beſitzen, nach (S. 180).

Zu unſerm Bilde.

Einer der ſchönſten aller Starvögel überhaupt und ihrer Unterfamilie der Stärlinge insbeſondere iſt der **Brillen-Hordenſtärling** (Sturnus xanthocephalus. *Bp.*). Er erſcheint am ganzen Körper tiefſchwarz; Kopf bis zur Oberbruſt zitrongelb bis orangegelb; breiter Zügelſtreif und ſchmaler Ring um's Auge ſchwarz; Flügel mit weißem Spiegelfleck (große und kleine oberſeitige Flügeldeckfedern weiß, mit ſchwarzen Spitzen); Augen dunkelbraun; Schnabel und Füße hornſchwarz. In der Größe übertrifft er eine Droſſel. Das Weibchen iſt kleiner; ſchwarzbraun; Kopf ſchwarz; Augenbrauenſtreif gelb; kein Weiß im Flügel.

Die Verbreitung dieſes Stärlings erſtreckt ſich über das weſtliche Nordamerika, von Texas und Neumexiko bis zum 58. Grad nördlicher Breite, von Illinois bis zum Stillen Ozean. Auch auf Kuba kommt er vor, wenn auch nur höchſt ſelten. Er iſt Zug- oder Strichvogel, aber er geht nicht weit ſüdlich hinab, höchſtens bis in's Innere von Mexiko, und überwintert zum Theil ſchon in den nördlichen Staten. Vorzugsweiſe lebt er in den großen Prärien, an waſſerreichen, mit Schilf und Rohr bewachſenen Sümpfen und Marſchen, wie die Verwandten geſellig. Hunderte von Brillenſtärlingen vereinen ſich hier zur Brutanſiedlung. In dem dichten Rohrwald ſtehen die Neſter dann oft nur wenige Schritt von einander entfernt und ſind meiſtens nur in geringer Höhe über dem Waſſerſpiegel je in einem Rohrbüſchel angelegt. In der Regel laufen etwa 6 bis 8 Rohrhalme durch die Wandungen eines jeden Neſtes, die gut mit demſelben verbunden und umflochten ſind. Der Neſtbauſtoff des kunſtvollen, feſten Baues beſteht meiſtens aus langen, groben, elaſtiſchen Halmen, die immer aus dem Waſſer aufgeſucht werden. Das Innere iſt mit feinen Hälmchen ausgelegt. Die vier bis fünf Eier des Geleges ſind matt graugrünlich, mit hell- und dunkelbraunen Tüpfeln gezeichnet, die am dicken Ende ſo dicht ſtehen, daß die Grundfarbe kaum erkennbar iſt. Im Verhältniß zur Größe des Vogels erſcheinen die Eier klein, auch ſind ſie ſehr zartſchalig. Das Leben und Treiben der munteren prächtigen Vögel in einer ſolchen Brutanſiedlung zu beobachten, wie ſie in den Niederungen nach Nahrung ſuchend am Boden umherlaufen, einzeln oder in kleinen Schwärmen mit leichtem, hurtigem Flug Ausflüge in die Umgebung machen, mit bewundernswerther Gewandtheit in dem hohen dichten Rohr ſich bewegen, oder auf den Stengeln ſitzend von jedem Luftzug ſich hin und her wiegen laſſen, oder fleißig naſſen Bauſtoff herbeitragen, iſt von beſonderm Reiz.

Der Brillen-Hordenſtärling iſt in Amerika nicht nur als Vertilger ſchädlicher Inſekten für die Farmer von unſchätzbarem Nutzen, ſondern auch als Käfigvogel ſehr beliebt, und wird auch bei uns um ſeines drolligen Weſens und ſeiner hübſchen Erſcheinung willen geſchätzt. In ſeinem ganzen Thun und Treiben iſt er höchſt eigenthümlich und kann als unterhaltender Zimmergenoſſe bezeichnet werden. Von ſeinem Geſang darf man indeſſen nicht zu viel erwarten. Dieſer iſt zwar ſtellenweiſe melodiſch und im ganzen wechſelreich und um ſo intereſſanter, da der Vogel ihn mit kurioſen Geberden, Sträuben der Hals- und Flügelfedern, Emporſtrecken des aufgeſperrten Schnabels u. ſ. w. begleitet, beſteht aber in der Hauptſache nur aus heiſeren, krächzenden, ſchnarrenden und gurgelnden Kehllauten, unter denen namentlich ein langgezogener, an den Bruſtton des Kuhgebrülls erinnernder Ton unangenehm auffällt.

Am beſten hält man die Brillenſtärlinge in einem ſog. Droſſelkäfig. Mit anderen Vögeln vertragen ſie ſich nicht und mit ihresgleichen nur, wenn der Käfig ſehr geräumig iſt. Zur Nahrung reicht man ihnen verſchiedene Sämereien, und zwar Kanarienſamen, Hirſe, geſpelzten Hafer, Reis und Hanf. Sehr gern freſſen ſie reifenden Hafer. Daneben bedürfen ſie auch des Weichfutters. Am zuträglichſten iſt ihnen ein einfaches Droſſelfutter aus Ameiſenpuppen, überrieben mit Möre oder Gelbrübe, nebſt zerriebenem Weißbrot, alles zu gleichen Theilen. Dazu gibt man eine entſprechende Anzahl von Mehlwürmern oder, wenn möglich, allerlei lebende Kerbthiere, Maikäfer, Schmetterlinge, Heuſchrecken u. a., ſchließlich auch Beren, Kirſchen und andere Frucht. Vor allem aber lieben ſie das Waſſer ſehr; ein recht geräumiger Trink- und Badenapf darf daher niemals fehlen. D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Kautſchukſtempel

von 1,25 bis 2,50 ℳ, Farbkiſſen dazu 50 ₰ liefert [1669]

H. D. Becker, Iſerlohn.

Futtermittel.

98er Ameiſeneier,

feinſte weiße Qualität, rein und ſchön, à Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Ameiſeneier, 98er Ia, ſehr ſchön, à Ko. 8 ℳ, à Ltr. 70 ₰, 10 Ltr. 6½ ℳ

Weißwurm, 98er hochprima, à Ko 4½, à Ltr. 1 ℳ.

Muska, hochf. 98er, à Ko. 3, 5 Ko. 14 ℳ.

Mehlwürmer, rein und prima, à Ltr 5, à Ko. 9.

Präpar. Eigelb, garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.

Bisquit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,80
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,20
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,—
do. algeriſche	„ „ „ „	2,
do. indiſche	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	5,—

Oſſa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [1670]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter
Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. Vogelfutterarten gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Neue 1899er
Tyroler Ameiſeneier,

hochfein, weiß und rein, à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk.

Neuer 99er Elbe-Weißwurm

à Ko. 3½ Mk., à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk. [1671]

Zeke (Muska)

à Ko. 3, 5 Ko. 13, 10 Ko. 25 Mk.

J. O. Rohleder
Leipzig-Gohlis
Vogelfutter-Groß-Handlung.

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [1672]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411, I.

Geſetzl. geſchützt.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die

Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1673]

Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Geſetzl. geſchützt.

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [1674]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

AVOL Nachtigallen- u Droſſelfutter (Geſetzl. geſch.) mit und ohne Caretten per Pfd. 80 Pfg. 9 Pfd. Mk. 7.20 fco.

Dieſes Futter, — in Folge langjähriger Liebhaberei ſachkundig nur aus beſten Zuthaten hergeſtellt u. nach eingehender probeweiſer Fütterung durch Herrn

Karl Kullmann, Frankfurt a. M.

auf der großen allgem. Geflügel- u. Vogel-Ausſtellung hier mit dem

I. Preis prämiirt

iſt das Beſte, was es für Inſektenfreſſer gibt.

Auf Verlangen Gratisproben an Liebhaber.
Fſt. deutſche handbeleſene Ameiſeneier 1899 p. Lit. 70 Pfg., von 10 Liter an franco

F. Grünewald, Offenbach a. M.
Markt 5.

[1675]

Alle Vogelfutter,
Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig,
Königsplatz 7.

Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche. Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1676

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche inſektenfreſſende Singvögel von Apotheker **Max Kruel.**

Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!

[1677] Allein angefertigt von

Ernst Hanke, Trier, Moſel.

Muſter und Proſpekte koſtenlos.

99er Ameiſeneier,

à Ltr. 80 ₰, 10 Ltr. 7,50 ℳ, **Miſchfutter,** 10 ℔ 2—2,50 ℳ, **Vögel** ꝛc. empfiehlt alle Arten bei ſtreng reeller Bedien. Preisl. auf Wunſch.

J. Götz, Hofl.,
[1678] **Neuulm (Bayern).**

Mehlwürmer, à Ltr. 4 ℳ inkl. Verp.

Bei Einſendung von 1,50 ℳ = 140 gr., alſo weit über 1000 Stück, frk. inkl. Verp.

[1679] P. Bartsch, Breslau, Flurſtr. 6.

Neue getr. Ameiseneier,

deutſche, hochprima, helle Qualität, p. Ltr. 1 ℳ, p. 10 Liter 9 ℳ, empfiehlt [1680]

Carl Kämpf, Mainz.

Rheiniſches [1681]

Univerſalfutter

für feinere inſektenfreſſende Vögel, per Kilo 2 ℳ, für Amſeln, Droſſelarten 1,60 ℳ. Proſpekt und Gebrauchsanweiſung gratis.

J. Nullmeyer.
Vogel- u. Futterhandlung, **Mannheim.**

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 5 ℳ, Kilo 8½ ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,50 ℳ. [1682]

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Vögel.

Kanarien-Vorsänger!

Vorzügliche tieftourenreichſte, noch nie zur Zucht benutzt und flott durchſingend, nach Geſangsgüte à 12, 15, 20, 25 und 30 ℳ, noch in großartiger Auswahl da. Verſandt überallhin gegen Vorherkaſſe oder Nachnahme mit voller Garantie für Werth, Geſundheit und Probezeit.

[1683] **Julius Häger,**
St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864. Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Wegen Aufgabe d. Liebhaberei

verk. folg. hochprima Sänger: 1 poln. noch ſchlag. Davids-Sproſſer 12 ℳ, 1 roſenbrüſt. Kernbeißer 15 ℳ, 1 Gartengrasmücke 6 ℳ, 1 Papſtfink 6 ℳ, 1 Meitzugfink, zweiſchall., 4 ℳ, 1 Stiglitz 1,50 ℳ, 1 Rothhänfling 1,50 ℳ, 1 rother Gimpel 1,50 ℳ. Off. u. M. an die Exped. d. Blattes. [1684]

Verkaufe:

70 Ltr. Ameiſeneier, gut gedörrt, 99. prima Ware, à Ltr. 35 ₰, 7 rothe Dompfaffen à 1 ℳ, 4 Sproſſer à 1,60 ℳ, 2 Nachtigalen à 1,50 ℳ, 6 Schwarzplatten à 1 ℳ, 10 Lachtauben à 40 ₰, 15 6 Monate alte legreife, ſchwarze Hühner, zuſammen 13 ℳ. Anfragen Rückporto erb., in Tauſch nehme Taſchenuhr oder Harzer Kanarien. [1685]

Aden Mann,
Steinamanger (Ungarn), Günsgaſſe 16.

Gelbe Erlenzeiſige, prachtv., futterf. Vögel, 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Junge Dompfaffen zum Anlernen à Stck. 2 ℳ, 4 Stck. 6 ℳ, Kreuzſchnäbel 6 Stck. 4 ℳ, Schwarzmeiſen 6 Stck. 4 ℳ, Dtzd. 6 ℳ, Blau- u. Finkenmeiſen 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Garant. leb. Ank. In Gegenrechnung nehme Sproſſer und Schwarzblatten. **A. Jaumann,**
[1686] **Großbreitenbach,** Thür.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1687]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Digitized by Google

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer, **Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,** alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1688]

Mönchsſittiche,

prachtvoll, à P. 12 ℳ, **Grauköpfige Sperlingspapageien,** à P. 4, 3 P. 10 ℳ, **Weißkehl. Pfäffchen,** à P. 12 ℳ, ſowie alle früher angezeigten Vogelarten. [1689]

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Verk.: Ia **Nachtigal,** ff. Gefieder, wieder anfang. zu ſingen, mit Käfig 9 ℳ, ff. **Wiener Plattmönch,** wieder laut ſingend, mit Käfig 9 ℳ, ohne Käfig nur 6 ℳ. [1690]

Heinr. Becours, Goslar.

Echt ruſſiſche Frühjahrs-

David-Weiden-Sproſſer

mit Glocken-, Baß-, Moll-, Lach-, Knarr- und Waſſer-Touren, jede Geſangsſtrofe gut ſchnappend, geſanglich erprobt und im Käfig vermauſert, ſo lange der Vorrath reicht, à 20 und 25 ℳ, ferner gute **Frühjahrs-Au-Sproſſer** ohne David-Ruf, à 15 ℳ, ſowie

Orpheus-Grasmücken,

ſchöne, ſichere Männchen, à 9 ℳ, dito minder ſchöne à 5—7 ℳ, dito ohne Gewähr fürs Geſchlecht à 3—4 ℳ und **Frühjahrs-**

Gebirgsſchwarzplättchen,

im Käfig vermauſert, à 6—8 ℳ, empfiehlt die als reell bewährte Firma [1691]

Mathias Rausch,
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

F. Rejsek, Hamburg, Peterſtraße 28

Spezialität: **Papageien und Papageienkäfige** in neuesten praktischsten Façons und mit Porzellannäpfen.

Prämirt auf allen beſchickten Ausſtellungen.

Offerirt in nur ſchönen wohlgepflegten geſunden Exemplaren: Junge **Grau-Papageien** (Jakos) vollkommen geſunde Thiere, 6 Wochen hier, Stück nur 15 ℳ, ſolche ſchon 4 Monate hier, 25 ℳ, **einige ſehr viel ſprechend,** 60, 80, 100, 120 ℳ. Junge grüne **Amazonen,** mit viel gelb und roth, anf. zu ſprech., Stück nur 20 ℳ, ſolche ſchon gut ſprechend, 30, 35, 50 ℳ, je nach Leiſtung. **Brillen-Amazonen,** ſprechend, 25 ℳ, **Rothſtirn-Amazonen,** ſprechend, 25 ℳ, **Gelbnacken,** anf. zu ſprech., 25 ℳ, **große Doppelgelbköpfe** in Pracht nur 30 ℳ, **weiße Kakadus** 15 ℳ, **Tigerfinken,** ganz rothe, Par nur 1,50 ℳ, ganz zahme amüſante **Affen,** Stück 20 ℳ. Lebende geſunde Ankunft garantirt. [1692]

Junge Wellenſittiche,

Stück 2,50 ℳ. **L. Brinkmann,**
[1693] **Calefeld** in Hannover.

Citronenzeiſig

(Zitril), Dutz. 21 ℳ, Stück 2,50 ℳ, Par 4 ℳ, **rothe Dompfaffen,** Dutz. 24 ℳ, St. 2,50 ℳ, Par 3,25 ℳ u. ſ. w., alle Vögel ſichtbar verpackt. Dieſe zwei Sorten liefere bis Ende November. Anfr. Marke beifügen. [1694]

Beck's Vogelhandlung, Stuttgart.

Einen vorzüglichen **Sproſſer** gebe billig ab. **C. Knibbe,** Buchhändler,
[1695] **Dresden,** Annenſtr. 41.

Kukuk, jung aufgezogen, fingerzahm, tadellos befiedert, Ausſtellungsvogel, 10 ℳ. [1696]

Hesse, Berlin, Schleiermacherſtr. 10.

Rothkehlchen

à 75 ₰, Dtzd. 5 ℳ, 2 Dtzd. 9 ℳ, **Blau- u. Tannenmeiſen.** Par 1,50 ℳ, Dtzd. 5 ℳ, **Schwarzdroſſeln,** im Geſang, 4 ℳ. Garant. leb. Ank unt. Nachn. [1697]

Rud. Meier,
Neuendorf b. Potsdam.

Niemals schreiende

Gelbkopf-Amazone, Schwingen an der Außenfahne roth und blau, zu verkaufen. Gelehriger, geſunder Papagei, ſpricht verſchiedenes und pfeift. Angebote erbeten an [1698]

W. Germann, Verlag,
Schwäb. Hall, Langer Graben.

Zahme, ſchöne Schleiereule,

mit Verp. 4 ℳ gegen Nachn. [1699]

Jos. Ehrlich,
Würzburg, Weißenburgerſtraße.

Verk.: Stieglitzbaſt., ♂ à 4 ℳ, ♀ à 50 ₰, ~~1 Zuchtp. weiße Reisfinken~~ 7 ℳ, bunte Junge, P. 4,50 ℳ. **Suche** hier gez. Diamantf., Gürtelgrasf. od. Gould's-Amand. [1700]

Maiss, Lehrer, **Reichenbach** (Schleſ.).

[1701] **Geſucht:**

Granataſtrilde, Buntaſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen u. ſeltene ausländ. Finken.

J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.).

Einen **zahmen Buſſard** 10 ℳ, 5 **Bartmeiſen,** ½ Jahr im Käfig, tadellos befiedert, à 5 ℳ, **1 Blaudroſſel** 12 ℳ, gibt ab **A. David.**
[1702] **Breslau,** Ohlauerſtr. 32.

Gebe ab: 1 Par 2jährige **Wellenſittiche** 7 ℳ, 2 Par reinweiße **Reisfinken,** à 7 ℳ; die 3 Pare zuſ. 20 ℳ. [1703]

M. Reger, Altheim, Niederbayern.

Junger kaufmänniſch gebildeter Mann, mit der Behandlung und Pflege lebender Thiere durchaus vertraut, ſowie einigermaßen bewandert im Geflügel- u. Wildbretgeſchäft, 19 Jahre alt, **ſucht** ſofort oder ſpäter **Stellung** auf Bureau oder im Verſandgeſchäft. Gefällige Offerten unter **K. S. 1** an den Verlag dieſes Blattes. [1704]

Unterricht! [1705]

Wer nimmt einen **Doppelgelbkopf** in Pflege und **Unterricht?** Anerbieten mit Preisforderung an den Verlag unter **C. D.**

Umſtändehalber offerire:

1 Schubert's Naturgeſchichte der 3 Reiche, wie neu, ſtatt 48 für 25 ℳ.
1 Brehm's Thierleben, Kl. Ausgabe, ſtatt 26 für 15 ℳ. [1706]

M. Seidel,
Dresden, Pfotenhauerſtr. 10, part. r.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg · Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 24.

Die gefiederte Welt
Wochenschrift für
Vogelliebhaber,
Züchter und Händler
von
Dr. Karl Ruß.

Preis: vierteljährlich
[illegible]
M. 1,50.

Magdeburg
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
(R. & M. Kretschmann).

Einzelpreis der Nummer
20 Pfg.

Inhalt der Nr. 38.

Ueber die beſte Ernährung der Papageien, bzl. aller weichlichen Exoten.
Plauderei über Kanarienzuchten und Kanariengeſang.
Wie ich Ornithologe wurde.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechſel.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Prima 99er Elbe-Weißwurm, Kg. 3, 5 Kg. 13,50, 10 Kg. 25 ℳ, Lt. 85 ₰.
Tyroler Ameiſeneier, hochfein, weiß u. rein, handgeleſen, Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ, ungeleſene Kg. 3 ℳ. [1707]
Zeke (Musca), 99er, feinſte, fr. Ware, à Ko. 2,60 ℳ, 5 Ko. 12,50 ℳ. Univerſal-Nachtigalenfutter, 10 Jahre ſelbſt erprobt, Ko. 1,80, 5 Ko. 8,50 ℳ, ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- u. Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ mit Sack, reelles Gewicht u. Maß.
Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Der beſte Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ. 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1713]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Käfige und Geräthſchaften.



Sperlingsfangkörbe 2,50 ℳ. **Netzfallen,** kleine 60 ₰, groß 1 ℳ, f. größ. Vögel 1,50 bis 2 ℳ. **Fangkäfige** 1 ℳ, u. 1,50 ℳ. **Vogelleim,** à Büchſe 50 ₰, bei Einſend. von 1 ℳ in Briefmarken 2 Büchſen franko. [1708]
Gebr. Janſen, M.-Gladbach 112.
Illuſtrirte Preisliſte gratis.

▬ Für alle Arten Vögel fertige ich **fachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Staatspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 30 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1714]

Neu! **Senſationell!**

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [1709] **Edmund Schiewick, Zittau, Sachſen.**
Bitte Proſp. zu verlangen, mit f. Ref. zu dienen.
Reparaturen aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt.

Holzwaarenfabrik.

C. L. Flemming

Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen
empfiehlt: [1715]
Flug- und Heckbauer, Einſatzbauer, Geſangskaſten.
Muſterpackete 9 St. ſort. f. Kanarienzüchter M. 6 franko.

Holzwaarenfabrik.



Man verlange Preisliſte.

Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in praktiſcher Anordnung,
großer Auswahl u. billigem Preis. [1710]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
Auguſt Hermann Luther, Oſchatz i. S.

Der beſte Fangapparat
für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1711]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

50% Eier mehr
durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,** [1712] **Waren i. Mecklenb.**
Proſpekte gratis.

Per **ſofort** abzugeben: [1716]

Eine Voliere,

2,80 × 1,10 × 70, zu jedem annehmbaren Gebot. Gefl. Anfragen befördert die Exped. der „Gefiederten Welt“ sub. Voliere.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei.
R. Schröter (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen bei Greußen.** [1717]

Die gefiederte Welt.

Wochenschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

[illegible]

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
[illegible]

[illegible]

Nr. 38. Magdeburg, den 21. September 1899. XXVIII. Jahrg.

Ueber die beste Ernährung der Papageien, bzl. aller weichlichen Exoten.

Eine theoretisch-praktische Studie.

Von Dr. med. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Digitized by Google

Zunächſt verpflege ich die Thiere ſo, wie ſie der Vorbeſitzer verpflegt hat. Nach zwei bis drei Tagen Eingewöhnung erhalten ſie an Getränk folgendes: ein- bis dreimal höchſtens pro Tag abgekochtes Waſſer (Regenwaſſer). Bei Neigung zu Durchfall ſofort ganz dünne Hafergrütze mit Nährſalzextrakt verſetzt (ſiehe Nr. 35). Alles Getränk darf nur ſchluckweiſe verabreicht werden, und zwar zu ganz beſtimmter Zeit: um 8, 12 und 6 Uhr. Es iſt oft erſtaunlich, wie ſchön das „Nährſalz“ den Stuhlgang regulirt. Iſt die Verdauung in der Weiſe abnorm, daß Verſtopfung mit Durchfall abwechſelt und unverdaute Speiſereſte ſich in der Ausleerung finden, ſo gebe ich ein- bis zweimal täglich Milch, oder auch vier bis zehn Weintraubenberen; bei Milch und Obſtdarreichung muß alles andere Getränk entzogen werden. Daneben immer fleißiges Benagen grüner Zweige, welche „Nährſalze“ in dem innern Theil der Rinde enthalten, täglich ſechs- bis achtmal.

Die Milch (Kuh- oder Ziegenmilch) iſt ein ſehr geſundes Getränk und zugleich „Normal-Nährmittel“ für alle jungen Papageien, auch alte. Die Milch enthält alle Beſtandtheile, die zum Aufbau eines Körpers nothwendig ſind, nämlich: Waſſer 87 %, Eiweiß $3\frac{1}{2}$ %, Fett $3\frac{1}{2}$ %, Zucker $4\frac{3}{4}$ %, Nährſalze $\frac{3}{4}$ %.

Die vier erſten Stoffe ſind allgemein bekannt; daß jedoch auch der fünfte Stoff abſolut nothwendig iſt, davon wiſſen die allermeiſten lieben Menſchenkinder nichts. Es iſt bekannt, daß alle jungen Thiere (und Menſchen) auch körnerfreſſende Vögel mit Milch aufgezogen werden und gut gedeihen. Man mache jedoch den Verſuch und entziehe der Milch die Nährſalze, ſofort ſcheitert die Sache. Von mir und anderen, z. B. Dr. med. Lahmann, Sanatorium weißer Hirſch bei Dresden, ſind ſolche Verſuche tauſendfältig immer mit demſelben Reſultat gemacht worden. Hierher gehört auch folgender Verſuch Förſters: er fütterte Hunde mit Fleiſchabfällen, denen er die „Nährſalze“ entzogen hatte; die Hunde ſtarben trotz vieler Fleiſchkoſt eher, als andere Hunde, die hungerten, d. h. gar nichts bekamen. — Bezüglich der Milch muß man bei Papageien die Vorſicht bewahren, daß man keine Milch kauft, die vom Milchhändler in der Stadt herumgefahren wird, ſondern man muß ſie unverfälſcht im nächſten Kuhſtall holen laſſen. Zweitens, muß nach dem Darreichen der Milch $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde vergehen, ehe Futter gereicht wird. Die Magenverdauung bei Menſchen und Papageien geht ſo vor ſich, daß nur dann verdaut wird, wenn ein dicker Speiſebrei gebildet iſt. Alle flüſſige Nahrung (Waſſer, Milch, dünne Suppe, bzl. Wein und Bier bei Menſchen) muß zuerſt reſorbirt (entfernt) werden, ehe der Speiſebrei gebildet wird. So lange alſo bleibt die Nahrung unverdaut im Magen liegen. Dieſe höchſt wichtige Verdauungsvorſchrift kennen nur wenige Menſchen. Hier, am hieſigen Platz habe ich in einem Jahr erſt einen Menſchen getroffen, welcher dieſe Verdauungsvorſchrift kannte, und viele Tauſende lernte ich kennen in einem Jahr. Daher auch die ärztliche Vorſchrift bei Magen- und Darmkranken: „Zum Eſſen Nichts trinken“. Man trinkt eine Stunde vor dem Eſſen. — Auf die Papageienpflege angewandt heißt dieſes: Man reicht dem Vogel Saufen, läßt ihn ſeinen Durſt ſtillen, ſodann nimmt man den Saufnapf weg, und reicht nach $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde zwei Futternäpfe, 1. für Nr. I Futter, 2. für Nr. II Futter. Ich glaube ganz ſicher, ja ich weiß ſogar ganz genau, daß die ungeheuer vielen Erkrankungen der Papageien nur lediglich mit auf die Nichtbeachtung dieſer wichtigen Vorſchrift zurückzuführen ſind. Da hat ein Papagei, der ſonſt „normal“ gefüttert iſt, d. h. Waſſer, Hanf, Mais und Brot bekommen hat, „Lungenentzündung, Darmentzündung“ ſich zugezogen; natürlich heißt es durch „Erkältung“; daß dieſe Erkältung jedoch nur eine Gelegenheitsurſache iſt, und der eigentliche Grund der Erkrankung an den falſchen Stoffwechſelprodukten liegt, die ſich durch einſeitige Ernährung bilden, daran denkt Niemand. (Waſſer, Hanf und abgekochten Mais nenne ich eine einſeitige Ernährung; warum, werden wir gleich ſehen.)

Ein Papagei, der eine ganz normale Blutzuſammenſetzung hat, wird niemals eine Lungenentzündung, Luftröhrenkatarrh, Darmkatarrh bekommen, ſelbſt wenn er ſich erkältet. Solche Krankheiten befallen nur den mit verdorbenem, verwäſſertem, nährſalzarmem Blut behafteten Vogel. Ganz verwerflich und nicht naturgemäß iſt die Darreichung von Kaffe, ſelbſt noch ſo verdünntem. Es entſteht dadurch im Lauf der Zeit chroniſcher Darmkatarrh, Blutverwäſſerung mit ſekundärer Lungenentzündung und Tod, oder Sepſis.

Zum normalen Aufbau des (menſchlichen) thieriſchen Körpers ſind folgende Nahrungsbeſtandtheile nothwendig. In einem Gemiſch von 100 Theilen: Eiweiß $3\frac{1}{2}$ %, Fett $3\frac{1}{2}$ %, Zucker (bzl. Stärkemehl) $4\frac{3}{4}$ %, Nährſalze $\frac{3}{4}$ %. Wo auch nur eins von dieſen auf die Dauer fehlt, z. B. die Nährſalze (Kali, Natron, Eiſen), kann der Vogel auf die Dauer nicht gedeihen, ſondern muß erkranken.

(Schluß folgt.)

Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang.

Von R. Groſſe.

Es wird verſchiedentlich als merkwürdig bezeichnet werden, wenn ich zu einer Zeit, in welcher die Kanarienhecke faſt allgemein ſchon aufgelöſt iſt, über Kanarienzucht ſchreiben will. Ich wähle aber gerade dazu einen Zeitabſchnitt, in dem einerſeits die Züchter noch nicht von der Geſangsausbildung der in den Anfangsgründen befindlichen lernenden Junghähne allzu ſehr in Anſpruch genommen ſind, und andererſeits, unmittelbar nach Schluß der Hecke, ihnen noch alle Vorkommniſſe und Handlungen der Heckvögel friſch im

[illegible]



[illegible]

[illegible]

welcher der Eifer, durch Zucht edler Kanarienvögel ſich einen lohnenden Nebenerwerb zu verſchaffen, hervortretend war. In dieſem Zeitabſchnitte wurde weniger mit dem bloßen Liebhaber gerechnet, der Züchter wurde als Käufer lieber geſehen, der immer annehmbare Preiſe bezahlte und die Ausſtellungen wurden deshalb lediglich für Züchter eingerichtet. War es denn weiter etwa wunderbar, daß viele Züchter, die vordem „gewöhnliche Vögel“ gehabt hatten, alle Anſtrengungen machten und u. A. für ihre Verhältniſſe viel Geld anwandten, um beſſere Zuchtvögel zu erlangen und gute Hohlroller zu erziehen, wenn ſie ſahen, um wie viel höhere Preiſe die Händler für Rollervögel zahlten und wie ſehr letztere begehrt wurden? Alle dieſe Umſtände bewirkten, daß die Zucht beſſerer Vögel ſchnell ſich verbreitete, daß auf die Hohlrolle ein ſehr großer Werth und Nachdruck gelegt wurde, und daß alle anderen Geſangsſtrofen, die im Mißklang zur Hohlrolle ſtanden, nicht geduldet wurden und entfernt werden mußten. Der Hohlrolle zu Liebe iſt ſo manches ſchöne Geſangsſtück ſchlafen gegangen, der Hohlrolle zu Liebe hat ſo manche wohlklingende Strofe unbeachtet bleiben müſſen. Jetzt ſcheinen wir nun zwar nicht den Höhepunkt des Idealgeſanges, wohl aber den der „Hohlrolle“ erreicht zu haben. Die Vereine haben ſich ſehr vermehrt, die Zahl der Züchter des Trute'ſchen Vogels hat rieſig zugenommen und alle haben ſo großen Werth auf dieſe eine, allerdings auch wunderbare Geſangsſtrofe gelegt, daß ſie bisher die herrſchende geblieben iſt und daß auch die Knorre ihr nicht gleichkommen konnte, obgleich Knorrvögel auch recht beliebt geworden ſind.

Die Anzahl guter Vögel aber wurde mit der Zeit ſo groß, daß die Züchter ſie nicht alle mehr verwerthen konnten, und ſie mußten zum großen Theil an die Exporthändler abgegeben werden. Letztere machten auch verſchiedene Jahre hindurch ein gutes Geſchäft mit dieſer Ware und zahlten ganz annehmbare Preiſe, allerdings weniger als Züchter. In den letzten Jahren ſtockte das Geſchäft mit guten Sängern aber, und ſämmtliche Händler erklärten, die Rollervögel werden wegen ihrer Einſeitigkeit nicht mehr vom Publikum begehrt, der gewöhnliche Vogel dagegen verkaufe ſich leichter und vortheilhafter. Die Preiſe für edle Vögel ſind nun noch mehr gefallen und die Vereine ſowol, wie überlegende Züchter rathen vielſeitigere Nachzucht zu erziehen. Es iſt dies aber leichter geſagt als gethan. Ich kann mich in keiner Weiſe dafür erwärmen, daß man verſucht, das Lied des Edelrollers dadurch mannigfaltiger zu geſtalten, daß fehlerhafte Strofen wieder geduldet werden ſollen, Strofen, welche vorher in ihrer gelindeſten Form nicht gelitten wurden. Ich bin ſelbſt Augenzeuge geweſen, daß früher Händler, die um ſonſt gute Stämme handelten, dieſelben für werthlos erklärten, wenn ſie in denſelben auch nur die weichſte Schnatter verſpürten. Sie ſetzten nicht nur die Preiſe für ſolche Sänger unverhältnißmäßig herab, ſondern ſtanden ſogar öfter vom Ankauf derſelben als beſſere Vögel zurück und verſetzten ſie unter die Landraſſe. Jeder Vogel, der auf Ausſtellungen etwas von der Schnatter hören ließ, wurde bisher ohne weiteres als werthlos beiſeite geſtellt, und jetzt will man eine weiche Schnatter ſogar einem zweiten Preisvogel geſtatten! Wenn auch die hierüber laut gewordenen Anſichten und die dahin gefaßten Beſchlüſſe in keiner Weiſe für Vereine und Verbände bindend ſind, ſo ſind ſie vielleicht doch ſo manchem Züchter, der bisher mit dieſer Fehltour zu kämpfen gehabt hat, willkommen, und man bedenke nur die Folgen, welche ſchon aus einem Dulden dieſer Mißſtrofe, die von den Vögeln gern aufgenommen wird und die außerdem forterbt, entſtehen können und werden. — Trotzdem ſchon mehrere Jahrzehnte hindurch das Glanzſtück des Edelrollers, die Hohlrolle, gepflegt wird; ſo treffen wir auf den Ausſtellungen doch alljährlich noch Vögel an, die bezüglich des Vortrages dieſer Strofe noch recht viel zu wünſchen übrig laſſen, und die beſſer nicht zum Wettkampf gebracht wären. Ebenſo wie eine mangelhafte Hohlrolle als paſſend für Ausſtellungszwecke angeſehen wird, ebenſo werden mindeſtens ſolche Züchter, die ſehr für ihre Vögel eingenommen ſind, und deren gibt es eine ganze Menge, ſelbſt eine merkbar hervortretende Schnatter noch für bewerthungsfähig halten und mindeſtens einen 2. Preis für einen ſonſt guten Sänger erwarten, der dieſe Schnatter hören läßt. Derartige fehlerhafte Künſtler, meine ich, ſind nicht allein unfähig, als Heckvögel zu dienen, ich behaupte ſogar, ſie ſind für beſſere Vögel auf den Ausſtellungen gefahrbringend. Ich für meine Perſon würde keine Ausſtellung beſchicken, auf der die Schnatter geduldet wird. Dieſe in Vorſchlag gebrachte Neuerung fördert nach meinem Ermeſſen unſere Liebhaberei in keiner Weiſe, ſie bedeutet vielmehr ohne Frage einen Rückſchritt. Ich laſſe es gelten, wenn die Preisrichter möglichſt parteilos ihres Amtes walten und Züchtern, bezw. Ausſtellern auch Geſchmack und Feingefühl zutrauen und im Hinblick hierauf ſchöne Geſangsſtrofen auch dann bewerthen, wenn ſie nicht die von ihnen beliebten bilden, aber Fehler, noch dazu ſolche, die forterben, zu dulden und Vögel, die ſie haben, u. U. mit guten 2. Preiſen zu bewerthen, halte ich für unthunlich.

Mannigfaltigere Vögel aber müſſen wir heranbilden, das ſteht außer Zweifel, und ich möchte für dieſen Zweck ein anderes Mittel in Vorſchlag bringen, das den Züchtern gleichzeitig als Richtſchnur bei der Auswahl der nächſtjährigen Heckvögel dienen möge. Wir haben es fertig gebracht, aus dem wilden Vogel einen ſchönen — jetzt einſeitig gewordenen — Sänger herauszubilden, was uns einzig und allein dadurch gelungen iſt, daß wir immer wieder die vollkommenſten Künſtler zur Zucht verwendet haben. Nicht gute Vorſänger allein haben uns als Mittel zum Zweck gedient, — Züchter, die ſich ausſchließlich auf dieſe verließen, haben es ſicher noch nicht allzuweit gebracht, — ſondern wir ſind dadurch auf die erreichte Höhe gekommen, daß wir gute Heckvögel — Hähne wie Weibchen — eingeworfen haben, wir haben uns alſo auf die Vererbung verlaſſen, und das war klug! (Fortſetzung folgt.)

Wie ich Ornithologe wurde.

Von Fritz Braun.

Es mag ſeltſam erſcheinen, wenn ein kaum Sechsundzwanzigjähriger Erinnerungen aus der kurzen Zeitſpanne auftiſcht, da er ſelber das Licht der Sonne geſehen. Aber ſo berechtigt dieſes Befremden im allgemeinen ſein mag, hier wie überall bringt die Regel auch ihre Ausnahmen mit ſich.

Dieſen führt ſein Lebensberuf, jenen ſpäter erwachende Neigung auf ornithologiſche Bahnen; ich hingegen bin — cum grano salis ſei es verſtanden — gewiſſermaßen ſchon als Ornithologe geboren.

Schon mein Vater, der in meinem fünften Lebensjahr verſtarb, zeigte eine große Vorliebe für die gefiederten Sänger des Waldes, und ſo kam es, daß ſchon an meiner Wiege die Vögel ihre Lieder ſangen. Als dann ſpäter das Kind mit ſuchenden Sinnen ſeine Umgebung betrachtete und nach dieſem und jenem fragte, waren grade die erſten Dinge, die ſeinen Wiſſenstrieb erregten, über die man ihm Auskunft und Belehrung ertheilte, jene freundlichen Stubengenoſſen. Zu ihrem lebensvollen Treiben fühlte ſich das keimende Menſchenleben vor anderen hingezogen. So regte ſich mit dem jungen Menſchenverſtand auch der — sit venia verbo — Vogelverſtand, und gar aufmerkſam lauſchte der Knabe, wenn die Verwandten ihm von den Grünſpechten erzählten, die der Vater vordem beſaß oder vom Bienenwolf, deſſen abenteuerlicher Name an manch kindiſchem Phantaſiegeſpinſt ſchuld wurde. Noch immer weiß ich genau, daß man mir auch von einem anderen ſeltſamen Vogel erzählte, deſſen Name man jedoch leider vergeſſen hatte, der ſich deshalb auch trotz alles Grübelns nicht mehr recht feſtſtellen ließ. Wol nur ſelten ſind einem toten Vogel ſo viel ſinnende Gedanken gefolgt wie jenem geheimnißvollen Unbekannten, an den die Gedanken des Knaben wunderbar gebannt waren.

Der Ort, an dem ich aufwuchs und meinen kindiſchen Spielen nachging, war vor allen ein zum Blumengärtchen verwandeltes, plattes Hausdach, der Balkon, wie er von uns dazumal genannt wurde. Hier achtete der Knabe auf das Wachsthum der Bohnen und Winden und freute ſich baß, wenn die Knoſpen des Flieders zu großtraubigen Blüthen wurden. Hier hingen zwiſchen buntblüthigen Winden und purpurnen Weinblättern fröhliche Sänger in ihren hölzernen Behältern. Und alles das wußte die kindliche Phantaſie prächtig zu beleben, das kleine Dach, welches kaum 15 Schritte lang war und kaum ihrer fünf in die Breite maß, wurde für mich eine bunte und glückliche Welt, in die ſpäter noch manch ſehnender Traum ſich flüchtete.

Noch jetzt entſinne ich mich ganz genau, wie ich einſt in dem geräumigen Blumenkaſten eine ſchön geſchmückte Zigarrenkiſte begrub, die einen toten Zeiſig barg, und wie ich dann große, rothe Fuchſiablüthen auf ſein gebrechliches Grab ſtreute: tompi passati!

Rings um den kleinen, hängenden Garten reckten alte Danziger Wohnhäuſer ihre ſchlanken Giebel in die blaue Himmelsluft, als wollten ſie den Gedanken des Kindes den Weg in die Weite verwehren und ſie zuſammenhalten in dem kleinen, grünen Reich, das ſeine Sinne und ſeine Phantaſie beherrſchte.

Was Wunder alſo, wenn meine Aufmerkſamkeit ſich ganz von ſelbſt den luſtigen Sängern zuwandte, wenn ich ſie früh kennen, über ein kleines verpflegen und bald auch ſie mir ſelber verſchaffen lernte.

Meine entfernteren Verwandten waren faſt ausnahmslos antiornithologiſch veranlagt und ſchauten mit Entſetzen und mit Grauen auf meine bunten Schützlinge. Nur ein Oheim war ſelber Vogelwirth. Er züchtete jedoch nur Kanarienvögel und theilte die ganze Ornis in Kanarien und bunte Vögel, welch' letztere ihm furchtbar gleichgültig waren. Da ich ganz entgegengeſetzte Anſichten vertrat, bildete ich von Anfang an eine Art Komplement zu dem Kanarienonkel.

Von der bunten Schar derer von dazumal iſt mir vor allem ein Zeiſig im Gedächtniß geblieben. Man fütterte ihn tagaus, tagein, jahraus, jahrein mit bloßem Hanf; vor allen anderen wurde er zahm und faſt ein Glied der Familie.

Daß ich dann ſpäter, von meinem zehnten Lebensjahr etwa, mit glühendem Eifer danach trachtete, meine Vögel zu vermehren, hat wie alles in der Welt eine Urſache. Dieſelbe lag nahe genug, es war eine Ausſtellung des Danziger Ornithologiſchen Vereins. Eigenthümlich dabei iſt nur der Umſtand, daß ſie dieſe Wirkung hatte, weil ich es unterließ, ſie zu beſuchen.

Als ich zwiefach überlegte, wie der alte Homer ſagt, ob ich in die Ausſtellung gehen oder mir für das Eintrittsgeld einen Zeiſig erſtehen ſollte, erſchien mir dies viel rathſamer und dem Zeislein folgte die bunte Schar ſeiner Verwandten. Unter ihnen war auch ein ſehr dicker Buchfink, der trotz allem Fett in der überfüllten Voliere fleißig ſang was ſonſt nicht grade Finkenart — und ein Hänfling, der mir ein Kind der Qual werden ſollte. Es war nämlich ein Berghänfling, und da ich in meinen Büchern nur den Bluthänfling beſchrieben fand, hielt ich den unſchuldigen Gelbſchnabel für ein recht geheimnißvolles Weſen. Der ſelige Herr Engel in ſeiner Zigarrenbude am Hohen Thor, von dem ich den Hänfling erſtanden, belehrte mich dann ſpäter, daß es der Vetter des „beregten“ ſei und fügte gleichſam entſchuldigend hinzu, das ſei die beſſere Sorte. Nun, ein guter Vogel war es, ein beſſerer ſchwerlich!

Wenn ich heute jene Periode vom hiſtoriſchen Standpunkt aus überſchaue, ſo möchte ich ſie die Zeit der Finkenherrſchaft nennen, denn damals waren Grünlinge, Zeiſige und Stieglitze, Hänflinge und Leinfinken, Buch- und Bergfinken meine bevorzugten Pfleglinge, zu denen ſich nur hin und wieder ein Goldammer oder ein Brommeis — wie könnte man die Kirſchkernbeißer beſſer nennen — als flüchtiger Gaſt hinzugeſellte. Erſt ſpäter lernte ich den Girlitz, dieſen Neuling unſerer weſtpreußiſchen Ornis kennen, um ihn dann wegen ſeiner Anmuth vor vielen anderen Finken hochzuſchätzen.

Die genannten Arten ſcheinen zwar des Bemerkenswerthen nicht grade viel zu bieten, aber auch hier trügt der Schein. Welches Geſchöpf auf der Gotteswelt kennen wir denn wirklich? Hier wie überall gilt der treffliche Ausſpruch des großen Laplace, daß unſer Wiſſen nur gering, unſere Unwiſſenheit unendlich iſt. So blicke ich denn heute nicht ohne Dank auf jene Tage zurück. Wenn ich in Freundeskreiſen darauf dringe, Buchfinken aus der Voliere zu entfernen, um ſie nicht dem Hanfelend preiszugeben, wenn ich manchen Rothhänfling und Zeiſig in den Einzelkäfig hinübergerettet habe, ſo that ich es auf Grund von Erfahrungen jener Tage, da ich ſelbſt noch ein anſpruchsloſer Neuling war. Als ornithologiſches Wunderthier beſaß ich damals einen Zeiſig, der ſtümpernd und radebrechend ſich bemühte, den Schlag des Buchfinken nachzuahmen. Leider blieb er in dieſer hohen Kunſt zeitlebens ein Anfänger.

So genau, als wäre es geſtern geweſen, vermag ich mich noch auf jenen hellen Sommerabend zu beſinnen, da ich die erſte Meiſe nach Hauſe brachte. Es war ein wunderhübſches Blaumeischen und turnte gleich keck und flink in den Tannenzweigen umher, die ich für den Ankömmling in den Flugkäfig ſteckte. Dem kleinen Kletterkünſtler folgten viele, viele ſeiner Sippe, Blau-, Sumpf- und Kohlmeiſen. Ich habe viel Freude an ihnen erlebt, aber auch viel Trübes, wenn die ſchmucken Thierchen trotz aller Mühe im zweiten oder dritten Jahre abſtumpften oder verkamen. Noch immer halte ich die Meiſen nicht für ausdauernde Vögel, wenn es mir inzwiſchen auch mit mancher beſſer ergangen iſt. Am meiſten von allen Meiſen wurden mir bald die zierlichſten Sumpfmeiſen befreundet. Faſt immer flog ein ſolches Schwarzkäppchen in meinem Zimmer umher und ergötzte mich und meine Gäſte durch ſein harlekinartiges Weſen. Leider hatten die zierlichen Geſchöpfe — und zwar oftmals die beſten und ausdauerndſten Exemplare — die leidige Unart, ſich faſt ganz kahl zu rupfen, was gerade nicht zu ihrer Verſchönerung beitrug.

Daß ich heutzutage mich nicht mehr damit zufrieden gebe, meinen Vögeln möglichſt viel gutes und nahrhaftes Futter zu verabfolgen, daß ich ſie jetzt ziemlich knapp halte und mich von manchen Ornithologen auslachen laſſe, wenn ich ihnen von Bewegungszwang und dergleichen dozire, das — und vielleicht iſt es nicht gar zu wenig — haben die Meiſen zu Wege gebracht.

Wie kurzſichtig ſind doch die lieben Leutchen geweſen, die da glaubten, der Vogel lebe vom Korn und von dem Wurm allein, nicht in und mit und durch die Bewegungen, die ihn das Korn finden und den Wurm fangen laſſen! Wie wenig aber weiß ich auch heutzutage noch mit den anderen Gedanken in der Praxis anzufangen — aber iſt es doch immerhin ein Gedanke, und Gedanken ſind entwickelungsfähig.

Nach dieſer Finken- und Meiſenperiode kam eine Zeit kraſſer Revolution; es ſollten nur wenig Vögel mehr gehalten werden, dafür aber gute. So wurden denn alle Vögel fortgegeben mit Ausnahme eines überaus zahmen und zutraulichen Rothkehlchens, das zu verkaufen oder zu verſchenken ich nicht Verbrecher genug war. Dafür zog eine Amſel ein, die alles mögliche können ſollte, aber während mehrerer Wochen nicht den Mund aufthat und außerdem ſehr dumm zu ſein ſchien, viel dummer als alle anderen Amſeln, die ich ſpäter ſah. Das war nun freilich ein anderer Vogel, aber kein guter.

Deshalb wurde das alte Syſtem mit neuer Begeiſterung wieder aufgenommen. Zuerſt zogen einige Kreuzſchnäbel in den verwaiſten Flugkäfig ein. Zum Unglück war es gerade Hochſommer, und die Voliere ſtand in einem ſehr ſonnigen Zimmer. Da war es den Krünitzen wol ſicher zu heiß, denn einer nach dem andern purzelte von der Stange herab, um unter Krämpfen zu enden. Hätte ich den Grund ihres Elends ſchon damals gewußt, ſo wäre es wol möglich geweſen, den geſchäftigen Thierchen „das flüchtige Daſein zu friſten“. Erſt viel ſpäter ſollte ich erfahren, daß bei den Kreuzſchnäbeln wie bei den Meiſen die Temperatur ihres Aufenthaltorts einen ſehr wichtigen Faktor für das Wohlbefinden bildet. Damals aber wähnte ich, es läge an der Nahrung und ließ mir Tannen- und Erlen-, Diſtel- und Birkenſamen und andere wundergute Dinge kommen. Heute ſind all’ dieſe Sachen wieder abgeſchafft und nur der Tannenſamen hat ſich neben den landläufigen Sämereien in Ehren behauptet.

Alles im Leben iſt der Mode unterworfen, und ſo war es denn auch mit meiner Vogelwirthſchaft. Lautete früher die Parole Fink, ſo ſtanden nunmehr Pieper und Grasmücken am höchſten in Ehren. Weil ich auf den Geſang der Vögel nie viel Werth legte, ſondern ſtets alle ihre Lebensäußerungen im Auge behielt, verloren die Grasmücken allmählich wieder an Intereſſe für mich, während ich den zierlichen, liebenswürdigen Piepern, den hübſchen Baſen des ſchmucken Kloſterfräuleins Bachſtelze, bis zu meiner Studentenzeit treu blieb.

Ein zahmer Baumpieper war lange Zeit mein Stubengenoſſe. Er flog frei im Zimmer umher, ſtolzirte ſchwanzwiegend auf der Erde der Blumentöpfe umher, oder wartete ſehnſuchtsvoll neben einer außer Dienſt geſetzten Papierkragenſchachtel, bis ſie ſich öffnete und heißerſehnte Mehlwürmer ſpendete. Von allen Vögeln, die ich je beſaß, iſt außer einem Rothkehlchen, einem Star und einem Wendehals keiner ſo zahm geworden wie jener Baumpieper, den man ſonſt ſo ſelten als Stubenvogel findet.

In jenen Tagen beſaß ich auch einen ſprechenden Star. Ich hatte ihn in ziemlich elender Verfaſſung gekauft. Die Füße des jungen Graurocks waren ſchmutzig und ſo entzündet, daß ich mehrere Zehen amputiren mußte, weshalb der Star zeitlebens nur ſchlecht auf einer Stange ſitzen konnte. Trotzdem erholte er ſich bald und lernte, ohne daß ſich jemand beſonders darum bemühte, das Wort Jakobchen mit beſonderer Betonung der letzten Silbe herausbringen. Daneben konnte er wol ein Dutzend Vogelgeſänge nachahmen und war ganz das, was ein Star wie ein Papagei oder Hund einmal ſein ſoll, eine Art von drolligem, komiſchem Menſchenthier. Leider vergiftete ſich der zahme Vogel ſpäter und fand einen qualvollen Tod; noch in ſeiner letzten Stunde rief er kläglich das alte „Jakobchen“.

Als dann die Gymnaſialzeit zu Ende ging, hatte ich ſchon den größten Theil unſerer einheimiſchen Singvögel im Käfig beherbergt. Auch fürderhin belebten ihre Rufe unſere Danziger Wohnung, während auf meiner Königsberger Bude eine Art Kommandite entſtand. Auch fürderhin bildeten Vogelleben und Menſchenſchickſal in meinem Daſein eine ſchier untrennbare Einheit. So war es ſelbſt am Sterbebett meiner Mutter, als die helle Septemberſonne auf den Dächern lag und im Nebenzimmer eine Weindroſſel ihren feierlich gehaltenen Geſang vortrug. So predigt die Natur ſich ſelber, es iſt eine mächtige Predigt von der Vergänglichkeit der Form, eine mächtige Predigt von der einen, großen, lebendigen Natur, die das empfängliche Menſchenherz gar gewaltig zu treffen verſteht.

Zu meinen früheren Lieblingen kam in Königsberg noch der Kleiber. Den erſten ſeiner Art erſtand ich bei Schulze in der Paſſage, einen ſchmucken, hurtigen Blaurock. Leider ſchien der Lebensmuthige ſchon nach wenigen Tagen dem Tod verfallen, er war ſo krank, daß ich das Fenſter öffnete und ihn zum Flug in den Garten nöthigen wollte; vielleicht, ſo dachte ich, würde er ſich im Freien wieder beſſern. Aber dem kranken, mühſeligen Geſchöpf mochte der friſche Wind nicht behagen, er ſtrebte von dem Fenſterbrett immer wieder in's Zimmer zurück. Deshalb ließ ich ihn denn auch in ſeinem Käfig, verſorgte ihn mit Futter und ging in's Kolleg, ſicher, bei meiner Rückkehr eine Leiche vorzufinden. Aber wider Erwarten fand ich den alten, muntern Kleiber, wahrſcheinlich wird ein Krampf über ihn gekommen ſein, der plötzlich wieder verſchwand. Später folgte er mir nach Danzig und war noch lange Zeit eine Zierde meiner vielköpfigen Sammlung.

Jetzt aber, da ich dieſes ſchreibe, iſt ein Wendehals mein erklärter Günſtling. Von ſeinen Tugenden und Schwächen berichte ich, wenn es dem Leſer erwünſcht iſt, vielleicht ein ander Mal.*) Habe ich auch nicht viel Neues gebracht und viel Senſationelles — wie man allerhand Zeug nennt — verkündet, ſo konnte ich doch von einem Leben melden, dem die gefiederten Sänger von Kindheit auf eng vertraut waren, das ihnen manchen Sonnenblick heller, echter Poeſie verdankt.

---

*) Wir bitten darum. D. L.

Briefliche Mittheilungen.

... Beifolgend erlaube ich mir, Ihnen einen kleinen, letzthin in der „Kölniſchen Volkszeitung“ erſchienenen Aufſatz „Das Vordringen der Schwarzdroſſeln“, welcher den katholiſchen Pfarrer Diehl in Lorch zum Verfaſſer hat, zu überſenden.**) Ich meinestheils bin in der Lage, über das Vordringen eines anderen Vogels in hieſiger Gegend eine ergänzende Mittheilung zu liefern. Sie brachten vor einiger Zeit in der „Gefiederten Welt“ einen Bericht von mir zum Abdruck, wonach die gelbe Bachſtelze, (Motacilla flava s. sulphurea) hier in Ahrweiler zuerſt etwa im Jahr 1873 als Standvogel beobachtet worden ſei. Eine kleine halbe Stunde oberhalb Ahrweiler, bei Walchorzheim, tritt die Ahr aus dem Gebirge heraus und beginnt deren Unterlauf. Das Thal erweitert und die Gehänge verflachen ſich auf dem linken nördlichen Ufer, um in eine Hügellandſchaft überzugehen, in der ausgedehnte Waldungen mit verwachſenen, von Rinnſalen durchzogenen Schluchten nicht mehr vorkommen. Die Bäche haben zwar noch tief eingeriſſene, buſchbewachſene Betten, ziemliches Gefälle und ſind waſſerreich, können aber nicht mehr als eigentliche Gebirgsbäche angeſehen werden. In dieſe Gegend, die ſchon weſentliche Flachlandsmerkmale aufweiſt, hat nun in den letzten Jahren die Gebirgsſtelze ihren Verbreitungsbezirk vorgeſchoben. Das erhellt aus der mir kürzlich gewordenen Mittheilung eines jungen Mannes von etwa 24 Jahren aus Oeverich, einem Dorfe, das eine halbe Stunde nördlich landeinwärts von dem bekannten Berge „die Landskron“, unweit Remagen an einem Nebenbache der Ahr liegt. Nach Ausſage meines Gewährsmannes hat er in ſeiner früheren Knabenzeit die gelbe Stelze als einheimiſchen Vogel ſeines Geburtsorts nicht gekannt. Erſt ſeit etwa 1890 habe er ihn dort ſtändig und häufig wahrgenommen. Er hob beſonders die geringe Scheu vor dem Menſchen, die dieſer Vogel an den Tag lege, und ſein dreiſtes Auftreten unmittelbar an den menſchlichen Behauſungen hervor. Oeverich liegt von hier etwa 1½ Stunden entfernt in öſtlicher bis nordöſtlicher Richtung nach dem Rheine zu. Ein Pärchen gelber Stelzen hat dieſes Jahr hier ſein Neſt an einem Mühlwehr gehabt; das von der Landſtraße nur durch eine vielbetretene offene Bleiche getrennt iſt. Ich habe die Thierchen beobachtet und ebenfalls gefunden, daß ſie ſich aus der Nähe des Menſchen nichts machten.

Als erfreulich kann ich von hier und dem benachbarten, eine Stunde ahraufwärts belegenen Dernau berichten, daß die Zahl der Schwalben wieder weiterhin eine gewiſſe Vermehrung erfahren hat. Die frühere Zahl iſt allerdings bei weitem noch nicht wieder erreicht, doch ſcheint die diesjährige Brut ziemlich zahlreich ausgefallen zu ſein. An einer hieſigen Mühle waren heuer acht Schwalbenneſter, voriges Jahr nur eins. Aehnliches wird von anderen Stellen berichtet.

Der penſionirte Förſter Reil in Sieghaus bei Altenahr hat Birkwild zum erſten Male an der Ahr im Jahr 1895 beobachtet. Es iſt ſeitdem in den Jagden an der mittleren Ahr bei Altenahr und in dem benachbarten Striche ſtändig vertreten und hat ſich infolge rationeller Schonung befriedigend vermehrt. Reil hatte in jüngeren Jahren unter ſich ein Revier im Kreiſe St. Goar, in dem ebenfalls vor etwa 30 bis 40 Jahren die erſten Birkhühner erſchienen. R. Laufs, Referendar a. D.

Anfragen und Auskunft.

Herrn O. Beyer: 1. In Ihrem kleinen Käfig können Sie zwei Pärchen Mövchen wol halten und züchten, denn dieſe Vögel ſind ja, wie Sie wiſſen, überaus friedlich und zuweilen niſten ſogar zwei oder noch mehrere Weibchen zuſammen in einem Neſt. 2. Bei den Mövchen kann man hinſichtlich des Niſtens nicht von „dieſem Jahr“ ſprechen, denn für ſie iſt die

---

**) Beſten Dank! Der intereſſante Auszug gelangt in der nächſten Nummer zum Abdruck. D. L.

Jahreszeit ganz gleichgiltig. Sie niſten, wenn es warm genug im Zimmer iſt, zu jeder Zeit. 3. An dem kleinen Käfig müſſen Sie die Harzer Bauerchen mit Neſt natürlich von außen anhängen, und da iſt es denn allerdings am beſten, wenn das Harzer Bauerchen, in dem das Korbneſt ſteht, von außen mit Papier überklebt wird.

Frau Zinger: Allen Stubenvögeln überhaupt und den Kanarienvögeln insbeſondre müſſen von Zeit zu Zeit die Krallen an den Füßen verſchnitten werden. Man hält dabei mit dem Daumen und Zeigefinger der linken Hand den Fuß des Vogels feſt, während man den Vogel ſelbſt ſo faßt, daß er in der hohlen Hand ruht. Sodann ſchneidet man vermittelſt einer kleinen ſcharfen Schere einen Nagel nach dem andern ſo weit ab, daß keinenfalls das Lebendige verletzt wird.

Herrn E. Helmers: Vor allen ſtellen Sie mit Sicherheit feſt, ob der Edelfink auch wirklich Milben oder Vogelläuſe hat. Sodann brühen Sie den Käfig mit heißem Waſſer gründlich aus, und nach dem Abtrocknen verſtreichen Sie alle Ritzen und Spalten mit Glaſerkitt. Wo ſolche dennoch bleiben, pinſeln Sie mit verdünntem Glyzerin und blaſen beſtes dalmatiniſches Inſektenpulver darüber. Den Vogel ſelbſt bepinſeln Sie an allen Stellen, wohin er mit dem Schnabel nicht gelangen kann, alſo an Hinterkopf, Nacken und Schultern, gleichfalls mit dem Glyzerin und bepuſten ihn darüber mit dem Inſektenpulver. Dann geben Sie ihm in der Mittagſtunde Badewaſſer und wiederholen dieſe Behandlung einen Tag um den andern, im ganzen etwa viermal. So werden Sie den Vogel von Ungeziefer gründlich befreien.

Herrn Dr. med. Böhm: Ihren Wellenſittichen wird eine Temperatur, die über 20° R. ſteigt, vielleicht nicht grade nachtheilig ſein, ganz gewiß aber Ihrer Wellenſittichzucht, da in der Niſtzeit eine 15 bis 16° R. überſteigende Stubenwärme durchaus ſchädlich iſt.

Herrn Hugo Schroeder: Die Nachtſchwalbe (Caprimulgus europaeus, *L.*) gehört zu den allernützlichſten einheimiſchen Vögeln. Sie iſt in faſt ganz Europa und ebenſo in Weſtaſien und Sibirien heimiſch; bei uns in Deutſchland kommt ſie ſtellenweiſe noch ziemlich häufig vor und vornehmlich innerhalb großer Waldungen, in denen freie Stellen, Wieſen- und Haidekrautflächen wechſeln, ſodann aber auch Vorhölzer und ſelbſt wieder große Feldhölzer mit alten Bäumen beherbergen ſie. Wenn wir uns hier, beſonders auf den nach Süden hin ſich erſtreckenden, alſo gegen die rauhen Winde geſchützten Blößen, umſehen, ſo können wir den wunderlichen Vogel vom Beginn des Monats Mai an unſchwer belauſchen. Zu den Nacht- oder richtiger Dämmerungs-Vögeln gehörend, ruht er am Tage auf der Erde oder einem ſchräg ſtehenden Baumſtumpf, einem niedrigen dicken Aſt, auf letzterm der Länge nach hingekauert, ſodaß man ihn faſt mit den Händen ergreifen kann. Da ſeine Gefiederfärbung von der Baumrinde oder der Bedeckung des Fußbodens ſich nur wenig abhebt, ſo iſt er ſchwierig zu bemerken. Mit der heranbrechenden Dämmerung wird die Nachtſchwalbe munter, fliegt hurtig dahinſchießend, dann ſchwebend und gaukelnd, geräuſchlos hin und her, ihrer Nahrung nachgehend, die in den ſchädlichſten Kerbthieren beſteht. Anfang Juni hört man an den erwähnten Orten abends vielfach die Locktöne, leiſe dak, dak und lauteres häit, mit denen die Gatten des Pärchens einander rufen, und dann läßt das Männchen auch ſein ſonderbares, weithin ſchallendes ſchnurrendes err oder örr, wechſelnd im höhern oder tiefern Ton, ſeinen Liebesſang hören. Ein Neſt baut die Nachtſchwalbe nicht. Das Gelege beſteht aus zwei düſterweißen, braun- oder bläulichgrau gemarmorten Eiern, die auf die bloße Erde an einer verſteckten Stelle, zwiſchen Haidekraut und Geſtrüpp oder auch im Mos auf einen Baumſtumpf gelegt und von beiden Alten in 16 Tagen erbrütet werden. Nach Beendigung der Brut ſchweifen Alte und Junge umher, ohne ſich viel um einander zu bekümmern, doch ſchlagen ſie ſich auch wol mit anderen zu einem, freilich niemals vielköpfigen Schwarm zuſammen und wandern ſo, ſchon gegen den Monat September hin, zur Ueberwinterung bis tief nach Afrika hinein. Um der großen Nützlichkeit willen ſollte man dieſen Vogel niemals fangen oder töten. Für die Liebhaberei iſt die Nachtſchwalbe kaum zugänglich.

Herrn Fr. Richert: 1. Ihr Kanarienvogel hat in der That infolge eines Schlagfluſſes den Tod gefunden. Die Urſachen deſſelben ſind mannigfacher Art. Große Erregung, Schreck, Angſt u. a., auch ſtarke Hitze, zu viel Hanfſamen bei heißem Wetter und Fettſucht können die Schuld tragen. 2. Die Fütterung iſt richtig, in ihr iſt in dieſem Fall nicht die Todesurſache zu ſuchen, denn ſie enthält nichts, was den Vogel zu fett oder zu erregbar gemacht hätte. Die Eizugabe könnten Sie allenfalls verringern. 3. Bieten Sie den genannten Prachtfinken, außer weißer und Kolbenhirſe und Kanarienſamen, die verſchiedenen Hirſenarten in mannigfaltigem Wechſel, und ich habe es immer als namentlich wolthuend und zum Niſten anregend befunden, wenn man ſoweit als ausführbar jeder Art dann die aus ihrer Heimath herſtammende Hirſe zu gewähren vermag. Außerdem geben Sie noch etwas geſchälten Hafer und ungeſchälten Reis. Zuweilen reichen Sie den Vögeln einige Mehlwürmer, in drei Stücke geſchnitten, und in der wärmeren Jahreszeit Grünkraut, ſowie als vorzügliche Leckerei und wichtiges Nahrungsmittel zugleich die Hirſen in friſchen Aehren mit halbreifen Körnern. Als Zugabe und ſpäter als Aufzuchtfutter für alle Prachtfinken empfehle ich Ihnen ein Miſchfutter aus kleingehacktem, hartgekochtem Hühnerei (weiß und gelb), mit aufgebrühten Ameiſenpuppen, zu gleichen Theilen, das Ganze mit feingeſtoßenem Potsdamer Zwieback zu einem krümeligen Gemenge bereitet. Zur beginnenden Niſtzeit reichen Sie das Samenfutter recht mannigfaltig, außer den genannten auch allerlei andere kleine Sämereien von Mohn, Wegerich, Melde u. a. unſchädlichen Kräutern, vorzugsweiſe aber von Gräſern. Daß Sie die mehlhaltigen Sämereien auch im eingequellten Zuſtande geboten haben, war gut.

Herrn Andreas Wittner: An der Erkrankung Ihrer Kanarien trägt nach meiner Ueberzeugung das in Milch eingeweichte Weißbrot die Schuld. Wahrſcheinlich war die Milch ſauer oder ſonſt irgendwie verdorben. Geben Sie lieber nur in Waſſer geweichtes und dann gut ausgedrücktes Weißbrot oder auch Bisquit.

Briefwechſel

Herrn Groſſe, Herrn Anzinger, Herrn Hennemann, Herrn Aelbert, Herrn Dankler: Beiträge mit Dank erhalten.

◆

Zu unſerm Bilde.

Ein reizender, leicht zahm werdender Vogel iſt der **Katharina-Sittich** (Bolborhynchus lineolatus, *Cass.*), auch ſchwarzgefleckter Dickſchnabelſittich genannt, den unſer heutiges Bild zeigt. Die Zeichnung des kleinen, kaum ſtargroßen Sittichs iſt ſo abſonderlich, daß eine Verwechſelung nicht leicht möglich iſt. Er iſt an der ganzen Oberſeite dunkelgrasgrün, jede Feder mit ſchwärzlichem Endſaum; Hinterrücken olivengrünlich und hier ebenſo wie am Bürzel und an den oberen Schwanzdecken jede Feder mit breiten, rundlichen, ſchwarzen Endflecken; erſte Schwingen dunkelgrün, Innenfahne ſchwarz, die übrigen Schwingen grün, alle unterſeits düſtergrün; mittelſte Flügeldecken an der Außenfahne ſchwarz gerandet, kleinſte Flügeldecken am Unterarm ſchwarz (einen großen länglichen Fleck bildend), Flügelrand hell gelbgrün; Schwanz dunkelgrün, die beiden mittelſten Federn am Ende ſchwarz, alle unterſeits düſtergrün; Kopfſeiten und ganze Unterſeite lebhaft grasgrün; an den Schenkelſeiten jede Feder mit breitem ſchwarzem Endfleck; untere Schwanzdecken grasgrün, mit kleinen ſchwarzen Flecken; Schnabel weiß; Auge braun, ſehr ſchmaler nackter Augenkreis weiß; Füße fleiſchfarben, Krallen ſchwarz. Männchen und Weibchen unterſcheiden ſich im Gefieder nicht.

Der Katharinaſittich iſt erſt in neuerer Zeit lebend eingeführt worden und noch jetzt im Handel nicht häufig. Selbſt in ſeiner Heimat, Mexiko und Mittelamerika, kommt er ſelten vor. Dennoch war er mehrmals auf Ausſtellungen des Vereins „Ornis“ in Berlin vertreten. In der Gefangenſchaft zeigt er ſich ſehr leicht zähmbar und ſogar ſprachbegabt. Zwei Katharinaſittiche, die ich 1882 in meiner Vogelſtube hielt, waren ungemein ſanft, ließen nur ein leiſes Geplauder hören und unterſchieden ſich angenehm von anderen Sitticharten dadurch, daß ſie niemals ſchrieen. D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.



Käfige

jeder Art
(Preisliſte gratis)
fabrizirt u. empfiehlt
preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1718] **Oſchatz i. S.**

Geflügel-Fußringe

für Hühner 3, 5 u. 6 ₰, für Tauben und Kanarien 2, 3 u. 4 ₰. [1719]
H. D. Becker, Iſerlohn.

Geſangskäſten, [1720]

Geſangsſpinde, Harzer Vogelbauer, liefert (Prsl. fr.) **A. Bothe, Weddersleben, Harz.**

Futtermittel.

Eierbrot

(garantirt rein) per ℔ 80 ₰, ½ ℔ zur Probe 50 ₰ in Briefmarken. Bei Mehrabnahme noch viel billiger. [1721]
Fr. Mann, Kaiserslautern.

Mehlwürmer,

1100 Stck. 1,40 ℳ, 5500 Stck. 6 ℳ, franko und freie Verpackung gegen Einſendung des Betrags. [1722]
Paul Bienzeisler, Tillowitz, O.-S.

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [1723]
Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411, I.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Staats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt [1724] ſandfrei.
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Pfälziſches
Univerſalmiſchfutter,

das Beſte für **alle** inſektenfreſſende Vogelarten. Qualität I 2 ℳ, Qual. II 1,60 ℳ per Kilo franko geg. Nachn. od. vorheriger Kaſſe. Beimiſchungen, wie geriebene Gelbrüben, Salvia ꝛc. ſind überflüſſig, weil das Futter zum Gebrauch fertig iſt. [1725]
Fr. Mann, Kaiserslautern.

Die Samen-Großhandlung

von
Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [1726]
hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten u. billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

AVOL

Nachtigallen- u Drosselfutter
(Gesetzl. gesch.)
mit und ohne Carotten
per Pfd. 80 Pfg. 9 Pfd. Mk. 7.20 fco.

Dieſes Futter, — in Folge langjähriger Liebhaberei ſachkundig nur aus beſten Zuthaten hergeſtellt u. nach eingehender probeweiſer Fütterung durch Herrn
Karl Kullmann, Frankfurt a. M.
auf der großen allgem. Geflügel- u. Vogel-Ausſtellung hier mit dem
I. Preis prämiirt
iſt das Beſte, was es für Inſektenfreſſer gibt.

Auf Verlangen Gratisproben an Liebhaber. Fſt. deutſche handbeleſene Ameiſeneier 1899 p. Lit. 70 Pfg., von 10 Liter an franco
F. Grünewald, Offenbach a. M.
Markt 5.
[1727]

Rheiniſches [1728]
Univerſalfutter

für feinere inſektenfreſſende Vögel, per Kilo 2 ℳ, für Amſeln, Droſſelarten 1,60 ℳ. Proſpekt und Gebrauchsanweiſung gratis.
J. Nullmeyer.
Vogel- u. Futterhandlung, **Mannheim.**

Mehlwürmer,

vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 5 ℳ, Kilo 8½ ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,50 ℳ. [1729]
Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1730] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
Muſter und Proſpekte koſtenlos.

99er Ameiſeneier,

à Ltr. 80 ₰, 10 Ltr. 7,50 ℳ, **Miſchfutter,** 10 ℔ 2—2,50 ℳ, **Vögel** ꝛc. empfiehlt alle Arten bei ſtreng reeller Bedien. Preisl. auf Wunſch. **J. Götz,** Hofl.,
[1731] **Neuulm (Bayern).**

Mehlwürmer,

à Ltr. 4 ℳ inkl. Verp. Bei Einſendung von 1,50 ℳ = 140 gr., alſo weit über 1000 Stück, frk. inkl. Verp.
[1732] **P. Bartsch, Breslau, Flurſtr. 6.**

Alle Vogelfutter,

Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.
E. Schreiber, Leipzig,
Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1733]

Echt ruſſiſche Frühjahrs-
David-Weiden-Sproſſer

mit Glocken-, Baß-, Moll-, Lach-, Knarr- und Waſſer-Touren, jede Geſangsſtrofe gut ſchnappend, geſanglich erprobt und im Käfig vermauſert, ſo lange der Vorrath reicht, à 20 und 25 ℳ, ferner gute **Frühjahrs-Au-Sproſſer** ohne David-Ruf, à 15 ℳ, ſowie

Orpheus-Grasmücken,

ſchöne, ſichere Männchen, à 9 ℳ, dito minder ſchöne à 5—7 ℳ, dito ohne Gewähr fürs Geſchlecht à 3—4 ℳ und **Frühjahrs-**

Gebirgsſchwarzplättchen,

im Käfig vermauſert, à 6—8 ℳ, empfiehlt die als reell bewährte Firma [1734]

Mathias Rausch,

Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der beſten Singvögel,
Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Anzeigen.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer, **Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,** alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1735]

Spottbillig:

Rothe Kardinäle, Mch., defekt im Gefieder, mit Fehlern, à Stck. 4 ℳ.

Zebrafinken mit Fehlern, à Par 1,50 ℳ, à Stück 75 ₰.

Paradieswittwen, gutgefiedert, à P. 2, 3 P. 5, 5 P. 7,50 ℳ.

Indigos, Mch., mauſernd, à Stück 2,50 ℳ

Nonpareils, Mch., mauſernd, à St. 3 ℳ. [1736]

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Ein Kranaffe,

Weibchen, ſehr zahm und gut im Pelz, 25 ℳ, ein ſelten ſchöner **Zwerg-Affenpintſcher,** Hündin, 1¾ Jahr alt, Farbe gelbgrau, echte Raſſe, I. Preis-Hündchen, 40 ℳ.

Ferner offerire: 1 großen **Gelbhauben-Kakadu, taubenzahm u. ſprechend,** 30 ℳ, **Amazonen-Papageien,** prachtv., ſchöne, geſunde, fingerzahme, ſprechende Vögel, à 36, 45 u. 60 ℳ, **Sonnenvögel,** Mnch. à 5, à P. 7,50 ℳ, **Goldkanarienvögel** à 4 ℳ, **Zebrafinken,** Wbch. 2,50 ℳ, **Diamantvögel,** Zchtp. 14 ℳ, **Gürtelgrasfinken,** Zuchtp. 10 ℳ, **Wellenſittiche,** P. 6 ℳ, **echte Wolga-Sproſſer** vom Frühjahr, 15 ℳ, ein **dito,** Nachtvogel, zweijährig, 36 ℳ, **Chineſiſche Zwergwachteln,** P. 7 ℳ, **Zippdroſſeln,** garant. pfeifend, à 8 ℳ, **Amſeln** à 4 ℳ, **gute Hänflinge** à 2 ℳ, **graue Hänflinge** à 1 ℳ, **Stiglitze,** flottſingende Mnch. ~~zum Baſtard ziehen~~ à 2 ℳ, 1 zahme **Dohle,** ~~frei fliegend,~~ 3 ℳ, **Kanarienvögel,** flotte Sänger, von feinſten Stämmen garantirt, 6 Stck. 22 ℳ, à Dtzd. 40 ℳ, dito Weibchen à Dtzd. 8 ℳ unter Garantie. [1737]

R. Schulze,
Zoolog. Handlung, **Altenburg (S.-A.).**

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft. Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [1738]

[1739]

Geſucht:

Granataſtrilde, Buntaſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen u. ſeltene ausländ. Finken.
J. Beedzler, 20 Korton Felgate, London (Engl.)

Junge Wellenſittiche,

Stück 2,50 ℳ! **L. Brinkmann,**
[1740] **Calefeld** in Hannover.

Citronenzeiſig

(Zitril), Dutz. 24 ℳ, Stück 2,50 ℳ, Par 4 ℳ, **rothe Dompfaffen,** Dutz. 24 ℳ, St. 2,50 ℳ, Par 3,25 ℳ u. ſ. w., alle Vögel ſichtbar verpackt. Dieſe zwei Sorten liefere bis Ende November. Anfr. Marke beifügen. [1741]

Beck's Vogelhandlung, Stuttgart.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1742]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Gelbe Erlenzeiſige,

prachtv., futterf. Vögel, 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Junge Dompfaffen zum Anlernen à Stck. 2 ℳ, 4 Stck. 6 ℳ, Kreuzſchnäbel 6 Stck. 4 ℳ, Schwarzmeiſen 6 Stck. 4 ℳ, Dtzd. 6 ℳ, Blau- u. Finkenmeiſen 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Garant. leb. Ank. In Gegenrechnung nehme Sproſſer und Schwarzblatten. **A. Jaumann,**
[1743] **Großbreitenbach,** Thür.

Gelegenheitskauf.

Für jedes Angebot verkaufe od. vertauſche auf Vögel od. Nützliches: **Ein Foxterrier,** ſchön gleich gezeichnet, 4 Monat alt, ff. Abſtammung, **einen ſchwarzen Spitz,** ſehr ſcharf, 6 ℳ, gebe ab weg. Unannehmlichkeiten des Hauswirths. [1744]

Emil Feiste,
Kappel b. Chemnitz, Wilhelmſtr. 25.

Kanarienhähne

(St. Trute) à 8 ℳ, Weibchen 75 ₰, Rothhänflinge à 1,20 ℳ, Dutzend 10 ℳ, Stiglitze à 1,50 ℳ, Dutzend 12 ℳ. Garantie für Hähne und lebende Ankunft. Nachnahme. [1745]

H. Pfromm, Vogelhandlung,
Homberg, Bez. Caſſel.

Gelbhaubenkakadus,

große, richtige Pare, tadellos, verkaufe mit Käfig franko für 25 ℳ, ev. tauſche andere fremdländiſche Vögel. [1746]

M. Zierer, München, Parkſtr. 31, I.

Verkaufe:

Ein Schwarzdroſſelmännchen, 6 ℳ, 1 Papſtfink 6 ℳ, 1 chin. Zwergwachtelweibchen 5 ℳ, 1 Zuchtpar Wellenſittiche 9 ℳ. Verſ. p. Nachn. Verp. 40 ₰. [1747]

Else Voerster,
Sternfelde b. Angermünde.

Verkaufe

1 Uiſtiti-Aeffchen, 3½ Jahr im Beſitz, vollkommen zahm, urdrollig, 15 ℳ. [1748]

Rüdenburg, Weſtend, Charlottenburg.

Bücher-Anzeigen.

Bei uns erschien:

Der Dompfaff,

seine Naturgeschichte,
Pflege, Abrichtung und Zucht.

Von
F. Schlag.

4. Auflage. — Preis M. 1.—.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Aquarienliebhaber!

Im unterzeichneten Verlage erſcheint

Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde

herausgegeben von **Dr. E. Bade.**

(Monatlich zwei Nummern!)

Preis: halbjährlich Mk. 2.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in **Magdeburg.**

Demnächst erscheint in unserem Verlage und ist durch alle Buchhandlungen oder gegen frankirte Einsendung des Betrages direkt von der Verlagsbuchhandlung zu beziehen:

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes

von

Mathias Rausch, Wien.

Mit 3 Farbendrucktafeln und 4 Textabbildungen.

Geheftet 2,— Mk., gebunden 2,60 Mk.

Der Verfasser, welcher durch seine Aufsätze in der „Gefiederten Welt“ in ausserordentlich weiten Kreisen bekannt geworden, gibt in diesem Buche ausser einer verlässlichen Anleitung über Käfigung, Wartung und Pflege der einheimischen Weichfutterfresser auch eine ausführliche Darstellung ihres Gesanges, sodass dasselbe für jeden Liebhaber unserer gefiederten Sänger ein unentbehrlicher Rathgeber sein wird.

Die schon jetzt zahlreich eingelaufenen Vorausbestellungen gelangen sofort nach dem Erscheinen des Buches zur Erledigung.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (Max Kretschmann).
Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 39.

Die Ringdroſſel (Turdus torquatus, *L.*).
Ueber die beſte Ernährung der Papageien, bzl. aller weichlichen Exoten (Schluß).
Plauderei über Kanarienzuchten und Kanariengeſang (Fortſ.).
Briefliche Mittheilungen.
Mancherlei.
Anfragen und Auskunft.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Prima 99er Elbe-Weißwurm,

Kg. 3, 5 Kg. 13,50, 10 Kg. 25 ℳ, Lt. 85 ₰.

Tyroler Ameiseneier, hochfein.

weiß u. rein, handgeleſen. Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ, ungeleſene Kg. 3 ℳ. [1749]

Zeke (Musca),

99er, feinſte, fr. Ware, à Ko. 2,60 ℳ, 5 Ko. 12,50 ℳ. Univerſal-Nachtigalenfutter, 10 Jahre ſelbſt erprobt, Ko. 1,80, 5 Ko. 8,50 ℳ, ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- u. Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ mit Sack, reelles Gewicht u. Maß.
Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

In voller Pracht

u. wirklich tadelloſen, geſunden Exemplaren:

Paradiswittwen, in Prcht., Zchtp.	4,50 ℳ
Dominikanerwittw., i. Pr., „	5,00 „
Orange- oder Feuerweber, in Pracht, Zuchtpar	3,50 „
Napoleonsweber, i. Prcht., Zchtp.,	3,50 „
Schwarzk. Gouldamandinen, Zuchtp.	22 „
Rothköpfige Inſeparables, Zchtp.	9,00 „
Singſittich, Männchen, Stck.	15,00 „
Mozambikzeiſige, Mnch. 3, Zchtp.	5,00 „
Grauedelſänger, Mnch. 4, Zuchtp.	6 „
Grauk. Zwergpapageien, Zuchtp.	3,00 „

und ferner noch Vorrath der in Nr. 34 angezeigten Vogelarten.

Goldfiſche, pr. hochroth, abſolut geſunde Ware, 5—8 cm lang, 6 ℳ, 8—12 cm lang, 9 ℳ, 5—12 cm lang, 8 ℳ, per 100 Stk. mit Kanne. Bei Mehrabnahme billiger. Alle Sorten pr. Vogelfutter. Preisl. gratis.

Brühl's Vogelexporthaus,
[1750] **Kötzſchenbroda.**

Käfige und Geräthſchaften.

Hermann Schramm's

mechaniſche

Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [1751]

Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Neu! **Senſationell!**

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt
[1752] **Edmund Schiewick, Zittau,** Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit f. Ref. zu dienen.

Reparaturen aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes

Schlagnetz

m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ. 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1753]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

☛ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1754]

Holzwaarenfabrik.

C. L. Flemming

Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen

empfiehlt: [1755]

Flug- und Heckbauer, Einſatzbauer, Geſangskaſten.
Muſterpackete 9 St. ſort. f. Kanarienzüchter M. 6 franko.

Holzwaarenfabrik.



Man verlange Preisliste.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1756]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze

à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei.
R. Schröter (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1757]

Hunde-Halsbänder

in ff. vernick. Metall mit Lederunterlage u. Namensgravur per Stück von 3—8 ℳ.
[1758] **H. D. Becker, Iſerlohn.**



Käfige

jeder Art

(Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth

Arthur Herrmann & Cie.,
[1759] **Oſchatz** i. S.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 39. Magdeburg, den 28. September 1899. XXVIII. Jahrg.

Die Ringdroſſel (Turdus torquatus, *L.*)*).

Von Fr. Anzinger.

„Was machſt Du morgen?“ fragte mich an einem Samstag-Abend vor Bureau-Schluß mein Amtskollege K. — „Ich habe noch keinen Plan gefaßt“, erwiderte ich. — „Wenn Du zu einem ausgiebigen Morgenſpaziergang aufgelegt biſt, ſo lade ich Dich zu einer Auerhahnjagd ein; Büchſe und Munition ſtelle ich Dir zur Verfügung“, lautete nun die mich ſofort einnehmende Aufforderung.

„Angenommen! — Ich will Dich begleiten, doch nicht als Jäger, ſondern als Beobachter. Ich habe in meinem Leben noch auf keinen Vogel geſchoſſen und werde es auch fürderhin unterlaſſen können. Dein zweites Kracheiſen nebſt Zubehör kannſt Du daher ruhig im Schranke laſſen“, war meine Antwort.

Nachdem wir noch die Zeit des Aufbruches und den Ort der Zuſammenkunft beſtimmt hatten, ſchieden wir.

Am nächſten Tage um $^1/_2$2 Uhr früh waren wir bereits auf den Beinen und trachteten eiligen Schrittes dem nahen Bergwald zu, um bereits vor Sonnenaufgang am Balzplatze zu ſein. Die launenhafte Aprilwitterung ſchien uns günſtig zu bleiben. Ein friſcher Oſtwind ſtrich durch das Thal und am nachtſchwarzen Himmel flimmerten einzelne Sterne. In den kühlen Frühſtunden läßt es ſich auf bekannten, halbwegs gangbaren Waldwegen mit Luſt und Leichtigkeit marſchiren, und wir hatten daher bald das Mittelgebirge hinter uns und über demſelben das Brutrevier des Tannenhähers durchſchritten. Nun wurde die Sache etwas ſchwieriger, und in langſamerer, vorſichtiger Gangart mehrere Schutthalden überquerend, näherten wir uns allmählich dem von meinem Kollegen ſo ſehnlichſt erſtrebten Endziele unſerer Wanderung, dem Platze, auf welchem ſich nun Augenblicke der höchſten Jagdluſt abſpielen ſollten.

Mein Kollege wies mir nun einen Platz an, von wo aus ich alles beobachten konnte und ſchlich noch etwa 150 Schritte vor-, bezw. ſeitwärts, um ein beſſeres Licht für den Schuß zu haben. Auf meinem Standplatze angelangt, ſetzte ich mich nieder, und nachdem ſich mein Auge an das herrſchende Zwielicht gewöhnt, überwachte ich mit geſpannter Aufmerkſamkeit die vor mir liegende Waldblöße. Auf derſelben ſtanden, wie vorgeſchobene Poſten, einige Kiefern und von einer derſelben ſollte ſich das Balzſpiel des Auerhahns hören bzl. ſehen laſſen.

Minute reihte ſich an Minute, eine Viertelſtunde bereits an die andere, von einem Auerhahn aber war noch immer nichts zu hören. Meine Hoffnung begann zu ſchwinden, und als ſich jetzt bereits das Firmament über den öſtlichen Bergſpitzen röthete, betrachtete ich unſere Sache als mißlungen. Nicht weit von mir ließ ſich bereits ein Waldrothſchwanz (Erythacus tithys) vernehmen, und nicht lange dauerte es, ſo drang auch ſchon der kräftige Schall eines droſſelartigen Liedes an mein Ohr. Ich hatte alſo wenigſtens Vogelgeſang um mich und hiermit halbwegs einen Erſatz für den ausgebliebenen Genuß.

Ich ſuchte mir nun einen bequemeren Sitz, holte meinen Mundvorrath: Speck, Schwarzbrot und Rothwein aus dem Ruckſack und begann zu frühſtücken. Mein Schickſalsgenoſſe hatte mittlerweile die

---

*) Zu dem Bilde in dieſer Nummer.

Waldblöße umgangen und war jetzt in meine Nähe gekommen. „Du ſcheinſt vernünftiger zu ſein als ich, wenigſtens ſcheinſt Du mein Mißgeſchick von der leichten Seite zu nehmen“, ſprach er mich an, und aus ſeinen Worten klang der Groll über die mißlungene Auerhahnjagd. „Warum ſollte ich nicht vernünftiger ſein dürfen als Du? — Haſt Du bisher vielleicht an das Gegentheil geglaubt?“ fragte ich beluſtigt zurück. — „Spotte nicht! — Ich glaube Du wirſt mich verſtanden haben. — Dieſe Auerhahngeſchichte ſoll der T . . . . . holen.“

„Laß es gut ſein!“ beſchwichtigte ich ihn, „ſetze Dich her zu mir und ſei ebenfalls ‚vernünftig‘“. Scheinbar widerſtrebend ließ er ſich nun neben mir nieder, kramte gleichfalls ſeinen Schnerfer aus und that vor allem einen kräftigen Schluck aus der Feldflaſche. Schweigend ſaßen wir nebeneinander, er mit ſeinem Frühmahl beſchäftigt, ich bereits meine Pfeife rauchend und auf den Geſang der Vögel lauſchend. Nicht weit von uns entfernt, auf einen Abſtand von etwa 120 Schritt, ſangen zwei Ringdroſſeln, die erſten, welche ich in der Freiheit hörte, und ſie nahmen daher mein Intereſſe vollkommen in Anſpruch.

Was ich von dieſen Vögeln geſehen und gehört und in ſpäterer Folge noch einigemale von anderen Ringdroſſeln ohne merkbare Abweichungen wahrgenommen habe, geſtatte ich mir hier den geſchätzten Leſern mitzutheilen.

Der Geſang der Ringdroſſel iſt laut und ſtark, weithin vernehmbar, ohne jedoch jene markige Kraft und jene Klangfülle zu beſitzen, welche den Schlag der Singdroſſel ſo ſehr auszeichnen. Die aus wenigen, mehr konſonanten- als vokalreichen Lautſilben beſtehenden, alſo ziemlich kurz gemeſſenen Strofen werden, ähnlich wie bei der Singdroſſel, durch Pauſen auseinander gehalten, welche bedeutend länger ſind als die Strofen ſelbſt. Die Endſilben dieſer Klangfiguren werden meiſt amſelartig langgehalten, die letzteren entbehren deshalb des feurigen Rhythmus des Singdroſſelſchlags und zeigen mehr einen ſchwermüthigen Charakter. Wären die Strofen länger und dabei reicher an tief- und vollklingenden Vokalen, der melodiſche Inhalt der einzelnen Tonfiguren ein deutlicherer, ſo würde der Geſammteindruck des Geſanges um ein Bedeutendes werthvoller erſcheinen, ſo aber kann ſich das Ringdroſſel-Lied trotz ſeiner mannigfachen Abwechslung nach meiner Anſchauung nicht einmal mit jenem der Miſteldroſſel (Turdus viscivorus) meſſen, welche bekanntlich nur einige ſehr hübſche melodiſche Strofen in ſtets gleicher Reihenfolge bringt. Für die erſten Augenblicke, zur richtigen Zeit und am rechten Ort gehört, nimmt der Ringamſelgeſang wol jeden Lauſcher für ſich ein; ſein Intereſſe hierfür wird aber — vorausgeſetzt, daß er ein verwöhnter Geſangskenner iſt — umſoweniger eine Steigerung erfahren, je länger, bzl. öfter er Gelegenheit hat, denſelben zu vernehmen. Der Ringamſelgeſang gehört eben zu jenen Vogelliedern, welche ſich wie unſere Dialektlieder nur dort am vortheilhafteſten ausnehmen, wo ſie zu Haus ſind, ſich dem Kenner nicht als alltäglicher Genuß präſentiren und ſo ihrer ſelbſt genügend einen begrenzten, lokalen Werth behalten.

Immerhin darf der Geſang der Kragenamſel höher geſchätzt werden als jener der Wachholder- und Weindroſſel (T. pilaris et iliacus). Größere Verſchiedenheiten in der Geſangs-Ausbildung, welche ſich höchſtens beim Halten mehrerer Stücke dieſer Art in der Vogelſtube konſtatiren ließen, habe ich, nachdem mir bis jetzt nur eine ganz kleine Zahl dieſer Sänger als Käfigvögel zu Geſicht gekommen iſt, nicht wahrnehmen können. Ich glaube übrigens annehmen zu dürfen, daß bei der weniger ausdrucksvollen Geſangsweiſe dieſes Vogels nennenswerthe Unterſchiede kaum gefunden werden dürften.

Ich habe vorhin andeutungsweiſe auf die Oertlichkeit verwieſen, wo die Ringdroſſel zur Zeit ihrer Fortpflanzung beobachtet werden kann. Zur beſſern Information möge noch Folgendes dienen.

Die Ringdroſſel hält ſich von Ende März bis Mitte September hauptſächlich in den ſtillen, durch viele Blößen gelichteten Wäldern der höheren Gebirge auf und iſt bis zu einer Höhe von 4000 Fuß und noch darüber zu finden. Auf Waldblößen, aus welchen bereits Geſteinsmaſſen hervorragen, wo die Krummholzkiefer an die Stelle hochragender Fichten und Tannen tritt, namentlich aber, wo derartige Blößen einen moorigen Boden aufweiſen, dort hat die Ringamſel, das „Jochköppl“ des Nordtirolers, die „collarina“ des Wälſchtirolers ihre Heimat. Das Neſt ſteht ziemlich niedrig (2 bis 4 Fuß hoch) in den oben erwähnten Kiefern oder in zwerghaften Fichten, iſt aus Reiſerchen, Halmen und Mos ſtark gebaut und innen mit feinen Grashälmchen ausgelegt. Die Brutzeit beginnt je nach den klimatiſchen Verhältniſſen der Gebirgsgegend von der zweiten Hälfte Mai an. Die 4 bis 6 Eier ſind auf grünſpanfarbigem Grund violettgrau und roſtfarbig geſtrichelt und gepunktet. Nach dem Selbſtſtändigwerden der Jungen beginnt der Strich, und man trifft dann oft einzelne Trupps auf dem Mittelgebirge oder noch tiefer. Oberhalb des Dorfes Thaur, welches am linken Ufer des Inn unterhalb Innsbruck liegt, befinden ſich einige Kirſchbäume nahe der Waldgrenze, und auf denſelben wurden zur Zeit der Kirſchenreiſe bereits einigemale Ringdroſſeln beobachtet. Der Abzug in die Winterherberge erfolgt gewöhnlich anfangs Oktober.

In ihrem Weſen und Betragen zeigt die Ringdroſſel viel Aehnlichkeit mit unſerer Amſel (T. merula). Namentlich das Niederbeugen des Vorderkörpers, ſowie das fächerartige Ausbreiten und Aufwärtsſtellen des Steuers im erregten Zuſtand hat ſie mit der Vorigen gemein. Zudem iſt die Ringdroſſel eine ſehr hübſche Erſcheinung. Das Gefieder iſt beim Männchen ſchwarz, beim Weibchen in’s Braune ziehend; bei beiden Geſchlechtern ohne oder mit weißen oder ſchmutzigweißen Federrändern auf der Unterſeite; das Männchen hat einen weißen, das Weibchen und die Jungen einen ſchmutzigweißen oder düſtergrauen Halsring. Größe unſerer Amſel.

In neuerer Zeit wurde von L. Stejneger eine genaue Unterſuchung und Vergleichung einer größeren Zahl von Ringdroſſeln aus verſchiedenen Theilen Europas vorgenommen, welche die bereits von Chr. L. Brehm durchgeführte Theilung der Hauptform in zwei Nebenarten beſtätigte. Demnach werden jetzt unterſchieden:

Der Grund hierfür liegt wol darin, daß Nachfragen nach dieſer Art äußerſt ſelten und dann nur in Fachzeitungen, nicht aber in Lokalblättern der Gebirgsländer geſtellt werden, alſo nicht zur Kenntniß der profeſſionsmäßigen Vogelfänger gelangen. Werden demnach auf dem Frühjahrs- oder Herbſtzug ſolche Vögel zufällig gefangen, ſo wandern ſie als billige Delikateſſe in den menſchlichen Magen, weil eben eine ertragreichere Abſatzquelle nicht bekannt und der hieſige Vogelfänger zu indifferent iſt, „lebende Ware" zu inſeriren.

Ueber die beſte Ernährung der Papageien, bzl. aller weichlichen Exoten.

Eine theoretiſch-praktiſch-wiſſenſchaftliche Studie.

Von Dr. med. Otto, Arzt für naturgemäße Heilweiſe zu Mülhauſen (Elſaß).

(Schluß).

Unterſuchen wir nun einmal, ob der Vogel bei ſeiner täglichen Portion von abgekochtem Mais, Hanf, Waſſer, Brot dieſe Stoffe erhält? Nein, er erhält ſie nicht, und muß nothwendiger Weiſe im Verlauf der Zeit erkranken. Im Hanf iſt z. B. faſt gar kein Nährſalz enthalten, während die 1½ % Nährſalze (ſiehe Tabelle, unten) im Mais nicht voll zur Geltung kommen, indem durch das Abbrühen des Mais die Nährſalze zum größten Theil ausgezogen werden; auch liegen die Nährſalze hart an der Schale, während der Papagei nur die Spitze des Kernes frißt. Ich halte deshalb die Vorſchrift, einen (beſonders jungen) Papagei nur mit Hanf, gekochtem Mais und Waſſer zu ernähren, auf die Dauer nicht für richtig, gebe vielmehr meinen Thieren ein ſehr wechſelreiches Futter und überlaſſe den Thieren, ſich auszuſuchen, was ſie für ihre Ernährung durch Inſtinkt für gut befinden.

Ich theile das Papageienfutter zur beſſern Ueberſicht in fünf Klaſſen:

1. Hanf, erweichter Mais (1,50), Weizenbrot (0,50).
2. Spitzſamen, Hafer (3,0) (erweicht), Reis (4,50) (erweicht), Sonnenblumen.
3. Mais (3,0), Hafer (5,0), in Milch.
4. Wall- und Haſelnüſſe.
5. Kirſchen (0,75), Aepfel (0,50), Weintraube (0,50), Birnen (0,30), Eberejchen- und andere Beren.

Die Zahlen bedeuten den „Nährſalzgehalt", das Wichtigſte bei der ganzen Ernährung; ein Umſtand, der bis jetzt mangels Kenntniß total überſehen worden iſt.

ad 1. Hanf iſt ein ſehr werthvolles Futtermittel, an welches jeder Papagei zu gewöhnen iſt. Nimmt der Vogel viel Hanf, ſo ſind Sonnenblumen ganz wegzulaſſen, ſonſt wird der Vogel zu fett und ſtirbt an Krämpfen oder Unterleibsentzündung.

Angekochten Mais halte ich für die Dauer für ein ungeeignetes Futter, und werden die Papageien bei dieſem Futter mit der Zeit an einer entzündlichen Krankheit der Reſpirationsorgane erkranken. Durch das Kochen und Abbrühen wird einer der wichtigſten Nährſtoffe, das „Nährſalz", faſt total zerſtört, denn die Nährſalze, die unter der Rinde liegen, löſen ſich in heißem, kochendem Waſſer auf. Ferner wird das Stärkemehl des Mais durch das Kochen zum Theil in Kleiſter und Stärkezucker (Dextrin) übergeführt, und der Vogel genießt faktiſch im angekochten Mais nicht mehr „Mehl", ſondern Kleiſter und Stärkezucker minus Nährſalze, welcher Zuckergenuß ſchließlich zu chroniſchem ſaurem Magenkatarrh führt, woraus wiederum ſchlechte Blutbildung (Blutarmuth mit Ueberwiegen der Kohlenſäure und Mangel an Blutnährſalzen) erfolgt, die bei Erkältung eine Lungenentzündung produzirt.

Ein Blick auf beifolgende Tabelle iſt intereſſant:

	Nährſalze	Fett	Eiweiß	Stärke	Waſſer	Zucker
a) Milch-Mais	3,0	0,5	1½ %	8	82	—
b) Trocken-Mais	1½ %	4½	10 %	68	12	4
c) Gekochter Mais	Spuren	4½	8 %	30	28	30

Ich füttere meinen Papageien keinen angekochten Mais, ſondern Mais in Milch (a), oder wenn nicht zu haben 12 bis 18 Stunden lang eingeweichten Mais. In dieſem Mais ſind, wie die Tabelle zeigt, die Nährſalze (1½ %) noch vollſtändig erhalten, da ſie ſich in kaltem Waſſer nicht löſen, während das Stärkemehl des Mais aber noch „Mehl", und nicht zum Theil in Kleiſter und Dextrin (Stärkezucker) übergeführt iſt. Wer kocht dem Papagei im Freileben den Mais? Dieſe Frage gibt doch zu denken! Daß ich Recht habe, beweiſt ſofort ein Blick auf nachſtehende Tabelle. Ich muß vorausſchicken, daß es eine bekannte Sache iſt, daß Mais in Milch (3,0) und Hafer in Milch (5,0) dem Papagei (und auch anderen Thieren) ſehr gut bekommt, warum? zeigt eben die Tabelle. Bei Mais in Milch genießt der Papagei 3 %, bei Hafer in Milch ſogar 5 % Nährſalze, bei trocknem Mais (gequellt) 1½ %, bei gekochtem Mais nur Spuren! Bei Mais in Milch iſt das Nährſalz durch das ganze Korn vertheilt, während es ſich ſpäter beim Ausreifen unter der Rinde anſammelt. (Daher die Vorſchrift: Eſſet Schrotbrot, ihr Menſchenkinder!) Vermuthlich genießt der Papagei in der Freiheit nur Mais in Milch, da es in dem heißen Klima wahrſcheinlich ſtets Mais in Milch gibt. (Man vergleiche übrigens unſere Spatzen, die Weizen in Milch freſſen.) Mais in Milch neigt nur dann zu Durchfall, wenn Getränk daneben verabreicht wird (Milch-Mais hat 82 % Waſſer!). Jeder, ſelbſt noch ganz junge Papagei nimmt kalt eingeweichten Mais ſofort auf und zieht ihn dem abgekochten vor. (Anmerkung: Hieran ſich anſchließend kommt ſpäter ein neuer Artikel. D. V.)

ad 3. Iſt durch vorſtehende Ausführung erledigt. Hafer in Milch nehmen die meiſten Papageien ſehr gern, und iſt ihnen dieſe Wohlthat möglichſt lange zu reichen wegen des hohen Nährſalzgehalts (5 °/₀).

ad 4. Wall- und Haſelnüſſe ſind Leckerbiſſen und täglich 1 bis 2 Stück zu geben; ſie wirken ſehr günſtig auf die Leberabſonderung ein.

ad 5. Obſt. Obengenanntes reiche ich jedem Papagei täglich, ſofern er nicht Durchfall hat. Der hohe Nährſalz- und Waſſergehalt ſpricht für die Empfehlung. Getränk iſt bei Obſtbarreichung wegzulaſſen, bzl. einmal zu geben.

Anſchließend hieran gebe ich noch 5 Papageien-Krankengeſchichten aus letzter Zeit, die Obiges illuſtriren. Die frühern ſind mir leider durch meine Reiſe in's Ausland verloren gegangen.

A. Blauſtirnamazone, 2½ Jahr, Auguſtele, Nr. 78. Dieſen Vogel kaufte ich von einem Arbeiter, der ihn wegen Durchfall, ſtruppigem Gefieder weggab. Die Erkundigung meinerſeits ergab falſche Ernährung durch Kaffe und menſchliche Nahrungsmittel. Der Vogel war biſſig, halbwild, nicht gezähmt, ſpricht franzöſiſch und Elſäßer Deutſch.

Diagnoſe: Chroniſcher Darmkatarrh mit ſtockender Mauſer, beginnende Blutzerſetzung (brüchige Federn, Gefiederſträuben ꝛc.).

Behandlung: Abgekochtes Waſſer, dünner Haferſchleim mit Nährſalz jeden dritten Tag wechſelnd. Futter 1 und 2, ab und zu 4 und 5. 3 war nicht zu haben. Nach vier Monaten: Der Vogel hat ſich ſchön vermauſert, ohne Katarrh, iſt vollſtändig gezähmt, zeigt ſich höchſt intelligent, mit großem Sprachtalent, ſteht keinem Graupapagei nach, ſpricht franzöſiſch, Elſäßer Deutſch, hochdeutſch. Ich komme ſpäter auf „Auguſtele 78“ zurück.

B. Doppelgelbkopf, Lora, 2½ Jahr, Nr. 79. Iſt geſund, ſehr fett, infolgedeſſen phlegmatiſch; ſpricht etwas, frißt nur Sonnenblumen.

Diagnoſe: Fettſucht, Blutverwäſſerung.

Behandlung: Entziehung der Sonnenblumen, dafür Futter 1, 2, 4 und 5.

Nach zwei Monaten: Der Vogel iſt jetzt viel lebhafter, turnt und ſchwätzt, hat an Gewicht verloren, die Mauſer iſt mit Gewalt (durch das veränderte Futter) eingetreten. Er erhält abgekochtes Waſſer, ab und zu Hafergrützſchleim mit Nährſalz. (Dieſer Vogel wäre in kurzer Zeit an Krämpfen oder Gehirnentzündung geſtorben, hätte man die Nahrung nicht geändert.)

C. Gelbnacke, jung, Nr. 80, von Hamburger Großhandlung. Der Vogel kommt mit Diphtheritis an. Die Handlung ſchreibt: „Der Vogel ſoll Knochen zum Benagen bekommen“. Vor ſolchen Vogel-Handlungen, die Knochen zum Benagen empfehlen, kann ich nur warnen. Ich werde in einem ſpätern Artikel über die „Vogeldiphtheritis“ nachweiſen, daß Vögel, die Fleiſch, bzl. Knochen erhalten, Diphtheritis bekommen müſſen. Der Vogel ſtarb natürlich am 9. Tage an Erſtickung.

D. Gelbnacke, jung, Nr. 81, Lorita, von derſelben Handlung als Erſatz des Vorigen auf Reklamation hin; der Vogel erſcheint geſund, iſt jedoch krank oder krank geweſen. Auslerung dünn, Verſtopfung wechſelt ab mit Durchfall, Erbrechen von Hanf (nicht verdaut). In der Auslerung finden ſich Paprikaſchalentheile, ein Beweis, daß man in Hamburg auf Magenkatarrh hin kurirt hat, Gefiederſträuben, ſtill ſitzen ꝛc.

Diagnoſe: Chroniſcher Magen- und Darmkatarrh mit beginnender Blutzerſetzung.

Behandlung: Zunächſt zwei Tage hintereinander 10 bis 12 Weintrauben, um Magen und Darm tüchtig von unverdaulichen Futterreſten zu entleren. Dazwiſchen leichte Koſt: Mais, Spitzſamen, Milch. Am 3. Tag: Haferſchleim mit Nährſalz. Am 9. Tag: Der Vogel iſt bedeutend beſſer und frißt Futter 1, 2, 4 und 5. 13. Tag: Der Vogel iſt ſehr kräftig, munter, turnt, ſchreit, zeigt Intelligenz, geht auf Finger und auf Kommando herunter, begreift ſehr leicht und verſpricht etwas zu werden. Er nährt ſich jetzt nur von Spitzſamen, Hanf, Mais. Es wäre höchſt wünſchenswerth, wenn Herr Federico Eichlam in Guatemala (Nr. 24 d. Z.) angegeben hätte, wie die Gelbnacken dort mit Mais ernährt werden. Wollte Herr Eichlam nicht einmal eine Kontrolfütterung an Gelbnacken vornehmen?

E. Jacko, jung, Nr. 82, von Zittau bezogen. Der Vogel ſollte 8 Monate hier und geſund ſein. Nach Ankunft zeigten ſich die Entlerungen wäſſrig dünn, Vogel matt, ſehr mager, Bruſtknochen tritt ſtark hervor, Federn brüchig.

Diagnoſe: Chroniſcher Darmkatarrh, beginnende Sepſis, ſchwacher Neſtvogel.

Behandlung: Abgekochtes Waſſer und Haferſchleim-Nährſalz, zwei- bis dreimal täglich abwechſelnd. Frißt anfangs nur Hanf, geweichter Mais wird aber gern angenommen, ſpäter auch etwas Spitzſamen und etwas geweichter Reis. Die Zeit iſt noch zu kurz (drei Wochen), um ein Urtheil zu fällen.

Ich werde ſpäter mit weiteren Berichten aufwarten können und bitte alle Papageien-Liebhaber, dieſe ſehr wichtige Sache vorzunehmen und nachzuprüfen.

Alle anderen weichlichen Exoten ſind übrigens ebenfalls nach dieſem Nährſalz-Prinzip zu behandeln, und werden ſodann gute Erfolge nicht ausbleiben.

Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang.

Von R. Groſſe.

(Fortſetzung).

Man halte mir hier nicht vor, daß wir, wollten wir auf dieſe Weiſe mannigfaltige Sänger züchten, wieder von vorn anfangen müßten. Das iſt nicht der Fall. Wir verfügen über eine Menge ſchöner und wohlklingender Geſangsſtrofen, die wir unter allen Umſtänden beibehalten müſſen und auch weiter pflegen wollen, aber wir wollen nicht einſeitig bleiben, ſondern auch alles das pflegen und fördern, was außer den jetzigen Modeſtrofen noch ſchön iſt, und das können wir nur dadurch erreichen, daß wir alles Schöne durch *Vererbung* zu übertragen ſuchen. Die Wiſſenſchaft hat uns längſt davon überzeugt, daß es falſch iſt, wenn wir der Redensart: „Gleiches erzeugt Gleiches“ beitreten, wenn wir alſo meinen, daß alle Thiere gleichen Geſchlechts einander gleich ſein müſſen. Daß ein Kanarienvogel dem andern ähnlich iſt, ſteht außer Zweifel; denn ſie beſtehen alle aus demſelben Fleiſch und Blut, ebenſo feſt ſteht es aber, daß keiner dem andern ganz gleich iſt, weil jedes Geſchöpf ſchon vor der Geburt und noch mehr nach derſelben unter ganz andern Verhältniſſen beſteht und fortbeſteht, wie die Erzeuger und Miterzeugten. Eine gewiſſe Ungleichheit beſteht ohne Frage bei allen Thieren gleicher Art, was ſchon daraus geſchloſſen werden kann, daß die Thiere gleicher Klaſſen ſich gegenſeitig wiedererkennen; ein Sperlingsmännchen kennt unter Hunderten von Weibchen *ſein* Weibchen heraus, ebenſo der Stieglitz, Fink und alle Vögel, was den beſten Beweis für die aufgeſtellte Behauptung liefert. Dieſe beſtehende Ungleichheit der einzelnen Weſen ein und derſelben Klaſſe beruht auf der Abänderung, auf der Verſchiedenartigkeit des Beſtehens und Fortbeſtehens. Wenn wir nun weiter in Berückſichtigung ziehen, daß jeder neue Charakter, jedes neue Merkmal, das eine Folge der naturwiſſenſchaftlich feſtgelegten Abänderung iſt, von welcher Art es auch ſein möge, das Beſtreben in ſich ſchließt, vererbt zu werden und daß das Ueberraſchende bei jedem Merkmal darin beſtehen würde, daß es jemals nicht vererbt werden ſollte, wenn wir ferner bedenken, daß ſchon das bloße Beſtehen dauernder Raſſen von Thieren für das Vermögen der Vererbung ſpricht, ſo dürfte es uns wol klar werden, daß wir durch die Fortpflanzung immer vollkommnerer Singmuskelwerkzeuge, die ja für uns Kanarienzüchter das werthvollſte Stück an unſerm Sänger ſind, durch Singwerkzeuge, welche ein mannigfaltiges und uns angenehmes Lied hervorbringen, ſchließlich zu einem Ergebniß gelangen müſſen und werden, das uns befriedigt. Die ganze Kunſt des Züchtens hängt ja einzig und allein von der Vererbung jedes, auch des kleinſten edlen Theilchens der Körperbeſchaffenheit von den Erzeugern auf die Erzeugten ab, und die Erfolge der Zucht werden uns umſomehr genügen, je mehr die edlen Theile unſeres Lieblings — inſonderheit ein vollkommenes Singwerkzeug — auf die jedesmalige Nachzucht übertragen werden. Selbſtredend iſt es für dieſen Zweck erforderlich, daß wir die beſten Zuchtthiere miteinander paaren; denn welche Vortheile würden wir zu erwarten haben, wenn wir Vögel mit geringen Leiſtungen zur Hecke verwenden würden? Die Errungenſchaften würden ſehr verſchwindend ſein! Die mannigfachen Fälle, die wir in unſerer Liebhaberei zu verzeichnen haben, in denen ein edler Rollerhahn mit einem Weibchen der Landraſſe, und umgekehrt gepaart, ſchlechte Sänger bringen, beweiſen uns, daß wir auf unſere Zuchtverhältniſſe nicht die Regel der Wiſſenſchaft, daß es oft hinreichend iſt für die Vererbung, wenn nur eins der beiden Eltern die Vorzüge beſitzt, welche wir vererbt wiſſen wollen, in Anwendung bringen können. Wir dürfen dieſes wol thun, wenn wir die äußerliche Beſchaffenheit z. B. des Gefieders weitererben wollen, ſicher aber nicht, wenn wir auf Geſang züchten. Im letzteren Falle müſſen ſowol Hahn wie Henne mit gleich tadelloſen Singwerkzeugen ausgeſtattet ſein. Das iſt umſo mehr erforderlich, weil das Vererbungsvermögen oft ſehr launig iſt, bei einzelnen Weſen auch wol ganz fehlt. Auch die letztere Behauptung iſt durch die Wirklichkeit erwieſen. Könnten wir mit Sicherheit darauf rechnen, daß von zwei guten Vögeln, einem gut ſingenden Hahn und einem mit gutem Singwerkzeuge ausgeſtatteten geſunden Weibchen eine gleich gute Nachzucht fallen würde, ſo hätten wir weiter nichts nöthig, als für ein Paar tadelloſe Zuchtvögel zu ſorgen, und wir könnten mit unſerer Nachzucht glänzen. Dem iſt jedoch nicht ſo. Unter den Junghähnen, die von tadelloſen Eltern abſtammen, finden wir immer wieder einen Theil, der nicht unſern Wünſchen entſpricht, was wir der Launenhaftigkeit der Vererbungstheorie oder auch dem Rückſchlage (hierüber ſpäter einmal) zuzuſchreiben haben. Wollen wir aber mit Erfolg züchten, ſo iſt das erſte Erforderniß: auf gute Heckvögel ſehen und zwar nach der jetzigen Lage der Verhältniſſe auf Heckvögel, die rein im Vortrage, frei von Fehlern und *mannigfaltig im Geſange* ſind. Dieſe Vögel finden wir am zuverläſſigſten an den Stellen, an welchen der Stab über die Leiſtungen unſerer Sänger gebrochen wird. Wie wir ſie daſelbſt ausfindig machen können, werde ich ſpäter auseinanderſetzen. Die vorſtehenden Erörterungen mögen in erſter Linie diejenigen Züchter beherzigen, welche bisher weniger Werth auf die Güte oder auch auf die Behandlung der Zucht*weibchen* gelegt haben, ſie mögen bei der Auswahl der Zuchtvögel für das kommende Jahr nach den aufgeſtellten Regeln verfahren und nur das Vollkommenſte in Bezug auf Geſundheit und Leiſtungsfähigkeit auswählen. Die Vererbungstheorie aber möge es auch ſein, auf welche geſtützt wir den Geſang unſerer Lieblinge wieder mannigfaltiger zu geſtalten ſuchen, die Vererbung wird zweifelsohne manch’ ſchöne Strofe weitertragen und vervollkommnen. Ich glaube, wir kommen ſo ſicherer zum Ziel, als wenn wir Fehler, die wir bisher haßten, jetzt dulden wollen. Ich habe in der Fachpreſſe des laufenden Jahres geleſen, daß die Kanarienzucht mit Rieſenſchritten rückwärts gehe und daß der Grund hierfür in der Maſſenzucht der Großzüchter liege. Ich bin andrer Anſicht: Der Bedarf an Sängern wird gegenwärtig noch nicht gedeckt; denn wir können im Januar, Februar, ja ſelbſt noch im März Ankündigungen in Fach- und Ortsblättern leſen, in denen Vögel geſucht werden. Wenn auch die

Ausfuhrhändler, wie es in der betreffenden Abhandlung heißt, mit Vorliebe große Stämme kaufen, ſo reichen die vorhandenen doch in jedem Jahre beiweitem nicht aus, und außerdem gebrauchen auch die Händler des Inlandes eine recht bedeutende Anzahl Junghähne und auch Weibchen für ihr Geſchäft. Der allerdings vorhandene Rückgang im Preiſe für gute Vögel iſt thatſächlich darin zu ſuchen, daß der Laie dem einſeitigen Truteſchen Hohlroller des Züchters keinen Geſchmack mehr abgewinnen kann, er will einen muntern und zugleich mannigfaltigen Sänger haben. Die Züchter ſind aber jetzt auf den Händler in erſter Linie und infolge deſſen auf das Publikum in zweiter Linie angewieſen, weil ihre Zahl viel zu groß iſt, als daß ſie noch, wie früher, untereinander weitgehende Geſchäfte machen konnten. Deshalb müſſen wir mannigfaltige Vögel zu erreichen ſuchen.

Bezüglich der Auswahl der Zuchtvögel möchte ich noch hinzufügen, daß man mit Vorliebe ſolche Weibchen auswählen möge, die gut überwintert ſind. Ich habe wiederholt die Erfahrung gemacht, daß ſich ſolche Hennen vorzüglich zur Zucht eignen, die verſtändnißvoll im Winter gepflegt und gefüttert worden ſind und die ſich ſo zu ſagen einen Fettbauch angefreſſen hatten. Gerade die Weibchen mit einer Fettſchicht haben ſich in meiner diesjährigen Zucht wieder als recht gute Brüterinnen und gleichzeitig als ſorgſame Mütter erwieſen. Solche Hennen kann man aber nur bekommen, wenn ſie entweder in dem Wohnzimmer während des Winters gehalten werden, in welchem abends Licht gebrannt wird, oder wenn die Flugräume der Weibchen in den Wintermonaten abends zum Zweck der Fütterung eine Zeit lang erleuchtet werden. Weibchen, die unter Umſtänden von nachmittags 4 bis zum andern Morgen um 8 Uhr keine Gelegenheit zum Freſſen haben, können wol erſchlaffen und abnehmen, aber keine Fettſchicht auf dem Bauch anſetzen. Ich empfehle deshalb aus eigener Erfahrung die Fütterung der Weibchen bei Licht während des Winters. Ebenſo empfehle ich für den gleichen Zweck die Geſangskäſten, in denen die Hähne gehalten werden, zu öffnen, ſobald das Zimmer, in dem ſie ſich befinden, erleuchtet wird.

Die Lage der Heckräume ſpricht zwar bei dem Fortpflanzungsgeſchäft im allgemeinen dann nicht mit, wenn die Heckzimmer künſtlich erwärmt werden können, wol aber iſt es für den guten Fortgang der Zucht und für das Wohlbefinden alter und junger Vögel von Vortheil, wenn die Sonne auf den Heckraum einwirkt. Die Sonne ſtärkt, belebt und fördert. Deshalb ſind Heckräume zu empfehlen, die nach Süden, Südoſten oder Oſten gelegen ſind. Mißerfolge ſind in ſolchen Züchtereien erzielt worden, in denen die Heckkäfige unmittelbar unter der Zimmerdecke angebracht worden ſind. An dieſer Stelle iſt bekanntlich die Luft am meiſten unrein, und ſie iſt in denjenigen Monaten, in welchen geheizt wird, für die Körperbeſchaffenheit der Vögel beſonders ſchädlich.

(Fortſetzung folgt.)



Briefliche Mittheilungen

Eine hoffentlich vereinzelt daſtehende Roheit wurde in einem an der Ecke der Heumattſtraße in Baſel gelegenen Reſtaurant begangen. In dem kleinen Wirthſchaftsgarten hatte ſich ein Mehlſchwalbenpärchen angeſiedelt und unvorſichtiger Weiſe ſogar eine zweite Brut gemacht, die aber nicht dazu kam, das Neſt zu verlaſſen. Am 1. September fiel eines der jungen, halbflüggen Schwälbchen aus dem Neſt, und wurde vom Portier aufgehoben. Ein eben anweſender Herr, der meine große Liebhaberei für die Vogelwelt kennt, ſandte den Burſchen mit dem Vogel zu mir, und mit herzlicher Freude über die Erfüllung eines ſchon lange gehegten Wunſches nahm ich das zarte Geſchöpf in Empfang, dachte aber leider in meiner freudigen Erregung im Augenblick nicht daran, den Ueberbringer nach dem Verbleib der übrigen jungen Schwalben zu fragen. Sofort nach dem Weggehen des Mannes fiel mir dieſe Unterlaſſung ein, und da ich wol wußte, daß die armen kleinen Spätlinge und mit ihnen ihre pflichtgetreuen Eltern dem ſichern Hungertod entgegengingen, wenn ſie zum Ausfliegen kämen, ſo erkundigte ich mich ſo ſchnell als möglich nach der Herkunft des jungen Schwälbchens. Als ich in Erfahrung gebracht hatte, wo das Neſt ſich befand, ſandte ich ſogleich meinen Kutſcher nach dem Reſtaurant H. und ließ dem Portier ein gutes Trinkgeld verſprechen, wenn er mir die übrigen jungen Schwalben noch bringen würde. Umſonſt, — die armen, hülfloſen Geſchöpfe waren bereits ausgenommen und von den rohen Beſitzern des Reſtaurants — lebendig der Hauskatze gefüttert worden!!! — Heiße Thränen ſchmerzlichſter Empörung ſtiegen mir in die Augen, als mein Burſche mir dieſen niederſchmetternden Beſcheid brachte. Sollte man es wol für möglich halten, daß es in unſern ziviliſirten Gegenden, in unſerm als ganz beſonders thierfreundlich bekannten Schweizerland noch derartige Vandalen geben kann, die ein teufliſches Vergnügen daran finden, unſere lieblichſten und nützlichſten Vögel dem blutgierigſten Raubthier vorzuwerfen, unter deſſen Krallen und Zähnen qualvoll verenden zu ſehen! — Haben wir da noch ein Recht, uns über die mordgierigen Italiener zu entrüſten, in denen keine Bildung die leider jedem Menſchen innewohnende Roheit und Grauſamkeit unterdrückt hat? — Der einzige Troſt, den wir uns angeſichts ſolcher Vorgänge vorhalten können, iſt die Hoffnung, ich glaube ſogar behaupten zu dürfen die Ueberzeugung, daß ſolche niederträchtigen Bubenſtreiche, für die meiner Anſicht nach keine der geſetzlich zuläſſigen Strafen empfindlich genug iſt, immerhin vereinzelt daſtehen und vom Volk ſelbſt ziemlich ſcharf verurtheilt werden. Was ich thun würde, wenn mich der Zufall einmal Zeugin einer ſo unmenſchlichen Roheit werden ließe, mag ich lieber nicht ausdenken.

Das junge, in meinen Beſitz gelangte Mehlſchwälbchen gedeiht vorzüglich, frißt ſchon vom erſten Tag an Alles, d. h. Mehlwürmer und friſche Ameiſeneier, ſowie Fliegen bereitwillig von der vorgehaltenen Pinzette und hat ſchon lange mit der, wie ich glaube, nur Schwalben eigenen Intelligenz meine Stimme erkennen gelernt, denn ſowie dieſelbe erſchallt, wendet ſich das runde Köpfchen nach mir herum, und die ſchwarzen Aeuglein ſchauen begehrlich nach meinen Fingern. Während ich dies ſchreibe, läuft das niedliche Thier behende wie ein Mäuslein auf meinen Armen und Schultern hin und her. Leider iſt ſein rechter Flügel, wahrſcheinlich bei dem Sturz aus dem Neſt, etwas beſchädigt worden, doch hoffe ich, daß derſelbe bei dem jugendlichen Alter des Vögelchens wieder völlig brauchbar werde.

Frau N. Siegmund.

Mancherlei

Das Vordringen der Schwarzdroſſeln. Nachdem ſo viel über ſtete Abnahme der Singvögel geklagt worden iſt, wird es um ſo angenehmer empfunden, daß in den letzten Jahren wenigſtens im Maingau mehrere Vogelarten, am meiſten Diſtelfinken und Schwarzdroſſeln (Amſeln) einer bedeutenden Zunahme, ſich erfreuten. In dieſem Jahre wurden z. B. in einer lebenden Umzäunung eines allerdings ausgedehnten Gartens nicht weniger als vierzehn Amſelneſter gezählt.

Das Vordringen der Amſel in dieſem Jahrhundert iſt eine überall in Deutſchland beobachtete Erſcheinung; die Entwickelung der Amſel von einem ſchüchternen Waldvogel zugleich zu einem vertrauten Garten- und Ortsvogel ſcheint erſt in unſrem Jahrhundert vor ſich gegangen zu ſein. Die Vogelkundigen noch des vorigen Jahrhunderts kennen nur die äußerſt furchtſame und ſchüchterne Waldamſel; ſelbſt bis in die dreißiger Jahre unſeres Jahrhunderts hatte kaum ein vereinzeltes Pärchen ſeine verſteckte Waldheimat verlaſſen. Dann aber wurden die Nachrichten über ihr Ueberſiedeln und Niſten in Parkanlagen, Kurgärten und größeren Büſchen häufiger; immerhin war es noch ein beſonderer Glücksfall, ihren Geſang ganz in der Nähe der menſchlichen Wohnungen zu vernehmen. Mögen die warmen Winter daran die Schuld tragen, oder andere Umſtände, die Thatſache ſteht feſt, daß jetzt in ganz Weſtdeutſchland in wol faſt allen größeren Gartenanlagen, Buſchwerk, Alleen mit ſtrichweiſem Unterholz, ſelbſt in wenig baumreichen Hausgärten mit lebenden Zäunen oder Weidenpflanzungen oder Uferdickicht die Amſeln vollſtändig naturaliſirte Gäſte ſind. Auch ihre gangbare Charakteriſirung als „Zugvögel" ſcheint im letzten Dezennium gänzlich hinfällig geworden zu ſein. Man darf nach ſorgſamen Beobachtungen der letzten Jahre ſagen, daß es auch dem Weibchen gar nicht einfällt, die Heimſtätte zu verlaſſen. Immerhin muß ich es allerdings dahingeſtellt ſein laſſen, ob nicht die faſt unbekannt gewordenen ſtrengen Winter früherer Jahrzehnte, wenn ſie ſich wieder erneuern, die Amſeln doch vielleicht nach Süden treiben, wenn auch nur für kurze Zeit.

In manchen Parkanlagen, z. B. dem Kurpark zu Soden, Weilbach u. ſ. w., kann man nur ein par Schritte von ſich entfernt die Amſeln ohne irgendwelche Scheu dahinhüpfen ſehen, mögen auch noch ſo viele Spaziergänger auf und ab wandeln. Den großen Wald alſo haben die Amſeln mit den Waldminiaturen der Gärten und Anlagen und dem Buſchwerk der Waſſerläufe vertauſcht und ihr ſchüchternes Weſen abgelegt. Trotzdem ſuchen ſie in ihren neuen Standorten denſelben Schutz wie im Walde. Sie halten ſich im dunkeln Unterholz am liebſten, zumal im dichten Tannen- und Fichtenbuſch auf; Anlagen ohne ſtrichweiſes Geſträuch werden nicht oder wenig von ihnen bewohnt ſein. Im freien Felde, ſelbſt in Baumſtücken wie auf den Wieſen ſind ſie nur vorüberfliegende Paſſanten. Sie haben ſich an die Menſchen dermaßen gewöhnt, daß ſie ſelbſt in ganz kleinen Anlagen, z. B. auf Kinderſpielplätzen mit etwas Buſchwerk, auf den Friedhöfen, in dem Ziergeſträuch um die Kirchen und auf freien Plätzen mitten in den volkreichſten Städten hauſen. Ohne Zweifel ſind ſie den Städtern die bekannteſten Singvögel geworden, geradeſo wie den Landbewohnern, denen ſie vor dem Fenſter im Linden- oder Kaſtanienbaum ihre regelmäßigen Morgenkonzerte aufführen. Selbſt mitten in rauch- und ſtaubreichen Induſtriebezirken lohnen ſie die ſich dort mehrenden Baum- und Strauchpflanzungen durch regelmäßige Einwanderung. Kaum iſt der Park, ſei er groß oder klein, neu erſtanden, ſo ziehen in die dichteren Partieen ganz ſicher die Amſeln ein, während andere Singvögel von hellerer Färbung ſich weiter von dem Reiche der Induſtrie entfernen. Sie fliegen von den Bäumen und Sträuchern der Gärten auch ungeſcheut auf die Firſten der Häuſer, auf niedrige Mauern oder in den Hof; hier halten ſie ſich aber nie lange auf; ihre eigentliche Natur als Waldvögel läßt ihnen im ſchutzloſen Freien nicht Ruhe.

Man hat behauptet, die Amſel dränge mit ihrem Vorſchreiten andere kleinere Singvögel zurück, beſonders die Finken und Nachtigalen. Das Recht des Stärkeren mag ſich allerdings hin und wieder geltend machen, niemals aber im direkten Angriff, ſondern höchſtens im Vorwegnehmen und Behaupten der Nahrung. Die Amſel geht jedem kleineren Singvogel aus dem Wege und bewohnt mit ihm dieſelbe Hecke, denſelben Baum. Nur gegen ihresgleichen wird ſie zeitweiſe eiferſüchtig und geht angriffsweiſe vor. Selbſt wenn ſie aber Finken, Spechte, Grasmücken u. ſ. w. zum Theil verdränge, was jedoch für einzelne Gegenden als durchaus unzutreffend nachgewieſen iſt, ſo würde ſie dieſelben mehr als erſetzen nicht bloß durch ihren Liederreichthum, ſondern auch durch ihre Nützlichkeit. Altum vertritt die Meinung, der Nutzen der Droſſeln ſei größer, als der aller anderen Vögel. Wenn ſie im Garten auch über alle Beerenarten herfallen, ſo lieben ſie doch vorzugsweiſe die Fleiſchnahrung und geben ihr unabläſſig durch Hüpfen und Säbeln mit ihren Schnäbeln nach.

Das ſtets mehr und mehr beobachtete Vordringen der Amſeln iſt um ſo erſtaunlicher, als ihre Lebensweiſe in der Nähe der menſchlichen Siedelungen ihnen ſehr gefährlich wird. Sie bauen ihr Neſt niedrig, meiſt nicht über einige Meter von der Erde entfernt und ſo wenig verſteckt, daß die Feinde von allen Seiten an daſſelbe herandringen. Nach meinen Beobachtungen dürfte nicht viel mehr als die Hälfte aller Bruten glücklich zu Ende kommen. Wieſel und Katzen ſtreiten ſich mit den zweibeinigen Neſträubern um den Vorzug; der weite Umfang des Neſtes und das allzu ſichtbare Zutragen an die Jungen wird nur zu leicht zum Verräther des Standorts.

Trotzdem alſo kann in dieſem Jahr und konnte auch im vorigen ein äußerſt zahlreiches Vorkommen der Amſeln beobachtet werden. Ihre allmähliche Angewöhnung an die menſchlichen Siedelungen bildet eines der intereſſanteſten Blätter in der Geſchichte der heimiſchen Vogelwelt.

(Kölniſche Volkszeitung.)

Anfragen u Auskunft

Fräulein W. v. Daum: 1. Der fragliche Papagei iſt ein Roſa-Kakadu (Psittacus roseicapillus, *Vll.*). Heimat: Auſtralien. Der Roſa-Kakadu iſt ſprachbegabt, gehört aber nicht zu den hervorragenden Sprechern. Ueber ein bis zwei Sätze und ein halbes Dutzend Worte dürfte ſeine Fähigkeit nicht hinausgehen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Er iſt aber ein Stubenvogel, der ſich durch Klugheit, drolliges Weſen, leichte Zähmbarkeit und Befähigung für einen freundſchaftlichen Umgang mit dem Menſchen auszeichnet. Läſtig wird er, wie alle Kakadus, durch ſein Geſchrei, das er indeſſen um ſo ſeltner erſchallen läßt, jemehr er in der Zähmung und Abrichtung fortſchreitet. Der Preis von 12 ℳ für einen Roſa-Kakadu iſt zwar recht niedrig, aber nicht außergewöhnlich. 2. Ueber den genannten Händler ſind bei mir noch keine Klagen eingelaufen. 3. Vom Ankauf eines billigen Graupapageis rathe ich Ihnen entſchieden ab.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.



50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter p. St. 40 *M* lief. **Behm & Steinhardt,**
[1760] Waren i. Mecklenb.
Proſpekte gratis.



Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in praktiſcher Anordnung,
großer Auswahl u. billigem Preis. [1761]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Gut erhaltene **Vogel-Voliere** abzugeben. Näheres [1762]
Weimar, Bertaer-Chauſſee 1.

Futtermittel.

Präpar. Eigelb,
garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.
Mehlwürmer, rein und groß, à Ltr. 5, à Ko. 9.
Bisquit u. Eierbrot, beſt. Qualit. à Ko. 3.
Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.
Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 *M*. 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	" " " "	1,80
Hafer geſchält	" " " "	2,25
Mohn blau	" " " "	3,75
Hirſe weiß Pa.	" " " "	2,20
do. Senegal	" " " "	2,25
do. do. i. Kolb.	" " " "	5,—
do. algeriſche	" " " "	2,—
do. indiſche	" " " "	1,75
Sonnenblumen	" " " "	2,
Kürbiskerne	" " " "	3,25
Reis i. Hülſen	" " " "	2,25
Zirbelnüſſe	" " " "	5,—

Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 *Pf*. [1763]
Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter
Poſtſack 5 Ko. no. 2,—
Ausführl. Preisliſten ſämmtl. **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.
J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Eierbrot
(garantirt rein) per Pfd. 80 *Pf*, ½ Pfd. zur Probe 50 *Pf* in Briefmarken. Bei Mehrabnahme noch viel billiger. [1764]
Fr. Mann, Kaiſerslautern.

Universalfutter
für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 *M*. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 *M*. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 *M*, per 5 Kilo 16 *M*. I dito per Kilo 3,00 *M*, per 5 Kilo 14 *M* in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [1765]
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Engliſche Farben-Kanarien!
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten
echten Kayenne-Pfeffer,
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [1766]
Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.
Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos)

AVOL Nachtigallen- u Drosselfutter (Gesetzl. gesch.)
mit und ohne Caretten
per Pfd. 80 Pfg. 9 Pfd. Mk. 7.20 fco.
Dieſes Futter, — in Folge langjähriger Liebhaberei ſachkundig nur aus beſten Zuthaten hergeſtellt u. nach eingehender probeweiſer Fütterung durch Herrn
Karl Kullmann, Frankfurt a. M.
auf der großen allgem. Geflügel- u. Vogel-Ausſtellung hier mit dem
I. Preis prämiirt
iſt das Beſte, was es für Inſektenfreſſer gibt.
Auf Verlangen Gratisproben an Liebhaber.
Ff. deutſche handbeleſene Ameiſeneier 1899 p. Ltr. 70 Pfg., von 10 Liter an franco
F. Grünewald, Offenbach a. M.
Markt 5.
[1767]

Pfälziſches
Univerſalmiſchfutter,
das Beſte für **alle** inſektenfreſſende Vogelarten. Qualität I 2 *M*, Qual. II 1,60 *M* per Kilo franko geg. Nachn. od. vorherigen Kaſſe. Beimiſchungen, wie geriebene Gelbrüben, Salvia ꝛc. ſind überflüſſig, weil das Futter zum Gebrauch fertig iſt. [1768]
Fr. Mann, Kaiſerslautern.

Neue 1899er
Tyroler Ameiſeneier,
hochfein, weiß und rein, à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk.
Neuer 99er Elbe-Weißwurm
à Ko. 3½ Mk., à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk. [1769]
Zeke (Muska)
à Ko. 3, 5 Ko. 13, 10 Ko. 25 Mk.
J. O. Rohleder
Leipzig-Gohlis
Vogelfutter-Groß-Handlung.

Mehlwürmer,
ff. ſchöne, ſtarke, reine Ware, à Pfd. 3,50, bei 5 Pfd. à Pfd. 3,25 *M*. [1770]
Junge fingerz. Eichkatzen à 2,50 *M*.
Aug. Schulz,
Breslau I, Altbüßerſtr. 36, Ecke Ritterplatz.

99er Ameiſeneier,
à Ltr. 80 *Pf*, 10 Ltr. 7,50 *M*, **Miſchfutter,** 10 Pfd. 2—2,50 *M*, **Vögel** ꝛc. empfiehlt alle Arten bei ſtreng reeller Bedien. Preisl. auf Wunſch. **J. Götz,** Hofl.,
[1771] **Neuulm (Bayern).**

Mehlwürmer, à Ltr. 4 *M* inkl. Verp.
Bei Einſendung von 1,50 *M* = 140 gr., alſo weit über 1000 Stück, frk. inkl. Verp.
[1772] **P. Bartsch,** Breslau, Flurſtr. 6.

Univerſalfutter
für feinere inſektenfreſſende Vögel, per Kilo (3 Ltr.) 2 *M*, 1 Ltr. 75 *Pf*, für Droſſelarten per Kilo 1,60 *M*, 1 Ltr. 60 *Pf*. [1773]
J. Nullmeyer.
Vogel- u. Futterhdlg., Mannheim G 3, 11.

Alle Vogelfutter,
Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.
E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1774]

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter
für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1775] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Mehlwürmer, vegetab. gez. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 5 *M*, Kilo 8½ *M* einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,50 *M*. [1776]
Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Mehlwürmer,
1100 Stck. 1,40 *M*, 5500 Stck. 6 *M*, franko und freie Verpackung gegen Einſendung des Betrags. [1777]
Paul Bienzeisler, Tillowitz, O.-S.

Ameiſeneier,
1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 *Pf*.
Weisswurm,
getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 *Pf*.
Mehlwurm,
ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 *M*, liefert [1778]
Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, **Prag** 411, I.

Vögel.

Kanarien-Vorsänger!
Vorzügliche tieftourenreichſte, noch nie zur Zucht benutzt und flott durchſingend, nach Geſangsgüte à 12, 15, 20, 25 und 30 *M*, noch in großartiger Auswahl da. Verſandt überallhin gegen Vorherkaſſe oder Nachnahme mit voller Garantie für Werth, Geſundheit und Probezeit.
[1779] **Julius Häger,**
St. Andreasberg (Harz).
Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864.
Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Anzeigen.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer, **Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,** alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Jll. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1780]

Rothkehlchen

und **Blaumeiſen,** Dtzd. 9, Stck. 1 ℳ, **Haubenmeiſen, Kleiber, Gartenrothſchwänze, Bachſtelzen, Grasmücken, Stare, Rothhänflinge u. Stiglitze,** Stck. 2 ℳ, **Schwanz- u. Sumpfmeiſen, Fliegenſchnäpper,** Stück 1,50 ℳ, **Zaunkönige, Goldhähnchen, Baumläufer, Kappen- u. Braunkopfammern, Dompfaffen, Hausrothſchwänze, Schwarzplatten u. Graudroſſeln** St. 3 ℳ, **1 ſprechender Eichelheher** 6 ℳ, **1 Buntſpecht** 3 ℳ, **1 Wiedehopf** 6 ℳ, **Graue Kardinäle mit rother Haube,** Stck. 5,50 ℳ, **1 Dayaldroſſel,** prachtvoller Sänger, 30 ℳ, liefert in bekannter Güte

W. Hiltmann,
[1781] **Berlin S,** Dresdenerſtr. 23.

Zu verkaufen:

3 P. Zebraf. à 4,50, 2 P. weiße Reisf. à 6,50, 5 Stück Wbch. Goldb. à 1, Mövchen 1, Bandf. 1, Paradiswittwe 1, Tigerfink à Stck. 1,25 ℳ. Ein Excelſior-Käfig, Nr. 15, wie neu, 25 ℳ, ein do. mit Hinter- und Schmalſeite aus Glas, zweitheilig zerlegbar, 18 ℳ, ein do. mit 4 Abtheilung., ſehr praktiſch für Vögel von Kanariengröße, 24 ℳ, 9 Reformneſter aus Holzgeflecht 5 ℳ, 18 Käſtchen mit Neſter, ein Baumſtück, à 35 ₰, 4 Salat-Raufen 18 ℳ, 2 Böcke mit Rahmen für die großen Käfige zum Daraufſtellen, 1,50 ℳ, 12 Anhängegefäße u. Niſtmaterial, zuſ. 1,60 ℳ, 1 Badehaus 1 ℳ. Alles um die Hälfte des Werths.

Joh. Oehlschläger,
[1782] **Worms,** Cornelius-Heilſtr. 27.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft.

Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [1783]

[1784]

Geſucht:

Granataſtrilde, Buntaſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen u. ſeltene ausländ. Finken.

J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.).

Geſucht: Eigentl. oder dreifarb. Papagei-Amandine, Masken- oder dottergelber Weber.

Zu verkaufen: 1 Männchen Graugirlitz 3 ℳ, Zither mit Schule, Noten u. allem Zubehör, 60 ℳ, 6 Bände Moderne Kunſt à 12 ℳ. [1785]

Brummund, Cöslin, Schulſtr. 12.

F. Rejsek, Hamburg, Peterſtraße 28

Spezialität:

Papageien und Papageienkäfige.



Prämirt auf allen beſchickten Ausſtellungen.

Offerirt junge ſchöne kräftige, recht geſunde und leichtlernende **Grau-Papageien,** diesjährige Brut, jetzt ſechs Wochen hier, Stück 20 ℳ, einige ſchon 5 Monate hier, 25 und 30 ℳ, einige ſchon ſehr viel ſprechend, 60, 80, 100, 120 ℳ, je nach Leiſtung. **1 Königs-Graupapagei** (Königs-Jakos) mit rothbunt geſtreiftem Rücken, Seltenheit, 50 ℳ. **Amazonen** 20—25 ℳ, ſprechend, 30, 35, 40 bis 150 ℳ, große **Doppelgelbköpfe und Gelbnacken** à 30 ℳ. **Gelbhaubenkakadus** 12, 15, 20 ℳ. **Brillen-Amazonen,** ſprechend, 25 ℳ. Zahme amüſante ☛ **Affen,** ☚ 18, 20 und 25 ℳ. **Papageien-Salonkäfige,** wie Abbildung oben, nur 10 ℳ, ohne Säulen nur 8 ℳ, ſehr ſtark und ganz nach Vorſchrift gearbeitet, ganz aus Metall und ſtark verzinnt. [1786]

Junge Wellenſittiche,

Stück 2,50 ℳ. **L. Brinkmann,**
[1787] **Calefeld** in Hannover.

Citronenzeiſig

(Zitril), Dtz. 24 ℳ, Stück 2,50 ℳ, Par 4 ℳ, **rothe Dompfaffen,** Dtz. 24 ℳ, St. 2,50 ℳ, Par 3,25 ℳ u. ſ. w., alle Vögel ſichtbar verpackt. Dieſe zwei Sorten liefere bis Ende November. Anfr. Marke beifügen. [1788]

Beck's Vogelhandlung, Stuttgart.

Verkaufe

1 Uiſtiti-Aeffchen, $3\frac{1}{2}$ Jahr im Beſitz, vollkommen zahm, urdrollig, 15 ℳ. [1789]

Rüdenburg, Weſtend, Charlottenburg.

Ausgezeichnete **Harzer Kanarienſänger** hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1790]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Gelbe Erlenzeiſige, prachtv., futterf. Vögel, 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Junge Dompfaffen zum Anlernen à Stck. 2 ℳ, 4 Stck. 6 ℳ, Kreuzſchnäbel 6 Stck. 4 ℳ, Schwarzmeiſen 6 Stck. 4 ℳ, Dtzd. 6 ℳ, Blau- u. Finkenmeiſen 6 Stck. 5 ℳ, Dtzd. 8 ℳ. Garant. leb. Ank. In Gegenrechnung nehme Sproſſer und Schwarzblatten. **A. Jaumann,**
[1791] **Großbreitenbach,** Thür.

Habe abzugeben: einige gut 2 Lieder flötende **Dompfaffen,** à 35 ℳ, do., junge Hähne zum Anlernen, à 5 ℳ, do., junge Weibchen, beſte Sorte zum Anlernen, à 1,50 ℳ. Lebende Ankunft garantirt. [1792]

Paul Groesch, Dalherda im Rhöngebirge.

Jch habe noch einige ſehr ſchöne **Eierſammlungen,** à 300 St. in 80 Geleg., einſeitig geb., für 20 ℳ m. Verp. à Samml. abzugeb.

[1793] **H. Hintze, Neuwarp** i. P.

Je 1 **Hänfling, Stiglitz, Zeiſig, Buchfink** (zweiſchall. Wildfan), über 1 Jahr gekäf., **auserwählte Sänger,** desgl. 1 hochf. **Wiener Schwarzpl.** u. 1 Poſten faſt neue **Käfige** gebe ab. [1794]

C. Kathe, Kaufmann,
Magdeburg, Gr. Junkerſtraße 11 III.

Eine **Schamadroſſel,** gut ſingend, 35 ℳ, 1 Sprachmeiſter dito, 4 ℳ. Nehme 1 bis 2 **Kanarien-Roller** mit in Tauſch. **J. Philipp,**
[1795] **Gleiwitz,** am Kanal I.

Pariser Trompeter-

Kanarien, mehrf. präm. Abſt., mit bek. tadell. Stellg. u. Befied., verkaufe. [1796]

E. Grab, Kfm., **Metzingen** (Württemberg).

Eine prima **Nachtigal,** tadellos im Gefieder, vorzüglicher Schläger, 7 ℳ, **1 Goldamſel,** Mnch., ſehr ſchön, 5 ℳ, mit Verpackung gegen Nachnahme. [1797]

Jos. Ehrlich, Würzburg, Weißenburgerſtr.

Bücher-Anzeigen.

Verk.: „Gef. Welt", Jhrg. 1894, 96, 97, 98 u. 99 à 8,50 ℳ. Tſche. Vgb.
[1798] **Karl Herz, Staßfurt,** Holzmarkt.

Seewaſſer-Aquarien im Zimmer.

Von **Reinhold Ed. Hoffmann.**

Mit vielen Abbildungen. — Preis Mk. 3.—.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Wir offeriren solange der Vorrath reicht:

Ornithologische Briefe

Blätter der Erinnerung an seine Freunde

gesammelt von

E. F. von Homeyer

☛ **statt zu 8 Mk., zu nur 1,80 Mk.** ☚

und bitten von diesem vortheilhaften Angebot Gebrauch zu machen. Versendung erfolgt gegen Einsendung von 2 Mk. (zuzüglich 20 Pf. für Porto).

Creutz'sche Buchhandlung (Max Kretschmann)
in **Magdeburg.**

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Allianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Beſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 40. Magdeburg, den 5. Oktober 1899. XXVIII. Jahrg.

Dr. Karl Ruß sen. †.

Am 29. September, nachmittags 3 Uhr, endete plötzlich und unerwartet ein Herzſchlag das raſtloſe Leben des Begründers und bisherigen Schriftleiters unſerer „Gefiederten Welt“, des Herrn

Dr. Karl Ruß sen.,

nachdem ihm wenige Wochen vorher die Stütze ſeines Alters, ſein einziger Sohn, vorausgegangen war. Selbſt von früh auf ein aufrichtiger Bewunderer der Natur, hat er durch Wort und Schrift die Augen und Herzen vieler Tauſender für die Schönheiten derſelben geöffnet, und alle dieſe, welche er durch ſeine Anregungen für das Studium der Vogelwelt und die Vogelliebhaberei gewonnen hat, werden mit uns den Verluſt begreifen, welchen die ganze Vogelliebhaberei (im beſſern Sinn) erlitten hat. Aber er war doch noch mehr in ſeinen Schriften, und wir greifen wohl nicht fehl, wenn wir ſagen, er war ein bedeutender Volksſchriftſteller und ein würdiger Miterzieher des deutſchen Volkes! — Wir müſſen es uns an dieſer Stelle verſagen, näher auf ſein reiches Leben einzugehen, müſſen das vielmehr einer würdigeren Feder überlaſſen. Möge er ſanft ruhen! — Sein Werk aber, „Die gefiederte Welt“, wird von berufener Seite, einem jungen Freunde ſeines Hauſes, in ſeinem Sinn weitergeführt werden.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

(Fortſetzung).

Zwei werthvolle Vögelchen für unſere Vogelſtuben (Chlorophonia occipitalis — Chlorophonia callophrys).

Heute käme ich zur Beſchreibung zweier Vögelchen, welche ſehr nahe mit einander verwandt ſind, aber deren Verbreitungsgebiet ein vollſtändig anderes und getrenntes iſt. Ich ſelbſt ſah dieſe beiden Vögelchen hier zum erſten Mal. In Deutſchland hatte ich ſie nie in meinem Beſitz, das will allerdings nichts heißen, denn meine Mittel geſtatteten mir eben nur von den fremdländiſchen Vögeln die billigſten zu kaufen. Aber auch in der von mir geführten Liſte habe ich keinen Namen verzeichnet, welcher mir, wenn auch nur den geringſten Anhaltepunkt geben könnte. — In den Muſeen von Guatemala und Coſtarica ſind die beiden Vögelchen beſtimmt, der Volksmund nennt ſie Verdinos.

Der in Guatemala heimiſche Verdino iſt im Muſeum wie folgt feſtgeſtellt und beſchrieben. „Chlorophonia occipitalis; dieſes Vögelchen iſt bekannt unter dem Namen Verdino (Grünvögelchen), es iſt eine Spezialität der Gegenden von Coban und Verapaz.“

Der Verdino iſt von der Größe einer Grasmücke. Männchen am ganzen Oberkörper leuchtend grün, auf dem Kopf einen großen ovalen hellblauen Fleck, Hals, obere Bruſt grün, untere Bruſt bis zum Unterleib leuchtend gelb. An der Bruſt iſt die gelbe Färbung von der grünen durch eine intenſiv ſchwarze 2 bis 3 Millimeter breite Binde getrennt. Vom Nacken nach den Schultern läuft eine ſchmale hellblaue Linie. Auge ſchwarz, Schnabel klein und ſchwarz, Füße grau. Weibchen mit dem Männchen übereinſtimmend, doch fehlt die gelbe Bruſt und die ſchwarze Trennungslinie. Ein Männchen dieſer Art hatte ich geſchoſſen, kann aber nur das präparirte Köpfchen davon einſenden, da der übrige Körper, bevor ich ihn auf der Reiſe abſtreifen konnte, ſchon in Verweſung übergegangen war. Aber immerhin wird die Zeichnung des Köpfchens den Anhaltepunkt zu einer genauen Beſtimmung geben können.

Der Vogel von Coſtarica iſt unter Chlorophonia callophrys beſtimmt. Er iſt etwas größer, wie ſein Guatemaliſcher Vetter, und unterſcheidet ſich außerdem von ihm durch ſeine gelbe Kopfbedeckung. Das Männchen hat ebenfalls die gelbe Bruſt, doch iſt die Trennungslinie dunkelbraun. Beim Weibchen fehlt dieſe ſchöne Bruſtzeichnung. Die Bruſt iſt einfarbig grün, dagegen Bauch und Hinterleib gelb. Die grüne Färbung iſt ſonſt mit dem Vogel von Guatemala übereinſtimmend. Faſſe ich für jeden der beiden Vögel ein charakteriſtiſches Zeichen heraus, ſo hat der Verdino von Guatemala einen blauen Kopfſcheitel, und der von Coſtarica einen gelben. Beide Arten halte ich für Tangaren oder für nahe Verwandte derſelben. Ihre Ernährung beſteht aus Früchten, und in der Gefangenſchaft werden ſie ausſchließlich mit kleingehackten Bananen gefüttert. Im Benehmen ſind beide Arten ebenfalls gleich, in der Vogelſtube ſehr verträglich, ruhig, zahm und zutraulich. In meiner Vogelſtube zählen die Verdinos zu meinen Lieblingsvögeln, und einzelne Thierchen ſind ſo zahm, daß ſie mir, wenn ich komme, auf den Teller gehackter Bananen fliegen.

Geſang iſt nicht vorhanden, die Locktöne ſind ein langgezogenes tiuuu, tiuu, oder bei Erregung, wenn Futter gebracht wird oder ein neuer Gaſt die Vogelſtube bevölkert, ein kurzes bwit, twit. In dem großen Bereich unſerer Stubenvögel haben wir indeſſen eine ganze Menge, denen ſtets eine gute Aufnahme nicht des Geſangs, ſondern der ſchönen Farben und des anmuthigen Weſens wegen geſichert bleibt. Aus dem Grund glaube ich, daß auch dieſe beiden Verdinos eine willkommene Bereicherung der deutſchen Vogelſtuben ſein würden. Allerdings ſo leicht und einfach die Ernährung dieſer beiden Vögel hier auch iſt, da ſie abſolut nur mit Bananen erhalten werden, dürfte die Erhaltung drüben doch etwas Schwierigkeiten machen. Der eifrige Vogelwirth hat indeſſen ſchon ganz andere Anforderungen zu überwinden verſtanden, warum ſollte er nicht auch für dieſe beiden herrlichen Vögel ein geeignetes Erſatzfutter finden können? Ich ſelbſt habe mich darum noch nicht bemüht, da mir die Bananenfütterung ſo bequem und ſo billig iſt, wie kein anderes Erſatzfutter. Sollte es ſich jedoch um die Feſtſtellung von Thatſachen oder um eine Ausfuhr handeln, ſo hätte ich vielleicht hier die beſte Gelegenheit, Verſuche anzuſtellen und würde das auch thun.

Durch die jetzt zwiſchen den Staten und Zentralamerika öſtlicher Küſte eingerichtete Bananenſchifffahrtsverbindung lediglich für die Ausfuhr von Bananen, werden übrigens über kurz oder lang auch nach Europa dieſe Südfrüchte in größeren Mengen billig eingeführt werden können. In Zentralamerika bereitet man jetzt ſogar aus getrockneten Bananen ein Mehl mit angeblich überaus großem Nährgehalt. Vielleicht ließe ſich auch hieraus ein Gebäck herſtellen, welches zur Erhaltung einer größeren Zahl Fruchtfreſſer geeignet wäre.

In großen Mengen oder Trupps ſind die Verdinos nicht anzutreffen. Die Pärchen halten ſich geſondert und beobachten einen beſtimmten Bezirk ihrer Thätigkeit. Nicht daß ſolcher durch Raufereien geſichert würde, ſondern die Ernährungsverhältniſſe erfordern die beobachtete Einrichtung. Die Verdinos ſollen in einem offenen Neſt, welches auf möglichſt flacher Unterlage, einem breiten Baumaſt ꝛc., errichtet iſt, niſten. Die Jungen ſollen in der Färbung den Alten gleichen. Große Flieger ſind unſere Vögelchen nicht; ſie haben ſehr kurze Flügel und ein kurzes, geſchloſſen getragenes Schwänzchen. Ihre Nahrung ſuchen ſie im Strauchwerk umherſchlüpfend. In der Freiheit dienen ihnen hauptſächlich Beren, Kirſchen und dergleichen weiche Früchte zur Nahrung. Den Bananen können ſie mit ihren ſchwachen Schnäbelchen nicht ankommen, wo aber ein Papagei oder ein Trupial eine Bananenfrucht angefreſſen hat, verſuchen ſie an dem Inhalt weiter zu naſchen.

büſche. Die Blätter der Zitterpappeln laufen gelb und roth an, die Eſchen ſchimmern gelblichgrün, und immer mehr und mehr beginnt das Laub von den Bäumen zu rieſeln. Auch die raſtloſe Welt der Inſekten wird täglich kleiner. Der Trauermantel ſchmiegt ſeine karmoiſinrothen, gelbgebänderten Sammetflügel an den weißglänzenden Stamm der Birke. Noch fliegen Käfer, Mücken und Fliegen umher, küſſen die letzten Blumen und freuen ſich der wenigen ſchönen Tage, aber bald ſinkt eines nach dem andern dahin. Ihr kurzes Sommerleben iſt beendet.

Nun würde für unſere liebſten Vögel, für die Inſektenfreſſer, eine gar traurige Zeit anbrechen, wenn die gütige Mutter Natur ſich ihrer nicht annehmen würde. Schon längere Zeit, ehe der Mangel eintritt, werden die von ihm bedrohten Vögel unruhig. Ein heftiger unwiderſtehlicher Trieb füllt ihre kleine Bruſt, ein Trieb, ſo ſtark, daß er manchmal den Vogel tötet, der ihm nicht nachkommen kann.

Dieſer Wandertrieb iſt eines der ſchönſten Geheimniſſe der Natur. Wer ſagt dem Vogel, der erſt im Sommer dem Ei entſchlüpfte, daß der Winter kommt, deſſen Kälte ihn töten und bei deſſen Futtermangel er verhungern müßte? Da werden zwar die verſchiedenſten Auslegungen gegeben, aber wenn wir aufrichtig ſein wollen, ſo müſſen wir geſtehen: „Wir wiſſen es nicht, ja, ich glaube wir können mit dem berühmten Forſcher Du Bois Reymond ſagen: Ignorabimus, d. h. Wir werden es niemals wiſſen.“ Gerade in der Natur gibt es noch viele Dinge, die über den Menſchenverſtand hinaus gehen, über die er wol Hypotheſen aufſtellen, aber keine Spur ihres Beweiſes erbringen kann. Es iſt dies ein zwar empfindlicher, aber doch nützlicher und nothwendiger Dämpfer für unſere modernſten Naturforſcher, die am liebſten alles das leugneten, zu deſſen Erkenntniß der Phosphorgehalt ihres Gehirnes nicht ausreicht.

Betrachten wir jetzt einmal einige der aufgeſtellten Hypotheſen etwas genauer. Da ſagt einer: „Die Erklärung iſt ſehr einfach. Der Vogel iſt ſehr empfindlich für Witterungseinflüſſe, die Temperaturveränderung des Herbſtes zeigt ſich ihm frühzeitig an und bewegt ihn, ſeine Reiſe anzutreten.“ Ja, die Erklärung iſt ſehr einfach, aber der Beweis noch lange nicht. Ein anderer ſagt: „Der beginnende Nahrungsmangel zwingt ſie zum Abzuge“. Beide Erklärungen ſind leicht widerlegt. Die Nachtigal kommt in der erſten Hälfte des Aprils in unſerer Gegend (Rheinland) an und zieht bereits in der erſten Hälfte des Auguſt wieder fort. Im Auguſt iſt nun aber von einer Wetterveränderung wol noch nichts zu ſpüren, und die Nahrung, Fliegen, Mücken, Maden, kurz Inſekten aller Art ſind ſo häufig und zahlreich, daß ſie Menſchen und Thieren das Leben verbittern. Da kann wol von einem beginnenden Mangel keine Rede ſein. Was die Wetterveränderung aber angeht, ſo können die Vögel doch auch wol nichts empfinden, was nicht da iſt. In dieſem Jahre (1899) liegt der Fall wieder ſehr klar. Als die Nachtigal fortzog, herrſchte Trockenheit und Hitze, und jetzt, ungefähr drei Wochen ſpäter iſt die Witterung noch die gleiche. Im vorigen Sommer (1898) begann nach einem ziemlich naßkalten Sommer die Wärme erſt im Auguſt, am 14., 15., 19. und 22. Auguſt ſtieg das Thermometer über 25° Celſius, einen Stand, den es im ganzen Sommer noch nicht erreicht hatte, und hierauf folgte andauernde ſchöne Witterung. Aber die Nachtigal, welche den naßkalten Sommer hindurch nicht an’s Fortziehen dachte, ſie zog nun gerade mit Beginn des ſchönen Wetters davon. Auch der ganze Herbſt blieb warm bis weit in den November hinein, daß aber im Winter ein par ſcharfe Froſttage kommen würden, das konnte die Nachtigal unmöglich im Auguſt ſchon herausfühlen.

Die Gegenprobe ergibt daſſelbe Reſultat. Vor einigen Jahren fiel ziemlich ſpät noch einmal ein tüchtiger Nachwinter ein, der unzähligen Vögeln das Leben koſtete. Dieſelben waren etwa acht Tage früher eingetroffen. Da ſie durch ihren innern Bau ſehr innig mit der Atmoſphäre in Berührung ſtehen, ſo hätten ſie in dieſem Fall ſchlennigſt die Flucht ergreifen ſollen, beſonders diejenigen, die nur bis Italien ziehen, oder ſie hätten ruhig dableiben können, bis auch der Nachwinter vorüber war. Aber nein, der Wandertrieb zwang ſie in die Heimat zurück, und als der Nachwinter kam, da trieb ſie keine Vorahnung in die Flucht, da blieben ſie trotz Nahrungsmangel und Kälte, und gingen eher zu Grund, als daß ſie fortzogen. Und darum behaupte ich, ſelbſt auf die Gefahr hin, ein Finſterling und Reaktionär genannt zu werden: „Ein unwiderſtehlicher Naturtrieb, ein eiſernes Geſetz zwingt den Vogel zu ſeiner Wanderung, zwingt ihn über Berg und Thal, über Wald und Meer bis in die Gefilde, wo er den Winter ſeiner Heimat überdauern ſoll. Und wer hat dieſen Trieb in den Vogel gelegt, wer hat das Geſetz gegeben? Nun, die Frage mag ſich jeder ſelbſt beantworten, die Antwort iſt leicht genug. Daß viele Vögel zu uns zurückkehren, die auch im Sommer in ihrem Winterquartier gut leben könnten, iſt jedenfalls kein Beweis des Gegentheils.

Eine andere Erklärung wurde vor einigen Jahren von mehreren tüchtigen Beobachtern in meiner Gegenwart und als ich eingriff, auch mir gegenüber energiſch vertreten. Dieſe lautete wörtlich: „Die Wanderung der Zugvögel gründet ſich auf eine Summe von Erfahrungen, welche dieſelben im Lauf vieler Generationen geſammelt und übertragen haben“. Recht ſchön ausgedrückt, aber auch dieſe Erklärung ſteht auf ſchwachen Füßen. Die Dachrinnen meines Hauſes kommen an einer Seite in eine Art Trichter zuſammen, und das Waſſer wird von hier aus durch ein gemeinſames Rohr in den unterirdiſchen Regenſarg geführt. In dieſem Trichter baute nun alljährlich ein Starenpar ſein Neſt und verſtopfte dadurch die Röhre. Der erſte tüchtige Regen, der kam, zerſtörte das Neſt und tötete die Jungen. Darauf zogen dann die Stare bis unter’s Dach, und brüteten in einem dort befindlichen Loch ungeſtört. Wie ſehr war ich daher erſtaunt, als daſſelbe Starenpar (das Männchen hatte einen verkrüppelten Fuß) im nächſten Frühjahr wieder in dem Trichter niſtete. Es verlor abermals ſeine Jungen und kam im letzten Frühjahr trotzdem an die alte Stelle zurück. Da machte ich denn dem grauſamen Spiel ein Ende und machte den Trichter mit Drahtgaze zu. Die ſchlechten Erfahrungen dreier Jahre hatten alſo das alte Pärchen nicht einmal ſchlauer gemacht, noch viel weniger werden daher die Jungen von der Summe dieſer Erfahrungen profitirt haben.

In einer Unterhaltungszeitſchrift, deren Namen mir leider entfiel, plauderte eine Dame in wirklich feſſelnder und geiſtreicher Weiſe über denſelben Stoff. Da ſaßen die jungen Schwälbchen auf dem Telegraphendraht, und das Elternpar beſchrieb ihnen den ſchrecklichen Winter (den ſie ſelbſt nicht kannten) und die Gefahren der Reiſe. Angenommen, die alten Vögel kannten den Schrecken unſeres Winters wirklich, ſo würde ich es nicht für unmöglich halten, daß eine Mittheilung ſtattfände, denn daß Thiere ſich untereinander verſtändlich machen können, iſt wol nicht zu bezweifeln. Allein da beweiſen wieder Verſuche, daß der Grund tiefer liegt, daß der Trieb bei Vögeln, die keine elterliche Unterweiſung empfangen konnten, ebenſo ſtark zum Vorſchein kommt. So erhielt ich von einem Ackerer ein Neſt der Feldlerche, welches halb vom Pflug zerſtört war, aber noch zwei unverſehrte Eier enthielt. Ich legte dieſelben einem brütenden Kanarienvogel unter und erhielt auch zwei Junge. Dieſelben wurden von den jungen Kanarienvögeln getrennt, aber in einem Verbindungskorb untergebracht, welcher es dem Kanarienweibchen ermöglichte, auch für die Pflegekinder zu ſorgen. Paſſendes Futter ſtand immer neben dem Neſt und wurde den Thieren ſowol von der Pflegemutter, als ſpäter auch von mir gereicht. Beide kamen denn auch durch. Sie hatten alſo keine Belehrungen von Seiten der Eltern erhalten, auch hatten ſie nicht von generationenlang geſammelten Erfahrungen der Alten profitiren können, aber als die Wanderzeit kam, da begannen die ſonſt ſo ruhigen und zahmen Thierchen unruhig zu werden. Unaufhörlich liefen ſie umher, beſonders bei Nacht, ſtießen klagende Töne aus und geberdeten ſich gerade ſo wie eingefangene Wildlinge, die ſchon die Reiſe mitgemacht. Aehnliche Beiſpiele könnte ich anführen von Waſſerhühnern, von Wildgänſen, die von Hühnern ausgebrütet wurden, und andere derartige Beiſpiele ſind doch wol geeignet, zum Nachdenken anzuregen. Wenn da allerdings noch einer kommt, der derart in ſeine Idee verbiſſen iſt, daß er ſagt: „Die Summe der Erfahrungen u. ſ. w. iſt den Thieren ſo in Fleiſch und Blut übergegangen, daß ſie im Ei weitervererbt wird“, ſo hört jeder ordentliche Disput auf, und man kann nur bedauern, daß der ſo weit entwickelte Menſch nur dumme Säuglinge, anſtatt durch Vererbung junge Doktoren, Profeſſoren, Elektriker und ähnliche nützliche Berufsmenſchen erzeugt. Da ſtehen wir ja weit zurück.

Eine zweite Frage, ebenſo intereſſant aber auch ebenſo dunkel, iſt die: „Wie finden die Vögel den Weg?“ Auch hier iſt die Zahl der Hypotheſen groß, die Beweiſe Null. Außer der eben ſchon beſprochenen „Summe der Erfahrungen“ werden Luftſtrömungen, Erdmagnetismus, ausgezeichneter Beobachtungs- und Ortsſinn u. a. angeführt. Allein einer wirklich eingehenden kritiſchen Muſterung hält keiner dieſer Gründe ſtand. Abgeſehen davon, daß manche Vogelarten, wie z. B. die Taube, wirklich großartige Leiſtungen im Aufſuchen der Heimat leiſten, ſo kann dieſes auf die Zugvögel wenig Anwendung finden. Schon bei dichtem Nebel bleiben auf großen Touren viele Tauben aus, oder kommen erſt nach langem Umherirren wieder zurück. (Auf die Taube will ich ſpäter noch eingehen.) Der junge Kukuk aber macht ſeine Reiſe allein auch ſchon zum erſten Male und findet trotzdem den Weg in ein Land, von dem er keine Ahnung haben kann. Ein Forſcher hatte auf ſeinem Speicher ein Schwalbeneſt, deſſen Junge, auch nachdem ſie ſchon ausgeflogen waren, jeden Abend zum Schlafen zurückkehrten. Wenige Tage vor dem Abzuge der Schwalben ſchloß er das Loch, wodurch ſie ein- und ausflogen und hielt ſie auf dem fliegen- und mückenreichen Speicher gefangen, bis die letzten Schwalben über 8 Tage fort waren. Während dieſer Zeit fing er mit leichter Mühe die zahmen Thierchen und legte ihnen ein dünnes Silberdrähtchen ums Beinchen und ließ ſie 8 Tage ſpäter fliegen. Sie blieben noch einen Tag in der Nähe des Hauſes und ſchoſſen dann pfeilſchnell auf der richtigen Flugbahn nach Süden. Im nächſten Jahre waren von fünf Jungen wieder vier zur Stelle, ſie hatten alſo allein den richtigen Weg gefunden. Eine große Anzahl der Vögel reiſt nur in der Nacht, und ob hell oder dunkel, ſie verfolgen gerade ihren Weg, ohne jemals zu fehlen. Wer da keine höhere Kraft erkennt und mit Gewalt etwas heraus vernünfteln will, der gleicht dem Menſchen, der vor dem Sonnenlicht in den Keller flüchtet, ſich dort ein Oellämpchen anzündet und ſich in deſſen „Strahlen“ ſonnt.

(Schluß folgt.)

Ueber den Fang und die Eingewöhnung junger Körnerfreſſer.

Von Fritz Braun.

Es liegt in der Natur der Dinge, daß der Vogelliebhaber am liebſten von jenen Fällen berichtet, in denen es ihm glückt, eine zarte Vogelart einzugewöhnen oder einen hinfälligen Stubengenoſſen glücklich durch die gefährliche Mauſer zu bringen. Ebenſo ſehr iſt es aber die Pflicht des wahren Vogelliebhabers, jene Fälle nicht zu verſchweigen, in denen es ihm trotz aller Mühe nicht gelang, ſeinen Pfleglingen Leben und Wohlbefinden zu retten. Nur durch die Erfüllung dieſer unangenehmeren Pflicht kann verhütet werden, daß die Vogelliebhaberei in Vogelmord ausartet und eine gemüthvolle Beſchäftigung ſich in eine gewiſſenloſe, egoiſtiſche Vergewaltigung unſchuldiger Lebeweſen verwandelt.

Schon längſt iſt es mir aufgefallen, daß die Sterblichkeit unter meinen jungen, noch nicht vermauſerten Körnerfreſſern eine weit größere war, als unter den älteren Artgenoſſen. Ich bemühte mich deshalb, feſtzuſtellen, ob dieſe Wahrnehmungen der Regel entſprächen. Zu dieſem Ende ließ ich mir im vorigen Jahr und im heurigen Sommer einige Dutzend junger Hänflinge, Zeiſige, Kreuzſchnäbel und Stiglitze kommen. Die Sterblichkeit unter dieſen Vögeln entſprach ganz meinen früheren Beobachtungen und war im Vergleich zu älteren Jahrgängen erſchreckend hoch.

Selbſt die jungen Zeiſige, die Artgenoſſen eines unſerer härteſten Stubenvögel, ſind überaus ſpröde Geſchöpfe. Erhält man die Thierchen aus der Großhandlung, ſo hat ſich wol die Hälfte durch ihr Toben die Kopfhaut zerſchunden und die Federn zerſpleiſt. Der eine oder andere iſt zumeiſt ſchon in der Transportkiſte geſtorben, und unter den übrigen, ſo wild und munter ſie auch noch ſein mögen, halten Auszehrung und typhöſe Unterleibsentzündungen eine furchtbare Ernte.

Manche Liebhaber werden wol einwenden, dies Bild ſei zu ſchwarz gezeichnet; man dürfe ſich nur an eine recht bekannte, renommirte Firma wenden, dann erhalte man beſſere Thiere. Dieſe Behauptung will ich nicht im mindeſten in Zweifel ziehen. Dann behält der reelle Händler die zweifelhaften Geſchöpfe, zumeiſt wol 1/2 bis 2/3 des ganzen Beſtandes, bei ſich zurück und läßt ſie dort ſterben. Damit wird aber an der Thatſache, daß zahlreiche Geſchöpfe nutz- und zwecklos mehr dem Schlendrian als dem Eigennutz geopfert werden, nicht das mindeſte geändert.

Sehr lehrreich war in dieſer Beziehung der diesjährige Vogelbeſtand unſeres Danziger Händlers. Im Juli erhielt derſelbe an 60 junge Zeiſige, die alle wild und beweglich, d. h. anſcheinend geſund waren, wenn ſie auch das altbekannte Charakteriſtikum der wunden Köpfe zeigten. Vielleicht ein Dutzend der Thiere wurde verkauft, die übrigen fielen wie Fliegen, und heute iſt von der lebendigen Schar auch nicht ein einziger übrig.

Faſt ebenſo ſchlimm wie mit den Zeiſigen ſteht es mit den Hänflingen (F. cannabina, *L.*). Ich freute mich oft, wenn ich eine größere Zahl von Jungvögeln beiſammen hatte, über die Anmuth dieſer glatten, ſchmucken Geſellen, die ſich recht leicht zähmen laſſen. Aber nur zu bald ſträubte einer nach dem andern das Gefieder, ſeine Bewegungen wurden kraftlos und matt; Wochen und Wochen dauerte oftmals das matte, elende Dahinſiechen, dann kam der Tod und machte allem ein Ende — die Schwindſucht hatte ihr leidiges Werk verrichtet. Der Kot, mein vornehmliches Merkzeichen bei kranken Vögeln, iſt bei dieſen Thieren in ſeiner Konſiſtenz ziemlich unverändert, nur verwandelt ſich zumeiſt die gelbe Farbe in bleiernes Grau. Setzt man die kranken Vögel in die pralle Sonne, ſo leben ſie wunderbar auf, aber die ſcheidenden Strahlen nehmen auch die Lebensfreudigkeit der Thiere wieder mit ſich fort. So habe ich Sommer für Sommer ungeheure Verluſte unter den Jungvögeln erlitten und ſelten mehr als 1/3 durch die Mauſer gebracht.

Oftmals zweifelten der Händler und meine Freunde die Behauptung an, wenn ich einen Hänfling als Todeskandidaten bezeichnete, der erſt ganz wenig, anderen unmerklich trauerte; leider habe ich bis jetzt immer ausnahmslos Recht behalten. Ein einziger junger Hänfling, der ſchon trauerte, iſt bei mir wieder aufgekommen, aber nach kurzer Gnadenfriſt ging das Thier doch an der Auszehrung zu Grunde.

Anfänglich glaubte ich, ich hätte perſönliches Pech, jetzt weiß ich, daß 3/4 aller jungen Hänflinge dem Tod geweiht ſind. Ich würde es deshalb als unentſchuldbare Roheit bezeichnen, wenn ich jemals wieder junge Hänflinge erwürbe; zudem gehört es nicht zu den Annehmlichkeiten des Daſeins, wenn man zuſehen muß, wie die ſchönen Geſchöpfe vergehen und verkommen.

Bei den jungen Kreuzſchnäbeln und Stiglitzen macht man ähnliche Erfahrungen; ein Verluſt von 1/5 bis 1/4 des Beſtandes gehört ſchon zu den glücklichen Ausnahmen

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß auch von alten Wildfängen der eine oder andere zu Grunde geht, bei guter Behandlung darf der durchſchnittliche Verluſt aber kaum mehr als 10 bis 15% betragen. Andererſeits glaube ich auch gern, daß in der Freiheit ein großer Theil der Jungvögel zu Grunde geht, denn ſonſt müßte ſich ja der Vogelbeſtand ganz auffällig vermehren. Trotzdem möchte ich mich nicht mehr dazu hergeben, ihren Henker zu ſpielen, und ich glaube, Vogelliebhaber werden meine Meinung theilen.

Unſer Altmeiſter Liebe hat ſicher Recht, wenn er den Stubenvogel mit warmen und poetiſchen Worten gegen ſeine Angreifer in Schutz nimmt, aber nichts deſto weniger ſoll man alle Auswüchſe der Vogelliebhaberei mit ihrem wahren Namen bezeichnen. Von den Pfleglingen, die leben und gedeihen, ſpricht der Liebhaber nur allzu gern, über die, welche ein verfrühter Tod von ihren Leiden erlöſte, ſchweigt aber das böſe Gewiſſen. In dem alten Studentenliede heißt es: „Wer die Wahrheit kennt und ſaget ſie nicht, der iſt fürwahr ein erbärmlicher Wicht“; ſollten wir Vogelliebhaber uns nicht dieſes Wort zum Wahlſpruch machen?

Jedem Liebhaber ſteht es frei, alte Wildfänge zu erwerben, die in den allermeiſten Fällen am Leben bleiben und zudem noch beſſer ſingen als jene Jungvögel. Wenn einige Liebhaber eine unſchuldige Freude daran finden, ihrem Hänfling ein par fremde Töne beizubringen und ſich über dieſe Laute mehr freuten als über das ganze Geſchöpf, wie es in ſeiner Harmonie und Vollkommenheit aus der Hand der großen Bildnerin hervorgegangen iſt, ſo läßt ſich mit ihnen über den Geſchmack nicht ſtreiten. Trotzdem ſollten ſie ſich mit ihrem Gewiſſen deshalb abfinden, daß ſie für einen Vogel manchmal vier bis fünf opfern.

Ueber jeden Krammetsvogel erheben die Liebhaber ein wahres Lamento. Sicherlich iſt ihr Zorn berechtigt, aber auch wir ſind in unſerem Recht, wenn wir dem Fange der Jungvögel entgegentreten. Ihr Los iſt noch ſchlimmer als das der Droſſel, die in ihrer Schlinge zumeiſt ein ſchnelles Ende findet.

Auf vogeltolle Originale werden dieſe gutgemeinten Worte ja wol leider keinen Eindruck machen, doch iſt es mir ſchon Lohn genug, wenn ich den einen oder anderen Liebhaber abhalte, ſolche unglücklichen Jungvögel zu erwerben.

Es iſt nicht grade ſchwer, den Krammetsvogelfang zu verdammen und anſtatt der Droſſeln ſich opfermuthig mit einem gebratenen Kücken und friſchen Spargeln zu begnügen; ſchwerer iſt's ſchon, anſtatt eines Dutzend junger Zeiſige ein ſolches alter Vögel für den doppelten Preis zu erwerben; bildet ſich doch zumeiſt der Liebhaber ein, auch jene würden am Leben bleiben.

So wird dann das Experiment von Fall zu Fall wiederholt, der Erfolg bleibt immer derſelbe, ohne daß der optimiſtiſche Liebhaber den Muth hat, ſich zu geſtehen, daß er kein Vogelliebhaber, ſondern ein Vogelmörder iſt. Und dieſen Muth ſollte er doch eigentlich haben.

Briefliche Mittheilungen.

... Unter meinen Stubenvögeln befindet ſich unter anderen ein Dompfaff, von dem zu erzählen ich manches bemerkenswerth finde. Derſelbe theilt den Käfig jetzt mit einem Leinzeiſig und einem Edelfink, nachdem er mir einen Erlenzeiſig durch ſtetes Zerren am Flügel und Herumjagen im Käfig zu Tode gemartert hatte.

Ich bemerkte nun ſchon ſeit einiger Zeit, daß in meinen Dompfaff die Niſtluſt erwachte, und ſuchte daher mit allem Eifer ein Gimpelweibchen zu erhalten. Doch leider gelang es mir trotz aller Mühe nicht zur jetzigen Zeit, eines aufzutreiben.

Nun wagte ich den Verſuch mit einem Kanarienweibchen, kam aber ſchön dabei an, da der Gimpel es ernſtlich bedrohte und umher jagte. Ich gab daher den Dompfaff wieder in ſeinen alten Käfig zurück. In dieſem ereignete ſich nun ein ſehr intereſſanter Fall. Der Gimpel widmete ſeine ganze Aufmerkſamkeit von jetzt an dem Edelfink, einem Männchen. Er rückte ihm immer näher zu Leibe, trug ſein Lied unter den üblichen Schwenkungen vor und fütterte den Fink wie ein Weibchen. Der Fink ſperrte geduldig, ja ich möchte ſagen, verlangend den Schnabel auf und ließ ſich den Futterbrei oder das Fleiſch von Kirſchen oder Heidelberen, oft auch nur zerbiſſene Fichtennadeln ruhig einſtreichen, ja jetzt hüpft er ſogar dem Dompfaff entgegen und begehrt gefüttert zu werden, was dieſer natürlich mit größter Freude beſorgt. Will jedoch letzterer, was meiſtens das Ende vom Lied iſt, Begattungsverſuche ausüben, ſo weiß der Fink jedesmal, auch in noch ſo bedrängter Lage, auszuweichen.

Das iſt eben die ſtete Plage für den Edelfink, da ihn der Gimpel manchmal unausgeſetzt verfolgt. Sieht der Dompfaff ſein fruchtloſes Begehren ein, ſo gibt er endlich nach, ſetzt ſich in eine Käfigecke und lockt ſo anhaltend, daß es einem oft wirklich läſtig wird. Dieſer Vogel iſt jetzt ganz toll und mir thut es immer leid, daß ich ihm kein Weibchen ſeinesgleichen verſchaffen konnte. Vielleicht wäre hier ein Ergebniß zu erzielen, das bei den Dompfaffen ja ohnehin ſo ſchwer zu erreichen iſt. Aber dann würde es gewiß wieder beim Weibchen fehlen.

Arthur Steininger.

... Es wird Sie vielleicht intereſſiren, zu erfahren, daß in dieſem Jahre der Sproſſerzug hier in Petersburg ſehr zahlreich war. Infolgedeſſen haben die meiſten hieſigen Vogelliebhaber einen oder gar mehrere dieſer Sängerfürſten in ihren Käfigen. Wie die Vogelhändler Petersburgs berichten, ſeien auch in verſchiedenen anderen Gegenden zahlreiche Sproſſer durchgezogen, was wol glaubwürdig ſein mag, da ſeit vielen Jahren nicht ſo große Sproſſermaſſen, möchte ich ſagen, auf dem hieſigen Vogelmarkte käuflich zu haben geweſen ſind. Hier konnte man in dieſem Frühjahre ſowohl ſüd- als nordruſſiſche, polniſche und ungariſche Schläger haben. So kaufte ich mir nun im vergangenen Lenz einen nordruſſiſchen Sproſſer. Der Vogel ſchlug bald und blieb bei Fütterung mit friſchen blanken Ameiſenpuppen etwa 4 Wochen im Geſang. Dann verſtummte er. In anbetracht deſſen, daß dieſer Vogel 1) kein Nachtſchläger war, 2) nicht mannigfaltig und laut genug ſang und 3) keinen Fleiß im Geſange zeigte, ließ ich ihn Ende Juni in Freiheit. Jetzt habe ich mir dafür kürzlich einen Frühjahrsfang litthauiſchen Sproſſer angelegt, und bin geſpannt, ob derſelbe meinen ſüdruſſiſchen Sproſſer, den ich bereits lange habe, im Geſang erreichen wird. Genannter ſüdruſſiſcher Sproſſer (er ſtammt aus der Umgegend von Kiew), iſt ein wirklich großartiger und ſehr lauter Schläger, der im letzten Jahre ſeinen Geſang ſchon Ende Oktober aufnahm und denſelben bis Februar fortſetzte. Wahrſcheinlich wird er alſo auch in dieſem Jahre um dieſelbe Zeit zu ſingen anfangen und wenn der litthauiſche Sproſſer auch nächſtens ſeinen Geſang aufnehmen ſollte, ſo werde ich mir erlauben, Ihnen einen eingehenden Bericht über den Geſang beider Sängerfürſten einzuſenden.*)

Leider dauert es ja noch geraume Zeit, bis unſere Stubenſänger uns wieder mit ihren Liedern erfreuen. So bin ich jetzt ganz zufrieden, wenn der eine meiner beiden Baumläufer ſeine beſcheidenen Weiſen trillert. Die beiden Baumläufer ſind meine beſonderen Lieblinge. Der eine iſt z. B. ſo zahm, daß er, wenn er aus ſeinem Käfig gelaſſen wird, zutraulich an mir heraufklettert, um einen Mehlwurm zierlich aus den Fingern zu nehmen. Ich hoffe, daß es mir gelingen wird, dieſe herzigen Tierchen zu durchwintern. Außer dem Baumläufer fängt ſeit einigen Tagen mein kleiner Zwergfliegenſchnäpper an, mich mit ſeinem leiſen Liedchen zu erfreuen. Aber was iſt das im Vergleiche zum Sproſſergeſange! Hermann Grote.

... Ich habe wieder eine neue Art Miſchling und zwar vom Gürtelfink und weißen Mövchen. Die erſten Miſchlinge dieſer Art ſtammten ſeiner Zeit vom Gürtelfink und ſchwarzbunten Mövchen, wie Ihnen wol noch innerlich ſein dürfte, da dieſelben ja auch in Ihren Beſitz übergegangen ſind. Der erſte dieſer neuen Miſchlinge nun hat genau die Zeichnung des Gürtelfinken, nur iſt die Farbe etwas anders, mehr ins Graue ſpielend und er hat eine einzige weiße Feder im ſchwarzen Kehlfleck. Der Zweite hat weiße Federn im Flügel, und zwar ſind dieſes die erſten großen Federn in beiden Flügeln und der Kehlfleck iſt weiß-ſchwarz gerändert; ſonſt iſt er ebenſo gefärbt, wie der erſte. Chineſiſche Zwergwachteln habe ich ebenfalls wieder zwei, aber meine Alten haben wieder nicht gebrütet. Bis zum 27. Auguſt hat die Wachtel nachſtehende Eier gelegt: im Januar 1899 5 Stück, Februar 5 Stck., März 7 Stck., Juni 15 Stck., Juli 20 Stck., Auguſt 22 Stck. Ich glaubte, es wäre zu Ende, aber am 10. September fing ſie wieder an zu legen und hat bis heute ſchon wieder 5 Stück gelegt. Dabei iſt das Weibchen geſund und munter, nur brütet es nicht. Was ich alſo habe, iſt wieder mit dem kleinen Brutapparat ausgebrütet worden. Auch zwei deutſche Wachteln habe ich auf dieſem Wege erhalten, und die Alten haben es ebenſo wie meine Chineſen gemacht; ſie haben ebenfalls in dieſem Sommer über 50 Eier gelegt. Dieſen wurde aber leider keine Gelegenheit zum Brüten geboten. Alſo muß wohl dieſes viele Eierlegen der Wachtel Naturſache und nicht allein in der reichlichen Fütterung zu ſuchen ſein. **W. Stehle.**

Mancherlei

Miſchling von Ceresaſtrild-Männchen und Zebrafink-Weibchen. Oefter bereits ſind Zebrafinken mit Diamantfinken und Amaranten zu Miſchlingszuchten verwandt worden. Jetzt hat Fräulein Stehle ein Männchen des Ceresaſtrilds und ein Weibchen des Zebrafinks gepart und war ſo gütig, uns von den ſo gezogenen Miſchlingen ein Exemplar zu überſenden, deſſen wiſſenſchaftliche Beſchreibung folgendes ergibt: Oberhalb an Hals und Rücken braungrau; Stirn und Oberkopf bräunlich-aſchgrau; Hals und Oberbruſt perlgrau, bräunlich gewellt; Unterbruſt, Bauch und Hinterleib weiß, Flügel braungrau; Flügelſchwingen mit ſehr feinem, weißen Außenſaum; Schwingen 2. Ordnung (Armſchwingen) an der Außenfahne mit breitem weißen Endſaum, Schulterfedern und Flügeldecken mit weißen Endflecken, welche zu Querbändern zuſammentreten; an den Seiten kaſtanienbraune, weißgetüpfelte Färbung; Schwanzdecken ſchwarz, jede Feder mit 3 bis 4 querovalen weißen Bändern; die Steuerfedern ſchwarz, die zwei äußeren jederſeits mit weißen Endſäumen; Schnabel röthlichgelb bis roth; Füße röthlichgelb.

Anfragen u. Auskunft

Herrn A. Schmitt: 1. Wenn Sie aufmerkſam in Dr. Ruß' Buch „Der Wellenſittich“, das Sie ja beſitzen, nachleſen, ſo finden Sie unter „Geſchlechtsunterſchiede“ die Erkennungszeichen von Männchen und Weibchen genau angegeben. Selbſtverſtändlich ſind dieſelben bei den jungen und alten Vögeln in gleicher Weiſe übereinſtimmend zutreffend. 2. Der kleine, gelbhäubige Kakadu iſt in der That ein liebenswerther Vogel, der unendlich zahm und zutraulich wird. Aber es gehört eben bis zur erſten Zähmung, bis er ruhig und geduldig wird, ſehr viel Ausdauer, Liebe und Sorgfalt dazu. Stellen Sie ihn ſo, daß Sie ſich zwiſchen ihm und dem Licht befinden und daß er, wenn möglich von früh morgens bis ſpät abends alles Futter durchaus nur aus Ihrer Nähe holen muß. Dann hüten Sie ſich, ihn jemals im geringſten zu erſchrecken und zu ängſtigen. Nach und nach gewöhnen Sie ihn dazu, daß er Ihnen alle Leckerbiſſen und ſchließlich alles Futter überhaupt aus der Hand nehmen muß. So wird er ganz von ſelbſt zahm.

Frau Th. Weigand: Sie ſind recht berichtet: fünf Jahre ſind für ſolche Vögel wenn auch keine ungewöhnlich lange, ſo doch wenigſtens keine auffallend kurze Lebensdauer.

Herrn Alf. Steiner: Der eingeſandte Vogel iſt leider infolge der Verpackung in einem der Feſtſtellung nicht günſtigen Zuſtande geweſen; es war übrigens eine Hausſchwalbe.

Zu unſerm Bilde.

Zu den fremdländiſchen Vögeln, die vom Glanz der Sage umſtrahlt ſind und in den Dichtungen der Orientalen gefeiert werden, gehört der in Indien, China, Zeylon, den Sundainſeln und einem Theil von Afrika heimiſche Bülbül (Pycnonotus, *Khl.*). Der Name Bülbül bedeutet im Perſiſchen Nachtigal; aber die Vögel ſind den Droſſeln nahverwandt, was aus einer Betrachtung ihres Körperbaues, ihrer Ernährung und ſogar ihres Weſens folgt.

Sie haben meiſt Droſſelgröße. Das Gefieder iſt voll und ſchlicht, von brauner, grauer oder olivengrüner und weißer Färbung, mit ſchwarzen, gelben, rothen oder weißen Abzeichen. Die Flügel ſind lang, und die dritte bis fünfte Schwinge iſt am längſten. Der Schnabel iſt droſſelähnlich, der Schwanz ziemlich lang, gerundet oder gerade abgeſchnitten; die Füße ſind ſehr kurz. Viele Arten tragen eine bewegliche Tolle, die ſie in der Erregung auf- und niederſträuben oder -klappen. Die Nahrung beſteht aus Inſekten und Früchten, auch etwas Sämereien. Die Bülbüls bewegen ſich lebhaft und ſchnell; ihre Bewegungen begleiten ſie mit Gezwitſcher, zirpenden Rufen, die man nur ſelten als Geſang bezeichnen kann. Sie fliegen leicht und anmuthig und ermüden ſchwer, weshalb man ihren Flug dem der Schwalben verglichen hat. Sie wohnen in Waldungen, Dickichten, wol auch Hainen und Gärten, während der Niſtzeit parweiſe, nach der Brut in Familien. Das Neſt iſt ſehr kunſtfertig, meiſt im Dickicht verſteckt. Die drei bis fünf Eier des Geleges wechſeln zwiſchen Grauweiß und Röthlichweiß und zeigen Punkte und Flecke verſchiedener Art.

Die Indier und andere Völker halten die Bülbüls, um ſie für Kampfſpiele abzurichten. Sie nehmen die jungen Vögel recht früh aus dem Neſt, binden dem flüggen Thierchen einen Faden an den Fuß oder ein ledernes Band, an welches ein Faden gebunden iſt, um den Leib, und nehmen es dann mit hinaus in's Freie. Der Vogel wird nun ſo gefüttert, daß er von ſelbſt zurückkehrt, wenn er fortgeflogen iſt. Dieſelben Völker richten den Bülbül auch als Sänger ab, der Strofen aus dem Geſang anderer Vögel aufnimmt und kurze Weiſen nachflötet. Im allgemeinen iſt der Geſang angenehm, aber nicht hervorragend zu nennen.

Zu uns iſt der Bülbül erſt Anfang der ſiebziger Jahre gekommen. Auch jetzt iſt er noch immer eine Seltenheit im Handel; nur drei bis vier Arten ſind häufiger anzutreffen. Und doch wird der Bülbül faſt von ſelber dreiſt, zutraulich und nach kurzer Zeit zahm. Schade nur, daß ſie miteinander nicht Frieden halten können, wodurch es kaum möglich iſt, mehrere Pärchen zuſammen freifliegend in der Vogelſtube zu halten. Dagegen ſind ſie anderen Vögeln gegenüber nicht ſo leicht erregbar. Die Futterbedürfniſſe der Bülbüls ſind gering, dazu ſind die Vögel kräftig und ausdauernd und, wenn ſie erſt eine gewiſſe Zeit nach der Einführung überſtanden haben, leicht jahrelang in gutem Zuſtand zu erhalten.

Der Vogel unſeres Bildes, der **grauſchwarze Himalaya-Bülbül** (Hypsipetes psaroïdes, *Vgrs.*), wird von neueren Vogelkundigen zu der Gruppe der Fluchtvögel gerechnet, die ſich durch ganz beſonders hurtiges und bewegliches Weſen auszeichnen. Er iſt an der Oberſeite dunkelaſchgrau; Zügel, Oberkopf nebſt kleinem Schopf ſchwarz; Kopfſeiten weißlichgrau, unterhalb mit ſchwarzem Strich umzogen; Schwingen an den Spitzen und Schwanzfedern ganz ſchwarz; Unterkörper mattgrau, Hinterleib und After fahler; unterſeitige Schwanzdecken mattgrau, breit weiß gerandet; Schnabel lebhaft roth; Augen rothbraun; Füße roth. Ueber Droſſelgröße (Länge 25,$_5$ cm; Flügel 12 cm; Schwanz 10,$_5$ cm). Bis jetzt iſt dieſe Art bei uns leider noch nicht lebend eingeführt worden. D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Karl Ruß in Berlin; für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Geſangskäſten, [1810]

Geſangsſpinde, Harzer Vogelbauer, liefert (Prsl. fr.) **A. Bothe,** Weddersleben, Harz.



50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,**
[1811] Waren i. Mecklenb.
Proſpekte gratis.

Futtermittel.

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. 1 dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt [1812] ſandfrei.
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

AVOL **Nachtigallen- u Droſſelfutter** (Geſetzl. geſch.)
mit und ohne Karotten
per Pfd. 80 Pfg. 9 Pfd. Mk. 7.20 fco.

Dieſes Futter, — in Folge langjähriger Liebhaberei ſachkundig nur aus beſten Zuthaten hergeſtellt u. nach eingehender probeweiſer Fütterung durch Herrn
Karl Kullmann, Frankfurt a. M.
auf der großen allgem. Geflügel- u. Vogel-Ausſtellung hier mit dem
I. Preis prämiirt
iſt das Beſte, was es für Inſektenfreſſer gibt.

Auf Verlangen Gratisproben an Liebhaber.
Ff. deutſche handbeleſene Ameiſeneier 1899 p. Lit. 70 Pfg., von 10 Liter an franco
F. Grünewald, Offenbach a. M.
— Markt 5. —

[1813]

Univerſales. [1814]

Röbbeckes prämirte **Univerſalfutter-Spezialitäten** ſind die beſten für alle inſektenfreſſende Vögel.

Qual. Extra,	à Ko. 2,60 ℳ	in ½ u.	
„ Prima,	à Ko. 2,— ℳ	¹/₁ Pfd.-	
„ Sekunda,	à Ko. 1,— ℳ	Packet.	

1899er Ameiſeneier 1899er, hochprima Qual., das Feinſte, was es gibt, vollſtändig rein und ſtaubfrei, à Ko. 4 ℳ, 5 Ko. 18 ℳ, **Ameiſeneier,** naturell, à Ko. 2,20, ſtaubfrei 2,60 ℳ, offerirt
Otto Röbbecke, Meerane, Sa., 11,
Sämerei- u. Vogelfutter-Handlg., gegr. 1854.

Mehlwürmer, à Ltr 4 ℳ inkl. Verp.
Bei Einſendung von 1,50 ℳ = 140 gr., alſo **weit über 1000 Stück,** frk. inkl. Verp.
[1815] **P. Bartſch, Breslau,** Flurſtr. 6.

Univerſalfutter

für feinere inſektenfreſſende Vögel, per Kilo (3 Ltr.) 2 ℳ, 1 Ltr. 75 ₰, für Droſſelarten per Kilo 1,60 ℳ, 1 Ltr. 60 ₰. [1816]
J. Nullmeyer.
Vogel- u. Futterhdlg., **Mannheim** G 3, 11.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

Geſetzl. geſchützt. ## „Insectiverous“,

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen **Vogelfutter-Artikel** empfiehlt die
Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. Geſetzl. geſchützt.
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1817]
Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

99er Ameiſeneier,

à Ltr. 80 ₰, 10 Ltr. 7,50 ℳ, **Miſchfutter,** 10 ℔ 2–2,50 ℳ, **Vögel** ꝛc. empfiehlt alle Arten bei ſtreng reeller Bedien. Preisl. auf Wunſch. **J. Götz,** Hofl.,
[1818] **Neuulm (Bayern).**

Alle Vogelfutter,

Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.
E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1819

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[1820] Allein angefertigt von
Ernſt Hanke, Trier, Moſel.
Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Mehlwürmer,

1100 Stck. 1,40 ℳ, 5500 Stck. 6 ℳ, franko und freie Verpackung gegen Einſendung des Betrags. [1821]
Paul Bienzeisler, Tillowitz, O.-S.

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [1822]
Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, **Prag 411, I.**

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 5 ℳ, Kilo 8½ ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,50 ℳ. [1823]
Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Universalfutter.

Vor dem Kennerauge kann eine **Universalfutter-Mischung ohne Zeke** nicht mehr als vollwerthig bestehen.

Einige Jahre fehlte dieses Produkt vollständig am Vogelfuttermarkt, und mancher Liebhaber hätte gern 10 Mk. für ein Kilo bezahlt, wenn er es hätte bekommen können.

Jetzt ist es da!

Gut und billig überall zu haben.
Man verlange ausdrücklich **„Zeke, Marke Amsel“.** [1824]

Rothe 99er Hollunder- u. Ebereſchenbeeren bill. bei **Markert,** Scheibenberg i. S. [1825]

Mehlwürmer, Ia., Ltr. 4 ℳ, Pfd. 3,20 ℳ, **Jeitner, Breslau,** Weinſtr. 12. [1826]

Schleſ. Ameiſeneier,

1. Qual., vorzügl. gereinigt ½ Ko. 1,60 ℳ,

Univerſalfutter,

feinſter Qual., 5 Ko. 5 ℳ,

Droſſelfutter,

feinſter Qual. 5 Ko. 3,50 ℳ,

Mauſerfutter,

für Kanarien und alle Körnerfreſſer, 5 Ko. 3 ℳ,

Sommerrübſen,

beſter, ſüßer, garantirt hederichfrei 50 Ko. 15,80 ℳ, 5 Kilo 1,80,

Vogel-Orgeln,

9tönig, 4 Stücke ſpielend, à St. 10,— ℳ,
9tönig, 6 Stücke ſpielend, à St. 11,50 ℳ,
Zum Anlernen von Papageien, à St. 30,— ℳ,
Es wird ſtets um Bezeichnung des Vogels erſucht, da die Orgeln für jede Gattung eingerichtet werden, auch die zu ſpielenden Stücke können vom Auftraggeber beſtimmt werden.

Hanfquetſchmühle,

ſehr praktiſch für kleinen Privatbedarf, 2,50 ℳ,

Vogelleim,

von ſtärkſter Klebekraft, in Büchſen à 60 ₰ und 1 ℳ, bei mindeſtens 5 Ko. à ½ Ko. 60 ₰.

Netzfalle,

zum Einfangen kleiner Vögel (Meiſen, Stieglitze, Zeiſige ꝛc.) à St. 1,50 ℳ; für größere Vögel (Droſſeln, Amſeln ꝛc.) à St. 2,25 ℳ; für **Tauben, Krähen ꝛc.** à St. 8 ℳ; verſendet gegen Nachnahme, Vogelfutterhdlg.
[1827] **W. J. Knebel** in **Liegnitz.**

Vögel.

Offerire in eingewöhnten, geſunden Exemplaren: [1828]

Singſittiche,	Par	35,—	ℳ
Roſenkopfpapageien,	„	20,—	„
Hirtenſtare	à	4,50	„
Javan. Maina	à	8,—	„
Elſterſtare	à	8,—	„
Afrik. Glanzſtare	à	20,—	„
Afrik. Glanzelſtern	à	24,—	„
Braſilian. Glanzſtare	à	3,50	„
Graue Kardinäle	à	5,—	„
Amerik. Blauheher	à	8,—	„
Braſilian. Blauheher	à	10,—	„
Strichelheher	à	20,—	„
Rieſen-Elſterchen	Par	6,—	„
1 Ind. Heherdroſſel (squamiceps)		35,—	„

H. Fockelmann,
Hamburg, Herrengraben 1.

Suche einen guten **Gelbſpötter,** Mnch., Frühjahrs-Wildfang, zu kaufen. Offert. mit Preisangabe abzugeben unter **M. 5** an „Die gefiederte Welt“. [1829]

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1830]

Prima
Kanarien-Hohlroller,

welche vorzüglich in tiefen, gebogenen u. geraden Hohlrollen, Schockel u. Hohlklingel gehen, verkaufe um zu räumen von jetzt an für nur 5 *M.*, Weibchen 1 *M.* [1831]

F. Unrein, Eiſenberg (S.-Altb.),
Kanarienzüchterei u. Verſandt-Geſchäft.

Geſucht:

Papagei-Amandinen, ſämmtliche 5 Arten, Ringelaſtrilde, Ceresaſtrilde, kl. Kubafinken, Diamantfinken und andere ſeltene ausländ. Körnerfreſſer. Offert. erbittet **J. Daub, Karlsruhe** (Baden), Zollſtr. 2. [1832]

Panzerwels,

100 Stück Callichthys punctatus, 2½ bis 4 cm lang, 60 *M.* oder tauſche gegen gute Schleierſchwänze oder Teleskopſchleierſchwänze. [1833]

J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.)

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 *M.* Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft. Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [1834]

Ausgezeichnete **Harzer Kanarienſänger,** hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1835]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Citronenzeiſig

(Zitril), Dutz. 21 *M.*; Stück 2,50 *M.*, Par 4 *M.*, **rothe Dompfaffen,** Dutz. 24 *M.*, St. 2,50 *M.*, Par 3,25 *M.* u. ſ. w., alle Vögel ſichtbar verpackt. Dieſe zwei Sorten liefere bis Ende November. Antw. Marke beifügen. [1836]

Beck's Vogelhandlung, Stuttgart.

Junge Wellenſittiche,

Stück 2,50 *M.* **L. Brinkmann,**
[1837] **Calefeld** in Hannover.

[1838]

Geſucht:

Granataſtrilde, Buntaſtrilde, dreifarbige Papageiamandinen u. ſeltene ausländ. Finken.

J. Beedzler, 20 Norton Folgate, London (Engl.).

Suche **Singſittiche** einzeln und parweiſe zu kaufen. [1839]

Goldbeck, Prediger, **Liebſtadt** (Oſtpr.).

Grau-Papageien (Jakos),

kräftige, ſtarke, recht geſunde, junge gelehrige Thiere, à Stck. nur 75 *M.*, ſolche ſchon 8 Wochen hier, Stück nur 20 *M.*, einige ſchon ½ Jahr in Europa, nur 30 und 35 *M.* Solche ſchon viel ſprechend, 60, 80, 100 und 150 *M.*, je nach Leiſtung. Junge **Blauſtirn-Amazonen, Rothbug- und Surynam-Amazonen** anf. zu ſprechen, nur 20 *M.*, ſolche ſchon ſprechend, 30, 40 bis 150 *M.*, je nach Leiſtung. **Tigerfinken,** rothe, Par nur 1,50 *M.*, zahme amüſante **Affen,** Stck. nur 20 und 25 *M.*, der ſchönſten Arten. **Papageienkäfige,** neueſter Façons, ſchon von 4 *M.* an, ſtets auf Lager. Verſandt gegen Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. [1840]

F. Rejsek, Hamburg, Peterſtraße 28,

Specialität: **Papageien.**

Kanarienhähne

meines mit Ehrenpr., Gold. u. Silb. Med. präm. Hohlrollerſt. von 8 bis 25 *M.* Probe u. Garant. **Th. Börner,**
[1841] **Kaſſel,** Gartenſtr. 3 I.

Suche:

1 bulgariſche Nachtigal, 1 Gebirgsſchwarzköpfchen, nur prima Sänger u. perfekt. **P. Frank,**
[1842] 4 Greenheys Road, **Liverpool.**

Alpen-Stiglitz-Männchen,

Dtzd. 10 *M.*, Schwarzplatten, echte Doppelüberſchläg., à Stck. 4 *M.* Verſende nur gut eingew. Vögel u. Gar. leb. Ank. [1843]

Wilhelm Fechtner, Leitmeritz a. d. Elbe.

Zu meinen

Ernährungsverſuchen

hat mir Herr **Rejsek in Hamburg,** Peterſtr. 28, beſonders kräftige, geſunde Papageien geliefert, welchen Umſtand ich gebührend hervorheben muß. [1844]

Mülhauſen, den 29. September 1899.

Dr. med. W. Otto.

Verk. verſetzungshalb. ſofort:

Jahrg. 95, 96, 97 u. 98 der „Gef. Welt" für 5 *M.* **1 Amſel** 5 *M.* **1 Singdroſſel** 8 *M.*, beide im Geſang. **1 Schwarzkopf** 4 *M.* **2 gr. Droſſelkäfige,** einfach aber ſolid gearbeitet, 3 u. 4 *M.*, **1 Mehlwurmhecke** mit gutem Abſatz 4 *M.*, 10 Ltr. trockne **Ameiſenpuppen,** à Ltr. 60 ₰. [1845]

J. Mayer,
Sonnenberg b. Kronweiler.

Verk. zu je ⅔ d. Ankaufspr. od. tauſche: **Ruß, Fremdl. Stubenvögel I** (27 *M.*), **Einheim. Stubenv.** (6 *M.*), **Prachtf., Vogelzuchtb. Amazonen.** [1846]

Schwarzmann, Eſſing, P. Olching b. München.

Der

Deutſche Geflügelhof

Abonnement vierteljährlich 75 Pfg.

Inſerate: die einſpaltige Zeile 15 Pfg.

Amtliches Organ des Sonderausſchuſſes für Geflügelzucht der Landw. Kammer für die Prov. Brandenburg und der demſelben angeſchloſſenen Vereine.

Redaction:
Bruno Dürigen, Charlottenburg.

Der „Deutſche Geflügelhof" bringt alles Wiſſenswerthe auf dem Gebiete der landw. Nutzgeflügelzucht, ſowie rationellen Tauben- und Kaninchenzucht, auf den Sport dabei gebührend Rückſicht nehmend, belehrende Artikel für den Anfänger, Beſchreibungen und Abbildungen.

Probenummern koſtenlos durch die Geſchäftsſtelle

Otto Koobs Verlagsanſtalt,
Forſt i. L.

Für Aquarienliebhaber!

Im unterzeichneten Verlage erſcheint

Blätter für Aquarien- und Terrarienfreunde

herausgegeben von **Dr. E. Bade.**
(Monatlich zwei Nummern!)
Preis: halbjährlich Mk. 2.50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandl.
in **Magdeburg.**

Wir offeriren solange der Vorrath reicht:

Ornithologische Briefe

Blätter der Erinnerung an seine Freunde

gesammelt von

E. F. von Homeyer

statt zu 8 Mk., zu nur 1.80 Mk.

und bitten von diesem vortheilhaften Angebot Gebrauch zu machen. Versendung erfolgt gegen Einsendung von 2 Mk. (zuzüglich 20 Pf. für Porto).

Creutz'sche Buchhandlung (Max Kretschmann)
in **Magdeburg.**

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung, ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823). Preis vierteljährlich 1 Mark 60 Pfg. Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Begründet von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Alliancestraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Beſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 41. Magdeburg, den 12. Oktober 1899. **XXVIII. Jahrg.**

Dr. Karl Ruß.

(Geb. 14. Januar 1833, geſt. 29. September 1899.)

Sein Entwicklungsgang, vornehmlich als Schriftſteller.

Geſchildert von Erich Bleich.

Ich will verſuchen, mit überſchauendem Blick und in gedrängter Kürze Leben und Wirken deſſen zu vergegenwärtigen, der bis zuletzt gerade für dieſe Wochenſchrift wirkte und dachte. Ich will es verſuchen, faſt durchaus ſchöpfend aus dem, was gedruckt vorliegt; denn ſeine Schriften ſind durchſetzt von ſeiner Perſönlichkeit, Leben und Schriftſtellerei durchdrangen ſich bei ihm.

I.

Sein erſtes Auftreten in der Oeffentlichkeit iſt mit dem Tode Alexander von Humboldts im Jahre 1859, wenn auch nur äußerlich, verknüpft. Denn er feierte in Verſen den Hingang dieſes Altmeiſters der deutſchen, beſſer der europäiſchen Naturwiſſenſchaft; und er erzählte gern, wie dieſes dichteriſche Talent, verbunden mit glühender Begeiſterung für die Naturforſchung und deren höchſtſtehende Vertreter, ihm den erſten Erfolg eingetragen habe.

In den ſechziger Jahren entfaltete er dann eine rege Thätigkeit als Naturſchilderer und Verbreiter naturwiſſenſchaftlicher Kenntniſſe. Er veröffentlichte in zahlreichen Zeitſchriften und Zeitungen ſo viel Artikel und Feuilletons, daß die in den Jahren 1865—68 erſcheinenden wohlgeordneten Sammlungen ſieben Bände anfüllten. Es ſind dies: „In der freien Natur“, 1. und 2. Reihe; „Meine Freunde“; „Durch Feld und Wald“; „Natur- und Kulturbilder“; „Naturwiſſenſchaftliche Blicke ins tägliche Leben“; „Rathgeber auf dem Wochenmarkte“. Zum größten Theile waren es Schilderungen aus der Pflanzen- und Thierwelt, fußend auf den geſicherten Ergebniſſen der beſchreibenden Naturwiſſenſchaften, umkleidet und durchleuchtet von dem Zauber eigener ſinniger Beobachtung, vorgetragen in dem ſchlichten, edlen Tone wahrer Volksthümlichkeit und immer mit kunſtverſtändiger Hand zum lebenswahren, farbenſatten Bilde gerundet. Die heimiſche Vogelwelt, unſere eigenthümlichſten Bäume und Pflanzen, Freunde und Feinde unter den Vierfüßern, aber auch Fiſche und Ringelthiere werden hier, ſtets mit liebevollem Eingehen, einer genauen Betrachtung unterzogen. Immer wieder ertönt die ernſte Mahnung, daß ohne eindringende Kenntniß eine wahre Zuneigung zur Natur und ihren Geſchöpfen nicht beſtehen könne, daß ohne vorurtheilsfreies allſeitiges Betrachten ein richtiges Abſchätzen nach Nützlichkeit und Schädlichkeit nicht möglich ſei. Zu dieſem Erkennen*wollen* anzuregen, dieſe Liebe immer bewußter werden zu laſſen, dazu ſollten dieſe Schilderungen für jedermann dienen. Und in der That ſind ſie wohlgeeignet, ſo recht hinauszulocken in die freie Natur und mit offenen Sinnen das geſchäftige Leben und Treiben ihrer Geſchöpfe betrachten, das bunte Weſen und Weben der umgebenden Welt kennen zu lehren. Sind ſie doch lebhafter Erinnerung an den eigenen engen Umgang mit der Allmutter entſprungen, ſind ſie doch ein freudig-wehmüthiger Nachhall ſchöner naturbeglückter Knaben- und Jünglingsjahre. Die Saaten des Lebensfrühlings erblühten und reiften hier zu den Früchten der beginnenden Mannesjahre. Wer die Natur aus eigener Anſchauung kennt, wird gern zu dieſen Büchern, z. B. „In der freien Natur“, greifen, um Selbſtgeſchautes durch die Kunſt dieſer Feder im eigenen Innern wieder aufleben zu laſſen. Vorzüglich ſind es auch hier ſchon die Vögel, und zwar die der Heimat, welche in ihren Hauptvertretern vorgeführt werden, hineingeſtellt in ihre naturgemäße Umgebung. Ihr Freileben wird geſchildert und ihre Bedeutung für den Naturhaushalt erörtert. Bedauernd ertönt die Klage über das Zurückgehen der Singvögel und der oft wiederholte Ruf: Schutz den Vögeln! Sie waren ihm ja ans Herz gewachſen, „ſeine Freunde“, alle dieſe lieblichen, anmuthigen und dabei ſo nützlichen Geſchöpfe. Er kannte ſie von früheſter Jugend, als er die Kinderjahre dort auf der Waſſerſcheide Pommerns und Weſtpreußens verlebte, in dem kleinen Städtchen, ſeiner Geburtsſtadt Baldenburg, in ſeenreicher Umgebung und auf waldbekränzten Höhen. Hier war ſein Vater Apotheker, gerade wie ſein Großvater auch. Früh zu kleinen Dienſten verwandt, entſchloß er ſich, den väterlichen Beruf zu ergreifen. Als Proviſor in mancher Stadt und manchem Städtchen Nordoſtdeutſchlands thätig, dazwiſchen in Berlin eifrig den Studien obliegend, vermißte er je länger, je mehr ein Etwas in ſeinem Daſein; die Träume des Knaben und das Schwärmen des Jünglings, das ſehnliche Verlangen nach einem weiten Wirkungskreiſe und ehrebringender Anerkennung gewannen immer feſtere Geſtalt: ein Schriftſteller wollte er werden und die großartigen Ergebniſſe der neueren Naturforſchung in populärer Form an ſeinem Theile verbreiten helfen. Die Fähigkeit fühlte er in ſich, an Fleiß und Eifer ließ er's nicht fehlen, und in freudigem, nie erlahmendem Ringen hatte er, eben ein Dreißiger, erreicht, was er wollte.

Aus einem Apotheker kann alles werden, pflegte er zu ſagen. Aus ihm war ein anerkannter, vielgeleſener Schriftſteller geworden; allein der Apotheker und die Studien, die er als ſolcher gemacht hatte, wirkten nach in ſeinen Schriften. So benutzen ſeine „naturwiſſenſchaftlichen Blicke ins tägliche Leben“ die Fortſchritte der Chemie und Phyſik ſehr glücklich für die Erklärung der allergewöhnlichſten Vorgänge in Küche und Haus. Sie ſind für die Frauenwelt beſtimmt und haben das Beſtreben, die rein mechaniſche Thätigkeit am Herd, wie im Haushalte überhaupt, in eine vernünftige, klarbewußte überzuführen. Das Vergnügen am Wiſſen wollte er wecken und ein durch den Geiſt geregeltes Handeln. Wie er die Nützlichkeit eines Thieres nicht nach Ausſehen und verbreiteten Meinungen bemaß, ſondern lediglich nach ſeiner Stellung im ganzen großen Haushalt der Natur und nach unbefangener Werthung, ſo zog er mit muthigem Eifer gegen allen Schwindel der Geheimmittel zu Felde und legte die Werthloſigkeit der dazu verwandten Miſchungen bloß. Seine Kenntniſſe in der Heilmittellehre ſowie ſeine mediziniſchen Studien wurden ſpäter von nicht geringer Wichtigkeit, indem ſie ihn in Stand ſetzten, die betreffenden Theile ſeiner Werke über fremdländiſche Stubenvögel mit Sach- und Fachkenntniß zu behandeln und als glücklicher Vogelarzt einen großen Ruf zu genießen.

Er war ein freier Geiſt, unbeirrt durch die Feſſeln des wiſſenſchaftlichen, politiſchen oder ſozialen Vorurtheils. Er ſtand z. B. der Frauenfrage ſympathiſch gegenüber und war ein Begünſtiger der freiheitlichen Entwicklung ſeines Volkes. Hierin wie in der Liebe zu ſeinem deutſchen Vaterlande ſtimmte er mit Roßmäßler überein, dem Lehrer, dem väterlichen Freunde, dem ſchriftſtelleriſchen Vorbilde. Er beſchrieb Land und Leute mancher Gegend nach ſeiner Erfahrung, und immer wieder gab er charakteriſirende Darſtellungen des heimiſchen Naturverlaufes, ſei es nach einer beſtimmten Seite, wie dem Auftreten kennzeichnender Vögel, ſei es nach allen beſtimmenden Merkmalen, wie ſie Wetter, Thiere und Pflanzen an die Hand geben. Zweimal hat er dieſes heimiſche Naturleben im Kreislauf des Jahres zum Gegenſtande ganzer Werke genommen: „Durch Feld und Wald“ führt uns das frühere vom Jahre 68, welches in jahreszeitlicher Anordnung das Leben und Wirken unſerer Natur in lebensvollen Bildern entrollt, während das ſpätere vom Jahre 89, das „Jahrbuch der Natur,“ in monatlicher Gliederung zunächſt einen kurzen, die Haupterſcheinungen und -vorgänge des betreffenden Monats darſtellenden Ueberblick gibt, um dann, mit Unterſtützung von anerkannten Fachgelehrten, peinlich genau alle Verhältniſſe der Pflanzen- und Thierwelt, auch ſoweit ſie vom Menſchen beeinflußt werden, zu verzeichnen: ein mit unendlichem Fleiß angelegtes, vielen praktiſchen Zwecken dienliches Werk, für welches dem Verfaſſer auch die Jagdliebhaberei früherer Jahre von weſentlichem Nutzen war. Es iſt eine knappe Zuſammenfaſſung und wiſſenſchaftliche Verarbeitung aller der ſchönen und nützlichen, vielſeitig anregenden Bücher der ſechziger Jahre.

In denſelben achtziger Jahren, bevor er das Jahrbuch ausarbeitete, beendigte er ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit auf einem andern, ſeit lange gepflegten Gebiete: er ſchuf ſein Werk über die „Vögel der Heimat“, worin alle Reſultate der vielfältigen Beobachtungen und Studien in ſyſtematiſcher Zuſammenſtellung gegeben wurden. Aber es war ihm nicht genug, bloß das trockene Gerippe der Gattungen und Arten ſchablonenmäßig auszufüllen, ſondern er verſuchte einleitend das Vogelleben nach allen ſeinen Beziehungen in natürlicher Folge zu ſchildern, die einzelnen Lebensbilder mit aller Kunſt der Beſchreibung auszugeſtalten und in den beigegebenen, nach ſeiner Anordnung gemalten Farbenbildern die Hauptvertreter unſerer Vogelarten nach ihrem Erſcheinen bei uns oder ihrem beſonders auffälligen Hervortreten in dieſer oder jener Jahreszeit gewiſſermaßen als Helden zu faſſen, auf welche man das Augenmerk richten müſſe, um ein dem Leben einigermaßen entſprechendes Bild des Naturverlaufes in allen einzelnen Phaſen zu bekommen. Daß die wiſſenſchaftliche Gruppirung der Vögel ihren zureichenden, beſonders anatomiſchen, dem Bau entnommenen Grund habe, glaubte er anerkennen und berückſichtigen zu müſſen, wenn er ein wiſſenſchaftliches Werk liefern wollte; daß aber dieſe der Wiſſenſchaft natürliche Zuſammenſtellung recht oft eine Trennung und Sonderung des örtlich und zeitlich Verbundenen herbeiführe und keine Anſchauungen wecke, wußte er ebenſowol, und es entſprach durchaus ſeinem geſunden Sinn, wenn er dieſen Mangel der wiſſenſchaftlichen Gliederung, zumal für ein weiteren Kreiſen zu dienen beſtimmtes Buch, durch prächtige, die Wirklichkeit künſtleriſch nachahmende Bilder aufzuheben dachte. Die Vögel leben nicht ſo zuſammen, wie ihr Bau und ihre Geſtalt es

ſehr raſch beendet und die Jungen ſcheinen frühzeitig ihre Selbſtändigkeit zu erlangen. Ein mir bekanntes Neſt enthielt zwei Eier, und zehn Tage ſpäter waren ſchon befiederte Junge darin, welche, durch meine ihnen zugewandte Neugierde veranlaßt, aus dem Neſt hüpften und im hohen Graſe verſchwanden. Auf meinem Rückweg wollte ich das leere Neſt mitnehmen, war aber nicht wenig erſtaunt, die jungen Vögel wieder darin vorzufinden, welche bei meiner Beſichtigung abermals davoneilten. Das warme Bett habe ich natürlich den beiden Vögeln gelaſſen. Acht Tage ſpäter war alles leer, und das Neſt hatte durch einen Regenſchauer inzwiſchen ſo gelitten, daß ich es nicht einmal mehr für meine Sammlung gebrauchen konnte. — Mehrere Pärchen niſten dicht nebeneinander. Bevorzugte Niſtgelegenheiten bilden dichte Geſträucher in unmittelbarer Nähe bebauten Landes. Namentlich mit dornenartigem Gebüſch bewachſene Feldraine beherbergen förmliche Kolonien dieſes kleinen Finken.

Den ganzen Tag iſt der Jakarinifink thätig, wenngleich er auch ſtets ſein Thun und Treiben dem Auge des Menſchen zu verbergen ſucht, wozu ihm die ausgedehnten Zacate-Felder die beſte Gelegenheit bieten. Zacate iſt ein Hirſegras, vermuthlich Panicum miliaceum, welches ausſchließlich zur Grünfütterung von Großvieh in ergibiger Weiſe angebaut wird. Der Schnitt erfolgt, wenn das Gras 50 bis 60 cm erreicht hat und zu ſchoſſen beginnt. Dieſe grünen Getreide-Haine ſichern dem Jakarinifink den molligſten Aufenthalt. Nach Art der Feldſperlinge, welche drüben die Getreidefelder plündern, fliegen die aufgeſcheuchten Vögel davon, um in einiger Entfernung wieder einzufallen. Mit anderen kleinen Vögeln lebt der Atlasfink geſellſchaftlich und namentlich ſcheint mit dem kleinen Morellet's Pfäffchen ganz beſondere Freundſchaft zu beſtehen. Gegen das Frühjahr zeigt der Vogel, wenigſtens die Männchen, ein eigenthümlich unruhiges Weſen; er beginnt ſein Liebesſpiel, das trotz der fortgeſetzten Einförmigkeit hoch intereſſant anzuſehen iſt, wenn es gelingt, den Vogel in unmittelbarer Nähe beobachten zu können. Unermüdlich fliegt er ruckweiſe hoch und kommt ſtets auf denſelben Standort wieder zurück, dabei ſein wenig begabtes Stimmchen hören laſſend. Raufereien zwiſchen den einzelnen balzenden Männchen konnte ich nicht beobachten.

Die Nahrung des Jakarinifinken beſteht aus kleinen Sämereien, zartem Grün, aber auch aus Beren, anderen weichen Früchten und Inſekten. In der Gefangenſchaft erhält er nur Kanarienſamen, und, da letzterer hier ſehr theuer iſt (das ſpaniſche Pfund = 460 gr koſtet 60 bis 70 Pfg.), wird er nur wenig im Käfig gehalten. Seines Geſangs wegen wird der Atlasfink allerdings kaum Anſpruch auf einen Käfigvogel machen können, dagegen aber hat er ſo viel andere Vorzüge, daß er dem größten Theil der Prachtfinken gleichgeſtellt werden kann. Seine Ernährung iſt die denkbar einfachſte, ſein Weſen munter und zutraulich. Stets befindet er ſich in gutem Gefieder, und das Männchen macht in ſeinem metallglänzenden ſchwarzen Kleid einen vornehmen Eindruck.

Die Einfuhr dieſes kleinen Finken nach Deutſchland iſt weder regelmäßig noch zahlreich, demzufolge fordert man immer einen verhältnißmäßig hohen Preis für das Pärchen. Wie jedoch heute die Verhältniſſe im Verkehrsweſen liegen, iſt es nicht ausgeſchloſſen, daß auch der Jakarinifink eines Tags in größerer Anzahl eingeführt wird. — Als ich dem Negrito zum erſten Mal begegnete, war ich zunächſt betroffen und glaubte, nicht gleich an dieſen denkend, den ſtahlblauen Widafink vor mir zu haben, erſt bei näherer Betrachtung des ſchwarzen Schnäbelchens und der dunklen Füße wurde mir der richtige Name vorſtellig.

Der Atlasfink iſt ja wol den verehrten Leſern hinlänglich bekannt, ſodaß es mir unnöthig erſcheint, ſein Gefieder eingehend zu beſprechen. Das Männchen iſt am ganzen Körper metalliſch glänzend tief dunkelblau, nur am Flügelrand befinden ſich einige weiße Federchen, welche vielfach durch überliegende Federchen verdeckt ſind. Die in Panama dagegen angetroffenen Jakarinifinken hatten dieſe unbedeutende weiße Zeichnung nicht. Das Jugendkleid iſt dunkelbraungrau melirt. Der Farbenwechſel der jungen Männchen geht noch im Herbſt vor ſich und zwar infolge der Mauſer, die nachfolgenden Federchen ſind glänzend dunkelblau. In dieſer Uebergangsperiode ſehen die jungen Männchen geſcheckt und bunt aus. Das einmal verfärbte Männchen behält ſein glänzendes Gefieder für Lebenszeit und der Glanz nimmt durch Wohlbefinden und Alter etwas zu. Das Weibchen iſt unanſehnlich graubraun, an der Kehle und am Unterleib etwas heller. Hier wird das Weibchen vielfach mit anderen kleinen Vögelchen verwechſelt, was auch der Grund ſein mag, daß man hier immer nur Männchen kaufen kann, die Weibchen dagegen ſehr ſelten und nur zufällig von den Vogelfängern gebracht werden.

Zum Schluß will ich es nicht unerwähnt laſſen, daß der Jakarinifink auch im Muſeum von Coſta Rica in zwei Exemplaren, ♂ ♂ juv., unter Volatinia splendens vorhanden iſt, und von hier als ſein Verbreitungsgebiet Mexiko, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Coſta Rica, Panama, Colombia, Venezuela und Guayana bezeichnet wird.

(Fortſetzung folgt.)

Das Wandern der Zugvögel.

Von M. Dankler.

(Schluß).

Doch laſſen wir jetzt dieſe Fragen einmal bei Seite und beſchäftigen uns lieber mit den Einzelheiten der Wanderung, die ja für jeden Vogel- und Naturfreund von beſonderm Intereſſe ſein müſſen. Wie reizend iſt es ſchon, die Vorbereitungen zur Reiſe zu beobachten. So ging ich am vorigen Sonnabend

(9. Sept.) durch die alte Sörs der Stadt Aachen zu. Zu beiden Seiten ſchoſſen Schwalben laut zwitſchernd, in der Richtung meines Weges, ohne daß ich auch nur eine entgegenkommende bemerkt hätte. Dagegen hörte ich bald eine tauſendſtimmiges Gezwitſcher, und bei einer Biegung des Weges ſah ich plötzlich ein wunderhübſches Bildchen. Da ſaßen tauſende der hübſchen Vögel mit ihren ſtahlblauen Reiſekleidchen auf den Telephondrähten und hielten eine jedenfalls wichtige Berathung ab. Es ging aber gar nicht parlamentariſch dabei zu, ſondern ſie ſchwatzten und zwitſcherten alle kunterbunt durcheinander. Dann ward es ſtiller. Nun löſte ſich von einer Ecke eine Schar von etwa 30 Stück, flog pfeilſchnell in die Ebene, kreiſte dort ein parmal, und dann kehrten ſie auf ihren Platz zurück. Gleich darauf löſte ſich eine Schar aus der Mitte, machte daſſelbe Manöver und kehrte ebenſo ſchnell zurück. So ging es wol eine Stunde lang fort, dann noch einmal ein allgemeines, lautes Gezwitſcher, und nun ſchoſſen nach allen Seiten größere und kleine Trüppchen davon, jedenfalls ihren Heimatdörfern zu. Derartige Verſammlungen kann man noch bei manchen Vogelarten beobachten, ſie finden beſonders gerne auf hohen Dächern, Bäumen, Thürmen und im Schilf und Röhricht der Seen und Flüſſe ſtatt. Sind die Vorbereitungen beendet, ſo verſchwindet eine Vogelart nach der andern aus der Gegend, bis endlich nur die Strich- und Standvögel zurückbleiben. Bei einiger Aufmerkſamkeit können wir beinahe täglich diesbezügliche Beobachtungen anſtellen, täglich können wir größere oder kleinere Scharen von Wandervögeln ihrem fernen Ziele zuziehen ſehen. Zu allererſt ziehen in hieſiger Gegend die Segler, nämlich in den erſten Tagen des Auguſt (entweder in der Nacht vom 3. auf den 4., oder vom 4. auf den 5. Auguſt). Dann ziehen von den Schwalben (aber erſt über einen Monat ſpäter) die Ufer- und Hausſchwalben und dann die Rauchſchwalben. Die Schwalben ziehen am liebſten in ſternhellen Nächten und zwar von der Morgen- bis zur Abenddämmerung. Sie legen in einer Nacht ungeheure Strecken zurück, da ſie in einer Stunde, je nachdem der Wind günſtig oder ungünſtig iſt, 10 bis 12 Meilen machen. Die gange Reiſe, von Deutſchland bis Afrika, legen ſie in 5 bis 6 Tagen zurück, wobei noch Raſttage oder Aufenthalt infolge ungünſtiger Witterung eingeſchloſſen ſind. Nach den Berechnungen eines franzöſiſchen Forſchers und Beobachters, eines Kaufmanns, der durch ſeine Handelsfreunde in den verſchiedenſten Städten unterſtützt wurde, machte ein beſonders großer Zug Schwalben im Jahre 1897 die weite Reiſe in vier Tagen. Die Schwalben fliegen auf der Reiſe in dichten Schwärmen. Andere Vögel bilden mehr oder weniger regelmäßige Figuren. Die Kraniche, fälſchlich Schneegänſe genannt, bilden das bekannte offene Dreieck, Gänſe und Enten fliegen entweder in ſchrägen oder ſchnurgeraden Reihen. Der europäiſche Ibis zieht in einer unregelmäßigen Wellenlinie, die ſich oft wie ein ſchwarzer Faden am dunklen Himmel hinzieht, während Finken und Strandläufer in dichten Scharen ziehen. Die Schar der Auſternfiſcher iſt lichter und wechſelt raſch ihre Form. Die Schnepfe ſtreicht bei ihren Wanderungen beinahe lautlos über dem Boden hin, die Sumpf- und Waſſerhühner fliegen in geringer Höhe und zwar immer Nachts, von Waſſer zu Waſſer, während der Storch in ſolcher Höhe zieht, daß er dem unbewaffneten Auge entſchwindet.

Das Ziehen bei Tag und Nacht hat auch wieder ſeine beſonderen Gründe. Bei Nacht ziehen nämlich beſonders die ſchlechten Flieger unter den Vögeln, und von den gutfliegenden Vögeln nur die Inſektenfreſſer, die zur Aufſtöberung ihrer Nahrung längere Zeit nöthig haben, ſo z. B. der Kukuk, die Nachtigal und der Wiedehopf. Dieſe Inſektenfreſſer fallen mit dem Morgengrauen in waldiges Gelände ein und beginnen ſofort ihre Nahrung aufzuſuchen. Darauf folgt Ruhepauſe zur Erholung, wieder eine gute Mahlzeit und darauf ſitzen die Wanderer noch eine Zeitlang ruhig, um zu verdauen, ehe ſie mit dem hereinbrechenden Abend die Reiſe wieder fortſetzen. Die ſchlechten Flieger, wie z. B. die hühnerartigen Vögel (Waſſer- und Sumpfhühner, Wachteln) fliegen auch aus Sicherheitsgründen nur in der Nacht, da ſie dadurch leichter ihren Feinden aus dem Thierreiche, beſonders den Tagraubvögeln, entgehen.

Die Körnerfreſſer unter den Vögeln ziehen dagegen durchgehends am Tage, wenigſtens alle diejenigen, die gut fliegen. Sie machen aber regelmäßig eine Stunde vor Sonnenuntergang Halt und haben ſo noch genügend Zeit, an ihrem Ruheort für Nahrung zu ſorgen. Von den Schwalben wird ſogar behauptet, ſie zögen Tag und Nacht und erhaſchten im Fliegen die nöthige Nahrung, doch dürfte dies wohl auf einem Irrthum beruhen, da eine ſolche Leiſtung ſelbſt für Schwalbenflügel zu arg wäre. Daſſelbe wird von den Störchen berichtet, iſt aber ebenfalls unwahr. Daß die Schwalben Ruhe- und Freßpauſen eintreten laſſen, kann jeder beobachten. Wenn z. B. heute die Schwalben fortgezogen ſind, und keine mehr zu ſehen iſt, ſo ſchwärmen ſie vielleicht morgen oder übermorgen wieder in größeren Scharen. Die abgereiſten Schwalben des Ortes, der Gegend ſind aber keineswegs noch einmal zurückgekommen, ſondern es ſind Schwalben, die aus mehr nördlich gelegenen Gegenden kommen und auf dem Durchzuge begriffen ſind. Dieſe Erſcheinung aber zeigt auch zugleich, daß der Wandertrieb die Vögel derſelben Art auch zu gleicher Zeit erfaßt, daß ſie alle zu gleicher Zeit abreiſen und ſo nacheinander die einzelnen Gegenden paſſiren.

Eine ſehr ſeltene Beobachtung konnte ich im Jahre 1893 im Baaler Bruch machen. Dort fand ich an einem ſchönen Herbſtabend, als ich das Bruch nach Nachtſchmetterlingen abſuchte, eine Lichtung, auf welcher ſich in dem Augenblicke, als ich ſie betreten wollte, fünf große Vögel niederließen. Im erſten Augenblicke dachte ich an Reiher oder Kraniche, allein bei genauerm Zuſehen ſah ich, daß es Störche waren. Dieſelben wateten leiſe klappernd durch den Sumpf und ließen ſich die hier ſehr zahlreichen Fröſche prächtig ſchmecken. Nachdem ich ihren gravitätiſchen Bewegungen bis zum Einfall gänzlicher Dunkelheit zugeſehen hatte, ſchlich ich leiſe fort. Am anderen Morgen war ich noch vor dem erſten Morgengrauen wieder zur Stelle, jedoch war nichts mehr vom Freund Langbein zu entdecken.

Digitized by Google

Wilde Enten und Gänſe ſcheinen die Nacht ſchwimmend zu verbringen. Die Art und Weiſe, wie dieſes geſchieht, konnte ich auf den großen Weihern bei Alsdorf beobachten. Dort fiel mir an einem Herbſtabend ein ſchräger ſchwarzer Strich auf, der ſich ſchnell auf die Weiher zu ſenkte und bald einfiel. Da es ziemlich hell war, konnte ich die einzelnen Thiere noch gut unterſcheiden, und ſie als die Saatgans (Anser segetum) feſtſtellen. Nachdem die Thiere erſt eine halbe Stunde im Schilf verweilt hatten, blieben ſie in einer ziemlich regelmäßigen Reihe im offenen Waſſer liegen, und nach kurzer Zeit ſchienen ſie feſt zu ſchlafen. Eine leichte Brieſe wehte über den Weiher, und ich dachte, die Thiere würden in kurzer Zeit ans Land treiben. Allein dieſes geſchah nicht, vielmehr blieben ſie beinahe unbeweglich an einer Stelle liegen. Ein kaum hörbares und ſichtbares Plätſchern und Kräuſeln des Waſſers in ihrer Nähe aber zeigte, daß die Thiere auch im Schlaf noch ſoviel ruderten, daß ſie nicht ans Land getrieben wurden. Im letzten Jahre endlich konnte ich auch einen unſerer Kleinvögel beobachten, wie er ſeine Reiſe antrat. Da bemerkte ich ſpät im Herbſt an den Ufern der Inde eine ſo große Anzahl Bachſtelzen, wie ich nie zuvor zuſammen geſehen. Das nickte und pickte, ſchwirrte und flirrte vor lauter Stelzen, hunderte von Schwänzchen waren in Bewegung, und hunderte feiner Stimmchen ließen ſich dazwiſchen hören. Allmählich rückten die Thierchen nun mehr und mehr zuſammen, bis ſie zuletzt einen richtigen Klumpen bildeten. Nun auf einmal vollſtändige Stille, auch kein Laut mehr zu hören, der Abflug, die Reiſe begann. Stelze auf Stelze erhob ſich, bis die ganze Schar eine ſchnurgerade Linie bildete, die ſich aber ſo ſchnell erhob und höher ſtieg, daß ſie in wenigen Minuten dem Auge entſchwunden war, beſonders da es ſchon ſtark zu dunkeln begann.

Von einem unſerer hieſigen Vögel aber können wir ſagen, er wandert rein zu ſeinem Vergnügen. Dieſes iſt der Buchfink. Von dieſen muntern Sängern ziehen in jedem Jahr eine große Anzahl Weibchen und Männchen nach Süden. Der größte Theil davon bleibt in Europa, andere aber ziehen bis Nordafrika. Sie bleiben dort in größeren Geſellſchaften zuſammen und ſtreifen meiſenartig umher, um Futter zu ſuchen.

Eine ſehr große Anzahl Männchen (ich habe aber auch in mehreren Wintern einzelne Weibchen beobachtet und gefangen) aber bleibt unſeren Gegenden treu und zieht auch im Winter nicht fort. Nur verlegen ſie ihren Aufenthaltsort in die Nähe der Dörfer, und ſchlagen ſich mit den Spatzen redlich durch den Winter. Von den ſüdwärts gezogenen kommen zuerſt die Männchen, dann einige Wochen ſpäter die Weibchen zurück.

Verfolgt man mit ſcharfem Fernrohr die Vogelflüge eines Herbſtes, ſo wird man finden, daß an einem Tage all' die wandernden Vogelſcharen in einer hohen, an einem andern Tage, daß ſie in einer viel tiefern Region ziehen. Dieſes geſchieht nun ebenfalls nicht zwecklos. Die Vögel ziehen in der Luftſchicht, welche ihnen einen leichten Gegenwind bietet.

So bieten die Wanderungen unſerer Zugvögel dem Naturfreund ein reiches Feld zur Beobachtung, auf dem noch vieles unklar iſt und zur Forſchung reizt. Es iſt eine Einrichtung im weitverzweigten Haushalt der Natur, die wir anſtaunen, aber nur ſchwer begreifen wollen.

Und wenn wir Gelegenheit haben, Beobachtungen über dieſes Wandern zu machen, ſo verſchließen wir ſie nicht in's Notizbuch allein, ſondern machen ſie bekannt, denn nur aus einer ſehr großen Summe von Beobachtungen, geſammelt zu verſchiedener Zeit, unter verſchiedenen Bedingungen und in verſchiedenen Gegenden, laſſen ſich ſichere Schlüſſe ziehen.

Die Blaudroſſel (Monticola cyanus, *L.*).

Von Fr. Anzinger.

Der formenreichen Unterfamilie der Droſſeln (Turdinae) wird durch die vereinfachende Syſtematik der Vögel Mitteleuropas auch eine nur zwei Arten umfaſſende Gattung von befiederten Gebirgsbewohnern beigezählt, deren Vertreter ſich von den eigentlichen Droſſeln in Geſtalt und Weſen in mancher Hinſicht ebenſo unterſcheiden, wie die gleichfalls beigezählten Erdſänger- und Schmätzer-Arten. Es ſind dies die Blaudroſſel (Monticola cyanus, *L.*) und die Steindroſſel (Monticola saxatilis, *L.*).

In einzelnen ornithologiſchen Werken finden wir die erwähnten zwei Arten unter dem Gruppennamen „Felsſchmätzer“ vereinigt, und zwar rangirt die Blaudroſſel unter die „Blaumerlen“ (Petrocossyphus) und die Steindroſſel unter die „Steinmerlen“ (Petrocincla). Da aber die Blaudroſſel ebenſogut eine Steinmerle genannt werden kann wie die Steindroſſel und mit Rückſicht auf ihren Aufenthalt zur Führung des deutſchen Schriftnamens „Steindroſſel“ noch mehr Berechtigung hat als jene, da ferner der Gattungsname „Steinſchmätzer“, welcher wieder eine eigene Vogelſippe in ſich vereinigt, mit dem Gattungsnamen „Felsſchmätzer“ ſinnverwandt iſt, ſo reſultirt aus einer ſolch ſinnverwandten Namengebung viel eher eine Begriffsverwirrung, als eine ſachgemäße, wenigſtens Geſtalt oder Farbe des Vogels präziſirende Bezeichnung. Mir ſind auch unzählige Fälle bekannt, in welchen beſcheidene Liebhaber zwiſchen dieſen gleichartigen Bezeichnungen nicht zu unterſcheiden wußten. Meines Erachtens dürften die Namen „Blau- und Rothmerle“ für die zwei unſern Erdtheil bewohnenden Steindroſſelarten behufs ihrer Unterſcheidung genügen. Bei uns im Gebirge iſt Monticola saxatilis unter dem Namen „Steinröthel“ (im Volksmund Stoanreatl) und Monticola cyanus unter dem Namen „Paſſerl“, abgeleitet von dem italieniſchen „Passero solitaria“, bekannt. Die Bezeichnungen „Einſiedler“ und „Einſamer Spatz“, welche manchmal fälſchlich auf den Steinröthel angewendet werden, beziehen ſich auf die letztere Art. Siehe auch die italieniſche Bezeichnung.

Aus der Biologie dieſer beiden Vögel ſollen hier nun jene Momente mitgetheilt werden, welche für die eigentlichen Vogelliebhaber in Betracht kommen, und zwar zunächſt, ſoweit es die Blaudroſſel betrifft, während über den Steinröthel bei ſpäterer Gelegenheit berichtet werden ſoll.

Das Verbreitungsgebiet der Blaudroſſel erſtreckt ſich vom ſüdöſtlichen Mitteleuropa über Süd- und Oſteuropa, Klein- und Mittelaſien, Himalaya, bis zur Oſtküſte von China. Als nördlichſte Verbreitungsgrenze für Tirol wird Klauſen im Eiſackthal angeſehen. Wo ſich in ſolchen Gegenden von Pflanzenwuchs entblößte, kahle, weißgraue Gebirgsmaſſive von dem tiefen Blau des ſüdlichen Himmels abheben und über dem öden Geſtein ein ewiges Schweigen gebettet liegt, dort hat der „Einſiedler“ ſeine eigentliche Heimat. In dieſen Gebirgen iſt er nicht ſo hoch zu treffen, wie ſein Vetter, der Steinröthel, in den bewaldeteren Bergen ſeiner Heimat, findet ſich auch in vegetationsarmen Mittelgebirgen, und verbreitet ſich von da aus, vorausgeſetzt, daß er nicht beunruhigt oder gar verfolgt wird, auch in die angrenzende Ebene, wo er dann auf hochragenden Gebäuden ſeinen Standort wählt und dort brütet. Auf einem Kirchthurm der ziemlich geräuſchvollen Stadt Bozen brüteten die Blaudroſſeln lange Zeit hindurch und holten ſich ihre Atzung aus den nahen Weingärten. Durch die überhandnehmenden Amſeln aus denſelben verdrängt, verließen ſie auch ihr altes Heim am Kirchthurm.

Mit Rückſicht auf dieſe Iſolirtheit und das außerordentlich ſcheue und flüchtige Weſen des Vogels iſt es wol wenigen Vogelfreunden vergönnt, deſſen Geſang im Freien zu belauſchen, um auf dieſe Weiſe einen richtigen Eindruck hierüber erhalten und demnach auch ein entſprechendes Urtheil fällen zu können. Dies erweiſt ſich vom Standpunkt der Vogelliebhaberei aus um ſo mißlicher, als gegenwärtig faſt durchwegs dem Neſt entnommene und aufgepäppelte Vögel und im beſten Fall nur junge Herbſtwildfänge in den Handel gelangen. Von ſolchen Paſſerln iſt eben geſanglich nichts zu erwarten als ein unfertiges Einerlei oder gar ein eingelerntes, drehorgelartiges Geleier, und in dieſen Fällen kann der Laie höchſtens zu der Ueberzeugung gelangen, über welche Stimmmittel das Paſſerl ungefähr verfügt und wie herrlich dieſelben in einem vollſtändigen, urwüchſigen Naturgeſang zur Geltung kommen könnten. Eine weitere Kenntniß des echten Blaudroſſelgeſanges bleibt ihm entzogen.

Iſt ſchon der Fang eines ältern Vogels dieſer Art mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden, das Männchen meiſt nur am belegten Neſt zu überliſten und in dieſem Fall nur dann am Leben zu erhalten, wenn die Jungen ausgehoben und behufs Atzung mit in die Gefangenſchaft gebracht werden, ſo reſultirt aus der Eingewöhnung eines Blaudroſſelwildfanges im Allgemeinen ein Stück Arbeit, welchem der Südländer infolge ſeiner Indolenz und armſeligen Knauſerei nicht gewachſen iſt. Er verlegt ſich alſo auf das bequemere Neſterausnehmen, päppelt die Jungen mit den primitivſten Futterſtoffen ſoweit auf, daß ſie transportfähig ſind und verkauft dann den ganzen Neſtinhalt, alſo Männchen und Weibchen zuſammen um einen niederen Preis, gewöhnlich 3 bis 5 fl. ö. W. Da ſolche Vogelfänger ſchlimmſter Sorte einerſeits den Neſtraub ziel- und planlos betreiben*), ohne darauf zu ſehen, ob die Jungen von einem guten Sänger abſtammen und andererſeits keinen Lehrmeiſter halten, von welchem die Neſtlinge etwas erlernen könnten, ſo wird es wol einleuchten, daß ſolche in den Handel kommenden Vögel nicht anders als völlig werthlos ſein können.

Hieſige ſpekulative Vogelwirthe ließen ſich deshalb ſ. Z. ſolche Neſtlinge aus Südtirol kommen, pflegten ſie aufmerkſam, gaben ihnen fremdartige aber ausgeſucht gute Lehrmeiſter mit getragenen Geſangsweiſen, wie Amſel, Steinröthel und Rothkehlchen und erzielten theilweiſe hübſche Erfolge. Das Vertrauen an die Leiſtungsfähigkeit der Paſſerln war aber ſchon geſchwunden, und man hatte Mühe, die ſolcherart gelernten Vögel an den Mann zu bringen.

Der urwüchſige Geſang der Blaudroſſel iſt kräftig, ja in einzelnen Parthien noch lauter als bei unſerer Amſel, was der meiſt höheren Lage des Stimmtones zu Grunde liegt; die Tonfiguren ſind umfangreicher, die Strofen länger, die hierfür verwendeten Lautſilben aber kürzer gehalten und mehr gehäuft als bei jenem Sänger. Schöne, volle Flötentöne, in eine deutliche, einſchmeichelnde Melodie gekleidet, wechſeln mit eigenartigen rätſchenden oder gurgelnden Kehllauten, und es wird hierdurch eine ziemlich große, wenn auch nicht durchgehend gleichwerthige Abwechslung erzielt. Zwiſchen den einzelnen Strofen finden ſich entweder faſt gleichlange Pauſen, oder dieſelben werden durch ein leiſe flüſterndes Gezwitſcher miteinander verbunden. Der Geſammteindruck des Geſanges iſt, namentlich im Freien, wo die ſcharfklingenden, konſonantenreichen Beigaben mehr verſchwinden, ein wunderbar ſchöner und trägt, trotz der einzelnen getragenen Weiſen, den Stempel eines lebhaften, friſchen Charakters.

Von einem Paſſerl, das als guter Sänger gelten ſoll, muß alſo Kraft und Wohlklang der Stimme, eine größere Zahl in ihrer Verſchiedenheit leicht trennbarer Strofen mit flott durchlaufender Melodie und zudem die Eigenſchaft verlangt werden, daß die verſchiedenen Motive nicht zu oft hintereinander wiederholt, ſondern in ſchöner Wechſelfolge gebracht werden. Fließen auch die obenerwähnten, weniger angenehmen Beigaben häufig mit ein, ſo wird ſie der vernünftige Liebhaber, bei ſonſt wechſelvollem Lied, gern mit in den Kauf nehmen und an ihnen keinen Anſtoß finden.

Durchwegs verſchieden von ſolch werthvollen Sängern zeigen ſich die im Handel erhältlichen jungen

---

*) Dieſem blindwüthenden, ſchmutzigen Verfahren iſt es zuzuſchreiben, daß in manchen Bezirken Südtirols dieſer ſchöne Vogel ſchon faſt ganz ausgerottet iſt. Bereits in den achtziger Jahren beklagte ſich der Naturgeſchichtsprofeſſor A. Bonomi in Rovereto über die rapide Abnahme der Blaudroſſel im Trentino.

Paſſerln, über deren Können ich mich bereits oben andeutungsweiſe geäußert habe, hier aber noch Einiges hinzufügen muß.

Von vielen Vogelkennern wird die Behauptung ausgeſprochen, daß junge Singvögel der Schule der Alten abſolut nicht bedürfen, vielmehr ihren Geſang in ſeiner ganzen Vollſtändigkeit mit zur Welt bringen und ihn ſpäter ohne jede Beihülfe vervollkommnen. Dies iſt nur zum Theil richtig. Allerdings iſt jedem Singvogel-Männchen der ſeiner Art eigenthümliche Geſang ſchon angeboren, und eine junge Nachtigal z. B., welche ohne Geſellſchaft eines Vorſchlägers im Käfig aufgezogen wurde, wird gewiß auch die von jeder Nachtigal am meiſten zu Gehör kommenden Schläge bringen, der mit Verſtändniß Horchende wird aber bald herausfinden, daß der Geſang keine vollkommene Durchbildung, die einzelnen Strofen nicht die reine Prägung und das richtige Zeitmaß haben. Ein ſolcher Vogel wird, und mag er noch ſo lange im Käfig gehalten werden, nie jenen Geſangswerth erhalten, wie ein mehrjähriger Wildfang. Man wird vielleicht einwenden, daß dies nur in der Gefangenſchaft, nicht aber im Freien der Fall ſei. Dieſem gegenüber könnte ich einige Beiſpiele anführen, würde aber hier zu weit damit kommen.

Zeigt ſich die vorangeführte Wahrnehmung im Allgemeinen, ſo ſcheint ſie bei aufgezogenen Paſſerln im Beſonderen Geltung zu finden, denn unter denſelben gibt es ſo armſelige Stümper, daß deren Werth als Stubenvogel wirklich in Frage kommt.

Erhält der Liebhaber einen jungen Einſiedler in noch vollkommen rohem Zuſtande, d. h. bringt ſolch ein Vogel noch nichts Anderes als beſcheidene Anklänge an ſeinen Naturgeſang, ſo darf er ihn jedenfalls noch höher ſchätzen als einen ſolchen, welcher Bruchſtücke aus dem Liede anderer minderwerthiger Sänger erborgt, oder von ſeinem Pfleger ein fades, abgedroſchenes Muſikſtück oder einen gemeinen Gaſſenhauer pfeifen gelernt hat. Solche Kunſtpfeifereien bleiben im Gedächtniſſe des mit Nachahmungstalent übrigens nicht beſonders begabten Paſſerl merkwürdigerweiſe viel leichter haften, als Vogellieder-Kopien, werden vom Vogel den lieben langen Tag hindurch mit beſonderer Konſequenz vorgetragen und können auf dieſe Weiſe überaus läſtig fallen.

(Schluß folgt.)

Anfragen u.
Auskunft

Herrn H. Sauerland: Ein Pärchen Pflaumenkopfſittiche können Sie mit den zwei Pärchen Wellenſittiche in einer Stube zuſammen vortrefflich halten und mit beſtem Erfolg züchten.

Fräulein E. Feldt: Ueber den Werth der Blaurake (Coracias garrula, *L.*) als Stubenvogel urtheilen die meiſten Vogelpfleger ungünſtig. Alteingefangene ſind wild und ungeberdig, jung aufgezogene werden zwar zahm, erlangen aber nicht die ſchönen Farben, zeigen ſich gefräßig und unbeweglich. Dagegen ſind ſie im Flugkäfig mit anderen Vögeln verträglich und können hier auch ihr naturgemäßes Weſen entfalten. Füttern Sie Ihren Vogel anfangs reichlich mit Mehlwürmern neben allen zu erlangenden Inſekten und gewöhnen Sie ihn dann an ein Droſſelfutter, alſo Ameiſenpuppengemiſch, überrieben mit Möre oder Gelbrübe, dazu gehacktes rohes, mageres Fleiſch, Quarkkäſe u. dergl. Gibt man das Miſchfutter allein ohne Zugabe von vielen Mehlwürmern u. a. Inſekten oder Fleiſch, ſo ſtirbt die Blaurake an Abzehrung.

Zu unſerm Bilde.

Zu den gewöhnlichſten Erſcheinungen des Vogelmarkts gehört der Tirika- oder Blumenauſittich (Brotogerys tirica, *Gml.*). Dennoch, und trotz einzelner hervorragender Eigenſchaften, wie leichte Zähmbarkeit, Ausdauer in der Gefangenſchaft und Sprachbegabung, erfreut ſich dieſer Schmalſchnabelſittich bei uns keiner beſonderen Beliebtheit, weil er zeitweiſe ein arger Schreier iſt. Da aber ſeine Züchtung mehrfach geglückt iſt und gezüchtete Vögel ſich nicht nur am beſten zur Sprachabrichtung eignen, ſondern auch mit dem fortſchreitenden Unterricht das arge Geſchrei unterlaſſen, iſt es möglich, die bisher ziemlich werthloſe Vogelart in eine werthvolle zu verwandeln.

Der Tirikaſittich iſt ſchon ſeit altersher bekannt und von den älteſten Schriftſtellern auf dieſem Gebiete beſchrieben worden. Er erſcheint an der Stirn hellgrasgrün, an der ganzen übrigen Oberſeite dunkelgrasgrün; erſte Schwingen längs der Schaftmitte dunkelblau, an der Innenfahne breit grauſchwarz, die nächſten Schwingen an der Innenfahne abnehmend weniger grauſchwarz, die übrigen einfarbig grün; alle unterſeits düſtergrün; Deckfedern der erſten Schwingen dunkelblau, Flügelrand gelbgrün, kleine unterſeitige Flügeldecken grünlichgelb; die äußeren Schwanzfedern an der Innenfahne gelbgrün; alle unterſeits ſchwärzlichgrün; Wangen und ganze Unterſeite hell grasgrün; Schnabel röthlichfleiſchfarben, Spitze faſt weiß, Wachshaut grauweiß; Auge braun; Füße bräunlichfleiſchfarben. Das Jugendkleid iſt graulichgrün; Flügel faſt reingrün; Flügeldeckfedern bräunlichgrün. Es gibt auch Abarten (mit gewelltem Gefieder, gelben Flügeln u. a.) In der Größe ſteht er einer Droſſel gleich (Länge 26 cm; Flügel 10,$_4$ bis 12,$_4$ cm; Schwanz 10 bis 12,$_6$ cm).

Die Heimat des Tirikaſittichs erſtreckt ſich über Braſilien und Guyana. Im Küſtenwaldgebiet Braſiliens iſt er gemein, aber er kommt in ganz Braſilien vor, und wo der Wald an Pflanzungen grenzt, ſieht man nicht ſelten vielköpfige Schwärme verſchiedener Arten von Keilſchwanzſittichen und unter ihnen dieſe Schmalſchnäbel. Jede Art hält ſich in der Schar geſondert für ſich. In dem gewaltigen Lärm, welche alle zuſammen verurſachen, hört man die ſchrillen Rufe der Tirikaſittiche noch beſonders heraus. Des Schadens wegen, welchen ſie am Mais und an allerlei anderen Nutzgewächſen verurſachen, verfolgte man ſie früher eifrig mit Schußwaffen; in neuerer Zeit bilden ſie einen bedeutſamen Handelsgegenſtand. Sie werden daher in mancherlei Weiſe gefangen und gelangen alljährlich in mehr oder minder großer Anzahl nach Europa. Leider werden ſie von der Heimat aus gewöhnlich unzweckmäßig verpflegt, nur mit zerſtoßenem Mais und in Waſſer aufgeweichtem Brot gefüttert, welcher erſtere in den Schmutz geworfen und welches letztre nicht ſelten ſauer geworden iſt; wenn ſie trotzdem nach der anſtrengenden Reiſe von den verſchiedenen Provinzen Braſiliens bis Rio de Janeiro und dann nach der Ueberfahrt bis Hamburg oder London lebend ankommen, ſo iſt das doch ein Beweis dafür, daß ſie zu den ausdauerndſten unter allen Papageien gehören. Dies iſt in der That richtig, denn man hat ſie bei uns auch bereits mehrfach im ungeheizten Raum überwintert.

Als Fütterung gibt man ihnen vorzugsweiſe Kanarienſamen, Hanf (wenig) und Hafer (viel), und wenn völlig eingewöhnt, ein wenig Zugabe von guter Frucht (beſonders Apfel) und Biskuit oder erweichter, ausgedrückter Semmel oder eingeweichtem Eierbrot.

D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,

Papageikäfige,

Eichhornkäfige,

Zuchtutenſilien,

alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1873]

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [1874]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [1875]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, **Prag 411, I.**

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 4,25 ℳ, Kilo 7,75 ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ. **Ameiſeneier,** hochprima 99er, Liter 90 ₰, **Weißwurm,** Liter 90 ₰. [1876]

Louis Conrad, Elberfeld, Düſtr. 45.

Alle Vogelfutter,
Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig,
Königsplatz 7.

Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche. Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1877

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**

Mehrfach prämiert! Höchſte Auszeichnungen!
[1878] Allein angefertigt von

Ernſt Hanke, Trier, Moſel.

Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Mehlwürmer, à Ltr. 4 ℳ inkl. Verp. Bei Einſendung von 1,50 ℳ = 140 gr., alſo weit über 1000 Stück, ſel. inkl. Verp. [1879] **P. Bartſch,** Breslau, Flurſtr. 6.

99er Ameiſeneier,

à Ltr. 80 ₰, 10 Ltr. 7,50 ℳ, **Miſchfutter,** 10 ℔ 2—2,50 ℳ, **Vögel** ꝛc. empfiehlt alle Arten bei ſtreng reeller Bedien. Preisl. auf Wunſch. **J. Götz,** Hofl.,
[1880] **Neuulm (Bayern).**

Univerſales. [1881]

Röbbeckes prämirte **Univerſalfutter-Spezialitäten** ſind die beſten für alle inſektenfreſſende Vögel.

Qual. Extra, à Ko. 2,60 ℳ | in ½ u.
„ Prima, à Ko. 2,— ℳ | ¹⁄₁ Pfd.-
„ Sekunda, à Ko. 1,— ℳ | Packet.

1899er Ameiſeneier 1899er,

hochprima Qual., das Feinſte, was es gibt, vollſtändig rein und ſtaubfrei, à Ko. 4 ℳ, 5 Ko. 18 ℳ, **Ameiſeneier,** naturell, à Ko. 2,20, ſtaubfrei 2,60 ℳ, offerirt

Otto Röbbecke, Meerane, Sa., II.
Sämerei- u. Vogelfutter-Handlg., gegr. 1854.

Univerſalfutter

für feinere inſektenfreſſende Vögel, per Kilo (3 Ltr.) 2 ℳ, 1 Ltr. 75 ₰, für Droſſelarten per Kilo 1,60 ℳ, 1 Ltr. 60 ₰. [1882]

J. Nullmeyer.
Vogel- u. Futterhdlg., **Mannheim** G 3, 11.

Mehlwürmer, Ia., Ltr. 4 ℳ, Pfd. 3,20 ℳ. Jeitner, Breslau, Weinſtr. 12. [1883]

Vögel.

Sonnenvögel, Mnch., à Stck. 7 ℳ

Kl. Alexanderpapageien, St. 4,50 ℳ
Graaköpf. Zwergp., à P. 3, 6 P. 18 „
Wellenſittiche, Zuchtpare, à Par 6 „
do. jüngere, à Par 5 „
Paradis- u. Dominik.-Wittwen, in Farbe, à Par 4 ℳ, 4 Par 14 „
Atlasfinken in Pracht, à P. 2,50 „
Aſtrilde, Silberbecks, Tigerfinken, Bandfinken, Helenafaſänch., Blutſchnabelweb. P. 2 „
Tigerfinken, à Par 1,50, 5 Par 6,50 „
do. in Farbe, à P. 2, 5 P. 9 „
Hartlaubzeiſige, à P. 4, à Mnch. 3 „
Elſterchen, Goldbrüſtel, [1884]
Orangebäcks, à Par 2,50 ℳ
Oryxweber in Pracht, à Mnch. 6 „
Pretrês Amazonen, ſelten, à Mch. 40 ℳ.
Südamerik. Spottdroſſeln, à M. 25 ℳ
Mövchen, gelb u. braunbt, à P. 3 „
do. weiß, à P. 6 „
Reisfinken, grau, à P. 2,50, 5 P. 10 „
Rothköpf. Inſeparables, à Par 9 „
Nymfenſittiche, à Par 10 „
Gould's Amandinen, à P. 22, Wb. 11 „
Mönchsſittiche, à Par 9 „
Weiße Reisfinken, à Par 8 „
Calif. Schopfwachteln, à Mnch. 5 „
Chineſ. Zwergwachteln, à Mch. 4 „

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Alpen-Stiglitz-Männchen,

Dtzd. 10 ℳ, Schwarzplatten, echte Doppelüberſchläg., à Stck. 4 ℳ. Verſende nur gut eingew. Vögel u. Gar. leb. Ank. [1885]

Wilhelm Fochtner, Leitmeritz a. d. Elbe.

---

1 P. ſchwarzkehl. Laufhühnchen

15 ℳ, diverſe Wellenſittiche à 2,50 ℳ, alles ſelbſtgezogen, hat abzugeben [1886]

Jaeger, Apotheker, **Dieburg.**

Wellenſittiche,

Par 6 ℳ. **L. Brinkmann,**
[1887] **Calefeld** in Hannover.

Kanarien-Vorsänger!

Vorzügliche tieftourenreichſte, noch nie zur Zucht benutzt und flott durchſingend, nach Geſangsgüte à 12, 15, 20, 25 und 30 ℳ, noch in großartiger Auswahl da. Verſandt überallhin gegen Vorherkaſſe oder Nachnahme mit voller Garantie für Werth, Geſundheit und Probezeit.

[1888] **Julius Häger,**
St. Andreasberg (Harz).

Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864.
Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Steinröthel

7 ℳ, einſamer Spatz 10 ℳ, Schwarzplattl 2,50 ℳ, gar. Männchen Stiglitz, Bluthänflinge, Dtz. 10 ℳ, Weibchen 5 ℳ, Buchfinken, Dtz. 6 ℳ, rothe Dompfaffen, Dtz. 20 ℳ, blaue 4 ℳ, Zwergohreule 3 ℳ, Schneemäuſe, Par 10 ℳ, Röthelfallen à 5 ℳ, ſchw. Axolotl 5—7 Mon., 10 Stck. 3 ℳ, Grottenolme, Stck. 3 ℳ, prachtvolle Goldfiſche, 100 Stck. 3—6 ℳ, Mehlwürmer, Ltr. 4 ℳ. Schlangen, Echſen liefert unter Garantie [1889]

G. Findeis, Wien I., Wollzeile 25.

Gebe ab: Ein ſchönes Zuchtpar Nandayſittich, 12 ℳ, ein Roſella-Männchen, ſehr ſchön, 16 ℳ, ein Alexander-Weibchen, à 2 ℳ. Hochländer Trompeter-Hähne, 7 ℳ. Suche Pennantſittich-Weibchen und ein Zuchtpar Singſittich. [1890

Leo Händel, Weiher b. Bruchſal (Baden).

---

2 Tannenmeiſ., 4 Schwanzf. und 1 Spechtmeiſe, zuſ. 7 ℳ, 1 prima Heidelerche 3 ℳ. Verpack. fr. g. Nachn. [1891]

Jos. Ehrlich, Würzburg.
Weißenburgerſtr.

Alle Sorten Waldvögel,

Ia Ware, ſowie rothe Hollunder- u. Ebereſchenberen getrocknet, verſendet [1892]

W. Wolf, Gefell i. Vogtl.

Preisl. frei. Dankſchreiben erhalte täglich.

Verk. weil umgez. weg. Mang. a. Raum, 1 Schw. Dompf. 2,75, 1 Hänfl. 1,20, 1 Girlitz 1,20, 1 Sumpfm. 1, 1 ſſ. ruſſ. Frühj.-David-Sproſſer v. Rauſch 8,50 (Ankaufpr. 16) 1 Rothk., Wipfelſgr., 2, f. Wien. Sproſſ.-Käfig 5. Pack. frei. Off. u. **1899** an Creutz Verl.-Bchhdl. [1893]

Kanarienhähne

meines mit Ehrenpr., Gold. u. Silb. Med. präm. Hohlrollerſt. von 8 bis 25 ℳ. Probe u. Garant. **Th. Börner,**
[1894] **Kaſſel,** Gartenſtr. 3 I.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft.

Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen.

Kataloge gratis u. franko. [1895]

☞ Geſucht: ☜

Papagei-Amandinen, ſämmtliche 5 Arten, Ringelaſtrilde, Ceresaſtrilde, kl. Kubafinken, Diamantfinken und andere ſeltene ausländ. Körnerfreſſer. Offert. erbittet **J. Daub, Karlsruhe** (Baden), Jollyſtr. 2. [1896]

Berichtigung.

Im Inſerat der Firma: F. Reiſſet, Hamburg (Gef. Welt Nr. 40) muß es heißen: Grau-Papageien (Jakos), kräftige, ſtarke, recht geſunde, junge gelehrige Thiere, à Stck. nur **15** ℳ (nicht 7 ℳ).

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 42.

Dr. Karl Ruß (Schluß).
Die Blaudroſſel (Monticola cyanus, *L.*) (Schluß).
Plauderei über Kanarienzuchten und Kanariengeſang (Fortſ.).
Aus den Vereinen: Mainz.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechſel. — Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der **Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Neue Ameiseneier! hochfeine, geſiebte, ſandfreie, goldgelbe Ware, Ko 3 ℳ, 5 Ko. 13,50 ℳ. [1897]

Prima Elbe-Weißwurm, Ko. 300, Ltr. 85 ₰.

Tyroler Ameiseneier, hochfein, weiß, handgeleſen, Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ.

Zeke (Musca), 99er, feinſte, fr. Ware, à Ko. 2,60 ℳ, 5 Ko. 12,50 ℳ. Univerſal-Nachtigalenfutter, 10 Jahre ſelbſt erprobt, Ko. 1,80, 5 Ko. 8,50 ℳ, ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- u. Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ, reelles Gewicht u. Maß.

Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Hohlroller

(feine Japper), tieftourenreich, zart- u. langgehend, Dtzd. 65 ℳ, einzelne Probevögel 6,50 ℳ. **Hohlroller-Weibchen,** Stck. 1 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, keine Uebervortheilung, nur reelle Bedienung. [1898]

Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1899]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten. Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko. Man verlange Preisliste.

Geſangskäſten, [1900] Geſangsſpinde, Harzer Vogelbauer, liefert (Prsl. fr.) **A. Bothe,** Wedderſleben, Harz.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1901]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1902]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe.
Schlotheim i. Th.

Für alle Arten Vögel fertige ich **fachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1903]

50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung. **Knochenmühlen** für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,** [1904] **Waren i. Mecklenb.**
Proſpekte gratis.

Hunde-Halsbänder
in ff vernick. Metall mit Lederunterlage u. Namensgravur per Stück von 3–8 ℳ. [1905] **H. D. Becker,** Iſerlohn.

Neu! Senſationell!
Kanarien-Lehr-Orgeln,
auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [1906] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.
Reparaturen aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt.

Der beſte Fangapparat
für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1907]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Käfige jeder Art
(Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1908] **Oſchatz** i. S.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [1909]

Futtermittel.

Univerſales. [1910]
Röbbeckes prämirte **Univerſalfutter-Spezialitäten** ſind die beſten für alle inſektenfreſſende Vögel.
Qual. Extra, à Ko. 2,60 ℳ
„ Prima, à Ko. 2,— ℳ
„ Sekunda, à Ko. 1,— ℳ
in ½ u. 1/1 Pfd.-Packet.
1899er Ameiſeneier 1899er, hochprima Qual., das Feinſte, was es gibt, vollſtändig rein und ſtaubfrei, à Ko. 4 ℳ, 5 Ko. 18 ℳ, **Ameiſeneier,** naturell, à Ko. 2,20, ſtaubfrei 2,60 ℳ, offerirt
Otto Röbbecke, Meerane, Sa., 11, Sämerei u. Vogelfutter-Handlg., gegr. 1851.

Nährsalz-Extract
von Herrn **Dr. Otto** in dieser Zeitschrift empfohlen. Preis per Topf bei Vorauszahlung 1.80 ℳ, gegen Nachnahme 2,40 ℳ franko.
Schiffer & Co., Köln.
Abth. **Vogelfutter.** [1911]

Mehlwürmer, à Ltr. 4 ℳ inkl. Verp. Bei Einſendung von 1,50 ℳ = 140 gr., alſo **weit über 1000 Stück,** frk. inkl. Verp. [1912] **P. Bartsch, Breslau,** Fluriſtr. 6.

Mehlwürmer, Ia., Ltr. 4 ℳ, Pfd. 3,20 ℳ, **Jeitner, Breslau,** Weinſtr. 12. [1913]

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Begründet von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belle-Allianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 42. Magdeburg, den 19. Oktober 1899. XXVIII. Jahrg.

Dr. Karl Ruß.

(Geb. 14. Januar 1833, geſt. 29. September 1899.)

Sein Entwicklungsgang, vornehmlich als Schriftſteller.

Geſchildert von Erich Bleich.

II.

Wir haben in großen Zügen die Entwicklung gezeichnet, welche Ruß als volksthümlicher Schriftſteller und als Kenner der deutſchen Vogelwelt und Landesnatur durchgemacht hat. Wir haben die ſchönen Schilderungen der ſechziger Jahre als wohleingebrachte Ernte mannigfacher und friſch empfundener Eindrücke aufgefaßt; wir ſehen in den beiden Arbeiten der achtziger Jahre den gründlichen, reifen Abſchluß eines langen, verſtändigen Schauens, immer bereiten Lernens und nie ermüdenden Studiums.

Als Dreißigjähriger, eben verheirathet, war er im Jahre 1863 zu dauernder Niederlaſſung nach Berlin gekommen, und er hat dieſe Reſidenzſtadt der preußiſchen Könige und dann der deutſchen Kaiſer nicht mehr verlaſſen, abgeſehen natürlich von Erholungsreiſen und ſolchen, die er als Ornithologe und Wiſſenſchafter in rüſtigen Jahren öfter machte.

Allein die ſechziger Jahre waren nicht bloß eine Zeit fleißigen Erntens, ſondern auch eines neuen regen Anbaues.

Seit Jahren hatte man ein Zurückgehen im Beſtande unſerer heimiſchen Singvögel beobachtet, eine erſchreckende Verminderung ihrer Zahl, verurſacht einmal durch Entziehung der Niſtgelegenheit, andrerſeits in den Nachſtellungen der Menſchen begründet. Und doch war und iſt es nicht recht angängig, den Fang und die Haltung einheimiſcher Vögel zu unterſagen. Wer will denn dem Naturfreund verargen, wenn er, in der großen dumpfen Stadt lebend, ſich nicht begnügen mag, nur an Sonn- und Feiertagen noch ein Stück Natur zu ſchauen, wenn er auch im Werkeltagsleben ein Fleckchen, einen Gegenſtand haben möchte, der ihm die Erinnerung an das große Ganze wach erhält, der ihn mit dem Leben da draußen verbindet, ſei dieſer Gegenſtand nun eine duftende Blume, ſei es ein ſingender Vogel! Da aber der Zimmer-Kulturvogel, der goldgelbe Hausfreund, der Kanarienvogel, nicht jedermanns Geſchmack iſt oder den weiten Spielraum des Gefallens nicht befriedigend ausfüllt, da der Papagei ein gar zu koſtbares Thier iſt, was bleibt denn da für ein Ausweg als ſich an das zu halten, was die Heimat bietet? Ja! Wenn die Fremde, wenn andere Erdtheile nicht wundervoll gefärbte, liebenswürdige, anmuthende Vögelchen böten, welche bei verbeſſerten Verkehrsverbindungen, bei vermehrter Nachfrage und ſtarkem Abſatz in Maſſen eingeführt und hier bei uns gezüchtet zu billigen Preiſen vertrieben werden können! Und dann, welches Intereſſe wird die Wiſſenſchaft daran haben: was wir durch noch ſo ſorgſame Reiſende ſchwer oder gar nicht erfahren, jetzt werden wir's kennen lernen, wenn die Züchtung glückt: Liebesſpiele, Parung, Brutverlauf, Aufziehung der Jungen, Jungendkleid und überhaupt Näheres und Beſtimmteres über Art und Lebensweiſe.

Das waren die Ideen, welche im Verlauf dieſer Bewegung immer klarer hervortraten, und deren hauptſächlichſter Vertreter, auch gegen Brehm's Autorität, Ruß von Anfang an und bis an ſein Ende

[illegible]

[illegible]

ſchriften und Zeitungen, welche in ſeiner faſt vierzigjährigen Thätigkeit ihm gern und willig ihre Spalten öffneten; nicht aufführen die zahlreichen Vereine, welche ſich ſelbſt nicht weniger als ihn ehrten, wenn ſie ihn zu ihrem Ehrenpräſidenten oder Vorſitzenden machten; nicht herzählen die vielen Vogelausſtellungen allerorten, auf denen er das Amt des Preisrichters verſah; nicht nennen die berühmten Namen, deren Träger ſeine Freunde und beſonders in früheren Jahren ſein täglicher Umgang waren; nicht näher erwähnen die Ehrungen und ſonſtigen Auszeichnungen, welche ihm in ſo reichem Maße zu Theil wurden. All dies ſind ja nur die mehr oder weniger äußerlichen Beſtätigungen dafür, daß hier eine kräftige, zielbewußte Perſönlichkeit in arbeitsreichem Leben und in unaufhaltſamem Erfolge ihren, dauernde Spuren hinterlaſſenden, Weg gemacht hat, Vielen zu Liebe, und Manchem — zu Leide; denn ohne feindliche Begegnungen und neidiſche Verkleinerungsſucht pflegt ein ſo eingreifendes Wirken und eine ſo nachhaltige Thätigkeit nicht leicht zu ſein und zu bleiben.

Jetzt aber an ſeinem ſtillen Grabe muß aller Lärm des Streites ſchweigen, muß jeder Mißlaut des hämiſchen Neides verſtummen: die ſelbſtbewußte, hier und da in dem Gefühl ihrer Ueberlegenheit vielleicht ſchroff anmuthende Perſönlichkeit iſt nicht mehr, nur ihre Schriften ſind uns geblieben, ein theures Vermächtniß des Todten, ein reineres, geiſtiges Abbild ſeines Weſens und Werdens, ein Spiegel ſeines Fühlens, Denkens und Wollens. Das gerade iſt ja der überragende Troſt, welcher den Anverwandten, Freunden und Verehrern am Grabe eines großen Verblichenen ſich bietet: der ſterbliche irdiſche Theil iſt nun dahin und kehrt uns nimmer wieder; der Hauch ſeines Geiſtes aber, der innerſte Antrieb ſeiner Perſönlichkeit bleibt uns erhalten in ſeinen Werken.

So nehmen wir denn Abſchied von dem Grabe, welches ihm neben der letzten Ruheſtätte des einzigen Sohnes zubereitet iſt, fern von dem Trubel und Qualm der unruhig wogenden Weltſtadt, in der einſamen Stille und freieren Luft des dörflichen Friedens, auf dem Kirchhofe der Heiligen-Kreuz-Gemeinde in Mariendorf. Die Erde wird ihm leicht werden, denn er hat rechtlich gelebt und iſt ruhig geſtorben; ſein Leben war ſo rein und unbefleckt, wie wir Menſchen es nur zu führen vermögen; kein laſtender Vorwurf bedrückte ſein Gewiſſen. Sein Leben hatte allgemeine Bedeutung; der Tod wird den nachwirkenden Nutzen ſeiner Schriften nicht hemmen.

Die Blaudroſſel (Monticola cyanus, *L.*).

Von Fr. Anzinger.

(Schluß).

Jungerhaltene „rohe“ Vögel überlaſſe man, falls man keinen guten Lehrmeiſter gleicher Art beſitzt, am beſten ſich ſelbſt und ſei ſchlechterdings mit dem zufrieden, was der Sänger je nach ſeiner Begabung allmählich zu bieten im Stande iſt, denn der Preis, der für ſolche jungen Vögel gezahlt wird, iſt kein hoher, ja manchmal ein ſo geringer, daß hierfür kein beſonderer Anſpruch erhoben werden darf.

Blaudroſſelwildfänge mit reinem Naturgeſang werden, falls ſie überhaupt zum Verkauf gelangen, ſehr theuer (30 bis 50 fl. ö. W. per Stück) bezahlt und preiſen oft noch höher.

Auch Blaudroſſelweibchen ſingen und zwar manchmal in einer Art, daß ſie von einem jungen Männchen kaum unterſchieden werden können. In ſpäterer Folge bleiben ſie mit ihrer Geſangsleiſtung hinter dem Männchen allerdings zurück oder verſtummen ganz. A. E. Brehm theilt mit, daß einzelne alte Weibchen hahnfederig werden, d. h. das Kleid des Männchens anlegen und ebenſo gut ſingen wie letztere. Eine derartige Beobachtung wurde hier noch nicht gemacht, und ich kann dieſer — jedenfalls über allem Zweifel erhabenen — Angabe keine beſtätigende Erfahrung beifügen.

Aus dem ſoeben Geſagten geht hervor, daß es für den Laien bei einem ſehr jung erhaltenen Vogel oft nicht leicht iſt, ſein Geſchlecht zu beſtimmen und es iſt daher dem Nichtkenner zu empfehlen, nur auf vollkommen ausgefärbte Vögel zu reflektiren. Das Männchen iſt dunkelſchieferblau und gleich einer friſchgepflückten reifen Zwetſchke heller blau überlaufen; Flügel- und Schwanzfedern ſind ſchwarz, mit der Hauptfarbe geſäumt; der Schnabel iſt ſchwarz mit gelbem Rachen. Größe unſerer Singdroſſel, doch ſchmächtiger; der Schwanz iſt kürzer, der Schnabel länger als bei dieſer und an der Wurzel breiter als hoch. Das Weibchen iſt bläulichbraungrau, an der Kehle mit lichtroſtbräunlichen, ſchwarzbraun eingefaßten Flecken; der übrige Unterleib zeigt dunkelbraune Mondflecken mit bräunlichweißen Federkanten. Flügel und Schwanz ſind dunkelbraun. Junge Vögel gleichen dem alten Weibchen, doch tritt bei Männchen das Blau, namentlich an der Oberbruſt, bald mehr hervor und verdrängt auch bald die übrige Fleckenzeichnung.

Da nun der Liebhaber nur in ſeltenen Fällen in den Beſitz eines älteren Friſchfanges kommt und, falls dies wirklich zutrifft, einen meiſt ſchon geraume Zeit gekäfigt geweſenen Vogel erhält, ſo bedarf es für die erſte Zeit ſeiner Pflege keiner beſonderen Verhaltungsmaßregeln. Der Vogel wird in einem Droſſelkäfig (Type des Nachtigalenkäfigs) von mindeſtens 70 cm Länge, 30 cm Tiefe und 45 cm Höhe untergebracht und dieſer womöglich an einer ſonnigen Stelle aufgeſtellt. Für ausreichende Trink- und Badegelegenheit, reinen Flußſand als Schubladenbelag und ſtete Reinhaltung des Käfigs behufs Abhaltung des bei den Steindroſſeln (hierunter ſind, wie ſchon vorne erwähnt, der Steinröthel und die Blaudroſſel gemeint) gern ſich einfindenden Ungeziefers iſt ſelbſtverſtändlich Sorge zu tragen. Die im Querſchnitte ovalgehaltenen Sitzſtangen müſſen mindeſtens ſo dick wie der Zeigefinger einer ſtarken Männerhand ſein.

Weil länger im Käfig befindliche Steindroſſeln nicht ſelten an kranken Füßen leiden, ſo umwickeln manche Liebhaber die Sitzſtangen mit Tuch oder weißgegerbtem, weichem und dabei rauhem Rehleder. Erſteres iſt gänzlich zu verwerfen, denn Tuch oder Filz ſind ſchlechte Wärmeleiter und der Vogel hat infolgedeſſen einen viel wärmeren Sitz als auf dem bloßen Holze, was Blutzudrang zu den Füßen und Geſchwulſt derſelben veranlaßt. Man iſt in letzterer Zeit darauf verfallen, die Sitzſtangen zu übergypſen, was indes nicht Jedermann in befriedigender Weiſe gelingt. Aus dieſem Grunde ſtelle ich die Frage: Wäre es nicht möglich, die ganze Sitzſtange aus Gyps- oder Cementguß herzuſtellen und an den Enden mit Metallvorrichtungen zu verſehen, um ſie im Käfig entſprechend feſtmachen zu können? In Deutſchland iſt man gegenwärtig der Käfigfrage viel näher getreten als anderwärts, und es dürfte ſich vielleicht ein Geſchäftsmann finden, welcher einen derartigen Verſuch machen würde.

Sollte ſich eine Blaudroſſel nach dem Empfange beſonders wild und ſtürmiſch benehmen, d. h. beim Herantreten an den Käfig furchtſam herumtoben, ſo überdecke man den Käfig, laſſe ihn einige Wochen verhüllt und ſtöre den Vogel, außer bei der nothwendigen Verſorgung nicht in ſeiner Ruhe. Es empfiehlt ſich weiter, in den erſten Tagen blos Mehlwürmer oder friſche Ameiſenpuppen in reichlicher Menge zu füttern und allmählich auf ein Nachtigalenfutter, wie ich es ſchon früher beſchrieben habe, überzugehen. Demſelben werden dann 20 bis 25 Mehlwürmer per Tag oder ein ſtarker Eßlöffel voll Ameiſenpuppen beigegeben. Darüber, ob ſich die in Deutſchland erhältlichen Droſſelfuttergemiſche für Steindroſſeln eignen, kann ich nichts ſagen; ich bezog einmal ein „Univerſalfutter I. Qualität“ von einer Leipziger Firma, fand aber, daß es ein hölliſches Gemiſch war und fütterte damit die Abortgrube. Die Futtergemiſche von Capelle und Kruel hört man übrigens allgemein loben und ſie dürften daher zu empfehlen ſein.

Jenen Leſern, welche vielleicht in Brehms Thierleben die von Wright gebrachte Mittheilung geleſen haben, nach welcher Blaudroſſeln einen Oertlichkeitswechſel nicht vertragen und daran zu Grunde gehen können, kann ich zur Beruhigung ſagen, daß dies nach unſeren Erfahrungen nicht zutrifft. Wir wiſſen Fälle, in welchen arme Stümper im Jahre mehrmals ihren Pfleger wechſelten, dabei auch oft ſehr verſchieden behandelt wurden, aber trotzdem nicht eingingen, obwol dies manchmal für ſie am beſten geweſen wäre.

Alle im Freien vorkommenden Vögel, einerlei, ob ſie in der Gefangenſchaft aufgepäppelt werden, oder als ältere Wildfänge in den Käfig gelangen, miſſen jenen Platz, an welchem ſie aufgezogen oder eingewöhnt und unausgeſetzt einige Jahre belaſſen wurden, nur ſehr ungern, ſtellen beim Wechſel deſſelben häufig den Geſang ein und trauern um das gewohnte, liebgewordene Plätzchen oft längere Zeit. Auf das ſanfte, ich möchte faſt ſagen zartbeſaitete Gemüth der Steindroſſeln wirkt ein derartiger Platzwechſel meiſt immer ſo, daß ihr Geſang oft für das ganze Jahr verſtummt. Eine weitere Gefahr iſt indeſſen nicht zu befürchten.

Ebenſo kann die unter vielen Liebhabern beſtehende Annahme widerlegt werden, daß die Blaudroſſel nur einige Jahre im Käfig ausdauert. Dieſe ſowol als auch der Steinröthel ſind ebenſo widerſtandsfähig wie unſere Walddroſſeln und erreichen bei ſachgemäßer Pflege gewöhnlich ein Alter von 8 bis 10 Jahren. Major Alex. v. Homeyer ſchrieb mir ſ. Z., daß er eine Blaudroſſel genau 10½ Jahre beſeſſen habe, welche ſich früher ſchon etwa 3 Jahre bei anderen Liebhabern befunden hat. „Trotz dieſes Alters“, erzählte er mir, „könnte der Vogel noch leben, wenn derſelbe nicht der Zugluft ausgeſetzt worden wäre. Er bekam hierdurch Krämpfe und ging langſam ein.“

Züchtungsergebniſſe ſcheinen mit dieſer Steindroſſelart noch nicht erzielt worden zu ſein; wenigſtens iſt hierüber meines Wiſſens noch nichts veröffentlicht worden. Meiner Meinung nach dürften übrigens bei dieſer Art unter günſtigen Verhältniſſen ebenſolche Erfolge erzielt werden können, wie beim Steinröthel, denn hierfür ſpricht ja auch die Art und Weiſe des Brütens dieſes Vogels im Freien.

Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang.

Von R. Groſſe.

(Fortſetzung).

Es muß ſchon bei der Einrichtung der Hecke auf die gute Ausbildung und Erhaltung der für den Züchter ſehr wichtigen Athmungswerkzeuge des Kanarienvogels, zu denen auch der Kehlkopf oder Singmuskelapparat gehört, Rückſicht genommen werden, deren Hauptthätigkeit durch eine vollkommen geſunde Lunge beſtimmt wird. Die Lunge und die mit ihr zuſammenhängenden Kanäle, welche zu ihr führen und von ihr ausgehen, bilden die Athmungswerkzeuge, und der eine von dieſen drei beſtehenden Kanälen iſt die Luftröhre, welche die ganze Tüchtigkeit unſeres Sängers nur dann hervorzubringen vermag, wenn ſie gut ausgebildet und außerdem in der Lage iſt, ihre Thätigkeit ohne Hinderniſſe und Beſchwerden entfalten zu können. Durch einen zweiten Kanal wird dem ſehr luftreichen Werkzeug; der Lunge, das Blut zugeführt. Dieſer Kanal heißt Lungenſchlagader. Während die Lungenſchlagader der Lunge das Blut zuführt, hat der Kehlkopf oder beſſer die Luftröhre die Aufgabe, das aufgenommene Blut mit der Luft in Berührung zu bringen. Für dieſen Zweck iſt die Luftröhre mit der Lunge verbunden, und zwar theilt ſie ſich in der Bruſt in zwei Hauptäſte, die ſich in der Lunge mehr und mehr verzweigen und zuletzt in kleine mit Luft angefüllte Bläschen endigen, welche von den feinen Verzweigungen der in die Lunge gehenden Adern umgeben ſind. Die Verbindung des Blutes mit der Luft wird durch das Athmen bewerkſtelligt. Für den Zweck des Athmens dehnen ſich beſtimmte Muskeln in der Bruſthöhle aus, und in den hierdurch entſtehenden luftleren oder an Luft verminderten Raum tritt durch die Luftröhre die von ihr aufgenommene Luft ein. Werden dieſe Muskeln wieder zuſammengezogen, ſo ſtrömt eine entſprechende Menge Luft wieder aus. Der aufgenommenen Luft wird der Sauerſtoff entzogen und dafür wird durch das Ausathmen, alſo durch das Zuſammenziehen der Muskeln, eine gleiche Menge Kohlenſäure abgegeben. Durch die Beigeſellung des Sauerſtoffs zum Blut wird das letztere wieder gut verwendbar für alle Körpertheile, es wird ſozuſagen gereinigt von allen unreinen und ſchädlichen Beſtandtheilen, es wird mit allem Nothwendigen für ſeine Verrichtung verſehen und kehrt nach dieſer Umwandlung durch die Lungenvenen zum Herzen zurück, um von hier aus ſeinen großen Kreislauf wieder anzutreten.

Es dürfte aus den vorſtehenden Erörterungen unzweifelhaft klar werden, daß die erhaltene Nachzucht um ſo widerſtandsfähiger und kräftiger erblüht, je mehr darauf gehalten wird, daß die Luft, welche dem Vogelkörper zugeführt wird, möglichſt viel Sauerſtoff enthält. Wenn für dieſen Zweck nun während der Hecke eine gute Luftreinigung (Ventilation) am Platz iſt, ſo iſt auch ganz beſonders zu berückſichtigen, daß, wie erwähnt wurde, die Luft unmittelbar unter der Zimmerdecke ſauerſtoffarm iſt und dieſer Platz alſo vermieden werden muß. Es darf jedoch auch nicht vergeſſen werden, daß für das Athmen Kohlenſtoffe erforderlich ſind, die dem Vogel durch die Speiſen zugeführt werden, daß alſo auch auf beſondere Güte des Futters zu halten iſt Obgleich in der Fachpreſſe öfter geſchrieben wird, daß der Kanarienvogel ſich in allen Heckräumen vermehrt, ſie mögen liegen wie ſie wollen, ſo wird es ſich doch empfehlen, die vorſtehenden Regeln zu berückſichtigen. Sie verhelfen zu geſunden Sängern.

Der Verlauf der diesjährigen Zucht hat wieder gezeigt, daß ihre Erfolge zum großen Theil von der Abwartung und Pflege der Heckvögel abhängig gemacht werden mußten, und daß grade die Sauberkeit in der Hecke eine große Rolle ſpielt. Wie in jedem Jahr, ſo hat es auch in dieſem wieder viel klare Gelege, abgeſtorbene Junge im Ei und auch viele Verluſte an kleinen Neſtlingen gegeben. Ich habe in einem Fachblatt geleſen, daß die Fütterung von Speck und Rindertalg als Grund für klare Gelege beobachtet worden iſt. Ich ſuche die Gründe für dieſe Art Störungen ganz wo anders, obgleich ich in keiner Beziehung dieſer widernatürlichen Fütterungsweiſe das Wort reden will. Die ſchieren Eier werden vorwiegend in der erſten Brut bemerkt und, obgleich die Fütterungsweiſe in den folgenden Bruten nicht geändert wird, kommen ſpäter klare Gelege doch ſeltener oder nicht mehr vor. Dieſer Umſtand muß uns veranlaſſen, beim Vorkommen von klaren Gelegen zunächſt einmal gründlich nachzuforſchen, ob wir unſere Schuldigkeit bezüglich der Abwartung und Pflege der Heckvögel im Winter gethan haben. Die Erziehung der Hähne zu vollendeten Sängern macht es leider nothwendig, daß wir Maßregeln anwenden, die, wenn ſie auch nicht unmittelbar ſchaden, doch entſchieden das Wohlbefinden und Gedeihen der Vögel nicht ſonderlich fördern. Ich meine das Geſangsbauer und den Geſangskaſten. Beide müſſen wir haben, um einen entſprechenden und nicht gar zu kleinen Theil unſerer Nachzucht zur Vollendung zu bringen. Das Geſangsbauer iſt unverhältnißmäßig klein — in ihm ſoll der Vogel ſtill ſitzen lernen —, der geſchloſſene Geſangskaſten verhindert den unbeſchränkten Zütritt friſcher, ſauerſtoffhaltiger Luft — in ihm muß der Vogel ungeſtört lang, ſanft und wohlklingend ſingen lernen. Dieſe beiden Handhaben ſind für jeden Züchter feiner Vögel unentbehrlich geworden, wir alle wiſſen ihre Vortheile zu ſchätzen. Wir kennen aber auch ihre Nachtheile, und ſollten wir nicht, wenn wir es mit unſeren kleinen Thierchen gut meinen und ſie uns lange thatkräftig und geſund erhalten wollen, dauernd beſtrebt ſein, den kleinen Gefangenen ihre Lage dadurch erträglicher und weniger nachtheilbringend zu geſtalten, daß wir neben entſprechend guter Koſt auch für große Reinlichkeit und möglichſt viel friſche Luft ſorgen? Nur wer das thut, hat auf kräftige Heckhähne im nächſten Jahr zu rechnen.

Gut, die Hähne pflegen wir ſo gut es nur immer möglich iſt, ſchon aus dem Grund, leiſtungsfähige Preisſänger für die Ausſtellungen zu bekommen. Wie aber ſteht es mit den Weibchen? Ich bin weit entfernt davon, anzunehmen, daß die Züchter die Hennen während ihrer Unthätigkeit im Winter, wie es früher üblich war, mit mangelhaftem Futter verſehen, oder ihnen gar die verſchmähten Ueberreſte der Hähne als Lebensunterhalt anbieten. Die gemachten Erfahrungen und die guten Rathſchläge der wohlmeinenden Fachpreſſe haben in anerkennenswerther Weiſe dieſen Uebelſtand beſeitigen helfen, ſie haben den Züchtern klar gemacht, daß nur gut genährte Vögel hecktüchtig ſind und verwendbare Nachkommenſchaft liefern. Aber wie ſteht es denn mit der Sauberkeit und der Luftreinigung in den Räumen, in denen ſich die Hennen im Winter befinden? Die Wohnungen in großen Städten ſind zum größten Theil im Raum ſo beſchränkt, daß zur Durchführung der Liebhaberei nur wenig Platz übrig bleibt, und es werden infolge dieſes Mißſtandes oft entlegene, dunkle und bisweilen gar zugige Bodenräume den Weibchen als Aufenthaltsort angewieſen. Ferner nimmt die Pflege der geſanglich fortſchreitenden Junghähne den größten Theil der verfügbaren Zeit des Züchters in Anſpruch, ſodaß für die Abwartung der Hennen nur ſo viel Zeit erübrigt wird, ſie allenfalls mit Futter zu verſehen. Wenn auch das letztere für ſie bekömmlich hergeſtellt wird, ſo muß doch der Mangel an Reinlichkeit und das Fehlen von ſauerſtoffhaltiger Luft, die, wie wir vorher geſehen haben, von ſehr vortheilhaftem Einfluß auf die Beſchaffenheit des Blutes iſt und den Kreislauf des letztern zu einem wirkſamen geſtaltet, ungünſtig auf die Thätigkeit der Körperwerkzeuge einwirken. Wie nothwendig aber eine regelrechte und ungeſtörte Wirkſamkeit aller in Betracht kommenden Theile des Körpers für die Entſtehung und Ausbildung des Eies ſelbſt und für die Entwicklung und das Gedeihen der Frucht in dem Ei iſt, das lehren uns beide Vorgänge, das werden wir einſehen, wenn wir uns mit den zarten Gebilden, dem Ei und der Frucht in demſelben, bekannt machen.

Das Vogelei befindet ſich auf ſeiner erſten Bildungsſtufe als kugelige, gelbe Geſtalt an dem einſeitigen oder beſſer linksſeitigen Eierſtock; denn der rechtsſeitige iſt zwar urſprünglich vorhanden, weil der Kanarienvogel in die Klaſſe der Wirbelthiere, alſo der ſeitlich in ihren Theilen übereinſtimmenden Thieren gehört, aber er verkümmert mit ſeinem Eileiter oft ſo vollſtändig, daß auch nicht eine Spur von beiden übrig bleibt. Der Eierſtock des Vogels gleicht einer viereckigen Platte, an der dieſe Urſprungseier (Follikel) traubenartig in verſchiedenen Größen, alſo auf verſchiedenen Bildungsſtufen ſtehend, befeſtigt ſind. Dieſe gelben Eidötterchen beſtehen ſchon als Urgebilde aus zweierlei Beſtandtheilen, von denen der bei weitem größere den Stoff bildet, der zur Erhaltung der werdenden Frucht Verwendung findet, der ſie alſo ernährt, weshalb er als Nahrungsdotter bezeichnet wird. In dieſem Nahrungsdotter befindet ſich an einer beſtimmten Stelle eine klare Eiweißmaſſe (Protoplasma), welche der Hahnentritt oder die Narbe heißt und die den Kern des Hahnentritts oder das Keimbläschen in ſich ſchließt. Der Hahnentritt mit dem Keimbläschen wird Bildungsdotter genannt, weil aus ihm ſich der Embryo aufbaut. Bei normalem Körperbau des Vogels und bei naturgemäßer Entwicklung des Keimes reicht der Nahrungsdotter bis zur Vollendung der Frucht aus und er iſt aufgezehrt, wenn der Embryo die Eiſchale ſprengt und ſeine Bildungsſtätte verläßt. Zunächſt entſteht der Bildungsdotter und ſpäter aus dieſem der Nahrungsdotter. Dieſe Maſſe, aus der unſer lieblicher Sänger aufgebaut und bis zu ſeiner Geburt erhalten wird, iſt von einer ziemlich feſten Dotterhaut umgeben und wird durch einen Stiel mit der Eierſtocksplatte verbunden. Je mehr nun das Eifollikel durch die geſteigerte Ernährung wächſt, d. h. je mehr der Dotter an Inhalt zunimmt, umſomehr dehnt ſich die Dotterhaut, bis ſie an einer aderloſen Stelle, gegenüber dem Stiel, zerreißt und die nunmehr reife Dotterkugel hindurch läßt. Die letztere verläßt den Eierſtock und tritt ſofort in den ſogenannten Eileiter oder die Muttertrompete, die zwei Oeffnungen hat, von denen die eine in die Bauchhöhle und die andere in die Kloake mündet. Dieſes verhältnißmäßig lange Rohr wird aus ſehr zarten und gefäßreichen Muskel- und Schleimhäuten gebildet und weitet ſich zur Zeit der Fortpflanzung beträchtlich. Zur Befruchtung des Eies iſt es nothwendig, daß die männlichen Samenfäden nicht allein mit dem vom Eierſtock losgelöſten Eifollikel in Berührung kommen, ſondern auch in den Dotter eindringen. Es genügt das Eindringen einer Samenzelle, die aus Kopf, Mittelſtück und einem ſich lebhaft bewegenden Schwanz beſteht, um das Ei zu befruchten, und es iſt wiſſenſchaftlich nachgewieſen worden, daß der Eifollikel, welcher im befruchtungsfähigen Zuſtand das Keimbläschen von der Mitte nach der Oberfläche vordrängt, ſofort nach Aufnahme einer befruchtenden Samenzelle von dem Empfängnißhügel, das iſt von der Stelle aus, wo die Aufnahme der befruchtenden Samenzelle ſtattgefunden hat, mit einer Schutzhaut umgeben wird, die ein Eindringen weiterer Samenzellen verhütet. Von dieſem Standpunkt aus und auf Grund dieſer wiſſenſchaftlichen Forſchungen iſt es auch leicht erklärlich, daß die Befruchtung ganzer Gelege durch eine nur einmalige Begattung ſehr wol möglich iſt, eine Frage, die ſchon öfter in der Preſſe erwogen wurde. Bei der Begattung bringen nämlich zahlreiche Samenzellen in den Eileiter des weiblichen Körpers ein und behalten hier eine gewiſſe Zeit lang die Fähigkeit, zu befruchten. Wenn nun die Ablöſung der befruchtungsfähigen Eidotter vom Eierſtock in möglichſt kurzen Zwiſchenräumen vor ſich geht, ſo iſt in Anbetracht der wiſſenſchaftlichen Forſchungen, daß jeder Eidotter nur eine Samenzelle aufnimmt, die übrigen aber noch längere Zeit leiſtungsfähig im Eileiter verbleiben bzl. vordringen, eine weitere Aufnahme dieſer Befruchtungsmaſſe durch entgegenkommende Dotterkugeln ſehr wol denkbar und es kann alſo ein ganzes Gelege von vier auch fünf Eiern ſo befruchtet werden.

Ich will, bevor ich die Entwicklung des Eies weiter auseinanderſetze, erwähnen, was für den Kanarienzüchter ſehr wichtig iſt, daß nach naturwiſſenſchaftlichen Forſchungen in dem Hahnentritt oder der Narbe des weiblichen Vogels, dem Bildungsdotter, und zwar hier wieder in dem Kern des Hahnentritts (Keimbläschen) und in den Samenzellen des männlichen Vogels, nämlich in der ſogenannten Spermakernſubſtanz, die eigentliche Vererbungsmaſſe enthalten iſt und daß auf der Verbindung dieſer von verſchiedenen Geſchlechtern ausgehenden Vererbungskerne die Güte der Nachkommen beruht. Auf unſere Liebhaberei übertragen, heißt das, ſind Hahn und Weibchen beide von vorzüglichem Stamm, ſo iſt auch Hoffnung auf vorzügliche Nachzucht vorhanden, iſt dagegen das Männchen von guter und das Weibchen von ſchlechter Abkunſt oder umgekehrt, ſo wird in der Regel nichts Geſcheites herauskommen.

(Fortſetzung folgt.)

Aus den Vereinen.

Mainz, 29. September 1899. **Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht** hielt geſtern Abend nach dreimonatlicher Pauſe wieder ſeine erſte Sitzung ab. Nach Begrüßung der Anweſenden theilte der Vorſitzende, Herr Direktor Pozniczek, mit, daß ſich wieder eine größere Anzahl Herren als Mitglieder gemeldet hätten. Der erſte Gegenſtand der Berathung betraf die Frage der Abhaltung einer Geflügelausſtellung im nächſten Jahre. Herr Direktor Pozniczek beſprach eingehend dieſe Angelegenheit, kommt dabei aber zu der Anſicht, daß der Geflügelverein im nächſten Jahre keine Ausſtellung abhalten möge. Der Geflügelverein in Worms beabſichtige nämlich, im nächſten Jahre die Verbands-Ausſtellung zu übernehmen und ſei er der Anſicht, daß man Worms dieſe Verbands-Ausſtellung überlaſſen möge. Die Verſammlung ſchloß ſich einſtimmig den Ausführungen des

Redners an. Weiter theilte der Vorſitzende mit, daß in den Tagen vom 14. bis 16. Oktober der Verein „Ornis“ zu Frankfurt am Main und vom 21. bis 23. Oktober in Ludwigshafen eine große Geflügel- und Vogel-Ausſtellung ſtattfände und er bitte die Mitglieder, ſich an dieſen Ausſtellungen recht zahlreich zu betheiligen. Eine weitere Mittheilung betraf die Weihnachts-Ausſtellung mit Verloſung der Sektion „Kanaria“ des Geflügelvereins, dieſelbe findet in der Zeit vom 23. bis 26. Dezember in dem ſtadtſeitigen Foyer der Stadthalle ſtatt. Der Vorſitzende machte zum Schluß intereſſante Mittheilungen über praktiſche Einrichtung des Geflügelſtalles im Winter, und zwar an der Hand eines ſpeziell angefertigten Modelles. Der Vorſitzende der Brieftaubenſektion, Herr **Salomon**, theilte mit, daß in der letzten Zeit wieder viel Brieftauben geſchoſſen würden, die Brieftauben ſtänden aber unter beſonderem Schutze des Kriegsminiſteriums, und das Schießen der Tauben würde deshalb ſchwer beſtraft. Den Schluß bildete die übliche Verloſung von Tauben und Exoten.

Anfragen u. Auskunft

Herrn A. **Kattowitz**: Wir haben Ihren Brief an die Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung geſandt, da dieſe, als für den Anzeigentheil verantwortlich, an Ihrem Brief gewiß Intereſſe nehmen wird.

Frau R. **Siegmund**: 1. Ein Miſchfutter für den alten Trauerfliegenſchnäpper bereiten Sie wie folgt: gute Ameiſenpuppen, überbrüht mit lauem Waſſer, werden mit Eierbrot und geriebenem Quarkkäſe zu einer lockeren, flaumigen Maſſe hergeſtellt. Das Ganze wird mit etwa 8—10 durchſchnittenen Mehlwürmer vermiſcht. Obenauf legt man als Lockſpeiſe zwei Mehlwürmern und einige Fliegen. Wenn Sie ſich dann garnicht um den Vogel kümmern, ſondern ihn ungeſtört laſſen, ſo nimmt er das Futter gleich an. In die Vogelſtube können Sie den Trauerfliegenſchnäpper, nachdem er an Miſchfutter gewöhnt iſt, ſetzen, — an eine Parung mit dem grauen Fliegenſchnäpper können Sie jedoch nicht denken, da dieſe Gattung in der Gefangenſchaft ſich ſchwer fortpflanzt und gar zwei verſchiedene Arten von Fliegenſchnäppern noch viel weniger zum Paren zu bringen ſein dürften. 2. Der Wiedehopf iſt in der Vogelſtube keineswegs bösartig, doch iſt es nicht rathſam, dieſen Vogel mit anderen Arten zuſammen zu ſetzen, da er vermöge ſeiner Schnabelbildung ein ſehr langſamer Eſſer iſt und ſeine Nahrung erſt in die Höhe wirft, um ſie richtig mund-, d. h. ſchnabelgerecht zu haben. Auf dieſe Art würden ihm die anderen Inſaſſen der Vogelſtube das beſte Futter wegfreſſen, und der Vogel ginge in Kürze an Schwäche ein, da er ohnedies ſtets kräftiges Futter zu ſeiner Erhaltung braucht. Verſuchen Sie es alſo mit dem Wiedehopf im Einzelkäfig; er wird überaus zahm und zutraulich und bereitet durch ſein drolliges Gebahren dem Pfleger viel Freude.

Frau **Lina** E. in Riga: 1. Die Urſache des Kahlwerdens Ihrer Zebrafinken ſind thieriſche oder pflanzliche, mikroſkopiſch-kleine Schmarotzer. Bei zweckmäßiger Pflege, hoher, gleichmäßiger, feuchter Wärme (15 bis 18 Grad R.), nach Unterſchlupf zur Nacht, befiedern ſich die nackten Stellen meiſt von ſelber; wenn aber nicht, ſo bepinſeln Sie die Stellen einen Tag um den andern mit Perubalſam und an dem dazwiſchen liegenden mit verdünntem Glyzerin (1 : 5), während Sie ſie nach je drei oder vier Tagen mit einem in warmes Seifenwaſſer (am beſten von milder Schmierſeife) getauchten weichen Pinſel abwaſchen und die Vögel darauf für die nächſten Stunden wieder in höherer Wärme halten. Dies Verfahren wiederholen Sie acht bis vierzehn Tage, dann werden ſicherlich an den nackten Stellen friſche Federn üppig hervorſprießen. 2. Das Hauptfutter für Zebrafinken iſt ungeſchälte weiße Hirſe. Außerdem bietet man ihnen noch etwas geſchälten Hafer und ungeſchälten Reis. Zuweilen reicht man ihnen einige Mehlwürmer, in drei Stücke geſchnitten, und in der wärmeren Jahreszeit Grünkraut, ſowie als vorzügliche Leckerei und wichtiges Nahrungsmittel zugleich die Hirſen in friſchen Aehren mit halbreifen Körnern. Nothwendig iſt für ſie auch Kanarien- oder Spitzſamen.

Herrn **Joſ. Burchardt**: Mit der Anſchaffung neuer Vögel hätten Sie unter allen Umſtänden ſo lange warten müſſen, bis unter Ihrem Beſtand jede Spur von anſteckender Krankheit erloſchen war. Jedenfalls ſind die vielen Todesfälle unter den neu hinzugekauften Vögeln lediglich durch Anſteckung von den ſchon vorhandenen hervorgerufen worden.

Herrn **Th. Hintze**: Die tropiſchen Täubchen können bedeutend ſchwankende und ſehr niedrig fallende Wärme durchaus nicht vertragen.

Frau Hofräthin von F.: Füttern Sie die Schamadroſſel weiter ganz ſo, wie Sie in Ihrem Briefe angegeben haben.

Herrn W. **Grohe**: Reichen Sie dem rothen Kardinal neben den Sämereien, die Sie geben, alſo Spitz- oder Glanzſamen, Hirſe und geſchälten Hafer, auch Hanf, dann täglich zwei bis drei Mehlwürmer und ein wenig Frucht.

Briefwechſel

Herren **Schnetz, Eichlam, Wagner, Braun, Schlag, Rettich, Anzinger, Dr. Otto**: Beiträge mit Dank erhalten!

Zu unſerm Bilde.

Von den eigentlichen Kernbeißern (Coccothraustes, *Briss.*), von denen man etwa ein Dutzend Arten kennt, ſind bisher nur zwei lebend eingeführt: der Maskenkernbeißer (Coccothraustes personatus, *Tmm.* et *Schl.*) und der ſchwarzſchwänzige Kernbeißer (Coccothraustes melanurus, *Gml.*). Der letztere, deſſen Bild wir heute bringen, iſt ein hübſch gezeichneter Vogel. Sein Gefieder erſcheint an Kopf und Kehle bis zur Oberbruſt glänzend ſchwarz, an letzterer in Dunkelbraungrau übergehend; Flügel ſchwarz, blau metallglänzend, mit zwei weißen Querbinden; Rücken und Schultern fahlbraun, Schwanz metallglänzend ſchwarz; Körperſeiten gelblichbraun; Unterſeite weiß; Schnabel bräunlichgelb; Augen braun; Füße horngrau. Das Weibchen iſt oberſeits und an der Bruſt bräunlichgrau, im übrigen matter in den Farben, als das Männchen. Die Heimat des ſchwarzſchwänzigen Kernbeißers iſt China, weshalb er auch Kernbeißer von China genannt wird.

Er hat einen eigenartigen, wenn auch einfachen Geſang, hervorragender als der unſeres Kirſchkernbeißers, mit langgezogenen ſchleifenden, auch angenehm klingenden, flötenden Tönen. Als Stubenvogel zeigt er ſich ruhig und friedlich. Er iſt noch recht ſelten im Handel, indeſſen bereits in einem Fall mit Erfolg gezüchtet worden, und zwar von Herrn Gymnaſiallehrer W. Hartwig in Berlin. Dieſer kaufte 1885 ein Pärchen in ſchlechtem Zuſtand. Das Weibchen mauſerte im September, das Männchen im Oktober. Im Mai 1886 bauten ſie in einem an der Decke des 1,5 Kubikmeter großen Heckkäfigs angebrachten und durch Epheu und Lindenzweige geſchützten Körbchen ein Neſt aus ſelbſtgepflückten Wachholder- und Lebensbaumzweigen, auch einigen Birkenreiſern, das ſie mit Leinwandfäden und Schweinsborſten ausrundeten. Das Gelege beſtand aus vier bläulichgrün, blaugrau und ſchwarzbraun gezeichneten Eiern, von denen täglich eins gelegt wurde. Männchen und Weibchen bauten gemeinſam. Während der 11 Tage dauernden Brutzeit brütete das Weibchen allein; das Männchen fütterte Weibchen und Junge, anfangs nur mit friſchen Ameiſenpuppen, ſpäter auch mit Mehlwürmern. Die Jungen blieben 12 bis 13 Tage im Neſt und fraßen nach 20 bis 21 Tagen allein. Wenige Tage nach dem Flüggewerden der Brut begann das Weibchen wieder Eier zu legen, doch wurden dieſe für Sammlungen ausgenommen. Das Jugendkleid war dem des alten Weibchens faſt völlig gleich, doch war der roſtrothe Anflug an den Seiten matter, der Schnabel war blaugrau, nach fünf Wochen gelbgrün. Das junge Männchen dagegen hatte bereits vor dem Flüggewerden eine viel breitere weiße Flügelbinde (weiße Spitze der Armſchwingen); nach fünf Wochen war der Schwanz ſchwarz, die Spitze der Handſchwingen ziemlich weiß. Die Verfärbung ging ohne Federwechſel vor ſich.

D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer, **Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,** alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1934]

Alle Sorten Waldvögel,

In Ware, ſowie rothe Hollunder- u. Ebereſchenberen getrocknet, verſendet [1935]

W. Wolf, Gefell i. Vogtl.

Preisl. frei. Dankſchreiben erhalte täglich.

Wellenſittiche,

Par 6 ℳ. **L. Brinkmann,**
[1936] **Calefeld** in Hannover.

Alpen-Stiglitz-Männchen,

Dtzd. 10 ℳ, Schwarzplatten, echte Doppelüberſchläg., à Stck. 4 ℳ. Verſende nur gut eingew. Vögel u. Gar. leb. Ank. [1937]

Wilhelm Fechtner, Leitmeritz a. d. Elbe.

Gebe ab: 1 erfolgreiches Zuchtpar **Wellenſittiche,** ſelbſtgezüchtete niſtluſtige **Zebrafinken u. reinweiße Mövchen,** ſelbſtgezüchtete braunbunte **Mövchen, Schmetterlingsfinken, ſpitzſchwänz. Gürtel-Amandinen u. rothk. Papagei-Amandinen.**

Suche: Pärchen **kl. Maskenweber,** Pärchen lauchgrüne **Papagei-Amandinen,** Wbch. **Binſenaſtrild.**

Hugo Dieker,
[1938] **Halle a. S.,** Landwehrſtr. 24.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1939]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe ab: 6 ſchöne **Schwarzplättchen,** davon 4 Doppelüberſchläger, à Stck. 6,50 ℳ, 2 einfache Schläger mit Nachtigaltouren à Stck. 4,50 ℳ. 1 lautſingendes **Rothkehlchen, Lichtfänger,** 2,50 ℳ. Sämmtliche Vögel ſind vom Frühjahr 1898.

Fr. Köhler.
[1940] **Aſchersleben,** Bergſtraße 5.

Ausverkauf! ſing. Kanarienhähne, à 5 bis 8 ℳ, ſchöne gute Wellenſittiche, mit 1. u. 2. Preiſen präm., Stck. 3, Dtzd. 34 ℳ, ſt. Zuchtp. 7,50 ℳ, 1 P. ſchneeweiße Reisfinken, 8 ℳ (F. Z.). [1941]

Ad. Steinhagen, Lübeck, Hürſtr. 107.

Zwei Par kleine Amaranthen

à 5 ℳ, 1 P. **ſchwarzköpf. Laufhühnchen** 15 ℳ. einige **Wellenſittiche** à 2,50 bis 3,00 ℳ. 4 **ſpitzſchwänzige Gürtelgrasfinken,** ſelbſtgezüchtet, tadellos, abzugeben.
[1942] Apotheker **Jaeger, Dieburg.**

Emil Geupel, Leipzig

Kreuzſchnäbel 1, Lachtauben 1,50, Stiglitz-Hähne 2, Zeiſige 1,25, Hänflinge 2, Wachteln 1,50, Kanarien-Hähne, nur Harzer, 10—30, Wellenſittiche, Zuchtp. 8 ℳ. [1943]

F. Rejsek,
Hamburg, Peterſtraße 28.
Spezialität:
Papageien und Papageienkäfige.
Prämirt auf allen beſchickten Ausſtellungen.

Offerirt garantirt junge diesjährige **Grau-Papageien,** gelehrig und beſonders geſund, à Stück nur 15 ℳ, ſolche ſchon 10 Wochen hier, nur 20 ℳ, einige ſchon ½ Jahr hier 30 ℳ, einige ganz vorzüglich u. ſehr viel ſchon ſprechend, 60, 80, 100, 150 ℳ. Junge große **Blauſtirn(Rothbug)-Amazonen,** anfang. zu ſprechen, 20 ℳ, dito, ſchon mehrere Worte ſprechend, 25, 30, 35, 40 ℳ, je nach Schönheit und Leiſtung. 1 **Bl.-St.-Amaz., faſt alles ſprechend, 4 Lieder ſing., 150 ℳ, 1 weinrothe Amaz.,** ſehr gut ſprechend, 40 ℳ. **Surynam-Amazonen,** gut ſprech., 30—35 ℳ. **Große Gelbnacken** und **große Doppelgelbköpfe** im Prachtgefieder, 2 bis 3 Worte ſchon ſprechend, nur 30 ℳ. **Brillen-Amazonen in Pracht,** ſchon ſprech., 25 ℳ, große **Müller-Amaz.,** anfang. zu ſprech., 25 ℳ, **Gelbhaubenkakadus** 12 ℳ, ſchon zahme, 20—25 ℳ, **Inkakakadus** 30—35 ℳ, **große rothe Araras** 35—65 ℳ, 1 Stück ſehr gut ſprech. 85 ℳ, **Tigerfinken,** rothe, Par 1,50 ℳ, **Reisfinken,** Par 1,70 ℳ, **Aſtrilde, Bandfinken, Elſterchen** Par 1,50 ℳ, zahme, hochamüſante **Affen,** ſchönſte Exemplare, 15, 18, 20, 25 ℳ. **Papageienkäfige,** ganz aus Metall, ſtark verzinnt, mit allem Zubehör ſchon von 3,50 ℳ an, und **eine Partie gebrauchter Papageienkäfige billigſt.** Verſandt jederzeit nach allen Orten des In- und Auslandes gegen Nachnahme oder Voreinſendung des Betrages; lebende, geſunde Ankunft garant. [1944]

Eichelheher,

diesjähriger, ſehr zahm, pfeift, auch gelehrig zum Sprechen, an gewöhnliches Futter gewöhnt, iſt gegen Angebote od. Tauſch mit Sproſſer oder Pariſer Trompeter abzugeben. [1945]

Wilh. Sass, Varzin in Pommern.

Jung. Dachshund,

ſchwarzer Farbe, roſtbraun gezeichnet, guter Abſtammung, Männchen, ſehr hübſch, wäre ſofort zu verkaufen. [1946]

Baronin Hermine von Wilsdorf.
Göding (Mähren), Ringplatz 25 27.

Amarantweibchen geſucht. [1947]
M. Stock, Kaſſel, Maulbeerplatz 23½.

---

8 ſchöne große Stiglitzmännch.

8 ℳ, 2 Par ſchöne **Aurora-Aſtrilde,** zuſ. 9 ℳ, 1 Par **Rieſenelſterchen** 4 ℳ. Verpackung frei gegen Nachnahme. [1948]

Jos. Ehrlich,
Würzburg, Weißenburgerſtraße.

Seewaſſer-Aquarien im Zimmer.

Von **Reinhold Ed. Hoffmann.**
Mit vielen Abbildungen. — Preis Mk. 3.—.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Soeben erschien in unserem Verlage und ist durch alle Buchhandlungen oder gegen frankirte Einsendung des Betrages direkt von der Verlagsbuchhandlung zu beziehen:

Die gefiederten Sängerfürsten
des europäischen Festlandes
von
Mathias Rausch, Wien.
Mit 3 Farbendrucktafeln und 4 Textabbildungen.
Geheftet 2,— Mk., gebunden 2,60 Mk.

Der Verfasser, welcher durch seine Aufsätze in der „Gefiederten Welt“ in ausserordentlich weiten Kreisen bekannt geworden, gibt in diesem Buche ausser einer verlässlichen Anleitung über Käfigung, Wartung und Pflege der einheimischen Weichfutterfresser auch eine ausführliche Darstellung ihres Gesanges, sodass dasselbe für jeden Liebhaber unserer gefiederten Sänger ein unentbehrlicher Rathgeber sein wird.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (Max Kretschmann),
Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 43.

Mittheilungen aus Centralamerika (Fortſetzung).
Die deutſchen Ammern.
Plauderei über Kanarienzuchten und Kanariengeſang (Fortſ.).
Briefliche Mittheilungen.
Mancherlei.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenſchau.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen **bis ſpäteſtens Sonntag früh** in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Neue Ameiſeneier, hochf., geſiebte, ſandfr., goldgelbe Ware, Ko. 3, 5 Ko. 13,50 ℳ. **Prima Elbe-Weißwurm**, Ko. 300, Lt. 85 ₰. **Tyroler Ameiseneier**, hochfein, weiß, handgeleſen, Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ. **Zeke (Musca)**, 99er, feinſte, fr. Ware, à Ko. 2,60 ℳ, 5 Ko. 12,50 ℳ. Univerſal-Nachtigalenfutter, 10 Jahre ſelbſt erprobt, Ko. 1,80, 5 Ko. 8,50 ℳ, ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- u. Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ, ſolide, prompte Beding. [1949]
Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Einen Poſten diesjährige, **fleißig ſingende**, zart- u. langgehende Harzer [1950]

Kanarienhähne

mit ſchönen **Hohl- u. Baßrollen** (keine Zitt u. Schapper) verſende à 6, 8 u. 10 ℳ, 2 Stck. **packfrei**, Hochedle Wbch., St. 1 ℳ, Dtd. 10 ℳ, Gar. für Werth u. geſunde Ank.
Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [1951]

Holzwaarenfabrik.

Holzwaarenfabrik.

Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko
Man verlange Preisliste.

Kautſchukſtempel

von 1,25 bis 2,50 ℳ, Farbkiſſen dazu 50 ₰ liefert [1952]
H. D. Becker, Iſerlohn.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei.
R. Schröter (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen**. [1953]

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [1951]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

☞ Für alle Arten Vögel fertige ich fachgemäße

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Staatspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [1955]



50% Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
☞ **Knochenmühlen** ☜
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt**, [1956] Waren i. Mecklenb.
▬ Proſpekte gratis. ▬



Vogelkäfige
aller Art,
Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,
unerreicht in **praktiſcher** Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [1957]
☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Neu! **Senſationell!**

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [1958] **Edmund Schiewick**, Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.
Reparaturen aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt.

Käfige
jeder Art
(Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[1959] Oſchatz i. S.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [1960]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [1961]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

Futtermittel.

Univerſales. [1962]

Röbbeckes prämirte **Univerſalfutter-Spezialitäten** ſind die beſten für alle inſektenfreſſende Vögel.

Qual. Extra, à Ko. 2,60 ℳ
„ Prima, à Ko. 2,— ℳ
„ Sekunda, à Ko. 1,— ℳ
in 1/1 u. 1/2 Pfd.-Packet.

1899er Ameiſeneier 1899er,
hochprima Qual., das Feinſte, was es gibt, vollſtändig rein und ſtaubfrei, à Ko. 4 ℳ, 5 Ko. 18 ℳ, **Ameiſeneier**, naturell, à Ko. 2,20, ſtaubfrei 2,60 ℳ offerirt
Otto Röbbecke, Meerane, Sa., 11,
Sämerei- u. Vogelfutter-Handlg., gegr. 1854.

Sitz meiſt nur, wenn ein beſtimmter Grund vorhanden iſt. Wollen ſie Bewegung haben, ſo fliegen ſie ſich, von Gitter zu Gitter eilend, gehörig aus oder machen immer wieder und wieder den Weg vom Boden zur Sproſſe, von der Sproſſe zum Boden. Je weiter dabei der Weg iſt, deſto mehr Gefallen ſcheinen die Ammern an dieſen Flugkünſten zu finden. Nur der Rohrſpatz iſt hurtiger in ſeinen Bewegungen und benutzt nach Finkenart die Sproſſen, um auf ihnen geſchäftig hin und her zu hüpfen.

Am ungeſchickteſten, aber mit am dauerhafteſten iſt der Grauammer. Die ungefügen Strumpfwirker ſind auch in der Gefangenſchaft recht fleißige Sänger. Vielen iſt allerdings das ſcharfe Getön dieſer Thiere widerwärtig, der wirkliche Liebhaber wird jedoch an ihm ebenſo gut wie an beſſeren Geſängen ſeine Freude haben, iſt es doch ein Zeichen dafür, daß die Pfleglinge ſich wohl befinden. Nur in der Nacht wird das Quietſchen unangenehm, iſt es doch nicht lieblich genug, um einen Gegenwerth für die geſtörte Nachtruhe zu bieten. Hält man die Grauammern parweiſe, ſo wird man im Lenz auch Zeuge ihres eigenthümlichen Minneſpiels, das in einem bäueriſch groben Umhüpfen der Geliebten beſteht und oftmals geradezu lächerlich wirkt. Ihre Zankſucht iſt zwar recht unangenehm, kann jedoch in einem großen Flugkäfig nicht viel Unheil ſtiften, da die anderen Vögel bald gewitzigt ſind und den Grobianen rechtzeitig aus dem Wege gehen. Immerhin ärgert man ſich mitunter über ihre ſtille, tückiſche Art, die Genoſſen am Schwanze zu packen und von der Sitzſtange herabzuzerren.

Weit anmuthiger als die ungeſchlachten Strumpfwirker ſind die gelbbrüſtigen Goldammern, deren Geſang ſchon weniger roh iſt, ſodaß ſie mancher Liebhaber — mit Ausnahme der Nachtzeit — recht gern hört. Auch ihre Bewegungen ſind ſchon weniger ungefüge, wenn auch lange nicht finkenartig gewandt zu nennen. Als ich ſ. Z. den erſten Goldammer in meinen Flugkäfig brachte, fing ich ihn ſchleunigſt wieder heraus, fürchtete ich doch, er würde ſich und alle anderen Inſaſſen zu Schanden fliegen. Jetzt weiß ich, daß ſich die Heftigkeit ſehr bald legt. Die Goldammern haben ſich im Flug bald beſtimmte Flugbahnen ausgeſucht, die ſie faſt mechaniſch innehalten, ſodaß die anderen Vögel durch ihre haſtigen Bewegungen nicht ſehr geſtört werden. Ihre Zähmbarkeit iſt individuell recht verſchieden, manche werden raſch zahm, andere trotzen zeitlebens. Am beſten thut man hier (nicht ſo bei den Finkenarten), wenn man ſich junge Vögel verſchafft. Dieſelben werden nach meinen Erfahrungen raſch zahm und bekommen nach der erſten Mauſer ein prachtvolles, glattes Gefieder, wenn auch ihre Farben nicht der Schönheit der Wildfänge gleichkommen.

Von dem Goldammer an Thun und Treiben wenig verſchieden iſt der Gartenammer, der jedoch bei ſeiner Neigung zur Fettſucht nur gar zu leicht alle Beweglichkeit einbüßt. Am angenehmſten von allen boden- und baumſtändigen Ammern iſt meiner Anſicht nach der Zippammer, den ich ebenſo wie den Gartenammer aus böhmiſchen Handlungen für etwa $1_{,50}$ Mk. zu beziehen pflege. — Es iſt natürlich, daß man ſolche aus der Großhandlung bezogenen Vögel nicht gleich in den Flug wirft, ſondern erſt etwa einen Monat bei reichlicher Badegelegenheit in Quarantäne hält. Nach meinen Erfahrungen iſt gut dreiviertel der aus ſolchen Großhandlungen ſtammenden Vögel (zumeiſt durch Ruhr und Typhoide) verſeucht. Deshalb beſtelle ich mir auch nie einen, ſondern ſtets zwei bis drei Vögel, weil ich ſonſt die nicht ganz unweſentlichen Porto- und Nachnahmekoſten ſchon oft ohne jeden Erfolg weggeworfen habe. — Das braunellenartige Aſchblaugrau des Zippammers wirkt im Käfig recht angenehm, ſodaß ich den Zippammer auch der Färbung wegen vielen Verwandten vorziehe, zumal er auch durch verhältnißmäßig leichte Zähmbarkeit erfreut und viel beſcheidener und verträglicher iſt als die ungefügen Verwandten.

Der Flugkäfig, in dem man die Ammern unterbringt, kann natürlich ſchlechterdings gar nicht zu groß ſein. Während ich bei Finken einen langen und verhältnißmäßig niedrigen Käfig bevorzuge, möchte ich bei Ammern einen ſolchen wählen, bei dem die Höhe die Breite etwa um die Hälfte übertrifft. (Bei einem Quadratmeter Grundfläche alſo $1_{,50}$ bis $1_{,70}$ m Höhe). In dieſem Käfig bringe man nur wenig Sitzſtangen und zwar vornehmlich im obern Theil an, damit die Vögel ihre Touren (Boden—Stange, Stange—Boden) nach Herzensluſt innehalten können.

Was die Nahrung der Ammern angeht, ſo darf man ihnen bei Leibe nicht reines Körnerfutter verabfolgen. Eine Zeit lang (etwa 15 Monate im Durchſchnitt) halten ſich die Thiere dabei ganz gut, dann aber werden ihre Entlerungen immer ſchwieriger und ſchwieriger, ſodaß die Elenden zuletzt ächzend und flügelzuckend daſitzen und einen überaus kläglichen Anblick gewähren. Ein in Rizinusöl getauchter Mehlwurm hilft wol für kurze Zeit (wenn ihn die Thiere nehmen), dann beginnt das Leiden von neuem. Will man dieſe Trübſal vermeiden, ſo füttere man im Sommer reichlich friſche Ameiſeneier und verabreiche den Ammern zur Winterszeit tagtäglich recht ſtark mit Milch getränkte Semmelkrume, bzl. bei ſo karger Fütterung, daß die Thiere dieſelbe verzehren müſſen. In den meiſten Fällen wird die Milchſemmel aber auch ohnehin recht gern angenommen. Daß man Thiere, die an und für ſich zur Fettſucht neigen, nicht überfüttern darf, braucht wol kaum beſonders betont zu werden. Als Körnerfutter verabreiche ich meinen Ammern Hirſe, Kanarienſat und ſehr wenig Hanf. Von der Anwendung von Mehlwürmern bin ich bei ihnen ganz und gar zurückgekommen.

Eine Sonderſtellung nach Lebensart und ganzer Erſcheinung nimmt in unſerer Familie der Rohrammer ein, der, wie oben bemerkt, ſich im Käfig noch am finkenartigſten benimmt. Leider iſt das ſchöne und anmuthige Thier recht zart und nach 1½ bis 2 Jahren faſt immer dem Tod verfallen. In den meiſten Fällen verlieren die Rohrammern zuerſt die Kopffedern, werden dann allmählich ganz kahl und bloß, fröſteln und gehen zuletzt unter Krämpfen ein. Aller Wahrſcheinlichkeit nach entbehren die Thierchen in der trockenen Zimmerluft die feuchten Dämpfe und Nebel, die an ihrem Wohnort ihr Gefieder fortwährend durchbringen. Mochte ich auch das Futter (im allgemeinen fütterte ich Mohn, Hirſe und Weichfutter) wieder und wieder abändern, länger als 2 Jahre konnte ich keinen Rohrammer erhalten. Deshalb verzichtet der Liebhaber wol am beſten ganz darauf, dieſe zärtlichen Geſchöpfe ihrer rohrhalmrauſchenden Heimat zu entrücken.

Alle Arten, die wir hier kennen lernten, entfalten nur beſcheidene Reize. Aber auch dieſe ſind dem wahren Liebhaber theuer, ſind doch die Ammern auch in der freien Natur durchaus nicht poeſieloſe Geſchöpfe. Wer jemals an einem klaren Abend im erſten Vorfrühling, wenn der Himmel klar und weit ſich über der Erde wölbt und das Menſchenauge hoffend und ſehnend in die unendliche Ferne hinausſchaut, wenn es von den Aeſten tropft und rinnt, und allüberall die Goldammern ihr träumeriſches, klagendes und doch verheißungsvolles Lied ſingen, wer jemals in dieſen Tagen durch einen ſtillen Hag ſchritt, wird uns ſicher zugeben, daß auch die unſcheinbaren Ammern nicht bloße Stiefkinder der Allernährenden ſind.

Vielleicht beſetzt der eine oder andere Liebhaber einen Flugkäfig mit den beſcheidenen Thieren und kann dabei alte Erfahrungen nützen. Erwähnen will ich noch zum Schluß, daß ich einſtmals die Ammern mit verſchiedenen Webern (Napoleon-, Blutſchnabel- und Orangewebern) zuſammenhielt, die mit ihnen eine lebensvolle, farbenprächtige Genoſſenſchaft bildeten.

Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang.

Von R. Groſſe.

(Fortſetzung).

Nun zum Vogelei zurück. Das in den Eileiter übergetretene Eierſtocksei wird auf ſeiner Wanderung durch denſelben von verſchiedenen Stoffen umgeben, die ohne Frage das Eindringen der befruchtenden Samenzelle in den Dotter verhindern müſſen und die es auch thun, wenn ſie mit den Samenzellen in Berührung kommen. Um das zu verhindern, dringen die Samenzellen in den Eileitern möglichſt weit vor und ſind ſogar ſchon auf der Eierſtocksplatte ſelbſt aufgefunden worden. Wir haben hier wieder einen Grund für ſchiere, unbefruchtete Eier. Iſt nämlich das Ei im Eileiter ſchon mit Eiweißſtoffen umgeben, wenn die Samenzelle zu ihm gelangt, ſo kann es nicht mehr befruchtet werden und es kann ſehr wol der Fall eintreten, daß von einem Gelege vier Eier hoch oben im Eileiter und das fünfte an einer ungünſtigen Stelle weiter unten von der männlichen Samenzelle erreicht werden und daß ſo vier Eier befruchtet und eins unbefruchtet iſt. Es ſoll aber dieſe durch das Naturgeſetz feſtgelegte Erſcheinung — und das iſt der Hauptgrund, weshalb ich ſie anführe — uns ermahnen, nur geſunde und naturgemäß gepflegte und gefütterte Vögel zur Hecke zu verwenden; denn dieſe allein ſind fähig, den Naturgeſetzen in jeder Beziehung zu genügen und die vielen unbefruchteten Eier, die wir alljährlich noch in der Hecke vorfinden, die aber bei den wild lebenden Vögeln faſt ausgeſchloſſen ſind, beweiſen uns, daß wir noch immer etwas verſäumen in der Pflege unſerer Lieblinge. — Der Legedarm bewegt nun die Dotterkugel, welche aus dem Blut alle für ſie erforderlichen Beſtandtheile aufgenommen hat, durch Zuſammenziehungen der Muskelfaſern vorwärts und auf dieſer Wanderung durch den oberen und mittleren Theil des Eileiters wird das Ei durch Abſonderungen der Drüſen mit der Eiweißſchicht umgeben, und hierauf erhält es in dem untern Theil des Legedarmes, dem ſogenannten Eihälter, zunächſt eine vorläufige Schutzhülle, die Schalenhaut, und hierauf ſeine eigentliche, wirkſame Schutzdecke, die harte Kalkſchale, welche mit unendlich vielen, mit bloßem Auge nicht ſichtbaren, ſtoffloſen Zwiſchenräumen (Poren) verſehen iſt, durch welche die für die Entwicklung der Frucht unbedingt erforderliche ſauerſtoffhaltige Luft einſtrömt. Die letztere veranlaßt den nothwendigen Stoffwechſel, d. i. die Aufnahme von Sauerſtoff und Abgabe von Kohlenſäure. Die Thätigkeit der Muskelfaſern im Eihälter drängt das nunmehr legereife Ei in die Kloake, von welcher es dann ausgeſtoßen wird. Die Eiweißſtoffe dienen hauptſächlich zur Bildung von Fleiſch und Knochen des werdenden Weſens.

Dieſe Vorgänge können ſich ſelbſtredend nur in einem in jeder Beziehung geſunden Vogelkörper regelrecht vollziehen, d. h. in einem Körper, deſſen Werkzeuge in jeder Beziehung thatkräftig arbeiten. Es müſſen das ſowohl die Verdauungs- als auch die Athmungswerkzeuge thun; denn verſagt auch nur einer dieſer Körperbeſtandtheile den Dienſt, ſo arbeiten die Muskeln im Legedarm nicht naturgemäß und Krankheitserſcheinungen (inſonderheit Legenoth) tritt ein.

Im Anſchluß hieran möchte ich noch einige Worte über die Entwickelung der Frucht im Ei ſagen. Ich zweifele nicht daran, daß ſolche Auseinanderſetzungen ſämmtlichen geehrten Leſern und Leſerinnen der „Gefiederten Welt“ willkommen ſein werden. In dem befruchteten Ei vollziehen ſich durch die Einwirkung der Brutwärme des brütenden Weibchens, die 30 bis 32 Grad R. beträgt, Vorgänge, die zur Entwickelung einer Körperform führen, welche zuletzt der Geſtalt der Erzeuger gleicht. Als Ausgangspunkt dieſer Vorgänge iſt alſo das Ei anzuſehen, das demgemäß einen ſehr verwickelten und zarten Bau haben muß, um zu einem ausgebildeten Körper umgeſtaltet werden zu können. Die früher herrſchende Anſicht, daß in dem Ei der Vogelkörper vollſtändig vorgebildet ſei und der letztere bzl. die vorhandenen Theile deſſelben durch bloßes Wachsthum ſich weiter entwickeln und ſchließlich als vollendetes Ganze zur Welt kommen ſollen, iſt längſt durch wiſſenſchaftliche Forſchungen widerlegt worden. Feſt ſteht, daß ſich der Vogelkörper durch ſtändige Fortbildung von Zellen im Ei nach beſtimmten Naturregeln aufbaut. Die Urſprungszelle bildet das befruchtete Ei, ſpäter entſtehen die Furchungszellen und aus dieſen wieder die beiden Keimblätter, die im Verlauſe der weiteren Entwickelung nach dem Geſetz der Arbeitstheilung verſchiedene Zwecke zu erfüllen haben. Die Zellen des äußeren Keimblattes (Exoderm) bilden ſich um zum Nervenſyſtem, den Sinnwerkzeugen und der Haut, während die Zellen des innern Keimblattes (Entoderm) die Verdauungswerkzeuge durch fortwährende Umbildungen ſchaffen. Mit dieſen Zell-Umbildungen werden auch die in der Mutterzelle (dem Ei) vorhandenen Erbmaſſen weitergetragen und ſie vertheilen ſich auf die beſtimmten Körpertheile, wo ſie Verwendung finden können. Wenn ſchon die naturgemäße Bildung des Eies in dem Vogelkörper eine naturgemäße und vollkommen gute Körperbeſchaffenheit des Vogels erfordert, ſo können ſich die den Aufbau des Embryo vollendenden Zellen nur dann naturgemäß bilden, wenn alle hierzu erforderlichen Stoffe in der Mutterzelle (dem Ei) ausreichend vorhanden ſind.

Ich brauche wol nicht, im Hinblick auf die im Vorſtehenden auseinandergeſetzten Entwickelungsvorgänge, noch einmal darauf hinzuweiſen, daß die letzteren nur dann naturgemäß vor ſich gehen können, wenn der Vogel durch entſprechende Pflege und zweckdienliches Futter alle die Stoffe, Kräfte und Säfte in ſich vereinigt, die für ein glatt abzuwickelndes Fortpflanzungsgeſchäft unerläßlich ſind. Wenn wir es erſt fertig bekommen, unſere Edelroller ſo aufzuziehen, dann werden auch klare Gelege und abgeſtorbene Junge im Ei immer ſeltener werden.

Weſentlich können wir hierzu ſchon beitragen, wenn wir auch die Weibchen, ſogar hauptſächlich dieſe, während des Winters ſorgfältig verpflegen und von ihnen alle vorher beſchriebenen Nachtheile fern halten. Wir machen hierdurch zum Theil wieder gut, was wir an den Hähnen durch die allerdings in Rückſicht auf gute Geſangserfolge gebotene Erziehung in kleinen Käfigen und dunkeln Geſangskaſten gefehlt haben. Die ſtraffe Erziehungsweiſe, welche wir unſerer männlichen Nachzucht angedeihen laſſen, um gute und vollkommene Sänger aus ihnen zu bilden, können wir außer durch entſprechend vorſichtige Auswahl nur tadelloſer Heckvögel auch dadurch abſchwächen, daß wir eine Heckart wählen, die einmal die Heckvögel vor körperlicher Ueberanſtrengung ſchützt und ihnen andrerſeits auch geſanglich weniger Nachtheile bringt, ich meine, die einen Rückgang im Geſange nicht zur Folge hat. Beides würden wir annähernd erreichen, wenn wir Einzelhecke pflegten. Dieſe Züchtungsweiſe iſt die natürlichſte, wir finden ſie in der Wildniß faſt bei allen Vogelarten vertreten. Geben wir jedem Heckhahn nur ein Weibchen, ſo findet er während der Brutzeit des letzteren Zeit, ſich ſowol von den geſchlechtlichen Anſtrengungen zu erholen, als auch in derſelben Zeitdauer ſeine geſanglichen Leiſtungen ununterbrochen fortzuſetzen und dadurch ſich auf der Höhe des Geſanges zu erhalten. Beides iſt nicht der Fall, wenn zwei oder noch mehr Hennen ſich um ihn ſcharen und ſeine Liebesergüſſe erwarten. Wenn das Parweibchen, das er ſich bei Beginn der Zucht erkoren hat, auf dem vollendeten Gelege brütet, ſo liegt ihm die Pflicht ob, auch dem Liebesgirren der übrigen Hennen Gehör zu ſchenken, und der Aufregung für ihn iſt kein Ende, weshalb auch ſo in Anſpruch genommene Hähne nur vorübergehend im Laufe des Tages ihr Lied ertönen laſſen und, wenn ſie es thun, von den treibenden Weibchen oft und anhaltend im Geſange geſtört werden. Die Muße, welche dem Heckhahn in der Einzelhecke gewährt wird, iſt aber nicht allein für ihn ſelbſt vortheilhaft und bequem, ſie übt auch auf die Nachzucht einen unverkennbaren Vortheil aus. In erſter Linie iſt die körperliche Entwickelung der Jungen beiderlei Geſchlechts eine günſtigere, weil die Atzung von beiden Alten gemeinſchaftlich ausgeführt und auf dieſe Weiſe das Wachsthum der Jungen gefördert wird. Zum andern leiden die Junghähne nicht unter den oft übelklingenden Tönen, die von den lockenden und ſich zankenden Weibchen ausgeſtoßen werden, und endlich ſind die geſanglichen Ergüſſe des Heckhahns für ſie von großem Vortheil auch ſchon dann, wenn ſie ſich noch im Heckbauer befinden. In einer Einzelhecke treten aber auch beiweitem weniger und ſeltener Krankheitserſcheinungen auf, als in denjenigen Heckkäfigen, in denen eine größere Anzahl Vögel weilt, denn hier iſt die Uebertragung von Anſteckungskeimen ungleich leichter möglich. Dieſe Gefahr wird noch geſteigert, wenn viele Junge das Neſt verlaſſen haben und im Käfige umherfliegen. Es iſt denn auch wol als wahr anzunehmen, daß die Züchter, welche Einzelhecke unterhalten, mit der Ausbildung der Nachzucht wenig Schwierigkeiten haben, und daß ſie die Junghähne nicht nachdrücklich zu verdunkeln brauchen. Auch iſt das Ausmerzungsgeſchäft nicht ſo ſchwierig und unangenehm, wie es oft wird, wenn die Junghähne unter den vorher erwähnten Nachtheilen in der Hecke zu leiden hatten. Infolge der Mehrkoſten, welche die Einzelhecke an Zuchtvögeln und Heckeinrichtungen erfordert und infolge der Mehrarbeit, die ſie bezüglich der Fütterung der Vögel und Reinigung der Käfige verurſacht, wird ſie wenig gepflegt.

Verbreiteter iſt die ſogenannte Bauerhecke mit einem Einwurf von einem Hahn und drei bis vier Hennen. Wenn auch nicht zu leugnen iſt, daß in dieſer Heckart ungleich mehr Störungen vorkommen als in der Einzelhecke, Störungen, die ſich die Weibchen gegenſeitig bereiten, und wenn auch nach meiner Anſicht es nicht zutreffend iſt, wenigſtens nicht im allgemeinen, daß die Bauerhecke verhältnißmäßig eine größere Kopfzahl von jungen Vögeln bringt, als die Einzelhecke, ſo iſt ſie bei einiger Sachkenntniß und Aufmerkſamkeit doch immer noch leicht zu überſehen. Außerdem verurſacht ſie weniger Arbeit als viele Einzelhecken und auch der Geſang der eingeworfenen Heckhähne iſt der Gefahr des Rückganges dann nicht allzuſehr unterworfen, wenn ihm nicht mehr als höchſtens vier Hennen beigegeben werden. (Fortſetzung folgt.)

Brieſliche Mittheilungen.

... Ausgang September haben die Schwalben unſer Saarthal verlaſſen. Erfreuend iſt es, daß ihre Zahl weit größer iſt, als in den letzten Jahren. Erblickt man doch faſt an jedem Hauſe ein bis zwei Neſter, an manchem drei bis vier. Ja, an einem vereinzelt ſtehenden Hauſe zählte ich 28 Stück, ein Neſt dicht an dem andern. Die lieben Thierchen ſind nun fort. Mögen ſie alle wiederkehren im nächſten Frühling! — Die Waſſeramſel und die gelbe Bachſtelze ſind in hieſiger Gegend jetzt ziemlich häufig. Faſt bei jedem kleinen Spaziergange kann ich dieſe Vögel beobachten. Auch Schwarzdroſſeln und Stiglitze treten in dieſem Jahr beſonders häufig auf

P. Mantes.

Mancherlei

Der Vogel-Maſſenmord auf Helgoland hat ſchon öfters die Thierſchutzvereine des Deutſchen Reiches beſchäftigt. Vor einigen Jahren ließ der Verband der Thierſchutzvereine Unterſuchungen an Ort und Stelle vornehmen, und wenn bei dieſer Gelegenheit konſtatirt wurde, daß in einer einzigen Nacht 15000 Wachteln und an einem einzigen Tage 200 Singvögel gefangen und mit dem Schlagnetz in einer Nacht bei Laternenſchein 100000 Lerchen getötet und deren je 20 Stück für 1,50 Mk. verkauft wurden, um größtentheils den Badegäſten als Leckerbiſſen aufgetiſcht zu werden, ſo kann hier wol von einem grauſamen Thiermorde geſprochen werden. Schon als Helgoland noch unter engliſcher Herrſchaft ſtand, hat der Verband Schritte zur Beſeitigung dieſes Maſſenvogelfanges gethan, jedoch vergeblich; auch eine von dem deutſchen Thierſchutz-Kongreß an die deutſche Reichsregierung eingereichte Petition hatte keinen Erfolg. Erſt nach neueren Unterſuchungen erließ die Reichsregierung eine Verfügung, nach welcher Perſonen unter fünfzehn Jahren der Vogelfang gänzlich verboten und Erwachſenen nur unter beſonderen Vorausſetzungen geſtattet wurde. Ein gänzliches Verbot wurde nicht erlaſſen, weil nach Behauptung der Inſulaner der Vogelfang zu deren Verſorgung mit der nöthigen Fleiſchnahrung durchaus erforderlich ſei und ſie ſich auf ihre verbrieften Rechte, die ihnen bis zum Jahre 1900 gewährleiſtet ſeien, berieſen. Da der Thierſchutzverband jedoch der Ueberzeugung iſt, daß die Ernährungsverhältniſſe auch der ärmeren Bevölkerung Helgolands ſich ſeit 1898 infolge erhöhter Beſuche von Badegäſten und des Aufenthalts von Militär gebeſſert haben, auch eine zweimalige tägliche Verbindung mit Hamburg die tägliche Verſorgung mit Fleiſch ermöglicht, ſo ſind dieſer Tage Gymnaſial-Oberlehrer Rohweder aus Huſum und Kaufmann Buſſe aus Hamburg nach Helgoland entſandt, die die Sache noch einmal gründlich unterſuchen und das Reſultat dem Präſidenten der deutſchen Thierſchutzvereine, Hartmann (Köln), zur weiteren Veranlaſſung bei der Staatsregierung mittheilen ſollen.

(„Staatsbürgerzeitung“.)



Anfragen u. Auskunft.

Fräulein Alma Peter: I. Der grauköpfige Zwergpapagei (Psittacus canus, *Gmel.*), auch Grauköpfchen genant, iſt bereits vielfach gezüchtet worden, zuerſt von Dr. Karl Ruß im Jahre 1872. II. Die Fütterung Ihrer Grauköpfchen iſt richtig, ebenſo das gebotene Aufzuchtfutter. Wenn die Vögel Ameiſenpuppen nicht anrühren, ſo bieten Sie ihnen ſtatt derſelben ein Ameiſenpuppengemiſch, beſtehend aus Ameiſenpuppen oder Weißwurm mit geriebnem Eier- oder Weißbrot. III. Der Hafer für das Aufzuchtfutter muß gekocht werden. Am beſten ſind natürlich halbreifer Hafer, Mais in Kolben und friſche Ameiſenpuppen. IV. Um Sämereien einzuquellen verfahren Sie auf folgende Weiſe: Sie laſſen ſie über Nacht in reinem kaltem Waſſer liegen; ſie ſind alsdann ſo weit erweicht, daß ſie den Eindruck eines Fingernagels annehmen; dann ſeihen Sie das Waſſer durch ein Blechſieb oder grobes Leinentuch ab und geben die gequellten Sämereien in einer flachen Porzellanſchale. Bei heißem Wetter müſſen dieſelben zweimal im Tage zubereitet werden, und alle hierbei benutzten Geräthe ſind ſorgfältig ſauber zu halten.

Herrn Adolf: 1. In letzterer Zeit iſt die Züchtung von Miſchlingen von Kanarienvögeln mit Dompfaffen mehrfach gelungen. 2. Für die Baſtardzucht mit dem Kanarienvogel eignen ſich auch Edelfinken, Zitron- und Flachsfinken, Berghänflinge, Goldammern, ſelbſt Feld- und Hausſperlinge. Zahlreiche Züchter zogen auch Miſchlinge von fremdländiſchen Finken, z. B. vom Graugirlitz oder Grauedelfink, vom Goldzeiſig oder amerikaniſchen Stiglitz, vom ſchwarzköpfigen Zeiſig aus Weſtindien, vom gelbſtirnigen Girlitz, Hartlaubszeiſig und Kaplanarienvogel, ja ſelbſt vom Nonpareil und dem Indigovogel. 3. Inbetreff Ihrer weißen Mövchen müſſen Sie nähere Angaben über Fütterung und Haltung machen, wenn Sie erfolgverſprechende Rathſchläge haben wollen.

Bücher und Schriftenſchau.

Die Vogelwarte Helgoland von **Heinrich Gätke.** Braunſchweig 1899. 2. vermehrte Auflage. Lex. 8°. Vollſtändig in 16 Lieferungen je 1 Mk.; Geſammtpreis 16 Mk. Lieferung 1 bis 6.

Vor acht Jahren begrüßte Ruß ſelbſt mit warmen Worten an dieſer Stelle das erſtmalige Erſcheinen dieſes Buches. Er ſprach anerkennend über den Verfaſſer, welcher, ein tüchtiger Kunſtmaler, dieſe Tüchtigkeit auch im ornithologiſchen Fach ſeit lange bekundet und dann durch ein großartiges Werk — eben die Vogelwarte Helgoland — die beobachtend und nachdenkend gewonnenen Reſultate einer fünfzigjährigen Thätigkeit dem leſenden Publikum nutzbar gemacht hatte. Ich will nicht unerwähnt laſſen, daß auch die damals gerade in Arbeit befindliche 3. Aufl. des „Handbuchs für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler“ im 2. Bande („Einheimiſche Stubenvögel“) von dem reichen Inhalt und den wiſſenſchaftlich geſicherten Angaben des Gätke'ſchen Buches nicht unerheblichen und gern anerkannten, dankbaren Gebrauch machte. Stand ja doch Gätke und ſein Buch in engen Beziehungen zu den beiden Blaſius, Vater und Sohn, deren fachmänniſcher Ruf feſt gegründet war und iſt! Blaſius der Vater nämlich hat Gätke in die wiſſenſchaftliche Welt gewiſſermaßen eingeführt, während der Sohn Gätke's Buch herausgab.

Und wahrlich, der Mann und ſein Werk verdiente dieſe Antheilnahme, wie man auch die nothwendig gewordene 2. Auflage und das daraus zu erſchließende Intereſſe des Publikums nur mit Freude begrüßen kann.

Allerdings iſt es ein winziges Stückchen Land, welches der Betrachtung unterzogen wird. Allein dies landferne, meerverlorene Inſelchen, umbrandet von den toſenden Fluthen der Nordſee, dieſes kahle, kleine Eiland — es birgt eine Fülle regſten Lebens. Der Vogelmord auf Helgoland könnte ſo ungeheure Dimenſionen nicht annehmen, wenn nicht jahraus jahrein ſo unzählbare Scharen Gefieders aller Arten hier durchzögen und zu kurzer Raſt ſich niederließen. Helgoland iſt wie der Platz an der Heerſtraße, auf welchem der Feldherr Heerſchau abhält: immer neue und neue Scharen ziehen heran und ſchnell weiter, immer andere und andere Gattungen zeigen ſich dem Blick. Aber es iſt ein unaufhörliches Wogen und Fluthen, jeder Monat zeigt ein verſchiedenes Bild; umſo verſchiedener und wechſelvoller, als das Fluthen nicht bloß nach einer Richtung hin ſtatt hat, ſondern Helgoland liegt auf einem Knotenpunkt. Es iſt nicht nur eine Station auf dem Weg der nord-ſüdlich Wandernden, es ſieht im Herbſt auch die Maſſen der oſtweſtlich Ziehenden, welche von Südſibirien, von Daurien her bis England fliegen, um dann in ſüdlicher Richtung abzuzuſchwenken, nach Nordafrika.

Von der allgemeinen Schilderung der einzelnen Monate und dem Entwurf des Bildes, welches ſie durch Auftreten oder Abzug dieſer oder jener Vogelart gewähren, ſowie nach der ſehr bedeutſamen Feſtlegung auch einer öſt-weſtlichen Zugrichtung für den Herbſt, wendet ſich Gätke zur Beſtimmung der Höhe und Schnelligkeit des Wanderfluges, wobei er zu durchaus weſentlichen, neuen Ergebniſſen gelangt. Es iſt leider nicht möglich, auch nur in Kürze auf dieſe ſehr intereſſanten und von Gätke ſehr klar und lebhaft auseinandergeſetzten Verhältniſſe einzugehen, ebenſo müſſen wir uns verſagen, die weiteren Kapitel des Näheren zu behandeln, um davon eine wenn auch ſchwache Vorſtellung zu geben. Die Ueberſchriften: Meteorologiſche Beeinfluſſungen des Zuges; Zug nach Alter und Geſchlecht; Ausnahmsweiſe Erſcheinungen (Irrgäſte), müſſen genügen, um zu zeigen, daß Gätke dornigen Problemen nicht aus dem Wege, vielmehr ihnen ſcharf zu Leibe geht, wo ſie ihm aufſtoßen. Sein Stoff bot deren genug, und wäre Gätke darauf aus geweſen, etwa drei geiſtreiche Vermuthungen durch eine vierte, geiſtreichere aus dem Felde zu ſchlagen, ſo hätte er wol Gelegenheit und Geiſt genug gehabt, dieſem Hang in ausgiebigſter Weiſe zu fröhnen. Jedoch er war beſcheiden und ſtolz genug; beſcheiden genug, um nur ſichere Thatſachen ſammeln, ſtolz genug, um nur ſolche zur Erklärung der Erſcheinungen verwerthen zu wollen. Wo aber auch die größte Menge unanfechtbarer Thatſachen eine ausreichende, ſtichhaltige Erklärung eines Vorganges nicht ergibt, da erkennt er ein „offenkundiges Räthſel“ an, das er nicht gewillt iſt in leichtſinnigem, tapfer losſchwatzendem Raten zu löſen. Mit dieſer Geſinnung hat er in ſcharfſinniger Erörterung all die vielen Aufſtellungen durchgeſprochen, welche gemacht worden ſind, um aus dem körperlichen oder ſeeliſchen Leben und Verhalten der Vögel ein Verſtändniß für ihren alljährlichen Zug zu gewinnen. Er hat in den beiden letzten Kapiteln des erſten Theiles die Fragen aufgeworfen: Was leitet die Vögel während ihrer Züge? Was veranlaßt den Ausbruch zum Zuge? Die Fragen zu beantworten, hat er nicht verſucht; er hat ſie aber ſehr ſchön als Kapitelüberſchriften gewählt, denn es ſind eben offene Fragen.

Der zweite Theil behandelt einen ebenſo gewichtigen Punkt, den Farbenwechſel der Vögel durch Umfärbung ohne Mauſer, der 3. endlich die bisher auf Helgoland beobachteten Vögel. Dieſe ſind innerhalb der erſten ſechs Lieferungen, welche wir vor uns haben, nur erſt mit 69 Nummern vertreten.

Wenn wir übrigens der 2. Auflage des Gätke'ſchen Buches im Vorſtehenden mit ſolcher Ausführlichkeit gedacht haben, ſo liegt das einmal in der Wichtigkeit ſeines Inhaltes und der einfachen Klarheit ſeiner Schreibweiſe, dann aber auch darin begründet, daß ſein jetziges Erſcheinen in Lieferungen weiteren Kreiſen einen Ankauf eher ermöglichen möchte. E. Bleich.

Ornithologiſches Jahrbuch. Organ für das paläarktiſche Faunengebiet. Herausgegeben von Viktor Ritter von Tſchuſi zu Schmidhoffen. Jahrgang 10, Heft 5. September-Oktober 1899. Hallein 1899.

Inhalt: Robert Eder, Ornithologiſche Notizen aus Neuſtadt bei Friedland in Böhmen; C. E. Hellmayr, Beiträge zur Ornithologie Nieder-Oeſterreichs; v. Tſchuſi zu Schmidhoffen, Einige Bemerkungen zu v. Madaraß': „Further contribution of the Hungarian Ornis“; P. Erneſto Schmitz, Zur Ornis von Madeira; v. Tſchuſi, Sperbereule (Nyctea ulula) in Galizien geſchoſſen; P. Alex. Schaffer, Erſte Ankunft der Zugvögel in Mariahof in Steiermark von 1848—1899; Baron Loudon, Ankunftsdaten in Kerjen (Livland); A. Pohl, Muscicapa parva in Oeſterr.-Schleſien; Literaturbericht.

Es iſt kaum nöthig, in empfehlendem Hinweiſe auf die reichen Angaben und vielfachen Beobachtungen aufmerkſam zu machen, welche das vorliegende Heft bringt. Wir möchten nur bemerken, daß der letzte Beitrag, der über Muscicapa parva in Oeſterr.-Schleſien, in ausführlicherer Darſtellung und durch neue Beobachtungen des Herrn Verf., A. Pohl, erweitert den Leſern der „Gefiederten Welt“ in Nr. 36 bereits vorgelegen hat. D. L.

Lebende Bilder aus dem Reich der Thiere. Augenblicksaufnahmen nach dem lebenden Thierbeſtand des Berliner Zoologiſchen Gartens. Herausgegeben und mit erklärenden Unterſchriftſätzen verſehen von Dr. L. Heck, Direktor des Berliner Zoologiſchen Gartens.

Die beiden erſten Lieferungen dieſes Werkes ſind uns ſoeben zugegangen, und wir werden nicht verfehlen, in der nächſten Nummer eingehender darüber zu ſprechen. D. L.

◆

Zu unſerm Bilde.

Wenn ein Reiſender über Auſtralien berichtet, wird er eine intereſſante Erſcheinung aus der Vogelwelt nicht vergeſſen, die ihm dort immer wieder begegnete und infolge ihres nichts weniger als ſcheuen Weſens und ihrer Neugier gewiſſermaßen zum ſtändigen Begleiter wurde. Es iſt der Jägerlieſt oder Rieſenfiſcher (Halcyon giganteus, *Lath.*), der in ſeiner Heimat, Süd- und Oſtauſtralien, auch „lachender Hans“ genannt wird, weil ſeine außergewöhnliche, weithin ſchallende Stimme einem gurgelnden Gelächter gleicht. Zu beſtimmten Zeiten, morgens, mittags und abends, läßt er ſein „wildes Lachen“ hören und zeigt ſo dem Buſchmann die Zeit an, der ihn deshalb, zugleich auch wegen ſeiner Feindſchaft gegen die Schlangen, als einen heiligen Vogel verehrt. Seine Nahrung, auf die er in der Regel vom Aſt aus ſtößt, beſteht außer aus den eben erwähnten auch aus anderen Reptilien (vornehmlich Eidechſen), dann aus Kerbthieren, kleinen Säugethieren, wahrſcheinlich auch jungen Vögeln. Des Waſſers ſcheint er als Jagdbezirk nicht zu bedürfen; man hat ihn in den trockenſten Waldungen gefunden, und in der Gefangenſchaft zeigt er wenig Neigung zu baden und zu trinken. Der Name Rieſenfiſcher iſt alſo nicht zutreffend für ihn. — Die Brutzeit fällt in die Monate Auguſt und September. Das Par ſucht ſich dann eine paſſende Baumhöhle, meiſt in großen Gummibäumen, aus und legt hier ſeine wundervollen, perlweißen Eier in die Tiefe der Höhle. Wenn die Jungen ausgeſchlüpft ſind, vertheidigen die Alten den Brutplatz muthig und furchtlos. Den, der die Brut rauben will, greifen ſie ſogar thätlich an und verſetzen ihm nicht ungefährliche Biſſe. — Zu erwähnen iſt noch, daß der Jägerlieſt in ſeiner Heimat ein allbekannter Vogel iſt, da er ſich keineswegs an eine beſtimmte Oertlichkeit bindet, ſondern eine jede beſucht, die üppigen Büſche längs der Küſte, wie den dünn beſtandenen Wald der Höhe. Er findet ſich überall, wenn auch nur vereinzelt. Dazu kommt auch, daß er die Nähe des Menſchen durchaus nicht ſcheut, ſondern ſie im Gegentheil aufſucht.

Der Jägerlieſt oder Rieſenfiſcher iſt ein Verwandter unſeres Eisvogels, allerdings ein Rieſe im Vergleich zu ihm; ſeine Länge beträgt 45 bis 47 cm, die Fittichlänge 21, die Schwanzlänge 16 cm. Gefärbt iſt er an Stirn und Oberkopf dunkelbraun, ebenſo erſcheint die Mitte des Oberkopfes und ein Strich durch das Auge; der übrige Kopf iſt weiß, bräunlich verwaſchen; Unterſeite ebenſo; Rücken und Flügel dunkelbraun; mittlere Flügeldecken zart blau geſäumt; Schwanzfedern und Oberſchwanzdecken rothbraun mit ſchwarzen Querbinden, an der Spitze weiß mit ſchwarzen Binden; Oberſchnabel ſchwarzbraun, Unterſchnabel blaßgelb; Augen braun; Füße braun. Beim Weibchen ſind die Farben minder lebhaft und weniger hervorſtechend.

Zum Halten in Volieren oder größeren Käfigen empfiehlt ſich dieſer Vogel recht gut, wie Beobachtungen in zoologiſchen Gärten dargethan haben; er iſt auch, beſonders in neuerer Zeit, ſo oft nach Europa gekommen, daß er gegenwärtig keiner größeren Thierſammlung fehlt; namentlich Herr Direktor Schöpff in Dresden beſaß im Lauf der Zeit Jägerlieſte, die ſich ihrem Pfleger gegenüber völlig zahm zeigten. Mit kleineren Vögeln darf man ſie allerdings nicht zuſammenbringen. Bei Fütterung mit Mäuſen, Fleiſchſtückchen, Fiſchen u. a. thieriſcher Nahrung laſſen ſie ſich leicht erhalten. Zur Fortpflanzung ſind ſie in der Gefangenſchaft ſchon mehrmals geſchritten. D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt:

Geſetzl. geſchützt.

„Insectiverous",

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die

Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Geſetzl. geſchützt.

Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1963]

Niederlagen in allen größeren Städten Deutſchlands und vielen ausländiſchen Städten.

Für Insektenfresser und zur Aufzucht.

„Eidotter" „Eiweiss"

griesförmig per Kilo 3.75 ℳ schrotförmig per Kilo 4.75 ℳ

Beimischung zu jedem Futter. Bei 4½ Ko. franco. [1964]

Henri Vallette, Berlin SW., Schönebergerstrasse 15a.

Präpar. Eigelb,

garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.

Mehlwürmer, rein und groß, à Ltr 5, à Ko. 9.

Biscuit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 98er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,50
Hanfſat	„ „ „ „	1,80
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,75
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,20
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,
do. algeriſche	„ „ „ „	2,—
do. indiſche	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	5,—

Oſſa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [1965]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter

Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl. Vogelfutterarten gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,

Vogelfutter-Großhandlung.

Ameiseneier,

1899er Ia geſiebte, ſandfreie Ware, per Kilo ℳ 3,50

Weißwurm, prima	„ Liter „	1,—
Muska	„ „ „	0,90
Univerſalfutter, extra	„ Kilo „	1,20
Mohnmehl, weiß	„ „ „	0,60
Sonnenblumenk., weiße	„ „ „	0,60
Reis in Hülſen	„ „ „	0,60
Oſſa ſepia, prima	„ „ „	3,—
Sommerrübſen, Ia großkern. für	„	0,44

Ferner Mohar-, Senegal-, Kolben-, weiße **Hirſen, Mohn** und alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1966]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

[illegible] 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſucht große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefere [1967]

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag 411, I.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Staats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpaketen franko, garantirt ſandfrei. [1968]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)

Vogel- und Hundefutterhandlung.

Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Getr. Ameiseneier,

hoch prima, deutſche, ſandfreie Ware, per Ko. 4,60 ℳ, 5 Ko. 22,50 ℳ, per Ltr. 90 ₰.

Gewöhnl. sandfreie Handelsware,

per Ko. 3 ℳ, per 5 Ko. 14 ℳ.

Weisswurm, I. Qual.,

per Kilo 3,80 ℳ, extra Qual. p. Ltr. 1 ℳ.

[1969] **Carl Kämpf, Mainz.**

Neue 1899er

Tyroler Ameiſeneier,

hochfein, weiß und rein, à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk.

Neuer 99er Elbe-Weißwurm

à Ko. 4 Mk., à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk. [1970]

Zeke (Muska)

à Ko. 2½, 5 Ko. 12, 10 Ko. 22 Mk.

J. O. Rohleder

Leipzig-Gohlis

Vogelfutter-Groß-Handlung.

Export u. Engros

von

Prima amerik. Fleiſchmehl,

[illegible]

ſowie **Hanfkuchen, Hanfkuchenmehl, Rapsfutter** und alle **Vogel- u. Kraftfutterſtoffe** liefert billigſt:

A. J. Woznianski,

[1971] Amſterdam (Holland).

Universalfutter.

Vor dem Kennerauge kann eine **Universalfutter-Mischung ohne Zeke** nicht mehr als vollwerthig bestehen.

Einige Jahre fehlte dieses Produkt vollständig am Vogelfuttermarkt, und mancher Liebhaber hätte gern 10 Mk. für ein Kilo bezahlt, wenn er es hätte bekommen können.

Zeke ist **jetzt wieder** überall **gut** und **billig** zu haben.

Man verlange ausdrücklich **„Zeke, Marke Amsel".** [1972]

Alle Vogelfutter,

Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.

Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.

Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [1973

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche

inſektenfreſſende Singvögel

von Apotheker **Max Kruel.**

Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!

[1974] Allein angefertigt von

Ernst Hanke, Trier, Moſel.

Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 4,25 ℳ, Kilo 7,75 ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ. **Ameiſeneier,** hochprima 99er, Liter 90 ₰, **Weißwurm,** Liter 90 ₰. [1975]

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Mehlwürmer, à Ltr. 4 ℳ inkl. Verp.

Bei Einſendung von 1,50 ℳ = 140 gr., alſo weit über 1000 Stück, frk. inkl. Verp.

[1976] **P. Bartsch, Breslau, Flurſtr. 6.**

Mehlwürmer, Ia., Ltr. 4 ℳ, Pfd. 3,20 ℳ,
Jeitner, Breslau, Weinſtr. 12. [1977]

Vögel.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft.

Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen.

Kataloge gratis u. franko. [1978]

Kanarienhähne

meines mit Ehrenpr., Gold. u. Silb. Med. präm. Hohlrollerſt. von 8 bis 25 ℳ. Probe u. Garant. **Th. Börner,**

[1979] **Kaſſel,** Gartenſtr. 3 I.

Stiglitze

mit ſchwarzen Achſeln, Dtzd. 9 ℳ, Wbch. 1,50 ℳ, **Bluthänflinge,** gute Sänger, Dtzd. 9 ℳ, **Buchfinken,** Dtzd. 6 ℳ, **Schwarzplattl,** Dtzd 24, Stck. 2,50 ℳ, **Mehlwürmer,** Ltr. 4 ℳ, liefert unter Garantie [1980]

G. Findeis, Wien I, Wollzeile 25.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1981]

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1982]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Alle Sorten Waldvögel,

Ia Ware, ſowie rothe Hollunder- u. Ebereſchenbeeren getrocknet, verſendet [1983]
W. Wolf, Gefell i. Vogtl.
Preisl. frei. Dankſchreiben erhalte täglich.

Wellenſittiche,

Par 6 ℳ. **L. Brinkmann,**
[1984] **Calefeld** in Hannover.

Alpen-Stiglitz-Männchen,

Dtzd. 10 ℳ, Schwarzplatten, echte Doppelüberſchläg., à Stck. 4 ℳ. Verſende nur gut eingew. Vögel u. Gar. leb. Ank. [1985]
Wilhelm Fechtner, Leitmeritz a. d. Elbe.

Kanarien-Vorſänger!

Vorzügliche tieftourenreichſte, noch nie zur Zucht benutzt und flott durchſingend, nach Geſangsgüte à 12, 15, 20, 25 und 30 ℳ, noch in großartiger Auswahl da. Verſandt überallhin gegen Vorherkaſſe oder Nachnahme mit voller Garantie für Werth, Geſundheit und Probezeit.

[1986] **Julius Häger.**
St. Andreasberg (Harz).
Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864.
Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Ein Sprosser und eine Nachtigal

werden zu kaufen geſucht. Es werden jedoch nur ganz vorzügliche Schläger berückſichtigt. Offerten nebſt Preis und Bezugsquelle befördert die Exped. unter **P. 166.** [1987]

Verk. 1,0 ſchön und laut ſchlagende **Nachtigal,** Preis 15 ℳ, l. Garantie. [1988]
A. Wycisk, Zaborze.

Graupapagei,

7 Monat hier, fleißig übend, ſchön., kräftiges Exemplar, verk. für 35 ℳ geg. Nachn. [1989]
Alwin Heinrich, Zittau i. Sa.

---

45 Stck. ſüdamerik. Vogelbälge, der größ. Theil davon Colibris in 3–4 Arten, gebe zum billigen Preis von 12 ℳ ab. [1990] **Rich. Hummel,** Coethen i. Anh.

Seewaſſer-Aquarien im Zimmer.

Von **Reinhold Ed. Hoffmann.**
Mit vielen Abbildungen. — Preis Mk. 3.—
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Ia Dayaldroſſel,

tadellos befiedert, prima Sänger, mit Verpackung 30 ℳ, zu verkaufen. [1991]
Aug. Amlung.
Ludwigshafen, Kanalſtr. 70.

Ruſſ, fremdl. Stubenvögel I (27 ℳ), Taf. verl. ſonſt vollſt., verk. f. d. Meiſtgebot, Stiglitzbaſt., ſſ., in Geſ. u. Farbe, 8 ℳ, Zbch. 2 ℳ, mein erprobt vorzügl. Zchtp. 5 ℳ. [1992
Schwarzmann, Eſſing, P. Olching (Oberbayern).

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländiſchen und ausländiſchen Körner- und inſektenfreſſende Vögel, in allerfeinſter, ſtets friſcher Ware, beſonders **Ameiſeneier,** handverleſene ganz reine, **Eintagsfliegen** (Weißwurm), **Muska** oder **Zeke** (überſeeiſche Fliege), **Mehlwürmer** und **Univerſalfutter-Miſchungen** verſendet zu billigen Preiſen [1993]
H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung,
Erfurt, Futterſtraße 3.
Preisliſte auf Wunſch umſonſt und poſtfrei.

Folgende viel und deutlich ſprechende, liederſingende Papageien habe abzugeben:

1	Blauſtirn-Amazone,	11	Lieder	ſingend,
1	" "	8	"	"
1	" "	4	"	"
1	" "	3	"	"
1	" "	2	"	"
1	" "	1	Lied	"
1	Gelbnacken,	3	Lieder	"
1	"	2	"	"
1	Doppelgelbkopf	3	"	"
1	Graupapagei	3	"	"
1	"	2	"	"
1	"	2	"	"
1	"	2	"	"

Außerdem: 1 Surynam-, 1 Gelbnacken-, 7 Blauſtirn-Amazonen, 7 Graupapageien, viel und deutlich ſprechend, aber nicht ſingend.

Vorſtehend verzeichnete 26 ſprechende Papageien ſind gegenwärtig thatſächlich am Lager; alle ſind tadellos geſund, zahm, abgehört und wird für richtiges Sprachverzeichniß Garantie geleiſtet. Liebhabern gutſprechender Papageien bietet ſich damit eine Auswahl wie nie zuvor. Die Preiſe ſind billigſt geſtellt.

Ferner vorräthig in großer Anzahl: 1 Neſtor-Papagei, 16 Araras, darunter Glauca, Leari, blaue, gelbbrüſtige, hellrothe und dunkelrothe. Friſch eingeführte Graupapageien, große, ausgeſucht ſchöne helle Vögel, à 16—18 Mk., desgl. weniger ſchön befiedert, 14 Mk. Blauſtirn-Amazonen, Scharlachſtirnige, Pracht-, Müller-, rothrückige Surynam- und Goldnacken-Amazonen; gelbſchnäbelige Langflügel-Papageien; große und kleine Kakadus; Felſenſittiche, Roſellas, Blauſtirnſittiche Par 10 Mk.

Wellenſittiche, tadelloſe, zuchtfähige Vögel, Par 5,50 Mk., 3 Par 15 Mk.

Kleine Alexanderſittiche, Par 8 Mk., desgl. einzelne Männchen, Stück 5 Mk., Grauköpfige Zwergpapageien, Par 2,50 Mk., 10 Par 20 Mk., Graue Kardinäle, ausgefärbt, Stück 4 Mk., Seidenſtare, Stück 4 Mk., Par 7 Mk., Kalanderlerchen, Männchen, à 4 Mk., Stummellerchen (Alauda brachydactylus), à 15 Mk., Goldzügelfinken, Par 3,50 Mk., Röthelammern, Par 8 Mk., Schwarzkopf-Nonnen, 5 Par 7 Mk., 10 Par 12,50 Mk., graue Reisfinken, 5 Par 9 Mk., 10 Par 16 Mk., Halsbandtauben, Par 4 Mk., Sperbertäubchen, Par 4 Mk., Californ. Schopfwachteln, importirt, Par 12 Mk., desgl. Weibchen, Par 8 Mk., Amerik. Spottdroſſeln, eingewöhnte ſichere Männchen, Stück 10 Mk., desgl. jüngere, Stück 7 Mk.

Ferner folgende, noch jetzt im Freien gehaltene Vogelarten: Hirtenſtare, St. 5 Mk., Ufermaina, St. 8 Mk., Buſchmaina, St. 8 Mk., Javaniſche Mainas, St. 10 Mk., Weißkehlige Heherlinge, Grünflügeltauben, Par 8 Mk., Mähnen- oder Nicobartauben, Par 30 Mk., Pampas- oder Straußhühner, Par 42 Mk., Mandarin-Enten in voller Pracht, Par 25 Mk., Smaragdenten, Par 25 Mk.

Betone ausdrücklich, daß die Vögel, welche von mir als „im Freien gehalten“ bezeichnet werden, auch thatſächlich in Außenvolièren Tag und Nacht ſich befinden, trotz der niedrigen Nachttemperatur ſind die Vögel tadellos und geſund. Alle übrigen Vögel und Thiere ſind in dem zu dem Zwecke erbauten hohen und luftigen, mit Oberlicht, Ventilation und Central-(Heißwaſſer)-Heizung verſehenen Häuſern untergebracht.

Ferner offerire: Kleine zahme Affen, St. 15—18 Mk., Königseichhörnchen, St. 30 Mk., Flughörnchen, Par 15 Mk. Leoparden, Hyänen, Bären, Krabbenbären, Känguruhs, Krokodile, Rieſenſchlangen, große Schildkröten, Seehunde, Pelikane ꝛc. ꝛc.

Papageienkäfige zu en gros-Preiſen.

Illuſtrirte Preisliſte gegen Einſendung von 30 Pfg. in Briefmarken, welche bei Kauf vergütet werden. [1994]

August Fockelmann
Thierhandlung
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtraße 72.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner= und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.
Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [1981]

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [1982]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Alle Sorten Waldvögel,

Ia Ware, ſowie rothe Hollunder= u. Ebereſchenberen getrocknet, verſendet [1983]
W. Wolf, Gefell i. Vogtl.
Preisl. frei. Dankſchreiben erhalte täglich.

Wellenſittiche,

Par 6 ℳ. **L. Brinkmann,**
[1984] **Calefeld** in Hannover.

Alpen=Stiglitz=Männchen,

Dtzd. 10 ℳ, Schwarzplatten, echte Doppelüberſchläg., à Stck. 4 ℳ. Verſende nur gut eingew. Vögel u. Gar. leb. Ank. [1985]
Wilhelm Fechtner, Leitmeritz a. d. Elbe.

Kanarien-Vorſänger!

Vorzügliche tieftourenreichſte, noch nie zur Zucht benutzt und flott durchſingend, nach Geſangsgüte à 12, 15, 20, 25 und 30 ℳ, noch in großartiger Auswahl da. Verſandt überallhin gegen Vorherkaſſe oder Nachnahme mit voller Garantie für Werth, Geſundheit und Probezeit.

[1986] **Julius Häger,**
St. Andreasberg (Harz).
Züchterei hochedler Kanarien, gegründet 1864.
Höchſte Ehrenprämien. Tauſende Dankſchreiben.

Ein Sprosser und eine Nachtigal

werden zu kaufen geſucht. Es werden jedoch nur ganz vorzügliche Schläger berückſichtigt. Offerten nebſt Preis und Bezugsquelle befördert die Exped. unter **P. 166.** [1987]

Verk. 1,0 ſchön und laut ſchlagende **Nachtigal**, Preis 15 ℳ, l. Garantie. [1988]
A. Wycisk, Zaborze.

Graupapagei,

7 Monat hier, fleißig übend, ſchön., kräftiges Exemplar, verk. für 35 ℳ geg. Nachn. [1989]
Alwin Heinrich, Zittau i. Sa.

---

45 Stck. ſüdamerik. Vogelbälge, der größ. Theil davon Colibris in 3 4 Arten, gebe zum billigen Preis von 12 ℳ ab. [1990] **Rich. Hummel**, Cöthen i. Anh.

Seewaſſer=Aquarien im Zimmer.

Von **Reinhold Ed. Hoffmann.**
Mit vielen Abbildungen. — Preis Mk. 3.--
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Ia Dayaldroſſel,

tadellos befiedert, prima Sänger, mit Verpackung 30 ℳ, zu verkaufen. [1991]
Aug. Amlung.
Ludwigshafen, Kanalſtr. 70.

Ruß, fremdl. Stubenvögel I (27 ℳ), Taf. verl. ſonſt vollſt., verk. f. d. Meiſtgebot, Stiglitzbaſt., ff. in Geſg. u. Farbe 8 ℳ, Wbch. 2 ℳ, mein erprobt vorzügl. Zchtp. 5 ℳ. [1992
Schwarzmann, Eſting, P. Olching (Oberbayern).

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländiſchen und ausländiſchen körner- und inſektenfreſſende Vögel, in allerfeinſter, ſtets friſcher Ware, beſonders **Ameiſeneier**, handverleſene ganz reine, **Eintagsfliegen** (Weißwurm), **Muska** oder **Jeke** (überſeeiſche Fliege), **Mehlwürmer** und **Univerſalfutter=Miſchungen** verſendet zu billigen Preiſen [1993]
H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung,
Erfurt, Futterſtraße 3.
Preisliſte auf Wunſch umſonſt und portofrei.

Folgende viel und deutlich ſprechende, liederſingende Papageien habe abzugeben:

1	Blauſtirn=Amazone,	11	Lieder	ſingend,
1	" "	8	"	"
1	" "	4	"	"
1	" "	3	"	"
1	" "	2	"	"
1	" "	1	Lied	"
1	Gelbnacken,	3	Lieder	"
1	"	2	"	"
1	Doppelgelbkopf	3	"	"
1	Graupapagei	3	"	"
1	"	2	"	"
1	"	2	"	"
1	"	2	"	"

Außerdem: 1 Surynam=, 1 Gelbnacken=, 7 Blauſtirn=Amazonen, 7 Graupapageien, viel und deutlich ſprechend, aber nicht ſingend.

Vorſtehend verzeichnete 26 ſprechende Papageien ſind gegenwärtig thatſächlich am Lager: alle ſind tadellos geſund, zahm, abgehört und wird für richtiges Sprachverzeichniß Garantie geleiſtet. Liebhabern gutſprechender Papageien bietet ſich damit eine Auswahl wie nie zuvor. Die Preiſe ſind billigſt geſtellt.

Ferner vorräthig in großer Anzahl: 1 Neſtor=Papagei, 16 Araras, darunter Glauca, Leari, blaue, gelbbrüſtige, hellrothe und dunkelrothe. Friſch eingeführte Graupapageien, große, ausgeſucht ſchöne helle Vögel, à 16—18 Mk., desgl. weniger ſchön befiedert, 14 Mk. Blauſtirn=Amazonen, Scharlachſtirnige, Pracht=, Müller=, rothrückige Surynam= und Goldnacken=Amazonen; gelbſchnäbelige Langflügel=Papageien; große und kleine Kakadus; Felſenſittiche, Roſellas, Blauſtirnſittiche Par 10 Mk.

Wellenſittiche, tadelloſe, zuchtfähige Vögel, Par 5,50 Mk., 3 Par 15 Mk.

Kleine Alexanderſittiche, Par 8 Mk., desgl. einzelne Männchen, Stück 5 Mk., Grauköpfige Zwergpapageien, Par 2,50 Mk., 10 Par 20 Mk., Graue Kardinäle, ausgefärbt, Stück 4 Mk., Seidenſtare, Stück 4 Mk., Par 7 Mk., Kalanderlerchen, Männchen, à 4 Mk., Stummellerchen (Alauda brachydactylus), à 15 Mk., Goldzügelfinken, Par 3,50 Mk., Röthelammern, Par 8 Mk., Schwarzkopf=Nonnen, 5 Par 7 Mk., 10 Par 12,50 Mk., graue Reisfinken, 5 Par 9 Mk., 10 Par 16 Mk., Halsbandtauben, Par 4 Mk., Sperbertäubchen, Par 4 Mk., Californ. Schopfwachteln, importirt, Par 12 Mk., desgl. Weibchen, Par 8 Mk., Amerik. Spottdroſſeln, eingewöhnte ſichere Männchen, Stück 10 Mk., desgl. jüngere, Stück 7 Mk.

Ferner folgende, noch jetzt im Freien gehaltene Vogelarten: Hirtenſtare, St. 5 Mk., Ufermaina, St. 8 Mk., Buſchmaina, St. 8 Mk., Javaniſche Mainas, St. 10 Mk., Weißkehlige Heherlinge, Grünflügeltauben, Par 8 Mk., Mähnen= oder Nicobartauben, Par 30 Mk., Pampas= oder Straußhühner, Par 42 Mk., Mandarin=Enten in voller Pracht, Par 25 Mk., Smaragdenten, Par 25 Mk.

Betone ausdrücklich, daß die Vögel, welche von mir als „im Freien gehalten“ bezeichnet werden, auch thatſächlich in Außenvolièren Tag und Nacht ſich befinden, trotz der niedrigen Nachttemperatur ſind die Vögel tadellos und geſund. Alle übrigen Vögel und Thiere ſind in dem zu dem Zwecke erbauten hohen und luftigen, mit Oberlicht, Ventilation und Central=(Heißwaſſer)Heizung verſehenen Häuſern untergebracht.

Ferner offerire: Kleine zahme Affen, St. 15—18 Mk., Königseichhörnchen, St. 30 Mk., Flughörnchen, Par 15 Mk. Leoparden, Hyänen, Bären, Krabbenbären, Känguruhs, Krokodile, Rieſenſchlangen, große Schildkröten, Seehunde, Pelikane ꝛc. ꝛc.

Papageienkäfige zu en gros=Preiſen.

Illuſtrirte Preisliſte gegen Einſendung von 30 Pfg. in Briefmarken, welche bei Kauf vergütet werden. [1994]

August Fockelmann
Thierhandlung
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtraße 72.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von August Hopfer in Burg b. M.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Begründet von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 44. Magdeburg, den 2. November 1899. XXVIII. Jahrg.

Ergänzungen zu der Lehre über die Ernährung der Papageien.

Von Dr. med. Otto, Mülhauſen (Elſaß).

(Schluß).

Nach der vorangegangenen etwas ausführlichen chemiſch-wiſſenſchaftlichen Darſtellung werden nun den Leſern folgende Stellen in den Dr. Ruß'ſchen Werken und in der „Gefiederten Welt“ klar werden:

Dr. Ruß, Sprech. Papageien, Seite 173*): „Die Malakaſittiche hielten ſich bei gekochtem Reis ziemlich gut, magerten jedoch ab.“ Ich glaube ganz ſicher, daß ſie bald darauf geſtorben ſind. In dem gekochten Reis fehlten eben die Nährſalze. Mit eingeweichtem Reis gefüttert, wären ſie nicht abgemagert.

Gefiederte Welt 1899, Nr. 25: Petzſittiche: „Die Jungen werden mit Früchten und halbreifen Samen aufgezogen.“ Beides enthält hohe Prozente an Nährſalzen (ſiehe Nr. 38).

Gefiederte Welt 1898, Nr. 3, Behl: „Bei eingeweichter Semmel und ganz weich gekochtem Mais gehen die Papageien maſſenhaft zu Grunde.“ Warum? Weil ſie keine Nährſalze erhalten. Mit trockner Semmel und eingeweichtem Mais wären ſie erhalten geblieben.

Gefiederte Welt 1898, Nr 31, Wiegand: „Eine an Sepſis erkrankte Amazone genas auf den Genuß von einer ganzen Weintraube (0,50 Nährſalze); ſie erhielt auch ſpäter niemals Waſſer.“

Gefiederte Welt 1897, Nr. 8, General-Arzt Brummer in Karlsruhe: „Fruchtſäfte empfiehlt er bei Sepſis; Waſſer erzeugt und befördert die Krankheit.“ Dieſe Anſicht deckt ſich alſo vollſtändig mit meinen Unterſuchungen.

Dr. Ruß, Fremdländiſche Stubenvögel, Seite 383: „Der gekochte Reis iſt in neuerer Zeit als Vogelfutter arg in Verruf gekommen.“ Warum? Weil ihm die Nährſalze fehlen. Gekochter Reis iſt nicht nur durchaus werthlos, ſondern ſogar direkt ſchädlich. Hieran ſchließt ſich ein Verſuch, den ich durch einen Hühnerzüchter vornehmen ließ. Zwei Hähne, A. u. B., wurden mit Reis gefüttert, nachdem ihr Gewicht genau feſtgeſtellt war. A. erhielt ungeſchälten, rohen Reis, B. ſtark abgekochten, polirten Reis. A. war nach 14 Tagen fett und viel ſchwerer; B. hatte kaum einige Gramm zugenommen. Jetzt erhielt A. gekochten Reis, B. rohen Reis. In 14 Tagen hatte B. das Gewicht von A. überholt, A. hatte bei gekochtem Reis abgenommen.

Gefiederte Welt 1898, Seite 353: „Die Schiffsmatroſen erklären, daß die Vögel, die öfter als ein- bis zweimal am Tag Kaffe zu ſaufen bekommen, an chroniſchem Darmkatarrh erkranken.“ Vom chroniſchen Darmkatarrh zur Sepſis iſt ſodann nur ein kleiner Sprung; deckt ſich alſo vollſtändig mit meinen Unterſuchungen.

H. Behl's Behandlung: „$^1/_4$ Hanf, $^3/_4$ Spitzſamen, Milch, Semmel, reichlich Obſt.“ In allen dieſen Nahrungsmitteln ſind reichlich Nährſalze vorhanden, deshalb Behl's Erfolg. Es wäre mir intereſſant zu erfahren, wo Herr Behl dieſe Behandlung hergenommen hat.

---

*) Wir bemerken ein für alle Mal, daß die folgenden Belegſtellen von dem Herrn Verf. nicht wortgetreu, wol aber ſinngemäß übernommen worden ſind; man kann ihm für die knappe, das Wichtige zuſammenordnende Wiedergabe nur dankbar ſein. D. L.

Gefiederte Welt 1897, Nr. 29: „Die Mönchsſittiche, freifliegend, plünderten die ganzen Frühkirſchen, weil ſie viel Junge hatten.“ Alſo der alte Sittich füttert aus Inſtinkt ſeine Jungen mit nährſalzreichem (0,75) Futter (Kirſchen).

Dr. Ruß, *Der Graupapagei, Seite* 10: „Mais in Milch ſoll die Lieblingsnahrung des Graupapagei in der Freiheit ſein.“ Da nun Mais in Milch 3 % Nährſalze enthält, ſo geht daraus hervor, daß der Graupapagei einen hervorragenden Prozentſatz von Nährſalzen (3 %) zu ſeinem Geſundſein bedarf. Es kann alſo nicht einmal der gewöhnliche ausgereifte Mais mit ſeinen nur 1½ % Nährſalzen im eingeweichten Zuſtand dieſe Nährſalze vollſtändig erſetzen, d. h. ein Vollfutter ſein, noch weniger aber im angekochten oder gar ſtark zerkochten Zuſtand. Man muß alſo beſonders für den Graupapagei andere ſtark nährſalzhaltige Futterſtoffe, beſonders Reis und Spitzſamen, zu Hülfe nehmen. Ich kann mich erſt ſpäter genau über dieſe Sache ausſprechen, wenn ich den Nährſalzgehalt von Hanf und Spitzſamen genau beſtimmt haben werde. Sicher aber iſt, daß das maſſenhafte Eingehen der jungen Graupapageien lediglich darauf beruht, daß dieſe Thiere bis jetzt zu wenig nährſalzhaltige Futterſtoffe erhalten haben.

Wer ſich über die enorm wichtige Ernährung des Menſchen mit „*Nährſalzen*“ unterrichten will, den verweiſe ich auf meine Vorträge, Schriften und Zeitungen; vielleicht trägt dieſes zur Aufklärung mehr bei, als wenn ich meinen Artikel noch weiter in die Länge ziehe.

Nun noch einmal das Praktiſche. Bei der Ernährung der Papageien kommt in Betracht: 1. *Waſſer*: Regenwaſſer, Flußwaſſer, Waſſerleitungswaſſer. Das Regenwaſſer iſt chemiſch faſt reines Waſſer, enthält jedoch 2 mmg Ammoniak, 0,7 mmg Salpeterſäure und Schwefelſäure; dieſe Chemikalien nehmen zu, je weiter nach dem tropiſchen Klima hin der Regen fällt. Die Schwefelſäure ſpielt bei der Verdauung der Eiweißkörper (Mais 4 %) eine wichtige Rolle: die Eiweißkörper werden in Peptone umgewandelt. Es iſt alſo nicht von der Hand zu weiſen, daß das Saufen von Regenwaſſer bei der Verdauung der Papageien eine wichtige Rolle ſpielt, ähnlich den Nährſalzen (ſiehe oben unter Natron). Statt Regenwaſſer nimmt man weiches Flußwaſſer oder abgekochtes Waſſerleitungswaſſer, dem ich einige Tropfen Schwefelſäurelöſung 0,10 : 500 deſtillirten Waſſers zuſetze.

2. *Milch*. In der guten unverfälſchten Milch ſind alle Nährſubſtanzen enthalten, die der Körper zum Ausbau braucht (ſiehe Nr. 38). Infolgedeſſen iſt Milch ein ſehr werthvolles Nahrungsmittel. Sie wird täglich ein- bis zweimal gereicht, beſonders Früh zum Eintauchen der Semmel. Ich gebe die Semmel trocken, der Vogel taucht ſelbſt ein. Die Milch enthält ¾ % Nährſalze, beſonders alle 12 obenerwähnten Mineralſtoffe und zwar im richtigen Miſchungsverhältniß.

3. *Mais* gequellt, *Reis* trocken oder gequellt, *Hirſe* trocken. Aus beiſtehender Tabelle über die chemiſche Zuſammenſetzung iſt erſichtlich, daß Reis und Hirſe ſehr nahrhaft und „blutbildend“ ſind, wegen des ſehr hohen Nährſalzgehaltes. Hirſe nehmen jedoch die großen Papageien ſehr ſelten an. Die Hirſe enthält einen ſtarken Prozentſatz Zucker (35 %). Hieraus ziehe ich den Schluß, daß die großen Papageien Hirſe deshalb nicht nehmen, weil ſie keine für große Mengen Zucker eingerichtete Verdauung haben. Aus dem Grunde iſt es nun aber auch falſch, den Mais anzukochen oder abzukochen, weil ſo ein großer Theil des Stärkemehls in Zucker übergeführt wird. Der Papagei genießt eben in der Freiheit keinen Stärkezucker, weil keiner da iſt, ſondern nur Fruchtzucker, und zwar im Reis nur 6 %, im Mais 2 %. Der Stärkezucker wird im Körper des Thieres weiter zerlegt in Kohlenſäure und Alkohol. Ein Thier alſo, das ſtets *abgekochten* Mais und Reis erhält, befindet ſich ſchließlich unter denſelben Verhältniſſen, als ein Anderes, daß ſtets Wein und Bier zu trinken bekommt, d. h. es geht bald ein. *Mais* und *Reis* wird in weichem Flußwaſſer eingeweicht oder in abgekochtem Waſſerleitungswaſſer, dem man eine Meſſerſpitze voll Soda zuſetzt.

Hafer, ungeſchälter, roh oder gequellt, ſteht im Nährſalzgehalt noch höher als der Mais und iſt ſtets im Miſchfutter II zu reichen. Alle Papageien nehmen ab und zu welchen auf.

Spitzſamen. Leider konnte ich keine Analyſe erhalten bezüglich der Mineralſtoffe. Meine Erfahrung hat mich aber gelehrt, daß Spitzſamen ein ſehr werthvolles *Kranken*- und *Rekonvaleszentenfutter* iſt. So hat eine Gelbnacke während 9 Tagen ſich faſt nur von Spitzſamen ernährt und frißt heute noch bisweilen viel davon. Für alle jungen, neuangekommenen, beſonders Graupapageien dürfte Spitzſamen ein ſehr werthvolles Futter ſein.

Früchte: Für das Beſte hiervon halte ich Weintrauben, die ja auch bei uns jetzt faſt das ganze Jahr hindurch zu haben ſind. Wie viel man davon reicht (4 bis 12 Stück), richtet ſich nach den Ausleerungen des Vogels. Aus beifolgender Tabelle*), die ſehr lehrreich iſt, erſieht man, daß die Weintraube hinſichtlich des Nährſalzgehaltes, bzl. guter Blutbildung bei Weitem unter allen Futterſtoffen die erſte Stelle einnimmt:

Kali:	Weintrauben (56)	Kirſchen (52)	Nüſſe (31)	Mais (30)
Natron:	Reis (5)	Kirſchen (2)	Nüſſe (2)	Hafer (1,70)
Kalk:	Weintrauben (11)	Nüſſe (9)	Kirſchen (8)	Reis (4)
Eiſen:	Kirſchen (2)	Reis (2)	Nüſſe (1½)	Hafer (1,18)
Phosphorſäure:	Reis (50)	Mais (45)	Nüſſe (44)	Hafer (25)
Schwefelſäure:	Weintrauben (6)	Kirſchen (5)	Hafer (2)	Reis (1)
Kieſelſäure:	Hafer (39)	Reis (18)	Kirſchen (9)	Weintrauben (3)

Es gruppiren ſich alſo die Futterſtoffe bezüglich des Nährſalzgehaltes und deſſen Einwirkung auf geſunde Blutbildung folgendermaßen: Weintrauben, Kirſchen, Reis, Hafer, Mais, Nüſſe.

---

*) Unter Benutzung von Henſels Düngerlehre, vegetar. Warte. 1899. Nr. 9.

[illegible]

[illegible]

Bei dieſen im Handel vorkommenden Steinröthelu verhält es ſich ebenſo, wie bei der Blaudroſſel, denn auch von dieſer Art kommen meiſt nur aufgezogene Stücke in den Handel. Bei ſolch jungen Steinröthelu liegt die Sache jedoch inſofern günſtiger, als ihr Geſang in allen Theilen ein durchwegs reintönender iſt und der Vogel zudem ein großes Nachahmungstalent bekundet, welches ihn unter günſtigen Verhältniſſen wenigſtens zu einem angenehmen Potpourriſänger heranbilden läßt. Auch der Geſangsfleiß iſt bei jungen Steinröthelu meiſt ein größerer als bei jungen Blaudroſſeln.

Der Stimmton des Steinröthel iſt im Verhältniſſe zur Körpergröße des Vogels nicht ſo ſtark und hellklingend wie der anderer Droſſelarten, doch kräftig genug, um mit ſeiner Schallſtärke den Raum eines größeren Zimmers zu füllen; er iſt weich, dabei voll und rein, und die aus ſolchen Tönen zuſammengeſetzten Klangbilder ſind überaus wohllautend. Der ſanfte, getragene Geſang erinnert in vieler Hinſicht an die traulichen, herzinnigen Weiſen unſeres allbeliebten Rothkehlchens, übt jedoch infolge der reicheren Tonfülle im Allgemeinen und häufigerer Abwechslung bei gutſingenden Vögeln im Beſonderen eine größere Wirkung aus. Nicht in kecker, friſcher Lebensluſt überſprudelnd, ohne überſtürzende Haſt, vielmehr in bedächtiger Breite, in ſchön gegliederten Sätzen und faſt jede Silbe für ſich kommen die melodiſchen Geſangsſtrofen ausdrucksvollſt zur Geltung.

Ein außergewöhnlich großer Geſangseifer, wie er zur beſten Zeit z. B. von Sing- und Miſteldroſſel, Nachtigal und Sproſſer, Grasmücken und Gartenſängern geäußert wird, läßt ſich beim Steinröthel kaum konſtatiren; er ſingt im Mai mit ebenſolch ſcheinbarer Ueberlegung und Bedächtigkeit wie in den erſten Wintermonaten, iſt aber inſofern dankbarer als manch andere Stubenvögel, weil er gewöhnlich ſchon nach Beendigung der Mauſer mit dem Geſang beginnt und denſelben in der folgenden Zeit ſtets hören läßt.

Ebenſo wie das Rothkehlchen liebt der Steinröthel ſolch befiederte Stubengeſellſchaft, welche nicht mit allzuſtarken Stimmmitteln ausgeſtattet iſt, und er wird ſein Lied umſo lieber hören laſſen und daſſelbe um ſo ſchöner vortragen, je weniger er durch andere Schreier beeinträchtigt wird. Während eines unfreundlichen Wintertages im wohlig durchwärmten Zimmer ſitzen und auf die traulichen Weiſen eines Rothkehlchens und Steinröthels, auf das ſüße Lullen einer Haidelerche und das andachtsvolle Dichten einer noch halblautſingenden Singdroſſel lauſchen zu können, iſt ein Genuß, welchen der gemüthvolle Vogelfreund nicht hoch genug anzuſchlagen weiß.

Die treffliche Eignung des Geſanges für das Zimmer, das ſchöne Gefieder mit den hübſch harmonirenden Farben und das ſanfte, zutrauliche, anſchmiegende Weſen des Steinröthels laſſen ihn vielen Vogelliebhabern beſonders ſchätzenswerth erſcheinen. Daß es unter den Steinröthelu ebenfalls faule Geſellen und werthloſe Stümper gibt, iſt ja ſelbſtverſtändlich und beruht letzterer Umſtand, wie ſchon oben angedeutet, hauptſächlich auf der unterbliebenen Ausbildung des aufgepäppelten Jungen im Naturgeſang. Aeltere Wildfänge mit reinem Naturgeſang ſind im Handel faſt ebenſo ſelten, wie bei den Blaudroſſeln. Der Aufenthaltsort des Steinröthels iſt nämlich gleichfalls ein derart gewählter, daß dort nur in den ſeltenſten Fällen die üblichen Fangmittel gehandhabt werden können. Selbſt der Verſuch mit dem „Wichtl“ (hierzu wird gewöhnlich die in den ſüdlichen Bergen ziemlich häufig vorkommende Zwergohreule verwendet) iſt nicht immer erfolgverſprechend; ſei es, daß er dieſen Nachtraubvogel einfach ignorirt, oder vorſichtig genug iſt, um den verfänglichen Leimruthen aus dem Wege zu gehen. Am früheſten gelingt der in gewiſſer Hinſicht grauſame Fang des bereits zum Vater gewordenen Vogels am Neſte mit ſeinen Jungen, weil ihn die Fürſorge für dieſelben eine vorhandene Gefahr eher überſehen läßt. In dieſem Falle müſſen die Jungen ausgehoben, mit ihrem Vater gemeinſam in einen Käfig gebracht, dieſer in einem unbewohnten ſtillen Raum aufgeſtellt, entſprechend verhüllt und die Vögel dann reichlich mit „lebendem“ Futter verſehen werden. Die Sorge um das Wohl ſeiner bettelnden Jungen und das ermöglichte Atzen derſelben, laſſen dem Alten dann, wie man ſagt, die Zeit nicht lange werden und ihn die Freiheit umſo leichter vermiſſen. Bis dann die Jungen ſelbſtſtändig werden, hat ſich auch der Alte an die neuen Verhältniſſe gewöhnt.

Gelangt ein Steinröthelwildfang, namentlich ein mehrjähriger, auf andere Art in die Gefangenſchaft, ſo iſt in den meiſten Fällen alle Mühe, welche auf die Eingewöhnung deſſelben verwendet wird, vergebens. Wie geiſtesabweſend, den ſtarren Blick gegen die Käfigdecke gerichtet, ſitzt er in ſeinem Behälter, raſt beim Nähertreten des Pflegers wie wahnſinnig umher, ſtößt ſich wund, zerſetzt ſich das Gefieder und iſt nach einigen Tagen, bei gänzlichem Verſchmähen des verlockendſten Futters, bereits ſo elend, daß an ſeinem Aufkommen gezweifelt werden muß. Iſt der Pfleger barmherzig, ſo läßt er den Vogel noch zeitgerecht in Freiheit, andernfalls verſucht er es mit dem mühevollen Stopfen und gelangt vielleicht ausnahmsweiſe zu einem Ergebniß. Gewöhnlich aber wird der Vogel durch dieſe Manipulation, welche nothgedrungen bei abgedecktem Käfig vorgenommen werden muß, noch unruhiger und ſchreckhafter, die noch vorhandenen Kräfte werden gänzlich aufgebraucht, und manchmal verendet er ſchon bei dem zweiten oder dritten Herausgreifen aus dem Käfig vor Angſt und Aufregung.

Eine gewiſſe, oft ans Komiſche grenzende Aengſtlichkeit und Schreckhaftigkeit bleibt dem Steinröthel während ſeiner ganzen Lebenszeit eigen und äußert ſich am meiſten beim unvermittelten Erſcheinen eines fremden Gegenſtandes oder Lebeweſens in ſeiner unmittelbaren Nähe. Ein vom Wind erfaßtes und umher gewirbeltes weißes Stück Papier, ein ins Zimmer ſtürmender Hund, der ſchwarze Kaminfeger, der ſeltſam ausſehende ſlovakiſche Naſtelbinder, eine fantaſtiſch aufgeputzte Dame und dergleichen „Schreckgeſtalten“ können ihn ganz außer Rand und Band bringen und laſſen ihn oft lange nicht zur Ruhe kommen.

Hinſichtlich der Wartung und Pflege des Steinröthels im Allgemeinen verweiſe ich auf das bei der Blaudroſſel Geſagte und kann für Liebhaber, welche gerne Zuchtverſuche mit heimiſchen Vögeln anſtellen, noch beifügen, daß dieſe Steindroſſelart in der Gefangenſchaft bereits zum Brüten und vollſtändiger Aufziehung ihrer Jungen gebracht wurde. Die eingehende Beſchreibung einer derartigen dem verſtorbenen Hofrath Dr. Liebe gelungenen Zucht findet ſich gegenwärtig in jedem ausführlichen Hilfsbuch über Stubenvogelpflege nachgedruckt nnd ich will daher nur kurz darauf hinweiſen.

Ein zweijähriges aufgezogenes Steinröthelweibchen, welches in einem großen Käfig Anſtalten zum Niſten gemacht hatte, wurde mit einem gleichalten, ebenfalls aufgezogenen Männchen in ein zweifenſteriges Dachkämmerchen gebracht, welches mit Tannenbäumchen, Buchen und Eichenäſten, hölzernen Niſtkäſtchen und mit aus Ziegelſteinen erbauten Niſträumen ausgeſtattet war. Als Ort für den Neſtbau wählte das Weibchen eine Rinne oberhalb des Dachfenſters, gebildet von einem auf die Kante geſetzten Balken und von Verſchlagbrettern. Zum Bau des Neſtes wurde nur trockenes Gras verwendet. Vom 28. Mai an ſaß das Weibchen außerordentlich feſt, ohne vom Männchen unterſtützt zu werden und am 10. Juni, alſo bereits nach 13 Tagen, waren die Jungen ausgekrochen. Als Atzfutter wurden friſche Ameiſenpuppen und kleine Mehlwürmer gereicht und zur vollſtändigen Großfütterung der Jungen ſüßer Quark, rohes und gekochtes Fleiſch, Semmelgries, hartgeſottenes Ei, größere Inſekten, Obſt, Beren und noch manch Anderes in Verwendung genommen, deſſen Wiederholung ich lieber übergehe, um nichts Ueberflüſſiges ſagen zu müſſen. — Behufs Aufpäppelung junger Steinröthel wird hier beſter Polentagries ſehr dick in Milch eingekocht und abgekühlt verwendet. Die mit dem Atzlöffel von dieſem Brei heruntergeſtochenen Biſſen werden in friſche Ameiſenpuppen getaucht und dann dem ſperrenden Neſtling in dem Schnabel eingeführt. Sobald der Vogel allein das gleiche Futter aus dem Troge zu freſſen beginnt, erhält er abwechslungsweiſe fein geſchabtes, rohes Fleiſch und ſüßen Quark mit Semmelgries gemiſcht, immer Ameiſenpuppen hierzu und wird dann allmählich an das übliche Nachtigalen-Miſchfutter gebracht. Demſelben wird das gleiche Quantum Mehlwürmer, bzl. Ameiſenpuppen wie bei der Blaudroſſel beigegeben.

Beim Ankaufe junger Steinröthel-Männchen wolle man mit der gleichen Vorſicht zu Werke gehen, wie ich ſie unter Hinweis auf ſingende Weibchen bei der Blaudroſſel empfohlen habe und nur auf ausgefärbte Vögel reflektiren.

Das ausgefärbte Steinröthelmännchen iſt oberſeits graubraun, blau überlaufen, mit dunkelaſchgrauen bis ſchwärzlichen Schultern; die Flügel ſind dunkelbraun mit helleren Federſäumen, der Unterrücken iſt weiß; Kopf und Hals ſind dunkelblaugrau; die Unterſeite iſt von der Bruſt an hellroſtfarbig; der Hinterleib iſt roſtgelb; die Schwanzfedern ſind, mit Ausnahme der mittleren dunkelbraunen, roſtfarbig. Je älter das Männchen wird, deſto lebhafter zeigen ſich ſeine Farben, einerlei, ob daſſelbe frei lebt oder in ſachgemäßer Pflege gehalten wird Das Weibchen iſt oberſeits graubraun, mit fein dunkelgeſtricheltem und heller punktirtem Rücken; Kehle und Kopfſeiten ſind grauweißlich, dunkel geſtrichelt; die Unterſeite iſt gelblichbraun, zart dunkel geſchuppt. Junge Vögel gleichen dem alten Weibchen, nur zeigen ſie eine hellere Farbe.

Einzelne Liebhaber behaupten zu wiſſen, daß die im tieferen Süden vorkommenden Steinröthel von kleinerer, ſchmächtigerer Geſtalt ſind, ſich in lebhafteren Farben präſentiren und einen beſſeren Geſang beſitzen als jene, welche weiter nach Norden ihre Heimat haben. Hinſichtlich der Farbe und Größe jener Vögel mag es ſeine Richtigkeit haben, einen nennenswerthen Unterſchied im Geſang habe ich indeß noch nicht wahrnehmen können.

* * *

Leiden und Freuden des Vogelliebhabers.

Von N. S.

Als Vogelliebhaber ſtehe ich, wenn ich das in einem Ruß'ſchen Lehrbuch angeführte Beiſpiel benutzen darf, auf dem Standpunkt des Fräulein Ornis. Ich habe meine Freude daran, die Vögel in ihren Bewegungen und in ihrer ganzen Lebensweiſe zu beobachten, und das allergrößte Vergnügen bereitet es mir, wenn ich meinen Lieblingen ein Daſein bereiten kann, das ſie die Gefangenſchaft vergeſſen läßt und das ihnen Wohlbehagen bereitet.

Freilich iſt dies eine ſchwierige Aufgabe, wenn man in einer großen Stadt wohnt und keinen Raum für eine Vogelſtube oder für eine größere Voliere hat; aber doppelt ſchwierig iſt es dann, wenn eine Ehefrau inbetreff der Reinlichkeit der Wohnräume zu Gunſten der Vögel nicht ein Auge zudrücken mag. Ich habe immer nur wenig Vögel gehalten, habe aber in meinem fünfzigjährigen Leben ſchon alle möglichen Arten unter den Händen gehabt. Die dankbarſten und intereſſanteſten jedoch waren für mich ein Par Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scop.*), und an dieſen zwei Lieblingen will ich den Beweis führen, daß ich trotz Ehefrau und trotz Raummangel dieſen Thierchen wenigſtens eine Zeit lang ein behagliches Daſein bereitete; auch ſind mit dieſer kleinen Vogelgeſchichte ſo nebenbei gleich die Freuden und Leiden des Liebhabers gekennzeichnet.

In einem meiner Wohnzimmer hatte ich einen Erker mit zwei Seiten- und einem Vorderfenſter, alle drei der Morgenſonne zugänglich. In einem dieſer Seitenfenſter ſtand der Käfig, und vor dem gegenüberliegenden Fenſter hatte ich auf einer Etagere einen dichten Pflanzenwald aufgebaut, der ſich faſt bis zur Decke des Zimmers erſtreckte. Gegen das Zimmer zu war der Erker mit einer ſogenannten Portiere von dunklem Stoff begrenzt.

Auch früher ſchon hatte ich es durchzuſetzen gewußt, daß meine Vögel in der Mittagszeit ein bis zwei Stunden und Sonntags den ganzen Vormittag Ausgehzeit hatten, das heißt frei umherfliegen konnten, und ſtets gewöhnte ich ſie zum Aus- und Einfliegen in ihren Käfig. Aber wenn in meinem glücklichen Eheleben bisweilen eine Disharmonie vorkam, ſo war die Urſache niemals eine andere als dieſer Spazierflug meiner Vögel.

Bei dieſer Erkereinrichtung in einer neugemietheten Wohnung hatte ich nun meinen Plan darauf gebaut, daß meine Pekingnachtigalen dieſen Pflanzenwald zu ihren Spaziergängen benutzen würden, und die lieben Thierchen entſprachen ganz meiner Erwartung. Es war eine Freude zuzuſchauen, wie ſich dieſe ſchmucken Vögel in dem Miniaturwald umhertummelten, und in hundertmaliger Abwechslung bald in den Käfig, bald in's Gebüſch flogen, und mit welchem Behagen ſie namentlich die unter einer Palme angebrachte Badeeinrichtung benutzten.

In der erſten Zeit hielt ich an einer zweiſtündigen Urlaubszeit feſt, doch ſpäter wurde dieſelbe immer mehr ausgedehnt, bis ſchließlich der Käfig nur noch beim Lüften des Zimmers geſchloſſen wurde, da es faſt garnicht vorkam, daß die Vögel aus dem Erker heraus in die wenig Ruhepunkte bietende Stube hinausflogen, und die beſchmutzten Pflanzen ſich im Badezimmer unter der Brauſe leicht reinigen ließen. Auch nahm ich gern mit in den Kauf, daß einzelne Pflanzenarten benagt und beſchädigt wurden. So war ich denn nahe daran, dies luſtige Par, das ſich auch im Gefieder zu einer wahren Pracht entfaltet hatte, als das Ideal aller Stubenvögel zu betrachten, aber eine gewiſſe Herabminderung meiner Begeiſterung ſollte mir doch nicht erſpart bleiben.

Die drei Fenſter hatten natürlich, wie es bei einer ordentlichen Hausfrau nicht anders ſein kann, weiße Gardinen bekommen, und ſo konnte es nicht ausbleiben, daß auch den Gardinenſtangen ab und zu ein Beſuch abgeſtattet wurde, deſſen Folgen ſich auf den Gardinen bemerkbar machten. Aber mit Argusaugen überwachte ich dieſe überflüſſigen Verzierungen und beſeitigte täglich mehrere Male alle Spuren ſo gut es ging. Da kam ich in meiner angeborenen Argloſigkeit mal auf den Gedanken, einen Verſuch zu machen, ob vielleicht Heidelberen eine Delikateſſe für meine Lieblinge wären, und ſiehe da, ſie wurden mit Dankbarkeit und großem Appetit angenommen. Aber an die Folgen dieſer Fütterung hatte ich nicht gedacht, und gegen Vertilgung dieſer Spuren auf den Gardinen war ich ganz ohnmächtig. Das gab nun einen mächtigen Krach, aber nicht mit den Nachtigalen, ſondern von einer andern Seite her. Doch nachdem ich Urfehde geſchworen, jeden weitern Verſuch mit der Heidelberfütterung aufzugeben, erlangte ich noch einmal Verzeihung, und es blieb vorläufig beim Alten.

Eines Tags waren meine Sonnenvögel ganz verſchwunden, und erſt nach langem Suchen entdeckte ich ſie endlich im Zimmer unterm Tiſch, auf einem Teppich ſitzend. Der Tiſch war mit einer faſt bis zur Erde herabhängenden Plüſchdecke überdeckt, ſodaß ſie dort ganz ungeſtört ſitzen konnten, und es ereignete ſich nun der für mich heute noch unerklärliche Fall, daß die Vögel täglich ſtundenlang lieber unter dieſem Tiſch auf dem Teppich ſaßen, als in ihrem kleinen Wald und, ſo oft ich ſie auch wegtrieb, immer wieder dahin zurückkehrten.*) Ich nahm an, ſie ſuchten Niſtgelegenheit, daher gab ich ihnen dieſe im Käfig und im Gebüſch: aber das wurde garnicht beachtet. Dieſer Teppich nun war gerade ein Lieblingsſtück meiner Frau, da ſie ihn mühevoll in bedeutender Größe und Schönheit ſelbſt geſtickt hatte. (Schluß folgt.)

---

*) Die Vorliebe der Sonnenvögel für den düſteren Raum unter dem Tiſch erklärt ſich aus dem Umſtand, daß dieſe Vogelart ſich in der Heimat, Indien und Südchina, viel in oft undurchdringlichen Dickichten und im Dſchunglegebüſch aufhält. D. L.

* * *

Briefliche Mittheilungen

... In Nr. 39 Ihrer Zeitſchrift bringen Sie einen der Kölniſchen Volkszeitung entnommenen Artikel über das Vordringen der Schwarzdroſſel in verſchiedenen Gegenden Deutſchlands. Auch hier in der Schweiz (Solothurn) kann ein Gleiches konſtatirt werden. Wenn einerſeits der Naturfreund Gefallen findet an dieſen Vögeln, wenn er ſie während des Winters Kälte gefüttert, in der darauffolgenden Brutzeit die Neſter und Jungen vor Raubzeug ſchützt und am guten Gedeihen der Nachzucht ſich freut, ſo iſt er andererſeits umſomehr entrüſtet, wenn er zuſehen muß, wie ſeine kleine Aufmerkſamkeit und Sorge um die Vögel mit Undank belohnt wird. Die Jungen ſind ausgeflogen, werden von den Alten einige Zeit noch in der Nähe der Niſtplätze gefüttert und treiben ſich oft bis zu Dutzenden in den Gärten und Anlagen herum. Die Zeit, da das frühe Obſt, Spalierbirnen und auch Birnen auf Hochſtämmen, zur Reife gelangt, naht heran und mit ihr auch die diesmal ungebetene Sippſchaft der Amſeln. Die vielgeprieſene Zutraulichkeit muß nun ſchon als Frechheit taxirt werden, da jetzt nichts mehr verſchont bleibt. Ich habe beobachten können, wie Schwarzdroſſeln in Scharen von 20 bis 30 Stück in einen wohlgepflegten Obſtgarten einfielen und ganze Bäume der ſchönſten frühen Birnenſorten in wenigen Tagen lerten. Die ſchönſten Früchte wurden zuerſt angehackt, zum Abfallen gebracht, am Boden alsdann bis auf die Rinde ausgehöhlt, kleine Früchte wurden ſogar ganz weggetragen. Der Beſitzer des Gartens (einer meiner Nachbarn) ließ ſich einige Zeit über die Nützlichkeit der Amſeln belehren und ſchien den Verluſt ſeiner Johannisberen und Birnen zu verſchmerzen. Als aber die gefräßigen Vögel auch über die reifenden Trauben eines freiſtehenden großen Weinſtockes, der ſeiner Ausdehnung wegen nicht mit Gaze überzogen werden konnte, herfielen und alles Erreichbare auffraßen, da wurde der gute Mann eines noch beſſeren belehrt. Die Gemüthlichkeit hat eben auch ihre Grenzen, mein Nachbar iſt ein Feind der Amſeln geworden und wird es auch bleiben. In gewiſſen Jahren, wo das Obſt ſtrichweiſe faſt gänzlich fehlt, wie es in dieſem Jahre hier der Fall iſt, ſcheinen ſich dieſe Vögel auf diejenigen Gegenden zu konzentiren, die vermöge geſchützter Lage vereinzelte obſttragende Bäume aufweiſen. Es ſind dann gerade die beſſeren Birnen-Sorten, die unter dieſer Plage am meiſten zu leiden haben. Wenn ſich die Schwarzdroſſeln in den nächſten zehn Jahren in dem Maßſtab vermehren, wie in der letzten Zeit, ſo wird die öffentliche Meinung dieſem Vogel ein ſchlimmeres Lob ſpenden, als heute dem Spatz. Ich glaube mich zu dieſer Annahme umſomehr berechtigt, da ich mich von vielen ähnlichen Fällen überzeugen konnte, und trotzdem ich ein eifriger Vogelfreund bin, kann ich die Amſeln nicht mehr in Schutz nehmen, wie ich es ſ. Zeit zu thun gewohnt war. **Ein Abonnent der „Gefiederten Welt“.**

Anfragen u. Auskunft

Herrn Max Geisler, Omaha: Wir halten für das gerathenſte, daß Sie ſich an den Mann wenden, der die Nährſalzfütterung der Papageien zuerſt angeregt hat und vorher ſelbſt mit beſtem Erfolg erprobt hatte, — an Herrn Dr. Otto, deſſen Adreſſe Sie kennen: Mülhauſen (Elſaß). Uns ſtehen in dieſer Beziehung keine Erfahrungen zu Gebote. Vielleicht wird übrigens in nächſter Zeit Herr Dr. Otto ſelbſt in der „Gefiederten Welt“ darüber das Wort ergreifen.

Herrn Adolf: 1. Es iſt gut, daß Sie ein Kanarienweibchen zur Baſtardzucht nehmen wollen, denn glückliche Bruten gehen nach alter Erfahrung meiſtens nur dann vor ſich, wenn man Kanarienweibchen mit fremden Männchen zuſammenbringt. Uebrigens ſoll die Baſtard-Züchtung im Freien immer am beſten glücken. Bringen Sie alſo im Frühjahr, zu der Zeit, da Sie die Züchtung verſuchen wollen, den Käfig an einem Ort an, wo er gegen Zugluft, Regen und Raubthiere geſchützt iſt. 2. Sperlinge füttert man als Allesfreſſer mit mannigfaltiger Nahrung. Geben Sie alſo neben mehligen und öligen Sämereien, beſonders Hanf, auch Fleiſchfutter: Mehlwürmer, Ameiſenpuppen oder entſprechende Gemiſche, ſodann allerlei lebende Kerbthiere, ferner Früchte und Grünkraut. 3. Ihren weißen japaniſchen Mövchen müſſen Sie nicht allein ungeſchälte weiße Hirſe und Spitzſamen, ſondern auch Hafer und ungeſchälten Reis geben. Zuweilen bieten Sie einige Mehlwürmer, in drei Stücke geſchnitten, ſodann Grünkraut, ſowie als vorzügliches Nahrungsmittel ſpäterhin die Hirſen in friſchen Aehren mit halbreifen Körnern und vorzugsweiſe halbreifen Hafer. Zur beginnenden Niſtzeit reichen Sie das Samenfutter recht mannigfaltig, außer den genannten auch allerlei andere kleine Sämereien von Mohn, Wegerich, Melde u. a. unſchädlichen Kräutern, vorzugsweiſe aber von Gräſern, und zwar iſt es vortheilhaft, beſonders die letzteren friſch und wenn möglich in halbreifem Zuſtand, d. h. in Milch ſtehend, zu geben. Sodann bieten Sie die mehlhaltigen Sämereien auch im eingequellten Zuſtand. Das hauptſächlichſte Futtermitel beſteht aber in Ameiſenpuppen. Fehlen die friſchen, ſo müſſen Sie trockene, zwiſchen naſſem Löſchpapier aufgequellte, mit Eierbrot oder Vogelbisquit überriebene Ameiſenpuppen geben. Dieſe krümelige Maſſe wird mit etwas hart gekochtem, geriebenem Hühnerei (Gelbes und Weißes) vermiſcht. Außer dieſer Miſchung reichen Sie auch Eierbrot an ſich in Waſſer aufgeweicht, gut ausgedrückt und zwiſchen den Händen zerrieben. Auch kleine nackte Raupen, Spinnen, Blattläuſe u. a. weiche Kerbthiere ſind den Prachtfinken dienlich, ebenſo ein wenig weiche, ſüße Frucht. 4. Ihre weißen Mövchen waren an Legenoth erkrankt. Urſachen dieſer Krankheit ſind Mangel an kalkhaltigen Stoffen zur naturgemäßen Bildung der Eierſchale, beträchtliche und plötzliche Wärmeſchwankungen, Störung beim Eierlegen, Entkräftung oder zu große Wohlbeleibtheit, ſchließlich auch Fehler der Eierzeugungswerkzeuge. Häufig erkranken junge zu früh legende Weibchen beim erſten Ei oder ſolche, die zu oft hintereinander geniſtet haben. Vorbeugungsmittel: Verſorgung mit Kalk, friſchen, gut zerdrückten Eierſchalen, auch mit ſauberm, trocknem Sand; im zeitigen Frühjahr und Herbſt gleichmäßige Wärme von etwa 15 Grad R., auch nachts; Unterſuchung jeden Vogels vor der Heckzeit und Verpflegung dem Körperzuſtand entſprechend. Heilmittel: Beſtreichen des Unterleibs des kranken Vogels mit erwärmtem Oliven- oder Provenzeröl, indem man zugleich einen in das Oel getauchten Stecknadelknopf vorſichtig mehrmals in die Legeröhre führt, und ſchließlich ein Dampfbad. Man ſetzt das Weibchen in einem Harzer Bauerchen auf ein mehrfach zuſammengelegtes, dickes, über einen Topf mit ſtark handwarmem Waſſer gebreitetes Leinentuch, deckt es mit einem Zipfel loſe zu, jedoch ſo, daß es nicht erſtickt, läßt es bis eine Stunde ſitzen, erneuert das heiße Waſſer einige Mal, wickelt dann den Vogel in erwärmte, loſe Baumwolle, deckt darüber ein Tuch ſo, daß nur der Kopf frei bleibt, und bringt ihn an eine warme Stelle, wenn möglich auf recht warmen Sand, bis er völlig abgetrocknet iſt. Darauf wird er in eine warme Stube, bzl. in die Nähe des Ofens gebracht, wo er möglichſt ruhig verbleibt, bis er das Ei von ſich gegeben. Im übrigen finden Sie über Haltung, Pflege und Zucht der Mövchen vorzügliche Belehrung in Dr. Ruß Werk „Die Prachtfinken“, 2. Auflage (Preis 2,60 ℳ, zu beziehen durch die Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg).

Bücher und Schriftenſchau

Lebende Bilder aus dem Reiche der Thiere. Augenblicksaufnahmen nach dem lebenden Thierbeſtande des Berliner Zoologiſchen Gartens. Herausgegeben und mit erklärenden Unterſchriftſätzen verſehen von Dr. L. Heck, Direktor des Berliner Zoologiſchen Gartens. Vollſtändig in 16 Lieferungen à 50 Pf. mit ca. 200 Illuſtrationen. Querfolio (Werner Verlag G. m. b. H., Berlin, Equitable-Gebäude).

„Der Titel dieſes neuen Lieferungswerkes klingt überraſchend, „Lebende Bilder!“ Man denkt unwillkürlich an die neuen Erfindungen, die uns Menſchen und Thiere in voller Bewegung vorführen. Das bietet nun dieſes Werk allerdings nicht. Dennoch iſt der Titel gerechtfertigt. Schon der erſte Blick in dieſes Bilderwerk zeigt uns, daß wir etwas *ganz Neues und Originelles vor uns haben*. Wenn wir die Bilder eines naturhiſtoriſchen Atlas betrachten, ſo ſehen wir den Typus des Thieres vor uns, gleichſam ein Modell, eine Durchſchnittsfigur, die etwa jenem Durchſchnittsmenſchen gleicht, den man oft in Modeblättern ſieht. Es iſt ein Typus ohne Individualität, ein allgemeines Cliché ohne Leben, Umriſſe ohne Fleiſch, Knochen und Blut. Die Bilder des vorliegenden Werkes aber ſind Leben, Individualität, Wahrheit und volle Natur; denn ſie ſind eine treue Kopie des Lebens. Das Werk enthält Photographien der Thiere des Zoologiſchen Gartens in Berlin. Aber es ſind keine Durchſchnittsphotographien. Schon die Größe der Bilder iſt überraſchend. Eine Sammlung von Thierphotographien in dieſer Größe iſt bisher noch nicht dageweſen. Und wie ſind dieſe Photographien ausgeführt! Jedes Har, jede Feder tritt deutlich hervor. Das Thier ſelbſt ſteht mit ſolcher Plaſtik vor unſeren Augen, daß wir es in lebendiger Wirklichkeit zu ſehen glauben. Und nicht allein die Kunſt des Photographen ſpricht aus dieſen Blättern, auch die techniſche Ausführung iſt vollendet und der Kenner ſieht ſofort, daß ſich in dieſen Bildern das Wiſſen des Zoologen mit dem höchſten Können der modernen photographiſchen Reproduktion vereinigt haben. Abbildungen, wie die des indiſchen Nashorns, des Löwen „Caeſar“, Arnibüffel, des Weißnackenkranichs und überhaupt aller derjenigen Thiere, die in den vorliegenden erſten Heften vorkommen, haben wir in ſolcher lebensvollen Schönheit und mit ſo packender Naturtreue noch in keinem Illuſtrationswerke geſehen. Alle Thierfreunde, alle Naturkenner, alle Lehrenden und Lernenden werden ihre Freude daran haben. Der Text von Dr. Heck, dem Direktor des Zoologiſchen Gartens von Berlin, iſt friſch, lebendig, frei von aller Pedanterie und doch ſehr inſtruktiv gehalten. Und ſo iſt dieſes prächtige ca. 200 Illuſtrationen umfaſſende Werk geeignet, ſehr zahlreiche Freunde zu finden und zu weiteſter Verbreitung zu gelangen, zumal der Preis von 50 Pfg. für eine Lieferung mit 12 meiſterhaft ausgeführten Aufnahmen bei muſtergültiger Druckausſtattung als höchſt wohlfeil hervorgehoben zu werden verdient."

In der That ſind die Bilder, wie die zugehörigen Beſchreibungen recht wol geeignet, lebensvoll zu wirken und belehrend zu unterrichten. Wir wiſſen aus ſicherer Quelle und könnten auch ohnedies der trefflichen, lebenstreuen Wiedergabe abmerken, daß keine Mühe geſcheut worden iſt, mit allen Mitteln der modernen Technik echte, prächtige Abbilder der geſtaltungskräftigen Natur zu ſchaffen; für die Güte des erklärenden Textes aber bürgt voll und ganz der Name des Verfaſſers, des Herrn Dr. Heck, der übrigens auch ſonſt mit kenntnißreichem Eifer und liebevoller Thätigkeit für das ſchöne Unternehmen eingetreten iſt, ſodaß der ganze Geiſt der Auffaſſung und die friſche Urſprünglichkeit, welche aus den Bildern ſpricht, in hohem Maß ſeiner kundigen und verſtändnißvollen Antheilnahme verdankt werden.

Wenn wir die Bilder betrachten, welche uns Angehörige der gefiederten Welt in greifbare Nähe rücken, ſo finden wir in den vorliegenden beiden erſten Lieferungen: Den Grünſchnabelkranich; die Weißnackenkraniche; Fiſchreiher am Horſt; Lachmöven; Branicki's Seeadler (Haliaetus branicki, *Tacz.*); Kronadler (Spizaetus coronatus, *L.*). Wir wollen nicht verfehlen, auch unſererſeits dem vortrefflichen Prachtwerk recht vielen Erfolg zu wünſchen. Es iſt ein reizendes Geſchenk für den Büchertiſch, und Weihnachten vor der Thür! D. L.

Kalender 1900. Deutſcher Thierſchutz-Verein zu Berlin. 5. Jahrgang.

Inhalt: **Richard Schmidt-Cabanis**, Menſchenſprache und Thierſprache; **Karl Neunzig**, Herbſtvögel; Major **Wagener**, Die Verbreitung und Einführung des Pferdes; **Paul A. Kirſtein**, Der Thierfeind; **J. Trojan**, Großes im Kleinen; **Max Hesdörffer**, Unſer deutſcher Schäferhund; Futterſtellen für Vögel im Winter; **H. de Méville**, Hans; **Rudolf Neunzig**, Thätiger Thierſchutz; Die Wiedereinführung des Eſels in Deutſchland.

Unter dem Protektorat der Kaiſerin Friedrich iſt auch dieſer 5. Jahrgang erſchienen. Er bietet belehrende Aufſätze, Schilderungen, hübſche Thiergeſchichten, nützliche Unterweiſungen und gewichtige, in Reime gefaßte Mahnungen. Die Monatsbilder, gezeichnet von Karl Neunzig und P. Mangelsdorff, ſtellen einheimiſche Vögel, vorzugsweiſe Stand- und Strichvögel, darunter ſechs Meiſenarten dar.

Der letzte Aufſatz gibt intereſſante Mittheilungen über die Fortſchritte, welche in den Bemühungen für Wiedereinführung des Eſels in Deutſchland bisher gemacht worden ſind: es liegen hier in der That bedeutende Verdienſte und ſchöne Erfolge des Deutſchen Thierſchutzvereins vor; weitere Erfolge werden ſicherlich nicht ausbleiben und ſind zu Gunſten der gequälten Zughunde durchaus zu wünſchen.

Ebenſo iſt der „Thätige Thierſchutz" darauf bedacht, herrenloſe, wildernde Katzen zu beſeitigen, die Beſitzer von Katzen aber zur regelrechten Verpflegung der Thiere und zur Einſchränkung ihrer Vermehrung zu veranlaſſen. Wildernde Katzen ſchädigen nicht zum wenigſten den Vogelbeſtand; und den Vogelſchutz mit allen Mitteln zu fördern, iſt das ernſte Beſtreben des Vereins. Dementſprechend werden nach den beſten Erfahrungen von Fachmännern Rathſchläge ertheilt, wie die Futterſtellen für Vögel im Winter am zweckmäßigſten einzurichten ſeien. Der Aufſatz über „Herbſtvögel" endigt mit der Klage, daß wir den Italienern nichts vorzuwerfen haben; denn wie dieſe unſere Nachtigalen und Schwalben dem lüſternen Gaumen in Unmaſſen zum Opfer fallen laſſen, ſo ſtellt man bei uns z. B. den Seidenſchwänzen, hochnordiſchen Gäſten, nach und begeht ſo an den Skandinaviern und ihrem Land ein gleiches Unrecht, wie die Italiener und die Südländer überhaupt an uns und unſerm Land, und dies lediglich aus Feinſchmeckerei oder gar gemeiner Gewinnſucht, welche mit der Zahlungsfähigkeit und -willigkeit der Feinſchmecker rechnet. Maßnahmen von Seiten des Stats ſind hier nöthig und — ein aufklärender, wirkungsvoll belehrender Unterricht in Schule und Haus! Wer die Jugend nicht gewinnt, der läßt ſich das Beſte, das Zukunftbeſtimmende entgehen. Das iſt ein Geſichtspunkt, dem Ruß vor einem Menſchenalter bereits wiederholentlich Ausdruck gegeben hat, dem vor kurzem erſt Hans Freiherr von Berlepſch die größeſte Wichtigkeit beigemeſſen hat. Vor allem wäre auf die Jugend der Volksſchule in dieſer Richtung einzuwirken; ſie macht die große Maſſe aus, ſie kommt, beſonders in reiferen Jahren, viel eher mit Thieren aller Art in Berührung; ſie muß mit rechtem Abſcheu erfüllt werden vor jeder Thierquälerei und Gefühlsrohheit. Uebrigens hat Major Wagener in bemerkenswerthen Ausführungen darauf hingewieſen, daß ſo manche Uebelſtände aus der Welt geſchafft werden könnten, wenn man ſich entſchließen wollte, tüchtige, leiſtungsfähige Arbeitspferde im eigenen Land zu züchten, welche den Laſtwagen von der Stelle zu bringen vermögen, auch ohne daß der ungeduldige, wüthende Kutſcher ſie faſt zu Tode ſchlägt.

Wir betrachten nach alledem den vorliegenden Jahrgang des Kalenders gleichfalls als einen nützlichen Beitrag für verſtändige Aufklärung. Der Preis eines Exemplars des Kalenders beträgt 15 Pf., bei koſtenfreier Zuſendung 20 Pf., Partien von 10 Stück 1,20 Mk. Bei noch umfangreicheren Beſtellungen, welche nebſt den Beträgen für dieſelben an das Bureau des Deutſchen Thierſchutz-Vereins zu Berlin S.W., Lindenſtraße Nr. 74 I, zu ſenden ſind, noch bedeutendere Preisermäßigungen. E. Bleich.

Briefwechſel.

Herrn **A. Kattowitz**: Da auch ein anderer Abonnent ähnlich trübe Erfahrungen gemacht hat wie Sie ſelbſt, ſo haben wir uns an den bezeichneten Herrn gewandt, um ſeine Darſtellung des Sachverhalts, bzl. ſeine Entſchuldigung einzuholen.

Herrn **Wzl. Mildner**: Wie Sie aus der vorſtehenden Antwort erſehen, haben wir Schritte gethan, um auch für Ihren Fall Aufklärung zu ſchaffen.

Zu unſerm Bilde.

Unſer heutiges Bild zeigt den **Blutbauchſittich** (Psittacus haematogaster, *Gld.*), einen ſchönen und ſeltenen Plattſchweifſittich von Neuſüdwales. Seine Verbreitung dürfte ſich auf das innere Neuſüdwales beſchränken, doch iſt dieſelbe noch nicht mit Sicherheit feſtgeſtellt. In Heine's Muſeum befindet ſich auch ein Exemplar vom Schwanfluß in Weſtauſtralien. An den Flußufern des unteren Namoi und Darling zeigt er ſich in kleinen Flügen oder parweiſe zur Weihnachtszeit, alſo in der Mitte des auſtraliſchen Sommers.

Er iſt oberſeits olivengrünlichgelbgrau; Geſicht, obere Deckfedern und untere Flügeldecken blau, große Flügeldecken zimmtbraun, Flügelrand ſpahngrün; Unterſeite ſtrohgelb, Bauch und untere Schwanzdecken roth; Schwanzfedern außer beiden mittelſten an der Endhälfte weiß; Schnabel blaugrau, Spitze weißlich; Auge braun; Füße bräunlichgrau. Forſcher ſchildern ihn als beſonders ſchön im Flug, da beim Niederlaſſen das Scharlachroth recht zur Geltung kommt. — Das Weibchen iſt matter in allen Farben und am Unterkörper nicht roth. Die Größe iſt die einer Droſſel. Herr A. Jamrach in London beſaß 1882 einen ſchneeweißen Blutbauchſittich, nur mit blauer Kappe und rothem Bruſtfleck.

Der Blutbauchſittich oder rothbäuchige Plattſchweifſittich iſt immer nur vereinzelt und ſelten eingeführt worden, doch gelang bereits im Jahr 1882 ſeine Züchtung dem bekannten Vogelwirth Baron Cornely in Tours. Das Jugendkleid iſt von Dr. Ruß folgendermaßen beſchrieben: Stirnbinde, Zügel und Bartfleck blau; Kopf, Mantel, Rücken und Bürzel fahl olivengrünlichgrau; Schwingen wie beim alten Männchen, unterſeits rein aſchgrau; große Flügeldecken fahl olivengelblich, Deckfedern am Flügelrand und unterſeitige Flügeldecken zart blau; Schwanzfedern wie beim alten Männchen; Kehle, Halsſeiten und Bruſt fahl gelbgrau, Bauch und Hinterleib gelb, Bauchmitte und Schenkelgegend zart roth; unterſeitige Schwanzdecken hellgelb; Schnabel dunkel bläulichhorngrau, Spitze und Firſt des Unterſchnabels weißlichgrau; Füße grauweiß.

Er iſt ein angenehmer und begabter Vogel, wol einer der begabteſten unter den Plattſchweifſittichen, der dem Pfleger durch Spielen und drolliges Weſen viel Freude macht. D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [2008]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Futtermittel.

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Staats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. 1 dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpaketen franko, garantirt [2009] ſandfrei.

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [2010]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, **Prag 411, I.**

Ameiſeneier,

1899er Ia geſiebte, ſandfreie Ware,	per Kilo	ℳ 3,50
Weißwurm, prima	„ Liter	„ 1,—
Muska	„ „	„ 0,90
Univerſalfutter, extra	„ Kilo	„ 1,20
Mohnmehl, weiß	„ „	„ 0,60
Sonnenblumenk., weiße	„ „	„ 0,60
Reis in Hülſen	„ „	„ 0,60
Ossa sepia, prima	„ „	„ 3.
Sommerrübſen, Ia großkern. ſüß		„ 0,44

Ferner Mohar-, Senegal-, Kolben-, weiße **Hirſen, Mohn** und alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [2011]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Univerſales. [2012]

Möbbeckes prämirte **Univerſalfutter-Spezialitäten** ſind die beſten für alle inſektenfreſſende Vögel.

Qual. Extra, à Ko. 2,60 ℳ
„ Prima, à Ko. 2,— ℳ
„ Sekunda, à Ko. 1,— ℳ
in ½ u. ¹/₁ Pfd.-Packet.

1899er Ameiſeneier 1899er,

hochprima Qual., das Feinſte, was es gibt, vollſtändig rein und ſtaubfrei, à Ko. 4 ℳ, 5 Ko. 18 ℳ, **Ameiſeneier,** naturell, à Ko. 2,20, ſtaubfrei 2,60 ℳ, offerirt

Otto Röbbecke, Meerane, Sa., II,
Sämerei- u. Vogelfutter-Handlg., gegr. 1851.

Mehlwürmer,

vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 4,25 ℳ, Kilo 7,75 ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ. **Ameiſeneier,** hochprima 99er, Liter 90 ₰, **Weißwurm,** Liter 90 ₰. [2013]

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Für Insektenfresser und zur Aufzucht.

„Eidotter" „Eiweiss"

griesförmig per Kilo 3,75 ℳ schrotförmig per Kilo 4,75 ℳ
Beimischung zu jedem Futter. Bei 4½ Ko. franco. [2014]

Henri Vallette, Berlin SW., Schönebergerstrasse 15a.

Die Samen-Großhandlung
von

Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [2015]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Von keiner Fabrik übertroffen wird nach einſtimmigem Lob größter Liebhaber und Züchter mein mit vielen 1. Preiſen ausgezeichnetes, **Herm. A. W. Meyer's**

Hammonia-Kraftfutter,

für alle Inſekten freſſende Vögel, Pfd. 60 ₰, für Hühner, Faſanen und Enten 10 Pfd. 2,70 ℳ frei [2016]

Brüderſtraße 22, Hamburg.

Mehlwürmer,

à Ltr. 4 ℳ inkl. Verp. Bei Einſendung von 1,50 ℳ = 140 gr., alſo **weit über 1000 Stück,** frk. inkl. Verp. [2017] **P. Bartsch, Breslau,** Flurſtr. 6.

Alle Vogelfutter, Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt [2018

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche **inſektenfreſſende Singvögel** von Apotheker **Max Kruel.**

Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen! [2019] Allein angefertigt von

Ernst Hanke, Trier, Moſel.
Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Universalfutter.

Vor dem Kennerauge kann eine **Universalfutter-Mischung ohne Zeke** nicht mehr als vollwerthig bestehen.

Einige Jahre fehlte dieses Produkt vollständig am Vogelfuttermarkt, und mancher Liebhaber hätte gern 10 Mk. für ein Kilo bezahlt, wenn er es hätte bekommen können.

Zeke ist **jetzt wieder** überall **gut** und **billig** zu haben.

Man verlange ausdrücklich **„Zeke, Marke Amsel".** [2020]

Getr. Ameiseneier,

hoch prima, deutſche, ſandfreie Ware, per Ko. 4,60 ℳ, 5 Ko. 22,50 ℳ, per Ltr. 90 ₰.

Gewöhnl. sandfreie Handelsware,
per Ko. 3 ℳ, per 5 Ko. 14 ℳ.

Weisswurm, I. Qual.,
per Kilo 3,80 ℳ, extra Qual. p. Ltr. 1 ℳ.
[2021] **Carl Kämpf, Mainz.**

Mehlwürmer, Ia., Ltr. 4 ℳ, Pfd. 3,20 ℳ, **Jeltner, Breslau,** Weinſtr. 12. [2022]

Vögel.

Bringen unſern Freunden und Abnehmern auch in dieſem Jahre unſere tieftourenreiche

Kanarien

in beſte Erinnerung. [2023]

Mathilde Erntges,
Robert Erntges,
Elberfeld.

Rothk. Papagei-Amandine

(2 Weibchen) zu kaufen geſucht event. eines davon mit einem Männchen einzutauſchen. [2024]

C. Nebel,
Leipzig, Hoſpitalſtraße 18.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei. Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft. Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [2025]

Kanarienhähne

meines mit Ehrenpr., Gold. u. Silb. Med. präm. Hohlrollerſt. von 8 bis 25 ℳ. Probe u. Garant.

Th. Börner,
[2026] **Kaſſel,** Gartenſtr. 8 I.

Ia Dayaldroſſel,

tadellos befiedert, prima Sänger, mit Verpackung 80 ℳ, zu verkaufen. [2027]

Aug. Amlung,
Ludwigshafen, Kanalſtr. 70.

Wellenſittiche,

Par 6 ℳ. **L. Brinkmann,**
[2028] **Calefeld** in Hannover.

Alpen-Stiglitz-Männchen,

Dtz. 10 ℳ, Rothhänflinge, Dtz. 11 ℳ, Zeiſige, Dtz. 8 ℳ, rothe Dompfaffen, Stck. 2 ℳ. Bemerke auch, daß ich nur ſchöne, geſunde, eingewöhnte Vögel verſende unt. Garant. leb. Ank. mit beſter Verpackung. [2029]

Wilhelm Fechtner, Leitmeritz a. d. Elbe.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall in der ſolideſten, zweckmäßigſter Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [2030]

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle **Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [2031]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Verk. wegen Ueberfüllung:

ca. 40 Norwich- und Yorkſhire-Kanarien (darunter mehrere Farbenvögel), Stck. 5 bis 12 ℳ, **10 Lizards,** Stck. 8 bis 12 „ , **12 Holländer,** grüne u. braune, Stck. 7 ℳ. Verp. u. Porto extra. [2032]
Charles Backe,
Nordre Frihavns Vej. **Kopenhagen ø.**

Waldvögel,
großes Lager, empfiehlt zu billig. Preiſ. u. Gar. tadell. Ank. [2033]
J. Goldner, Jassy (Rumänien),
str. dess Nr. 160.

Verkaufe:

Harzer Hohlroller, prämirt. Stamm, zu 4, 5, 6, 8 u. 10 ℳ, unter Garant. des Werths, gebe 6 Tage auf Probe, nicht Gefall. tauſche um, ev. Betrag zurück. [2034]
W. Landt,
Elmshorn i. H., Gärtnerſtraße 51.

Suche 1 **Gimpelmnch.,** welches ein Lied pfeift.
Bamberger, Rechtsanwalt,
[2035] **Aſchersleben.**

Kanarien.

Von meinem ſehr tiefgehenden tourenreichen Hohlrollerſtamm m. g. Knorren, Klingeln, tiefen Pfeifen ꝛc. verſende unter Garantie des Werthes à 10–50 ℳ. Weibchen desſelben Stammes 2 ℳ. Für Wiederverkäufer ſehr empfehlenswerth, d. Dtz. Hähne 72 bis 96 ℳ.
Parade, Rentier,
[2036] **Hannover,** Ackerſtraße.

NB. Meine Verkaufsvögel erhielten nachweislich 1898 u. 99 goldene und ſilberne Medaillen.

Sprechender Wellenſittich, ſelbſt gezüchtet u. angelernt, ſpricht ſehr deutlich: Lora, miau, Jako, gut. Lorchen ſchnalzt mit der Zunge wie ein Menſch, gibt Kuß u. pfeift, ſehr zahm, für's Meiſtgebot abzugeb. [2037]
Max Dorn, Hochheim bei Erfurt.

Wellenſittiche, Pr. 6 ℳ, **1 Schwarzdroſſel,** Weibchen, 1 Jahr im Beſitz, 3,50 ℳ. **Paul Köhler,**
[2038] **Magdbg.-Neuſtadt,** Agnetenſtr. 1.

---

1 P. ſchwarzkehl. Laufhühnch.,

15 ℳ, einige **Wellenſittiche,** à Par 5 bis 6 ℳ, **3 ſpitzſchwänzige Gürtelamandinen,** à Stück 10 ℳ, alle ſelbſt gezüchtet. [2039]
Apotheker **Jaeger, Dieburg.**

Tannenheher,

Stck. 7 ℳ, unter Gar. für lebende Ankunft; **Zirbelnüſſe,** heuriger Ernte, beſtes Futter für Tannenheher, à Ko. 75 ₰, liefert [2040]
Joh. Rohracher, Lienz (Tirol).

Suche zu kaufen:

1 gelernt. Dompfaff- od Hänflingsmännchen (ſchön im Gefied. u. zahm).
P. Mautes, Poſtſchaffner,
[2041] **Merzig** (Saar).

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländiſchen und ausländiſchen körner- und inſektenfreſſende Vögel, in allerfeinſter, ſtets friſcher Ware, beſonders **Ameiſeneier,** handverleſene ganz reine, **Eintagsfliegen** (Weißwurm), **Musca oder Zete** (überſeeiſche Fliege), **Mehlwürmer** und **Univerſalfutter-Miſchungen** verſendet zu billigen Preiſen [2042]
H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung,
Erfurt, Futterſtraße 5.
Preisliſte auf Wunſch umſonſt und portofrei.

F. Rejsek,

Hamburg, Peterſtraße 28.

Spezialität:

Papageien und Papageienkäfige.

Prämirt auf allen beſchickten Ausſtellungen.

Offerirt garantirt **junge, grauäugige, ſchönbefiederte Grau-Papageien** (Jakos), diesjährige Brut, recht geſunde, kräftige, gelehrige Thiere, an Hanf u. Waſſer ſchon gewöhnt, à Stück nur 15 ℳ, ſolche ſchon 1/4 Jahr hier, Stück nur 20 ℳ, ſolche ſchon 1/2 Jahr hier 35 ℳ, ſolche ſchon ſehr viel ſprechend, Lieder ſingend und flötend, je nach Leiſtung 60, 80, 100, 150, 200 ℳ. **Junge Blauſtirn- oder Rothbug-Amazonen,** ſchön im Gefieder, recht geſund, noch nicht ſprechend, nur 15 ℳ, ſolche anfangend zu ſprechen, 18 ℳ, ſchon ſprechend, von 25 ℳ an, ſowie alle anderen Arten billigſt. Ganz zahme, beſonders ſchöne **Affen,** Stück 15, 20, 25 ℳ. **Papageienkäfige** in allen Größen und Façons, ſchon von 3,50 ℳ an. [2043]

In unserem Verlage erschien und ist durch alle Buchhandlungen oder gegen frankirte Einsendung des Betrages direkt von der Verlagsbuchhandlung zu beziehen:

Die gefiederten Sängerfürsten

des europäischen Festlandes

von

Mathias Rausch, Wien.

Mit 3 Farbendrucktafeln und 4 Textabbildungen.

Geheftet 2,— Mk., gebunden 2.60 Mk.

Der Verfasser, welcher durch seine Aufsätze in der „Gefiederten Welt“ in ausserordentlich weiten Kreisen bekannt geworden, gibt in diesem Buche ausser einer verlässlichen Anleitung über Käfigung, Wartung und Pflege der einheimischen Weichfutterfresser auch eine ausführliche Darstellung ihres Gesanges, sodass dasselbe für jeden Liebhaber unserer gefiederten Sänger ein unentbehrlicher Rathgeber sein wird.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (Max Kretschmann).
Magdeburg.

In unserem Verlage erschien

Das Huhn als Nutzgeflügel.

von

Dr. Karl Russ.

Zweite, reich illustrirte Auflage.
Preis M. 2.—; geb. 2.50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Abzugeben: 2 Singdroſſeln (Zippen) à 4 ℳ, ſowie 2 Rothdroſſeln à 3 ℳ, großartige Sänger! Große ſchöne Stiglitze u. Hänflinge à 1,25 ℳ, Zeiſige à 1 ℳ, ſpäter rothe Dompfaffen à 1,50 ℳ per Nachn. [2044]
Rud. Bandow, Elbing (W.-Pr.).

Der heutigen Nummer liegt ein Proſpekt „Die Vogelwarte Helgoland“ der Verlagsbuchhandlung von Joh. Heinr. Meyer in Braunſchweig bei.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 45.

Flugkäfig oder Einzelhaft?
Der Zwergfliegenſchnäpper (Muscicapa parva, *Bchst.*) und ſeine Behandlung als Stubenvogel.
Engliſche Vogelliebhaberei (Fortſetzung).
Leiden und Freuden des Vogelliebhabers (Schluß).
Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang. (Fortſ.)
Anfragen und Auskunft.
Briefliche Mittheilungen.
Bücher- und Schriftenſchau.
Briefwechſel. — Zu unſerm Bilde.

Anzeigen.

Annahme von Anzeigen in der **Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Käfige und Geräthſchaften.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in **praktiſcher** Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [2045]
☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Hermann Schramm's
mechaniſche
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,
mit und ohne Knorre, ſind das anerkannt beſte Hilfsmittel zum Anlernen junger Kanarien. Ueberall mit erſten Preiſen prämirt. Guter Gang und größter Erfolg wird garantirt. Illuſtrirte Preisliſte nebſt Anerkennungen gratis und franko zu beziehen von [2046]
Hermann Schramm's Nachf.
Inh. **Paul Schille,**
Dresden-N. 12, Görlitzerſtr. 45.

50 % **Eier mehr** durch Knochenſchrotfütterung.
☞ **Knochenmühlen** ☜
für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ
lief. **Behm & Steinhardt,**
[2047] **Waren i. Mecklenb.**
▬ **Proſpekte gratis.** ▬

Neu! **Senſationell!**
Kanarien-Lehr-Orgeln,
auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben D. R.-P. 108184, ohne Waſſer- und Luftkeſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [2048] Edmund Schiewick, **Zittau,** Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.
Reparaturen aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt.



Käfige jeder Art
(Preisliſte **gratis**) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[2049] **Oſchatz** i. S.

Hunde-Halsbänder
in ff. vernick. Metall mit Lederunterlage u. Namensgravur per Stück von 3–8 ℳ.
[2050] **H. D. Becker, Iſerlohn.**

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze
à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei.
R. Schröter (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen bei Greußen.** [2051]

Betone ausdrücklich, es kommen nur [2052]
☞ **Gesunde,** ☜
kräftige, tadelloſe, eingewöhnte Vögel zum Verſandt u. Gar. leb. Ank.
Roſella-Buntſittiche, in Pracht, P. 25 ℳ
Fledermauspapag., Blaukrönch., jg., P. 15 „
Große Alexanderſittiche, Mch., reizend zahm, im ſprech. üb., St. 10,50, Wbch. 8 „
Felſenſittiche, prachtvoll, P. 25 „
Nandayſittiche, prachtvoll, P. 15 „
Toviſittiche, ſehr eingew., fingerz., P. 18 „
Rothköpfige Inſeparables, Zchtp. 9,50 „
Feuerflügelſittiche, fingz., St. 10, P. 20 „
Peruſittiche, zahm, etwas ſprechend, 20 „
Roſenpapageien, richtige Zuchtpare, 25 „
Nymphenſittiche, imp. Zuchtp. 10,50 „
Grauk. Zwergpapag., P. 2,50, 5 P. 11 „
Halsbandſittiche, Mch., lern. ſpr., St. 5,00 „
do. richtige Zuchtpare 8,50 „
Wellenſittiche, prachtvolle, echt auſtraliſche, große, ſtarke, ſofort zur Brut ſchreitende Zuchtp. 6 ℳ
Wellenſittiche, hier gezüchtete, Zchtp. 4,50 „
Braſil. Elſtern, zahm, lern. ſpr., St. 12 „
Himmelblaue Hüttenſänger, Zuchtp. 10 „
Chin. Nachtigalen, Mnch. 4,50 ℳ, P. 6 „
do. extra ausgeſ., ſeur. Doppelüberſchl., 5 „
Dayaldroſſeln, großart. Sänger, St. 25 „
Amerik. Spottdroſſeln, eingew. Ia ſingende Mch., St. 12 ℳ, **do.** friſch import. St. 10 ℳ
Schamadroſſeln, bei mir abgeſed., garant. vorzüglich ſingende Mnch., St. 40—45 ℳ
Imp. Zebrafinken, Zuchtpar 4,50 „
Reinweiße Jap. Mövchen, Zuchtp. 7 „
Jap. Mövchen, gelb- u. braunb. P. 3,00 „
Rieſen-Elſterchen, Zuchtpar 5,50 „
Dreifarbige Nonnen, Par 3,50 „
Goldzügelf., reizende Sänger, P. 6 „
Rothe Kardinäle, Mnch., Ia Sg., St. 8,50 „
Grüne Kardinäle, Mnch. 12 ℳ, P. 16 „
Rothgehaub. Kardinäle, Mnch., Ia Sg., 5 „
Schneewß. Reisfinken, zahm, Zp. 7,00 „
Graue Reisfinken, prachtv. Zuchtp. 2,00 „
Feuerweber in voller Pracht, P. 3,50 ℳ
Bayaweber, Mnch. in voll. Pracht St. 4 „
Dottergelbe Weber, in Pracht, Par 4 „
Paradiswittwen, in voller Pcht., P. 4 „
Atlaswittwen, in voller Pracht, P. 2,50 „
Hartlaub-Zeiſige, Ia. Sg., Mnch. 3, P. 5 „
Gutſprech. Graupapageien 50—150 „
Kl. Gelbhaubenkakadus, gar. fingerz., 20 „
Roſakakadus, zahm, lernen ſprech., 10 „
Edle Hohlroller, tief, zart, langgeh., 7—30 „
Ind. Sperbertäubch., tadell. ſch., P. 4,50 „
Reinweiße Lachtauben, Zuchtp. 5,50 „
Gelbe Lachtauben, Zuchtp. 2,50 „
Zahme weiße Mäusch., P. 0,80, 5 P. 2,50 „
Japan. Tanzmäuſe, ſ. intereſſ., P. 1,50 „
Calif. Schopfwachteln, Mch., ſelt. ſch., St. 6 „
In richtigen, kräftigen Zuchtparen:
Broncemännch. 2,50, **Malabarfaſänch.** 2,50, **Chineſerfinken** 2,00, **Aſtrilde** 2,00, **Goldbrüſtchen** 2,50, **kl. Elſterchen** 2,50, **Orangebäckchen** 2,00, **Muskatfinken** 2,00, **Silberfaſänchen** 2,50, **Bandfinken** 2,00, **Paradiswittwen** 2,00, **Atlasfinken** 2,00, **Napoleonsweber** 2,00, **Orangeweber** 2,00, **Blutſchnabelweber** in Pracht 2,50, rothe **Bombay-Tigerfinken** 2,00, hochr. **Ceylon-Tigerfinken** 2,50 ℳ. Von dieſen **Senegalvögeln,** gemiſcht nach meiner Wahl in reizendem Sortiment, 5 P. 9 ℳ, 10 P. 16 ℳ, 20 P. 30 ℳ.
Einen Poſten diesjährige, fleißig tieftourenreich, zart- u. langdurchſingender Harzer
Kanarien-Hohlroller,
mit ſchönen tiefen langen Baßrollen (keine Zitt u. Schapper) verſende à 6, 8, 10 u. 12 ℳ, Dtzd. 60, 72, 84 u. 96 ℳ, Hochedle Wbch., St. 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, keine Uebervortheilung, ſondern hochfeine Sänger für billigen Preis.
Brühl's Vogel-Exporthaus, Kötzſchenbroda b. Dresden.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [2053]
K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Engliſche Farben-Kanarien!
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten
echten Kayenne-Pfeffer,
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [2054]
Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.
Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos.)

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2923).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Begründet von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 45. Magdeburg, den 9. November 1899. XXVIII. Jahrg.

Flugkäfig oder Einzelhaft?

Von Fritz Braun.

Wenn ich hier eine ſchon oft erörterte Frage wieder aufnehme, ſo thue ich es nicht, um in doktrinärer Art das Für und Wider der einzelnen Käfige zu beſprechen, ſondern lediglich, um eigene Erfahrungen weiteren Kreiſen mitzutheilen und dabei dem einen oder andern verjährten Irrthum entgegenzutreten.

Für jeden Vogelfreund hat ein großer Flugkäfig mit ſeinem luſtigen, wechſelvollen Leben ſehr viel Verlockendes. Es erſcheint ja auch ganz einleuchtend, daß die Thiere in dem weiten Raum und in froher Geſellſchaft viel beſſer daran ſind, als ihre einſamen Genoſſen im Einzelkäfig, zumal es nicht jedem geſtattet oder genehm iſt, ſeine Wohnung mit einer großen Zahl geräumiger Käfige zu beſetzen.

Es ſchadet ſelbſtverſtändlich keinem Vogel, wenn er einen großen Raum zur Verfügung hat. Kommt er alſo in dem Flugbauer zu Schaden, ſo liegt es nicht an dem größeren Bewegungsſpielraum, ſondern daran, daß man ihm in dem bunten Vogelverein nicht ſeine ſpezifiſche Nahrung verabfolgen kann. Daraus ergibt ſich, daß der Behälter niemals zu groß ſein wird, wenn man Arten zu ſeinen Inſaſſen beſtimmt, die genau dieſelbe Nahrung erhalten (z. B. Weber, Aſtrilde, Ammern, Kreuzſchnäbel, Meiſen). Aber ſelbſt hier ergeben ſich Mißſtände, indem manche Vögel auf dieſen oder jenen Leckerbiſſen verſeſſen ſind und z. B. alle Mehlwürmer herabſchlingen, bevor noch die ſchwächeren und langſameren Genoſſen ihren Antheil erhalten haben.

Wir können dem Liebhaber getroſt empfehlen, einen Flugkäfig mit einem Dutzend Kreuzſchnäbel, einer Anzahl Weber oder aber mit Ammern, Meiſen oder Aſtrilden zu beſetzen. Weſentlich anders liegt die Sache, wenn es ſich um unſere deutſchen Finken und ihre weitere Verwandtſchaft handelt.

Die Frage, welche Arten von dieſen ſich für das Zuſammenleben eignen, iſt gleichbedeutend mit der, welche Finkenſpezies ein gleichartiges Futter freſſen.

Als ſolche kommen vor allem Bergfink, Grünfink, Kreuzſchnabel und Kirſchkernbeißer in Betracht. Es iſt nicht leicht, für dieſe Arten ein Futter zuſammenzuſtellen, deſſen Beſtandtheile dem einen oder anderen durchaus ſchädlich ſind. Verabfolgt man ihnen Tannenſamen, Hafer, Hirſe, Kanarienſat, Hanf und ein wenig Rübſen, ſo wird man kaum einen der Geſellen mit dieſem Futter ſchädigen können. Beſetzt man alſo ein Flugbauer etwa mit vier Kreuzſchnäbeln, drei Grünfinken, ebenſoviel Bergfinken und zwei Kernbeißern, ſo wird man einen farbenprächtigen Verein beiſammen haben, der durchaus nicht langweilig iſt. Für muſikaliſche Unterhaltung müſſen die hellſtimmigen Grünfinken ſorgen, die Kreuzſchnäbel ſtellen geſchickte Akrobaten, die Bergfinken glänzen und ſchillern im Sonnenlicht und die braunblauen Dickſchnäbel werden zu den unfreiwilligen, aber deshalb oft nicht minder wirkſamen Komikern der Geſellſchaft.

7 2

So gut wie der Bergfink zu dieſer Genoſſenſchaft paßt, ſo ſchlecht eignet ſich dafür ſein nächſter Verwandter, der luſtige Buchfink. Setzt man dieſen in den Flugkäfig, ſo wird er ſich mit Eifer und Begier auf den Hanf ſtürzen, den die anderen ſchlecht entbehren können, der aber grade für den Buchfinken ein langſam, aber ſicher wirkendes Gift bedeutet. Aehnlich ſteht es mit den Ammern, denen ebenfalls Hanf

Digitized by Google

in größerer Menge unzweifelhaft nachtheilig iſt. Nicht viel anders ergeht es uns mit dem Zeiſig, der ebenſo wie der Rothhänfling nur gar zu gern von den verbotenen Früchten naſcht. Nach meinen langjährigen Erfahrungen hält man den Rothhänfling am beſten im Einzelkäfig und füttert ihn dort mit reinem, ſüßem Sommerrübſen, dem man täglich höchſtens ein Dutzend Hirſe- oder Spitzſamenkörner beifügt. Zwar habe ich ſelber wegen dieſer einförmigen Fütterung ſtets theoretiſche Bedenken gehabt, gab ich ihnen jedoch nach, ſo war es nie zum Segen der Vögel und durch neue Lehren gewitzigt, kehrte ich immer wieder zu der alten Methode zurück. Die Rothhänflinge ſind auch durchaus nicht ſo begeiſterte Feinde des Rübſens wie etwa Stiglitze oder gar Zeiſige. Befanden ſich in meinem Fluge Rothhänflinge, ſo merkte ich ſtets, daß in dem Miſchfutter ein größerer Prozentſatz Rübſen entſchält war, als es vordem der Fall zu ſein pflegte.

Sollten wir offen ſein, ſo hielten wir aus der obengenannten Sippſchaft auch Berghänflinge, Leinfinken, Girlitze und Stiglitze am liebſten ganz fern, wenn man auch ein par Vögel dieſer Arten noch am eheſten jenen größeren Genoſſen zugeſellen kann. In dieſem Falle müßte man dem Futter mehr Rübſen und ein gut Theil blauen Mohn hinzufügen.

Viel lieber wäre es uns, wenn man die vier letzten Arten unter ſich zu Flügen vereinigte und mit gleichen Theilen Mohn, Rübſen, Diſtel- und Erlenſamen zu erhalten ſuchte. Nur achte man in dieſem Falle darauf, daß die Vögel den Rübſen auch wirklich verzehren, iſt er doch namentlich den Girlitzen und Berghänflingen ſehr zuträglich. Wenn die anderen Vögel dabei ein wenig faſten, ſo ſchadet ihnen das durchaus nicht, ſondern kann ihnen nur nützen. Es gibt Leute, die den verabreichten Rübſen Tag für Tag unenthülſt wegſchütten und doch komiſcherweiſe des frohen Glaubens leben, ihre Vögel mit Rübſen zu füttern!

Hält man Ammern in Flügen beiſammen, ſo thut man gut, ihnen keine Mehlwürmer zu geben und anſtatt deſſen den Vögeln reichlich Milchſemmel zu reichen. Die meiſten Würmer fallen doch nur einem raſchen, energiſchen Vielfraß zum Opfer, dem die überhaſtig hinabgewürgte Koſt auch nicht nützen kann.

Bei den Webern iſt eine gleichmäßige Vertheilung der Mehlwürmer zwar auch recht ſchwierig, doch wirkt das Zuviel nach meinen Erfahrungen wenigſtens nicht ſchädlich.

Wirklich recht ſchwierig aber iſt es, bei den Aſtrilden etwas zu verſehen, da deren gleichartige Bedürfniſſe dem Pfleger ſein Geſchäft ſehr erleichtern.

Für alle Vögel, die einer mehr individuellen Pflege bedürfen, iſt der Flugkäfig ganz und gar nicht geeignet. Es wird ſich ja immer wieder mancher Liebhaber von Ausnahmen verführen laſſen, und das (noch dazu oft mörderiſche) Rothkehlchen, Grasmücken, Lerchen, Pieper, Bachſtelzen und Braunellen in den Flugkäfig werfen, weil es dem Freund X oder Y mit einem ſolchen Vogel ja auch geglückt iſt. Nun, wir wünſchen ihm viel Glück, aber rathen dennoch recht eindringlich, es lieber zu unterlaſſen, denn mit lebenden Geſchöpfen ſoll man möglichſt wenig experimentiren.

Auch mit der größeren Bewegungsfreiheit iſt es im Flugbauer nicht weit her. Solange die Vögel noch wild ſind, hüpfen und fliegen ſie ja recht munter, ſind ſie aber erſt zahm, ſo läßt die Energie ihrer Bewegungen raſch nach und ihr hurtiges Geflatter beſchränkt ſich auf die Morgenſtunde, die Zeit der Liebe und zeitweiligen Futtermangels, den man aus dieſem Grunde abſichtlich duldet. Ja, ich ſtehe nicht an, zu behaupten, daß recht oft die Summe der Bewegungen (namentlich bei ſolchen Vögeln, die finkenartig von Stange zu Stange hüpfen) im kleinen Käfig größer iſt als im großen, zumal wenn der erſtere ſich unter der Augenhöhe der Beſchauer an einem exponirten Platze befindet.

Daneben kann man auch im kleineren Käfig für Bewegung ſeiner Pfleglinge ſorgen. Mein rothrückiger Würger, ein ſehr fauler Geſell, hat täglich gewiſſermaßen Turnſtunde. Ehe ich ihm einen Mehlwurm reiche, laſſe ich den Vogel erſt zehn bis zwölf Mal hier und dort nach demſelben an das Gitter fliegen und es iſt auffällig, wie energiſch der Faulpelz dabei werden kann. Ehe er ſo ſeine zehn Würmer zu ſich nimmt, hat er ſich ſchon ordentlich ausgeflogen und wenn der Graukopf mich auch im Grunde ſeines Räuberherzens für einen recht gemeinen Kerl halten wird, ſo iſt mir dies immer noch lieber, als wenn er vor Unthätigkeit verkommt.

Fehlt dem Liebhaber die Gelegenheit, einzelne Arten zu Flügen zu vereinigen oder iſt ihm mit unſerer Beſchränkung der Käfiggenoſſen nicht gedient, ſo thut er am beſten, die Vögel gewiſſenhaft im Einzelkäfig zu verpflegen, wofern ſie nicht, wie manche Aſtrilde und einige Meiſen, aus anderen Gründen der Geſellſchaft dringend bedürfen.

Bei dieſer Anordnung wird auch die Gefahr der Verſeuchung weſentlich verringert. Wie leicht werden nicht durch neue Ankömmlinge Ruhr und Typhus in die Voliere eingeſchleppt und wie ſchwer iſt es nicht, die verdächtigen Vögel zu entfernen! Noch neulich wurde mir ein großer Flugkäfig durch Vögel, die ich aus denkbar reellſter Quelle erhielt, völlig verſeucht, und als ich die Voliere ausgebrüht, neu lackirt und gelüftet hatte, ſtellte ſich bei der Wiederbeſetzung heraus, daß trotz aller Quarantäne doch noch ein Vogel an Kalkmiſten litt, und Zeit, Mühe und Koſten waren verſchwendet. Das ſind Augenblicke, wo auch der zielbewußteſte Liebhaber eine gewiſſe Bitterkeit aufſteigen fühlt, und will man ſich ſolche Augenblicke möglichſt erſparen, ſo wird man gut thun, die Vorzüge der Einzelhaft nicht zu unterſchätzen.

* * *

nennen. Dieſe bilden bei mir immer einen guten Theil der täglichen Futtergabe, da ich eingeſehen habe, wie viel Nutzen dieſes nahrhafte Futter bringt. Ein nicht zu unterſchätzender Vortheil der Ameiſenfütterung liegt darin, daß dieſe Kerbthiere meiſtens gerne von unſeren Weichfutterfreſſern genommen werden. Allerdings dürfen die Ameiſen nicht zu friſch, ſondern müſſen immer gehörig getrocknet ſein. Als Beiſpiel dafür, wie nahrhaft die Ameiſen ſind, will ich nur anführen, daß hier in Petersburg die Sproſſer faſt allenthalben ausſchließlich mit Ameiſen und Ameiſenpuppen gefüttert werden und dabei gut ausdauern, was natürlich bei alleiniger Ameiſenpuppenverfütterung nicht der Fall wäre. Ich würde jedoch rathen, Ameiſen nur als Zugabe zu verfüttern, da ein gutes, ſelbſtzubereitetes Miſchfutter immer die Grundlage ſein ſollte.

Ein zweites Hilfsmittel zur guten Haltung des Zwergfliegenſchnäppers bildet die Milch. Ich reiche dies Getränk den meiſten meiner Weichfreſſer und bin von den damit erzielten Erfolgen geradezu überraſcht. Da Milch ſehr nahrhaft iſt, empfiehlt es ſich, ſie hauptſächlich bei zarteren Geſangskünſtlern zu verwenden. Ein Zwergfliegenſchnäpper, den ich früher käfigte, zog die Milch ſogar dem Waſſer vor, was natürlich viel dazu beitrug, ihn dauernd geſund und in gutem Zuſtande zu erhalten. Auch Milchhaut iſt dem Vogel ſehr förderlich. Neben der Milch reiche man ſelbſtverſtändlich ſtets Badewaſſer, damit es einem nicht ergehe, wie meinem Freunde, bei dem ein kleines Goldhähnchen mit unermüdlichem Eifer in der Milch badete. Wie es jedesmal nach einem ſolchen Bade ausſah, mögen ſich die freundlichen Leſer ausmalen.

Zwei Mal im Jahre findet die Mauſer unſeres Vogels ſtatt, nämlich im Januar-Februar und im Juli-Auguſt. Im letzteren Fall kann man den Vogel vorzüglich und leicht durchmauſern laſſen, wenn man ihn ausſchließlich mit blanken friſchen Ameiſenpuppen füttert, die aber auch wirklich ganz friſch, alſo höchſtens ein bis zwei Tage alt ſein müſſen. Im Januar jedoch, wo uns dieſelben fehlen, iſt es ſchwerer, den Zwergfliegenfänger gut durch die Mauſer zu bringen. Da müſſen wir ihn mit möglichſt kräftiger Koſt verſorgen; ſonſt könnte es leicht geſchehen, daß unſer Liebling einginge. Gepulverte Sepienſchale, unter das Futter gemiſcht, iſt für dieſen Vogel ebenſo zuträglich, wie für alle anderen zarten, die Wintermauſer durchmachenden Vögel. Sorgfältig iſt auch auf die Leibesbeſchaffenheit eines jeden Vogels zu achten, da von der richtigen Körperfülle gewöhnlich der ganze Verlauf der Mauſer abhängt. Den einzelnen Vogel immer zu überwachen, darin beſteht ja hauptſächlich die ganze Pflege unſerer gefiederten Sänger. Möge dieſe Abhandlung den gekäfigten kleinen Fliegenſchnäppern und ihren Pflegern von Nutzen ſein!

Engliſche Vogelliebhaberei.

Von Albert Rettich.

(Fortſetzung des Artikels aus Nr. 36).

Trotz der Vielſeitigkeit des in dieſem Raum*) Gehaltenen haben wir es hier noch nicht ſo weit gebracht, Kolibris lebend aufweiſen zu können, dagegen beſitzt Mr. Fulljames ein prachtvolles Möbel aus Mahagoni und Glas, welches deren zwei hundert Stück ausgeſtopft enthält und welches wol ſeines Gleichen ſucht.

Darin befinden ſich 95 Varietäten von Kolibris, einige mit echten Neſtern und Ei-Gelegen und zwei mit vielleicht eine Woche alten Jungen, die ſehr gut erhalten und im Neſt ſichtbar ſind. Das Ganze iſt außerordentlich naturgetreu gemacht und iſt das Meiſterſtück eines aſiatiſchen ſachverſtändigen Künſtlers. Jeder Balg iſt ausgeſucht und fehlerlos; jede erdenkliche Stellung, ſei ſie fliegend, hängend, ſitzend oder brütend, iſt wiedergegeben; der leichten Beſichtigung jedes einzelnen Exemplares iſt Rechnung getragen. Ein kolorirter und numerirter Schlüſſelplan gibt den lateiniſchen Namen und das Geſchlecht der zweihundert Prachtſtücke und iſt an und für ſich allein ſchon ein werthvolles Bild. Das Möbel ſelbſt iſt wahrſcheinlich konkurrenzlos in ſeiner Reichhaltigkeit und Pracht.

Wie geſagt, lebend haben wir noch keine Kolibris, doch ſieht man hier in voller Geſundheit und vielverſprechender Lebensfähigkeit verſchiedene Vertreter ſolcher Formen, die ſich durch Kleinheit, ſchwierige Pflege und Zartheit ſofort an die kleinen Abarten der Kolibris anreihen. Ich denke an die winzigen Brillen-Vögel (Zosterops), die wir in zwei Abweichungen haben; an die dreifarbige (tricolor), ſiebenfarbige (septicolor) und an die olivgrüne Tangare; an die verſchiedenen Zuckervögel, worunter die früher beſchriebene Dacnis cayana; an die auſtraliſchen Waldſchwalben — das erſte Par kam letzten Winter in England an; drei weitere Pare im Sommer; Mr. Fulljames kaufte ſie alle und hat ſie noch am Leben — und an dergleichen.

Alle dieſe zarten Geſchöpfe (außer den Schwalben, welche eine beſondere Behandlung genießen) leben hauptſächlich von reifen Orangen, Bananen, Traubenſaft, Honig und ähnlicher ungewöhnlicher Nahrung und machen der Pflegerin unſägliche Mühe.

Von dieſem Grad von Zartheit und Unbedeutendheit geht's dann durch alle Stufen und Formen hinauf bis zu dem ſchlanken abeſſiniſchen Kukuk, dem wunderbar beſchweiſten Fahnen-Drongo, dem großen orangehalſigen Tukan, dem hühnerartigen Turako und andern von ſolcher Größe, Länge oder Umfang. Selbſtverſtändlich ſind alle Farben und deren Nuanzen vertreten; Lockrufe und Geſang von ohrenzerreißenden

---

*) Es iſt das Zimmer des Erdgeſchoſſes in der Villa des Mr. Fulljames, welches die fremdländiſchen Vögel enthält. D. L.

Scheerenſchleifertönen bis hinauf zu dem melodiſchen Schlag des indiſchen Schama. Ein Dutzend verſchiedener Stare, worunter der langſchwänzige und der blauköpfige Glanzſtar, ſchreien alle zuſammen und alle recht häßlich. Heher, Elſtern, Trupiale und Gebirgs-Mynahs übertönen die Stare, und wieder Andere machen noch größern Lärm, ſodaß man ſich nicht ungern wieder in den erſten Stock flüchtet.

In meinen Notizen finde ich noch einige nennenswerthe Individualitäten. So ſah ich z. B. mit Vergnügen, daß ein Pärchen dreifarbiger Rothkopf-Amandinen, die Mr. Fulljames 400 Mk. gekoſtet hatten, immer noch bei beſter Geſundheit waren.

Von einem Stamm 3,1 violettbäckiger Aſtrilde, die er billig, für 300 Mk., erſtanden hatte, war nur noch das 0,1 übrig. Das einzige Exemplar dieſes niedlichen Vögelchens, was vorher und ſeither bekannt war, hatte dem öfters genannten Mr. Maxwell gehört und hatte dieſem Liebhaber jedes Mal den erſten Preis gewonnen. Für dieſes einzig daſtehende Männchen bot Mr. Fulljames ſchweres Geld, aber Mr. Maxwell war feſt. Zuletzt ging das Thierchen ein, und kurz darauf wurde der kleine Stamm an Mr. Fulljames geliefert. Nun fing ſein „Pech“ erſt recht an. Er annonzirte die zwei überflüſſigen Männchen als verkäuflich, fand aber keine Liebhaber. Inzwiſchen hatte er das Unglück, das erſte und einzig bekannte Weibchen dem Tod nahe zu finden. Es war nämlich unbemerkt aus dem Käfig entwiſcht und in eine der Wandvolieren gerathen, wo eine Kalanderlerche nichts beſſeres zu thun hatte, als das delikate Geſchöpf ſeines Gefieders zu berauben. Dies wurde zeitig genug entdeckt, um ihm das Leben retten zu können. Jetzt iſt dies werthvolle Thierchen nicht nur wieder hergeſtellt, ſondern ſo ſchön befiedert, daß es preisgekrönt wurde. Aber die drei Männchen ſind tot, nach und nach eingegangen! Von fünf eingeführten Exemplaren iſt alſo nur noch das Weibchen übrig.

Mit auſtraliſchen Tannenmeiſen machte man auch intereſſante Erfahrungen. Dieſe eingeführten ſehen den europäiſchen täuſchend ähnlich, ſind jedoch von mehr entwickelter Statur und haben roſafarbige Bruſt und Unterſeite. Locktöne und Bewegung erinnerten ſofort an die hier einheimiſchen. Kenner waren der Meinung, dieſe ſieben Exemplare ſeien die antipodiſche Nachzucht von europäiſchen, exportirten und freigeſetzten Eltern.

Natürlich ſicherte ſich Mr. Fulljames den ganzen Vorrath zu und mußte dafür recht theuer bezahlen. Binnen wenigen Wochen wurden aber ungefähr 40 weitere ſolcher Meiſen ausgeladen und um jeden Preis losgeſchlagen. Freund Fulljames nahm die Sache mit Gleichmuth hin und wartete der Dinge, die da kommen ſollten, und dieſe waren: Letzten Mai hatte er nur noch zwei am Leben, und die andern vierzig müſſen wol ſämmtlich eingegangen ſein. Sicher iſt es, daß kein Stück in eine Ausſtellung gelangte.

Es iſt dieſe Hinfälligkeit ſehr bedauerlich, denn ſie verhindert die Möglichkeit, Experimente zu machen. Wäre es gelungen, die veredelten Meiſen an unſer Klima zu gewöhnen, dann hätte man in einigen Jahren feſtſtellen können, ob ſie wirklich Nachzucht waren oder eine eigene Raſſe. Die einheimiſchen eventuell zu veredeln, ging einigen Leuten auch durch den Kopf, aber die Natur wird ſich wol kaum ſo weit vorgreifen laſſen.

Leiden und Freuden des Vogelliebhabers.

Von N. S.

(Schluß).

Jeden Morgen und jeden Mittag, wenn meine Frau bei der Toilette oder in der Küche beſchäftigt war, kroch ich heimlich unter den Tiſch, um mit der Pinzette alle Spuren zu beſeitigen, und lange Zeit blieb die Sache mein Geheimniß. Da mußte ich vier Tage verreiſen, und als ich zurückkehrte, wurde ich gleich mit dem übel zugerichteten Teppich empfangen. Jetzt, wußte ich, war's um die Freizügigkeit meiner Vögel geſchehen; andererſeits aber mochte ich ſie auch nicht im engen Käfig ſchmachten laſſen, und ſo öffnete ich in meinem erſten Ingrimm das große Erkerfenſter, vor welchem eine kleine Epheulaube ein Blumenbrett mit üppigem Blumenflor umrahmte, um meinen Lieblingen die Freiheit zu geben, ohne daß ich mir irgend welche Gedanken darüber machte, daß ſie zu Winters Anfang draußen verkommen mußten.

Aber meine Nachtigalen waren verſtändiger als ich; ſie begnügten ſich zunächſt damit, ſich draußen auf dem Blumenbet in dem köſtlichen Sonnenſchein zu beluſtigen und im Epheu umherzuklettern, kehrten aber wieder in ihren Käfig zurück. So ging das Spiel mehrere Tage lang, da ich das Fenſter tagsüber offen ließ, in der Hoffnung, die Vögel würden von dem Angebot der Freiheit keinen Gebrauch machen.

Von meiner Wohnung hatte ich einen unbegrenzten Blick in's Weite, da gegenüber der Exerzierplatz lag, an den ſich ein Offiziersgarten mit hohen Bäumen anſchloß. Am vierten Tag, als ich von meiner Berufsthätigkeit Abends heimkehrte, hörte ich ſchon auf der Straße die melodiſchen Töne meiner männlichen Nachtigal von den Bäumen des Offiziersgartens herüber ſchallen, während das Weibchen vom Fenſter aus hinüberlockte.

Ich ließ des Nachts die Fenſter geöffnet und am andern Morgen ſaßen Beide wieder vereint im Käfig. Nun flog das Männchen täglich aus und ein, während das Weibchen ſich nicht vom Fenſter hinweg wagte, wahrſcheinlich weil es ſeiner Flugkraft nicht recht traute.

Das ging nun wol 10 Tage lang ſo fort, und ich hatte meine helle Freude daran. Da — am elften Tag — kehrte das Männchen nicht wieder, ſo ſehr auch ſein Weibchen in den eindringlichſten und kläglichſten Tönen lockte, und drei Tage darauf war das Weibchen auch verſchwunden, und Beide kehrten niemals wieder.

In dieſem Frühjahr bezog ich nun eine neue Wohnung, in welcher es mir möglich war, ein größeres Vogelheim mit einem Baum darin herzurichten, außerdem noch ausgeſtattet mit Pflanzenſchmuck und einer Fontaine.

Da hinein brachte ich meinen vorhandenen Beſtand von 1 Stiglitz, 1 Hänfling und 1 Dompfaffen. Dazu beſorgte ich mir noch 2 Kanarienweibchen, 1 Dompfaffweibchen und, auf beſondere Empfehlung hin, 1 Par blaue Hüttenſänger und ein Par Mozambikzeiſige. Dieſe eigentlich planlos zuſammengeſteckte Geſellſchaft vertrug ſich wol ein Vierteljahr ganz vorzüglich, bis das Gimpelpar ſich anſchickte zu niſten. Da begann der Dompfaff-Vater mit Vater Stiglitz einen ſo heftigen Krieg, daß Letzterer ſich an keinem Futtergeſchirr blicken laſſen durfte und auch ſonſt keinen ruhigen Augenblick hatte, was ihn nach und nach ganz entkräftete. Ob nun Frau Dompfäffin ein Auge auf den allerdings eleganten Stutzer Stiglitz geworfen, und ſo die Eiferſucht des Gatten verurſacht, oder ob ſich der Stiglitz-Jüngling zudringlich gegen Madame Dompfäffin benommen, das war nicht feſtzuſtellen; aber ſo viel ſteht feſt, Vater Gimpel iſt ein ſtreitbarer Herr, er vergreift ſich zwar thätlich an keinem der Mitbewohner, doch hält er ſie ſich alle mit Knurren und Fauchen vom Halſe. Und in dieſer Geſellſchaft hat ſich das Gimpelpar nicht genirt, zweimal zu niſten und das erſte Mal 5, das zweite Mal 3 Junge zu erbrüten und groß zu ziehen.

Alle andern Mitbewohner aber haben, trotz reichlicher Niſtgelegenheit, auch nicht einmal einen Verſuch gemacht, für Nachkommen zu ſorgen. Doch ſchon der Erfolg mit den Gimpeln hat mir unendliche Freude bereitet; und dieſe junge Nachkommenſchaft im Baſſin des Springbrunnens ſich umhertummeln und plätſchern zu ſehen, iſt ein wahres Vergnügen.

Dagegen ſind mir ſo dummſcheue, träg umherſitzende Vögel wie die Hüttenſänger noch nicht vorgekommen, und ich gäbe etwas darum, wenn ich ſie los wäre und meine Sonnenvögel wieder hätte. So wechſelt Freud und Leid beim Vogelliebhaber.

Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang.

Von R. Groſſe.

(Fortſetzung).

Ungleich ungünſtiger, ſowol bezüglich des Geſanges der alten und jungen Hähne, als auch in Hinſicht auf den Geſundheitszuſtand der Vögel und auf die Beſeitigung von auftretenden Störungen iſt die Flughecke. Letztere erfordert ein ſicheres Auge und ein geübtes Ohr. Sehr ſchwer hält es oft, die in dieſer Heckart auftretenden Störungen zu beſeitigen, weil die ſolche verurſachenden Vögel oft nach verhältnißmäßig langer Zeit erſt ausfindig gemacht werden können und ebenſo ſchwierig iſt die Erkennung und Beſeitigung von auftretenden Krankheitserſcheinungen; dieſe iſt umſo ſchwieriger, wenn in ihr eine Anſteckungsgefahr enthalten iſt, die in ſtark bevölkerten Heckräumen in der Regel willkommenen Nährboden findet. Sehr zweifelhaft ſind endlich die Geſangserfolge, die in einer Flughecke erzielt werden. Aus allen Ecken ertönen die Lockrufe der Hennen, die bisweilen in Bezug auf Wohlklang recht viel zu wünſchen übrig laſſen; die Anfeindungen der Hähne, welche zum großen Theil von kräftigem Geſang begleitet ſind, hören ſelten auf und ſind bisweilen ſo heftig, daß das ſie begleitende Lied oft die Schranken der zuläſſigen Geſangsregeln bemerkbar überſchreitet. Zu dieſen unliebſamen Geſangsleiſtungen kommt endlich noch der lockende Ruf einer oft zahlreichen Menge junger Vögel in Neſtern oder im Flugraum, kurz die aufgeführten geſanglichen Leiſtungen der Bewohner einer Flughecke ſind keineswegs geeignet, den Junghähnen eine gute Vorbildung mit in ihre Geſangsſchule zu geben, und ich halte wirklich gute Geſangserfolge, die mit dieſer Heckart gewonnen werden, entweder für Zufall, oder ſie werden dann erzielt, wenn der Züchter in allen Theilen der Zucht wohl erfahren iſt und ſich auf ſein Auge und Ohr ganz verlaſſen kann. Beſſer als die Flughecke iſt entſchieden die Bauerhecke und dieſer vorzuziehen iſt die Einzelhecke. Störungen gibt es ſelbſtredend in jeder Heckart, in der einen mehr, in der andern weniger.

In der Einzelhecke fallen, wie erwähnt, die ſtörenden Zwiſchenfälle weg, die ſich die Hennen gegenſeitig bereiten und das iſt doch ſchon eine ganze hübſche Anzahl. Wie ſtörend iſt z. B. ein gemeinſamer Neſtbau zweier Weibchen. Mit einer Beharrlichkeit, die ſicher einer beſſeren Sache werth wäre, tragen beide Hennen Bauſtoff zu ein und demſelben Niſtplatz, und nicht ſelten gerathen ſie bei dieſem Geſchäft in heftigen Zwieſpalt, wenn ſie auf der Brutſtätte zuſammentreffen. Das gemeinſchaftlich gebaute Neſt nimmt bald eine unverhältnißmäßige Ausdehnung an; und der Züchter verſucht zunächſt, eine dieſer beiden Hennen dadurch von ihrem Vorhaben abzulenken, daß er unmittelbar neben die gemeinſchaftliche Bauſtelle ein zweites Niſtkörbchen aufhängt in der Erwartung, daß eins von den beiden Weibchen das letztere als Brutſtätte für ſich auswählen werde. Wenn er jedoch mit dieſem Verſuche keinen Erfolg hat, ſo bleibt ihm nichts anderes übrig, als eine der Hennen in eine andere Zuchtabtheilung zu bringen.

Gleich unangenehm ſind gemeinſchaftliche Gelege, die auch von zwei Hennen ausgebrütet werden. Wenn in ſolchem Falle auch keine Bedenken vorliegen, beide Weibchen gemeinſam brüten zu laſſen, ſo iſt doch eine gemeinſame Atzung der Jungen aus verſchiedenen Urſachen nicht zu empfehlen. Die Neſtjungen ſind bei einer ſolchen der Gefahr preisgegeben, entweder nicht genügend oder auch übermäßig geſtopft zu werden. Der erſtere Fall tritt ein, wenn das futterbringende Weibchen die Rivalin auf der Brutſtätte antrifft und ihm hierdurch die Gelegenheit genommen wird, ſeine Abſicht auszuführen. Es wird aber, wenn es mit Futter zu den Neſtlingen gelangt iſt, dieſe ſofort decken, wenn die andere Henne angeflogen kommt. Eine übermäßige Atzung aber findet ſtatt, wenn beide Weibchen ohne Störung die Jungen ſtopfen können und das öfter ausführen, als es letzteren dienlich iſt. Der kleine Vogelmagen iſt noch nicht fähig, das ihm zugeführte viele Eifutter zu verdauen, Verdauungsſtörungen, die nicht ſelten mit dem Tode endigen, werden eintreten.

In den Käfigen, in welchen mehrere oder viele Weibchen vorhanden ſind, wird ferner verſchiedentlich die Untugend des Federrupfens auftreten. Weibchen, die nicht mit dem vorhandenen Bauſtoff zufrieden ſind, werden anderen Hennen oder den im Heckraum herumfliegenden Jungen Federn ausziehen und ſie zum Neſtbau verwenden, oder die Federkiele mit dem Schnabel bearbeiten. Die alten Weibchen werden ſich dieſen Zudringlichkeiten in den meiſten Fällen durch Ausweichen u. a. zu widerſetzen wiſſen, aber trotzdem verurſacht dieſe Untugend auch für ſie Störungen, wenn ſie beim Neſtbau beſchäftigt ſind oder auf den Gelegen brütend ſitzen und in der vorbeſchriebenen Weiſe behelligt werden. Für die jungen Vögel aber kann das Federrupfen doch recht verhängnißvoll werden, ſobald es überhand nimmt. Werden die kleinen Thiere, nachdem ſie eben ihr ſauberes Kleidchen angelegt haben, von raufluſtigen alten Weibchen dieſes Schmuckes wieder beraubt, werden ihnen nicht nur die Schwanz- und Flügelfedern, ſondern auch die übrigen Deckfedern auf dem Rücken, an der Bruſt und am Bauch ausgezogen, ſo ſind ſie dadurch ſchon der Erkältung preisgegeben. Sie werden aber auch in ihrer weiteren Entwicklung durch das Federrupfen deshalb gehindert, weil die Neubildung der Federn immerhin gewiſſe edle Säfte in Anſpruch nimmt, die möglicher Weiſe an anderer Stelle vortheilhaft verwerthet werden könnten. Gerupfte junge Vögel erſcheinen uns daher immer geſchwächt, ſie laſſen auch ein gewiſſes Mißbehagen unſchwer erkennen.

Was veranlaßt denn aber die Vögel zum Federrupfen? Dieſe Frage iſt ſchon verſchiedentlich aufgeworfen worden, und man hat auch nach Gründen für dieſe läſtige Störung geforſcht, aber beſeitigt hat man dieſe Untugend bis heute noch nicht. Vielfach iſt die Meinung in den Vordergrund getreten, daß das Bedürfniß für thieriſche Stoffe den Vogel nöthige, ſich dieſe Stoffe in den Federkielen zu ſuchen. Ich halte dieſe Anſicht nicht für zutreffend und auch die von mir gemachten diesbezüglichen Erfahrungen ſprechen dagegen. Die Feder enthält nach meiner Anſicht nur einen verſchwindend kleinen Theil thieriſcher Stoffe, ſie iſt ein Oberhaut-Gebilde, das nur in ſeinem unterſten Ende, das in der Haut ſteckt, wächſt, das weder Nerven noch Gefäße enthält. Selbſt in dem durchſichtigen Rohr, der Spule, die als unterſter Theil der Feder ſich in der Haut befindet, iſt auch nur eine Stelle, Nabel genannt, vorhanden, die Zellengebilde enthält, welche dem Vogel zuſagen könnten, weil ſie der Feder die Nahrung zuführen. Dieſe Zellengebilde werden „Seele“ genannt. Die Vögel haben aber keine Veranlaſſung, dieſen geringfügigen thieriſchen Stoff aufzuſuchen, ſie finden ähnliche Stoffe leichter und in größeren Mengen in den ihnen dargebotenen Futterarten. Ich habe auch wiederholt in meiner Zucht Verſuche dahin angeſtellt, ob thatſächlich rupfende Vögel Mangel an den bezeichneten Stoffen haben, ich bin aber vom Gegentheil überzeugt worden. Den Weibchen, die mit der Untugend des Federrupfens belaſtet waren, habe ich jede Gelegenheit hierzu genommen, ich habe ſie in Einzelhecken geſetzt und die ausgeflogenen Jungen habe ich in kleinen Käfigen im Heckbauer niedergeſtellt, und ich habe die Wahrnehmung gemacht, daß ſie mit denſelben Erfolgen gebrütet und ihre Jungen aufgefüttert haben als zu der Zeit, in welcher ſie ihre Untugend ausübten. Auch der Mangel an Bauſtoff oder nicht zuſagender Niſtſtoff kann nicht die Veranlaſſung zum Federrupfen ſein; denn trotzdem vorzüglicher Bauſtoff in ausreichender Menge vorhanden war, rupften die Weibchen. Andere wieder verurſachten dieſe Störung auch beim gänzlichen Fehlen des Niſtſtoffes nicht, ſondern legten ihre Eier in lere Neſter. Es bleibt alſo nichts anderes übrig, als das Federrupfen für eine perſönliche Ungezogenheit zu halten, und das iſt es nach meiner Ueberzeugung auch. Thatſache aber iſt, daß dieſe Ungezogenheit forterbt; Junge von ſolchen Eltern fingen ſchon in den Flugkäfigen an, fleißig ihre Kameraden an dem Federkleid herumzuzauſen.

(Fortſetzung folgt.)

Anfragen u. Auskunft

Herrn Regierungsrath Anné: 1. Die genannten Sänger können, ohne ſich gegenſeitig im Geſang zu beeinträchtigen, in einer Stube gehalten werden. 2. Die gemeine Spottdroſſel (Mimus polyglottus) iſt nicht identiſch mit der ſog. ſüdamerikaniſchen, denn in Südamerika kommt ſie nicht vor. Ihre Heimat erſtreckt ſich vielmehr über Nordamerika, ungefähr vom 40. Grade bis ſüdlich nach Florida, Weſtindien und Mexiko.

Herrn Gerhard Pilgner: 1. Der Käfig von angegebener Größe würde ſich als Heckkäfig für ein Pärchen Rieſenelſterchen eignen, doch richten Sie ihn ſo ein, daß die Niſtvorrichtungen, Harzerbauerchen, Niſtkäſten, Niſtkörbchen u. a. m. nicht zu viel Raum fortnehmen, ſoweit als thunlich bringen Sie ſie lieber außen an, ſo, daß die Vögel vom Käfig aus hineingelangen können. Jemehr Niſtgelegenheiten Sie ihnen geben, deſto beſſer; auch ſetzen Sie Strauchwerk in den Käfig. Die gebräuchlichſten Niſtvorrichtungen ſind in Vogelhandlungen u. a. käuflich zu haben. 2. An Neſtbauſtoffen bieten Sie den Vögeln allerlei Baſtſtreifen, zumal von den Scheuerwiepen der Hausfrau (natürlich noch ungebrauchten), Fäden, Halme, Grasriſpen, weiche Läppchen, Watte, Agave- oder Aloefaſern, die man vorher etwa 30 cm lang ſchneidet, auch wol einige Tage hindurch in Waſſer einweicht, dem man 5 Hunderttheile Glyzerin zugemiſcht hat, um zu verhindern, daß die Vögel ſich an den ſcharfen Faſern verletzen oder erhängen; außerdem lange Pferdehare, friſche lange Gräſer, Blätter, Baumwollfäden, ausgezupfte Sackfäden, Papierfäden, d. h. ganz ſchmal abgeſchnittene Papierſtreifen, weiter Heu- und Strohhalme, letztere mit ausgedroſchenen Aehren, noch weiter etwa ſpannlang geſchnittene friſche, dünne und ſchmiegſame Reiſer von

Birken, friſche Spargelzweige, Abfälle von ſpaniſchem Rohr und all dergleichen, das zum äußeren Aufbau des Neſtes dient. Ebenſo können die Stoffe zum Auspolſtern des Neſtes in großer Auswahl geboten werden. Am brauchbarſten ſind Wundfäden, die ſog. Charpie, aus ſauberer mürber Leinwand, 2,5 cm lang gezupft, dann Kuh-, Kälber-, Reh- und dergl. Hare, welche wol vorher, um ſie von Ungeziefer und Schmutz zu befreien, in noch heiße Kalkmilch von friſchgelöſchtem Kalk eingeweicht, dann getrocknet, ſorgſam durchgerieben und ausgeſtäubt werden. Waldmos, welches man ſich ſelbſt ſucht, trocknet und zupft man zu einer loſen Maſſe aus. Baumwolle gibt man nicht in rohen zähen Flocken, ſondern als weiche Watte, loſe ausgepflückt. Sehr gern benutzen die Vögel Schweinsborſten, ebenſo kurzgeſchnittene Kamelharwolle, die überall käuflich iſt. Selbſtverſtändlich nehmen ſie auch allerlei Federn, welche natürlich ſauber ſein müſſen, gleichfalls gern. Filzſtücke werden, ſorgfältig gereinigt und ausgerupft, von den Vögeln wie Hare verwendet. Dazu dienen auch allerlei Abfälle von Näh- u. a. Arbeiten der Hausfrau, Läppchen, Flicken u. a., ausgezupft oder in Streifen, Wollſpitzchen von Stickereien u. drgl. Auch die Blütenfäden der Maiskolben kann man darbieten, ebenſo das im Freien oder in Töpfen gezogene Silberriſpen- und das Cyperngras. 3. Als Aufzuchtfutter iſt ein Miſchfutter aus kleingehacktem, hartgekochtem Hühnerei (Weiß und Gelb), mit aufgebrühten Ameiſenpuppen, zu gleichen Theilen, zu empfehlen, das Ganze mit feingeſtoßenem Potsdamer Zwieback oder altgebacknem reinem Weißbrot (ohne Zuſatz von Zucker, Butter, Milch gebacken) zu einem krümeligen Gemenge bereitet. 4. Manche Pärchen niſten leicht und ergibig, andere dagegen machen in Jahr und Tag keine Anſtalt zum Neſtbau.

Brieflich Mittheilungen.

... Ich bemerke, daß ich ſeit 12 Jahren einen rothen, von Herrn Voß-Köln gelieferten Kardinal beſitze, welcher ſeine ſchöne Färbung noch völlig hat, im kalten Raume faſt das ganze Jahr fleißig ſingt und Kerbthier- ſowie Körnerfutter, als Hanf, Reis und Sonnenblumenkerne erhält. Es iſt ein Wildfang.

Anné, Regierungsrath.

Bücher und Schriftenſchau.

Von der Zeitſchrift: **„Der Zoologiſche Garten“**, Redaktion und Verlag von Mahlau & Waldſchmidt in Frankfurt a. M., erſchien ſoeben Nr. 10 des **XXXX.** Jahrgangs für 1899 mit folgendem Inhalt:

Das Storchneſt auf dem Chordach in Zofingen (Kanton Aargau) im vierten Jahr (1898); von Dr. H. Fiſcher-Sigwart in Zofingen. — Beobachtungen an Reptilien in der Gefangenſchaft; von P. de Grijs (Schluß). — Die Verbreitung des Yaks; von Karl Grevé in Moskau. — Ueber die Beziehungen zwiſchen den Reproduktionsorganen und der Geweihbildung bei den Cerviden; von Forſtmeiſter Adolf Rörig in Frankfurt a. M. — 70. Jahresbericht der Zoologiſchen Geſellſchaft in London für das Jahr 1898. — Mittheilungen aus dem 27. Jahresberichte der Zoologiſchen Geſellſchaft zu Philadelphia für das Geſchäftsjahr 1898—99. — Kleinere Mittheilungen. — Litteratur. — Eingegangene Beiträge. — Bücher und Zeitſchriften. — Berichtigung.

Briefwechſel.

Herrn Braun und Herrn Dr. med. Otto: Beſten Dank für Ihre Beiträge.

◆

Zu unſerm Bilde.

Ein Verwandter des in Nr. 27 abgebildeten Schrift-Araſſari und auf den erſten Blick als ſolcher erkennbar iſt der ſchwarzkehlige Araſſari (Pteroglossus atricollis, *Müll.*). Auch er hat, wie die Tukane oder Pfefferfreſſer überhaupt, den charakteriſtiſchen, gewaltigen Schnabel, der, faſt ſo lang wie der eigentliche Rumpf und am Grunde ſo breit wie der ganze Kopf, dem Vogel ein ſehr abſonderliches Ausſehen verleiht. Bei ihm iſt der Oberſchnabel gelblichweiß gefärbt, mit breiter, nicht ganz bis zur Spitze reichender ſchwarzer Firſt und ebenſolchem Strich vom Naſenloch am Grunde entlang bis zum Schneidenrand; der Unterſchnabel iſt ſchwarz mit ſchmalem, weißem Rand am Grunde. An Kopf und Hals iſt dieſer Araſſari ſchwarz; die Wangen haben einen braunvioletten Anflug; Rücken und Flügel ſind metalliſch glänzend dunkelgrün; Unterrücken und Bürzel roth; Schwanz oberſeits ſchwarzgrün, unterſeits graugrün; Schenkel düſter olivengrün; Unterkörper von der Bruſt an ſchwefelgelb, mit breiter rother Binde über die Bauchmitte; Augen braun; nackte Augengegend ſchieferſchwarz; Beine grünlichgrau. In der Größe gleicht er der europäiſchen Elſter, iſt aber ſchlanker gebaut als dieſe (Länge 42—44 cm; Flügel 15—16 cm; Schwanz 16—17 cm).

Die Heimat des ſchwarzkehligen Araſſaris iſt das nördliche Braſilien und Guiana. Prinz Max von Wied traf ihn zahlreich in allen Urwäldern, die er beſuchte; er beobachtete, daß dieſer Tukan in der Lebensweiſe mit den übrigen übereinſtimmte. Häufig ſah der Prinz ihn auf den oberſten dürren Zweigen hoher Waldbäume ſitzen, von wo aus er ſeine kurzen, zweiſilbigen Rufe etwa wie „kulik kulik“ erſchallen ließ. Für gewöhnlich lebt er parweiſe, nach der Niſtzeit dagegen in kleinen Flügen, die nach Früchten umherſtreifen. In der kalten Jahreszeit, wenn die meiſten Früchte reif ſind, verlaſſen ſie öfter die Waldungen und nähern ſich den Küſten und Pflanzungen, wo ihrer viele erlegt werden, ihres gut ſchmeckenden und in der kalten Zeit auch fetten Fleiſches wegen. Sie fliegen bogen- und ſtoßweiſe, ebenſo wie die anderen Tukane und ſchnellen wenig mit den Flügeln; ſitzend wippen ſie, gleich der europäiſchen Elſter, mit dem Schwanz. In Baumhöhlen oder Aſtlöchern ſteht das Neſt mit nur zwei Eiern. Raubvögel und beſonders Eulen verfolgen ſie neckend und vertreiben ſie. Außer von Früchten ernährt ſich dieſer Vogel auch von Kerbthieren, beſonders großen Käfern u. dergl. — Von den Indianern werden Araſſaris nicht ſelten gefangen und gezähmt. Die Eingeborenen glauben, daß ihr Schnabel geſchabt, und die lange gefranſte Zunge ein ſicheres Heilmittel gegen Herzdrücken und Krämpfe ſeien. — Zu uns in den Handel gelangt der ſchwarzhalſige Araſſari höchſt ſelten; in den zoologiſchen Garten von Amſterdam kam er i. J. 1882; gegenwärtig iſt er im Berliner zoologiſchen Garten vorhanden.

Die Araſſaris (Pteroglossus, *Vig.*) unterſcheiden ſich von den allbekannten eigentlichen Pfefferfreſſern (Rhamphastus, *L.*) vornehmlich dadurch, daß ſie beträchtlich kleiner ſind; auch der Schnabel iſt verhältnißmäßig kleiner, ſchlanker und runder, gegen die Spitze weniger zuſammengedrückt, am Grunde nicht höher als der Kopf, bisweilen mit einem mehr oder minder ſcharf abgeſetzten aufgeworfenen Rande; die Naſenlöcher befinden ſich ganz dicht am hintern Rande des Schnabels oder in einem Ausſchnitt deſſelben zu beiden Seiten der abgeplatteten Stirnfirſt; die Schneidenränder ſind mehr oder minder gekerbt; die Flügel ſind ebenſo kurz, aber nicht ganz ſo ſtumpf gerandet wie bei den Verwandten, die dritte Schwinge iſt am längſten; der Schwanz iſt lang, keilförmig zugeſpitzt, ſtufig, die Federn ſind ſchmal, zum Theil mit ſtumpfer Spitze. Die Araſſaris ſind bunter gefärbt als die übrigen Tukane, namentlich zeigen ſie mehr Grün und Gelb.

D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Zimmer-Voliere,
Voß'ſches Fabrikat, Excelſior Nr. 9, ½ Jahr im Gebrauch, zu 12 ℳ zu verkaufen.
Herm. Kröner,
[2055] **Ulm a. D.,** Hirſchſtraße 20.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [2056]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko
Man verlange Preisliste.

Der beſte Fangapparat
für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [2057]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Futtermittel.

Neue 1899er
Tyroler Ameiſeneier,
hochfein, weiß und rein, à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk.
Neuer 99er Elbe-Weißwurm
à Ko. 4 Mk., à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk. [2058]
Zeke (Muska)
à Ko. 2½, 5 Ko. 12, 10 Ko. 22 Mk.
J. O. Rohleder
Leipzig-Gohlis
Vogelfutter-Groß-Handlung.

Universalfutter
für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [2059]
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.
J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Mehlwürmer, Ia., Ltr. 4 ℳ, Pfd. 3,20 ℳ, **Zeitner, Breslau,** Weinſtr. 12. [2060]

Für Insektenfresser und zur Aufzucht.

„Eidotter" **„Eiweiss"**
griesförmig per Kilo 3.75 ℳ schrotförmig per Kilo 4.75 ℳ
Beimischung zu jedem Futter. Bei 4½ Ko. franco. [2061]
Henri Vallette, Berlin SW., Schönebergerstrasse 15a.

Universalfutter.
Vor dem Kennerauge kann eine **Universalfutter-Mischung ohne Zeke** nicht mehr als vollwerthig bestehen.

Einige Jahre fehlte dieses Produkt vollständig am Vogelfuttermarkt, und mancher Liebhaber hätte gern 10 Mk. für ein Kilo bezahlt, wenn er es hätte bekommen können.

Zeke ist **jetzt wieder** überall **gut** und **billig** zu haben.
Man verlange ausdrücklich **„Zeke, Marke Amsel".** [2062]

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter
für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**
Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!
[2063] Allein angefertigt von
Ernst Hanke, Trier, Moſel.
Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Mehlwürmer, vegetab. gefüttert, ganz rein, à Liter 4,50 ℳ, Kilo 7,50 ℳ m. Verpackung. **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Liter 80 ₰, bei 10 Liter 75 ₰, empfiehlt und verſendet [2064]
C. O. Streckenbach, Breslau X.

Ameiſeneier,
1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.
Weisswurm,
getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.
Mehlwurm,
ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [2065]
Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, **Prag 411, I.**

Univerſales. [2066]
Röbbeckes prämirte **Univerſalfutter-Spezialitäten** ſind die beſten für alle inſektenfreſſende Vögel.
Qual. Extra, à Ko, 2,60 ℳ
„ Prima, à Ko. 2,— ℳ
„ Sekunda, à Ko. 1,— ℳ
in ½ u. 1/1 Pfd.-Packet.
1899er Ameiſeneier 1899er,
hochprima Qual., das Feinſte, was es gibt, vollſtändig rein und ſtaubfrei, à Ko. 4 ℳ, 5 Ko. 18 ℳ, **Ameiſeneier,** naturell, à Ko. 2,20, ſtaubfrei 2,60 ℳ, offerirt
Otto Röbbecke, Meerane, Sa., 11,
Sämerei- u. Vogelfutter-Handlg., gegr. 1854.

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 4,25 ℳ, Kilo 7,75 ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ. **Ameiſeneier,** hochprima 99er, Liter 90 ₰, **Weißwurm,** Liter 90 ₰. [2067]
Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Mehlwürmer, à Ltr. 4 ℳ inkl. Verp.
Bei Einſendung von 1,50 ℳ = 140 gr., alſo **weit über 1000 Stück,** frk. inkl. Verp.
[2068] **P. Bartsch,** Breslau, Flurſtr. 6.

Ameiseneier,
1899er Ia geſiebte, ſandfreie Ware,

	per	Kilo	ℳ 3,50
Weißwurm, prima	„	Liter	„ 1,—
Muska	„	„	„ 0,90
Univerſalfutter, extra	„	Kilo	„ 1,20
Mohnmehl, weiß	„	„	„ 0,60
Sonnenblumenk., weiße	„	„	„ 0,60
Reis in Hülſen	„	„	„ 0,60
Ossa sepia, prima	„	„	„ 8,—
Sommerrübſen, Ia großkern. ſüß			„ 0,44

Ferner Mohar-, Senegal-, Kolben-, weiße **Hirſen, Mohn** und alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [2069]
G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Getr. Ameiseneier,
hoch prima, deutſche, ſandfreie Ware, per Ko. 4,60 ℳ, 5 Ko. 22,50 ℳ, per Ltr. 90 ₰.
Gewöhnl. sandfreie Handelsware,
per Ko. 3 ℳ, per 5 Ko. 14 ℳ.
Weisswurm, I. Qual.,
per Kilo 3,80 ℳ, extra Qual. p. Ltr. 1 ℳ.
[2070] **Carl Kämpf, Mainz.**

Alle Vogelfutter,
Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.
E. Schreiber, Leipzig,
Königsplatz 7.
Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [2071

Vögel.

Goulds Amandinen, eingewöhnte, tadelloſe Vögel, à P. 22, à Stck. 11 ℳ.
Beo, einige Worte ſprechend, 30 ℳ.
Südamerik. Spottdroſſel, Stck. 20 ℳ.
Nordamerik. Spottdroſſel, Stck. 12 ℳ.
Tigerfinken, rothe Silberbecks, Bandfinken, Muskatfinken, Blutſchnabelweber, Aſtrilde, Elſterchen, à P. 2 ℳ.
Goldbrüſtchen, à P. 3 ℳ
Mövchen, à P. 3, 3 P. 8 ℳ.
Mövchen, weiß, à P. 6 ℳ.
Graaköpfchen, à P. 2,50, 3 P. 7 ℳ.
Wellenſittiche, tadelloſe Zuchtpare, à P. 6 ℳ.
Felſenſittiche, à Stck. 12 ℳ.
Mönchsſittiche, à P. 10 ℳ. [2072]
J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Wellenſittiche, Zp. 6 ℳ, **1 Schwarzdroſſel,** Männchen, 1 Jahr im Beſitz, 3,50 ℳ. **Paul Köhler,**
[2073] **Magdbg.-Neuſtadt,** Agnetenſtr. 1.

Digitized by Google

Anzeigen.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfresser,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutensilien,
alles ganz aus Metall, in sehr reicher, geschmackvoller Weise hergestellt: empfiehlt zu sehr billigen Preisen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.
Ill. Kataloge gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [2074]

Ein reizendes Naturalien-Kabinet zusammen oder einzeln sofort abzugeben: 1 großen gestopften Papageifisch, 9 ℳ, 1 gest. Igelfisch 4,50 ℳ, 1 gest. Haifisch 9 ℳ, 1 gest. Scorpionsfisch 3 ℳ, 1 großen gest. Sägefisch 20 ℳ, 1 gest. Krokodil 15 ℳ, 1 gest. Brillenschlange 20 ℳ, 1 präpar. großen Tintenfisch 4 ℳ, 1 Säge vom Sägefisch 3 ℳ, 1 großes Seepferdchen 1 ℳ, 1 große Seespinne auf Wandtafel 2,50 ℳ, 1 gr. Taschenkrebs auf Wandtafel 2,50 ℳ, 1 Steinkrabbe auf Wandtafel 3 ℳ, 1 Seeigel 1 ℳ, 3 verschiedene Seesterne à 1 ℳ, 1 Einsiedler-Krebs mit Muschel 1 ℳ, 3 verschied. prachtv. bunte große Corallensträucher à 3 ℳ, 1 deutsche Schmetterlings-Samml. im Glaskast., 80 div. saubere Expl., 4 ℳ, 1 deutsche Käfer-, Bienen-, Fliegen- u. Wespen-Samml. i. Glaskast., ca. 200 Expl. i. Glaskast., 4 ℳ, 1 Schmetterlings-Samml. von Südafrika, 50 prachtv. bunte Expl. i. Glaskast., 10 ℳ, 1 Steinsamml., 50 Arten i. Glaskast., 8 ℳ, 1 Erzsamml., 25 Arten i. Glaskast., 4 ℳ, 1 Muschelsamml., 100 Arten in 2 gr. Kästen, 20 ℳ, 1 Straußenei 3 ℳ, 1 großen Rücken-Panzer der Riesenschildkröte v. Florida 7,50 ℳ, 1 gr. Amethyst-Druse von Brasilien, Pracht-Expl., 8 ℳ. Sämmtl. Sachen sind frisch präpar., saubere Expl. Die ganze Sammlung im ganzen gebe ab für 160 ℳ franko. Versandt unter Nachnahme. [2075]

H. O. Kumss, Hirschberg i. Schl.

Kanarien.

Von meinem sehr tiefgehenden tourenreichen Hohlrollerstamm m. g. Knorren, Klingeln, tiefen Pfeifen ꝛc. versende unter Garantie des Werthes à 10—50 ℳ. Weibchen desselben Stammes 2 ℳ. Für Wiederverkäufer sehr empfehlenswerth, d. Dtz. Hähne 72 bis 96 ℳ.

Parade, Rentier,
[2076] **Hannover,** Asternstraße.

NB. Meine Verkaufsvögel erhielten nachweislich 1898 u. 99 goldene und silberne Medaillen.

Ausgezeichnete Harzer Kanariensänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [2077]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferstr. 16.

Stiglitze,

prachtvolle Männch., Dtz. 9 ℳ, Weibchen Dtz. 4 ℳ, Buchfinken, Zeisige, Dtz. 6 ℳ, Bluthänflinge, Dtz. 9 ℳ, rothe Gimpel, Dtz. 17 ℳ, Bartmeisen, Par 4 ℳ, 10 Par 30 ℳ, Uhu zur Jagd, 40 ℳ, Mehlwürmer, Liter 4 ℳ, liefert unter Garantie [2078]

G. Findeis, Wien I, Wollzeile 25.

Wellensittiche,

Par 4 ℳ.
[2079]

L. Brinkmann,
Calefeld in Hannover.

Gesunde Stiglitze

à 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, **Rothhänflinge** à 1 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, **Zeisige u. Buchfinken** à 90 ₰, Dtzd. 7,50 ℳ, **Grünhänflinge u. Tannenmeisen,** à 70 ₰, Dtzd. 6 ℳ, Weibchen die Hälfte. Garantie lebender Ankunft. [2080]

Gebr. Mergler, Vogelexport,
Hoffstetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

---

1 Par

Löwen-Äffchen,

prachtvoll in Pelz, 120 ℳ **Arassaris** à 35 ℳ. [2081]

H. Fockelmann,
Hamburg, Herrengraben 1.

R. Buhl, Hirschfelde i. Sachsen

Größtes Etablissement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Versandt vorzügl. **Vorsänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beste, was existirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preise à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und gesunde Ankunft. Prämirt mit goldenen u. silbernen Medaillen Kataloge gratis u. franko. [2082]

Halt!

Die **Vogelzüchterei** von [2083]
L. G. Müller, Nordhausen a. Harz
versendet kostenfrei die Preisliste, sowie hochfeine Anerkennungen über gutgelieferte
ff. Harzer Kanarienvögel.
Letztere vers. 14 Tage auf Probe überallhin.

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländischen und ausländischen körner- und insektenfressende Vögel, in allerfeinster, stets frischer Ware, besonders **Ameiseneier,** handverlesene ganz reine, **Eintagsfliegen,** Weißwurm, **Muska** oder **Zeke** überseeische Fliege, **Mehlwürmer** und **Universalfutter-Mischungen** versendet zu billigen Preisen [2084]

H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung,
Erfurt, Futterstraße 3.
Preisliste auf Wunsch umsonst und portofrei.

Kanarienhähne

meines mit Ehrenpr., Gold. u. Silb. Med. präm. Hohlrollerst. von 8 bis 25 ℳ. Probe u. Garant.

Th. Börner,
[2085] **Kassel,** Gartenstr. 3 I.

Alpen-Stiglitz-Männchen,

Dtz. 10 ℳ, Rothhänflinge, Dtz. 11 „, Zeisige, Dtz. 8 ℳ, rothe Dompfaffen, Stck. 2 ℳ. Bemerke auch, daß ich nur schöne, gesunde, eingewöhnte Vögel versende unt. Garant. leb. Ank. mit bester Verpackung. [2086]

Wilhelm Fechtner, Leitmeritz a. d. Elbe.

Verk. gesunde, gutvermauserte, zweijähr. **amerik. Spottdrossel,** Wildfang, Männchen, unter Garantie für 15 ℳ per Nachn. ohne Porto. **1 Käfig** dazu 5 ℳ.

A. Glatt,
[2087] Villa Schriever, **Baden-Baden.**

Mundgelernte, prachtvoll rothe

Dompfaffen,

garantirt 4 schöne Lieder wie ein Mensch pfeifend, versende per Nachn. Anfrag. bitte Retour-Marke. [2088]

F. Roth, Maler,
Schönfeld bei Karlsbad.



F. Rejsek,

Hamburg, Peterstraße 28.

Spezialität:

Alle Arten Papageien u. Papageienkäfige.

Offerirt junge schön befiederte, recht gesunde **Blaustirn-Amazonen** (Rothbug), noch nichts sprechend, à Stück nur 15 ℳ, solche anfangend zu sprechen, Stück 18—20 ℳ, solche schon gut sprechend, von 25 ℳ aufwärts, je nach Leistung. Schöne junge **Grau-Papageien** (Jakos), beste Qualität, jetzt 5 Wochen hier, nur 15 ℳ, solche schon 1/4 Jahr hier, nur 20 ℳ, solche 3/4 Jahr hier, 35—40 ℳ, solche viel sprechend 60, 80, 100, 150 ℳ, je nach Leistung, **weiße Kakadus,** 12, 15, 20 ℳ, **Inkakakadus** in Pracht, 35 ℳ, **große Alexander-Edelsittiche,** Stück 12 ℳ, Männchen 15 ℳ, **Tigerfinken,** Par 1,50 ℳ. Ganz zahme **Affen** der schönsten Arten, Stück 15, 20, 25 ℳ. **Papageienkäfige** in jeder Größe und Facon, Stück schon von 3,50 ℳ an. **Versandt gegen Nachnahme, lebende gesunde Ankunft garantirt.** [2089]

Neu eingetroffen:

80 junge blaustirnige Amazonen,

7 sprechende und liedersingende bezw. Melodien flötende Graupapageien,
7 Blaustirn-Amazonen, desgl.,
4 Gelbnacken, desgl.,
1 Gelbnacken, desgl., 4 Lieder singend, darunter das Lied: „Kaiser Friedrichs Lieblingsblume etc.“ [2090]

August Fockelmann
Thierhandlung
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerstraße 72.

Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von August Hopfer in Burg

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 46.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler

von

Dr Karl Ruß.

Preis: vierteljährlich
(13 Nummern mit Abbildungen)
M. 1.50.

Magdeburg
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretſchmann).

Einzelpreis der Nummer
20 Pfg.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung, ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823). Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg. Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Begründet von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Beſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 46. Magdeburg, den 16. November 1899. XXVIII. Jahrg.

Aus dem zoologiſchen Garten von Berlin.

In dem Vogelhauſe des Berliner zoologiſchen Gartens iſt wiederum eine Anzahl ſeltener Vögel vorhanden, die zweifellos für jeden Liebhaber von höchſtem Intereſſe ſind. Hier zum erſtenmal vertreten iſt der China-Sittich oder ſchwarzſchnäblige Edelſittich (Palaeornis derbyanus, *Frs.*), deſſen Erſcheinung der ſeiner nächſten Verwandten, des Bartſittichs oder roth- und ſchwarzſchnäbligen Edelſittichs (P. fasciatus, *Müll.*) und des Roſenbruſtſittichs oder rothſchnäbligen Edelſittichs (P. javanicus, *Osb.*) ſo ſehr gleicht, daß lange Zeit Unklarheiten und Irrthümer in der Beſtimmung der Arten herrſchten. Von vielen Ornithologen wurden ſie untereinander-, bzl. in eine Art zuſammengeworfen, während Dr. Finſch ſie auf Grund ſeiner Forſchungen als drei ſolche mit Entſchiedenheit auseinanderhält. Wie aus den Bezeichnungen erſichtlich, iſt das weſentlichſte Kennzeichen die verſchiedene Färbung des Schnabels, die freilich anfangs als ein Verfärbungsſtadium vom Jugendkleid zum vollſtändig ausgefärbten Gefieder aufgefaßt wurde. — Bei dieſen ſteten Verwechſelungen iſt es kein Wunder, daß über den Chinaſittich keine beſonderen Mittheilungen vorliegen. Wie es ſcheint, iſt er wie ſein Verwandter auf dem indiſchen Feſtlande heimiſch; doch ſoll er vorzugsweiſe in Nepal und im ſüdlichen China bis zum 30. Grad n. Br. vorkommen, und alſo unter allen Papageien Aſiens am höchſten nach Norden hinauf gehen, während der Bartſittich ſich über Bengalen, Nepal, Aſſam, Sylhet, Tenaſſerim und Malakka bis zur Höhe von Pinang verbreitet und ſogar in Kochinchina vorkommt, alſo unter den dortigen Papageien am weiteſten nach Oſten geht. Die Heimat des Roſenbruſtſittichs erſtreckt ſich über Java und Borneo, angeblich auf Sumatra und wahrſcheinlich auch auf Malakka. Auf der zweitgenannten Inſel iſt er bisher nur im Süden in großen Flügen beobachtet. Zur näheren Unterſcheidung dieſer Edelſittiche dürfte eine kurze Beſchreibung aller drei Arten von Intereſſe ſein. Hervorzuheben iſt beſonders, daß der Chinaſittich beträchtlich größer iſt als die beiden anderen; er iſt etwa ſo groß wie der Alexanderſittich. Der kleinſte, der Roſenbruſtſittich, iſt oberſeits dunkelgrün, unterſeits hellgrün, an Kopf und Wangen graugelb, Hinterhals und Nacken ſchön grün, Kinnbart ſchwarz, Kehle und Bruſt weinroth, auf dem Flügel hat er einen großen olivengrünlichgelben Fleck, der Schnabel iſt roth. Der Bartſittich ſtimmt in der Färbung des Gefieders im weſentlichen mit dem vorigen überein, Kopf und Wangen ſind jedoch bläulichgrau, Kehle und Bruſt bläulichweinroth, Bauch, Unterleib und untere Schwanzdecken verwaſchen bläulichgrün, der Oberſchnabel iſt ſtets roth, der Unterſchnabel ſchwarz. Der Chinaſittich iſt wiederum von dem erſteren hauptſächlich nur durch den einfarbig ſchwarzen Ober- und Unterſchnabel verſchieden; auch iſt der Oberkopf mehr grünlich angeflogen, der gelbe Flügelfleck größer und das Bläulichweinroth der Bruſt zieht ſich in einer ſchmalen Linie auch um den Hinterkopf. — Chinaſittich und Bartſittich ſind jetzt im zoologiſchen Garten vertreten, und es wird den Liebhabern gewiß intereſſant ſein, beide Arten mit einander zu vergleichen. Beſonders der Chinaſittich iſt eine ſehr ſeltene Erſcheinung im Handel. Dennoch war er ſchon 1879 auf einer „Ornis“-Ausſtellung in Berlin von Herrn Aug. Wiener in London ausgeſtellt.

Nicht minder intereſſant und ſelten iſt Brown's Plattſchweifſittich (Platycercus Brownii, *Temm.*), der von Auſtralien zu uns herüberkommt. Seine Verbreitung erſtreckt ſich über den Norden, Nordweſten und Nordoſten des Erdtheils. Ueber das Freileben dieſer Sittiche iſt wenig bekannt. Sie leben parweiſe oder in Familien von 10 bis 20 Köpfen, vorzugsweiſe auf dem Erdboden; der Flug geht niedrig, nicht ſehr raſch, im Zickzack und immer nur auf kurze Strecken dahin. Gould hebt hervor, daß die an den verſchiedenen Oertlichkeiten eingeſammelten Exemplare durch weſentliche Färbungsmerkmale von einander abweichen. So ſollen manche einen mehr oder weniger rothen Oberkopf haben. In der Regel iſt die Zeichnung folgende: Kopf und Rücken ſchwarz, mit weißem Bartfleck am Grunde des Unterſchnabels, Flügel und Schwanz blau, hintere Schulterfedern, Bürzel und ganze Unterſeite ſtrohgelblichweiß, untere Schwanzdecken ſcharlachroth. — Der Sittich im zoologiſchen Garten weicht nicht von dieſer Regel ab.

In einem ſchönen Exemplar finden wir den **Klippenhahn** (Rupicola crocea, *Vieill.*) vor, der aus den Gebirgsgegenden Guayanas und des nordöſtlichen Theiles von Braſilien ſtammt — aus Bergwäldern und Gebirgsthälern, die reich an Felſen und Klüften ſind. Er gehört der Gattung der Klippenvögel (Rupicola, *Briss.*) an, hehergroßen Vögeln, die durch prächtig rothe Färbung des Gefieders und durch helmbildende Stirn- bzl. Oberkopffedern auffallen. Der Klippenhahn ſelbſt iſt hell orangeroth, Schwingen und Schwanzfedern ſchwarz mit weißen Spitzenſäumen; letzte Armſchwingen und Oberſchwanzdecken mit auffallend breiten, zum Theil zerſchliſſenen Fahnen; Helm von halbmondförmiger Geſtalt mit ſcharf abgeſchnittenem oberm Rand und dunkelrothem Saum. Er iſt etwas kleiner als eine Dohle. Das Weibchen hat eine unreine rothbraune Färbung, Flügel und Schwanz mehr dunkelbraun. — Zur Parungszeit führen die Männchen höchſt ſonderbare Balztänze auf. Die Neſter werden an Felswänden in Löchern und Spalten erbaut und ſind in der Regel mit nur zwei auf weißem Grunde ſchwärzlich punktirten Eiern belegt. Die Nahrung beſteht ausſchließlich in Früchten. Umſomehr nimmt es wunder, daß der Klippenhahn im zoologiſchen Garten Schaben mit großer Vorliebe nimmt; Mehlwürmer dagegen verſchmäht er völlig.

Durch ihre abweichende Federnbildung lenken zwei andere Vögel die Aufmerkſamkeit der Beſucher des Vogelhauſes auf ſich. Es ſind Angehörige jener Art, deren ungewöhnlich geſtaltetes und unendlich farbenprächtiges Gefieder einen Sagenkreis um ſie entſtehen ließ, den Jahrhunderte lang die Wiſſenſchaft nicht zu zerſtören vermochte. Der Name, den die Sage den ſchönen Thieren gab, „Paradisvögel“, iſt ihnen noch heute geblieben. — Die **Paradisvögel** ſtehen unſeren Raben nahe, unterſcheiden ſich von dieſen jedoch von vornherein durch ihre wunderbare Federnbildung und -Geſtaltung, namentlich am Kopf, an den Körperſeiten und am Schwanz. Ihre Heimat iſt Auſtralien nebſt den dazu gehörigen Inſeln. Die beiden Exemplare im zoologiſchen Garten gehören der Art Paradisea apoda, *L.* und Paradisea papuana, *Bechst.* an. Der erſtere, auch großer Paradisvogel oder Göttervogel genannt, iſt die größte bekannte Art (gewöhnlich 42—45 cm vom Schnabel bis zur Schwanzſpitze). Sein Gefieder iſt ſehr ſchön und zeichnet ſich beſonders durch die mit ſchuppigen Federn von ſmaragdgrüner Farbe mit ſchönem, metalliſchem Glanze bekleidete Kehle aus, ſowie durch zwei dichte oft 66 cm lange Büſchel zarter Federn von der lebhafteſten goldgrünen Farbe, die von jeder Seite des Körpers unter den Schwingen ausgehen. Die Federbüſche können willkürlich aufgerichtet und ausgebreitet werden, ſodaß ſie faſt den Körper des Vogels verbergen. Dieſe prächtigen Zierden ſind gänzlich auf das männliche Geſchlecht beſchränkt. Das Weibchen ſieht nur ſehr einfach und gewöhnlich aus mit ſeiner einförmigen, kaffeebraunen Farbe. Das junge Männchen gleicht im erſten Jahre genau dem Weibchen; allmählich erſt, mit jedem Federwechſel vervollſtändigt ſich das Gefieder, und da ſie nur einmal im Jahre mauſern ſollen, iſt der volle Federſchmuck erſt im Alter von vier Jahren da. Leider iſt der große Paradisvogel im zoologiſchen Garten zur Zeit gerade in der Mauſer. Seine Heimat beſchränkt ſich, ſoweit bekannt, auf das Hauptland der Aruinſeln. — Der **Papua-Paradisvogel** iſt von beträchtlich geringerer Größe. Die Federnbildung iſt dieſelbe wie beim vorigen. Er iſt auf dem Hauptland von Neuguinea, ſowie den Inſeln Myſol, Salavatti, Jobi, Biak und Soek heimiſch. Beide Vögel werden ſehr lebhaft und beſtändig in Bewegung, von Baum zu Baum fliegend, geſchildert, wobei das erwachſene Männchen mit ſeinem vollentfalteten, wallenden Gefieder einen beſonders ſchönen Anblick gewähren ſoll. Sie ſind, wie alle Arten dieſer Familie, Strichvögel und nähren ſich von weichen Inſekten und Früchten. Im zoologiſchen Garten werden ſie mit Mehlwürmern und Reis gefüttert. Beide Arten waren ſchon einmal, vor 15 Jahren, im Berliner zoologiſchen Garten vertreten. E. R.

Meine Roſenpapageien.

Von A. Krispin.

Den Freunden dieſer lieblichen Papageienart möchte ich einige Erfahrungen mittheilen, welche ich während einer erfolgreichen Zucht ſammeln konnte. Im April d. J. gelangte ich in den Beſitz eines beſonders ſchönen, munteren Pärchens. Es wurde in einem entſprechenden Metallhauſe (Breite 42 cm, Höhe 45 cm, Tiefe 40 cm) untergebracht und ein Niſtkäſtchen, genau in den von Dr. Karl Ruß beſtimmten Dimenſionen, beigegeben. Im Juni erfolgte die Parung. Das Weibchen trug emſig allerlei Gräſer, jeden Halm im Gefieder befeſtigt, zum Neſt, und ſaß anfangs Juli auf 3 Eiern, welche aber, vielleicht wegen der abnormen Sommerhitze, vor der vollſtändigen Ausbrütung verlaſſen wurden. Das Pärchen ſchritt im Auguſt zur zweiten Brut. Diesmal fanden ſich bei vorſichtiger Prüfung 5 Eier vor. Die Mulde erſchien durch ein Gräſerdach nach oben geſchützt. Ende September konnte man aus dem Verhalten der beiden Alten das Vorhandenſein von Jungen erkennen, und wir ſahen am 8. Oktober drei kräftige, aber noch blinde und wenig befiederte Vöglein. Bei ſpäteren Beobachtungen erfuhren wir, daß die Jungen ungefähr 14 Tage

[illegible]

[illegible]

merkſamkeit bedürfen, auch keine weitere Nahrung als alte, unbrauchbare Waben verlangen und außerdem, ſoweit meine Beobachtungen reichen, keinen verherenden Krankheiten ausgeſetzt ſind, die ja bei den Mehlwürmern nicht zu den Seltenheiten gehören, falls ſie nicht ſorgfältig verpflegt werden.

In Anbetracht dieſer günſtigen Reſultate ſchließe ich mich dem Wunſch des Herrn Wimmer an, daß andere Vogelfreunde auch einmal einen Verſuch anſtellen möchten. wozu ich jedem die beſten Erfolge wünſche. Es würde mich ſehr freuen, wenn dann die Benutzung der Wachsmotte als Vogelfutter immer mehr verbreitet würde, ſchon aus dem Grunde, damit den Liebhabern eher die Möglichkeit gegeben wird, ihren Pfleglingen Abwechslung in der Nahrung zu bieten. Es iſt dies in der Pflege aller Thiere ein ſehr wichtiger Faktor, der leider nur zu oft überſehen wird.

Eine Spatzengeſchichte.

Plauderei von L. Aelbert.

Er hat trotz der nicht zu leugnenden Straßenbubeneigenſchaften doch auch manches Drollige an ſich, unſer Hausſpatz, und erfreut ſich deshalb hier und da eines Freundes unter den Menſchen, der ihn, den verachteten, ja zuweilen ſogar verhaßten Hausgenoſſen, durch beſtändige Beobachtung ſeines Treibens und dieſe oder jene Wahrnehmung lieb gewonnen hat. Es ſind oft recht kecke Streiche, die er vollführt und die jedem vorurtheilsloſen Beobachter Vergnügen bereiten müſſen. Eine amüſante Beobachtung, die kürzlich ein mir bekannter Vogelliebhaber machte, zeugt von überraſchend hohem Auffaſſungsvermögen des Vogels und muß außerdem jedem fühlenden Menſchen, zumal dem Vogelfreund, ein Lächeln abzwingen; ſo daß es wol am Platze ſein mag, ſie den geehrten Leſern der „Gefiederten Welt“ mitzutheilen.

„Ich halte“, ſo erzählte mir der Beobachter, „im Mai dieſes Jahres an der Hinterſeite meines Wohnhauſes in einer Mauerhöhlung das Neſt eines Sperlings-Pares entdeckt. Von den Früchten dieſer Entdeckung, die ja gewiß nicht von welterſchütternder Bedeutung war, zehrte ich täglich mehrere Wochen lang. Ein Kunſtbau iſt das Ergebniß des Spatzenfleißes nun bekanntlich nicht, und doch bin ich es glücklicherweiſe nicht allein, dem wenigſtens der rühmliche Eifer und die Beſorgniß, womit das Par ſchon bei dem Neſtbau zu Werke geht, des Intereſſes und der Beobachtung werth ſind. Das Neſt konnte ich von einem Fenſter meiner Wohnung aus bequem erreichen, und den Verlauf der erſten glücklich von Statten gegangenen Brut habe ich mit Intereſſe verfolgt. Die vier Jungen waren bereits flügge geworden und erwachſen, und ſchon ſchauten die der zweiten Brut, abermals vier, luſtig und neugierig in die Welt. Um dieſe Zeit fand ich brunten im Epheu an der Gartenmauer auch ein Sperlingsneſt, in dem ſich zwei mit den vorigen ungefähr gleichalterige Junge befanden. Das bewog mich, einmal zu verſuchen, ob gegebenen Falles die Eltern der einen Brut Mitglieder der anderen aufziehen würden. Der Verſuch mußte bald gemacht werden; denn das Ausfliegen der Jungen ſtand binnen einiger Tage zu erwarten, und ſo nahm ich denn am folgenden Morgen — der Tag verſprach heiß zu werden — früh aus dem erſterwähnten Neſt zwei Junge heraus und ſetzte ſie in das Neſt an der Gartenmauer. Natürlich blieb ich in der Nähe, um die Jungen, wenn ſie etwa von den Neſtinhabern oder deren Alten mißhandelt werden würden, ihren Eltern zurückzubringen. Das wurde jedoch überflüſſig. Die vier Vögel verhielten ſich ganz ruhig. Nach kurzer Zeit kam das Weibchen, um ſeine beiden Sprößlinge zu füttern und war beim Anblick des während ſeiner Abweſenheit entſtandenen Zuwachſes zunächſt augenſcheinlich höchſt überraſcht. Die Verwirrung währte jedoch nicht lange; denn bald fütterte es die Fremdlinge mit demſelben Eifer und derſelben Zärtlichkeit wie ſeine eigenen Jungen.

„Aber“, fuhr der Erzähler fort, „das war es eigentlich nicht, was ich Ihnen mittheilen wollte. Das erregende Moment des Spatzendramas kam erſt ſpäter. Ich ſtand noch in der Nähe des Neſtes und beobachtete die ohne jede Störung regelmäßig erfolgende Fütterung, als hinter mir jemand meinen Namen rief. Mein Freund war gekommen, um ſich meine Voliere und deren Bewohner einmal anzuſehen. Frohlockend erzählte ich ihm von dem glänzenden Erfolg, den ich eben errungen hatte. „Es war Raub und Betrug in einer That“, meinte er und fügte nachdenklich hinzu: „Und das vor dem Frühſtück!“ Deſſenungeachtet freute er ſich doch des gelungenen Experimentes und war ebenſo neugierig wie ich zu wiſſen, wie die beraubten Eltern ſich nun verhalten würden. Wir erwarteten, daß die Alten ihre Jungen ſuchen, und wenn es ihnen geglückt wäre, ſie in der Behauſung ihrer Nachbarn zu finden, entweder mit dieſen gemeinſchaftlich die Erziehung fortſetzen oder um ihre Jungen kämpfen würden. Umſomehr wunderte uns das, was die Alten nun wirklich thaten. Um die verſchwundenen Sprößlinge kümmerten ſie ſich garnicht. Ja, ſie fütterten die beiden zurückgebliebenen nicht einmal mehr. Das letztere that mir aufrichtig leid. Wenn ich aber die weggenommenen Jungen wieder in das alte Neſt ſetzte, ſo lag die Gefahr nahe, daß die Alten des zweiten Neſtes ihre Brut nun auch im Stich ließen, und außerdem war es ſelbſt dann bei dem offenbaren Eigenſinn des Pares nicht ſicher, daß es die Pflege wieder übernehmen werde. Zu Grunde gehen ſollten die beiden verlaſſenen Spatzenkinder auf keinen Fall! Was war da zu machen? Nach einigem Nachſinnen beſchloß ich, bis zum Abend zu warten, und wenn dann die Fütterung noch nicht wieder begonnen hatte, die Jungen ſelbſt aufzupäppeln. Mein Freund ſchimpfte noch weidlich auf meine Neugier und den Eigenſinn der Spatzen, denen nun die armen Thierchen zum Opfer fallen würden. Dann beſuchten wir die Voliere und traten hierauf einen längeren Spaziergang an.

Unterwegs ſagte mein Begleiter: „Die Grauſamkeit der Spatzen ſcheint mir nicht echt zu ſein; denn ſie hielten ſich doch immer in der Nähe auf und bezeugten durch ihre Aufregung wenigſtens noch Intereſſe für ihren Haushalt. Ueberdies iſt „nihil sine causa“ (Nichts ohne Urſache) ſtets mein Lieblingsſprichwort geweſen, und es trifft im Thierleben wie im Natur-Daſein überhaupt am meiſten zu“. Auch mir kam das Verhalten unſerer ſonſt ſo robuſten „Gaſſenbuben“ merkwürdig zartfühlend vor.

Erſt am Spätnachmittag kehrten wir von unſerm Streifzuge zurück. Der Tag war heiß geweſen; aber trotzdem wir ſehr müde waren, ſuchten wir doch ſogleich das Neſt auf. Wieder war etwas geſchehen, was wir nicht erwartet hatten: das Neſt war ler. Unten aber, auf dem Dach eines Schuppens, ſaßen die beiden Jungen und wurden unaufhörlich von ihren Eltern gefüttert. Jetzt wurde es uns plötzlich klar, weshalb die Alten am Morgen die Fütterung eingeſtellt hatten. Durch Hunger hatten ſie die Jungen zum verfrühten Ausfliegen gezwungen, um ſie der Gefahr, der ihre Geſchwiſter zum Opfer gefallen waren, zu entreißen. Und verfrüht war der Ausflug; denn einerſeits ſind wir beide alte Vogelliebhaber und wiſſen daher ungefähr, wann ein junger Vogel flügge wird, und andererſeits fällt dabei ins Gewicht, daß die beiden anderen Jungen erſt zwei Tage ſpäter ausflogen und überdies eines der beiden verfrühten Ausflieger das Neſthäkchen war. Das Spatzenpärchen hatte die Gefahr, in der der Reſt ſeiner Brut ſchwebte, erkannt und es verſtanden, ſeine Jungen dieſer Gefahr zu entziehen; daran läßt ſich mit allen Lehren über Inſtinkt nicht rütteln.“

Die letzten Worte hatte der Erzähler in ſehr energiſchem Ton geſprochen; ſein Geſicht hellte ſich wieder auf, als er fortfuhr: „Doch dann kam das Schönſte. Kaum hatten die Spatzen uns an dem Fenſter erblickt, als ſie ſich auf dem Fenſterſims neben uns niederließen und laut zu ſchwatzen begannen. Dem Par geſellten ſich bald ſeine Jungen erſter Brut zu, die eifrig in den „Geſang“ ihrer Eltern einſtimmten. Immer größer wurde die Schar und mit ihr der Lärm. Die Thierchen wetteiferten förmlich miteinander. Sie warfen den Hinterleib herausfordernd hin und her, und das eine ſuchte das andere mit ſeinem Geſchrei zu übertönen. Der Lärm wäre ſchließlich läſtig geworden, wenn nicht aus dem ganzen Gebahren hervorgegangen wäre, daß die Vögel es darauf abgeſehen hatten, ſich uns bemerkbar zu machen und uns von einer Erregung Mittheilung zu machen. Ich habe der Moralpredigt der erzürnten Geſellſchaft zugehört von Anfang bis zu Ende ohne Widerrede. Als das Geſchrei verſtummt war, meinte mein Freund ernſthaft: „Das war kein Zornesausbruch, ſondern Hohngelächter darüber, daß wir vor dem leren Neſt ſtanden“. Sei dem nun ſo oder ſo, mir hat dieſe Beobachtung nicht nur wahre Freude bereitet, ſondern auch mancherlei zu denken gegeben, und der Spatz iſt durch ſie in meiner Gunſt noch höher geſtiegen, als er ſchon vorher darin ſtand.“

So wurde ſie mir erzählt, die Spatzengeſchichte, von dem alten, treuherzigen Vogelfreund, der ſchon manchem Anfänger mit Rath und That beigeſtanden hat; und an jenem Abend iſt an dem Tiſch, an dem wir zuſammen unſern Abendſchoppen tranken, noch manches Gute und Schlechte über die gefiederten Günſtlinge des Alten erzählt worden und manches derbe Wort über die Spatzenfeinde unter Menſchheit und Gethier gefallen.*)

---

*) Vielleicht möchte dieſer oder jener Leſer an den etwas ſpäten Zornausbrüchen der Spatzen gelinde Zweifel hegen oder an das Hohngelächter nicht recht glauben; am Ende war es mehr das böſe Gewiſſen des Erzählers und ſeines Freundes, welche im Bewußtſein einer „ſchlechten“ That und in dem Gefühl der Mitſchuld daran die erregte Aufführung der Spatzengeſellſchaft als gerechtfertigte Mißbilligung und wohlverdiente Strafe auffaſſen mochten. D. L.

Von meinen Vögeln.

Von Frau Marie von Moeller.

Im Anſchluß an die Schilderung meiner zahmen Vögel im Jahrgang 96, bzl. 97 der „Gefiederten Welt“ erlaube ich mir, noch Folgendes hinzuzufügen:

Die „Lora“ (Amazone) und der „Jakob“ (Dohle) haben inzwiſchen noch intimere Freundſchaft geſchloſſen. So ſitzen ſich z. B. Beide oft auf ein und demſelben Käfig gegenüber, der Jakob das eine Bein hochgezogen, die Lora wie ein richtiger Philoſoph ihn anſehend und dabei überlegend, was ſie wol ſtundenlang thun würde, wenn der Jakob nicht ſo viel Queckſilber in ſich hätte. Letzterer iſt bald hier, bald da, aber immer poſſirlich und unterhaltend, und oft laufe ich des Vormittags von meinen wirthſchaftlichen Angelegenheiten weg, um ein Par Minuten mit ihm zu tändeln. Für Leute, welche keine Kinder haben, kann es meiner Meinung nach nichts netteres geben wie eine zahme Dohle. Hat man Kinder, dann kann man ſie freilich nicht ſo frei in allen Zimmern herum ſpazieren laſſen, denn gerade auf die Kinder haben es wol derartige Vögel abgeſehen. Sie zwicken die Kinder zu gern in die Beine und nehmen ihnen mit Vorliebe Spielzeug weg, weshalb ich auch meine Vögel in einer beſondern Stube habe, wo ſie den ganzen Tag frei herumlaufen und im Sommer durch's Fenſter, woran eine Stange angebracht iſt, in den Garten kommen. Da ſuchen nun die Kinder dem Jakob allerhand Käfer u. ſ. w., was er ſtets mit einem freudigen „gäk, gäk, gäk“ begrüßt. Sieht er einen kleinen Raubvogel am Himmel (welcher nach den Spatzen geht), ſo flüchtet er ſchnell in ſeine Stube.

Eine kleine Epiſode muß ich noch erwähnen. Eines Tags, vergangenen Sommer war's, will ich meine Vögel gegen Abend in ihre Käfige bringen. Der Jakob iſt da, doch die Lora fehlt. Ich rufe ſie, doch keine Antwort, ich ſehe alle Ecken durch, da auf einmal höre ich im Taubenkäfig ihr Lachen. Ich traute meinen Ohren kaum, ſah hinein und richtig, ſitzt die Lora auf der Stange zwiſchen 9 Lachtauben. Das Bild war reizend, und nur ſchade, daß ich's nicht feſthalten konnte. Und wer hatte die Thür zum Taubenkäfig auf und dann wieder zugemacht? Nur der freche Jakob, denn dreiſt und frech iſt er, da er gar keinen Reſpekt beſitzt. Daſſelbe Bild habe ich dann noch manchmal vor Augen gehabt. Der Jakob macht z. B. auch die Thür zur Vogelſtube auf, ſetzt ſich auf den Drücker und klopft mit dem Schnabel ſo lange, bis die Thür aufgeht. Auch die untere Ofenthür macht er auf, da er gemerkt hat, daß das Feuer dann heller brennt. Ich wundere mich oft über ſeine wirklich große Schlauheit.

Die wilden Raben, bzl. diejenigen, welche vom nahen Wald aus in unſern Garten kommen, ſind inzwiſchen auch noch zahmer geworden. Sie kommen faſt unter's Fenſter und ſitzen oft halbe Stunden lang im Garten auf Stangen, ſo daß ſchon oft Fremde gefragt haben: „Die hübſchen Raben gehören wol Ihnen?"

Kürzlich machten wir einen Spaziergang und zwar ſchlugen wir die Richtung ein, wo die Raben immer hin fliegen. Es iſt dies ein nicht allzu hoher Berg und von unſerer Wohnung aus in etwa 10 Minuten zu erreichen. Oben angelangt (alſo mitten im Wald und nur ganz oben eine ſog. Blöße) hörte ich auf einmal eine Menge Raben krächzen; ich dies hören und meine Raben rufen und pfeifen war das Werk eines Augenblicks. Und richtig, auf einmal kommt der eine Rabe an, ſetzt ſich auf eine hohe, alleinſtehende Tanne und läßt nun ſeine Stimme erſchallen. So oft ich rief, antwortete er auch, und ich freute mich über den dankbaren Vogel. Ich wußte nämlich ſofort, daß es einer von unſeren Raben war, da derſelbe ſchon lange eine heiſere Stimme hat. Auf Katzen ſind beide Raben ordentlich eiferſüchtig, bzl. futterneidiſch. Vergangenen Sommer beobachtete ich eines Morgens, wie beide Raben eine große Katze in ihrer Mitte hatten und dieſelbe über den Zaun brachten. Auch Mäuſe haben wir infolgedeſſen gar nicht im Garten, trotzdem das freie Feld und der Wald direkt an demſelben ſind. Da mein Mann im Garten nur Spalierobſt zieht, und wir deshalb gar keine großen ſchattigen Bäume haben, ſo halten ſich die Vögel auch nicht den ganzen Tag hier auf, ſondern ſie fliegen fort und kommen wieder, und zwar ſo und ſo oft den Tag über. Ich bin feſt davon überzeugt, daß ſie ſich, wenn ſie mehr Schutz im Garten fänden, den ganzen Tag und wol auch des Nachts hier aufhalten würden.

Aus den Vereinen.

Der **Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht in Breslau** hielt am 9. Oktober 1899 ſeine ſechſte ordentliche Verſammlung ab. Erſchienen waren 40 Mitglieder und einige Gäſte. Der Vorſitzende eröffnet um 8½ Uhr die Sitzung und gedenkt zunächſt des kürzlich verſtorbenen Dr. Ruß, des bekannten Ornithologen, über deſſen Leben und Wirken er einige Mittheilungen macht. Die Anweſenden erheben ſich zu Ehren des Verſtorbenen von ihren Plätzen.

Der Verein veranſtaltet am 25., 26., 27. November dieſes Jahres eine Vereins-Ausſtellung im Kafé-Reſtaurant, Karlſtraße 37. Sie umfaßt Hühner, Waſſergeflügel, Ziergeflügel, Tauben, einheimiſche Vögel, Exoten und Kanarien, ſowie Vogel-Eier, ausgeſtopfte Vögel, Bälge, Geräthſchaften, Artikel für Zucht und Pflege. Sie verſpricht nach den bis jetzt eingegangenen Anmeldungen außerordentlich reich beſchickt zu werden. Als Preisrichter fungiren die Herren: Rudolf Kramer, Leipzig, für Großgeflügel; F. Siebe, Magdeburg, für Tauben; Guſtav Hanke, Hentſchkau, für einheimiſche Vögel und Exoten; Auguſt Knaak, Breslau, für Kanarien. Mit der Ausſtellung iſt eine Lotterie verbunden. Es werden 4000 Loſe à 50 Pf. ausgegeben, von denen der größere Theil ſchon vor einigen Wochen verkauft war. Nur noch bei den Händlern ſind jetzt Loſe zu haben.

Den Glanzpunkt des Abends bildete der Vortrag des Herrn Lindner über: „Das Schwarzplättchen im Freien und als Stubenvogel." Herr Lindner, welcher langjähriger Liebhaber und Pfleger dieſes Vogels iſt, behandelte ſein Thema mit wol noch nie dageweſener Ausführlichkeit. Andere Liebhaber und Kenner dieſes Vogels wußten gegen die Beſprechungen nichts einzuwenden, ja nicht einmal etwas zur Ergänzung vorzubringen. Unter lautem Beifall ſchloß Herr Lindner ſeinen Vortrag, nicht ohne das Schwarzplättchen den Anweſenden wegen ſeines herrlichen Geſanges, auch wegen ſeiner Anſpruchsloſigkeit an Futter und Pflege nochmals warm empfohlen zu haben. Den Vortrag ſelbſt hat Herr Lindner ſich entſchloſſen, auf wiederholtes Erſuchen des Herrn Vorſitzenden, in dieſer Fachſchrift zu publiziren. Die Sitzung endigte mit der Verloſung eines vom Vortragenden ſelbſt ausgeſuchten ſchönen Schwarzplättchens, über welches die Mitglieder gründliche Belehrung erfahren haben.

Briefliche Mittheilungen.

... Inbetreff meiner Roſenpapageien möchte ich noch hinzufügen, daß die Jungen (nun ſieben Wochen alt) ſehr ſchön und munter ſind, ganz ſelbſtſtändig freſſen, und daß zwiſchen dieſen und dem verwittweten Männchen ein ungemein zärtliches Verhältniß beſteht. Ich werde ſie nun bald ſepariren und dem Männchen eine neue Genoſſin geben.

A. **Krispin.**

Mancherlei.

Vor drei Jahren ſuchte Karl Landſteiner durch einen Aufruf der Idee einer internationalen Liga zur Bekämpfung des Vogelmaſſenmordes Anhänger und thätige Förderer und Freunde zu gewinnen. Mitleidvolle Antheilnahme hat er gefunden allerorten, bei einzelnen, auch vielen fürſtlichen Perſonen und ganzen großen Vereinen. Die landwirthſchaftlichen Kreiſe wurden ſtark berührt, und der „Oeſterreichiſche Bund der Vogelfreunde" hielt im Auguſt vorigen Jahres einen Vogelſchutz-Kongreß in Graz ab. Man regt ſich allenthalben, aber es ſind vielmehr die Regungen des Schmerzes über heilloſe Zuſtände; es fehlt am berufenen Arzte und ſeiner heilbringenden Regſamkeit, es fehlt an durchgreifenden, probaten Mitteln gegen das Uebel; es fehlt an der Gewalt des Geſetzes, welches wol im Stande wäre, die Mordluſt einzuſchränken und den Kitzel der Feinſchmeckerei zu dämpfen; es fehlt an der Kraft und allſeitigen Wirkung nachhaltiger Aufklärung.

Der „Thierſchutz-Verein in Dresden“ hat in einem ſeiner Flugblätter (Nr. 2, Oktober 1899) einen neuen Aufruf Karl Landſteiners bekannt gegeben, deſſen zweiten Theil wir im Folgenden abdruckweiſe wiedergeben wollen, da die ernſten Warte und nachdrücklichen Mahnungen in der That weiteſte Verbreitung verdienen, da die klaren und überſichtlichen Auslaſſungen der Beachtung durchaus würdig ſind. Wir möchten ſie den Leſern der „Gefiederten“ um ſo weniger vorenthalten, als wir gerade in allerletzter Zeit mehrfach Gelegenheit hatten, beſonders den Vogelmaſſenmord, wenn auch nur ſtreifend oder in kurzer Notiz, zu erwähnen. — —

Gegen den Vogelmaſſenmord.

. . . Die geplante internationale Regelung des Vogelſchutzes, welche in Paris begonnen, in Aix fortgeſetzt wurde, iſt bis jetzt nicht zuſtande gekommen. Für die Bekämpfung des Vogelmaſſenmordes in Südtirol iſt der Entwurf eines Landesgeſetzes berathen und beſchloſſen worden, denſelben im Tiroler Landtag einzubringen. Beſchlüſſe ja — aber die Durchführung? — Was iſt endlich für Italien, dem Hauptherde dieſer unglaublichen Barbarei, geſchehen? Nichts!

Die Feder ſträubt ſich, niederzuſchreiben, was in dieſem Lande vorgeht. Nicht nur, daß Geiſtliche und Laien, Hoch und Nieder, Klein und Groß auf die Vogeljagd ausziehen, es findet auch Maſſenfang in großen Schlagnetzen ſtatt, wobei die nach langem Fluge über das Meer ermüdeten, zur Raſt ſich niederlaſſenden Vögelchen nach Tauſenden gefangen und mit Knütteln jammervoll todtgeſchlagen werden. Natürlich wird da kein Unterſchied gemacht, und unſere Lieblinge, die Schwalben, ebenſo hingemordet wie die anderen kleinen Sänger. Die Journale haben erſt unlängſt wahrhaft haarſträubende Berichte über den Schwalbenfang in Italien gemacht. Es iſt ein abſcheuliches Verbrechen, das dem ganzen italieniſchen Volke zur Laſt fällt, eine Barbarei ohnegleichen! Ein Vogelmord, der ſo lange fortdauern wird, als es noch kleine Vögel gibt, welche nach dem Süden ziehen. Wenn dies auch jetzt noch der Fall iſt, da man dieſe Thierchen leider nicht abhalten kann, dem todbringenden Wanderinſtinkte zu folgen, die Zeit iſt nicht mehr ſo ferne, in der ſie alle ausgerottet ſein werden.

Die Italiener gleichen ihren Katzen, welche ſie ſo lieben; ſie ſind, wie dieſe, Vogelräuber; ſie können kein fliegendes Vöglein ſehen, ohne demſelben nachzuſtellen. Dazu kommt noch die furchtbare Armuth in dieſem Lande. Fleiſch zu kaufen, fehlt es an Geld; eine Auflage zur Polenta will man aber — alſo fängt man die kleinen Vögel. Die Vornehmen und Reichen jedoch ſollten ſich wenigſtens zurückhalten und im allgemeinen Intereſſe die Schwalbenſchmäuſe unterlaſſen und andere Leckerbiſſen als gebratene kleine Vögel und Vogelcroutons verzehren! Das iſt aber leider in den Wind geredet.

Es iſt kein Zweifel mehr! Wenn nicht ein unvorhergeſehener Umſchwung eintritt, ſo werden unſere Wälder bald veröden, unſere Obſtkulturen die Beute wuchernden Ungeziefers ſein, und traurig, ſehr traurig wird es ausſehen in Wald und Flur!

Was helfen dann alle Adreſſen, alle Reſolutionen und Kongreß-Beſchlüſſe? Selbſt die ſo rührenden Klagerufe der edlen Lilli Lehmann, die gründlichſten Referate des Dr. Ohlſen, die höflichſten Zuſicherungen diverſer Ackerbauminiſter, daß etwas geſchehen werde, alles, alles wird fruchtlos ſein! Vielleicht raffen ſich am Ende doch noch die Parlamente, die Regierungen zu einer That auf, vielleicht entſchließt man ſich zu einer internationalen Vereinbarung — wenn es zu ſpät iſt. Wenn es keine Schwalbe mehr gibt! Wenn kein kleiner Sänger mehr den Wald belebt! Wenn uns nur die Kanarienvögel geblieben ſind und die — Spatzen!

Mit allem Rechte verdammen wir die Südländer! Sind wir aber von jeder Schuld freizuſprechen? Abgeſehen von dem Vogelmaſſenmord in Helgoland — ein ſchönes Humanitätszeugniß für das Volk der Dichter und Denker! —, abgeſehen von dem häßlichen Dohnenſtieg und dem überall verbreiteten Nachtigalen-, Finken- und Meiſenfang in unſeren Gegenden, ſind wir denn überhaupt ſo ſehr über die Südländer erhaben, daß wir uns, dem Phariſäer gleich, in die Bruſt werfen und ſagen dürfen: „Mein Gott, ich danke dir, daß ich nicht ſo bin, wie dieſer da!“, daß wir ſo viel geſitteter, großherziger, mitleidsvoller ſind, als die Italiener? Tragen denn unſere deutſchen Frauen und — „zarten“ Mädchen nicht immer noch, ja mehr als je, Vogelleichen und erotiſchen Federnſchmuck auf den Hüten? Was hat denn der Kreuzzug gegen die Mode genützt? die Mode iſt Trumpf! —

Und das iſt nicht alles! Wir hätten viel — vor der eigenen Thüre zu kehren! Was wollen wir?

Wir ſtehen in allem fin de siècle! Des Jahrhunderts der großartigſten Entwicklung, der ſtaunenswertheſten Entdeckungen und Erfindungen! Ginge doch auch die Kultur des Herzens, die Pflege edleren Gefühles gleichen Schritt damit! Da aber fehlt es. Fortſchritt nach Außen — Rückſchritt nach Innen!

Was aber ſoll in unſerer Sache geſchehen?

Was können wir thun?

Ich glaube, wir ſollten erſtreben, daß ſich ſämmtliche Thierſchutz-Vereine, wenigſtens Europas, zu einer gemeinſamen Bekämpfung des Vogelmaſſenmordes verbinden. Dies würde das Vordertreffen für eine durch die Regierungen herbeizuführende, internationale Regelung des Vogelſchutzes ſein. Einem ſolchen Drucke könnte ſchließlich auch Italien nicht widerſtehen.

Wenn nicht früher, ſo muß dieſe Idee auf dem großen Welt-Kongreſſe in Paris — 1900 — angeregt werden. Sollte ich noch leben zu dieſer Zeit und auf dem Kongreſſe anweſend ſein, ſo werde ich es thun.

Was nun ſpeziell Italien betrifft, ſo iſt daſelbſt keine Beſſerung zu hoffen, ſo lange nicht die erblichen Vogelherde aufgehoben, der Maſſenfang mit Schlagnetzen verboten, der Schwalbenfang gänzlich unterſagt iſt. Sollte es abſolut nicht möglich ſein, die maßgebenden Faktoren, die geſetzgebenden Körperſchaften für eine ſolche Maßregel zu gewinnen? Sie wird freilich unpopulär ſein, aber ein gegen die nationalen Gewohnheiten und Leidenſchaften eines Volkes gerichtetes Geſetz iſt immer unpopulär.

Endlich wäre es ſehr wünſchenswerth, in den ſüdlichen Ländern Perſönlichkeiten von Macht und Einfluß zu gewinnen, die ſich unſerer Sache annähmen. Daß durch ſolche Perſonen Vieles und Großes geleiſtet werden kann, beweiſt die faſt ans Wunderbare grenzende Thätigkeit der Prinzeſſin Vareſe und ihres Direktors in Neapel. Dieſe beiden treten der unſagbar grauſamen Behandlung der Zug- und Laſtthiere mit heroiſchem Muthe, ja mit Todesverachtung entgegen.

Sollte es nicht gelingen können, derartige Perſonen in Italien für uns zu gewinnen und für den edelſten Kampf zu begeiſtern, beſonders in jenen Gegenden der Halbinſel, wo der Vogelmaſſenmord in hergebrachter Weiſe betrieben wird? — Wie gering auch im Augenblick die Hoffnung auf durchgreifende Erfolge iſt, laſſen wir uns nicht entmuthigen!

Edle Mitkämpfer! Großherzige Mitkämpferinnen! Harren wir aus! Gebrauchen wir jedes erlaubte Mittel, ſcheuen wir vor keinem Opfer zurück! Es iſt die zwölfte Stunde!

Jeder aber, er ſei auch wer er ſei, wenn er nur ein Herz hat für die ſo menſchlich-edle, ſo wichtige Sache des Vogelſchutzes, er ſtehe zu uns, er unterſtütze uns mit all ſeiner Kraft, er kämpfe mit uns bis zum letzten Athemzuge!

Die Menſchheit wird es ihm danken und Gott wird es ihm lohnen!

Nikolsburg (Mähren), im Februar 1899.

Karl Landſteiner.

Ein merkwürdiges Vogelneſt hat dem „Prometheus“ zufolge in Braſilien der Naturforſcher Göldi entdeckt. Wir wiſſen ja, daß die Weber- und Laubenvögel höchſt wunderliche Neſter bauen; ähnlich abſonderlich formt nun noch eine andere Vogelart ihr Neſt. Von den Eingeborenen war Göldi als der Erbauer eine kleine Falkenart bezeichnet worden, die ſich allerdings auch durch eigenartige Gewohnheiten auszeichnet, und die die Eingeborenen mit einem ganzen Sagenkreis umwoben haben; indeß als Göldi dieſe neuen Neſter ſah, wußte er gleich, daß Falken Derartiges nicht bauen könnten. Die Geſtalt des Neſtes gleicht einer großen Röhre von einem Meter Länge. Das Neſt klebt der Länge nach an der Rinde eines Baumſtammes, iſt oben geſchloſſen und abgerundet und beſitzt an dem unteren Grunde eine einzige Oeffnung, die den Vögeln in das Innere Zutritt geſtattet. Die Wand des Neſtes iſt ſehr feſt und dicht, als Bauſtoff dient den Vögeln die Samenwolle einer beſtimmten Pflanzenart. In dem oberen Theile des Neſtes erweitert ſich die Röhre, die den unteren durchzieht zu einer kleinen Ausbuchtung, ſo daß der Umriß des ganzen Hohlraums der Form eines Schöpflöffels nicht unähnlich iſt. In dieſer napfförmigen Vertiefung befindet ſich das eigentliche Neſt zum Brüten. Nach langem Warten bekam Göldi auch die Bewohner dieſes Röhrenneſtes zu Geſicht; es waren nicht die in jenem Gebiete heimiſchen Falken, wie die Eingeborenen behauptet hatten, ſondern es waren ſchwalbenähnliche Vögel von der Art Panyptila cyanensis. Die Hauptfundſtelle dieſer ſonderbaren Neſter war ein Wald in der Nähe der Stadt Para an der Mündung des Amazonenſtromes.

Anfragen u Auskunſt

Neue Abonnentin: 1. Inbetreff des Nährſalzextraktes vermögen wir Ihnen keine genaueren Angaben zu machen; es ſtehen uns hier bisher keine Erfahrungen zur Seite. Doch möchten wir Ihnen bemerken, daß Nährſalzextrakt zunächſt bei Krankheiten Verwendung findet; es iſt beſtimmt, dem ſchlechten Blut ein beſſeres Miſchungsverhältniß zu geben und durch Erneuerung der Säfte die Geſundung des Körpers zu fördern. Geſunde Vögel brauchen nur die bisherige geſunde Nahrung; das Nährſalz ſoll nichts als die Fehler einer ſchlechten Ernährung aufheben. 2. Die Milch darf nicht roh, ſie muß gekocht ſein, vorher abgerahmt. 3. Zum Vorſchläger — es iſt gleich, ob er Hohl- oder Waſſerrolle hat — müſſen Sie einen Vogel nehmen, der von demſelben Stamme iſt wie die Jungen, welche unterrichtet werden ſollen; es muß ein altes Männchen und ein möglichſt vorzüglicher Sänger ſein. Sind Ihre jungen Vögel von geringerer Abkunft, ſo hüten Sie ſich, etwa einen vorzüglichen Harzer Vogel als Vorſchläger zu nehmen; die Jungen würden dann doch nichts Rechtes lernen und den tüchtigen alten Sänger verderben. Vergeſſen Sie weiterhin nicht, im zweiten Jahre nach der Mauſer die Jungen abermals zu demſelben Vorſchläger oder einem andern (jedoch durchaus von gleichem Stamme) zu bringen. Erſt im dritten Jahre iſt ja der junge Vogel ein taktfeſter Sänger.

Herrn Joſ. Porzelt. Füttern Sie Ihre grünen Kardinäle mit Hafer, Mohn, Kanarienſamen, zu gleichen Theilen vermiſcht, dazu geben Sie ein Stückchen hart gekochtes Ei und zwei bis vier Mehlwürmer täglich. Zur Abwechſlung bieten Sie in kleinſten Gaben Hanf und Sonnenblumenſamen, viel Grünkraut (Tradescantia oder Doldenrieſche, Vogelmiere, Salatkraut), ſüße Frucht (Aepfel, Birnen, Weintrauben) u. a. und hin und wieder auch nur wenig Eierbrot. Auch allerlei Kerbthiere ſind zur Erhaltung durchaus nothwendig. Eine Verfettung iſt bei dieſer Fütterung nicht zu befürchten.

Herrn Rheinberger: 1. Zum glücklichen Ueberſtehen der Mauſer bedarf der Bülbül ein ſehr reichhaltiges, mannigfaltiges Futter. Den Hauptbeſtandtheil bilden Früchte, trockene Korinten, angequellte Roſinen, Bananen, Datteln, zerſchnittene Kirſchen, Feigen, Birnen, oder was ſonſt die Jahreszeit mit ſich bringt; im Spätſommer und Herbſt vornehmlich Hollunder- und Vogelberen und den ganzen Winter hindurch fein zerſchnittenen Apfel. Das von Ihnen gereichte Kruel'ſche Singfutter iſt gut, nur dürften Sie noch einige friſche oder getrocknete Ameiſenpuppen, ſowie einige Mehlwürmer hinzufügen. Zur Zeit der Mauſer muß im Futter noch mehr Abwechſelung geboten werden; reichen Sie noch geſchabtes, mageres, rohes Fleiſch und miſchen Sie in das Miſchfutter fein gehacktes Ei hinein oder geben noch erweichtes Bisquit. 2. Sie ſagen, in Dr. Ruß Werk finden Sie über den Bülbül nur wenig geſagt. Welches ſeiner Werke beſitzen Sie denn? Das Handbuch (I. Fremdländiſche Stubenvögel) oder ſein großes vierbändiges Werk „Die fremdländiſchen Stubenvögel“. Mögen Sie nun dieſes oder jenes Werk beſitzen, geleſen mit Aufmerkſamkeit haben Sie weder in dem einen noch in dem andern. Das geht ſchon allein daraus hervor, daß die von Ihnen angegebene Fütterung des Bülbüls nicht mit der von Dr. Ruß empfohlenen übereinſtimmt. Wenn Sie ſich nicht die Mühe und Zeit nehmen wollen, aufmerkſam jeden Abſchnitt in den genannten Werken zu leſen, z. B. ein Handbuch über die Ernährung und Verpflegung, dann müſſen Sie aber auch nicht behaupten, daß in denſelben über dies und jenes nicht genügend Auskunft ertheilt iſt. In den „Fremdländiſchen Stubenvögeln“ ſind in Heft 6 und 7 des zweiten Bandes die Bülbüls auf nahezu 40 Seiten ausführlich behandelt, und zwar ſowol inbezug auf ihr Freileben, als auf ihre Haltung in der Gefangenſchaft. Zu dem Handbuch finden Sie ebenfalls genaue Angaben, über Fütterung im Beſonderen auf Seite 416.

Herrn W. Saß, Varzin: Der in Ihrem Beſitz befindliche Vogel iſt eine Rothdroſſel oder Weindroſſel (Turdus iliacus). Gewöhnen Sie den Vogel an ein Univerſalfutter, verſorgen ihn mit Ebereſchen-, Flieder- u. a. Beren und geben ihm je nach Ernährungszuſtand 8 bis 10 Mehlwürmer täglich. Als Zugabe reichen Sie Ameiſenpuppen, Schaben u. a. und etwas gehacktes gekochtes Fleiſch; im Sommer darf es ihm an allerlei Kerbthieren, beſonders Maikäfern, Engerlingen, Schmetterlingen, nackten Raupen, Fliegen, Maden, Schnecken, Regenwürmern u. a. nicht fehlen.

Briefwechſel

Fräulein Stehle und **Frau Elſe Mittag**: Beſten Dank für Ihre Beiträge.

Herrn F. Sauerland: Ihre Wünſche werden wir gern berückſichtigen.

Zu unſerm Bilde.

Der bekannteſte unter den kleineren Edelpapageien iſt **Müller's Edelpapagei** (Psittacus Mülleri, *Temm.*). Von unſcheinbarem Aeußern, überaus geringer Beweglichkeit und ſtillem Weſen, vermag er den Liebhaber nicht zu feſſeln und erfreut ſich daher keiner großen Beliebtheit. Selbſt in der Freiheit, auf Celebes, den Sangir- und Suluinſeln und Buru, wo er heimiſch iſt, zeigt er ſich ſtill und geräuſchlos, möglichſt immer im Waldesdunkel, in den Kronen der Bäume verſteckt und ſelbſt freiſitzend in ſeiner Regungsloſigkeit ſchwer zu entdecken; er hat daher Beobachtern wenig Gelegenheit zur Erforſchung geboten. Meiſtens wird er nur einzeln oder parweiſe getroffen. Sein Brutgeſchäft iſt unbekannt; als Neſter ſollen Höhlungen in ſchroffen, unerſteiglichen Klippen benutzt werden.

Müller's Edelpapagei iſt grasgrün, der Kopf iſt rein und lebhaft grün; Hinterhals und Mantel gelblicholivengrün; Mittel-, Unterrücken und Bürzel meerblau; obere Schwanzdecken gelblichgrasgrün; Innenfahne der Schwingen ſchwärzlich, Außenfahne grün, fein gelb geſäumt; Deckfedern ebenſo; kleine Deckfedern am Flügelbug und oberſte Schulterdecken breit blau gerandet; Schwanzfedern oberſeits grasgrün, gelblich geſäumt, unterſeits olivengrünlichgelb; ganze Unterſeite olivengrünlichgelb; Schnabel korall- bis zinnoberroth; Auge blaßgelb bis braun; Füße graugelb, Krallen ſchwärzlich. Das Weibchen ſoll übereinſtimmend ſein und ſich nur durch das dunkle Auge unterſcheiden. Das Jugendkleid iſt reiner grün; Schnabel weiß. — Bis zur neueſten Zeit hat man zwei Spielarten unterſchieden; den rothſchnäbligen und den weißſchnäbligen Müller's Edelpapagei; ſpäter iſt erforſcht worden, daß der weißſchnäblige Vogel nur der jüngere iſt.

Als Käfigvogel wird er, aus obengenannten Gründen, ſelten und dann faſt immer einzeln gehalten. Ueber den Grad ſeiner Befähigung als Sprecher liegen noch keine Mittheilungen vor. Dagegen iſt wenigſtens ein Beiſpiel von großer Ausdauer vorhanden, denn ein Müller's Edelpapagei in Halberſtadt erreichte das Alter von 85 Jahren. — Hinſichtlich der Verpflegung verurſacht er bedingungsweiſe Schwierigkeiten, denn bei der Einführung iſt er gewöhnlich nur an geſottenen Reis, Bananen u. a. weiche Früchte gewöhnt; man thut gut daran, ſie baldigſt, doch natürlich allmählich, an Kanarienſamen, Hafer, etwas Hanf- und Sonnenblumenſamen, auch rohen ungehülſten Reis und gute Frucht (am beſten nur Kirſche, Birne oder Apfel), nebſt Zugabe von etwas in Waſſer aufgeweichtem Eierbrot oder auch trocknem Biskuit zu gewöhnen; Vogelberen werden gern genommen und ſind zuträglich. Zweige zum Benagen dürfen nicht fehlen, und beſonders lieben ſie junge Fichtenſchößlinge. Kann man Maiskolben friſch aus dem Garten, wenn möglich mit noch in Milch ſtehenden Körnern erlangen, ſo iſt die Eingewöhnung nicht ſchwer. D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer, **Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,** alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [2122]

Wellenſittiche,

Par 4 ℳ. [2123]
L. Brinkmann,
Calefeld in Hannover.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [2124]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Kanarien.

Von meinem ſehr tiefgehenden tourenreichen Hohlrollerſtamm m. g. Knorren, Klingeln, tiefen Pfeifen ꝛc. verſende unter Garantie des Werthes à 10—50 ℳ. Weibchen desſelben Stammes 2 ℳ. Für Wiederverkäufer ſehr empfehlenswerth, d. Dtz. Hähne 72 bis 96 ℳ.
Parade, Rentier,
[2125] **Hannover,** Aſternſtraße.

NB. Meine Verkaufsvögel erhielten nachweislich 1898 u. 99 goldene und ſilberne Medaillen.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei. Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft. Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [2126]

Geſunde Stiglitze

à 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, **Rothhänflinge** à 1 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, **Zeiſige u. Buchfinken** à 90 ₰, Dtzd. 7,50 ℳ, **Grünhänflinge u. Tannenmeiſen,** à 70 ₰, Dtzd. 6 ℳ, Weibchen die Hälfte. Garantie lebender Ankunft. [2127]
Gebr. Mergler, Vogelexport,
Hoffstetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Halt!

Die **Vogelzüchterei** von [2128]
L. G. Müller, Nordhauſen a. Harz
verſendet **koſtenfrei** die Preisliſte, ſowie hochfeine Anerkennungen über gutgelieferte
ff. Harzer Kanarienvögel.
Letztere verſ. 14 Tage auf Probe überallhin.

Prachtv. ſelbſtgez. zuchtfhg. Jap. Mövchen, à 1,50 tauſche auch geg. andere Exoten. [2129]
Breuel, Leipzig-R., Comeniusſtr. 1,II.

Kanarienhähne

meines mit Ehrenpr., Gold. u. ſilb. Med. präm. Hohlrollerſt. von 8 bis 25 ℳ. Probe u. Garant.
Th. Börner,
[2130] **Kaſſel,** Gartenſtr. 8 I.

Blaudroſſel,

Frühjahrs-Wildfg., prachtvoll im Gefied. u. Geſang, **Sproſſer,** ebenſo tadellos im Gefied. u. Geſang, à 15 ℳ. [2131]
M. Zierer, München, Parkſtr. 31, I.

Keine Todeskandidaten!

Verk. 1,1 Stiglitze, 2,1 Hänflinge, 1,1 Baſtarde (Stiglitz u. Kanarien), alle von Kanarien aufgezogen, zuſammen oder einzeln zu annehmbarem Preis. [2132]
W. Landt, Elmshorn.

Verkaufe 1 blutsfremd. tadellos. Zuchtpar Singſittiche für 30 ℳ. [2133]
Goldbeck, Predig., Liebſtadt, Oſtpr.

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländiſchen und ausländiſchen körner- und inſektenfreſſende Vögel, in allerfeinſter, ſtets friſcher Ware, beſonders **Ameiſeneier,** handverleſene ganz reine, **Eintagsfliegen** (Weißwurm), **Muska oder Zeke** (überſeeiſche Fliege), **Mehlwürmer** und **Univerſalfutter-Miſchungen** verſendet zu billigen Preiſen [2134]
H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung,
Erfurt, Futterſtraße 5.
Preisliſte auf Wunſch umſonſt und portofrei.

Ich habe noch einige ſehr ſchöne **Eierſammlungen,** à 300 St. in 80 Gel., einſ. gebohrt, für 20 ℳ incl. Verp. à Samml. abzug. **H. Hintze,** Neuwarp i. P. [2135

F. Rejsek,

Hamburg, Peterſtraße 28.



Spezialität:

Alle Arten Papageien u. Papageienkäfige.

Offerirt junge ſchön befiederte, recht geſunde **Blauſtirn-Amazonen** (Rothbug), noch nichts ſprechend, à Stück nur 15 ℳ, ſolche anfangend zu ſprechen, Stück 18—20 ℳ, ſolche ſchon gut ſprechend, von 25 ℳ aufwärts, je nach Leiſtung. Schöne junge **Grau-Papageien** (Jakos), beſte Qualität, jetzt 5 Wochen hier, nur 15 ℳ, ſolche ſchon 1/4 Jahr hier, nur 20 ℳ, ſolche 3/4 Jahr hier, 35—40 ℳ, ſolche viel ſprechend 60, 80, 100, 150 ℳ, je nach Leiſtung, **weiße Kakadus,** 12, 15, 20 ℳ, **Inkakakadus** in Pracht, 35 ℳ, **große Alexander-Edelſittiche,** Stück 12 ℳ, Männchen 15 ℳ, **Tigerfinken,** Par 1,50 ℳ. Ganz zahme **Affen** der ſchönſten Arten, Stück 15, 20, 25 ℳ. **Papageienkäfige** in jeder Größe und Facon, Stück ſchon von 3,50 ℳ an. Verſandt gegen Nachnahme, lebende geſunde Ankunft garantirt. [2136]

Neu eingetroffen! [2137]

180 prachtvolle junge Graupapageien, Chineſiſche Nachtigalen, Hochrothe Tigerfinken.

August Fockelmann
Thierhandlung
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtraße 72.

In unserem Verlage erschien und ist durch alle Buchhandlungen oder gegen frankirte Einsendung des Betrages direkt von der Verlagsbuchhandlung zu beziehen:

Die gefiederten Sängerfürsten
des europäischen Festlandes

von

Mathias Rausch, Wien.

Mit 3 Farbendrucktafeln und 4 Textabbildungen.

Geheftet 2,— Mk., gebunden 2,60 Mk.

Der Verfasser, welcher durch seine Aufsätze in der „Gefiederten Welt" in ausserordentlich weiten Kreisen bekannt geworden, gibt in diesem Buche ausser einer verlässlichen Anleitung über Käfigung, Wartung und Pflege der einheimischen Weichfutterfresser auch eine ausführliche Darstellung ihres Gesanges, sodass dasselbe für jeden Liebhaber unserer gefiederten Sänger ein unentbehrlicher Rathgeber sein wird.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (Max Kretschmann).
Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 47.

Warum züchten Sie mit Vorliebe Miſchlinge?
Der Kukuk.
Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang (Fortſ.).
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Berichtigung.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der
Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Vom Besten das Beste!

Mehlwürmer, rein vegetar. gefütt., Ltr. 4,50 ℳ **Neue Ameiſeneier!** Hochf., geſiebte, ſandfr., goldgelbe Ware, Ko. 3 ℳ, 5 Ko. 13,50 ℳ. **Prima Elbe-Weißwurm,** Ko. 3 ℳ, Lt. 85 ₰. **Tyroler Ameiſeneier,** hochfein, weiß u. rein, handgeleſen, Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ, 1 Ko. 4,50 ℳ. **Zeke (Muſca),** Ia. feinſte, fr. Ware, à Ko. 2,60 ℳ, 5 Ko. 12,50 ℳ. Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahr. ſelbſt erprobt, Ko. 1,80, 5 Ko. 8,50 ℳ, ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- u. Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ, ſolide Bedienung. Verſuch lohnt. [2138]

Brühl's Vogelerporthaus, Kötzſchenbroda.

Für Händler

des In- und Auslandes, **Graupapageien** („Jakos") vollſtändig eingewöhnte abgehärtete Vögel, anfangend zu ſprechen, etwas ſprechend und ſehr gut ſprechend, ſowie liederſingende, auch alle Arten Amazonen verſende unter voller Garantie zu den denkbar ſolideſten Preiſen bekannter ſtrengſter Reellität. Nichtkonvenirendes wird gern umgetauſcht.

Prima Edelroller,

Hohl- und **Knorrvögel,** tourenreich, rein, zart u. langgehend (ohne alle ſcharfe Sachen), volles metallreiches Organ, Dtzd. 60, 72 u. 84 ℳ, einzelne Probevögel, 6, 7 u. 8 ℳ, prima Stammweibchen, Dtzd. 12 ℳ, keine Uebervortheilung, nur reelle Bedienung. [2139]

Georg Brühl, Voglerporth., Kötzſchenbroda.

Die größte Erfindung auf dem Gebiete der Vogelliebhaberei im neunzehnten Jahrhundert iſt der **Waſſerbehälter „Nonpareil".**

Derſelbe erweiſt beim Gebrauch folgende Vortheile:

Kein Waſſerſpritzen, keine Waſſerverſchwendung, kein Waſſerdunſt außerhalb der Behälter und doch können die Vögel nach Belieben trinken und baden.

Der Waſſerbehälter iſt von vielen bedeutenden Vogelliebhabern empfohlen, ſowie auch vom „Verein für Vogelfreunde" in Skandinavien.

Ueber 30 Ehrenprämien und ſilberne Medaillen ꝛc. zuerkannt. Behälter Nr. 1 koſtet 4 ℳ, Nr. 2 5 ℳ, Nr. 3 6 ℳ, Nr. 4 7 ℳ, Nr. 5 10 ℳ.

Der Waſſerbehälter „Nonpareil"

iſt mit einem ſehr praktiſchen Fangapparat verſehen, in welchem die Vögel ſehr leicht zu fangen ſind, ohne daß die übrigen Vögel dabei geſtört werden.

Der Waſſerbehälter „Nonpareil" wird überall nach dem In- und Ausland verſandt.

Nur erhältlich bei dem Erfinder

Anton Kristensen & Co., Metallwaarenfabrik,
[2142] **Kleitrup b. Hobro, Jütland, Dänemark.**

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



Fängisch gestellt.   Zugeschlagen.

ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1.50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [2143]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Käfige und Geräthſchaften.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [2140]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

☞ **Für alle Arten Vögel** fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [2144]

Geflügel-Fußringe

für Hühner 3, 5 u. 6 ₰, für Tauben und Kanarien, kleine u. große Exoten, 2, 3 u. 4 ₰.
[2141] **H. D. Becker,** Iſerlohn.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [2145]

☞ Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei! ☜

August Hermann Leiter, Oschatz i. S.

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [2146]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze

à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [2147]



Käfige jeder Art

(Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth

Arthur Herrmann & Cie.,
[2148] Oſchatz i. S.

---

50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.

☞ **Knochenmühlen** ☜

für Hühnerzüchter p. St. 40 ℳ frei. **Behm & Steinhardt,**
[2149] Waren i. Mecklenb.

▬ Proſpekte gratis. ▬

[illegible]

[illegible]

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2825).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Begründet von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Beſtellungen
in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 47. Magdeburg, den 23. November 1899. XXVIII. Jahrg.

Warum züchten Sie mit Vorliebe Miſchlinge?

Von W. Stehle.

(Nachdruck verboten.)

Dieſe Frage wird ſehr oft an mich gerichtet, und mit Recht; denn es iſt eine große Liebhaberei von mir, ſolche Miſchlinge zu züchten, und die Fragenden dürfen wol erwarten, daß dieſe Vorliebe ihre Gründe haben werde. Da nun in Nr. 40 der „Gefiederten Welt“ die Miſchlinge vom Ceresaſtrild M. und Zebrafink W. beſchrieben und zugleich (in einer brieflichen Mittheilung) die Miſchlinge vom Gürtelfink M. und weißen Mövchen erwähnt ſind, ſo will ich im Anſchluß daran jene Frage hier beantworten. —

Man lieſt in den Zeitungen und ſonſt ſo viel über Vererbung; aber immer ſind es nur die ſchlechten Eigenſchaften z. B. eines Menſchen, welche dann erwähnt werden. Um nun zu ſehen, ob auch beim Thier, und zwar in welchem Grade, ſich dieſe Vererbungserſcheinungen zeigen, züchte ich mit Vorliebe Miſchlinge, und ich kann nur ſagen, die Miſchlingszüchtung bietet ſehr intereſſante Vorgänge. Kein anderes Thier eignet ſich jedoch beſſer dazu als der Vogel; Gefieder, Geſang und Liebesſpiele ſind ja bei jedem Vogel verſchieden, und es iſt alſo mit leichter Mühe feſtzuſtellen, wie ſich in jedem beſonderen Falle die verſchiedenen Eigenarten vererbt haben. In Nr. 40 der „Gefiederten Welt“ iſt dank der Leitung derſelben der Miſchling von Ceresaſtrild M. und Zebrafink W. ſehr gut beſchrieben, wollte man aber glauben, der Vogel ſei beim Verlaſſen des Neſtes ſchon von der Färbung des zur Beſchreibung überſandten Exemplars, ſo wäre das ein großer Irrthum. Dieſes iſt durchaus nicht der Fall; ſondern ebenſo wenig wie der junge Ceresaſtrild oder Zebrafink gleich den Alten ähnlich iſt, ebenſo wenig iſt dieſes bei den jungen Miſchlingen der Fall, wenn auch ſchon das Jugendgefieder die beiden Stammeltern verräth. So finden ſich bei den jungen Vögeln bereits die weißen Punkte des Ceresaſtrild auf dem Flügel angedeutet, wogegen die ſonſtige Färbung die des Zebrafink iſt; der Kopf hat allerdings nicht die dem Zebrafink eigene Zeichnung. Erſt nach und nach mit dem Wechſel des Gefieders kommt Färbung und Zeichnung zuſtande. Eine eigene Art iſt es mit dem Geſang. Hört man die Jungen im Neſt um Futter betteln, ſo glaubt man junge Zebrafinken zu vernehmen; ſind ſie aber erſt ſelbſtſtändig, ſo laſſen ſie den kleinen, leiſen Geſang des Ceresaſtrild mit dem des Zebrafink vermiſcht ertönen, wodurch ein ganz eigenartiger Geſang entſteht. Noch etwas anderes an dieſen Miſchlingen iſt ſehr intereſſant. Ich beſitze noch 5 Stück ausgefärbte Männchen; 2 Stück habe ich an den Berliner zoologiſchen Garten abgegeben; einige ſind verkauft, andere zwecks Kenntnißnahme ſo abgegeben. Aber alle dieſe waren ſowohl im Jugendgefieder, als auch ſpäter, vollſtändig ausgefärbt, einander gleich gezeichnet, von ganz kleinen Abweichungen abgeſehen. Alle ſangen in gleicher Art und Weiſe. Alle waren Männchen; zwiſchen all den jungen Vögeln war, der Zeichnung nach zu urtheilen, nur ein einziges Weibchen, und dieſes iſt beim Federwechſel leider geſtorben. Ich hätte dieſe Miſchlingszüchtung längſt aufgegeben, wenn ich Weibchen davon hätte; und nur in der tröſtlichen Hoffnung, daß endlich doch welche kommen müſſen, wird ſie noch fortgeſetzt. Ich weiß zwar ſeit lange, daß ich im Züchten von Männchen ſehr glücklich bin (davon ein andermal), aber ſolche Verhältniſſe wie bei den Ceresaſtrild-Zebrafink-Miſchlingen ſind mir doch noch nicht vorgekommen. Die Vögel ſind innerhalb eines Jahres flügge geworden, im Alter alſo ganz verſchieden; durch ihre Aehnlichkeit iſt man aber verſucht zu glauben, daß man eine andere Art Zebrafinken vor ſich habe. Da nun die älteſten von dieſen Miſchlingen bereits im fortpflanzungsfähigen Alter ſtehen, ſo habe ich auch Gelegenheit, das Liebesſpiel zu beobachten. Hier iſt nun bei dem einen das Liebeswerben wie beim Ceresaſtrild ſo, daß er mit einem Halm im Schnabel ſich aufrichtet und hüpft, aber auf derſelben Stelle bleibt, während beim andern das ſtürmiſche Jagen wie beim Zebrafink ſtattfindet.

Die Miſchlinge vom Gürtelfink M. (Spermestes cincta, *Gld.*) und weißen Mövchen ſind nun in Allem ganz anders. Veränderungen im Gefieder kommen bei dieſen nicht vor, ſondern wie die Vögel das Neſt verlaſſen, ſo bleiben ſie, nur daß die Farben etwas dunkler werden. Der Geſang iſt dem des Mövchen am ähnlichſten, nur viel lauter; die ſo luſtig klingenden Flötentöne des Gürtelfinken ſind nicht da, oder beſſer, ſie ſind ſo in den Mövchengeſang hineingemiſcht, daß ſie ganz anders klingen. Von beiden Arten Miſchlingen ſind ſchon wieder Neſtlinge da, von der erſten Art drei Stück, von der andern zwei Stück. Wie die erſteren ausfallen, weiß ich, aber nicht wie die der zweiten Art ausſehen werden. Die Miſchlinge vom Mövchen fallen nämlich ſtets verſchieden aus, was ich Gelegenheit hatte bei einer früheren Zucht von Gürtelfink und ſchwarzbuntem Mövchen zu beobachten. Aber das iſt ja gerade das Intereſſante dabei, man weiß nicht, was man bekommt. Ich werde darum ſeiner Zeit Veranlaſſung nehmen mitzutheilen, wie dieſe beiden Neſtjungen ausſehen.*)

Nach dieſen Angaben wird man mir wol recht geben, wenn ich behaupte, die Miſchlingszüchtung iſt eine ſehr intereſſante Sache. Und wenn ich als Laie ſchon ſo viel Freude daran habe, wie viel mehr muß ſolche erſt einem Fachgelehrten daraus erwachſen, der all die vielen Beſonderheiten ihrer Herkunft und ihrem Urſprunge nach zu würdigen verſteht. Natürlich — das möchte ich noch bemerken — kann man nicht jeden Vogel irgend einer Art mit dem irgend einer anderen Art in Miſchlingszuchten paren. Die Vögel, welche ich zur Miſchlingszucht benutze, ſind von mir gezüchtete Vögel und werden ſchon früh aneinander gewöhnt: das iſt alles, was ich zum Gelingen der Miſchlingszucht thue.

---

*) Wir bitten ſehr darum. D. L.

Der Kukuk.

Von A. Reuter.

(Nachdruck verboten.)

Einem Naturforſcher oder Jäger gegenüber dürfte ich wol kaum wagen, über den Kukuk noch Neues berichten zu wollen, doch gibt es unter der großen Zahl von Vogelfreunden gewiß noch manche, die, ich möchte faſt ſagen, noch keine Luſt empfunden oder Gelegenheit gehabt haben, dieſen Vogel genauer zu beobachten, und für dieſe will ich meine Erfahrungen gern mittheilen.

Der Kukuk iſt ein ſehr ſcheuer und mißtrauiſcher Vogel; er iſt nicht leicht anzuſchleichen. Am allerbeſten kann man ihn und ſein Treiben beobachten, wenn man ſich an eine Stelle im Walde begibt, die überwiegend von Laubholzbeſtand mit Gebüſch und niederem Geſträuch bewachſen iſt, um einige Deckung zu haben, denn er äugt ſehr ſcharf und muſtert ſeine Umgebung aufs Genaueſte. Wähnt er ſich ſicher, ſo läßt er alsbald ſein „kukuk, kukuk“ viele Male hintereinander hören; ſehr oft auch, beſonders wenn er abſtreicht, einen dreiſilbigen Ruf, welcher ungefähr in den Silben „hukukuk“ ausgedrückt werden kann. Dieſer Ruf liegt um einige Töne höher als der erſtere, und er ſtößt ihn viel ſchneller hintereinander hervor. Erblickt der Vogel nun beim Abſtreichen ſeinen Beobachter, ſo flüchtet er nicht, wie man es erwarten ſollte, auf die entgegengeſetzte Seite, ſondern fliegt, wenn man unbeweglich ſtehen bleibt, oft in unbedeutender Entfernung an uns vorbei, ſodaß wir ihn ganz genau ſehen können, oder er fliegt über die Wipfel der Bäume, unter denen wir ſtehen, hinweg und läßt dabei ein in ſich hinein gurgelndes, dreimal hintereinander folgendes „whau, whau, whau“ vernehmen, womit er, wie mir ſcheint, ſeiner Verwunderung oder ſeinem Erſchrecken über die Störung Ausdruck verleiht, und gleich darauf kommt das in höherer Tonlage dreimalige hukukuk, als wollte er damit ſagen: kriegſt mich nicht.

Während ſeines Parungsrufes ſcheint er taub zu ſein, und man iſt imſtande, einige Schritte zu machen, ohne bemerkt zu werden, gleichwie beim Auerhahn, wenn er balzt, jedoch ein unbedachter Schritt, der das Kniſtern des dürren Laubes oder Reiſigs veranlaßt, gibt ihm das Bewußtſein wieder und treibt ihn zum ſofortigen Verlaſſen ſeiner Poſition.

Es gibt indeſſen auch ſeltene Zufälle, wo man auf ganz ungewöhnliche Weiſe an ihn herankommt. Ich ſah z. B. im April 1887 im Donaumoſe*) auf einer Telegraphenleitung zwei Kukuke nebeneinander ſitzen. Ich traute meinen Augen kaum, denn ſie hielten mich bis auf etwa 15 Schritt aus. Ich blieb dann ſtehen und beobachtete ſie eine Weile. Bemerkenswerth iſt noch, daß weit und breit kein Baum oder Strauch war; ſie mußten mich alſo unbedingt haben kommen ſehen. Endlich erhob ſich einer der Vögel, aber nicht um wegzufliegen, wie ich anfangs dachte, ſondern er ließ ſich ganz gemüthlich auf den Boden herab, nahm etwas auf, wie mir's ſchien einen Käfer, und kehrte alsbald wieder auf ſeinen Sitz zurück. Ich hätte beide mit leichter Mühe ſchießen können, doch ich bin kein Freund von ſolchen Thaten. Ich ließ alſo die beiden Reiſekameraden ungeſtört und ging, nachdem ich mich an ihrem Anblick und über ihre ſtoiſche Ruhe gefreut hatte, weiter.

---

*) Eine früher morige Landſtrecke auf dem rechten Donauufer zwiſchen Neuburg und Ingolſtadt. D. L.

des Kukuks willen ſicher nicht zurückbleiben, ſondern den alſo Gefangenen ſeinem Schickſal überlaſſen. Womit wollten ſie ihn auch füttern? Im Uebrigen glaube ich, daß es den Meiſen und anderen ſchließlich auch zu lange währen würde, den gefräßigen Kukuk zu füttern, ſie würden ihn gewiß auch im Stich laſſen.

Ein Kukuk wuchs mir ohne eigene Mühe auf. Er wurde mir von einem Dorngrasmückenpar nebſt eigenen vier Jungen im Käfig aufgefüttert. Die Vögel verbrauchten eine Unmaſſe Futter. In der Hauptſache beſtand es aus friſchen Ameiſenpuppen, außerdem aus rohem Rindfleiſch, in Milch erweichter Semmel, Hühnerei und Quargkäſe. Später reichte ich Rindsleber, Rinderherz und Kaninchenfleiſch ſammt den Haren, behufs der Gewöllbildung. Gequetſchter Hanfſamen iſt zu gleichem Zweck auch ſehr dienlich. Ich miſchte ihn mit geriebener Morrübe und Semmel zu gleichen Theilen und mengte das klein zerſchnittene Fleiſch darunter, wobei ſich dann der Hanf und die Gelbrübe an erſteres feſtſetzten und mit verſchluckt wurden.

Ueber die Ausdauer des Kukuks in der Gefangenſchaft habe ich kein ſicheres Urtheil, da ich alle meine Vögel dieſer Art „in der Blüthe ihres Lebens“ abgab. Den vorher erwähnten intelligenten beſaß ich etwas länger als zwei Jahre, ehe ich ihn dann auch fortgab. Bei gutem Futter und ſorgfältiger Pflege ſind ſie leicht zu erhalten. Die Mauſerzeit iſt aber die ſchlimmſte, beſonders da man dann ſelten mehr friſche Ameiſenpuppen haben kann. Man gebe dem Kukuk als Erſatz dafür gebrühte, dann etwa 100 bis 150 Mehlwürmer über Tag, gutes, rohes Rindfleiſch und Hühnerei, auch in Milch geweichte Semmel oder Eierbrot. Wenn er die erſte Mauſer hinter ſich hat, ſo iſt er weniger empfindlich, doch beanſprucht er jederzeit ein kräftiges, gutes Futter, andernfalls geht er leicht ein.

Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang.

Von R. Groſſe.

(Fortſetzung).

(Nachdruck verboten.)

Die vorbeſchriebenen Störungen fallen in der Einzelhecke ganz weg, in der Bauer- und Flughecke dagegen ſind ſie recht häufig. Sie haben aber trotz aller Unannehmlichkeit doch noch immer den Vortheil für ſich, daß der Züchter ihnen abzuhelfen vermag. Anderen unangenehmen Zwiſchenfällen dagegen ſtehen wir macht- und rathlos gegenüber.

Zu dieſen gehören z. B. klare Gelege, die ich ſchon vorher kurz erwähnte. Unbefruchtete Eier ſind in der Kanarienhecke etwas Gewöhnliches, und wir finden ſie in allen Züchtereien zahlreich. Schon lange Zeit ſucht man nach einem haltbaren Grund für dieſe Erſcheinung, ohne bisher Abhülfe haben ſchaffen zu können. Wenn wir die Bildung des Eies und den Vorgang der Befruchtung, welche ich beide vorher ausführlich klargelegt habe, einer Betrachtung unterziehen, ſo müſſen wir zu dem Ergebniß kommen, daß für die Befruchtung des Eies zwei Umſtände unbedingt erforderlich ſind: erſtens muß der männliche Same das vom Eierſtock abgelöſte weibliche Ei möglichſt weit oben im Eileiter erreichen, bevor es von anderen Beſtandtheilen umgeben wird, und zweitens muß wiederum das Ei des Weibchens ſich rechtzeitig vom Eierſtock loslöſen, damit nicht die männlichen Samenzellen vorher ihre Befruchtungskraft verlieren. Es gilt als Züchtergrundſatz, wenigſtens haben ältere, erfahrene Züchter einen ſolchen ſich geſtellt, zur Zucht immer mindeſtens ein Drittel alte Weibchen zu verwenden, was entſchieden zu billigen iſt.

Dieſes Verfahren iſt nicht etwa allein deshalb zu empfehlen, weil ältere, gutbrütende und ebenſo -fütternde Weibchen dieſe vortheilhaften Eigenſchaften auch für ſpätere Jahre beibehalten werden, ſondern ich halte daſſelbe, obgleich dieſe guten Anlagen auch viel für ſich haben, hauptſächlich aus dem Grunde für empfehlenswerth, weil bei den Weibchen, die das Alter von einem Jahr überſchritten haben, der Eierſtock ausgebildet iſt; er ſchrumpft zwar nach Beendigung der Fortpflanzungszeit zuſammen, verliert jedoch ſeine Fruchtbarkeit nicht und iſt bei Beginn der folgenden Brutzeit wieder voll entwickelt. Wenn nun ſolche Weibchen mit geſunden und leiſtungsfähigen Hähnen erſter und zweiter Brut gepart werden, ſo iſt die Ausſicht auf Erfolg ohne Zweifel größer, als es bei jungen Weibchen der Fall iſt, deren Eierſtock vielleicht noch nicht genügend in der Entwicklung vorgeſchritten iſt.

Ein Beweis dafür ſcheint mir auch der Umſtand zu ſein, daß klare Gelege meiſtentheils oder wenigſtens vorwiegend in der erſten Brut vorkommen, weil zu dieſer Zeit jedenfalls die Eier vorwiegend bei jungen Hennen ihre Bildungsſtelle zu ſpät verlaſſen und von fruchtbaren Samenzellen nicht mehr erreicht werden. Wenn mir entgegnet wird, daß auch junge Weibchen aus der letzten Brut mit Erfolg gebrütet haben, ſo beweiſt dieſer Umſtand noch lange nicht die Unrichtigkeit der aufgeſtellten Behauptung. Es können auch ſolche Fälle eintreten, die wir dann als Erfolge gleichwerthiger Leiſtungen beider Vögel, des Hahnes und der Henne, anzuſehen haben.

Jedenfalls aber müſſen für alle Züchter derartige Betrachtungen, die auf Grund der beſtehenden naturgemäßen Vorgänge in der Entwicklung und Beſchaffenheit des Vogelkörpers angeſtellt werden, werthvoll ſein, und ſie ſollten zu entſprechenden Verſuchen Veranlaſſung geben. Sie klingen auch wahrſcheinlich, wenn wir die Behauptung maßgebender Naturforſcher berückſichtigen, daß der Vogel erſt in dem Alter von einem Jahr fortpflanzungsfähig wird. Jedenfalls iſt im Hinblick hierauf das Alter der Heckvögel von großem Werth. Wenn mit alten Weibchen und jungen Hähnen minderwerthige Erfolge erzielt worden ſind, ſo können hieran auch die vielleicht zu jungen Hähne ſchuld ſein, deren Zeugungswerkzeuge zur Zeit der beginnenden Hecke noch nicht genügend ausgebildet waren. Der befruchtende Samenkern erreichte das Ei im Eileiter erſt dann, wenn es bereits mit einer Eiweißſchicht umgeben war.

Die anderen Urſachen, die für klare Gelege angeführt werden, als Abneigung der Hennen gegen die Begattung, Ungleichheit der Begattungswerkzeuge, erſcheinen zweifelhaft, denn eine derartige Abneigung bei geſunden Vögeln iſt widernatürlich, ſie kann nur bei kranken beſtehen. Die Körperbeſchaffenheit aber bei Vögeln gleichen Stammes und ſelbſt gleicher Art iſt nicht ſo verſchiedenartig, daß eine Begattung unmöglich wäre. Selbſt der Fall erſcheint mir fraglich, daß ein Hahn gegen manches Weibchen eine Abneigung haben ſollte und umgekehrt, und daß aus dieſer Veranlaſſung eine Parung unterbliebe. Der wahre Grund für unbefruchtete Eier dürfte wol ausſchließlich in den erwähnten Umſtänden zu ſuchen ſein.

Unangenehm wird weiter der Züchter dadurch berührt, wenn die Kanarieneier zwar befruchtet ſind, aber die jungen Vögel nicht auskommen, die Frucht alſo vorzeitig abſtirbt. Auch dieſe Widerwärtigkeiten treten in der Kanarienzucht wiederholt auf. Wenn der Züchter auch nicht vermag, ſeine Heckvögel auf ihre Zeugungsfähigkeit zu prüfen, ſo iſt es für ihn doch ungleich leichter, durch richtige Behandlung der Zuchtthiere und durch Aufmerkſamkeit während des Verlaufs der Hecke dem Abſterben des Embryo im Ei vielfach vorzubeugen. Wir haben bei der Beſprechung der Bildung des jungen Vogels im Ei erfahren, daß die bis zur Vollendung der Frucht fortgeſetzte Zellen-Umbildung nur dann möglich iſt, wenn alle hierzu erforderlichen Stoffe ſowol im Bildungs- als auch im Nahrungsdotter, alſo ſchon im Urſprungsei, vorhanden ſind. Dieſes iſt aber nur dann der Fall, wenn den Heckvögeln in der Zeit vor Beginn des Fortpflanzungsgeſchäfts dieſe Stoffe hinreichend zugeführt werden. Zur Bildung des Thierkörpers gehören vorwiegend Eiweißſtoffe (Proteinſtoffe), denn die Zelle, welche durch Umbildungen und Vergrößerungen ſchließlich den Körper aufbaut, entſteht, indem aus eiweißartiger Flüſſigkeit des Thierkörpers ſich zuerſt der Zellkern ausſcheidet und nachher ſich mit einer Haut umgibt. Ein Vogel, dem die Gelegenheit vorenthalten wird, dieſe Eiweißſtoffe im Futter (Pflanzeneiweiß) aufzunehmen, der ſich während des Winters nur nothdürftig zu ernähren vermag, kann unmöglich zur Zeit der Fortpflanzung hinreichend mit dieſen werthvollen Beſtandtheilen ausgeſtattet ſein, er wird wol zur Fortzucht neigen, weil ihn beſſere Fütterungsweiſe und behagliche Wärme im Heckraum hierzu veranlaſſen. Das Weibchen wird auch bauen und befruchtete Eier legen und brüten, aber in vielen, ſogar ſehr vielen Fällen, wird die Frucht nicht zur Reife gelangen und auskommen, weil infolge dieſer naturwidrigen Haltung und Pflege der Vögel im Ei die für den Aufbau des Vogelkörpers nöthigen Stoffe nicht in ausreichender und für ihren Zweck gleichmäßig vertheilter Menge vorhanden ſind. Die Eier von ſchlecht überwinterten Vögeln enthalten oft ungleich mehr Waſſerſtoffe als Nährſtoffe, was eine natürliche Folge von ſchlechter Nahrung iſt. Der Ueberfluß an minderwerthigem Waſſerſtoff verdunſtet durch die Brutwärme und der im Eidotter enthaltene Nährſtoff reicht nicht aus bis zur vollendeten Ausbildung des Embryo, letzterer ſtirbt vor der Zeit ab, und der Züchter findet ihn nur halb oder dreiviertel entwickelt im Ei vor. Deshalb pflegt Eure Vögel, inſonderheit die Weibchen, auch während der Jahreszeit gut, in welcher ſie für Euch nicht nutzbringend ſind. Ihr werdet es ſpäter nicht zu bereuen haben. Ich hoffe den verehrten Leſern und ſämmtlichen Züchtern durch eine ausführliche Beſprechung von zwei recht empfindlichen Störungen in der Hecke einen Gefallen erwieſen zu haben; denn mit bloßen Vermuthungen kann doch wirklich niemandem gedient ſein, am allerwenigſten den Züchtern, die gern und mit Eifer alles ergründen und beſeitigen wollen, was ihnen in der Ausführung ihrer Liebhaberei ſtörend begegnet.

Im weiteren Verlaufe der Zucht haben wir es dann mit der Pflege der jungen Vögel zu thun. So lange dieſelben in den Neſtern liegen und ſpäter noch nicht allein freſſen, können wir dieſe Pflege gut atzenden Weibchen überlaſſen, ſie führen ſie am beſten aus. Der Züchter mag deshalb auf zuverläſſig fütternde Hennen halten und für dieſen Zweck die von ſolchen gefallenen jungen Weibchen wieder zur Zucht verwenden, denn auch dieſe guten Eigenſchaften gehen auf Grund der Vererbungstheorie von der Mutter auf die Tochter über. Von künſtlicher Auffütterung ſchlecht ernährter Jungen bin ich kein Freund, weil wir Züchter nicht imſtande ſind, das Futter für das jedesmalige Alter der jungen Vögel ſo durch Vorverdauung herzuſtellen, wie es der alte Vogel vermöge der ihm eigenen Körperwerkzeuge fertig bringt. Ich mache in derartigen vorkommenden Fällen alle möglichen Verſuche, die Weibchen zur Atzung zu bewegen und gelingt mir das nicht, ſo vertheile ich die vernachläſſigten Neſtlinge in die Brutſtätten, wo gut gefüttert wird. Schon von der Zeit an, wenn junge Vögel auskommen, ſollen wir unſere Aufmerkſamkeit darauf richten, daß nicht ſchlechte Geſangsleiſtungen der Alten die Junghähne im „Zuſchnitt verderben“. Die jungen Vögel lauſchen ſchon ſehr bald auf den Geſang ihrer Väter und auf die Lockrufe u. a. der Mütter und es liegt Gefahr vor, daß ſie, wenn ſie verderbliche Strofen oder Töne zu hören bekommen, ſich ſolche einprägen und ſie ihrem ſpäteren Liede einverleiben. Um dieſe Gefahr möglichſt fern zu halten, dulden wir am beſten keine Hennen mit ſchlechten oder gar ſchappenden Lockrufen in der Hecke, wir entfernen ſie, ſelbſt wenn die Kopfzahl unſerer Nachzucht geringer werden ſollte. Bei den Hähnen wird ein Umſchlagen im Geſange während der Hecke ſeltner wahrgenommen werden, ſollte aber hin und wieder einer vorkommen, der ſich durch die Aufregungen, die das Fortpflanzungsgeſchäft mehr oder weniger mit ſich bringt, verleiten läßt, verwerfliche Strofen ſich anzueignen und zu Gehör zu bringen, ſo wird auch dieſer am beſten aus dem Zuchtraume herausgenommen. Ein Züchter, der nach dieſer Richtung peinlich verfährt, wird leichtere Arbeit mit der Ausbildung der Nachzucht haben, als ein ſolcher, der nachläſſig iſt in dem Glauben, die Junghähne achten im Heckraum noch nicht auf das Lied der Alten. Sobald die jungen Vögel ſich ſelbſt zu ernähren vermögen, was im Alter von vier Wochen in der Regel der Fall ſein wird, ſollen ſie nach den Geſchlechtern getrennt und die Hähne ſollen auch ſofort aus dem Heckraum entfernt werden. Die Merkmale, an denen die jungen Hähne von den Weibchen unterſchieden werden, ſind ſo ziemlich untrügliche. Der Junghahn hat eine aufrechte ſtolze Haltung und kräftige Bauart, ſein Gefieder iſt an allen Theilen des Körpers gelb gefärbt, ſein Kopf iſt ungleich runder und dicker als der des Weibchens. Das junge Weibchen zeigt über den Schädel hinweg und um den Hals herum einen weißlichen, verwaſchenen Streifen, ſein Körperbau iſt ſchwächer und ſein Kopf ſpitzer als beim Hahn. Der letztere zeigt außerdem, wenn er nach der erſten Mauſer längere Zeit geſungen hat, einen hervorſtehenden nach unten neigenden Zapfen, während der After der Hennen rund iſt. Das ſicherſte Merkmal iſt allerdings der Geſang, der beim Weibchen wegfällt. Nach der Entfernung aus dem Heckraum mögen die Junghähne zunächſt in geräumige Flugbauer gethan und letztere in einem Lernzimmer niedergeſtellt werden. Zur beſſeren Entwickelung der Körperwerkzeuge iſt für geeignetes Futter, unbedingte Sauberkeit und friſche ſauerſtoffhaltige Luft Sorge zu tragen. Rübſen und Eifutter, ſo oft und in gleicher Beſchaffenheit wie es in der Hecke gegeben wurde, ſoll auch in den Flugräumen die Nahrung der Junghähne bilden, die Beigaben an Eifutter ſind nach und nach ſoweit einzuſchränken, daß nach Verlauf von etwa vier bis fünf Wochen nur noch einmal täglich ein Näpſchen mit Ei vorgeſetzt wird. Von der Fütterung mit Miſchfutter, als Glanz, Hafer und Hanf, iſt gänzlich abzuſehen; denn dieſe Futterſtoffe wirken nachtheilig auf den Geſang der Vögel ein. Bei gutem Rübſen mit mäßigen Eibeigaben entwickeln ſich die Junghähne ſowol körperlich wie geſanglich am beſten, ſie kommen zwar etwas ſpäter auf den Geſang, wenigſtens werden ſie ſpäter geſangsfertig als die mit Miſchfutter verſehenen Kameraden, aber ihre Leiſtungen werden den Züchter ungleich mehr befriedigen, als wenn ſie durch Miſchfutter übermäßig angetrieben worden ſind. Erforderlich iſt weiter, daß den Junghähnen ſchon von dieſer Zeit ab Vorſänger beigegeben werden, damit die ihnen angeborenen geſanglichen Anlagen gut ausgebildet werden und damit ſie vom Beginn ihrer Geſangsſtudien an einen Anhalt und werthvolle Vorbilder haben, nach denen ſie ſich vervollkommnen können. Vorſänger ſind werthvoll, wenn ſie richtig ausgewählt worden ſind. Sie ſind nicht dazu da, den lernenden Junghähnen beſtimmte Geſangsſtrofen anzulernen, ſondern, wie ſchon angedeutet, die vorhandenen Anlagen auszubilden, und im Hinblick hierauf iſt es nothwendig, daß die Lehrmeiſter aus demſelben Stamm herrühren wie die jungen Hähne. Neue Lieder, die nicht in dem Stamm der Schüler liegen, können den letzteren von den Vorſängern nicht angelernt werden, denn hierzu würden entſprechend eingerichtete Singmuskelwerkzeuge gehören und deshalb eignen ſich die Heckhähne am beſten als Vorſänger, weil ihre diesbezüglichen Anlagen denen der Junghähne am ähnlichſten ſind. Es iſt zu empfehlen, von den Heckhähnen die vorzüglichſten Sänger nur eine oder höchſtens zwei Bruten durchmachen zu laſſen, damit ihr Geſchlechtstrieb befriedigt wird, ſie dann aber wieder aus der Hecke zu entfernen und ihnen das Amt der Vorſänger zu übertragen. Das Lied der Vorſänger ſoll möglichſt vollkommen und entſchieden frei von ſolchen Fehlern ſein, die den lernenden Junghähnen ſchädlich ſein können. Vorzuziehen ſind ſolche Hähne, welche die werthvollen Geſangsſtrofen ruhig, lang, tief und mit weichem Schmelz vortragen. Spitze Pfeifen, flache Sachen und Naſenſtrofen ſind gänzlich zu vermeiden, ſie werden von den Jungen leicht aufgefaßt und nachgeſungen, und wenn ſie einmal Fuß gefaßt haben, ſind ſie ſchwer oder gar nicht wieder zu beſeitigen und das „Ausmerzen“ nimmt dann kein Ende. Vortheilhaft iſt es weiter, die Vorſänger ſo aufzuhängen, daß ſie von den lernenden Jungen geſehen werden können. Denn wir können dann die Wahrnehmung machen, daß dieſe nicht nur dem Geſang des Vorſängers aufmerkſam zuhören, ſondern ihm auch „zuſehen“, was gewiß von Vortheil iſt. Schon im Flugkäfig müſſen die jungen Hähne einer dauernden Prüfung bezüglich ihrer Geſangsergüſſe unterworfen werden. Es werden unter ihnen manche vorhanden ſein, die unruhig im Flugraum ſich geberden und eine Forſche darin ſuchen, einmal während ihrer Lernübungen unruhig hin- und herzufliegen, zum andern beim Singen den Kopf wenig oder gar nicht aufzublähen und endlich auch möglichſt laut ihre Künſte vorzutragen. Dieſe Helden müſſen ſogleich aus dem Kreiſe ihrer Kameraden entfernt werden, und man bringt ſie dadurch zur Vernunft, daß ſie ſchon jetzt in Einzelhaft gebracht und, wenn es erforderlich wird, auch verdunkelt werden, andernfalls reißen ſie von den beſſeren Sängern ſo manche noch mit herum. Junghähne dagegen, die ihre Geſangsübungen ruhig daſitzend ausführen, den Kropf während derſelben tüchtig aufblähen und ſich durch andere Vögel nicht ſtören laſſen, berechtigen zu den beſten Hoffnungen, ſie laſſe man ruhig gewähren, ſie werden unter tüchtigen Vorſängern auch gute Sänger werden. Ich möchte hier noch erwähnen, daß der Züchter alle Störungen, welche auf die Geſangsleiſtungen der Junghähne von übelem Einfluß ſein können, möglichſt fern halten möge. Zu dieſen gehören ſchrille oder pfeifende Töne, welche durch irgendwelche Werkzeuge oder auch durch ungeölte Thüren oder Nähmaſchinen u. ſ. w. verurſacht werden. Auch die unmittelbare Nähe ſchlechter Sänger oder wilder Vögel, inſonderheit von Sperlingen iſt für den Geſang der jungen Kanarienhähnchen im höchſten Grade gefährlich. Zu Nachtheil bringenden Störungen führt auch die Uebervölkerung der Flugkäfige. Sind dieſelben zu ſtark mit Vögeln angefüllt, ſo entſtehen Zänkereien, die meiſt von kreiſchenden, ſpitzen Tönen begleitet ſind, welche Nachtheil bringen, ferner werden die ruhig ſingenden Junghähne unverhältnißmäßig oft geſtört und endlich kann auch die Geſundheit der Vögel in zu zahlreich beſetzten Bauern inſofern leiden, als ſchwächere Hähnchen von ſtärkeren dauernd von den Futterplätzen verdrängt werden und Mangel an Nahrung leiden müſſen. Alle dieſe Uebelſtände ſollten den Züchter bewegen, in einen Käfig von ein Meter Länge und 50 bis 60 cm Tiefe und Höhe nicht mehr als 10, höchſtens 15 Junghähne einzulaſſen. Für jeden Flugkäfig mit dieſer Anzahl Vögel iſt ein Vorſänger zu beſtimmen, damit der Geſang der Lehrmeiſter nicht von dem der übenden Jungen übertönt wird und ungehört verhallt.

(Fortſetzung folgt.)

Briefliche Mittheilungen.

... Das iſt einmal eine Herzensfreude, die Nährſalztheorie auch für die Vogelwelt nutzbar machen zu ſehen. Schon lange ehe ich etwas von Nährſalz wußte, wußte ich doch, daß man ſeinem Vogel keine größere Freude machen könnte, als ihm Grünes zu bringen. Wir pflegen nun wol ſchon 25 Jahre Vögel und unſer jetziger Beſtand: Papagei, Sproſſer, Schamadroſſel, Gartengrasmücke befindet ſich ſeit 15, 8, 7, 4 und 2 Jahren in unſerm Beſitz. Wir haben noch nie über ſtockende Mauſer oder irgend welche Krankheit zu klagen gehabt. Der Sproſſer bekam, bald nachdem wir ihn angeſchafft hatten, ſchlimme Füße, die aber durch entſprechende Stange und vor allen Dingen durch richtige Ernährung ſehr bald heilten. Unſer Dompfaff leuchtet förmlich, ſo roth iſt ſeine Bruſt, keine Spur von Verblaſſen; der Sproſſer ſingt von Weihnachten bis Johanni, die Grasmücke länger, die Schamadroſſel das ganze Jahr. Blank und ſchmuck, lebhaft, vergnügt und vollkommen zahm ſind unſere Vögel alle. Wir füttern den Papagei mit Hanf, Mais und einem Stückchen Eierbrot täglich; alles trocken, nichts eingequellt, dazu täglich Obſt in aller möglichen Form und größter Menge neben mindeſtens 3 bis 4 Wallnüſſen. Die Inſektenfreſſer bekommen, ſo lange es friſche Ameiſeneier gibt, nur ſolche, dann ein Miſchfutter von getrockneten Ameiſenpuppen, geriebner Morrübe, etwas Capelle'ſchem Futter und kleingeſchnittenem Apfel, dazu Fliederberen, ſo viel ſie freſſen wollen. Im Winter der Sproſſer ſechs, die Droſſel acht und die Grasmücke einen Mehlwurm täglich. Letztere vertilgt jetzt ſeit Wochen eine Unmenge Hollunderberen und rührt das andere Futter kaum an. Aber Salat frißt ſie mit Vorliebe; natürlich nur in ganz kleine Stückchen zerpflückt, nimmt ſie ſechs bis acht Stücke hintereinander mir vom Finger. Ich hatte ſie mir als kleinen Neſtling aufgepäppelt, weil ſie, von den Eltern verlaſſen, hülflos im Garten lag. So oft lieſt man, daß Grasmücken ſo weichlich ſind, das liegt eben daran, daß die armen Thiere verkommen müſſen ohne die ihnen nöthigen Stoffe. Aufgezogen habe ich das Thierchen mit friſchen Ameiſenpuppen und ſchwarzen Johannisberen.

Was nun das Waſſer betrifft, ſo mag die Entziehung deſſelben für kranke Papageien richtig ſein. Ein geſunder naturgemäß ernährter Vogel ſäuft von ſelbſt faſt gar nicht. Ich beſinne mich, unſern Vogel in den 14 Jahren höchſtens fünf bis ſechs mal, dann ſehr langſam acht bis zehn Schluck hintereinander trinken geſehen zu haben. Er wird es wol öfter thun; aber ich meine, wenn es ſehr häufig wäre, würde ich es doch öfter ſehen. Er bettelt dagegen faſt täglich um das Abſpritzen des Gefieders. Wenn man ſeine Vögel lieb hat, merkt man ſehr bald, was ſie mit ihren ſtummen Zeichen wollen. Doch nicht immer ſtumm, ſie können ſich ſogar recht vernehmlich in ihrer Ungeduld hören laſſen. Wenn Lora genug beſpritzt worden iſt, legt ſie alle Federn feſt an; ſo lange ſpreizt ſie nicht nur die Flügel, ſondern jede einzelne Feder. — Herr Mathias Rauſch ſchreibt ja auch, ſo lange er friſche Ameiſenpuppen gäbe, entziehe er das Waſſer. Ich kann das nicht beurtheilen, ich weiß nur, welche Wonne unſeren Vögeln das Baden iſt. Der Sproſſer planſcht ſogar alle Abend noch einmal bei Licht. Der Dompfaff erhält neben Rübſen und Glanz täglich ein großes Stück Apfel, Salat, Kreuzkraut, Vogelmiere und natürlich Ebereſchenberen, ſo lange es welche gibt. Es wäre wirklich zu wünſchen, daß bei Menſch und Thier das Obſt und „Grünfutter“ endlich zu ſeinem Rechte käme. Es kann davon nie genug werden.

Elſe Mittag.

Anfragen u. Auskunft

Herrn Albert Lütgens: Sie dürfen Ihrem Kreuzſchnabel nicht nur Körnerfutter geben, eine Beigabe von Miſchfutter iſt unerläßlich. Dieſes beſteht am beſten aus getrockneten aufgequellten oder friſchen Ameiſenpuppen oder Weißwurm mit geriebner Möre, bisweilen noch vermengt mit geriebnem Eierbrot oder Weißbrot. Ganz richtig iſt es, daß Sie Tannenzapfen und friſche Nadelholzſchößlinge reichen; nur fügen Sie dieſen noch Nadelholzſamen und allerlei Beren hinzu. Sonſt ſind Sie jedoch in der Fütterung von dem Händler falſch unterrichtet worden; geben Sie ſtatt der von Ihnen gereichten Sämereien Hanf, Rübſen und Spitzſamen. Wärme iſt dem Kreuzſchnabel nicht zuträglich; überwintern Sie ihn in einem ungeheizten, froſtfreien Zimmer, in dem er viel der Sonne ausgeſetzt iſt, deren Einwirkung auf das Gefieder nothwendig iſt, um das ſchöne Roth deſſelben zu erhalten.

Herrn G. Berger: Urſachen der Kropfkrankheiten ſind vorzugsweiſe Verdauungsſtörungen, hervorgerufen durch falſche Fütterung, nur ſelten verſchluckte Dinge, wie Steinchen, Glas-, Knochenſtückchen oder dergl. Fühlt ſich der Kropf hart an, ſo iſt er mit unverdaulichem Futter (zu vielen harten und durch reichlich getrunkenes Waſſer aufgequollenen Körnern) angefüllt; in dieſem Fall kann leicht Erſtickung eintreten, indem ſich die Futtermaſſe gegen die Luftröhre preßt. Der Vogel ſitzt dann ſchwerathmend, unter angſtvollem Schnabelaufſperren da. Durch vorſichtiges Kneten des Kropfes mit den Fingern und indem man den Vogel an den Beinen mit dem Kopf nach unten hält, ſucht man Entleerung herbeizuführen; zugleich beſtreicht man den Kropf mit erwärmtem Oel und gibt einige Tropfen Oelgemiſch (Rizinus- und Olivenöl) oder Pfeffermünzaufguß (1—2:100; 3—5 Tropfen, ½—1 Theelöffel voll als Gabe) und hartnäckigenfalls Salzſäure (im Trinkwaſſer, 1 Tropfen auf ein großes Weinglas voll Waſſer). — Ein mit Luft gefüllter und unnatürlich aufgeblaſener Kropf iſt ein Zeichen der Blähſucht. Die Urſache iſt auch hier Verdauungsſtörung, alſo unpaſſendes, verdorbenes oder auch zu reichliches, ſchwerverdauliches Futter. Im leichtern Grade iſt die Krankheit unſchwer heilbar, indem man die blaſenartigen Anſchwellungen vorſichtig aufſticht, die angeſammelte Luft gelinde herausdrückt und die Stellen mit erwärmtem Oel beſtreicht oder dem Vogel auch mit Vorſicht ein Dampfbad gibt. Alle an Blähſucht erkrankten Vögel müſſen knapp gefüttert werden. Als Heilmittel, jedoch erſt bei wiederholtem Eintreten, wird Salzſäure im Trinkwaſſer (ſ. oben) gegeben. — Abgeſehen von dieſen beiden Erkrankungsfällen erſcheint oft für Anfänger in der Liebhaberei eine „gelbe eitrige Blaſe“ an Hals oder Oberbruſt eines Vogels beunruhigend; es iſt jedoch der bei noch nicht voller oder bei mangelhafter Befiederung hervortretende Kropf, welcher, ſobald ſich der Vogel ſattgefreſſen, bzl. reichlich gefüttert worden, wenn er alſo mit Körnern gefüllt, auffallenderweiſe bemerkbar iſt. Sollte der Kropf wirklich blaſig aufgebläht erſcheinen, bei Verdauungsſtörungen, infolge Futterwechſels u. a., ſo behandle man ebenſo wie vorhin angegeben. Entſteht beim Aufſtechen der Luftblaſe eine größere wunde Stelle, ſo darf man nicht engliſches Pflaſter oder dergl. daraufkleben, denn daſſelbe trocknet hart an und verurſacht großen Schmerz; auch Kollodium iſt in dieſem Fall beſſer zu vermeiden. Man beſtreicht vielmehr mit warmem Oel oder einem Gemiſch von Glycerin 1, Waſſer 5 und feinem Stärkepulver 1, zum dünnen Brei angerieben. Innerlich gibt man alten Vögeln in Rizinus- und Olivenöl-Gemiſch getauchte Mehlwürmer.

Herrn A. M.: Der Geſang des rothen Kardinals iſt ſchöner als der des grünen. Er wird als vortrefflicher Sänger geſchätzt; manchen Liebhabern freilich ſagt ſein Geſang, zumal in der Stube, nicht zu, weil er ihnen zu laut und rauh klingt, während die meiſten ihn einſtimmig loben und namentlich die langgezogenen, flötenden Töne gern hören. — Auch der Geſang des grauen Kardinals iſt angenehm, aber durch langgezogene, ſchleifend klingende, nicht liebliche Laute unterbrochen. — Als Futter geben Sie dem rothen Kardinal ein Samengemiſch aus Hanf, Hafer und unenthülſtem Reis; als Zugabe hartgekochtes Ei und 2 bis 4 Mehlwürmer täglich; dazu ſüße Frucht und Grünkraut, halbreife Sämereien u. a., beſonders aber auch allerlei Kerbthiere und wenig Eierbrot. Der graue Kardinal erhält daſſelbe, aber vornehmlich kleine mehlhaltige Sämereien, beſonders verſchiedene Hirſen und Kanarienſamen; ölhaltige Sämereien, Hanf u. a. nur beiläufig. Allerlei Beren u. a. Obſt ſind auch ihm zuträglich.

Herrn Snider Lierna: Ein gutes Miſchfutter für zarte Weichfreſſer ſtellen Sie wie folgt zuſammen:

10 Loth gute, getrocknete Ameiſenpuppen,
6 Loth geriebene und getrocknete Karotten,
6 Loth gekochtes, getrocknetes, gemahlenes Rinderherz,
4 Loth geriebener Zwieback,
3 Loth gekochtes, getrocknetes, geriebenes Eigelb,
2 Loth gemahlener Weißwurm,
1 Loth gemahlene Ossa sepia.
32 Loth = 1 Ruſſ. Pfund.

Das Futter iſt als wohlgelungen zu betrachten, wenn es angefeuchtet eine lockere, flaumige Maſſe bildet. Stellen Sie die Miſchung lieber etwas trockner als zu feucht her, da ſie im letztern Zuſtand für heikle Vögel ſchwerverdaulich iſt und leicht die Veranlaſſung zu Unterleibsentzündungen wird. 2. Ein Aufzuchtfutter für Loris von den blauen Bergen finden Sie in Dr. Ruß's Handbuch I auf Seite 400 unter der Rubrik „Weichfutter-Gemiſche zur Zugabe für die Aufzucht junger Körnerfreſſer“ angegeben. 3. Die Kanarien-Lehr-Orgel mit Walze, die Sie uns anführen, iſt uns in der Praxis unbekannt; das Beſte zur Erlernung eines feinen Geſanges iſt und bleibt jedoch ein wirklicher Kanarienvorſchläger, da durch denſelben die Modulationen des Geſanges ganz anders zur Geltung gebracht werden, als durch eine Orgel, die doch ſtets nur monotone Töne hervorbringt und den Schlag des Vogels nicht rund genug wiedergibt.

Herrn H. B. Güſtrow: Der eingeſandte Zebrafink gelangte völlig zerquetſcht in unſern Beſitz. Die Art der Verpackung, in einem Briefcouvert, trägt die Schuld an dieſem bedauerlichen Vorkommniß. Am beſten verſchickt man tote Vögel in einer kleinen feſten Schachtel.

Herrn Hugo Schröder: Verſuchen Sie durch Aenderung der Fütterung Ihren Buchfinken zur naturgemäßen Mauſer zu bringen. Geben Sie ihm ein Gemiſch aus gehacktem Fleiſch, gehackter Vogelmiere und geriebenem Weißbrot (zu gleichen Theilen), unter das Sie ein wenig zerquetſchten Hanf und ein Theil Kanarienſamen mengen. Im Sommer reichen Sie ihm dazu möglichſt oft Ameiſenpuppen und Mehlwürmer, im Winter mehr Sämereien. Sobald der Fink ſchlägt, kann er bis zehn Mehlwürmer täglich erhalten. Zuviel Hanf ſoll ſchädlich ſein, bzw. Erblindung herbeiführen.

Herrn Merten: 1. In dem Heckkäfig von angegebener Größe haben die fünf Pärchen Prachtfinken hinreichend Raum. Auf Zuchterfolge können Sie mit Beſtimmtheit rechnen, vorausgeſetzt, daß alle übrigen Erforderniſſe zur Pflege und Zucht der Vögel vorhanden ſind. 2. Rieſenelſterchen vertragen ſich gut mit Zebrafinken und Mövchen. Natürlich gibt es ſelbſt unter den als verträglich bekannten Arten immer einzelne Exemplare, die eine Ausnahme von der Regel machen.

Berichtigung.

In Nr. 46 muß es auf Seite 368, Zeile 7 von unten, ſtatt „ein Handbuch“ im Handbuch heißen.

Zu unſerm Bilde.

Unkundige, die den Neuguinea-Edelpapagei (Psittacus Linnéi, *Rss.*), einen großen grünen Papagei, mit ſeinem ſcharlachrothen Weibchen zum erſten Mal zuſammenſitzen ſehen, werden ohne Zweifel nie auf den Gedanken kommen, daß zwei ſo außerordentlich verſchiedene Vögel als Pärchen zuſammen gehören. Dieſe abſonderliche Erſcheinung der gänzlich von einander abweichenden Färbung der Männchen und Weibchen zeigt ſich bei mehreren Arten der Edelpapageien. Der Reiſende Dr. A. B. Meyer, gegenwärtig Direktor des Königl. Zoologiſchen Muſeums in Dresden, machte zuerſt die intereſſante Entdeckung, daß zwei ſolche verſchieden gefärbten Vögel immer zuſammen eine Art bilden, in welcher der Grüne das Männchen und der Rothe das Weibchen iſt. Die Annahme, zu der Dr. Meyer dadurch gelangte, daß die vielen von ihm erlegten grünen Edelpapageien ſich bei der Unterſuchung ſtets als Männchen und die rothen als Weibchen ergaben, wurde anfangs viel beſtritten, doch iſt ſie nun einerſeits durch Züchtungen, namentlich von P. Hieronymus in Blankenburg, andererſeits dadurch, daß auch Finſch von Ort und Stelle aus Gleiches berichtet hat, als Thatſache beſtätigt. — Der in der vorigen Nummer beſchriebene Müller's Edelpapagei gehört nicht zu dieſen Arten, bei ihm unterſcheidet ſich das Weibchen vom Männchen, wie erwähnt, nur durch das andersfarbige Auge.

Das Männchen Neuguinea-Edelpapagei iſt ober- und unterſeits gleichmäßig grasgrün; die erſten Schwingen und deren Deckfedern ſind dunkelblau, Eckflügel, Bug und kleine Deckfedern längs des Unterarms hellblau, Achſelfedern, unterſeitige Flügeldecken und Fleck an den Bruſtſeiten ſcharlachroth; die äußeren Schwanzfedern jederſeits dunkelblau; alle Schwingen und Schwanzfedern unterſeits mattſchwarz, letztere am Ende fahlgelblich; Oberſchnabel korallroth, Spitze wachsgelb, Unterſchnabel ſchwarz; Auge ſchwarzbraun, mit ſehr ſchmalem, graubraunem bis orangefarbenem Ring; Füße bleigrau mit ſchwarzen Schildchen und Krallen. Die Größe iſt der einer Krähe gleich (Länge 36 bis 39 cm, Flügel 25 bis 27 cm, Schwanz 12 bis 14 cm). Das Weibchen iſt an Kopf, Hals und Bruſt hellſcharlachroth; das Auge umgibt ein ſchmaler, blauer Ring; ein breites Querband über den Oberrücken dunkelultramarinblau; Schwingen erſter Ordnung dunkelindigoblau, Innenfahne mattſchwarz, die großen Deckfedern gleichfalls dunkelroth, Flügelrand längs des Unterarms und kleine unterſeitige Flügeldecken dunkelblau; Schwanz oberſeits mit breitem, hellrothem Ende, unterſeits ſchwärzlich, am Ende fahlroth; ganze übrige Oberſeite dunkelſcharlachroth; Bruſtſeiten und Bauch glänzend dunkelblau; untere Schwanzdecken hellroth, fein gelb gerandet; Schnabel ſchwarz; Auge ſchwarzbraun, mit perlweißem Ring um die Iris; Füße grau mit ſchwarzen Schildern und Krallen. Die Größe iſt kaum bemerkbar geringer (Länge 36 bis 38 cm; Flügel 24 bis 25 cm; Schwanz 11 bis 11,6 cm). — Unſer Bild zeigt das Männchen dieſer Art.

Die Heimat des Neuguinea-Edelpapagei ſind die Inſeln der Neuguinea-Gruppe. Die Eingeborenen ſollen dieſe Art gleich anderen Papageien zahlreich aus den Neſtern heben. Das Männchen gehört längſt zu den gemeinen Erſcheinungen des Vogelhandels, während das Weibchen als Linne's Edelpapagei immer noch als Seltenheit gelten muß. Nach der Eingewöhnung ſind dieſe Edelpapageien ſehr ausdauernd und halten ſich auch vortrefflich bei uns im Freien. Einzelne ſind im Käfig überaus bösartig, zeigen trotzdem aber manchmal die wunderliche Eigenthümlichkeit, daß ſie ſich herausnehmen laſſen und faſt plötzlich zahm werden. Es gehört freilich Muth dazu, ſolchen großen Papageien mit dem gewaltigen Schnabel ohne weiteres an den Füßen zu packen; geſchieht es aber, ſo ſcheint dies ſolchen Eindruck auf ihn zu machen, daß er jeden Widerſtand aufgiebt. Mehrere Vögel, Männchen ſowol als Weibchen, zeigten ſich vortrefflich ſprachbegabt, zahm und zutraulich. Als Sprecher gehalten ſind beide nicht arge Schreier, als Brutvogel dagegen machen ſie, insbeſondere frühmorgens, beträchtlichen Lärm; auch zeigen ſich dann die Weibchen in hohem Grade bösartig.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Neu! Senſationell!

Kanarien=Lehr=Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer= und Luft=Keſſel, in elegantem Renaiſſance=Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [2150] **Edmund Schlewick, Zittau, Sachſen.**

Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.

Reparaturen aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt.

Futtermittel.

Mehlwürmer, vegetab. gefüttert, ganz rein, à Liter 4,50 ℳ, Kilo 7,50 ℳ m. Verpackung. **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Liter 60 ₰, bei 10 Liter 75 ₰. empfiehlt und verſendet [2151]

C. O. Streckenbach, Breslau X.

Mehlwürmer, Ia., Ltr. 4 ℳ, Pfd. 3,20 ℳ, **leitner,** Breslau, Weinſtr. 12. [2152]

Für Insektenfresser und zur Aufzucht.

„Eidotter" „Eiweiss"

griesförmig per Kilo 3.75 ℳ schrotförmig per Kilo 4.75 ℳ

Beimischung zu jedem Futter. Bei 4½ Ko. franco. [2153]

Henri Vallette, Berlin SW., Schönebergerstrasse 15a.

Die Samen=Großhandlung

von

Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [2154]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter=Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Neue 1899er

Tyroler Ameiſeneier,

hochfein, weiß und rein, à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk.

Neuer 99er Elbe=Weißwurm

à Ko. 4 Mk., à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk. [2155]

Zeke (Muska)

à Ko. 2½, 5 Ko. 12, 10 Ko. 22 Mk.

J. O. Rohleder

Leipzig=Gohlis

Vogelfutter=Groß=Handlung.

Univerſalfutter.

Vor dem Kennerauge kann eine **Universalfutter-Mischung ohne Zeke** nicht mehr als vollwerthig bestehen.

Einige Jahre fehlte dieses Produkt vollständig am Vogelfuttermarkt, und mancher Liebhaber hätte gern 10 Mk. für ein Kilo bezahlt, wenn er es hätte bekommen können.

Zeke ist **jetzt wieder** überall **gut** und **billig** zu haben.

Man verlange ausdrücklich **„Zeke, Marke Amsel".** [2156]

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 4,25 ℳ, Kilo 7,75 ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ. **Ameiſeneier,** hochprima 99er, Liter 90 ₰, **Weißwurm,** Liter 90 ₰. [2157]

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Mehlwürmer, à Ltr. 4 ℳ inkl. Verp. Bei Einſendung von 1,50 ℳ = 140 gr., alſo **weit über 1000 Stück,** frk. inkl. Verp. [2158] **P. Bartsch, Breslau, Flurſtr. 6.**

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [2159]

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag 411, I.

Univerſales. [2160]

Röbbeckes prämirte **Univerſalfutter=Spezialitäten** ſind die beſten für alle inſektenfreſſende Vögel.

Qual. Extra,	à Ko. 2,60 ℳ	in ½ u. ⅟₁ Pfd.=Packet.
„ Prima,	à Ko. 2,— ℳ	
„ Sekunda,	à Ko. 1,— ℳ	

1899er Ameiſeneier 1899er,

hochprima Qual., das Feinſte, was es gibt, vollſtändig rein und ſtaubfrei, à Ko. 4 ℳ, 5 Ko. 18 ℳ, **Ameiſeneier,** naturell, à Ko. 2,20, ſtaubfrei 2,60 ℳ, offerirt

Otto Röbbecke, Meerane, Sa., II, Sämerei= u. Vogelfutter=Handlg., gegr. 1854.

Alle Vogelfutter,

Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig, Königspl. 7.

Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche. Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [2161

Rheiniſches

Univerſal=Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche **inſektenfreſſende Singvögel** von Apotheker **Max Kruel.**

Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!

[2162] Allein angefertigt von

Ernst Hanke, Trier, Moſel.

Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt [2163] ſandfrei.

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)

Vogel- und Hundefutterhandlung.

Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Ameisenerier,

1899er Ia geſiebte, ſandfreie Ware,

	per	Kilo	ℳ 3,50
Weißwurm, prima	„	Liter	„ 1,—
Muska	„	„	„ 0,90
Univerſalfutter, extra	„	Kilo	„ 1,20
Mohnmehl, weiß	„	„	„ 0,60
Sonnenblumenk., weiße	„	„	„ 0,60
Reis in Hülſen	„	„	„ 0,60
Ossa sepia, prima	„	„	„ 8,—
Sommerrübſen, Ia großkern. ſüß	„		„ 0,44

Ferner Mohar-, Senegal-, Kolben-, weiße **Hirſen, Mohn** und alle anderen Vogelfutter=Artikel empfiehlt [2164]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Vögel.

Rothe Kardinäle, prachtv. Vögel, à Mch. 9, 2 Stck. 15 ℳ,

Graue Kardinäle, prachtv. Vögel, à Mch. 4, 4 St. 15 ℳ,

Wellenſittiche, alte Zuchtpare, à P. 6, 5 P. 28 ℳ,

Wellenſittiche, jüngere, à P. 5, 5 P. 23 ℳ,

Amerik. Spottdroſſeln, ausgeſ. Vögel u. Mch. 10, 2 Stck. 18 ℳ,

Tigerfinken, roth, à P. 2, 5 P. 9, 10 P. 17 ℳ,

Tigerfinken i. Verfärbg., à P. 1,50, 5 P. 7, 10 P. 13 ℳ,

Paradieswittwen, à P. 1,50, 5 P. 7 ℳ,

Japan. Mövchen, à P. 2,75, 3 P. 7,50 ℳ,

Japan. Mövchen, reinweiß, à P. 6 ℳ,

Grauköpf. Zwergpapageien, à P. 2,50, 5 P. 10 ℳ,

Chineſ. Nachtigalen, à Stück 4,50 ℳ,

Weiße Reisfinken, à P. 7 ℳ,

1 Beo, ſprechend, 15 ℳ,

Hüttenſänger, à P. 8, à Mch. 5,50 ℳ,

Felſenſittiche, leicht zu zähmen, **Muskatfinken, Nonnen, Bronze-Männchen, Graue Reisfinken, Silberbecks, Bandfinken, Blutſchnabelweber,** à P. 2, 5 P. 9, 10 P. ſortirt 16 ℳ. [2165]

J. O. Rohleder, Leipzig=Gohlis.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen
Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.
Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [2166]

Beſte Bezugsquelle für
Papageien!

Graue und grüne Amazonenpapageien, Doppelgelbkopf u. Gelbnacken-Amazonen, ſprechend und nichtſprechend,
ſchon von 20 ℳ. [2167]

Beste Bedienung.

Vollste Garantie.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Zu verkaufen:

Ein **Vogelbauer,** Laubſägearbeit, ein Schloß im Schweizerſtyl darſtellend, mit Holzboden, 3 Zinkeinſätzen und Springbrunneneinrichtung. Länge 1,30 m. Höhe 0,75 m, mit Thurm, Tiefe 0,48 m. Außen-Gallerie, um das Verſtreuen des Futters zu verhüten. Mit Inhalt: 1 P. **Dompfaffen,** 2 P. **Webervögel,** ſchon hier geniſtet, 1 P. **weiße Reisvögel,** ſchon hier geniſtet und ganz zahm; mit Vögel 40 ℳ, ohne Vögel 30 ℳ. [2168]

Knörnschild,
Hof O.-S., Lienengäßchen 12.

Finken u. Schwarzköpfe

zu verkaufen, 6 St. Wildir, lang im Schlag, mit Schnappen, 10 ℳ per Stück, Schwarzköpfe mit ſchönen, doppelten Ueberſchlägen, 8 ℳ. Die Vögel ſind ſämmtlich Wildfänge und fangen jetzt zu ſchlagen an und ſind ſofort zu hören. Garantie für lebende Ankunft.

Dammerer,
[2169] **Wien XVI,** Degengaſſe 40.

Blauſtirn-Amazonen,
Stück 20 Mk.,
Alexanderpapageien,
Stück 4,50 Mk.,
Wellenſittiche, Zuchtpar, **Par 6 Mk.,**
Amerik. Spottdroſſeln, St. 12 Mk.,
Dayaldroſſeln,
Stück 25 Mk.

Preisl. gratis. Garant. lebende Ank. u. tadelloſe Vögel.

Gustav Müller,
[2170] Leipzig-Neureudnitz.

Wegen Aufgabe der Zucht

ſind 20 der ſchönſten

Holländer-Kanarienvögel

(Ausſtellungsſtücke) nebſt Brutkäfige ſofort zu verkaufen bei [2171]
Wilhelm Sauer, Wien, III. Kolonitzgaſſe 12.

Zu kaufen geſucht

in tadelloſen, geſunden, eingewöhnten Exemplaren: **1,1 Roſenpapageien, 1,1 gelbe Wellenſittiche, 1,1 Schuppen-Loris, 1 Inka-Kakadu** (fingerzahm). Gefl. Offert. mit Preisangabe an [2172]

A. G. Walford,
Hannover, Sedanſtraße 45, part.

Kanarien.

Von meinem ſehr tiefgehenden tourenreichen Hohlrollerſtamm m. g. Knorren, Klingeln, tiefen Pfeifen ꝛc. verſende unter Garantie des Werthes à 10—50 ℳ. Weibchen desſelben Stammes 2 ℳ. Für Wiederverkäufer ſehr empfehlenswerth, d. Dtz. Hähne 72 bis 96 ℳ.

Parade, Rentier,
[2173] **Hannover,** Aſternſtraße.

NB. Meine Verkaufsvögel erhielten nachweislich 1898 u. 99 goldene und ſilberne Medaillen.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.
Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft.
Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen.
Kataloge gratis u. franko. [2174]

Halt!

Die **Vogelzüchterei** von [2175]

L. G. Müller, Nordhauſen a. Harz

verſendet koſtenfrei die Preisliſte, ſowie hochfeine Anerkennungen über gutgelieferte

ff. Harzer Kanarienvögel.

Letztere verſ. 14 Tage auf Probe überallhin.

Einen größeren Poſten

Norwich-Canarien,
à Par 25, à Mch. 15, à Wch. 10 ℳ.
Lizard-Canarien,
à Par 30, à Mch. 20, à Wch. 12 ℳ,
Cayenne-Canarien,
à Par 25, à Mch. 15, à Wch. 10 ℳ.

J. O. Rohleder
[2176] in Leipzig-Gohlis.

Stiglitze, [2177]

große Männchen, Dtzd. 9 ℳ, Weibchen, Dtzd. 4 ℳ, Bluthänflinge, Dtzd. 9 ℳ, Zeiſige, Dtzd. 6 ℳ, rothe Dompfaffen, Dtzd. 16 ℳ, Weibchen 4 ℳ, Bartmeiſen, Par 4 ℳ, 10 Par 30 ℳ, Heidelerchen, Stck. 1,60 ℳ, Schwarzplattl 3—5 ℳ. Mehlwürmer, Ltr. 4 ℳ, liefert unter Garantie.

G. Findeis, Wien I, Wollzeile 25.

Alpenſtiglitz-Männchen,

größte, farbenprächtigſte, nur gut an's Futter gewöhnte Vögel, Dtzd. 10 ℳ, mit beſter ſichtbar. Verpackg. Verſendet unter reeller Garantie leb. Ankunft. [2178]

Wilhelm Fechtner, Leitmeritz (Böhmen).

Kanarienhähne

meines mit Ehrenpr., Gold. u. Silb. Med. präm. Hohlrollerſt. von 8 bis 25 ℳ. Probe u. Garant.

Th. Börner,
[2179] **Kaſſel,** Gartenſtr. 3 I.

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländiſchen und ausländiſchen körner- und inſektenfreſſende Vögel, in allerfeinſter, ſtets friſcher Ware, beſonders **Ameiſeneier,** handverleſene ganz reine, **Eintagsfliegen** (Weißwurm), **Muska** oder **Zeke** (überſeeiſche Fliege), **Mehlwürmer** und **Univerſalfutter-Miſchungen** verſendet zu billigen Preiſen [2180]

H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung,
Erfurt, Futterſtraße 3.
Preisliſte auf Wunſch umſonſt und portofrei.

Harzer Hohlroller,

gute Mittelvögel, à Stck. 6 und 8 ℳ, à Dtzd. 54 ℳ, 2 Dtzd. 100 ℳ.

J. O. Rohleder
[2181] in **Leipzig-Gohlis.**

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [2182]
C. G. Vodel. Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Geſunde Stiglitze

à 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, **Rothhänflinge** à 1 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, **Zeiſige u. Buchfinken** à 90 ₰, Dtzd. 7,50 ℳ, **Grünhänflinge u. Tannenmeiſen,** à 70 ₰, Dtzd. 6 ℳ, Weibchen die Hälfte. Garantie lebender Ankunft. [2183]

Gebr. Mergler, Vogelexport,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Zur gefälligen Beachtung!

Von Mitte Dezember cr. bis Mitte März 1900 ſind wieder **firm gelernte Dompfaffen** von mir zu beziehen. [2184]
F. Schlag, Steinbach-Hallenberg i. Thür.

Der
Deutſche Geflügelhof

Abonnement vierteljährlich 75 Pfg.

Inſerate: die einſpaltige Zeile 15 Pfg.

Amtliches Organ des Sonderausſchuſſes für Geflügelzucht der Landw. Kammer für die Prov. Brandenburg und der demſelben angeſchloſſenen Vereine.

Redaction:
Bruno Dürigen, Charlottenburg.

Der „Deutſche Geflügelhof“ bringt alles Wiſſenswerthe auf dem Gebiete der landw. Nutzgeflügelzucht, ſowie rationellen Tauben- und Kaninchenzucht, auf den Sport dabei gebührend Rückſicht nehmend, belehrende Artikel für den Anfänger, Beſchreibungen und Abbildungen.

Probenummern koſtenlos durch die Geſchäftsſtelle

Otto Koobs Verlagsanſtalt,
Forſt i. L.

Bitte um Beachtung!

Der heutigen Nummer liegt wieder eine Extra-Prämie in Schwarzdruck,

Neſt des Gartenrothſchwänzchens mit Weibchen, Jungem und Ei

darſtellend, bei.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 48.

Betrachtungen über Papageien-Krankheiten.
Beobachtungen aus der freilebenden Vogelwelt.
Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang (Fortſ.).
Anfragen und Auskunft.
Briefliche Mittheilungen.
Zu unſerm Bilde.

Anzeigen.

Annahme von Anzeigen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Vom Besten das Beste!

Mehlwürmer, rein vegetar. gefüttert, Ltr. 4,50 ℳ. **Neue Ameiſeneier!** Hochf., geſiebte, ſandfr., goldgelbe Ware, Ko. 3 ℳ, 5 Ko. 13,50 ℳ. **Prima Elbe-Weißwurm,** Ko. 3 ℳ, Lt. 85 ₰. **Tyroler Ameiſeneier,** hochfein, weiß u. rein, handgeleſen, Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ, 1 Ko. 4,50 ℳ. **Zeke (Musca),** 99er, feinſte, ſ. Ware, 1 Ko. 2,60 ℳ, 5 Ko. 12,50 ℳ. Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahr. ſelbſt erprobt, Ko. 1,80, 5 Ko. 8,50 ℳ, genau ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- u. Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ, ſolide Bedienung. Verſuch lohnt. [2185]
Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [2186]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Neu! Senſationell!

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, ohne Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [2187] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ſ. Ref. zu dienen.
Reparaturen aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt.

50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung.
Knochenmühlen
für Hühnerzüchter v. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt.**
[2188] Waren i. Mecklenb.
Proſpekte gratis.

Käfig,

6- oder 8eckig, 75×150 groß, mit oder ohne Zink, zu kaufen geſucht. [2189]
Hermann Kröner.
Ulm, Bierbrauerei zur Stadt.



Käfige jeder Art

(Preisliſte gratis) [illegible] preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[2190] **Oſchatz i. S.**

Hunde-Halsbänder

in ff. vernick. Metall mit Lederunterlage u. Namensgravur per Stück von 3–8 ℳ.
[2191] **H. D. Becker, Iſerlohn.**

„Canaria" Berlin.

XVIII. allgemeine Ausſtellung

von

Kanarienvögeln, Papageien, Exoten, in- und ausländiſchen Sing- u. Ziervögeln und Aquarien

vom 8. bis 12. December 1899

in Becker's Feſtſälen, Kommandantenſtraße 62. [2192]

Für alle Arten Vögel fertige ich **fachgemäße**

Volieren, Käfige und Niſtutenſilien

an höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige den Staatspreis. Große reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [2193]

Holzwaarenfabrik.

C. L. Flemming

Globenſtein, Poſt Rittersgrün, Sachſen
empfiehlt: [2194]
Flug- und Heckbauer, Einſatzbauer, Geſangskaſten.
Muſterpackete 9 St. ſort. f. Kanarienzüchter M. 6 franko.

Holzwaarenfabrik.



Man verlange Preisliste.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder [illegible] schlagen 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krahen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [2195]
K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Begründet von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 48. Magdeburg, den 30. November 1899. XXVIII. Jahrg.

Betrachtungen über Papageien-Krankheiten.[*]

Von Dr. med. Otto, Mülhauſen (Elſaß).

(Nachdruck verboten.)

In den letzten Jahren iſt es gelungen, infolge der Entwicklung der Mikroſkopie, die kleinſten Lebeweſen im Pflanzen- und Thierreich gründlich zu erforſchen. Ueberall ſind kleinſte Pilze entdeckt worden, und zwar meiſtens ſolche, die für Menſchen, Thiere und Pflanzen giftige, d. h. ſchädliche ſind. In dem erſten Schreck über dieſe neuen der Mikroſkopie geglückten Entdeckungen von Lebeweſen, welche ſich bis dahin unſern Augen entzogen hatten, jetzt aber unter dem Vergrößerungsglaſe auf jedem Nahrungsmittel, das wir zu uns nehmen, in jedem Schluck Trinkwaſſer und in jedem Athemzug Luft, die wir in den Lungen einathmen, ſichtbar werden, hat man vielfach den Kopf verloren und damit nüchterne Betrachtung und wiſſenſchaftliche Beobachtung außer Acht gelaſſen; eine Pilzangſt iſt entſtanden, die ſich aus faſt allen wiſſenſchaftlichen Werken widerſpiegelt.

Man hat ſich nicht überlegt, daß es dieſe kleinen Pilze ſtets gegeben hat, und daß man dieſelben nur deshalb nicht kannte, weil die Fortſchritte in der mikroſkopiſchen Technik noch nicht ſo weit gediehen waren wie heute. Man hat ſich nicht überlegt, daß es dieſe kleinen Pilze ſtets geben wird; und da die Menſchheit im allgemeinen in ihrer Entwicklung und Vermehrung bisher nicht gehindert worden iſt, ſo werden dieſe Pilze uns auch für die Zukunft nicht viel anhaben. Gleichwol dachte man bei jeder neuen Entdeckung eines Pilzes, daß Thiere und Menſchen auf die Dauer dieſen unzähligen Mengen nicht widerſtehen könnten.

Für den erſten Augenblick ſcheint es nun dennoch ſo, als ob dieſe Angſt und Schwarzſeherei berechtigt iſt; denn welche Zeit hat wol ſo viel Krankheiten bei Menſchen, Thieren und Pflanzen aufzuweiſen gehabt wie die unſrige?

Sollte es aber da nicht doch noch eine andere Erklärung geben? Ganz gewiß! Denn wie alle großen Pilzforſcher zugegeben haben, daß eine Erkrankung trotz zahlreicher vorhandener Pilze doch nur dann eintritt, wenn eine ſog. „Dispoſition“ vorhanden iſt, d. h. wenn eine Veranlagung zur Erkrankung bei Menſchen, Thieren und Pflanzen dargeboten wird, ſo dürfen wir auch umgekehrt mit Recht den Schluß ziehen, daß heute eine große Erkrankungsziffer das Vorhandenſein einer entſprechend weitverbreiteten Dispoſition beweiſt. Der Begriff Dispoſition oder Veranlagung zur Krankheit iſt nun noch keineswegs feſtgeſtellt. So viel man auch über die Pilze weiß, ſo wenig weiß man von der Dispoſition. Die Forſcher ſprechen von einem Nährboden für dieſe und jene Pilzart; z. B. wenn ein Menſch, Thier oder Pflanze erkrankt, ſo müſſen ſie, wird geſagt, in ihrer Säftemiſchung dem betreffenden Pilz einen Nährboden darbieten. Da aber nun weitere Schlußfolgerungen von der Pilzſchule bis jetzt nicht geliefert worden ſind, ſo haben die diäteriſchen Geſundheitsärzte und Biochemiker die Aufgabe, die große Lücke, die hier noch klafft, auszufüllen. Der Biochemiker ſagt: „Die Dispoſition zu einer Erkrankung hängt in erſter Linie von einer ſchlechten Säftemiſchung infolge falſcher Nahrung ab.“ Oder, anders ausgedrückt:

---

[*] Unter Benutzung einer Arbeit von Dr. Lahmann, des Erfinders des Nährſalzextraktes.

„Die Widerſtandsfähigkeit jedes Lebeweſens, ſei es nun Menſch, Thier oder Pflanze, iſt in erſter Linie von ſeiner normalen chemiſchen Zuſammenſetzung abhängig.“

Die Ernährungs-Phyſiologie (Lehre vom Menſchenleben) wußte bis dahin nichts weiter zu lehren, als daß die ſtickſtoffhaltigen Nahrungsmittel und vor allem jene thieriſcher Herkunft die wichtigſten Nährſtoffe ſeien, daß man vorzugsweiſe Fett und zuckerbildende Kohlenhydrate (Stärkemehl) genießen müſſe, und daß auch Mineralſtoffe (Nährſalze) in den Nahrungsmitteln ſeien.

Man hat ſich auf das vorzüglichſte mit der Chemie der Eiweißkörper beſchäftigt, weiß jedoch immer noch nicht, wie viel davon Menſch, Thier oder Pflanze nöthig hat. Von den Kohlenhydraten weiß man, daß ſie das Brennmaterial (Arbeitsmaterial) darſtellen; Fett kann man zur Noth entbehren, nicht aber die Nährſalze (Mineralſtoffe, Aſchen), deren zum Aufbau des thieriſchen Körpers 12 an Zahl nothwendig ſind (ſiehe Nr. 43).

Man weiß heute, daß die Sepſis der Vögel im allgemeinen und der Papageien im ſpeziellen mit allgemeinem Nährſalzmangel des Blutes zuſammenhängt, ſpeziell durch meine Unterſuchungen, die ſtockende Mauſer dagegen mit Mangel an Schwefel- und Kieſelſäure, und die Katarrhe und Lungenentzündung mit Natron-Mangel im Blute. Sollten alſo dieſe Mineralſtoffe, bzl. das Fehlen derſelben, nicht vielleicht der wichtigſte erklärende Umſtand bei der Erkrankung der Papageien ſein? An Eiweiß (Mais), Fett (Hanf) und Kohlenhydraten (Mais) iſt ja doch kein Mangel. Sollten alſo dieſe 12 Mineralſtoffe (Kali, Natron, Kalk, Magneſia, Eiſen, Mangan, Phosphorſäure, Schwefelſäure, Kieſelſäure, Kohlenſäure, Chlor, Fluor) nicht vielleicht wichtiger ſein als die Eiweiß- ꝛc. Stoffe? Ganz gewiß!

Zum beſſern Verſtändniß hier noch Folgendes: Nicht nur die menſchliche Ernährungslehre krankt an der von Liebig aufgeſtellten Eiweißtheorie, ſondern auch die Ernährungslehre der Thiere und Pflanzen. Von dem Menſchen überträgt man alles ſofort auf ſeinen Stubenbewohner, den Papagei, und füttert ihn mit allerlei eiweißreichen und zuckerreichen Nahrungsmitteln, wie Fleiſch, gekochtem Mais u. a. Die Pflanzen füttert (düngt) man mit thieriſchem und ſtickſtoffhaltigem Dünger, dazu kommt höchſtens noch Thomasſchlacke (phosphorhaltig) und einige kalihaltige chemiſche Düngemittel, weil man Phosphorſäure und Kali als die wichtigſten — weil am reichlichſten vorhandenen Mineralſtoffe — erkannte. Nun kommt aber eine Pilzkrankheit nach der andern, bei Menſchen Tuberkuloſe und Diphtherie, bei Papageien Sepſis, Lungenentzündung und Diphtherie, bei Pflanzen Zuckerrüben-, Kartoffeln- und Rebkrankheiten.

Was fehlt alſo den Menſchen, Thieren und Pflanzen? Mineralſtoffe fehlen ihnen! Aus der durch Jahrhunderte von Generationen ausgemergelten, nur ½ bis 1 ' tiefen Ackerkrume — denn tiefer pflügt man ja doch nicht — ſind die Mineralſtoffe völlig ausgeſogen. Die Mineralſtoffe aber machen erſt die einzelnen Pflanzenzellen und die Pflanzenſtoffe zu dem was ſie ſind, genau wie ſie das Blut beim Menſchen erſt vollwerthig machen. Die Loſung für die Landwirthſchaft heißt deshalb: Tiefer pflügen und graben und Mineraldünger (Steinmehl, Holzaſche) verwenden, d. h. diejenigen Mineralſtoffe, die dem Boden fehlen, durch Zufuhr in Natura gewähren. So iſt es bei uns, in unſerm kultivirten Boden. Sehen wir uns nun aber einmal die Heimath der Papageien an. Da exiſtirt in den Tropen ein noch jungfräulicher Boden, aus welchem die Mineralſtoffe noch nicht ausgezogen ſind. Wenn nun ſchon bei uns, in unſerm nährſalzarmen Boden, der Mais in Milch, die Hauptnahrung der Papageien, 3 % Nährſalze enthält, ſo iſt wol anzunehmen, daß der „Tropen-Mais“ (analog dem Reis: 4½ %) einen noch bedeutend höhern Gehalt aufweiſen wird, und es iſt nur ſchade, daß hierüber keine Analyſen da ſind; ſolche würden uns ſehr wichtige Aufſchlüſſe geben. In Uebereinſtimmung mit dieſer Vermuthung ſteht die ſehr gewichtige Thatſache, daß das Blut von Papageien, die im Urwalde geſchoſſen wurden, einen ſehr hohen Prozentſatz an „Nährſalzen“ enthielt, wie mir ein Freund am Congo, dem ich Auftrag ertheilt, dort Unterſuchungen anzuſtellen, mitgetheilt hat. Es folgt auch hieraus, daß der Papagei, beſonders der Graupapagei ein ſehr „nährſalzreiches“ Futter haben muß. Der Graupapagei alſo, der in ſeiner Heimat ein mindeſtens 3 % nährſalzreiches Futter frißt, muß vor allem an der Sepſis erkranken, ſobald er auf's Schiff kommt, da verfaulte Früchte, gekochter Kaffe und eingeweichter Schiffszwieback kein geeignetes Futter darſtellen, deshalb nicht geeignet, weil darin die „Nährſalze“ faſt vollſtändig fehlen. Der Papagei, insbeſondere der graue, erhält alſo die „Dispoſition“ zur Erkrankung durch die verkehrte Schiffsfütterung, wozu noch der Abſchluß der guten Luft kommt. Gute Luft aber iſt nothwendig, den Lungen Sauerſtoff zuzuführen und Kohlenſäure auszuſcheiden, welches Letztere um ſo bedeutungsvoller iſt, als durch die falſche, nährſalzarme Nahrung die Anhäufung der Kohlenſäure größer iſt, als ſie ſonſt, unter normalen Verhältniſſen, ſein würde. Es ſind alſo zwei Hauptfaktoren, die bei der Erkrankung jedes Papageien ſowol auf dem Schiff als hier in Betracht kommen, nämlich: 1. ſchlechte, ozonarme Luft, 2. nährſalzarme Ernährung.

Wenn behauptet wird, daß der Graupapagei früher ein ſehr kräftiger, ausdauernder Vogel geweſen, ſiehe Ruß: „Die ſprechenden Papageien“, heute hingegen weichlich ſei, ſo erklärt ſich dieſes wol daraus, daß die Papageien früher auf Segelſchiffen in mäßiger Anzahl und von Haus aus kräftig importirt wurden; heute hingegen auf Dampfſchiffen und maſſenhaft zuſammengepfercht, wo dann die Bedingungen unter 1 und 2 nur zu ſehr zutreffen. Gewährt man nun dieſen mangelhaft verpflegten, mit nährſalzarmem Futter verſehenen „Grauen“ nach der Ankunft hier eine nicht viel nährſalzreichere Nahrung und vielleicht auch kein lüftbares Zimmer, ſo müſſen dieſe Thiere maſſenhaft, jedenfalls bis zu 50 %, an Sepſis, Lungenentzündung, Magen-, Darmkatarrh dahinſterben; denn welche wichtige Beſtimmung die „Nährſalze“ für den thieriſchen (menſchlichen) Organismus haben, zeigte ich in meinem letzten Aufſatze (Nr. 43). Ich kann mich heute nicht auf die einzelnen Papageien-Krankheiten einlaſſen, ſondern will nur ſummariſch bemerken, daß die häufigſten Krankheiten, wie Schnupfen und Huſten, Lungenentzündung, Sepſis, Magen-, Darmkatarrh, Diphtherie mit

Digitized by Google

ſondern entweder mit Steinmehl und Holzaſche düngt oder die Frucht auf noch jungfräulichem Boden angebaut hat.

Die Ernährung der Papageien hat alſo folgendermaßen zu geſchehen:

I. Täglich Hanf als Hauptfutter.
II. Täglich Reis, Haſer, Spitzſamen, Nüſſe als Miſchfutter.
III. Wöchentlich 2 Mal erweichter oder trockner Mais.
IV. Milch, Weintraubenſaft, Kirſchſaft als flüſſige Nahrung.

Mit dieſem Futter, nebſt täglich guter friſcher Luft und geeigneter Federpflege werden brillante Erfolge zu erzielen ſein.

Beobachtungen aus der freilebenden Vogelwelt.

Aus dem Sauerlande.

Von W. Hennemann, Lehrer. (Nachdruck verboten.)

Anſchließend an die letzten Mittheilungen aus unſern Bergen, in den Nrn. 19 und 20, ſeien nachfolgend meine weiteren Beobachtungen aus dieſem Jahr mitgetheilt.

Die naßkalte Witterung des April, der nur wenige Tage hatte, an denen die Sonne vom Morgen bis zum Abend ohne Unterbrechung auf den Erdboden einzuwirken vermochte, hielt, wie bereits mitgetheilt, manche Vögel in ihren Brutgeſchäften auf. Wenn beiſpielsweiſe die Finken ſich ſchon Ende März und anfangs April, als noch mildes Wetter herrſchte, für ihre Bruten rüſteten, ſo ſchritten ſie doch erſt allgemein in der letzten Aprilwoche, als die Temperatur wieder zu ſteigen begann, zum Niſten. Vollzählige Gelege des Buchfinks (Fringilla coelebs, *L.*) konnten hier erſt in den Tagen des 9. und 10. Mai gefunden werden; während, ſelbſt bei wenig günſtiger Witterung, in den meiſten Jahren die Gelege bereits Ende April fertiggeſtellt ſind. Ein Goldammerneſt (Emberiza citrinella, *L.*) enthielt am 6. Mai drei Eier; ein viertes und letztes Ei fand ich am folgenden Tage vor. Ein andres Ammerneſt fand ich am 8. d. Mts; dieſes enthielt fünf Eier. Wie bei Finken und Ammern, ſo wurden auch bei den Lerchen ſpäte Bruten bemerkt.

Am 10. Mai, einem regneriſchen Tage, an welchem das Thermometer in der Mittagsſtunde kaum + 10 ° R. erreichte, kehrten die Thurmſchwalben (Cypselus apus, *Ill.*) zurück. Am 13. d. Mts, als nach heiterem, warmen Morgen ſich nachmittags ſchwere Gewitter entluden, bemerkte ich gegen Abend bei einem Gehöft in der Nähe unſeres Dorfes den erſten Würger (Lanius collurio, *L.*). Als dann, allerdings nur bis zum 20. hin, eine weitere Erwärmung ſtattfand, kehrten auch die Hausſchwalben (Hirundo urbica, *L.*) zahlreicher zurück, nachdem ſie einzeln bereits im April angelangt waren. Immerhin waren auch in dieſem Jahr, gleichwie im Vorjahr, die Hausſchwalben nicht ſo zahlreich vertreten, als früher; während die Segler in entſchieden größerer Anzahl als im vorigen Jahr eintrafen. Es ſcheint faſt, als ob die Segler mit ihrem die Luft erfüllenden Geſchrei und ihrem unſtäten, ſtürmiſchen Weſen die Hausſchwalben mehr und mehr verſcheuchten. Auch die Rauchſchwalben (H. rustica, *L.*), welche bei uns vorwiegend die Gehöfte bewohnen, waren nicht ſo häufig als früher zu ſehen. Wahrſcheinlich ſind manche der Ungunſt der Witterung zur Zeit ihrer Rückkehr im April erlegen.

Bei kühlem Juniwetter mit vorherrſchenden Nordweſtwinden, welche namentlich in den Tagen vom 7. bis 9. d. Mts öfters Höhenrauch, jenen ſchwefligen, aus den Moorgegenden Norddeutſchlands aufſteigenden Qualm, über unſre Berge trugen, ſchritten die Schwalben recht ſpät zur Brut. Wenn überhaupt, ſo dürfte eine zweite Brut doch nur vereinzelt ſtattgefunden haben. Junge Gartenrothſchwänze (Ruticilla phoenicurus, *L.*), welche von den Alten geätzt wurden, ſah ich am 2. Juni, eine Spechtmeiſenfamilie (Sitta caesia, *M.*) mit flüggen Jungen am 7. d. Mts.

Am 6. Auguſt, einem heißen, gewitterreichen Tage, verließen uns die Thurmſchwalben, alſo am ſelben Tage, wie im vorigen Jahr.*) Am folgenden Tage verſammelten ſich die Hausſchwalben zum erſten Mal zu ihren Flugübungen.

Es kam der September. Nach ſommerlicher Wärme der erſten Woche trat eine plötzliche Abkühlung der Luft ein, ſodaß unterm 10. d. Mts bereits aus dem oberen Sauerlande der erſte Schneefall gemeldet wurde. Die betr. Zeitungsnotiz lautete: „Heute Abend gegen 6 Uhr hatte ein Schneegeſtöber in kurzer Zeit das Plateau des Aſtenberges mit einer weißen Decke gekleidet. Dabei ſteht die Ernte noch größtentheils auf den Feldern.“ Es war die Zeit der Abreiſe für viele Vögel gekommen. Die Hausſchwalben waren zumeiſt vor Mitte des Monats ihren Winterherbergen zugeeilt. Vorüberziehende Wanderer aus nördlicheren Gegenden zeigten ſich merkwürdigerweiſe noch wochenlang. So ſah ich z. B. noch am 3. Oktober etwa zwei Dutzend Schwalben in unſerm Thal. Recht zahlreich ſtellten ſich Mitte September außer Meiſen, Zaunkönigen und Spechtmeiſen auch Baumläufer (Certhia familiaris, *L.*) in den Dorfgärten ein, hier und da auch einige Goldhähnchen (Regulus cristatus, *K.*). Am 17., einem ſtürmiſchen Tage, bemerkte ich noch einen grauen Fliegenſchnäpper (Muscicapa grisola, *L.*) in einem Obſtgarten, was in Anbetracht der ſpäten und überdies kalten Zeit auffallend erſchien.

---

*) Vergl. Nr. 46 der „Gefied. Welt“ 1898.

Auf einer Wandrung nach dem Aſtenberge (842 m über dem Meeresſpiegel), der höchſten Erhebung unſres Berglandes, in den Tagen des 6. und 7. Oktobers, zeigten ſich auf den überreich mit Beren beladenen Ebereſchenbäumen große Schwärme Buchfinken und Hänflinge; auch bemerkte ich in der Nähe des ehemaligen Benediktinerkloſters zu Grafſchaft nordiſche Droſſeln (Turdus iliacus, *L.* et pilaris, *L.*) auf dieſen Bäumen. Zwiſchen den Ortſchaften Nordenau und Altaſtenberg, letztere 784 m hoch gelegen und das höchſtgelegene Dorf des Sauerlands, trieb ſich ein Schwarm Diſtelfinken (Fringilla carduelis, *L.*) auf den Aeckern umher. Im oberen Lennethal waren bereits zahlreiche Bergfinken (F. montifringilla, *L.*) eingetroffen aus ihrer nordiſchen Heimat. Selbſt in den höchſtgelegenen Dörfern waren Bachſtelzen (Motacilla alba, *L.*) und Rothſchwänzchen (Ruticilla titys, *L.*) noch zahlreich anzutreffen; an den Bächen zeigten ſich Gebirgsſtelze (M. sulphurea, *L.*) und Waſſeramſel (Cinclus aquaticus, *L.*) häufiger. Auf dem Plateau des Aſtenbergs, deſſen Vegetation auch einige nordländiſche Gewächſe aufzuweiſen hat, wie z. B. die isländiſche Moosflechte (Cotraria islandica), vernimmt man ab und zu Krähen- und Hehergekrächze.

Mitte Oktober traten Nachtfröſte ein, ſo regelmäßig und anhaltend, wie es zu dieſer Zeit ſelten der Fall iſt. Immerhin konnten in den warmen Mittagſtunden noch Lerchenlieder vernommen werden, ſo am 19. d. Mts. Am 25., einem ungemein nebligen Tage, bemerkte ich auch hier — im mittleren Lennethal — bereits Bergfinken; doch war es nur ein kleiner Flug, der ſich im Erlengebüſch eines Bergbaches niedergelaſſen hatte. Am Nachmittage des 26. zog gegen 5 Uhr ein Zug Kraniche, in der bekannten Hakenform geordnet, in ſüdweſtlicher Richtung über unſer Dorf. Weil nun die Hauptzugzeit dieſer Vögel gekommen war, begab ich mich andern Tags auf die Höhen und konnte daſelbſt noch weitere zwei Züge beobachten, ſeitdem allerdings keinen mehr. Uebrigens werden viele dieſer Wanderungen auch des Nachts ausgeführt, wo dann weiter nichts als das Rufen der Vögel wahrzunehmen iſt. Erwähnt ſei noch, daß der zuerſt beobachtete Zug etwa 40 bis 50 Köpfe zählte, die beiden anderen Züge waren nur halb ſo ſtark. Bei klarem Wetter zog am Morgen des 28. ein nach Tauſenden zählender Schwarm Zugvögel, eine wolkenähnliche Maſſe ausmachend, hoch am weſtlichen Himmel dahin. Eine Beſtimmung war mir nicht möglich. Auch ſah ich an dem Tage die erſten Nebelkrähen (Corvus cornix, *L.*), welche auf den Aeckern am Waldrande ihrer Nahrung nachgingen.

Der November hatte in ſeinen erſten Tagen freundliches, warmes Wetter. Am 2. traf ich in einem Waldthal einen Grünſpecht (Picus viridis, *L.*) an, in deſſen Nähe mehrere Spechtmeiſen, an den Baumſtämmen auf und ab laufend, ihrer Nahrung nachgingen. Auf der Höhe trieben ſich bei einem Bauernhofe zahlreiche Grauammern (Emberiza miliaria, *L.*), auf den Stoppelfeldern umher; einem noch größeren Schwarm dieſer Vögel begegnete ich am 8. d. Mts. Am Morgen des 3. ſaß ein Schwarm Diſtelfinken in den Linden vor unſerm Schulhauſe. Früher niſtete dieſer Fink zahlreicher bei uns; im letzten Jahr war mir nur ein einziges Neſt beim Dorf bekannt. Es iſt auffallend, daß der muntere, kecke Vogel ſo ſelten geworden iſt, während beim Buchfink eine ſtändige Zunahme wahrzunehmen iſt. Umſomehr erfreuen deshalb die im Herbſt in Schwärmen in den Feldern und Gärten umherſchweifenden farbenprächtigen Vögel, welche aus anderen Gegenden zuwandern, das Auge des Beobachters. Am 6. d. Mts ſah ich die letzten weißen Bachſtelzen am Ausfluß eines Mühlteiches nahrungſuchend einherlaufen. Sie gehörten zu den wenigen dieſer Vögel, welche nach dem Froſtwetter im Oktober noch zu ſehen waren. Wenige Schritte weiter gegangen, vernahm ich das Klopfen eines Buntſpechts (Picus major, *L.*) und bemerkte unter den in ſeiner Geſellſchaft ſich befindenden Goldhähnchen und Meiſen auch ein einzelnes feuerköpfiges Goldhähnchen (Regulus ignicapillus, *Lath.*), welches gleich dieſen, geſchäftig im Gebüſch kletternd und flatternd, ſeiner Nahrung nachging. Es war das erſte Mal, daß ich dieſes hübſche Vögelchen in Gemeinſchaft mit der etwas größeren Art beobachten konnte. Außerdem fiel es mir auf, noch ſo ſpät es zu ſehen, da dieſe Art gegen den Herbſt hin ſüdwärts wandert. In der Mittagſtunde des 10. d. Mts traf eine Schar Stare beim Dorf ein, welche in Geſellſchaft mit Dohlen und Krähen über Felder und Gehölze jagten. Auf meinen Wanderungen über die Höhen zu Ende des Oktobers konnte ich nirgends mehr Stare antreffen. Ungemein zahlreich war gegen Mitte des Novembers der Zaunkönig hier vertreten, deſſen lautes Schnarren häufig noch in der Dämmerung zu vernehmen war. Nachdem im vorigen Herbſte im nahen Verſethal ein grünfüßiges Teichhuhn (Fulica chloropus, *L.*) erlegt worden war, konnte ich auch in der diesjährigen Zugzeit ein ſolches auf einem Teich in der Nähe unſres Dorfs am 13. November feſtſtellen. Es war unterhaltend, den Taucherkünſten des behenden Vogels zuzuſehen, in deſſen Nähe ſich auch einige Krickenten tummelten.

Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang.

Von R. Groſſe.

(Fortſetzung).

(Nachdruck verboten.)

Die für den Züchter am meiſten verhängnißvolle Zeit der Geſangsausbildung der Junghähne beginnt ohne Zweifel mit der Einzelhaft der Letzteren. Ueber den Beginn der Einbauerung gehen die Anſichten noch vielfach auseinander. Ein Theil der Züchter hält es für vortheilhaft, die Vögel vor der Mauſer in kleine Käfige zu ſtecken, ein anderer Theil meint, die jungen Vögel müſſen bis zur Vollendung ihrer körperlichen Ausbildung, das ſei nach vollendeter Mauſer, freie Bewegung in Flugräumen haben. Was die letztere Anſicht anlangt, ſo vermag ich dieſelbe deshalb nicht vollſtändig zu theilen, weil nicht feſtſteht, daß der Vogel mit dem Ende der erſten Mauſer auch ſeine Körperentwickelung vollendet hat. Ich möchte vielmehr die von ſachverſtändiger Seite uns übermittelte Meinung theilen, daß der Vogelkörper zu ſeiner vollſtändigen Ausbildung ein Jahr gebraucht und daß es zweckmäßig iſt, Vögel nicht früher zur Fortzucht zu verwenden, als bis ſie dieſes Alter hinter ſich haben. Der wirthſchaftliche Zweck, den wir mit unſerer Liebhaberei verfolgen, geſtattet uns aber nicht, die Vögel ſolange zu behalten, bzw. ſie über ein Jahr zu füttern, ohne irgend welchen Nutzen von ihnen zu ziehen. Dieſer Umſtand ſowol, als auch die gemachte Wahrnehmung, daß unſere Kanarienvögel den Federwechſel in kleinen Käfigen ebenſo naturgemäß und vollkommen vollziehen, wie in geräumigen Flugkäfigen, und daß ſie ſich hier ebenſo vollkommen entwickeln, haben denn auch vielfach zu der Ueberzeugung geführt, daß die Einbauerung der Junghähne ohne Nachtheil ſowol vor wie nach der Mauſer erfolgen kann. Während des Federwechſels vermeidet man ſie vortheilhaft, weil in dieſer Zeit jede Störung und Beängſtigung der Vögel ſorgfältig zu vermeiden iſt. Der fühlbare Wechſel eines geräumigen Käfigs mit einem kleinen Bauerchen beängſtigt unſere kleinen Sänger aber anfänglich ſehr und würde u. a. ein Steckenbleiben in der Mauſer verurſachen. Vögel, die aus irgendwelchem Grunde die Mauſer unterbrochen haben, fangen zur Unzeit wieder an zu mauſern und hören dann auch wieder auf zu ſingen. Ich bin gleichfalls für den Beginn der Einzelhaft nach der Mauſer und zwar lediglich aus dem Grunde, weil vor dem Federwechſel mit dem Geſange noch nicht viel anzufangen iſt, und weil ich es den kleinen Thierchen gönne, daß ſie ſich bis zum Beginn ihrer endgültigen Geſangsausbildung frei umhertummeln können, ſtill ſitzen müſſen ſie ohnedies noch lange genug. Außerdem iſt auch die Pflege und Abwartung der Nachzucht in geräumigen Flugkäfigen eine einfachere und weniger zeitraubende als in Einzelbauern. Wenn nun die männliche Nachzucht in kleine Käfige oder beſſer noch in ſogenannte Gimpelbauer eingelaſſen worden iſt, ſo werden ſie in Geſangsrücken dicht nebeneinander aufgeſtellt und zwar zunächſt ſo, daß ſie ſich gegenſeitig ſehen können, alſo ohne die Bauerchen durch eingeſchobene Pappdeckel oder Brettchen von einander zu trennen. Anfänglich werden ſie in dieſer neuen Behauſung, die gegen den früheren Aufenthaltsort unverhältnißmäßig eng iſt, die Geſangsübungen einſtellen; aber es währt nur kurze Zeit, bis der eine oder andere der Junghähne wieder zu üben beginnt, ſchon nach wenigen Tagen wird die ganze Geſellſchaft wieder flott zu lernen anfangen und nach 14 Tagen kann der Züchter die Bauer durch eingefügte Bretter oder Pappdeckel trennen, ſodaß ſich die Vögel gegenſeitig nicht mehr ſehen können. Die täglichen Prüfungen der Geſangsfortſchritte der fleißig übenden kleinen Sänger, welche bald bemerkbar ſein werden, müſſen nun eingehende ſein und öfter wiederholt werden. Es wird ſich empfehlen, diejenigen Junghähne, welche durch aufrechte, ruhige Körperhaltung, und durch ſichtbar ſtarkes Aufblähen des Kropfes und durch den Vortrag der Anfangsgründe mit geſchloſſenem Schnabel hoffen laſſen, daß ſie ſpäter einmal etwas Tüchtiges leiſten werden, zuſammenzuſtellen; denn aus ihrer Mitte wird der Züchter ſpäter die Zierde ſeiner Vogelſtube entnehmen. Es währt nur verhältnißmäßig kurze Zeit, bis aus den Uebungen der Nachzucht die Rollen, Klingeln, Knorren und Pfeifen herausgehört werden können, mit welchen guten Strofen ſich aber auch in jedem, auch dem beſten Stamm geſangliche Unebenheiten einſtellen, die ſorgfältig ausgemerzt werden müſſen, wenn ſie nicht um ſich greifen und die Arbeit der Geſangsausbildung für den Züchter zu einer recht ſchwierigen geſtalten ſollen. Dieſe Ausartungen ſind einmal auf die Launenhaftigkeit der Vererbung zurückzuführen, andrerſeits ſind ſie eine Folge des Rückſchlages. Man wird bei den auftretenden Fehlern ſelbſtredend einen Unterſchied zwiſchen ſolchen machen müſſen, die den Geſang nur dann für das Ohr minder angenehm geſtalten, wenn ſie überhand nehmen, und zwiſchen ſolchen, die das Lied des Vogels werthlos machen, wenn ſie überhaupt gebracht werden. Zu der erſteren Klaſſe rechne ich z. B. die ſpitzen Pfeifen und harte, ſcharfe Aufzüge, welche zwar in mäßigem Umfange ſelbſt einem erſten Preisvogel geſtattet, die aber als Fehler angerechnet werden, wenn ſie der Vogel unverhältnißmäßig oft und ſcharf zu Gehör bringt. Es kommen aber unter den meiſten Stämmen ſolche Junghähne vor, die, bevor ſie die edlen Geſangsſtrofen erfaßt haben, bzw. dieſelben vortragen können, recht viel in ſchrillen Pfeifen und ſcharfen Aufzügen ſich ergehen, und dieſe müſſen aus der Menge entfernt werden, andernfalls auch die beſſer veranlagten Kameraden dieſe ſtörenden Töne aufnehmen und ihrem Liede einverleiben; denn alle jungen Hähne neigen zur Aufnahme von kurzen und ſpitzen Tönen und dieſe Mißklänge ſpäter ausmerzen zu wollen, iſt oft mit großen Schwierigkeiten verbunden. Solche Vögel ſind nun aber keineswegs von vornherein als werthloſe Sänger zu behandeln und etwa gar unter den Ausſchuß zu verſetzen; aus ihnen können ſich vielmehr noch ſehr gute Sänger entwickeln, wenn die edlen Geſangsſtrofen, die vielleicht in ihnen ſchlummern, zur Geltung kommen und die erwähnten unangenehmen Töne verdrängen. Deshalb iſt zu rathen, dieſe Sprößlinge zwar aus der Hörweite der übrigen Junghähne zu entfernen, ihnen aber immer noch tüchtige Vorſänger, die in ihrem Vortrag feſt ſind, beizugeben. Anders verhält es ſich mit denjenigen Größen, die im Verlauf ihrer Uebungsverſuche Strofen ꝛc. hören laſſen, welche ſie von vornherein werthlos machen; zu dieſen Geſangsergüſſen gehört in erſter Linie die Schnetter oder eine mit weit geöffnetem Schnabel gebrachte breite Pfeife (ich habe ſie in Züchterkreiſen immer mit dem Namen „Schweinepfeife“ nennen hören), oder das widerliche „Zitt“ oder auch „Zapp“. Vögel, die ſolche Untugenden an ſich haben, ſind für Züchter und Liebhaber feiner Vögel, die wirkliche Kenner ſind, ohne jeglichen Werth und können nur vom Händler jenſeits des Meres Verwerthung finden, ſie paſſen nicht für ein feineres Ohr, ſie gehören unter die ſogenannte Landraſſe, alſo in ein abgelegenes Zimmer mit ihnen oder noch beſſer, baldigſt aus der Wohnung des Züchters, denn ſie ſind das Futter, das ſie freſſen, nicht werth. Bezüglich der Behandlung dieſer drei Klaſſen von Sängern mag noch geſagt ſein, daß die erſtere fehlerfreie Abtheilung, die geſangliche Unebenheiten nicht enthält oder wenigſtens vorläufig nicht hören läßt, für's erſte nicht verdunkelt zu werden braucht, ſie wird ſich auch ohne Verdunkelung gut weiterbilden. Die zweite Abtheilung, die noch Hoffnung auf Beſſerung gewährt, mag durch angemeſſene Verdeckung in Schranken gehalten, und die dritte Klaſſe endlich, der ſogenannte Ausſchuß, ſoll, ſolange er in der Behauſung des Züchters iſt, „verfinſtert“ werden. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Geſangserfolge umſo durchſchlagendere ſind, je ſorgfältiger auf die Geſangsübungen der Junghähne geachtet wird und je peinlicher dieſelben nach ihren Leiſtungen getrennt werden, ohne daß dabei in der Ausmerzung gleich weit gegangen wird. Wird aber ſchon im Anfange der Geſangsausbildung gleichgültig verfahren, werden vorwiegend die täglichen Geſangsprüfungen unterlaſſen oder vernachläſſigt, dann iſt ſpäter des Ausmerzens kein Ende und der Verdruß über die Geſangserfolge groß.

Ueberlaſſen wir nun unſere kleinen Schüler für kurze Zeit ihren Geſangsübungen, ſelbſtredend in der Erwartung, daß ſie nur Gutes leiſten, und beſchäftigen wir uns etwas mit den einzelnen Strofen des Kanarienvogelliedes im Hinblick darauf, daß jeder Züchter, der ſeine Nachzucht zweckentſprechend ausbilden will, auch den edlen Geſang kennen muß. Die jetzige Geſangsrichtung, welche ſchon ſeit der Zeit, in welcher die Kanarienzucht eine weitgehendere Ausbreitung annahm, in welcher die Kanarienzüchtervereine zahlreicher wurden und die Ausſtellungen ſich mit jedem Jahr vermehrten, das Feld beherrſcht, hat es zuwege gebracht, daß alle andern Geſangsleiſtungen der Kanarienvögel, die nicht in den Rahmen dieſer Richtung hineinpaßten, allmählich beiſeite geſchoben wurden und jetzt nur noch vereinzelt aufzufinden ſind, ohne jedoch bemerkbar zur Geltung zu kommen. Es läßt ſich nicht leugnen, daß dieſem Fortſchritt, wenn wir das Beſtreben, den jetzigen Modevogel zur Geltung zu bringen, ſo nennen wollen, ſo manche Geſangsſtrofe, die das Ohr des Zuhörers erfreute und die auch in der That ſchön war, zum Opfer gefallen iſt und zwar lediglich deshalb, weil ſie für die Zuchtzwecke nach der jetzigen Weiſe nicht geeignet erſchien und es wohl auch nicht war. Vor dem Auftreten des Truteſchen Hohlrollers wurden vorwiegend Koller- und Gluckvögel gezüchtet und in den Handel gebracht. Die Züchter mußten aber bald die Erfahrung machen, daß ſie mit dieſen Vögeln ihr Vorhaben, das Lied des Kanarienvogels zu einem langen, tiefen Vortrage mit weichem Schmelz zu geſtalten und aus demſelben die übelklingenden Töne und Strofen zu beſeitigen, nicht erreichen konnten, ſie erkannten weiter bald, daß ein Koller- und Gluckvogel für die Hohlrolle mit ihren wunderbar ſchönen Verſchiedenheiten ſich nicht eignete, und da bald die Hohlrolle allgemein beliebt wurde und Vögel mit dieſer Glanzſtrofe ſchnell und zu hohen Preiſen Abſatz fanden, ſo wandte man den Koller- und Gluckvögeln den Rücken und züchtete faſt ausſchließlich den Truteſchen Hohlroller, welcher auch heute die Geſammtlage beherrſcht.

(Fortſetzung folgt.)

Anfragen u. Auskunft

Herrn Apotheker O. Höfel: 1. Wenn Sie Ihrer Sache durchaus ſicher ſind, ſo bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als den gerichtlichen Weg zu betreten. Ihre Sache wird dann durch Sachverſtändige entſchieden und Ihnen von Rechtswegen zu Theil werden, was Ihnen zukommt. 2. Ob die Lerchen in dem von Ihnen angezogenen Werke behandelt ſind, vermögen wir Ihnen nicht zu ſagen, da es uns bisher nicht vorgelegen hat.

Herrn Anton Olsewski Uscieryki: 1. Die von Ihnen angegebene Fütterung und Verpflegung Ihrer Feuerflügelſittiche iſt richtig, nur möchten wir Ihnen rathen, den Vögeln *vorzugsweiſe* Kanarienſamen oder Glanz, nur *wenig* Hanf und viel Hafer zu reichen; unter Zugabe von guter Frucht (beſonders Aepfel) und Biskuit oder erweichter, ausgedrückter Semmel oder eingeweichtem Eierbrot. 2. In den uns beſchriebenen Flugkäfig können Sie die Feuerflügelſittiche leider nicht ſetzen, einerſeits da dieſe Vögel gegen Kälte behütet werden müſſen, und andrerſeits weil ſie ſich mit den Inſaſſen dieſes Raumes nicht vertragen würden. 3. Loris von den blauen Bergen dagegen halten ſich bei einer ziemlich niedrigen Temperatur und laſſen ſich auch freifliegend in einem großen Flugkäfig beherbergen, allerdings nur, wenn man die Vorſicht beachtet, ſie allmählich an die obwaltenden Verhältniſſe zu gewöhnen. Läßt man ſie ſogleich nach der Ankunft plötzlich in die Vogelſtube, ſo droht zweierlei Gefahr: nämlich die, daß ſie ſich an lockeren, ungewohnten Nahrungsmitteln krank freſſen oder durch die Aufregung infolge des durch ſie hervorgerufenen Aufruhrs erkranken, andrerſeits die, daß ſie ebenfalls aus Aufgeregtheit über alle anderen Vögel herfallen und jeden totbeißen oder ſchwer verwunden, den ſie erwiſchen können. Wenn ſie aber zunächſt in einem Käfige gehalten werden und ſich nach und nach eingewöhnen können, ſo laſſen ſich jene Uebelſtände meiſtens vermeiden. Freilich zeigen ſich manche Pärchen auch ſpäterhin durchaus unverträglich, ſodaß man ſie nicht in der Vogelſtube beherbergen darf, während andere inmitten einer großen, gefiederten Geſellſchaft durchaus harmlos ſind. Am beſten würde ein Pärchen Singſittiche Ihren Wünſchen entſprechen. Es benimmt ſich unter kleineren Vögeln verträglich, ſchreitet meiſt bald zur Brut und läßt ſich ſelbſt im ungeheizten Raum überwintern. 4. Ihr Rothkehlchen bedarf außer dem von Ihnen gereichten Futter einer täglichen Zugabe von friſchen Hollunderberen. Auch an Schaben, Engerlingen, Stubenfliegen u. a. kleinen Kerbthieren darf es ihm nicht fehlen. Die Anzahl der Mehlwürmer können Sie bis auf täglich ſechs vermehren und auch die getrockneten, angequellten Ameiſenpuppen dürfen Sie dem Vogel reichlicher geben. 5. Unter den gegebenen Verhältniſſen muß die Nahrung Ihrer Sproſſer in den Wintermonaten, Oktober bis Anfang Januar, möglichſt wenig fettbildende Stoffe enthalten. Am empfehlenswertheſten iſt ein Miſchfutter aus gekochtem, geriebenem Rinderherz, getrocknetem Ameiſenpuppen, geriebener Gelbrübe (Möre), gut vermiſcht und etwas ausgedrückt zu reichen. Leider haben Sie nicht angegeben, ob bei Ihren Sproſſern zugleich Verſtopfung eingetreten iſt. In dieſem Fall müßten entſprechende Heilmittel angewendet werden. Bei Verfettung allein genügt es, das genannte Futter zu reichen und die Vögel in einen geräumigen Käfig, in dem ſie ſich möglichſt viel Bewegung machen können, zu ſetzen. Während der Singzeit reichen Sie ihnen ohne Bedenken aber wieder das übliche Futter: einen gehäuften Eßlöffel voll friſcher Ameiſinpuppen und bis über zwanzig Mehlwürmer.

Herrn Joſef Porzelt: 1. Die Angabe des Händlers, daß grüne Kardinäle zugleich Körner- und Weichfutter bedürfen, iſt vollkommen richtig. Aus dieſem Grunde haben wir Ihnen in der Antwort in Nr. 46 auch gerathen, dieſen Vögeln außer verſchiedenen Sämereien, etwas Ei, Eierbrot, Kerbthiere u. a. zu reichen. Als Ergänzung möchten wir heute noch erwähnen, daß man dieſen Kardinälen zur Heckzeit ein reiches Miſchfutter gibt, beſtehend aus angequellten Ameiſenpuppen, Ei, feingehacktem rohem Fleiſch, geriebenem Weißbrot (gl. Th.), alles gut untereinander gearbeitet und ſchwach angefeuchtet, mit oder ohne Zuſatz von Korinten. Da Ihre Kardinäle indeſſen an ein anderes Weichfutter gewöhnt ſind, ſo iſt es rathſam, daß Sie dieſe Fütterung nicht ändern. Hauptſache muß aber das Körnerfutter bleiben. 2. Um nun die Vögel dahin zu bringen, außer Kanarienſamen auch die übrigen ihnen dienlichen Sämereien zu nehmen, entziehen Sie ihnen den erſteren allmählich mehr und mehr, reichen dagegen von letzterem immer größere Gaben. Da jedoch die grünen Kardinäle als weichliche Vögel bekannt ſind, muß ihre Gewöhnung an fremde Futtermittel recht allmählich vor ſich gehen. Reichen Sie den Vögeln übrigens auch die Ihnen in Nr. 46 genannten Futterzugaben. Zur Erhaltung der Kardinäle ſind dieſelben durchaus nothwendig.

Briefliche Mittheilungen.

... Seit ſieben Wochen beſitze ich eine von A. Fockelmann-Hamburg bezogene Schamadroſſel zu meiner größten Zufriedenheit. Ich erhielt den Vogel in der Mauſer, und dennoch ſang derſelbe täglich viele Stunden. Jetzt iſt er untadelhaft ſchön, ſingt laut bei großer Mannigfaltigkeit des Geſanges, hält ſich äußerſt ſchmuck und reinlich, geht faſt nie auf den Käfigboden, iſt ganz ruhig bei Licht und ſo zahm, daß er die Mehlwürmer aus der Hand nimmt, und befindet ſich bei Voß'ſchem Univerſalfutter für Nachtigalen mit gut ausgepreßtem, friſchem Topfenkäſe mit etwas Ei und Ameiſenpuppen, wöchentlich 2 bis 3 Mal vermiſcht mit feingeſchnittenem, rohem Rindfleiſch und beſtem Schiffer'ſchen Garneelenſchrot, bei täglich 10 bis 12 Mehlwürmern geſund und wohl. Der ſchöne, herrlich ſingende Vogel iſt die Freude meiner Familie, und kann ich deſſen Schilderung in Nr. 19 der „Gefiederten Welt“, Jahrgang 1899, als durchaus zutreffend erklären.

Anné, kgl. Regierungsrath.

Zu unſerm Bilde.

In der Züchtung eines ſeltenen, überaus zarten und ſchwer am Leben zu erhaltenden Vogels liegt für den erfahrenen Vogelwirth ein großer Reiz, umſomehr, wenn dieſer Vogel von außerordentlicher Schönheit, Farbenpracht und Anmuth iſt. Es iſt daher erklärlich, daß der blaugrüne Plattſchweifſittich oder Paradisſittich (Psittacus pulcherrimus, *Gld.*), der wol hinſichtlich Farbenpracht und -Mannigfaltigkeit von keinem ſeiner Verwandten übertroffen wird, aber auch zugleich erfahrungsgemäß der hinfälligſte iſt, mehr als andere Papageien zu Zuchtverſuchen verlockte. In eifrigſter Weiſe beſchäftigten ſich zahlreiche Vogelfreunde mit ihm, obgleich es anfangs garnicht gelingen wollte, ihn für längere Zeit überhaupt nur am Leben zu erhalten. Die erſte Züchtung glückte 1880 in der Vogelſtube des Prinzen Ferdinand von Sachſen-Koburg-Gotha, des ſpäteren Fürſten von Bulgarien, wo ein Junges flügge wurde; zwei Jahre darauf erzielte Frau Prinzeſſin von Croy auf Schloß Roeulx in Belgien eine Brut von vier Jungen, nachdem bei ihr ſchon früher ein Paradisſittichmännchen mehrmals mit einem Singſittichweibchen geniſtet hatte. Aber nur durch ſorgfältigſte Verpflegung und nach mancherlei bitteren Erfahrungen waren ſolche Erfolge zu erreichen. Dr. Ruß, in deſſen Vogelſtube ſich ein Pärchen vier Jahre lang friſch und munter hielt, gibt in ſeinem Werke „Die fremdländiſchen Stubenvögel“, Band III, werthvolle Angaben über Haltung und Pflege dieſer Vögel. Vor allem ſoll man es vermeiden, friſch angekommene Sittiche in die Vogelſtube fliegen zu laſſen, ſchon aus dem Grunde, weil ſie leicht anſteckende Krankheiten mitbringen und unter den anderen Vögeln einſchleppen können. Im engen Käfige füttere man ſie anfangs nur mit den Sämereien, mit denen ſie vom Händler, bezl. vom Vorbeſitzer verpflegt worden ſind, denn ſie ſcheinen gegen jeden plötzlichen Futterwechſel außerordentlich empfindlich zu ſein. Man gebe ihnen erſt nach und nach neben Hanf und nur wenig Kanarienſamen und Hirſe, friſche Ameiſenpuppen und Mehlwürmer oder ein Gemiſch von getrockneten Ameiſenpuppen mit Eierbrot, außerdem Grünkraut, nachdem ſie ſich beſonders begierig zeigen, geriebene Mören mit Ebereſchenberen, doch muß man damit vorſichtig ſein, namentlich mit dem erſteren. Salatblätter oder naſſe Vogelmiere wirken nach Dr. Ruß' Erfahrungen geradezu als Gift für ſie. Dagegen bezeichnet er allerlei friſche Baumzweige, insbeſondere von Weiden, und dann auch Vogelberen als ſehr zuträglich für dieſe Sittiche. Erſt dann, wenn ſie an alle dieſe Zugaben allmählich gewöhnt ſind — man vermeide es ſorgfältig, ihnen viel auf einmal zu geben — laſſe man ſie in der Vogelſtube oder in einem großen Heckkäfig freifliegen. Ebenſo wie auf den Futterwechſel hat man auf den Luftwechſel ſorgſam zu achten. Gerade bei den bereits eingewöhnten, alſo an beſtimmte, gleichmäßige, wenn auch ſchlechte Luftmiſchung gewöhnten Sittichen, zeigt es ſich gefahrdrohend, wenn ſie plötzlich in eine ganz andere Luft verſetzt werden. Eine andere Gefahr bringt ihnen ihre große Erregbarkeit; nur zu häufig gehen ſie an Herz- oder Gehirnſchlag ein. —

Der Paradisſittich hat eine breite, rothe Stirnbinde, der Oberkopf iſt rußſchwarz, nach dem Nacken zu in ſchwarzbraun übergehend; ein breiter Streif von der Stirnbinde aus oberhalb des Auges bis hinter's Ohr, Wangen und Halsſeiten blaugrün (welche Färbung bei manchen ſich im Nacken zuſammenzieht, während andere einen ſchwarzbraunen Nackenſtreif haben); Zügel und Gegend um's Auge matt ſtrohgelb; Mantel dunkelbräunlich aſchgrau; Schwingen bräunlichſchwarz, heller außengeſäumt; rothe Flügelbinde (bei ganz alten Männchen auch noch hier und da im Flügel ein rother Fleck), Flügelrand und untere Flügeldecken dunkelblau; Bürzel blau; obere Schwanzdecken grünblau; die beiden mittleren Schwanzfedern fahl gelblichgrün, Endhälfte der Außenfahne ſchwach blaugrün, Innenfahne und das gerundete Ende bräunlichſchwarz, die nächſten ebenſo, doch an obrer Hälfte mehr blaugrün mit langer weißer Spitze, auch die beiden folgenden noch an der Innenfahne weiß geſpitzt, die übrigen hellblau, am Grund mehr grünlich, an der Spitze reiner blau, alle in der Mitte mit breiter, ſchwarzer Querbinde, unterhalb letzterer an Außenfahne fahlgrau; Kopfſeiten, Kehle und Oberbruſt glänzend grasgrün, Unterbruſt grünblau, Bruſt- und Bauchſeiten bis zum Unterrücken rein hellblau; Bauch, Hinterleib, Schenkel und untere Schwanzdecken roth, weißgeflammt; die fünf ſeitlichen Schwanzfedern am Ende weiß; Schnabel bläulichſilberweiß, Unter- und Oberſchnabel am Grunde ſchwach dunkler; Wachshaut fleiſchfarbenweiß, nackt; Auge dunkelbraun; Füße fleiſchfarbengrau, Krallen ſchwärzlich. Beim Weibchen iſt die Stirnbinde gelblichgrün; Oberkopf ſchwärzlichbraun; Zügel, Augenbrauenſtreif und Kopfſeiten fahl gelblichgrün, jede Feder fein dunkel geſäumt; Flügelbinde düſter blutroth, einzelne Federn ganz gelb oder gelb geſäumt; Flügelrand ſchwach hellblau; untere Flügeldecken aſchgrau; Kehle, Hals und Oberbruſt hellgelblichgrün; jede Feder fein dunkel quergeſtreift, Bruſt und Bauch grünbläulichweiß, ebenfalls dunkel quergeſtreift; Unterbauch weiß, roth geſchuppt, Hinterleib, untere Schwanzdecken und Schenkel grünlich, ebenfalls roth geſchuppt. Der Paradisſittich hat Droſſelgröße, doch iſt der ſtufig zugeſpitze Schwanz ſehr lang.

Heimiſch iſt er in Neuſüdwales, Queensland und den Darlingebenen. Ueber ſeine Lebensweiſe iſt nichts weiter bekannt, als daß er ſich von Gräſerſämereien ernährt und in Familien oder kleinen Flügen geſehen wird. D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Die größte Erfindung auf dem Gebiete der Vogelliebhaberei im neunzehnten Jahrhundert iſt der **Waſſerbehälter „Nonpareil“.**

Derſelbe erweiſt beim Gebrauch folgende Vortheile:

Kein Waſſerſpritzen, keine Waſſerverſchwendung, kein Waſſerdunſt außerhalb der Behälter und doch können die Vögel nach Belieben trinken und baden.

Der Waſſerbehälter iſt von vielen bedeutenden Vogelliebhabern empfohlen, ſowie auch vom „Verein für Vogelfreunde“ in Skandinavien.

Ueber 30 Ehrenprämien und ſilberne Medaillen ꝛc. zuerkannt. Behälter Nr. 1 koſtet 4 ℳ, Nr. 2 5 ℳ, Nr. 3 6 ℳ, Nr. 4 7 ℳ, Nr. 5 10 ℳ.

Der Waſſerbehälter „Nonpareil“

iſt mit einem ſehr praktiſchen Fangapparat verſehen, in welchem die Vögel ſehr leicht zu fangen ſind, ohne daß die übrigen Vögel dabei geſtört werden.

Der Waſſerbehälter „Nonpareil“ wird überall nach dem In- und Ausland verſandt.

Nur erhältlich bei dem Erfinder

Anton Kristensen & Co., Metallwaarenfabrik,
Kleitrup b. Hobro, Jütland, Dänemark. [2196]

Universalfutter.

Vor dem Kennerauge kann eine **Universalfutter-Mischung ohne Zeke** nicht mehr als vollwerthig bestehen.

Einige Jahre fehlte dieses Produkt vollständig am Vogelfuttermarkt, und mancher Liebhaber hätte gern 10 Mk. für ein Kilo bezahlt, wenn er es hätte bekommen können.

Zeke ist **jetzt wieder** überall **gut** und **billig** zu haben.

Man verlange ausdrücklich **„Zeke, Marke Amsel“.** [2203]

Mehlwürmer, c. ſed. Poſt., Ltr. 3,80 ℳ, Pfd. 2,90 ℳ. **Jeltner, Breslau,** Weinſtr. 12. [2204

Rothe u. ſchw. Hollunder- u. Ebereſchenbeeren billigſt. **Ad. Markert, Scheibenberg (S.).** [2205

Grottenſtein-Kanarien-Einſätze

à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. C. A. Dietrich, Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [2197]

Der beſte Fangapparat

für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [2198]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Geſangskäſten, [2199]

Geſangsſpinde, Harzer Vogelbauer, liefert (Preisl. fr.) **A. Bothe,** Weddersleben, Harz.

Hermann Schramm's
patentirte
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

ſind die höchſtprämirteſten, weltbekannteſten und **anerkannt beſten Geſangshilfsmittel für Kanarien.** Preisliſte gratis und franko durch [2200]

Hermann Schramm's Nachf.,
Dresden 12.

Futtermittel.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Staats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpacketen franko, garantirt ſandfrei. [2201]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Alle Vogelfutter,
Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.
E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.

Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche. Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [2202

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [2206]

Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos.)

Für Insektenfresser und zur Aufzucht.

„Eidotter“ „Eiweiss“

griesförmig per Kilo 3.75 ℳ schrotförmig per Kilo 4.75 ℳ

Beimischung zu jedem Futter. Bei 4½ Ko franco. [2207]

Henri Vallette, Berlin SW., Schönebergerstrasse 15a.

Präpar. Eigelb,

garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.
Mehlwürmer, rein und groß, à Ltr 4½, à Ko. 8½.
Bisquit u. Eierbrot, beſt. Qualit. à Ko. 3.
Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.
Sommerrübſ., 99er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack 5 Ko. no.	1,60
Hanfſat	„ „ „ „	1,60
Hafer geſchält	„ „ „ „	2,25
Mohn blau	„ „ „ „	3,25
Hirſe weiß Pa.	„ „ „ „	2,20
do. Senegal	„ „ „ „	2,25
do. do. i. Kolb.	„ „ „ „	5,—
do. algeriſche	„ „ „ „	2,—
do. indiſche	„ „ „ „	1,75
Sonnenblumen	„ „ „ „	2,—
Kürbiskerne	„ „ „ „	3,25
Reis i. Hülſen	„ „ „ „	2,25
Zirbelnüſſe	„ „ „ „	3,50

Oſſa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [2208]
Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—
Ausführl. Preisliſten ſämmtl. Vogelfutterarten gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter
für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**

Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!

[2209] Allein angefertigt von

Ernst Hanke, Trier, Moſel.

Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Univerſales. [2210]

Röbbeckes prämirte **Univerſalfutter-Spezialitäten** ſind die beſten für alle inſektenfreſſende Vögel.

Qual. Extra, à Ko. 2,60 ℳ
„ Prima, à Ko. 2,— ℳ
„ Sekunda, à Ko. 1,— ℳ
in ½ u. ¼ Pfd.-Packet.

1899er Ameiſeneier 1899er,

hochprima Qual., das Feinſte, was es gibt, vollſtändig rein und ſtaubfrei, à Ko. 4 ℳ, 5 Ko. 18 ℳ, **Ameiſeneier,** naturell, à Ko. 2,20, ſtaubfrei 2,60 ℳ, offerirt

Otto Röbbecke, Meerane, Sa., II,
Sämerei- u. Vogelfutter-Handlg., gegr. 1854.

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [2211]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411, I.

Mehlwürmer, à Ltr 4 ℳ inkl. Verp.

Bei Einſendung von 1,50 ℳ = 140 gr., alſo **weit über 1000 Stück,** frk. inkl. Verp.

[2212] **P. Bartsch, Breslau,** Flurſtr. 6.

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 4,25 ℳ, Kilo 7,75 ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ. **Ameiſeneier,** hochprima 99er, Liter 90 ₰. **Weißwurm,** Liter 90 ₰. [2213]

Louis Conrad, Elberfeld, Düſtr. 45.

Google

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer, **Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,** alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Jll. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [2214]

Pfälziſches Univerſalmiſchfutter, gebrauchsfertig, das Beſte f. alle inſektenfreſſende Vögel, Qual. I 1.80 ℳ, Qual. II 1,40 ℳ à kg. Eierbrot 1,60 ℳ à kg geg. Nachn. [2215]
F. Mann, Kaiſerslautern, Friedhofſtr. 16.

Vögel.

Beſte Bezugsquelle für
Papageien!
Graue und grüne Amazonenpapageien, Doppelgelbkopf u. Gelbnacken-Amazonen, ſprechend und nichtſprechend, ſchon von 20 ℳ. [2216]

Beste Bedienung.
Vollste Garantie.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Sehr schönes Weihnachtsgeschenk.

Verkaufe **gut ausgeſtopfte Vögel** in Glaskaſten, à 16–22 Stück 15–20 ℳ. Gruppen auf künſtlichen Felſen 6–20 ℳ; auch Seevögel billig. [2217]
Fridolin Becker,
Tiefurt bei Weimar.

Empfehle in nur ſchönen, gut ſingenden Exemplaren: Stieglitz u. Rothhänfling à 1,50 ℳ, Zeiſig u. Girlitz à 1,25 ℳ, Edelfink à 1,50 ℳ, Goldammer, Grünfink u. Grauhänfling à 0,75 ℳ, rother Dompfaff à 2,50 ℳ, dto. blaue à 1,50 ℳ, junge fingerzahme, anfangend zu ſprechende Perlſtare à 4 ℳ, ff. lautſchlagende Zippdroſſeln à 6 ℳ, lautſingende Feldlerchen à 2 ℳ. Garantie für Hähne u. leb. Ank. **Mehlwürmer** ff. reine Ware jedes Quatum à Pfd. 3 ℳ. [2218]
A. Schulz, Breslau I, Altbüßerſtr. 26.

Finken u. Schwarzköpfe

zu verkaufen, 6 St. Wildf., lang im Schlag, mit Schnappen, 10 ℳ per Stück, Schwarzköpfe mit ſchönen, doppelten Ueberſchlägen, 8 ℳ. Die Vögel ſind ſämmtlich Wildfänge und fangen jetzt zu ſchlagen an und ſind ſofort zu hören. Garantie für lebende Ankunft.
Dammerer,
[2219] **Wien XVI,** Degengaſſe 10.

0,1 Königsſittich, ſ. zahm 36 ℳ, **0,2 Kaptäubchen** à 5 ℳ. Tauſche **Gebirgsloris** und **0,2 Roſenpapageien,** zahle zu. [2220]
W. Dolff, Meckenheim.

Papageien!

40 gutſprechende und liederſingende bezw. Melodien flötende Graupapageien, Gelbnacken, Doppelgelbköpfe, Surinam- und Blauſtirn-Amazonen, ſowie eine große Anzahl junge Blauſtirn-Amazonen, Gelbnacken, Araras, Kakadus ꝛc. ꝛc. ſind augenblicklich am Lager und ſtehen Sprachverzeichniſſe zu Dienſten.

Jlluſtrirter Katalog über Papageienkäfige gegen 30 ₰ in Briefmarken. [2221]

August Fockelmann
Thierhandlung
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Bringen unſern Freunden und Abnehmern auch in dieſem Jahre unſere tieftourenreiche
Kanarien
in beſte Erinnerung. [2222]
Mathilde Erntges,
Robert Erntges,
Elberfeld.

Zu kaufen geſucht

in tadelloſen, geſunden, eingewöhnten Exemplaren: **1,1 Roſenpapageien, 1,1 gelbe Wellenſittiche, 1,1 Schuppen-Loris, 1 Inka-Kakadu** (fingerzahm). Gefl. Offert. mit Preisangabe an [2223]
A. G. Walford,
Hannover, Sedanſtraße 45, part.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei. Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25–30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft. Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [2224]

Harzer Hohlroller,

gute **Mittelvögel,** à Stck. 6 und 8 ℳ, à Dtzd. 54 ℳ, 2 Dtzd. 100 ℳ.
J. O. Rohleder
[2225] in Leipzig-Gohlis.

Geſunde Stieglitze

à 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ. **Rothhänflinge** à 1 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, **Zeiſige u. Buchfinken** à 90 ₰, Dtzd. 7,50 ℳ, **Grünhänflinge u. Tannenmeiſen,** à 70 ₰, Dtzd. 6 ℳ, Weibchen die Hälfte. Garantie lebender Ankunft. [2226]
Gebr. Mergler, Vogelexport,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Verkaufe:

1 Eichelheher, 3 Elſtern, 1 Dohle und **1 Nebelkrähe,** alle zahm, tadelloſes Gefieder, zuſammen für 15 ℳ, gebe auch einzeln ab. [2227]
W. Landt, Elmshorn i. H.

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländiſchen und ausländiſchen Körner- und inſektenfreſſende Vögel, in allerfeinſter, ſtets friſcher Ware, beſonders **Ameiſeneier,** handverleſene ganz reine, **Eintagsfliegen** (Weißwurm), **Muska** oder **Jeck** (überſeeiſche Fliege), **Mehlwürmer** und **Univerſalfutter-Miſchungen** verſendet zu billigen Preiſen [2228]
H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung,
Erfurt, Futterſtraße 3.
Preisliſte auf Wunſch umſonſt und portofrei.

Einen größeren Poſten
Norwich-Canarien,
à Par 25, à Mch. 15, à Wch. 10 ℳ,
Lizard-Canarien,
à Par 30, à Mch. 20, à Wch. 12 ℳ,
Cayenne-Canarien,
à Par 25, à Mch. 15, à Wch. 10 ℳ.
J. O. Rohleder
[2229] in Leipzig-Gohlis.

Kanarien.

Von meinem ſehr tiefgehenden tourenreichen Hohlrollerſtamm m. g. Knorren, Klingeln, tiefen Pfeifen ꝛc. verſende unter Garantie des Werthes à 10–50 ℳ. Weibchen desſelben Stammes 2 ℳ. Für Wiederverkäufer ſehr empfehlenswerth, d. Dtz. Hähne 72 bis 96 ℳ.
Parade, Rentier,
[2230] **Hannover,** Aſternſtraße.

NB. Meine Verkaufsvögel erhielten nachweislich 1898 u. 99 goldene und ſilberne Medaillen.

Verk. 1 hochf. 98er Wildf. **Schamadroſſel** tadell. i. vollem Geſang 35 ℳ. 1 ff. 98er Gelbſpötter Wildf. 6 ℳ. 1 ff. Haidelerche 3 ℳ. 1 hochf. Wildf. 98er d. Singdroſſel 7 ℳ.
[2231] P. Richter, Scheibenberg 54 (S.).

Verkaufe: Ein Zuchtpar **weiße Mövchen** [2232]
☞ **8 ℳ m. Verp.** ☜
Ad. Steinhagen, Lübeck, Hüxſtr. 107.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [2233]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Kanarienhähne

meines mit Ehrenpr., Gold. u. Silb. Med. präm. Hohlrollerſt. von 8 bis 25 ℳ. Probe u. Garant.
Th. Börner,
[2234] **Kaſſel,** Gartenſtr. 3 I.

☞ **Halt!** ☜

Die Vogelzüchterei von [2235]
L. G. Müller, Nordhauſen a. Harz
verſendet koſtenfrei die Preisliſte, ſowie hochfeine Anerkennungen über gutgelieferte
ff. Harzer Kanarienvögel.
Letztere verſ. 14 Tage auf Probe überallhin.

Prachtvolle, geſunde, blutsfremde **Wellenſittiche,** ſtarke, brütluſtige Zuchtpare, à 6 ℳ.
[2236] P. Kohls, Lehrer, Schivelbein (Pom.).

Vogelfreunden liebſt. Weihnachtsgeſchenk. Ein Quartett: **Stieglitz, Rothhänfling, Zeiſig, Buchfink,** alle ganz zahm, für 5 ℳ, große rothe **Dompfaffen** à 2 ℳ, Pärchen 3 ℳ, gute **Buchfinken** à 1,50 ℳ, **Sing- u. Heidelerchen, Triller,** à 1,50 ℳ, Garant. für Männchen u. ganz tadellos, empfiehlt per Nachn. [2237]
Rud. Bandow, Elbing (Weſtpr.).

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Die gefiederte Welt
Wochenschrift für
Vogelliebhaber,
-Züchter und -Händler

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer, **Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,** alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung [2214]

Pfälziſches Univerſalmiſchfutter,

gebrauchsfertig, das Beſte f. alle inſektenfreſſende Vögel, Qual. I 1.80 ℳ, Qual. II 1.40 ℳ à kg. Eierbrot 1,60 ℳ à kg geg. Nachn. [2215]
F. Mann, Kaiſerslautern, Friedhofſtr. 16.

Vögel.

Beſte Bezugsquelle für

Papageien!

Graue und grüne Amazonenpapageien, Doppelgelbkopf u. Gelbnacken-Amazonen, ſprechend und nichtſprechend, ſchon von 20 ℳ. [2216]

Beste Bedienung.
Vollste Garantie.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Sehr schönes Weihnachtsgeschenk.

Verkaufe **gut ausgeſtopfte Vögel** in Glaskaſten, à 16–22 Stück 15–20 ℳ. Gruppen auf künſtlichen Felſen 6–20 ℳ; auch Seevögel billig. [2217]

Fridolin Becker,
Tiefurt bei Weimar.

Empfehle in nur ſchönen, gut ſingenden Exemplaren: Stiglitz u. Rothhänfling à 1,50 ℳ, Zeiſig u. Girlitz à 1,25 ℳ, Edelfink à 1,50 ℳ, Goldammer, Grünfink u. Grauhänfling à 0,75 ℳ, rother Dompfaff à 2,50 ℳ, dto. blaue ~~à 1,50 ℳ~~, junge fingerzahme, anfangend zu ſprechende Perlſtare à 4 ℳ, ff. lautſchlagende Zippdroſſeln à 6 ℳ, lautſingende Feldlerchen à 2 ℳ. Garantie für Hähne u. leb. Ank. **Mehlwürmer** ff. reine Ware jedes Quantum à Pfd. 3 ℳ. [2218]
A. Schulz, Breslau I, Altbüßerſtr. 26.

Finken u. Schwarzköpfe

zu verkaufen, 6 St. Wildfr, lang im Schlag, mit Schnappen, 10 ℳ per Stück, Schwarzköpfe mit ſchönen, doppelten Ueberſchlägen, 8 ℳ. Die Vögel ſind ſämmtlich Wildfänge und fangen jetzt zu ſchlagen an und ſind ſofort zu hören. Garantie für lebende Ankunft.
Dammerer,
[2219] **Wien XVI,** Degengaſſe 40.

0,1 Königsſittich,

ſ. zahm 36 ℳ, **0,2 Kaptäubchen** à 5 ℳ. Tauſche **Gebirgsloris** und **0,2 Roſenpapageien,** zahle zu. [2220]
W. Dolff, Meckenheim.

Papageien!

40 gutſprechende und liederſingende bezw. Melodien flötende Graupapageien, Gelbnacken, Doppelgelbköpfe, Surinam- und Blauſtirn-Amazonen, ſowie eine große Anzahl junge Blauſtirn-Amazonen, Gelbnacken, Araras, Kakadus ꝛc. ꝛc. ſind augenblicklich am Lager und ſtehen Sprachverzeichniſſe zu Dienſten.

Illuſtrirter Katalog über Papageienkäfige gegen 30 ₰ in Briefmarken. [2221]

August Fockelmann
Thierhandlung
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Bringen unſern Freunden und Abnehmern auch in dieſem Jahre unſere tieftourenreiche

Kanarien

in beſte Erinnerung. [2222]

Mathilde Erntges,
Robert Erntges,
Elberfeld.

Zu kaufen geſucht

in tadelloſen, geſunden, eingewöhnten Exemplaren: **1,1 Roſenpapageien, 1,1 gelbe Wellenſittiche, 1,1 Schuppen-Loris, 1 Inka-Kakadu** (fingerzahm). Gefl. Offert. mit Preisangabe an [2223]
A. G. Walford,
Hannover, Sedanſtraße 45, part.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei. Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25–30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft. Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [2224]

Harzer Hohlroller,

gute Mittelvögel, à Stck. 6 und 8 ℳ, à Dtzd. 54 ℳ, 2 Dtzd. 100 ℳ
J. O. Rohleder
[2225] **in Leipzig-Gohlis.**

Geſunde Stiglitze

à 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, **Rothhänflinge** à 1 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, **Zeiſige u. Buchfinken** à 90 ₰, Dtzd. 7,50 ℳ, **Grünhänflinge u. Tannenmeiſen,** à 70 ₰, Dtzd. 6 ℳ, Weibchen die Hälfte. Garantie lebender Ankunft. [2226]
Gebr. Mergler, Vogelexport,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Verkaufe:

1 Eichelheher, 3 Elſtern, 1 Dohle und **1 Nebelkrähe,** alle zahm, tadelloſes Gefieder, zuſammen für 15 ℳ, gebe auch einzeln ab. [2227]
W. Landt, Elmshorn i. H.

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländiſchen und ausländiſchen Körner- und inſektenfreſſende Vögel, in allerfeinſter, ſtets friſcher Ware, beſonders **Ameiſeneier,** handverleſene ganz reine, **Eintagsfliegen** (Weißwurm), **Muska oder Zekk** (überſeeiſche Fliege), **Mehlwürmer** und **Univerſalfutter-Miſchungen** verſendet zu billigen Preiſen [2228]
H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung,
Erfurt, Futterſtraße 3.
Preisliſte auf Wunſch umſonſt und portofrei.

Einen größeren Poſten

Norwich-Canarien,

à Par 25, à Mch. 15, à Wch. 10 ℳ,

Lizard-Canarien,

à Par 30, à Mch. 20, à Wch. 12 ℳ,

Cayenne-Canarien,

à Par 25, à Mch. 15, à Wch. 10 ℳ.
J. O. Rohleder
[2229] in Leipzig-Gohlis.

Kanarien.

Von meinem ſehr tiefgehenden tourenreichen Hohlrollerſtamm m. g. Knorren, Klingeln, tiefen Pfeifen ꝛc. verſende unter Garantie des Werthes à 10–50 ℳ. Weibchen deſſelben Stammes 2 ℳ. Für Wiederverkäufer ſehr empfehlenswerth, d. Dtz. Hähne 72 bis 96 ℳ.
Parade, Rentier,
[2230] **Hannover,** Aſternſtraße.

NB. Meine Verkaufsvögel erhielten nachweislich 1898 u. 99 goldene und ſilberne Medaillen.

Verk. 1 hochf. 98er Wildf. Schamadroſſel tadell. i. vollem Geſang 35 ℳ. 1 ff. 98er Gelbſpötter Wildf. 6 ℳ. 1 ff. Haidelerche 3 ℳ. 1 hochf. Wildf. 98er d. Singdroſſel 7 ℳ.
[2231] P. Richter, Scheibenberg 54 (S.).

Verkaufe: Ein Zuchtpar **weiße Mövchen** [2232]
☞ **8 ℳ m. Verp.** ☜
Ad. Steinhagen, Lübeck, Hürſtr. 107.

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [2233]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Kanarienhähne

meines mit Ehrenpr., Gold. u. Silb. Med. präm. Hohlrollerſt. von 8 bis 25 ℳ. Probe u. Garant.
Th. Börner,
[2234] **Kaſſel,** Gartenſtr. 8 I.

☞ Halt! ☜

Die **Vogelzüchterei** von [2235]
L. G. Müller, Nordhauſen a. Harz
verſendet **koſtenfrei** die Preisliſte, ſowie hochfeine Anerkennungen über gutgelieferte

ff. Harzer Kanarienvögel.

Letztere verſ. 14 Tage auf Probe überallhin.

Prachtvolle, geſunde, blutsfremde **Wellenſittiche,** ſtarke, brütluſtige Zuchtpare, à 6 ℳ.
[2236] P. Kohls, Lehrer, Schivelbein (Pom.).

Vogelfreunden liebſt. Weihnachtsgeſchenk. Ein Quartett: **Stiglitz, Rothhänfling, Zeiſig, Buchfink,** alle ganz zahm, für 5 ℳ, große rothe **Dompfaffen** à 2 ℳ, Pärchen 3 ℳ, gute **Buchfinken** à 1,50 ℳ, **Sing-** u. **Heidelerchen, Triller,** à 1,50 ℳ. Garant. für Männchen u. ganz tadellos, empfiehlt per Nachn. [2237
Rud. Bandow, Elbing (Weſtpr.).

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von August Hopfer in Burg b. M.

Die gefiederte Welt

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Im Laufe der Jahre habe ich eine ganze Anzahl von Sperlingen in meinen Käfigen verpflegt und konnte auch von dieſen Plebejern manches lernen.

Einen gut eingewöhnten Hausſperling ſah ich ſeiner Zeit bei dem Danziger Gaſtwirth Baus, der zu unſeren älteſten Liebhabern zählt. Der ſchmucke Geſell bewohnte mit zahlreichen Genoſſen einen größeren Flugkäfig und ſchilpte aus Leibeskräften, um die Lieder der hellſtimmigeren Sänger nur ja zu übertönen. Später ſtellte ſich heraus, daß dieſer Spatz ein arger Zänker war, und der Störenfried wurde dem Danziger Händler zum Verkaufe übergeben. Hier erſtand ich den Graukopf, ohne daß ich ahnte, meinen alten Bekannten vor mir zu haben. Ich ſetzte den Spatz in den Flugkäfig, fand jedoch ſchon nach einigen Tagen in einem Harzer Käfig, der an der Wand des Behälters hing, einen toten Zeiſig. Wahrſcheinlich war dieſer zufällig in jenes Bauerchen gerathen, in dem ſich der Spatz mit beſondrer Vorliebe aufhielt und wurde ſpäter von dem Sperling in dem engen Raum angegriffen. Da ſein Gegner den Ausgang verſperrte, vermochte das unglückliche Thier nicht zu entfliehen und erlag den hitzigen Schnabelhieben ſeines ſo viel ſtärkeren Feindes. Wenn ich alſo ſ. Z. in einem kleinen Aufſatze den Sperling als friedlichen Käfigvogel hinſtellte, ſo bedarf dieſe Behauptung einer kleinen Abſchwächung. Der Liebhaber wird alteingefangene Sperlinge jedenfalls längere Zeit möglichſt genau beobachten müſſen, ehe er ihnen unbedingt vertrauen darf.

Viel friedlicher als jener Mordgeſelle betrug ſich ein altes Männchen, das mir die Kinder eines Bekannten zutrugen. Die Knaben hatten den alten Herrn in dem Pferdeſtall ihres Vaters überraſcht, aber bei dem Einfangen derartig zugerichtet, daß der arme Kerl zeitlebens auf einem Flügel gelähmt blieb. Trotzdem machte er ſich bei der nächſten Mauſer recht gut heraus und ergötzte mich lange Zeit durch ſein dreiſtes, vorlautes Weſen.

Im Gegenſatz zu anderen Vögeln ſieht ein gefangener Hausſperling oft viel ſchmucker aus als ſeine freien Genoſſen, deren Gefieder durch den Kohlendunſt der Schlote zunächſt arg verräuchert wird. Erſt durch ſolche Gefangene kam mancher meiner Bekannten zu der Einſicht, daß der Hausſperling eigentlich ein recht hübſcher Vogel iſt.

Nach den Erfahrungen mit dieſem und anderen, gleichartigen Sperlingen durfte ich ſchließen, daß der Hausſpatz unter Umſtänden zu einem recht lieben Stubenvogel werden kann, zumal er an geiſtiger Begabung und an Vermögen, ſich unter anderen Verhältniſſen zurecht zu finden, ſchwerlich von einem deutſchen Finken übertroffen wird. Demnächſt ſollte mein Urtheil über den Graukopf noch weit günſtiger lauten.

Als ich eines Tages die Angehörigen eines Schülers beſuchte, hörte ich in dem Nebenzimmer das unverkennbare Gezwitſcher eines Stiglitz und fragte meinen jungen Freund, von wem er jenen Vogel erhalten hätte. Zu meinem Erſtaunen erfuhr ich, daß der Sänger kein Stiglitz, ſondern ein Hausſpatz ſei, den ein Schulkollege aufgezogen und dann zu einem Stiglitz in den Käfig geſteckt hatte.

Gleich darauf ward mir der Sänger in persona vorgeſtellt, und ich erblickte einen hübſchen, ſchon völlig ausgefärbten Hausſpatz, der ſelbſtbewußt und breitbeinig auf ſeiner Sproſſe daſaß und bisweilen, wenn man ſeinen Käfig berührte, zornig nach den Fingern hackte.

Ich fand an dem drolligen Vogel ſo viel Gefallen, daß ich ihn ſogleich erwarb und frohgemuth nach Hauſe trug. Bei mir ſang er anfänglich ſein Stiglitzgezwitſcher, doch war die Fülle der Vogellaute, die in der neuen Umgebung an ſein Ohr tönten, der künſtleriſchen Fortbildung durchaus nicht günſtig; er erinnerte ſich immer mehr, daß er in Wirklichkeit kein lockerer Stiglitz, ſondern ein biederer Hausſpatz ſei und gibt nunmehr den eigenen Lauten vor den fremden zumeiſt den Vorzug.

Trotzdem habe ich den Vogel ſehr gern, iſt er doch ſo zahm, wie man es nur verlangen kann. Weit davon entfernt, mich zu fürchten, betrachtet er mich eher als ein unliebſames Element in ſeinem Spatzendaſein, das mit der nöthigen Grobheit in den geziemenden Schranken gehalten werden muß, und geräth in den höchſten Zorn, wenn ich mir bei der Reinigung und Fütterung zu lange an ſeinem Käfig zu ſchaffen mache. Merkwürdig iſt es, wie ſich die verſchiedenen Stimmungen in ſeinem Aeußeren abſpiegeln. Iſt der Vogel mürriſch, ſo erzielt er durch ein ganz geringes Nachlaſſen der Kopfhaut und die dadurch bewirkte, faſt unmerkliche Sträubung der Stirnfedern einen ſo bärbeißigen Geſichtsausdruck, daß man ſogleich weiß, es iſt mit ihm nicht gut Kirſchen eſſen. Mag er aber auch noch ſo zornig ſein, von Furcht iſt ſein Zorn ſtets völlig frei.

Alle meine Hausſperlinge fütterte ich mit Hirſe, Kanarienſamen, Hafer und Hanf und verabreichte ihnen daneben von Zeit zu Zeit einen Mehlwurm. Auf die Mehlwürmer ſind die Spatzen beſonders erpicht, doch darf man ſich durch ihr Betteln nicht dazu verleiten laſſen, ſie mit dieſer hitzigen Koſt zu überfüttern. Nirgends wird mehr und leichter geſündigt, als bei der Verabreichung dieſer gelbbraunen Kerfe. Außerdem iſt es gut, dem Spatzen eine Art Niſtkaſten oder ſonſt einen Schlupfwinkel in ſeinen Käfig zu ſtellen, da dieſe Vögel während der Nacht nicht gern jeder Deckung entbehren. Auch muß man den Spatzen recht reichlich Sand in den Käfig ſtreuen, da ſie gern paddeln.

Sollte in einem Liebhaber durch dieſe Zeilen der Wunſch rege werden, ſich einen Hausſpatz zu verſchaffen, ſo rathe ich ihm, ſich im nächſten Sommer ein junges Männchen zu beſorgen. Dieſes möge er mit einem fleißig ſingenden Körnerfreſſer (Stiglitz oder Zeiſig etwa) in einen Behälter ſtecken, jedoch ſo, daß möglichſt wenig andere Vogelſtimmen es umtönen. Ich bin überzeugt, daß die meiſten Sperlinge ſich den Geſang ihrer Genoſſen mehr oder minder aneignen würden und es würde mich freuen, wenn der eine und andere ſeine Bemerkungen darüber auch weiteren Kreiſen zugänglich machte.

Vogelarten, die aus irgend einem Grunde ihren Aufenthaltsort wechſeln, zeigen in der Regel Talent

[illegible]

[illegible]

jene großen und ſehr intereſſanten Vogelgruppen aufmerkſam gemacht und zur Beobachtung derſelben veranlaßt worden. Auf dieſe Weiſe haben die Inſaſſen, die hier bis dahin meiſt nur aus Büchern bekannt waren, manchen neuen Intereſſenten und Liebhaber gefunden. Es ſei mir nun geſtattet, dem geehrten Leſerkreiſe der „Gefiederten Welt“ einiges über die Einrichtung und Bevölkerung der Rieſenvoliere, ſowie über das Leben in ihr mitzutheilen.

Wahrſcheinlich wären die Düſſeldorfer Kenner und Liebhaber der erwähnten, anziehenden Vögel nicht ſo ſchnell zu einer für ihre Beobachtungen und Studien ſo äußerſt praktiſchen Einrichtung gelangt, wenn nicht unerwartet eine Spende aus wohlthätiger Hand den Bau der Voliere ermöglicht hätte. Dieſer Wohlthäter war der nunmehr verſtorbene Landgerichtsdirektor Abers. Neben vielen anderen Stiftungen ſetzte er ein Legat von 10000 Mark für den zoologiſchen Garten aus, deſſen Leitung hierdurch in die Lage verſetzt wurde, die höchſte Voliere der Welt zu errichten. Ihre Raumverhältniſſe und Größenmaße — die Länge beträgt 33 m, die Höhe im Scheitel 14 m und die Tiefe 15 m — ſind derart, daß die Vögel faſt vollkommen naturgemäß leben und ſich dem Beobachter in ihren Körperbewegungen, ihrer Stimme und in den verſchiedenen Gemüthszuſtänden, ſowie in ihrem Verhalten gegen ihresgleichen und andersartige Vögel naturwahr zeigen können, was gerade bei derartigen Vögeln in einem Thiergarten oft nur ſchwer zu erreichen iſt. Die vier Seiten, ſowie das Dach der Voliere beſtehen nur aus dem Drahtgitter, ſodaß Regen und Sonnenſchein ungehindert eindringen können. Damit die Thiere ſich einem Zuviel des erſteren entziehen können, ſind an einer Seite zwei ziemlich geräumige, hölzerne Verſchläge angebracht, und vor gar zu ſtarken Sonnenſtrahlen bieten im Innern ſtehende, breitäſtige Kaſtanien, Linden und Eichen hinreichenden Schutz. Der ganze Boden iſt mit Raſen bedeckt, der natürlich infolge der zerſtörenden Wirkung der Vogel-Exkremente alljährlich erneuert werden muß. Ungefähr in der Mitte erhebt ſich eine mit Farren und Gras bewachſene Grotte von beträchtlicher Größe, aus der ſich an verſchiedenen Stellen tröpfelnd und ſprudelnd Waſſer in ein 32 Kubikmeter faſſendes Baſſin ergießt, das bachartig und in Windungen angelegt iſt. Seine Ränder ſind treppenförmig abgeſtuft, ſodaß es auch dem kleinſten Sumpfvogel möglich iſt, das ihm unentbehrliche Bad zu nehmen.

Das ſchimmernde Blattwerk einer Silberpappel, deren Gezweig über die Ufer hinausragt, ſpiegelt ſich in dem Waſſer, und wenn an dieſer Stelle am Abend, wenn nur noch vereinzelte Beſucher im Garten ſind, einige Krickenten ſtill ihr Weſen treiben, dann ziehen an dem geiſtigen Auge des Beobachters, durch dieſes anheimelnde Bild wachgerufen, Erinnerungen vorüber, Erinnerungen an ſchöne, in einſamer Natur verlebte Stunden, in denen es ihm vergönnt war, ſolche Bilder aus dem unſcheinbaren Vogelleben in ſich aufzunehmen, um ſie nie wieder zu vergeſſen; denn unbeſchreiblich iſt der Zauber, den ſie auf das Gemüth des Naturfreundes ausüben, und die Reize einer ſolchen Beobachtung im Freien können ſelbſt in dem zweckmäßigſten und ſchönſten Käfig nicht im entfernteſten erwirkt werden. Ein gutes Zeugniß für die Rieſenvoliere iſt es nun, daß ſie von vielen Liebhabern immer wieder und mit demſelben oder gar wachſendem Intereſſe beſucht wird; denn obgleich dem Vogelleben in ihr der Zauber der freien, einſamen Natur fehlt, ſo kann der Zuſchauer doch theilweiſe ſeinen Wiſſensdurſt ſtillen und ſich auch manche Stunde hindurch an dem bunten, lebensvollen Treiben ergötzen. Unbeweglich, wie aus Stein gehauen, ſteht ein Fiſchreiher auf einem der aus dem Waſſer hervorragenden Steinblöcke, ſcheinbar völlig gleichgiltig gegen alles, was ſich in ſeiner Nähe abſpielt; nur wenn man genau zuſieht, bemerkt man, wie er ſeine Augen beuteſpähend über die Waſſeroberfläche gleiten läßt. Einer ſeiner Kameraden durchwatet bedächtig den Teich, zuweilen den Hals plötzlich vorſtreckend, ein Zeichen dafür, daß er einen Leckerbiſſen erſpäht hat. Geradezu ſtaunenerregend iſt die Sicherheit dieſer Schnabelhiebe. Mancher arme Spatz hat das erfahren müſſen, wenn er mit Kameraden durch die weiten Maſchen des Gitters hindurchgeſchlüpft war und nun ſeine unberechtigten Anſprüche auf das für die Sumpfvögel beſtimmte Futter gar zu dreiſt geltend machte. Der nie fehlende Hieb eines Fiſchreihers tötete ihn; für jeden, der den flinken Spatz kennt, ein Beweis für die Schnelligkeit, mit der dieſe Bewegung von dem Reiher ausgeführt werden muß. Trotz dieſer Gewaltthätigkeiten der Reiher iſt ein Gelbſpötter häufiger Gaſt in der Rieſenvoliere, wo er die Bäume nach Inſekten abſucht; er iſt aber einestheils ſehr mißtrauiſch gegen die Volierenbewohner, und anderntheils kommt er ſehr ſelten auf den Boden herab. Kreiſchend und ſich gegenſeitig jagend tummeln ſich braunköpfige Lachmöven auf und nieder; bald ſieht man ſie raſchen und ſicheren Fluges dicht über dem Boden dahinſtreichen, bald verſchwinden ſie hinter der Grotte oder den dichtbelaubten Bäumen, dann plötzlich tauchen ſie hoch oben unter dem Dach wieder auf, um ſich bei den Sturmmöven, die ſich dort oben auf einem der eiſernen Träger ſonnen, zur Ruhe niederzulaſſen. Von Zeit zu Zeit hat man auch das Vergnügen, einen Fiſchreiher ſchweben zu ſehen, der auch einmal von höher gelegenen Ruheplätzen aus Umſchau halten will. Hierzu wählt er nur ſehr ſelten die Aeſte der Bäume, zieht dieſen vielmehr die ſchon erwähnten freier und höher gelegenen Träger vor. Umſomehr jedoch werden die Bäume von ſeinen Verwandten, den Nachtreihern (Nycticorax griseus) aufgeſucht; den ganzen Tag über ſitzen dieſe Vögel ſtill und unbeweglich auf den Aeſten; nur der vom Hinterkopf bis zum Rücken herabreichende, weiße Federbüſchel bewegt ſich im Winde wie ein Pendel hin und her. Das Thier macht auf mich ſtets den Eindruck eines unförmigen Kobolds. Viel unterhaltender und lebhafter geſtaltet ſich das Leben unter den Bäumen, wo der Beobachter Vogelgeſtalten heimiſcher Fluren in Hülle und Fülle findet. Bei dem erſten Blick, der hierher fällt, wird das Auge von dem Treiben der Kampfläufer (Philomachus pugnax, *L.*) gefeſſelt, die in größter Anzahl in der Voliere vertreten ſind. Nicht ohne Grund trägt dieſe Vogelart ihren Namen; denn unaufhörlich kann man kleine Reibereien, in der Parungszeit Kampfſpiele und Turniere unter ihnen beobachten, in denen es oft zu heftigen Zweikämpfen kommt. Mit geſenktem Kopf ſtürmen die Männchen dann aufeinander los und verſetzen ſich mit dem Schnabel gegenſeitig Stöße, wobei ſich die Federn des nur zur Parungszeit vorhandenen Halskragens ſträuben, was dem Vogel ein recht bösartiges Ausſehen verleiht. Auffallend und höchſt merkwürdig iſt die muſterhafte Ordnung, die während dieſer Spiele unter den kampfluſtigen Gefiederten herrſcht. Spiele muß man das Treiben jedoch nennen, da ernſtliche Verletzungen wegen des weichen Schnabels ausgeſchloſſen ſind. Friedlicher und ſtiller führen die Uferſchnepfen ihr Daſein; emſig trippeln ſie auf dem Raſen umher und tauchen bald hier, bald dort auf, beſuchen auch wol den Rand des Teiches, um zu baden. Hier halten ſich auch gern die großen Silbermöven auf, um, auf dem Boden liegend, die Sonnenſtrahlen aufzufangen. Wenn man ihre kräftige Geſtalt und ihre großen Schnäbel betrachtet, ſo ſollte man annehmen, daß ſie bisweilen den ſchwächeren Vögeln übel mitſpielen; jedoch werden ſelbſt die kleinſten Inſaſſen weder durch ſie noch durch die Reiher irgendwie beläſtigt, wie überhaupt durchſchnittlich eine ſchöne Eintracht unter den Bewohnern der Voliere herrſcht. Allerdings kommt es wol vor, daß ein erkranktes Thier vor ſeiner Entfernung aus der Voliere von anderen mißhandelt wird; jedoch iſt dies wol dem Umſtand zuzuſchreiben, daß geſellſchaftliebende Vögel meiſt keinen Schwächling unter ſich dulden. Die kleinen reizenden Krickenten können ihre beſcheidene Thätigkeit unter den Grottenſteinen, Schlupfwinkel, die ſie ſehr gern aufſuchen, ungeſtört entfalten. Fortwährend hört man hier die Wellen des dort in ſteter Bewegung befindlichen Waſſers gegen die Steine plätſchern; denn haben die Krickenten einmal andere Plätze aufgeſucht, ſo ſtellen ſich bald allerliebſte, vielfarbige Pfeifentchen in Geſellſchaft von bunten und breiſchnäbeligen Löffelenten ein, um die Würmerſchätze zu heben. Die in der Nähe gründelnden Knäck- und Schnatterenten bemerkt man erſt nach längerer Zeit, da ihr beſcheidenes Auftreten vor dem Lärm oder dem auffallenden Treiben anderer Vögel in den Hintergrund tritt. Da plötzlich geräth ein zwiſchen den Steinen hervorſprießender Zweig an der Grotte in ſtarke Bewegung, und nur ein ſcharfes Auge ſieht jetzt, wie ein grünfüßiges Teichhuhn neugierig, aber vorſichtig aus einer Oeffnung hervorlugt; jetzt kommt es ganz zum Vorſchein, ſchwanzwippend läuft es an den Rand des Teiches und ſchwimmt nun anmuthig und in ſchnellen Wendungen nach Nahrung ſuchend auf dem Waſſer umher. Eine Bewegung des Beobachters genügt, um es zur ſchleunigen Rückkehr in ſein Verſteck zu veranlaſſen. Ungefähr zehn der ſcheuen Thierchen befinden ſich in der Voliere, und doch ſieht man nur ſelten eines von ihnen, es ſei denn, daß der Liebhaber bis zum Eintritt der Abenddämmerung im Garten verweilt; denn dann wagt ſich eins nach dem andern hervor. Zutraulicher ſind die Bläßhühner; furchtlos kommen ſie ganz nahe an die vor der Voliere ſtehenden Menſchen heran, ſodaß man hinreichend Gelegenheit hat, ihre merkwürdige Geſtalt und das dunkele Gefieder in Augenſchein zu nehmen. Einen in's Auge fallenden Unterſchied zwiſchen ihnen und ihren niedlichen Verwandten bemerkt man in dem Gang; während das grünfüßige Teichhuhn ohne Schwierigkeit und ſehr behende läuft, iſt der Gang des Bläßhuhns infolge der großen Schwimmlappen entenartig watſchelnd und ſchwerfällig. Zu den ſcheuen Bewohnern der Voliere gehören dahingegen wieder die großen Brachvögel (Numenius arquatus, *L.*); wenn ſie im Hintergrunde einmal vorüberhuſchen, ſchüttelt der Nicht-Vogelliebhaber wol den Kopf über die langbeinige Geſtalt und denkt ſich dann irgend einen fernen Erdtheil als Heimat dieſes menſchenſcheuen Geſchöpfes, das doch dem Kenner der einheimiſchen Vogelwelt eine ſo anheimelnde Erſcheinung iſt.

(Schluß folgt.)

Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang.

Von R. Groſſe.

(Fortſetzung).

(Nachdruck verboten.)

Es mag hier gleich geſagt ſein, daß man im Lauf der Jahre auch bei dieſer Zuchtweiſe inſofern über das Ziel hinausgeſchoſſen hat, als man infolge der allgemeinen Beliebtheit, derer ſich die Hohlrolle erfreute, ſich faſt einzig und allein auf dieſe legte. Alle anderen Strofen wurden nebenſächlich behandelt, es wurde nach allen Richtungen in der peinlichſten Weiſe ausgemerzt, und man duldete nur noch Vögel mit guter Hohlrolle. Wir haben Fälle zu verzeichnen, in denen von Preisrichtern, die allein für die Hohlrolle ſchwärmten, ſogar tüchtige Knorrvögel, welche weniger Hohlrolle brachten, nur mit geringen Preiſen bedacht wurden. So lange die Sänger mit Hohlrolle ſeltener waren, und in den Kreiſen der Züchter noch guten Abſatz fanden, war dieſe Zucht eine recht einträgliche und brachte hübſches Geld; als aber die beträchtliche Zunahme der Züchter und Kanarienzüchtervereine es erforderlich machte, daß auch unter dem Laienpublikum Abſatzquellen geſucht wurden, wurden bald Stimmen laut, daß der Geſang dieſer Vögel zu einſeitig ſei, und man zog mannigfaltigere Sänger den eintönigen Hohlvögeln vor, ſelbſt wenn der Geſang der erſteren auch an Reinheit zu wünſchen übrig ließ. So iſt es denn ſchließlich dahin gekommen, daß die Händler, welche in erſter Linie unſere Edelſänger unter das Publikum zu bringen berufen ſind, einem Stamme, deſſen Lied vielſeitige Strofen enthält, den Vorzug geben, und daß die Preiſe für reine aber einſeitige Vögel beträchtlich herunter gegangen ſind. Wir ſind im Hinblick hierauf gezwungen, dahin zu ſtreben, daß das Lied des Edelrollers mannigfaltiger wird, und zwar wechſelvoller in den bis jetzt erzielten werthvollen Geſangsſtrofen, ohne verwerflichen Tönen und Strofen den Eingang zu geſtatten. Wie wir das fertig bringen, habe ich im Anfang dieſer Abhandlung auseinandergeſetzt.

Die Glanzſtrofen des Trute'ſchen Edelrollers beſtehen in: 1. Hohlrolle, 2. Hohlklingel, 3. Knorre, 4. Pfeife. Aus dieſen vier Abtheilungen läßt ſich ein recht mannigfaltiges und wohlklingendes Lied herausbilden, wenn wir bemüht ſind, durch verſtändnißvolle Kreuzung mit Vögeln, die das aus dieſen vier Strofen zuſammengeſetzte Lied in den verſchiedenſten Tonarten und mit vollkommener Tonfülle zu Gehör bringen, eine entſprechende Nachzucht anzuſtreben. Die Hohlrolle iſt auch jetzt noch entſchieden die Glanzſtrofe des Kanariengeſanges; ſie wird eingeleitet in der Regel mit dem Konſonanten h und durchgeführt mit r, als Vokale finden wir in ihr i, ü und in der tiefſten Lage ſogar u vertreten. Erfolgt nun die Verbindung des Grundkonſonanten r fortlaufend mit ein und demſelben Vokale, alſo hiririrír oder hürürürür oder hurururur, ſo haben wir es mit einer geraden Hohlrolle zu thun, die allerdings auf die Dauer ermüdet, umſomehr, wenn ein Vogel neben ihr nur noch wenige andere Strofen hören läßt. Wechſelt der Sänger dagegen in der Tonlage öfter ab, indem er die Hohlrolle ſteigend oder fallend vorträgt, alſo hiririrürürürururu, oder hurururürürüririri, ſo iſt dieſes Geſangsſtück — die gebogene Hohlrolle — wohlklingend und es wirkt packend, wenn er dieſe drei Tonlagen gewiſſermaßen mit zitternder Stimme hören läßt, der Züchter nennt dieſe Strofe dann die ſchockelnde Hohlrolle. Ebenſo ſchön iſt dieſe Strofe, wenn ſie gleichſam mit gedämpfter Stimme vorgetragen wird. Die vollkommene Hohlrolle wird ruhig, mit geſchloſſenem Schnabel und ſtark aufgeblähtem Kropf geſungen. Es gibt auch Hohlrollen, aus welchen die Vokale oe oder a herausgehört werden; dieſe ſind, weil ſie unter die Naſenſtrofen gehören, für den Züchter weniger werthvoll; denn Vögel mit ſolchen Touren ſind nicht zur Hecke zu verwenden. Deſſen ungeachtet können Naſen-Hohlrollen recht ſchön klingen, wenn der Naſallaut nicht allzu ſcharf hervortritt, und ſolche Vögel können für den Laien immer noch recht werthvoll ſein. Wird die Hohlrolle anſtatt mit dem Konſonanten r mit dem Doppelkonſonanten bl durchgeführt, lautet ſie alſo bliblibli, oder blüblüblü, oder blublublu, ſo haben wir es mit der Waſſerrolle zu thun. Sie iſt zu vergleichen mit dem plätſchernden Waſſer eines Baches. Auch dieſe Art Hohlrolle kann, ruhig und vollendet vorgetragen, etwas recht Beſtrickendes haben, und ſie iſt wol werth, daß ſie auf den Ausſtellungen bewerthet wird. Wenn es auch nicht rathſam iſt, gleich den Vögeln mit Naſenſtrofen auch ſolche mit Waſſerrollen zur Zucht zu nehmen, weil beide Geſangsweiſen durch die Fortzucht erfahrungsmäßig ausarten, ſo müſſen ſie doch bei entſprechendem Wohlklang auf den Ausſtellungen bewerthet werden, weil wir hier nicht ausſchließlich für die Züchter, ſondern auch für das Publikum die Sänger begutachten ſollen. Aus der vorſtehenden Erklärung dürfte zweifellos hervorgehen, daß ſchon die erſte Geſangsſtrofe, die Hohlrolle, zu einem recht mannigfaltigen Geſangsſtück herangebildet werden kann, wenn es der Züchter verſteht und es ſich angelegen ſein läßt, und wenn auf den Ausſtellungen alles Gute auch nach Verdienſt bewerthet wird, ohne daß man ausſchließlich auf die Brauchbarkeit des Preisvogels für den Züchter verſeſſen iſt. Aehnlich der Hohlrolle iſt auch die Hohlklingel ein wohlklingendes Stück im Liede unſeres Edelrollers. Dieſe Strofe hat ebenfalls zu Grundvokalen ü oder in ſehr tiefer Lage u, ſie verbindet dieſe Vokale mit dem Konſonanten l und wird eingeſetzt mit h oder r, die Hohlklingel lautet alſo: h üllüllüll, h ullullull oder r üllüllüll, r ullullull. Dieſe Strofe wird recht oft mit der Hohlrolle verwechſelt und unterſcheidet ſich von derſelben nur durch den Verbindungskonſonanten l, der an der Hohlrolle als r erklingt. Vollendet wird auch die Hohlklingel ſteigend oder fallend zum Vortrag gebracht; ſie darf nicht ſchleppend geſungen werden, weil ſie in dieſem Falle das ihr Eigenthümliche, nämlich den Glockenklang, verliert und weil dann der Konſonant l zu ſehr hörbar wird. Bedeutend mehr wird die Hohlklingel zur Geltung kommen, wenn der vortragende Sänger neben ihr auch eine Klingel hören läßt, in welcher der Konſonant l in Verbindung mit dem Vokale i tritt, alſo lautet h illillill oder r illillill; ſie klingt ſchön, wenn ſie metalliſch rein vorgetragen wird. Hohlklingel ſowol, wie Klingel gewinnen ſehr an Werth, wenn der Vogel den Haupt-Nachdruck auf den Vokal ü, u, bezw. i legt und wenn der Konſonant l allmählich in h aufgeht. Wie die Hohlklingel darf auch die Klingel nicht ſchleppend oder flach vorgetragen werden. In den Rahmen der Klingel fällt noch eine andere Geſangsſtrofe, die gewiſſermaßen als eine Doppelſtrofe anzuſehen iſt und zwar als gleichzeitiger Vortrag einer Klingel und einer hohen Hohlrolle, es klingen alſo zuſammen: r illillill ririririri, und der Zuhörer wird bei dieſem Geſangsſtück den Eindruck gewinnen, als ob er ein ſehr raſches Zuſammenſchlagen vieler kleiner Glöckchen höre. Dieſe Doppelſtrofe wird durch ihre eigenthümliche Zuſammenſetzung oft hart und auch breit vorgetragen, ſie verliert dann an Eindruck und nimmt deshalb unter den Rollen als Klingelrolle die unterſte Stufe ein. Der eigentliche Baß des Kanarienliedes iſt die Knorre, eine Verbindung des Vokales o mit dem Konſonanten r, eingeleitet durch k oder kn: kn orrorrorr. Dieſer Theil des Liedes muß aus voller Bruſt mit ſtark aufgeblähtem Kropf vorgetragen werden, und das r muß neben dem o ſcharf hervorklingen. Die Knorre wird um ſo werthvoller, je mehr der Vogel in ihr biegt und zwar nach unten, je mehr ſich alſo das o dem u nähert; die Knorre wird in dieſem Fall zur Knurre. Wird anſtatt des o oder u ein a aus dem Vortrag herausgehört, ſo wird die Vortragsweiſe flacher und iſt weniger anſprechend. Wäſſrig wird die Knorre, wenn der Konſonant l anſtatt des r in ihr auftritt; ſie iſt auch in dieſer Faſſung nicht viel werth. Zur Beurtheilung einer Knorre gehört ein feines Kennerohr, das recht geübt ſein muß.

Ein würdiger Abſchluß wird einem wohlklingenden Kanarienliede durch 4 bis 5 Du-Pfeifen am Ende des Geſanges ertheilt. Die Verbindung des Konſonanten d mit dem Vokal ü oder u, recht langſam, gleichſam wehmüthig zu Gehör gebracht, erklingt wunderſchön und trägt ſein gut Theil zur Verſchönerung des Geſammtliedes bei. Pfeifen auf di ſind weniger ſchön, und widerwärtig erklingt eine Pfeife auf ti, beſonders wenn eine größere Anzahl derſelben recht ſchnell hintereinander und recht kurz und ſpitz gebracht wird. Wenn wir die vorbeſchriebenen vier Hauptſtrofen des Liedes kurz beurtheilen wollen, ſo können wir ſagen: Die werthvollen Theile des Liedes unſeres Edelrollers müſſen mit geſchloſſenem Schnabel, ſtark aufgeblähtem Kropf und in ruhiger Haltung mit weichem Schmelz und in tiefer Tonlage zu Gehör gebracht werden. Alle anders hervorgebrachten Geſangsſtücke ſind weniger werthvoll; ſie werden werthlos, wenn ſie als Zungenlaute mit geöffnetem Schnabel und durchzogen von übel klingenden Konſonanten vorgetragen werden.

Es läßt ſich auf dieſer Grundlage die Ausbildung der Junghähne am meiſten zweckentſprechend durchführen, vorausgeſetzt, daß es ſich der Züchter angelegen ſein läßt, durch aufmerkſames Abhören der Nachzucht unter Anwendung der geſammelten Kenntniſſe die erforderlichen Unterſchiede in den Geſangsſtrofen zu machen. Aufmerkſamkeit iſt ſelbſtredend hierzu die erſte Vorbedingung, andernfalls können ſich recht unliebſame Fehler einſchleichen, die ſchwer, vielleicht auch garnicht wieder aus dem Stamme zu entfernen ſind. Ich will von dieſen nachtheiligen Folgen vernachläſſigter Geſangsprüfungen nur eine anführen. Die Nachzucht bringt Klingel, die den Züchter noch allenfalls zufrieden ſtellt, obgleich ihm Hohlklingel lieber wäre, er läßt ſie aber gewähren und hört aus irgendwelcher Veranlaſſung die Junghähne längere Zeit nicht ab. Unter den letzteren befinden ſich nun mehrere weniger gut geartete Größen, die gern mit der Zunge arbeiten und die Klingel wol bringen möchten, aber anſtatt des l immer den Konſonanten ſ einfügen, allerdings in möglichſt weicher Form, die alſo ſingen ſiſiſiſi; ſie haben anſtatt der Klingel die Schwirre eingeübt, die im Liede geduldet werden kann, wenn ſie nicht überhand nimmt und nicht hart und breit wird. Andere lernende Zöglinge wieder nehmen die Schwirre auf, bringen aber anſtatt eines immer noch weichen ſ zwei harte, und verbinden dieſe Konſonanten mit dem Vokal i in recht ſchneller Reihenfolge, ſie ſingen alſo iſſiſſiſ und die Schnetter iſt fertig, und wenn derartige Helden nicht möglichſt ſchnell aus der Hörweite ihrer Kameraden entfernt werden, ſo werden ſie noch eine größere Anzahl derſelben auf ihre Seite bekommen, und die ganze Geſellſchaft iſt in kurzer Zeit werthlos. Die Schwirre wird im Liede geduldet, ſie kann ſogar wohlklingend ſein, wenn ſie z. B. vor der Hohlrolle bei Beginn des Liedes weich und nicht allzu lang gebracht wird, aber die Schnetter iſt ſelbſt in ihrer gelindeſten Form verwerflich, weil ſie einen ganzen Stamm in Gefahr bringt. Hoffentlich wird ſie auch in Zukunft niemals auf den Ausſtellungen geduldet werden. Ein anderer Ton, der ſich oft im Kanariengeſang vorfindet, und der auch gerade nicht zu den lieblichſten Ergüſſen gehört, iſt der Aufzug; er klingt ritſch, retſch, ratſch oder tzerr, und wird am häufigſten vor Beginn der Knorre gehört. Der Aufzug wird gewiſſermaßen als Erholungspauſe im Lied angeſehen und entwerthet daſſelbe nicht, wenn er nicht übermäßig oft, breit und hart gebracht wird. Alle kurzen, ſcharfen und ſpitzen, auch breiten Töne, die der Vogel mit der Zunge hervorbringt, ſind als Fehler anzuſehen und müſſen ausgemerzt werden. Unter ihnen nehmen die erſte Stelle ein die Beiwörter: ei, ei, wei, wei, wiß, wiß, zi, zi, zit, zit, ſi, ſi, giſ, giſ, ſchepp, ſchepp, ſchapp, ſchapp. Sie verunglimpfen den Geſang, wenn der Vogel ſie oft und laut, bzl. ſcharf bringt.

Bei aufmerkſamer Durchſicht der vorſtehenden Auseinanderſetzungen über die Geſangsſtrofen durfte es wol jedem Züchter einleuchten, daß wir recht gut im Stande ſind, auf Grund unſerer bisherigen Geſangsrichtung, vornehmlich unter Beibehaltung der Reinheit des Liedes mannigfaltige Sänger heranzubilden, die auch das Laienpublikum in jeder Beziehung befriedigen müſſen. Ich will es aber nicht unterlaſſen, zum beſſeren Verſtändniß meiner vorſtehenden Angaben zwei Beiſpiele anzuführen, aus denen erſichtlich ſein muß, daß ein einſeitiger Vogel ermüdet, während ein ſolcher mit wechſelvollem Geſang das Ohr des Zuhörers ergötzt. Der erſte Vogel, den ich anführen will, ſetzt mit einer Schwirre ein, geht darauf in eine tiefe Hohlrolle über, die er zwar lang, aber in ein und derſelben Tonlage hören läßt. Nach dieſer Hohlrolle bringt er eine ebenfalls lange, aber auch grade Hohlklingel und er beſchließt ſein Lied mit einigen Du-Pfeifen. Ein ganz hübſcher Zuchtvogel, aber einen Laien kann er niemals erfreuen und es werden von ihm vorausſichtlich auch für die Zukunft keine Nachkommen mit wechſelvollem Liede erzielt werden. Wenn dagegen ein zweiter Vogel gleichfalls mit einer ſanften Schwirre ſein Lied beginnt, darauf zu einer ziemlich hohen Hohlrolle übergeht, in derſelben Abtheilung (Hohlrolle) immer mehr nach unten biegt, bis er ſchließlich zum Vokale u gelangt und ebenſo zum i aufſteigt, wenn er dann aus dieſer mit weichem Schmelz vorgetragenen Strofe in eine Hohlklingel kommt, die er ebenfalls ſteigend und wieder fallend hören läßt und ſo beſtrickend vorträgt, daß ſchließlich das l in einem ſanften h aufgeht, und wenn er weiter nach einem kurzen und weichen Aufzuge eine volle, runde Knorre bringt, die zuletzt zu einer Knurre wird, und ſein Lied mit vier bis fünf wehmüthigen Du-Pfeifen ſchließt, ſo möchte ich wol einen hören, ſei er Züchter oder Laie, der nicht ſagt, daß das ein mannigfaltiger Vogel ſei, und der nicht beſtrebt wäre, ſich einen ſo vollkommenen Sänger zu erwerben.

(Schluß folgt.)

Aus den Vereinen.

Mainz, 24. November 1899. **Verein für Geflügel- und Vogelzucht.** Die geſtrige Monatsverſammlung des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht war von über 200 Mitgliedern beſucht. Nach einer Begrüßung des Vorſitzenden, Herrn Pozniczel, machte derſelbe die Mittheilung, daß dem Verein wieder eine Anzahl neuer Mitglieder beigetreten ſeien, weiter theilte er mit, daß demnächſt eine Delegirten-Verſammlung des rheinheſſiſchen Geflügelzucht- und Vogelſchutz-Vereins abgehalten werde, welchem ſämmtliche rheinheſſiſche Geflügelzuchtvereine, und zwar die Vereine in Mainz, Worms, Wöllſtein, Ober-Flörsheim und Bechtheim angehörten. In Bildung ſeien begriffen ſolche Vereine in Oſthofen und in Pfeddersheim und werden vorausſichtlich auch dieſe beiden

Vereine dem gemeinſamen rheinheſſiſchen Verbande beitreten. Nachdem ſich der Vorſitzende auf Grund der Statuten noch eingehend über das Beſtreben des rheinheſſiſchen Vereins verbreitet hatte, wurde zur Wahl der Delegirten des demnächſt, wahrſcheinlich in Mainz, ſtattfindenden Delegirtentages des rheinheſſiſchen Geflügelzucht- und Vogelſchutzvereins geſchritten und wurden auf Vorſchlag folgende Herren gewählt: Direktor Schüler, Fürſtweger, Agius, Diehl, Falk, J. B. Heim jr., Kimmes, Mach, D. Schmitt, W. Schneider und Schröter. Sollte einer der Delegirten am Erſcheinen verhindert ſein, ſo hat dies derſelbe anzuzeigen, damit alsbald ein anderer Delegirter gewählt wird. Der Vorſitzende machte noch die Verſamlung auf die demnächſt ſtattfindende Ausſtellung der Kanarienſektion in der Stadthalle aufmerkſam und erſuchte um eine rege Abnahme von Loſen für dieſe Ausſtellung. Nachdem noch Herr Direktor Schüler auf das Unſtatthafte aufmerkſam gemacht hatte, daß an der letzten Verloſung ſich auch Nichtmitglieder betheiligt hätten, wurde mit der üblichen Verloſung die Verſammlung geſchloſſen.

Anfragen u. Auskunft

Herrn **Aug. Matern**: Sie wollen Zaunkönige züchten! Wir wünſchen Ihnen alles Glück dazu, denn es liegen auf dieſem Gebiete bisher keine nennenswerthen Ergebniſſe vor. Wir würden uns freuen, wenn Sie recht ſchöne Erfolge erzielten, und wir beantworten Ihre bezüglichen Fragen gern, umſomehr als wir dadurch die Bedingungen für eine glückliche Züchtung mitzuſchaffen hoffen dürfen. 1. Als Firma für den Bezug des Pärchens empfehlen wir Ihnen R. Wilhelm, Zoologiſche Handlung, Berlin SW., Lindenſtr. 37. 2. Es wäre wol gut, wenn Sie in dem Kiſtenkäfig nur ein einziges Pärchen unterbringen würden. Sie könnten dann wol am erſten auf Züchtungs-Ergebniſſe rechnen. 3. Sie brauchen nur die Decke Ihres Kiſtenkäfigs zu polſtern; ſtatten Sie ihn jedoch reichlich mit alter, rauher und riſſiger Baumrinde aus. 4. Als Niſtmaterial bieten Sie reichlich Moſe, Baumflechten, Faſern, Halme und Federn. Ein zweckentſprechender Niſtkaſten kann eigentlich garnicht zu groß ſein, muß vier- oder ſechseckig ſein oder einen Zylinder bilden, an welchem unten der Boden befeſtigt und oben der Deckel aufgenagelt oder angehakt iſt. Der innere Boden muß ſanft ausgehöhlt, gleichviel ob ausgebohrt oder ausgedrechſelt, gerundet, nicht zu glatt, aber auch keinenfalls holprig ſein. Sodann ſollen die Wände innen nicht glatt ſein. Ob die Niſtkäſtchen aus weichem oder hartem Holz gefertigt werden, iſt gleichgiltig; nur ſoll man nicht ſog. olmiges, d. h. faules Holz oder gar Rindenniſtkäſtchen wählen. Sie ſind ſo anzubringen, daß die Vögel ſich ſicher fühlen. Die Wände müſſen feſt genagelt ſein, und der Kaſten muß unverrückbar feſt hängen; Ritzen und Spalten ſchaden nicht. Zur Ueberwachung und Reinigung können die Niſtkäſten mit aufzuklappendem Deckel oder ſeitwärts mit Schiebe- oder an Drahtöſen gehender und vermittelſt Haken und Oeſen ſchließender Thür eingerichtet ſein. — Ueber die Einrichtung der Schlafkäſten endlich finden Sie ſachkundige Anweiſungen in dem laufenden Jahrgange der „Gefiederten Welt“ Nr. 28 von Herrn Reuter.

Herrn **A. M.**: 1. Der Geſang der Dayaldroſſel bleibt hinter dem der Schamadroſſel an Fülle und Wohlklang weit zurück. Ein beſtimmtes, allgemein gültiges Urtheil, welches die Ueberlegenheit der geſanglichen Leiſtungen der Dayaldroſſel über die der Singdroſſel oder umgekehrt feſtſtellte, gibt es nicht. Jedenfalls liegen ſehr günſtige Urtheile über den Geſang der Dayaldroſſel vor, ſodaß Sie wol nicht ſchlecht fahren würden, wenn Sie einen Verſuch machten, dieſen Vogel zu halten. 2. Reichen Sie der Dayaldroſſel ein gewöhnliches Nachtigalfutter (gelbe Rübe oder Möre, gutes Weizenbrot, gekochtes Ochſenherz, alles fein und gleichmäßig zuſammengerieben, und dazu trockene Ameiſenpuppen) mit etwas abgekochtem Siebkäſe. Außerdem muß ſie reichlich Frucht, kleine Aepfel- oder Birnenſtückchen, zerſchnittene Feige, kleine Roſinen oder Korinthen, rothe Hollunderberen (trocken oder eingeweicht) erhalten. In geringer Gabe iſt ihr auch zerkleinertes, hartgekochtes Hühnerei dienlich. Auch an Mehlwürmern darf es nicht fehlen; 10 bis 12 Stück täglich, am beſten auf zwei Gaben vertheilt, ſind nicht zuviel.

Herrn **F. Reif**: 1. Auf Niſterfolge bei rothen Kardinälen dürfen Sie mit ziemlicher Beſtimmtheit rechnen. Dieſe Vögel ſind bereits in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Holland mit Glück gezüchtet worden. Natürlich müſſen Sie alle in Betracht kommenden Vorſchriften ſorgfältig beachten und einhalten. 2. Das Bauer für **ein** Par Kardinäle, d. h. der Heckkäfig, muß 75 cm lang, 60 cm tief und 75 bis 90 cm hoch ſein. 3. Mehrere Pare etwa in einer größeren Voliere zuſammenzuhalten, bzw. zu züchten, würde nicht rathſam ſein. Der Erfolg wäre von vornherein in Frage geſtellt, weil der rothe Kardinal ein unverträglicher und böswilliger Vogel iſt, — faſt die einzige Schattenſeite neben den Lichtſeiten!

Frau **Thekla Trott**: 1. Ihren Wünſchen würden am beſten Dr. Ruß, Werke „Der Graupapagei“ und „Die ſprechenden Papageien“ entſprechen. Erſteres iſt für 2,40 Mk., letzteres für 7,25 Mk. durch jede größere Buchhandlung zu beziehen.

Herrn **P. Helmkrampf**: Die Fütterung der Kalanderlerche beſteht in Hirſe, Spitzſamen, Hafer, Mohn, ein wenig gequetſchtem Hanf, ferner etwas Miſchfutter aus getrockneten Ameiſenpuppen mit Möre überrieben oder Nachtigalfutter und einigen (4 bis 6) Mehlwürmern täglich.

Herrn **Franz Báraby**: Farbige Plakate zu Reklamezwecken für Vogelausſtellungen beziehen Sie gut durch die Firma Hugo Spindler, Berlin, Ritterſtraße 96.

Herrn **Alir Lisneck**: Potsdamer Zwieback beziehen Sie am beſten von der Firma Rud. Franz Henning, Kraftnährbrot- und Zwieback-Fabrik, Berlin W., Blumenthalſtraße 19.

◆

Zu unſerm Bilde.

Weit weniger zart und weichlich als der Paradisſittich iſt der nahverwandte Singſittich oder rothrückige Plattſchweifſittich (Psittacus haematonotus, *Gld.*), einer der bekannteſten unter den eigentlichen Prachtpapageien. Bei ſachgemäßer Pflege zeigt er ſich ſehr ausdauernd; ſchon mehrmals iſt er ſogar im ungeheizten Raum, ſelbſt im Freien, überwintert worden. Als Stubenvogel iſt er ſehr zu empfehlen, beſonders da er auch ſonſt alle Eigenſchaften beſitzt, die ihn als ſolchen angenehm machen. Er hat ein zutrauliches, anmuthiges und immer lebhaftes Weſen, iſt verträglich unter kleinen Vögeln, nur zuweilen gleichgroßen oder größeren Papageien gegenüber zänkiſch, auch ſtört er niemals durch läſtiges Geſchrei. Zugleich iſt er ein guter Zuchtvogel; in den Frühlings- und Frühſommermonaten bringt er es zuweilen auf drei bis fünf Bruten. Eigenthümlich iſt der melodiſche, plaudernde Geſang und droſſelähnliche Ruf, den Männchen ſowol als Weibchen hören laſſen. Bei Herrn Pfarrer Winkler ahmten junge Männchen den Geſang eines Stiglitz nach, deſſen Schlag ſie vollſtändig in ihr Geplauder verwebten. — Intereſſant iſt das komiſche Liebesſpiel zur Niſtzeit.

Der Singſittich hat wie der Paradisſittich ein farbenprächtiges Gefieder. Er iſt oberſeits glänzend grasgrün; Unterrücken und Bürzel blutroth; Eckflügel und untere Flügeldecken blau, neben dem Flügelrand einige gelbe Federn; Bruſt und Bauch gelb; untere Schwanzdecken weiß; fünf ſeitliche Schwanzfedern am Ende weiß; Schnabel ſchwärzlichhorngrau, Spitze ſchwarz, Unterkiefer heller, Wachshaut bräunlichgrau; Auge braun; Füße bräunlichgrau, Krallen dunkelbraun. Das Weibchen iſt graulicholivengrün; Geſicht, Nacken, Kehle und Bruſt gelblich ſcheinend; Bürzel grün; Unterſeite graugrünlichgelb; untere Schwanzdecken graulichweiß. In der Größe iſt er dem Paradisſittich gleich.

Seine Verbreitung erſtreckt ſich über ganz Auſtralien, mit Ausnahme des Weſtens. Graſige Thäler und Hügel bilden dort für gewöhnlich ſeinen Aufenthalt, zur Brutzeit aber ſucht er den Wald auf. Hier ſieht man oft Hunderte der reizenden Vögel auf den blätterloſen Aeſten der Gummibäume dicht aneinander gedrängt ſitzen. Auf dem Erdboden laufen ſie ungemein gewandt und mit der Schnelligkeit des Regenpfeifers umher.

D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

[illegible]

[illegible]

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer,
Papageikäfige,
Eichhornkäfige,
Zuchtutenſilien,
alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Jll. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [2265]

Univerſalfutter.

Vor dem Kennerauge kann eine **Univerſalfutter-Miſchung ohne Zeke** nicht mehr als vollwerthig beſtehen.

Einige Jahre fehlte dieſes Produkt vollſtändig am Vogelfuttermarkt, und mancher Liebhaber hätte gern 10 Mk. für ein Kilo bezahlt, wenn er es hätte bekommen können.

Zeke iſt **jetzt wieder** überall **gut** und **billig** zu haben.

Man verlange ausdrücklich **„Zeke, Marke Amſel“.** [2266]

Mehlwürmer, vegetab. gefüttert, ganz rein, à Liter 4,50 ℳ, Kilo 7,50 ℳ m. Verpackung. **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Liter 80 ₰, bei 10 Liter 75 ₰, empfiehlt und verſendet [2267]

C. O. Streckenbach, Breslau X.

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 4,25 ℳ, Kilo 7,75 ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ. **Ameiſeneier,** hochprima Ware, Liter 90 ₰. [2268]

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Vögel.

Harzer Hohl- u. Knorren-Roller!

Die Vögel bewegen ſich in ſchönen Hohl-, Hohlklingel-, Klingel-Knorren und Du-Du-Pfeiſen im Preis zu 8, 10, 12, 15 u. 20 ℳ, Dtzd. 10 % Rabatt, Weibchen 1,50 ℳ, Dtzd. 12 ℳ. Verſandt gegen Nachnahme bei zehntägiger Probezeit, nicht gefallende Sänger tauſche um oder zahle erhaltenen Betrag zurück. Packung frei, nach dem Auslande gegen vorherige Einſendung des Betrages.

[2269] **W. Schöndorf,**
Schriftführer des Vogelzucht-Vereins „Kanaria“ in **Holzhauſen** bei Pyrmont.

Pariſer Trompeter-Kanarien,
hochfeiner Stamm, mit 1. Preiſ. prämirte Vögel, à P. 30, à Mch. 18, à Wb. 14 ℳ. [2270]

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis.

Dompfaffen,
ſelbſtgelernte, 2 Lied. ſſ. pfeif., u. Garant. [2271]

Jean Schmidt. Lehrer, Schlotzau, Kr. Hünfeld.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen
Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft.

Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen.

Kataloge gratis u. franko. [2272]

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländiſchen und ausländiſchen körner- und inſektenfreſſende Vögel, in allerfeinſter, ſtets friſcher Ware, beſonders **Ameiſeneier,** handverleſene ganz reine, **Eintagsfliegen** (Weißwurm), **Muska** oder **Zeke** (überſeeiſche Fliege), **Mehlwürmer** und **Univerſalfutter-Miſchungen** verſendet zu billigen Preiſen [2273]

H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung, **Erfurt,** Futterſtraße 2.

Preisliſte auf Wunſch umſonſt und portofrei.



F. Rejsek,

Hamburg, Peterſtraße 28.

Spezialität:

Alle Arten Papageien u. Papageienkäfige.

Prämirt auf allen beſchickten Ausſtellungen.

Offerirt in nur ſchönen, wohlgepflegten, geſundeſten Exemplaren: Junge **Grau-Papageien** (Jakos), ſchon von 12 ℳ an; ſolche ſchon ¼ Jahr hier, an alles Futter, Hanf, Waſſer gewöhnt, nur 20 ℳ; ſolche vom Congo, 5 Monat jetzt hier, ſchön flötend und zu ſprechen anfangend, nur 25 ℳ; ſolche ſchon ¾ Jahr hier, Prachtexemplare, völlig hier akklimatiſirt und abgehärtet, Stück nur 35 ℳ; ſolche ſchon ſehr viel ſprechend, Lieder ſingend und flötend, je nach Leiſtung 60, 80, 100, 120, 150, 200 ℳ. **Amazonen,** Blauſtirn (Rothbug), noch nicht ſprechend, nur 15 ℳ; ſolche anfangend zu ſprechen, 18, 20 ℳ; ſolche ſchon ſprechend, je nach Leiſtung 25, 30, 35, 40, 50 ℳ; ſolche ſchon beſonders viel ſprechend, Lieder ſingend und flötend, Stück nur 75, 100, 150 ℳ. Große **Doppelgelbköpfe** u. **Gelbnacken,** anfangend zu ſprechen, 30 ℳ; ſolche ſchon par Worte ſprechend, 35 ℳ; **Diadem-Amazonen,** flötend und ſprechend, 35 ℳ. **Rothſtirn-Amazonen,** ſprechend, 20—25 ℳ. **Brillen-Amazonen** in ſchönſtem Prachtgefieder, 6 bis 8 Worte ſchon ſprechend und äußerſt zahm, nur 25 ℳ. Große und kleine **Gelbhauben-Kakadus,** Stück 15—18 ℳ; ſolche ganz zahm 25 ℳ. Große rothe **Araras,** zahm und ſprechend, 65—85 ℳ. Große **Alexander-, Hoch- u. Edelſittiche** in tadelloſem Prachtgefieder, jung, gelehrig, anfangend zu ſprechen, Stück 15 ℳ; 1 dito, ſchon ſprechend, 20 ℳ. **Nanday-Sittiche** Stück 10 ℳ. **Mönchsſittiche** Stück 6 ℳ. **Kleine Alexanderſittiche** Stück 5 ℳ. **Singſittiche** Par nur 20 ℳ; 1 dito, ſelten ſchönes, zuſammengewöhntes Zuchtpar, 30 ℳ. **Turteltäubchen** Par 4 ℳ. **Rein ſchneeweiße Lachtauben,** Par nur 5 ℳ. Zahme, drollige, hochamüſante, kleine u. große **Affen,** **Stück ſchon von 12 Mk. an.** Verſandt jederzeit, nach allen Orten des In- und des Auslandes, unter Garantie für Werth und für lebende und geſunde Ankunft dort. **Papageienkäfige,** ganz aus Metall, ſtark verzinnt, ſehr ſtark und durabel und ganz nach Vorſchrift gearbeitet, mit und ohne Meſſingverzierungen, und mit den allerneueſten, praktiſchſten Porzellangeſchirren für Futter und Waſſer, und allem ſonſtigen Zubehör, in allen Größen und Facons, **das Stück ſchon von 3½ Mk. an!** Gebrauchte Papageienkäfige **ſchon von 2 Mk. an,** die neu das Drei- und Vierfache gekoſtet haben. [2274]

Bedienung sehr streng reell! Umtausch gestattet!

Graupapagei, kerngeſunder, prachtvoller, zahmer Vogel, 12—15 Worte deutlich ſprechend unt. Garant. mit 70—75 cm hoh. **hübſch. neuem Käfig** 75 ℳ

Graupapagei, tadellos, geſund und äußerſt talentirter Vogel, 30 bis 35 Worte deutlich ſprechend **mit ſchönem hübſch. neuen Käfig** 110 ℳ, ſowie gutſprech. **Amazonenpapageien** preiswerth. [2275]

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis.

Zaunkönig 5 ℳ, Müller- u. Dorngrasm., gelbe Bachſtelzen, do. weiße, Wieſenſchmätzer, Gartenrothſchwänze, à 4 ℳ, Vornella, Blauſpecht, à 3 ℳ, großer Buntſpecht 4 ℳ, Blaukehlch. à 9 ℳ, Zp. Dompf. 4 ℳ. Alles geſund., futterf. ſſ. Vögel. [2276]

Hesse, Berlin, Schleiermacherſtr. 10.

Verk.: Einen jungen gelehrigen Graupapagei, ein Jahr im Beſitz, mehreres ſprechend, geſund und ſchön befiedert, kein Schreier, Preis mit faſt neuem Käfig 50 ℳ. [2277]

Heinrich Becours, Goslar.

Der heutigen Nummer liegt ein Proſpekt der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, betreffend Deutſchlands Amphibien und Reptilien ꝛc., bei.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Inhalt der Nr. 50.

Mittheilungen aus Centralamerika.
Die Rieſenvoliere im Düſſeldorfer zoologiſchen Garten (Schluß).
Die Nachtigal.
Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang (Schluß).
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenſchau. — Zu unſerm Bilde.

Anzeigen.

Annahme von Anzeigen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Vom Besten das Beste!

Mehlwürmer, rein vegetar. gefütt., Ltr. 4,50 ℳ. **Neue Ameiſeneier!** Hochf., geſiebte, ſandfr., goldgelbe Ware, Ko. 3 ℳ, 5 Ko. 13,50 ℳ. **Prima Elbe-Weißwurm,** Ko. 3 ℳ, Lt. 85 ₰. **Tyroler Ameiſeneier,** hochfein, weiß u. rein, handgeleſen, Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ, 1 Ko. 4,50 ℳ. **Zeke (Musca),** 99er, feinſte, fr. Ware, à Ko. 2,60 ℳ, 5 Ko. 12,50 ℳ. Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahr. ſelbſt erprobt, Ko. 1,80, 5 Ko. 8,50 ℳ, ſowie ſachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- u. Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ, ſolide Bedienung. Verſuch lohnt. [2293]

Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Gelbnacken-Amazone, junger, prachtvoller, rein u. deutlich ſprechender, abſolut fingerzahmer Vogel, kein Schreier noch Beißer, ſehr fleißig in ſeiner Vortragsweiſe, ſpricht über 100 Wörter in ganzen Sätzen, ſingt (wirklich reizend) 3 Lieder, iſt ohne jede Untugend, tadellos ſchmuck befiedert und ferngeſund, feſter Preis 140 ℳ. Garantie für obige Angaben und geſunde, tadelloſe Ankunft, Sprachverzeichniß zu Dienſten.

Graupapagei, **prachtvoller, bildſchöner, junger ſtarker u. kräftiger Südvogel,** ſelt. gut begabt, **ferngeſund, feſt acclimatiſirt, lebhaft, ſpricht rein u. deutlich unter Garantie:** Guten Morgen, guten Tag, komm komm her, komm gib Kuß, du Schlingel du willſt Haue haben, ſoll ich mit dem Stocke kommen? Guter Jaco will auch was haben, mein Jung ja, 1, 2, 3, hurrah u. ſ. w., ſpricht viel mehr, leicht lernend, fleißig ſtudirend, fingerz., läßt Köpfchen krauen, mit tadelloſem Gefieder, für 95 ℳ. Ferner eine **prachtvolle** **Blauſtirn-Amazone,** mit vielem Gelb am Halſe, ſelten fingerzahm u. liebevoll gegen Jedermann, ſpricht **deutlich** Lora, Papa, Mama, gute Frau, 1, 2, 3, hurrah, guten Morgen, und noch viel mehr, für 45 ℳ. Bedienung in jeder Beziehung zufriedenſtellend und ſtreng ſolid. [2294]

Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.

50 % Eier mehr [illegible] Knochenmühlen [illegible] liefert **Behm & Steinhardt.** [2295] Waren i. Mecklenb. Proſpekte gratis

Der beſte Fangapparat für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland [illegible] Einſendung des Betrags. [2296]

K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.

Für alle Arten Vögel fertige ich fachgemäße **Volieren, Käfige und Niſtutenſilien** an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). — Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.

Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [2297]

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [2298]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe, **Schlotheim i. Th.**

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [2299]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6. — franko.
Man verlange Preisliste.

Geflügel-Fußringe für Hühner 3, 5 u. 6 ₰, für Tauben und Kanarien. [illegible] 2, 3 u. 4 ₰. [2300] **H. D. Becker,** Iſerlohn.



Käfige jeder Art Preisliſte gratis [illegible]

Arthur Herrmann & Cie.,
[2301] **Oſchatz** i. S.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. C. A. Dietrich Hoflief.), **Clingen** bei **Greußen.** [2302]

Neu! Senſationell!
Kanarien-Lehr-Orgeln,
auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G.-M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [2303] **Edmund Schiewick,** Zittau, Sachſen.
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.
Reparaturen aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, [in] großer Auswahl u. billigem Preis. [2304]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Geſangskäſten, [2305] [illegible] A. Bothe, Wedderſtedt, Harz.

Hermann Schramm's
patentirte
Original-Hohl- und Klingel-roller-Apparate,
ſind die höchſtprämiirteſten, weltbekannteſten und **anerkannt beſten Geſangshilfsmittel für Kanarien.** Preisliſte gratis und franko durch [2306]

Hermann Schramm's Nachf.,
Dresden.

Digitized by Google

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Begründet von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 50. Magdeburg, den 14. Dezember 1899. XXVIII. Jahrg.

Mittheilungen aus Centralamerika.

Von Federico Eichlam.

Das Morellet-Pfäffchen (Coccothraustes Morelleti).

(Nachdruck verboten.)

In meinen letzten Mittheilungen, welche mit wenigen Worten den Atlasfink in ſeinem Freileben ſchilderten, erwähnte ich ein Vögelchen, das Morellet-Pfäffchen, welches mit erſterem in ſteter Gemeinſchaft anzutreffen und wie dieſer zu den gewöhnlichſten Erſcheinungen der hieſigen Vogelwelt zu zählen iſt. Ich habe mich daher entſchloſſen, eine kurze Beſchreibung des Freilebens auch dieſes kleinen Finken folgen zu laſſen.

Bezeichnende und charakteriſtiſche Merkmale ſondern das Geſchlecht der Pfäffchen in der Familie der ſtarkſchnäbligen Finken zu einer engbegrenzten Unterfamilie, deren Vorkommen nur auf Amerika beſchränkt iſt. Die meiſten reihen ſich hinſichtlich der Größe den Prachtfinken an, obgleich das ſtarkentwickelte Schnäbelchen die Vögel robuſter und größer erſcheinen läßt, als ſie in Wirklichkeit ſind. Weder hervorragender Geſang, noch farbenreiches Gefieder iſt den Pfäffchen eigen. In ein düſteres Grau und Braun, welches theilweiſe von ſchwarzer oder weißer Zeichnung unterbrochen iſt, ſind die Männchen gekleidet. Die Weibchen ſind vorherrſchend dunkelolivenbräunlich in mehrfacher Schattirung. Ein oder zwei hellere bis reinweiße Flecken auf den Flügeln ſind bezeichnend für die Männchen des ganzen Geſchlechts.

Nur wenige Arten haben bis jetzt den Weg in die Vogelſtuben gefunden, die meiſten ſind ſelten und ihre Einfuhr nur von gutem Glück und vom Zufall abhängig. Der Liebhaber würde es ſicherlich mit Freuden begrüßen, wenn dieſe kleinen Papageiſchnäbelchen gleich den meiſten Prachtfinken zahlreicher eingeführt würden. Die bis jetzt in den Vogelſtuben gemachten Erfahrungen ſichern den Pfäffchen in ihren verſchiedenen Arten ſtets eine liebevolle Aufnahme und da, wie bereits erwähnt, dieſe Vögelchen ſich weder eines angenehmen Organs noch eines buntſchillernden Federkleids erfreuen, müſſen es andere Vorzüge ſein, welche ihnen dieſe Stellung erworben haben. Vor allem iſt es ihre Anſpruchsloſigkeit hinſichtlich ihrer Verpflegung; mit Prachtfinkenfutter nehmen ſie vorlieb und halten dabei in der Vogelſtube wie im Käfig jahrelang aus. Mit ihresgleichen oder mit anderen Genoſſen der Vogelſtube leben ſie in ſteter Harmonie. Ich wüßte mich nicht zu entſinnen, daß dieſe Freundſchaft zu irgend einer Zeit oder aus irgend einer Veranlaſſung getrübt worden wäre.

Als ein Muſter in jeder Beziehung, das alle die vorerwähnten Vorzüge in ſich vereinigt, möchte ich das Morellet-Pfäffchen hinſtellen. Ihm habe ich es auch zu verdanken, daß ich, ſeine guten Eigenſchaften erkennend, dem ganzen Geſchlecht mehr Aufmerkſamkeit entgegenbrachte, als es früher der Fall geweſen iſt. Im Freien wie in der Gefangenſchaft iſt das Morellet-Pfäffchen derſelbe liebenswürdige Vogel. Wenn ich ihn auf einer hervorragenden Strauchſpitze ſitzen ſehe, möchte ich glauben, daß er alles erſt zweimal überlegt, bevor er es zur Ausführung bringt. Alle ſeine Bewegungen, ſein ganzes Thun und Treiben verrathen etwas Beſonnenes und unbedingt Beſtimmtes. Noch bei keiner anderen Vogelgattung konnte ich ein ſo inniges Zuſammenleben, wie es in der Freiheit zwiſchen den Morellet-Pfäffchen und den Jakarinifinken beſteht, wahrnehmen, trotzdem die beiden Vögel vollſtändig getrennten Familien angehören. Ueberall, wo der Jakarina zu finden iſt, wird man auch ſogleich ſeinen Freund, das Pfäffchen, zu Geſicht bekommen! Unſer Vögelchen liebt das Kulturland und hält ſich gern in der Nähe menſchlicher Wohnungen auf. Es kommt mit dem Jakarina ſelbſt auf einzeln gelegene Gehöfte, um eine geeignete Futterquelle auszukundſchaften, der alsdann auch mehrmals am Tage ein Beſuch abgeſtattet wird. Aber ſonſt iſt der kleine Vogel inbezug auf ſeinen Aufenthaltsort ſehr konſervativ und verläßt ihn nur ſelten.

Am beſten läßt ſich das Pfäffchen in den Morgenſtunden beobachten. Es ſitzt alsdann meiſtens allein auf einer etwas hervorragenden Strauchſpitze und wartet, bis die ſoeben aufgegangene Sonne den Thau vom Graſe genommen hat, dann erſt geht's zum Futterſuchen. Die Nahrung beſteht aus kleinen Sämereien, aber auch aus Beren und Obſt; kleine Heuſchrecken ſind ihm ein bevorzugter Leckerbiſſen, wie überhaupt Inſekten zu ſeinem Wohlbefinden unbedingt nothwendig erſcheinen. In der Gefangenſchaft geht der Vogel auch gern an Ei- und Fleiſchmiſchfutter, doch bildet Kanarienſat und Maisſchrot hier ſeine Hauptnahrung. An ganzen Maiskörnern müht er ſich vergeblich, doch weiß er halbreifen, noch in Milch ſtehenden Mais recht geſchickt auszuknabbern.

Die Niſtzeit beginnt für das Morellet-Pfäffchen ſchon ſehr frühzeitig. Im Januar konnte ich bereits Vögelchen beobachten, welche Niſtmaterial zuſammentrugen. Das erſte Neſt mit Eiern fand ich dagegen erſt Ende Februar. Während dieſer Zeit bewahren die Männchen dieſelbe gelaſſene Ruhe wie ſonſt, und ich konnte eine erregte Veränderung abſolut nicht wahrnehmen. Das Neſt iſt nicht hoch, frei in dichtem Gebüſch aus feinen Halmen und Mos errichtet und im Innern mit kurzen Haren, Pflanzenwolle und Federchen weich ausgepolſtert. Das Gelege beſteht aus zwei bis drei grünlichweißen, dunkelbraun geſprenkelten Eiern, welche nach meiner Beobachtung nur vom Weibchen bebrütet werden. Um ſo aufmerkſamer betheiligt ſich alsdann das Männchen an der Aufzucht der Jungen. Die ausgeflogenen Jungen bleiben noch einige Tage, meiſtens dicht aneinander geſchloſſen, im ſchützenden Gebüſch ſitzen. Alt und Jung lockt fortwährend mit einander, ſodaß ein aufmerkſamer Beobachter auf dieſe Weiſe den Standort der Jungen ſtets ausfindig machen kann. Die Jungen gleichen bis zum Auguſt den Weibchen; von da ab unterſcheiden ſich infolge des Federwechſels nach und nach die Männchen von den Weibchen.

Im hieſigen Muſeum iſt das Morellet-Pfäffchen nur in einem einzigen Männchen vertreten mit der Bezeichnung „Spermophila Morelleti, *Bp.*“. Die übliche kurze Beſchreibung lautet: „Dieſes Vögelchen nennt man „Jaulin de escapulario“, und man findet es in der ganzen Republik“. Hier begegnen wir wie beim Atlasfink der theilweiſe gleichen Bezeichnung „Jaulin“. Wiederholt habe ich über dieſe Bezeichnung nachgedacht. Sollte dies Wort vielleicht von jaula = Käfig abgeleitet ſein, ſo würde es ſo viel wie „Eingekäfigter“, „ein Häusler“ bedeuten, de escapulario ſoll die ſchwarze Bruſt- und Kollerzeichnung charakteriſiren und könnte mit „Kragen-Jaulin“ eine kurze Auslegung finden. Da aber ſchon ein anderer Vogel des gleichen Geſchlechts mit „Kragen-Pfäffchen“ treffend benannt wird, muß vorläufig die gebräuchliche deutſche Bezeichnung mit Morellet-Pfäffchen beibehalten werden. Im Muſeum von Coſta Rica iſt obiges Pfäffchen als „Spermophila Morelleti *Bp.*“ in mehreren Exemplaren, Männchen und Weibchen, vorhanden, und von da wurden als ſein Verbreitungsgebiet die Vereinigten Staten von Nordamerika (jedenfalls nur die ſüdlichen Diſtrikte), Mexiko, Guatemala, Honduras und Coſta Rica feſtgeſtellt.

Bis jetzt wird das Morellet-Pfäffchen wenig oder garnicht eingeführt worden ſein, was immerhin früher oder ſpäter noch geſchehen dürfte, und aus dem Grund erſcheint es mir angebracht, eine genaue Beſchreibung des Vogels folgen zu laſſen.

Männchen: Stirn, Scheitel bis zum Nacken, Geſicht und Wangen tiefſchwarz. Kehle weiß, grau melirt, von hier nach der hinteren Ohrengegend ein gelblichweißer Streifen, ein halboffenes Halsband bildend. Obere Bruſt ſchwarz mit etwas Dunkelrothbraun und Grau untermiſcht. Nacken dunkler, Schultern und oberer Rücken heller ſchwarzbraun mit Grau marmorirt. Unterrücken bräunlichgelb, über dem Bürzel ein gelblichweißer Streif (Sattel). Obere Schwanzdecke ſchwach ſchwarz, hellbräunlich umſäumt. Der untere Theil von Bruſt und Leib weiß, ſchwach hellockerfarbig angelaufen. Untere Schwanzdecke von gleicher Farbe. Schwanz ſchwarzbraun, Enden heller eingefaßt. Flügel ſchwarzbraun, auf denſelben zwei weiße Flecken; dieſelben ſind durch die zehnte Schwungfeder, welche an der Außenfahne ſchwarz iſt, von einander getrennt. Alle Schwungfedern, mit Ausnahme der beiden erſten, an der Grundhälfte weiße Innenfahne. Die Schwungfedern zweiter Ordnung an den Spitzen heller eingefaßt. Obere Flügeldecken ſchwarz, jedes Federchen weiß geſpitzt, zwei nicht ſehr hervortretende Binden bildend. Untere Flügeldecken: jedes Federchen an der Grundhälfte ſchwarz, die obere Hälfte weiß, feine Wellenlinien hervorbringend. Schnabel und Auge ſchwarz, Füße dunkelbraunſchwarz. Weibchen: Oberhalb dunkler, unterhalb heller grünlichbraun, an der Kehle einen helleren weißlichen Fleck. Hinſichtlich der Färbung gleicht das Weibchen täuſchend dem Weibchen des Indigo-Finken.

Das Jugendkleid gleicht dem Gefieder des Weibchens vollkommen. Bei den jungen Männchen kommt indeſſen die ſchwarze Bruſt bald nach dem Selbſtändigwerden zum Durchbruch.

und ſo werden noch Jahre vergehen und mancher Verſuch wird noch gemacht werden müſſen, ehe für die Voliere eine konſtante, paſſende Bevölkerung geſchaffen iſt.

Eine Wiederholung im Großen und eine Ergänzung dieſes Volierenlebens findet der Vogelkenner in großartiger Weiſe auf den Weihern des Gartens. Hier wird ihm die Gelegenheit geboten, das geſellſchaftliche Leben, ja man möchte ſagen, die Art des Freilebens der Vögel zu beobachten, die er in der Rieſenvoliere nur hinſichtlich ihrer Geſtalt, ihres Gefieders und ihrer Stimme kennengelernt hat. Der größte dieſer Weiher, der bei nahezu kreisförmiger Geſtalt einen Umfang von ungefähr 500 m aufzuweiſen hat und der hauptſächlich von kleinen Vögeln bevölkert iſt, iſt für den Vogelfreund nach meinem Dafürhalten die Perle des Gartens. Wenn man von der an ſeinen Ufern künſtlich errichteten Ruine auf ihn herniederblickt, ſo bietet er ein Bild, deſſen Schönheit ſelbſt der verwöhnteſte Naturfreund anerkennen muß. Rothbuchen, Pappeln, Weiden, Erlen und andere Bäume, die theils am Ufer, theils auf den drei mit dichtem Unterholz bewachſenen Inſeln ſtehen, bilden im Sommer einen farbenprächtigen und duftenden Rahmen. Viele unſerer Kleinvögel, wie Nachtigal, Mönch, Gartengrasmücke, Gelbſpötter, Würger, Amſel und Eisvogel, ja ſogar der ſcheue Kukuk und die Ringeltaube haben ſich ſeit Jahren ſchon hier angeſiedelt. Beſonders ſchön iſt der Anblick am Abend. Dann thun ſich die am Tage über den ganzen Weiher zerſtreuten Enten familienweiſe zuſammen, um auch familienweiſe zu übernachten. Ehe nun die einzelnen Familien ihre Verſtecke aufſuchen, ziehen ſie auf dem Waſſer bis zur völligen Dunkelheit hin und her, wodurch ein geradezu entzückendes Gemälde entſteht. Die letzten Strahlen der ſinkenden Sonne fallen dann auf ganze Scharen, zwiſchen 20 und 30 Stück von Brand-, Löffel-, Pfeif-, Krick-, Spieß-, Tafel-, Berg- und Reiherenten u. ſ. w., die in prachtvollen Gruppirungen kaleidoſkopartig auf dem Weiher vertheilt ſind, ohne daß dieſer jedoch übervölkert wäre. Wenn ſich zwei verſchiedenartige Familien auf ihren Zügen begegnen, ſtutzen zuerſt beide Theile, dann entſteht plötzlich ein Durcheinander; im nächſten Augenblick jedoch iſt die Ordnung wieder hergeſtellt; die Schwärme ſind durcheinander durchgeſchwommen.

In bedeutend geringerer Anzahl ſind die verſchiedenen Gänſearten auf dem Weiher untergebracht, von denen hier nur die Weißwangen- oder Nonnengans (Anser leucopsis) genannt ſei, da ſie alljährlich mit Erfolg Bruten zeitigt, was in zoologiſchen Gärten ſelten der Fall iſt. Teichhühner, die von dem Düſſelbach, durch den die Weiher geſpeiſt werden, in den Garten hineingekommen ſind, ſieht man zuweilen von einer Inſel zur andern hinüberſchwimmen. Dazwiſchen ziehen weiße Höckerſchwäne, Singſchwäne und ſchwarze Trauerſchwäne majeſtätiſch ihre Kreiſe. Sie bewahren im Gegenſatz zu den Enten eine würdevolle Ruhe. Die letzteren lärmen bis zum Einbruch der Dämmerung, dann aber hört man nur noch zuweilen den charakteriſtiſchen hohen Flötenton der Pfeifente oder das gedämpfte „krrecka, krrecka“ der Krickente. Und „krrecka krrecka“ antworten dann wol die Kameraden in der Rieſenvoliere, bis die Nacht dieſen Grüßen zwiſchen Rieſenvolieren- und Weiher-Bewohnern ein Ende bereitet. Schakalgeheul und der klagende Uhuruf laſſen den Vogelliebhaber dann auffahren, und die ſich auf den ſtillen Weiher niederſenkenden Schatten der Nacht mahnen zur Heimkehr. Eulengeſchrei und das „kau“ der Nachtreiher in der Rieſenvoliere begleiten den letzten Gaſt des Gartens auf ſeinem Heimwege.

Die Nachtigal.

Vortrag, gehalten im Verein der Liebhaber einheimiſcher Vögel zu Berlin

von Joſef Wagner.

(Nachdruck verboten.)

Die Nachtigal, in Süd-Ungarn und Siebenbürgen auch Rothvogel genannt, im allgemeinen als Königin aller Sänger geſchätzt, nimmt ein großes Brutgebiet in Europa ein; nur in den nordiſchen Ländern, beſonders in Schweden und Norwegen, iſt ſie nicht heimiſch, wenigſtens iſt ſie mir auf meinen Reiſen in dieſen Ländern und bei den daſelbſt vorgenommenen Beobachtungen niemals vorgekommen.*)

Nach meinen Beobachtungen und der daraus gewonnenen, eigenen Ueberzeugung geht der Sproſſer wol noch etwas nördlicher als die Nachtigal; dieſe dagegen wiederum ſüdlicher als der Sproſſer. Ich hatte Gelegenheit, die Nachtigal auf vielen Reiſen in verſchiedenen Ländern anzutreffen und zu belauſchen; zur eigentlichen Geſangszeit hört man ſie ja bei Tag und Nacht ſchon von weitem, ſodaß ihre Anweſenheit leicht feſtzuſtellen iſt.

In Rom, unweit vom alten Koloſſeum, im Akazien- und Haſelnußgebüſch konnte ich die längſte Zeit Belauſcher ſein. Aber ich hörte ſie auch an anderen Orten; denn zahlreich kommt ſie zwiſchen Rom und Neapel vor, auch in der nächſten Nähe des Veſuv und noch weiter ſüdlich iſt ſie als Brutvogel heimiſch. Am häufigſten traf ich ſie in Akaziengebüſchen und ſonſtigem gemiſchten Beſtand. Sie kommt auch in ganz Oberitalien und bis hoch hinauf in den Alpen vor, ſodaß auch die Schweizer ſie als ihren Brutvogel betrachten dürfen, und zwar an der Südſeite ihrer Alpen, z. B. bei Lugano und an anderen Orten.

---

*) Daß ihr Verbreitungsgebiet auch das ſüdlichere Schweden mit umfaßt, ſteht feſt; aber natürlich iſt ſie in dieſen Gegenden erheblich ſeltener anzutreffen. D. R.

Ebenſo iſt der Tiroler ſtolz darauf, innerhalb ſeiner gebirgigen Heimat den König aller Sänger als Brutvogel anzutreffen; man hört ihn ſchon bei Neumarkt, Mori und Trient, und eine ſehr lange Zeit habe ich damit, ich möchte faſt ſagen verſchwendet, daß ich hier den Vögeln ganze Stunden hindurch zuhörte. Es iſt kaum glaublich, wie hoch hinauf dieſer Vogel da im Gebirge geht, ſo weit nämlich als das Geſträuch, mitunter ſogar nur ganz niedriges Geſträuch, noch für das Brüten zuſagt; und doch fühlt ſich der Vogel darin anſcheinend ganz behaglich.

Ich ſelbſt hätte kaum geglaubt, wenn mir jemand geſagt hätte, daß ich in dieſen Felſenſchluchten ſo hoch oben noch den herrlichen Sänger antreffen würde; in einem ſolchen Thal aber, wo der Vogel ganz oben am Felſenabhang ſeine Töne erſchallen läßt, kommt der Geſang noch einmal ſo gut zur Geltung, ſchon durch das ſchöne Echo, und der wahre Nachtigalliebhaber verzichtet da gern auf Speiſe und Trank und erträgt unſchwer Hunger und Durſt, um ſich an dieſen Liedern ſatt zu hören.

In einem Schloßgarten nahe bei Trieſt, auch in den Anlagen nordweſtlich von Abbazia, weiter in ganz Kroatien kommt die Nachtigal recht häufig vor und wird von den Vogelliebhabern dort ſehr gehalten, beſonders in Trieſt und Fiume. In Dalmatien iſt ſie vereinzelt, denn hier zieht ſich das ungeheure Karſtgebirge hin, auf welchem ſie nicht ſo zahlreiche Brutplätze findet. Die *Kalanderlerche* kommt hier auf dem Karſt vor.

Dagegen habe ich in Bosnien Tauſende gehört, die meiſten im Bosnathal. Das größte Vergnügen wurde mir bereitet, als ich eines Nachmittags bis gegen den Abend hin am Vrbasfluß und Pliwaſee in dem kleinen Ort Ilitſche ſpazieren ging und nun den Geſang von allen Seiten erſchallen hörte, ſodaß es ein förmliches Konzert war.

Das Narentathal mit ſeinen Naturſchönheiten, den wild zerriſſenen und zerklüfteten Felſen, welche bis zu einer Höhe von 1400 bis 1600 m ſenkrecht aus dem Thal emporſteigen, beherbergt gleichfalls eine Anzahl dieſer Sänger. Wie entzückend klingt es, wenn dieſe Vögel in der Abenddämmerung aus den Felſenklüften ihre Weiſen erſchallen laſſen!

Auch in den Weingärten bei Moſtar fand ich ſie, wo in dichter Nähe auf den Felſen die *Steinröthel* ihre Liedchen brachten, dann in die Gärten herabflogen und in Geſellſchaft mit der Nachtigal Futter ſuchten.

Beinahe ſo zahlreich wie in all dieſen ebengenannten Gegenden trifft man ſie auch in den Gebirgen an, welche ſich an der Donau entlang hinziehen, in den Serbiſchen ſowie in den Ungariſchen. Als ich mich hier aufhielt, hatte ich Gelegenheit, Hunderte zu hören und zu belauſchen. Ich wanderte hier als Touriſt umher, um alle die Naturſchönheiten mit rechter Ruhe in Augenſchein nehmen zu können. Wer dazu nicht genügend Zeit hat, der könnte ſich wol begnügen, einige Tage in Werſchiorowo zu weilen, oder an einem ſchönen Morgen bei gutem Wetter von dem genannten Ort aus mit dem Dampfſchiff bis Paſſia zu fahren. An beiden Stromufern in den Buchen, Eichen und im Sahlweiden-Geſträuch ſind ſo viel Nachtigalen, daß die Geſänge, hauptſächlich die flötenden Töne, das Geräuſch des Waſſers und das Arbeiten der Maſchine weit übertönen.

Auch in Rumänien fehlt die Nachtigal nicht, ſo hörte ich ſie bei Craiowa, und in Bukareſt iſt ſie als Käfigvogel allgemein beliebt. Sie wird da ſehr viel des ſchönen Geſanges wegen gehalten.

In Bulgarien iſt ſie heimiſch, wie ſie ſich denn überhaupt in den ſämmtlichen Balkanſtaten vorfindet.

In der Bukowina iſt ſie mir bisher nicht vorgekommen, dort hörte ich immer nur den Sproſſer, der da ſeine Heimatsrechte behauptet.

Vor Jahren hatten wir prima Sänger unſeres Vogels im mittleren Böhmen, in der Gegend von Liban, in den Eichenwäldern und Faſanengärten. Man hörte damals in dieſen Gegenden muſterhafte Vögel. Ob es heute noch ſo iſt, vermag ich nicht zu ſagen.

In allen dieſen oben aufgeführten Ländern kommt die Nachtigal häufiger vor als bei uns im nördlichen Deutſchland; ſie iſt dort zum größten Theil nur Waldvogel, wogegen ſie bei uns in der Mehrzahl nur Park- und Gartenvogel iſt, wenigſtens haben wir nicht ſo viel Laubwälder, die geeignet wären, für ſie ein paſſendes Brutgebiet abzugeben.

Man braucht ſich nicht zu wundern, daß in den letzten Jahren aus Süd-Ungarn Hunderte von Nachtigalen alle Frühjahre bei unſeren Vogelhändlern eintrafen und als die beſten Meiſter angeboten wurden. Die meiſten jedoch kommen aus Temesvar; und wo ſind dieſe gefangen? In den Donaugebirgen und deren Umgegend.

Der Vogel wechſelt mit der Zeit ſeinen Stand; die Laubwaldungen werden von Jahr zu Jahr immer größer, und der Vogel zieht ſich von ſelbſt zurück, weil ihm das Unterholz nicht mehr genügenden Schutz bietet. Er ſucht andere Gegenden auf, wo nach Abholzung des Großwaldes das junge Geſträuch wieder herangewachſen iſt und nun dem Vogel als Brutplatz geeignet erſcheint. Dennoch bleibt er gern in der Gegend, oder vielmehr in dem Lande, wo er das Licht der Welt erblickt hat. Daher kommt es, daß man in verſchiedenen Gegenden einen eigenen Stamm mit eigenartigen geſanglichen Leiſtungen antrifft.

Hier möchte ich mir wieder das Wort Oertlichkeitsraſſe erlauben, obwol bei den Nachtigalen die Geſangsweiſen nicht ſo weit auseinander ſtehen wie beim Sproſſer. So hörte ich in verſchiedenen Gegenden beſſere oder minderwerthige Stämme, welche im Geſang ausſchließlich durch verſchiedene Strofenbildungen einen eigenartigen Stamm für ſich bilden. Die Vögel aus manchen Gegenden ſind eben in ihren geſanglichen Leiſtungen hervorragender als die aus anderen Gegenden, oder ein und dieſelbe Gegend bringt in verſchiedenen Perioden Vögel mit verſchiedenen Leiſtungen hervor. Vor ungefähr 15 Jahren hatten wir

z. B. bei Frankfurt a. O. ſehr gute Sänger; hört man ſich die dortigen Nachtigalen heutigen Tags an, ſo muß man fragen, wo iſt der edle und gute Stamm geblieben? — Ja wo? — Die alten Lehrmeiſter, die guten Vorſchläger fehlen eben, die Jungen können ſich demnach, beim Mangel tüchtiger Lehrmeiſter, nicht mehr ſo ausbilden; und wenn dann und wann auch einmal einer ſich hervorthut, ſo hat das keine große Wirkung auf die übrigen.

Gute Sänger hörte ich in Bosnien. Hier hört man als Käfigvögel am meiſten Stiglitze und Kanarienvögel, welche von den in Bosnien anſäſſigen Oeſterreichern und Ungarn gehalten werden; der eingeborene Bosnier betreibt keine Vogelliebhaberei, er iſt Naturfreund, ſoweit Mutter Natur ihm ihre Schönheiten nahegerückt hat und von ſelbſt darbietet; er ſucht nicht danach, ſondern genießt, was um ihn herum an Schönem vorhanden iſt. Er hat den Geſang mitunter dicht bei ſeiner Hütte; er fühlt darum kein Bedürfniß, einen Vogel zu käfigen.

Ich belauſchte in Bosnien viele Sänger, welche ich in ihrer Art als Künſtler bezeichnen muß, und ich merkte, daß ſie von einem guten Stamm ſeien. Es ſind dort eben keine Vögel gefangen worden, und infolgedeſſen iſt der Stamm der dortigen Sänger erhalten geblieben, ſodaß man mehr Künſtler unter ihnen hört als irgendwo anders. Ich möchte faſt annehmen, daß dieſe Vögel ihre Zugſtraße vielleicht in öſtlicher Richtung nehmen, und ſo nicht in die Netze der Südländer gerathen. Doch vermag ich eine ſicher begründete Behauptung darüber nicht aufzuſtellen.

Die verehrten Vogelfreunde werden nun wol fragen, wie haben denn die Vögel geſungen. Da will ich denn vielleicht ſpäter einmal das, was ich beobachtet habe, nach meinen Kräften auffaſſen konnte und durch Notizen feſtlegte, zu Papier bringen und die Geſänge der Vögel aufzeichnen, welche ich im mittleren Böhmen, in den Donaugebirgen und in Bosnien hörte. Freilich den Geſang der Nachtigal aufzunehmen und in Buchſtaben und Worte zu überſetzen, iſt noch ſchwieriger als es beim Geſange des Sproſſers der Fall iſt.

Zum Schluß möchte ich noch bemerken: eine neu gefangene Nachtigal bringe man gleich in den für ſie beſtimmten Käfig, umhülle ihn ganz und gar mit weißer Leinwand, gebe ferner nur die beſten friſchen Ameiſenpuppen, etwa keine ſauren oder verbrühten, wie geſagt die ſchönſte, friſche Ware, und ſtelle den Käfig an einen hellen, ruhigen Ort; ſobald dann der Vogel mit ſeinem Geſang aufhört, und die Mauſer vollendet iſt, entferne man die Umhüllung nach und nach und gewöhne ihn an ein Miſchfutter.

* * *

Plaudereien über Kanarienzucht und Kanariengeſang.

Von R. Groſſe.

(Schluß).

(Nachdruck verboten.)

Solche Vögel müſſen wir anſtreben, ſie müſſen wir zur Zucht verwenden, dann werden wir ſicherer zu mannigfaltigen Edelſängern kommen, als wenn wir die Schnetter dulden und dem Liede einverleiben. Und wenn ich hier gleich, wie ich im Anfange dieſer Abhandlung verſprochen habe, den Ort angeben ſoll, wo wir ſolche Vögel finden können, die für die jetzt platzgreifende Geſangsrichtung recht werthvoll ſind, ſo weiß ich keine beſſere Quelle zu bezeichnen, als die Ausſtellungen. Hier ſind ſie vertreten und hier können wir ſie auch finden, wenn ſie nicht nach der alten, unverſtändigen Bewerthungsweiſe, dem Punktirſyſtem, das nur den Geſammtvortrag des Vogels abſchätzt, abgeurtheilt, ſondern wenn in einer überſichtlichen Tabelle die einzelnen Geſangsſtrofen durch tüchtige Preisrichter begutachtet worden ſind und wenn ſo jedem Züchter ſich die Gelegenheit bietet, die von ihm gewünſchten Edelſänger nach ihren Einzel-Leiſtungen aufzuſuchen und mit ihnen ſeinen Stamm zu verbeſſern. Schon die jetzt fühlbar auftretende Nothwendigkeit, mannigfaltige Sänger heranzubilden, ſollte alle Vereine veranlaſſen, den alten Zopf bei Seite zu legen und die Bewerthungsweiſe der einzelnen Geſangsſtrofen mit allen Mitteln anzuſtreben.

Nun zum Schluß noch einige Worte über die weitere Geſangsausbildung der Junghähne. Wenn der Züchter die Ueberzeugung gewonnen hat, daß die in Geſangsrücken befindliche Nachzucht, wie wir ſie vor der Erörterung des Liedes verlaſſen haben, den Geſang unter Anleitung tüchtiger Vorſänger vollſtändig erfaßt hat, dann iſt es an der Zeit, die Junghähne auseinander zu hängen und ſie in Geſangskaſten zu bringen. Die letzteren ſollen nun die Sänger zum ruhigen, ungeſtörten Geſange anhalten und in ihnen ſollen ſie ſich die vom Züchter gewünſchte Länge der einzelnen Geſangsſtrofen und auch die etwa noch fehlende weiche Vortragsweiſe aneignen. Die Geſangskaſten werden nicht von vornherein, ſondern allmählich ganz geſchloſſen, und es darf auch nicht verſäumt werden, ſie nachts zu öffnen, damit dem Vogel die erforderliche friſche Luft gewährt wird. Die Fütterung ſoll nun in bloßem Rübſen, ſelbſtredend von beſter Beſchaffenheit, beſtehen. Es iſt nach meiner Anſicht falſch, wenn in der Preſſe empfohlen wird, den Junghähnen ſoviel Miſchfutter zu geben, wie ſie nur freſſen wollen, nur auf dieſe Weiſe werde man zu mannigfaltigen Sängern kommen. Nicht das Futter hat Einfluß auf die Umbildung unſeres Edelrollers zu einem mannigfaltigen Vogel, ſondern eine verſtändnißvolle Auswahl der Heckvögel, die einen mannigfaltigen Geſang vererben. Wenn eine übermäßige Fütterung mit Miſchfutter irgendwelchen Erfolg hat, ſo iſt es der, daß die Vögel durch daſſelbe zu übermäßigem Geſange angetrieben werden und daß der letztere allerdings mannigfaltiger wird, aber die Mannigfaltigkeit vorausſichtlich darin beſteht, daß die Junghähne mehr ſpitze und ſonſt übelklingende Strofen hören laſſen werden. Wir müſſen unſer Hauptaugenmerk auf die Vererbung richten, nur ſo werden wir am ſicherſten zum Ziele gelangen.

Im dieſem Monat werden die Junghähne die Geſangsausbildung vollendet haben und es iſt rathſam, auch erſt um dieſe Zeit ſowol die Nachzucht abzugeben als auch den Ankauf begehrter Sänger auszuführen.

Die Kanarienzucht iſt eine ſchöne Liebhaberei, aber ſie erfordert, wenn ſie erfolgreich durchgeführt werden ſoll, Ausdauer, Ueberlegung und Verſtändniß, und wenn ich durch meine vorſtehenden Auseinanderſetzungen auch nur einen kleinen Theil dazu beigetragen haben ſollte, den Verlauf und die Durchführung der Zucht, ſowie die Geſangsausbildung unſerer lieblichen Sänger verſtändlicher zu machen, ſo ſoll es mir angenehm ſein; meine Abſicht iſt es geweſen.

* * *

Anfragen und Auskunft.

Herrn Oskar Kunkel: 1. Das Stiglitzweibchen iſt vom Männchen ſchwierig zu unterſcheiden; im allgemeinen iſt es kleiner und matter; ſichere Merkmale ſind folgende: an der Schnabelwurzel ein grauer oder brauner Bart, das Roth am Kopf ſchmaler als beim Männchen, reicht kaum bis zum Auge; Schnabel kürzer und geſtreckter; die gelblichgrünen Federn unter den braunen Bruſtflecken fehlen völlig; Flügelafter grau oder braun (nicht ſchwarz wie beim Männchen; auch beim jungen Männchen ſind die ſchwarzen Federn hier vorherrſchend); Bruſtflecke kleiner und blaſſer, die weiße Bruſtmitte iſt daher breiter. Eine andre Art, das Geſchlecht des Stiglitz feſtzuſtellen, beſteht darin, daß man den fraglichen Vogel in die Hand nimmt, ihn mit der Bruſt nach oben, den Kopf abwärts gekehrt, vor ſich hin hält und die braunen Federn an der Bruſt dann auseinander bläſt; der bloßgelegte Theil der Fahne wird dann beim Männchen eine mehr oder weniger grüngelbliche Färbung haben, während das Weibchen an derſelben Stelle nur ein etwas helleres Braun zeigt, von grüngelblichem Schimmer aber nicht die Spur zu bemerken iſt. 2. Reichen Sie dem Stiglitz gequetſchten Hanf und Kanarienſamen, etwas Rübſen, wenig Mohnſamen, als Leckerei Kletten- und Diſtelſamen. 3. Die Fütterung für den deutſchen Kanarienvogel im allgemeinen beſteht größtentheils in einem Gemiſch von Rüb-, Kanarien- und gequetſchtem Hanfſamen. Wenn Sie einen Kanarienvogel einer andern Raſſe beſitzen, ſo müſſen Sie Ihre Frage noch einmal ſtellen, denn die Verpflegung der verſchiedenen Arten iſt von einander abweichend. 4. Ihre Angaben über die Krankheit Ihres Stiglitzes ſind zu ungenau, als daß wir Ihnen Auskunft über Namen und Behandlung derſelben geben könnten.

Herrn P. Link: 1. Der Droſſelkäfig muß 40 bis 50 cm hoch, 60 bis 70 cm lang ~~und 32~~ bis 40 cm tief ſein; mit weicher, elaſtiſcher Decke. Der ganze Käfig muß von Metall und leicht zu reinigen ſein. Außer einigen zweckmäßigen Sitzſtangen bringen Sie friſche berindete Aeſte in verſchiedener Dicke an und in einer Ecke einen Ziegelſtein oder ein großes Stück Kalkmörtel; darauf ſitzt der Vogel gern. 2. Ihr Rheiniſches Univerſal-Miſchfutter iſt ein vortreffliches Erſatzmittel für Inſektenfreſſer. Als Schamafutter insbeſondere gelten: friſche oder getrocknete Ameiſenpuppen, Eikonſerve und abwechſelnd friſches, hartgekochtes Ei, geriebnes Weißbrot, zerquetſchter Hanfſamen, dazu etwas rohes Fleiſch und Korinthen. 3. Kaufen Sie nur bei Herrn Fockelmann-Hamburg. Ganz kürzlich, in Nr. 48 der „Gefiederten Welt“, erſt hat Herr Regierungsrath Auné über ſeine eben dort erſtandene Schama auf's günſtigſte berichten können. Wir empfehlen Ihnen, die betreffende briefliche Mittheilung in unſerem Blatte nachzuleſen.

Herrn Paul Nicolai: 1. Sie thun beſſer daran, die genannten Vögel jeden für ſich im Einzelkäfig zu halten. 2. Bieten Sie dem Zeiſig außer den angeführten Sämereien auch etwas Birken- und Erlenſamen, ein wenig Weichfutter und hin und wieder einen Mehlwurm, dem Stiglitz Kletten- und Diſtelſamen, dem Grünfink Wachholder- u. a. Beren. Zuträglich iſt letzterem auch ein Miſchfutter aus geriebner Semmel und Weizengrütze. Selbſtverſtändlich bedürfen alle dieſe Vögel auch des Grünkrauts. 3. Badewaſſer iſt den Vögeln am beſten ſtubenwarm zu geben. An der Abneigung Ihrer Vögel gegen das Baden iſt möglicherweiſe ein unzweckmäßiges Badegefäß ſchuld. 4. Um zu erkennen, ob ein Vogel an Ungeziefer leidet, überdecken Sie ſeinen Käfig während der Nacht mit einem weißen Tuche; am nächſten Morgen werden Sie die Milben mehr oder minder zahlreich an dem Tuch finden. Um nach einer ſolchen Feſtſtellung des Vorhandenſeins der Milben dieſe dann völlig zu vertreiben, bepinſelt ~~man alle~~ nackten Stellen des Vogels, insbeſondere an Hinterkopf, Schultern und wo er ~~ſonſt mit dem~~ Schnabel nicht hingelangt, mit Inſektenpulver-Tinktur, am nächſten Tage mit verdünntem Glycerin, gewährt ihm nach zwei Tagen, wenn es recht warm im Zimmer iſt, Badewaſſer, ſchlägt 3 bis 4 Tage über und beginnt die Kur von neuem. Im ſchlimmſten Fall muß man das Verfahren wiederholen. Vor allem müſſen aber Käfig nebſt Sitzſtangen und ſogar der Ort, wo erſtrer gehangen, alſo an der Wand, auf einem Spinde u. a., mit heißem Seifenwaſſer gereinigt, gewaſchen und abgeſcheuert, und wenn dies nicht thunlich, die betr. Stellen eingeölt, darauf abgerieben und mit Inſektenpulver-Tinktur bepinſelt oder neu gekalkt, bezl. tapezirt werden.

Herrn M. Glaubitz, Danzig: 1. Die Brutzeit der Kardinäle bei uns ſtimmt ungefähr mit der in der Heimat überein; ſie beginnt etwa mit dem Anfange des April. 2. Wenn Sie recht gute Zucht-Erfolge haben wollen, ſo müſſen Sie ausgemuſterte, ſeit Jahr und Tag in ſorgfältiger Pflege gehaltene und zum Niſten gut vorbereitete Vögel verwenden. Schaffen Sie möglichſt ein freiwillig zuſammengepaartes Pärchen an; denn ein ſolches niſtet naturgemäß am eifrigſten und ergibigſten. 3. In Ihrem großen Kiſtenkäfig werden Sie gut thun, doch nur ein Pärchen unterzubringen. Harzer Bauerchen werden eine ſehr gute Niſtvorrichtung abgeben. Sie werden ganz leer für die Vögel hingehängt, oder mit einer Hand voll von weichem Heu oder Mos. Neſtbauſtoffe müſſen Sie immer in möglichſt großer Mannigfaltigkeit, beſter Beſchaffenheit und ausreichender Maſſe bieten: Agave- oder Aloëfaſer, jedoch zur Länge von etwa 30 cm geſchnitten, um die Gefahr des Erhängens abzuwenden, und in Waſſer eingeweicht, dem man 5 Hunderttheile Glycerin beigemiſcht hat (natürlich müſſen die Faſern erſt wieder gut ausgetrocknet ſein, ehe man ſie den Vögeln hinlegt); ferner Baſtſtreifen, friſche, lange Gräſerhalme, bezl. Blätter, zur Abwechslung Papierfäden und ſchmale -Streifen, Baumwollfäden, etwa eine gute Spanne lang und von recht dickem, loſem Geſpinnſt, ausgezupfte Sackfäden, recht weiches und elaſtiſches getrocknetes Gras oder Heu. Zum Auspolſtern reichen Sie Wundfäden, die ſog. Charpie, aus ſaubrer, mürber Leinwand, 2,5 cm lang gezupft, Waldmos, getrocknet und ebenfalls ausgezupft, Baumwolle als weiche Watte loſe ausgepflückt. Große Freude werden Sie dem Pärchen bereiten, wahrſcheinlich auch Anregung, wenn Sie ein andres, noch ſauberes Vogelneſt, namentlich vom Sperling, in ein Harzerbauerchen ſtecken.

Herrn E. Israel, Werkmeiſter: Halten Sie Ihren Kanarienvogel in warmer, feuchter Luft, die Sie dadurch erzielen, daß Sie vermittelſt eines Verſtäubers täglich einigemal lauwarmes Waſſer um ihn her ſpritzen, während das Zimmer etwa 18 bis 24° R. Wärme hat. Sodann geben Sie ihm Pillen von kohlenſaurem Ammoniak (A. 0,01 gr. mit Altheepulver und Waſſer zu je einer kleinen Pille) täglich zwei- bis dreimal, oder gereinigten Salpeter (0,02 bis 0,03 gr. in Waſſer), dreiſtündlich. Im Trinkwaſſer geben Sie ihm wie ein Mohnſamenkorn groß Chiliſalpeter (Natr. nitr. dep.).

Herrn Webſinger: Das Futtergemiſch, welches Ihnen der Händler empfohlen hat und welches Sie uns als Futter I zur Prüfung überſandt haben, iſt recht gut zuſammengeſtellt. Geben Sie Ihrem Vogel daneben Eifutter (am einfachſten hartgekochtes Hühnerei, in der Mitte durchſchnitten und in der Schale, mit Gelb und Weiß, ſo daß er alles auspicken kann; zuträglicher iſt das gemiſchte Eifutter, etwa das vielbeliebt gewordene Böcker'ſche Eifutter. Als Erſatz für Eifutter wird auch Biskuit empfohlen Sie müſſen den Vogel dazu zu bringen ſuchen, daß er Ihr Futter I frißt; geben Sie ihm darum nicht zu viel Eifutter oder Biskuit, er wird Ihnen ſonſt übermäßig fett, was ſehr üble Folgen haben kann.

Herrn W. G.: 1. Durch Fettabſonderung aus der Bürzeldrüſe werden die Federn des Vogels in naturgemäßer Beſchaffenheit erhalten. Ohne volle Geſundheit der Bürzeldrüſe kann er ſich nicht wohlbefinden, namentlich nicht mauſern. 2. Eine augenblickliche große Gefahr iſt für Ihren Vogel nicht vorhanden. 3. Zur Heilung der Bürzeldrüſe geben wir Ihnen den Rath, dieſelbe täglich dreimal mit warmem Olivenöl zu bepinſeln. Sollte die Drüſe indeſſen entzündet ſein, ſo müſſen Sie die Federn ringsumher durch vorſichtiges Auszupfen oder beſſer Abſchneiden fortbringen, die erkrankte Stelle mit Bleiwaſſer kühlen und ſchließlich mildes Fett daraufſtreichen. Dies muß täglich wiederholt werdrn.

Herrn Ed. Kleber, München—Gladbach: Die Stubenwärme, welche uns Menſchen angenehm und unſerer Geſundheit gemäß iſt, iſt auch für alle Vögel am zuträglichſten, alſo eine gleichmäßige Wärme von 15—16° R. Vögel aus tropiſchen Gegenden ſogar haben ja allerdings unſere rauhen, harten Winter im Freien überdauert; aber es wäre gar grauſam, ſolche Vögel in einem ungeheizten Zimmer überwintern zu wollen, wo die Kälte für dieſe Thiere meiſt empfindlicher iſt als draußen. — Um Ihnen jedoch einige ſpeziellere Angaben zu machen, ſo können Sie den grauköpfigen Zwergpapagei bei 6—7 Grad Wärme gut überwintern; allein es läßt ſich nicht ſo an, als ob der Winter diesmal ſo milde ausfallen wird, wie in den letzten Jahren. Die Feuerweber können im ungeheizten Raum überwintert werden; allein das iſt faſt Thierquälerei. Wenn Sie dennoch nicht geradezu Einbürgerungsverſuche machen wollen, welche Ihnen vielleicht etwas theuer zu ſtehen kommen dürften, ſo ſuchen Sie ſich möglichſt in anderer Weiſe zu helfen.

Bücher
und
Schriftenſchau

The birds of eastern North America known to occur east of the ninetieth meridian. Water birds. Part I. Key to the families and species. By Charles B. Cory. Chicago 1899.

Die Vorrede belehrt uns über das Beſtreben des Verfaſſers etwa folgendermaßen: „Ornithologie iſt die Wiſſenſchaft von den Vögeln, und um ein tüchtiger Ornithologe zu werden, braucht man Jahre harter Arbeit, verbunden mit großer Liebe für das Studium; aber es gibt ſo manche Naturfreunde, welche recht gern die Vögel ihrer Umgebung kennen würden und doch nicht Zeit oder Luſt haben, ſich eingehender mit dem Gegenſtande zu befaſſen. Dieſen Wunſch zu erfüllen, ſind die vorliegenden „Schlüſſel" hergeſtellt worden, welche die einzelnen Spezies nach der Geſtalt und Größe ordnen und hoffentlich den Anfänger in Stand ſetzen werden, irgend einen unſerer Vögel, welcher es nun ſei, genau zu beſtimmen." Es handelt ſich, wie der Titel beſagt, um die Waſſer-Vögel des öſtlichen Nordamerika, und zwar öſtlich vom 90. Längengrade.

Zunächſt wird in ſauber ausgeführten Zeichnungen am Gefieder der Ente und des Brachvogels die Lage der zuſammengehörigen Federn veranſchaulicht; die Grenzen der äußeren Körpertheile gegen einander werden gezogen und die einzelnen Körpertheile benannt. Beſondere Zeichnungen ſind den Schwingen, den verſchiedenen Formen der Schwänze, Läufe, Füße und Schnäbel gewidmet. Wie man einen Vogel, ſei es im Ganzen, ſei es in einzelnen Theilen, mißt, wird recht lehrreich gezeigt und beſchrieben.

Dann kommt das eigentliche Thema des Buches: Die Waſſer-Vögel werden nach der Art und Geſtaltung ihrer Füße in ſechs Gruppen getheilt, auf welche die ſonſt überall gebräuchlichen Familien und Unterfamilien vertheilt werden. Die Betrachtung der Fußform gibt den Schlüſſel für die Feſtſtellung der Familie ab. Dagegen laſſen ſich die verſchiedenen Unterabtheilungen der Familien, die Spezies, gewinnen, indem man die Schwingen ausmißt. Die Ausmeſſung der Schwingen gibt alſo den Schlüſſel für die Feſtſtellung der Spezies ab. Die Form der Füße und die Länge der Schwingen ſind das Kennzeichnende, wie Staubgefäße und Stempel in Linné's botaniſchem Syſtem. Zwar verwünſcht ſo mancher dieſes Linné'ſche Syſtem, und ſelbſt wer von ſeiner Einfachheit und praktiſchen Verwerthbarkeit überzeugt iſt, muß doch zugeſtehen, daß es von mechaniſirender Art iſt und daß Linné bei der Anordnung natürlicher Gebilde wunderbar unnatürlich zu Werke gegangen iſt; nichts deſto weniger hat das Syſtem ſeine Vorzüge, und wer das natürliche Syſtem der Pflanzen kennt, mag das künſtliche Linné's zwecks ſchneller und ſicherer Beſtimmungen zu Hülfe nehmen. Wem andererſeits die natürliche Eintheilung der Waſſer-Vögel geläufig iſt, der mag Fußformen und Schwingenlänge zur genauen Feſtlegung von Art und Gattung verwenden, und Cory's Buch wird ihm gute Dienſte leiſten. Uebrigens iſt die Mechaniſirung des Wiſſens hier nicht ſo ſtark, da nur ein in ſich abgeſchloſſener und natürlich begrenzter Theil der Vogelwelt, die eng zuſammengehörigen Waſſer-Vögel, in Betracht kommen. Der Mangel des Linnéſchen Syſtems dagegen iſt groß und liegt darin, daß ein ganzes großes Gebiet nach einem Geſichtspunkt gewiſſermaßen vergewaltigt wird. E. Bleich.

Ornithologiſches Jahrbuch. Organ für das paläarktiſche Faunengebiet. Herausgegeben von Viktor Ritter von Tſchuſi zu Schmidhoffen. Jahrgang 10, Heft 6. November-Dezember 1899. Hallein 1899.

Inhalt: M. Marek, Ornithologiſches aus Zengg (Hafenſtadt in Kroatien); Rich. Häniſch, Maſſen-Rückwanderung von Zugvögeln in die Küſtengebiete bei Trieſt und Zara zufolge Wetterſturzes während der dritten Märzwoche 1899; E. Chriſtoleit, Zum Geſang des Zwergfliegenfängers (Muscicapa parva); Julius von Madarász, Ueber den in Ungarn vorkommenden gemeinen Star (Sturnus vulgaris) und ſeine verwandten Formen; J. Thienemann, Hirundo rustica pagorum, *Chr. L. Br.*; Kollibay, Muscicapa parva, *Bchst.* im mähriſch-ſchleſiſchen Geſenke; Vikt. Ritter von Tſchuſi zu Schmidhoffen, Pastor roseus in Oeſterreich-Ungarn 1899; Literaturbericht; Nachrichten; Index.

Der 10. Jahrgang dieſer reichhaltigen und gediegenen Zeitſchrift liegt mit dieſem Hefte vollendet vor. D. L.

Zu unſerm Bilde.

Diesmal zeigt unſer Bild einen Star, den unſerm gemeinen ſehr naheſtehenden einfarbigen oder ſchwarzen Star (Sturnus unicolor, *Temm.*). Dieſem in Geſtalt und Weſen ſehr ähnlich, wurde er von älteren Schriftſtellern ohne weiteres mit ihm in eine Art zuſammengeworfen oder doch nur als Oertlichkeits-Abänderung angeſehen. Er unterſcheidet ſich von ihm durch die eigenthümliche Bildung der Kopf-, Bruſt- und Nackenfedern, die ſehr lang und ſchmal ſind, vor allem aber durch das Fehlen jeglicher Fleckenzeichnung. Das Männchen iſt ſchwarz, über und über wie mit Purpurglanz übergoſſen, welcher ſich bald in lila, bald in metallgrün abhebt. Beſonders tritt dieſer Metallglanz an den feinen, langen Kehlfedern, den Nackenfedern, den zweiten Schwingen und Oberflügeldeckfedern hervor. Auch Stimme und Flug unterſcheiden ihn ſchon hinlänglich vom gemeinen Star, ſodaß kein Zweifel mehr über ſeine Artbeſtändigkeit herrſchen kann. Im übrigen ſtimmt er in der Färbung mit unſerm Star überein: Der Schnabel iſt gelb, am Grunde ſchwärzlich, die Füße gelblichgrau; die Augen braun. Das Weibchen hat weniger lange Kehlfedern als das Männchen und iſt düſter mattbraun, alſo matter gefärbt. Das Jugendkleid iſt dem des gemeinen Stars gleich. Die Größe betreffend ergeben ſich im Fleiſch folgende Maße; Länge 21 bis 22,5 cm, Flügel 14 bis 14,5 cm; Schwanz 6 bis 7 cm.

Der einfarbige Star vertritt den gemeinen im Süden Europas, in Nordafrika und Weſtaſien. In den Handel gelangt er höchſt ſelten und zu den Liebhabern überhaupt kaum. Zuerſt dürfte ihn der Amſterdamer zoologiſche Garten beſeſſen haben, wo er bereits im Jahre 1866 vorhanden war. D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Für Insektenfresser und zur Aufzucht.

„Eidotter" „Eiweiss"

[illegible]förmig per Kilo 3.75 ℳ schrotförmig per Kilo 4.75 ℳ

Beimischung zu jedem Futter. Bei 4½ Ko. franco. [2307]

Henri Vallette, Berlin SW., Schönebergerstrasse 15a.

Die Samen-Großhandlung

von

Carl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt) [2308]

hält ſich zum Bezug **ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel** bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos.

Präpar. Eigelb,

garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.

Mehlwürmer, rein und groß, à Ltr 4½, à Ko. 8½.

Bisquit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.

Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.

Sommerrübſ., 99er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack	5	Ko.	no.	1,60
Hanfſat	„	„	„	„	1,60
Hafer geſchält	„	„	„	„	2,25
Mohn blau	„	„	„	„	3,25
Hirſe weiß Pa.	„	„	„	„	2,20
do. Senegal	„	„	„	„	2,25
do. do. i. Kolb.	„	„	„	„	5,—
do. algeriſche	„	„	„	„	2,—
do. indiſche	„	„	„	„	1,75
Sonnenblumen	„	„	„	„	2,—
Kürbiskerne	„	„	„	„	3,25
Reis i. Hülſen	„	„	„	„	2,25
Zirbelnüſſe	„	„	„	„	3,50

Oſſa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [2309]

Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—

Ausführl. Preisliſten ſämmtl **Vogelfutterarten** gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Universalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle **Droſſelarten** pro Kilo 1 ℳ. Daſſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpaketen franko, garantirt ſandfrei. [2310]

Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Specialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Universalfutter.

Vor dem Kennerauge kann eine **Universalfutter-Mischung ohne Zeke** nicht mehr als vollwerthig bestehen.

Einige Jahre fehlte dieses Produkt vollständig am Vogelfuttermarkt, und mancher Liebhaber hätte gern 10 Mk. für ein Kilo bezahlt, wenn er es hätte bekommen können.

Zeke ist jetzt wieder überall **gut** und **billig** zu haben.

Man verlange ausdrücklich **„Zeke, Marke Amsel"**. [2311]

Ameiseneier:

Extra Qualität,	5 Ko.	17 ℳ,	1 Ko.	3.80 ℳ
Handelsware,	„ „	13	„ „ „	3.— „
Sommerrübſ. Ia.,	50 „	15 „	5 „	2.— „
Hafer, geſchälter,	„ „	15	„ „ „	2.— „
Sonnenblumenkerne, ſ. weiße,	„ „	14½	„ „ „	2.— „
Mohn, blauer,	„ „	28	„ „ „	3.30 „
Diſtelſamen,	„ „	16	„ „ „	2.— „

Zeke, loſe u. abgepackt, für 10 u. 25 ₰-Verkauf, ſowie ſämmtl. Vogelfutter billigſt.

C. Hecker.
[2312] **Friedrichsdorf** am Taunus.

Vogelfutter,

nur feinſte, gereinigte Ware.

Sommerrübſen,	1 Ko.	40 ₰,	5 Ko.	1.80 ℳ
Glanzkorn,	„ „	40	„ „ „	1.60 „
Hanfſat,	„ „	40	„ „ „	1.80 „
Hafer, geſchälter,	„ „	40	„ „ „	1.80 „
Hirſe, weiße,	„ „	50	„ „ „	1.80 „
do. algeriſche,	„ „	50	„ „ „	2.— „
do. Senegal,	„ „	60	„ „ „	2.30 „
do. ind. (Mohar),	„ „	35	„ „ „	1.60 „
Silberhirſe,	„ „	50	„ „ „	2.10 „
Mohn, blauer,	„ „	70	„ „ „	3.25 „
Kürbiskerne,	„ „	70	„ „ „	3.— „
Sonnenbl., weiß,	„ „	50	„ „ „	1.70 „
Reis in Hülſen,	½ „	25	„ „ „	2.25 „
Zirbelnüſſe,	1 „	100	„ „ „	4.— „
Erdnüſſe,	„ „	70	„ „ „	3.— „
Oſſa Sepia,	100 Stck.	3,50 ℳ.		
Carottengries,	1 Ko.	1.10 ℳ,	5 Ko.	4.50 „
Droſſelfutter,	„ „	1.—	„ „ „	4.— „
Nachtigalfutter,	„ „	2.—	„ „ „	7.— „
Ameiſeneier,	„ Ltr.	0.85	„ 10 Ltr.	8.— „
Mehlwürmer,	1 Ltr.	4.50 ℳ,	1000 St.	1.40 „

Gemiſchtes Vogelfutter für alle körnerfreſſenden Vögel 5 Ko. 2 ℳ. Bei Aufträgen hierfür genügt Angabe der Vogelart, für die das Futter beſtimmt iſt. Ausführliche Preisl. umſonſt, Engros-Preisl. nur an Wiederverk.

H. P. Lange, Samenhandlung,
[2313] **Gottesberg i. Schleſ.**

Ameiseneier,

1899er Ia geſiebte, ſandfreie Ware,	per	Kilo	ℳ	3,50
Weißwurm, prima	„	Liter	„	1,—
Muska	„	„	„	0,90
Univerſalfutter, extra	„	Kilo	„	1,20
Mohnmehl, weiß	„	„	„	0,60
Sonnenblumenk., weiße	„	„	„	0,60
Reis in Hülſen	„	„	„	0,60
Oſſa ſepia, prima	„	„	„	3,—
Sommerrübſen, Ia großkern. ſüß			„	0,44

Ferner Mohar-, Senegal-, Kolben-, weiße **Hirſen, Mohn** und alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [2314]

G. Schmitt. Samenhandlung, **Mainz.**

Mehlwürmer,

à Ltr 1 ℳ inkl. Verp.

Bei Einſendung von 1.50 ℳ = 140 gr., alſo **weit über 1000 Stück,** frk. inkl. Verp.

[2315] **P. Bartsch, Breslau,** Flurſtr. 6.

Ameiſeneier,

hochprima deutſche ſandfreie Ware, per Kilo 4,60 ℳ, p. 5 Kilo 22,50 ℳ, p. Liter 90 ₰. **Miſchfutter für Inſektenfreſſer** per Kilo 1,20 ℳ. **Sommerrübſen I, ſüß,** hochfeine Qual., per 50 Kilo 17 ℳ, per 5 Kilo 2,20 ℳ. **Weiße Hirſe,** extrafeine Qual., p. 50 Kilo 20 ℳ, p. 5 Kilo 2,50 ℳ, empfiehlt **Carl Kämpf. Mainz.** [2316]

Univerſales. [2317]

Röbbeckes prämirte **Univerſalfutter-Spezialitäten** ſind die beſten für alle inſektenfreſſende Vögel.

Qual. Extra,	à Ko. 2,60 ℳ	in ½ u. 1/1 Pfd.-Packet.	
„ Prima,	à Ko. 2,— ℳ		
„ Sekunda,	à Ko. 1,— ℳ		

1899er Ameiſeneier 1899er,

hochprima Qual., das Feinſte, was es gibt, vollſtändig rein und ſtaubfrei, à Ko. 4 ℳ, 5 Ko. 18 ℳ, **Ameiſeneier,** naturell, à Ko. 2,20, ſtaubfrei 2,60 ℳ, offerirt

Otto Röbbecke, Meerane, Sa., II,
Sämerei- u. Vogelfutter-Handlg., gegr. 1854.

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſiebt große Futterware, **rein gemeſſen,** 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [2318]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411, I.

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 4,25 ℳ, Kilo 7,75 ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ. **Ameiſeneier,** hochprima 99er, Liter 90 ₰. [2319]

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Alle Vogelfutter,

Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.

E. Schreiber, Leipzig,
Königsplatz 7.

Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche.
Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [2320

Rheiniſches

Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**

Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!

[2321] Allein angefertigt von

Ernst Hanke, Trier, Moſel.

Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Mehlwürmer, r., fed. Poſt., Ltr. 3,80 ℳ, Pfd. 2,00 ℳ. **Leitner,** Breslau, Weinſtr. 12. [2322

Vögel.

ff. Harzer ◆ ◆ ◆ ◆ Kanarien,

ſeit 1869 eigene Zucht; die Vögel gehen in gebog. Hohlrollen, Hohlklingel, Klingelrolle, Knorre, tiefe Hohlpfeife; lang u. voll mit klangvollem tiefen Organ, p. St. 8—30 ℳ, nach Werth d. Geſanges. Verſandt p. Nachnahme; größere Poſten Dep. des Betrages. Garantie für geſundes Eintreffen. Nicht Konv. nach 8 Tagen zurück. Verpackung frei.

Eduard Zacharias,
[2323] Ermsleben a./Harz.

Anzeigen.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer, **Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,** alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung [2324]

Neu eingetroffen:
252
junge Graupapageien,

große helle Vögel in ſchönem Gefieder, keine Schreier, an Hanf und Waſſer gewöhnt, à 16 bis 18 Mk.,

desgl., weniger ſchön befiedert, à 14 Mk.,
Singſittiche, Par 22 Mk.,
Roſella, Par 21 Mk.,
Ceresaſtrilde, Par 9 Mk.,
Schilffinken, Par 7 Mk.,
Schwarzkopf-Nonnen, 10 Par 12 Mk.,
Bandfinken, 10 Par 18 Mk.

Ferner vorräthig:

90 junge Blauſtirn-Amazonen,

fleißige gelehrige Vögel, fingerzahm und anfangend zu ſprechen.

42 gutſprechende und Lieder ſingende, bezw. Melodien flötende, graue und grüne Papageien. Hellrothe, dunkelrothe u. blaue gelbbrüſtige Araras; kleine Hyacinth-Araras; große u. kleine gelbhaub. Kakadus, Mainaſtare etc. etc. Kleine zahme Affen à 15 Mk. [2325]

August Fockelmann
Thierhandlung
Hamburg-Hoheluft, Gärtnerſtr. 72.

Kanarien.

Von meinem ſehr tiefgehenden tourenreichen Hohlrollerſtamm m. g. Knorren, Klingeln, tiefen Pfeifen ꝛc. verſende unter Garantie des Werthes à 10—50 ℳ. Weibchen desſelben Stammes 2 ℳ. Für Wiederverkäufer ſehr empfehlenswerth, d. Dtz. Hähne 72 bis 96 ℳ.

Parade, Rentier,
[2326] **Hannover,** Alleeſtraße.

NB. Meine Verkaufsvögel erhielten nachweislich 1898 u. 99 goldene und ſilberne Medaillen.

Beſte Bezugsquelle für
Papageien!

Graue und grüne Amazonenpapageien, Doppelgelbkopf u. Gelbnacken-Amazonen, ſprechend und nichtſprechend, ſchon von 20 ℳ. [2327]

Beste Bedienung.

Vollste Garantie.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis.

Einen größeren Poſten

Norwich-Canarien,

à Par 25, à Mch. 15, à Wch. 10 ℳ,

Lizard-Canarien,

à Par 30, à Mch. 20, à Wch. 12 ℳ,

Cayenne-Canarien,

à Par 25, à Mch. 15, à Wch. 10 ℳ.

J. O. Rohleder
[2328] in Leipzig-Gohlis.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei. Permanenter Verſandt vorzgl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft. Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [2329]

Harzer Hohlroller,

gute Mittelvögel, à Stck. 6 und 8 ℳ, à Dtzd. 51 ℳ, 2 Dtzd. 100 ℳ.

J. O. Rohleder
[2330] in **Leipzig-Gohlis.**

Geſunde Stieglitze

à 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, **Rothhänflinge** à 1 ℳ Dtzd. 9 ℳ, **Zeiſige u. Buchfinken** à 90 ₰, Dtzd. 7,50 ℳ, **Grünhänflinge u. Tannenmeiſen,** à 70 ₰, Dtzd. 6 ℳ, Weibchen die Hälfte. Garantie lebender Ankunft. [2331]

Gebr. Mergler, Vogelerport,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Harzer Kanarienvögel,

mit höchſten Preiſen prämirt, verkaufe per Stück 6, 8, 10, 15, 20 ℳ. Garantie für Hähne u. lebende Ankunft. Verpackung frei. Tauſche auch gegen Papageien oder ſonſtige ſchöne fremdländiſche Vögel. Bei Anfrage Porto für Rückantwort erbeten; nur reelle Bedienung. [2332]

Sollensberger, Wechſelwärter,
Bahnhof Roſenheim.

Halt!

Die **Vogelzüchterei** von [2333]

L. G. Müller, Nordhauſen a. Harz

verſendet **koſtenfrei** die Preisliſte, ſowie hochfeine Anerkennungen über gutgelieferte

ff. Harzer Kanarienvögel.

Letztere verſ. 14 Tage auf Probe überallhin.

Verkaufe:

1	**Amſel** (Schwarzdroſſel),	6. ℳ
1	**Sproſſer,** ſchön ſchlagend,	18.— „
1	**rothrück. Würger,**	5. „
1	**Rothhänfling,**	1.50 „
2	**Kohlmeiſen,**	0,75 „

Sämmtliche Vögel ſind vollſtändig zahm. Garantie für Männchen. [2334]

Steiner, Einbeck, Tiderexſtr. 27 I.

Goldhähnchen,

gut eingewöhnt, **Schwarzplättchen, Rothkehlchen, Meiſen, 1 Amſel,** pfeift Ach wie iſt es möglich dann u. Deſſauer Marſch, beides vollſtändig. [2335]

F. Nonck, Vogelhandlung,
Berlin W., Potsdamerſtraße 112.

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländiſchen und ausländiſchen Körner- und inſektenfreſſende Vögel, in allerfeinſter, ſtets friſcher Ware, beſonders: **Ameiſeneier,** handverleſene, ganz reine, **Eintagsfliegen** (Weißwurm), **Muska oder Sele** (überſeeiſche Fliege), **Mehlwürmer** und **Univerſalfutter-Miſchungen** verſendet zu billigen Preiſen [2336]

H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung,
Erfurt, Futterſtraße 2.

Preisliſte auf Wunſch umſonſt und portofrei.

Kanarienvögel

von 8—35 ℳ, Preisliſte frei, verſendet
[2337] **Wilh. Schick, St. Andreasberg.**

Habe noch abzugeben:

6 Par ſchöne u. gut gepaarte **Norwich,** à Par 13 und 14 ℳ, 4 Stück kleinere **Yorkſhires,** à 4 ℳ, 7 Stück **Stieglitz-Hänfling-Zeiſig- u. Kanarien-Kreuzungen,** ſchöne, gehaubte Vögel, 2—5 ℳ, Porto u. Emball. extra, Vorauszahlung. Bei Anfragen bitte Poſtkarten mit Rückantwort zu benutzen. [2338]

Charles Backe.
Nordre Frihavns Vej 86, **Kopenhagen ø.**

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [2339]

C. G. Vodel, Leipzig, Praſſendorferſtr. 16.

Aus meiner Privatzucht offerire:

ff. Harzer Edelroller,

à Stück 5, 7, 9 u. 12 ℳ. Geſunde und lebende Ankunft garantirt. [2340]

Georg Scholz, Dresden-N., Markgrafenſtr. 16.

Suche eine im Gefieder und Geſang tadelloſe **Steindroſſel** (Steinröſerl), **mehrfach überwintert. Bedingung, gegen Garantie.** Nachricht u. Preisangabe an [2341]

Fr. Brunner,
Oehndorf Poſt Hörſching, Oberöſterreich.

Mundgelernte prachtvolle rothe

Dompfaffen.

Garantirt 4 ſchöne Lieder wie ein Menſch pfeifend, für vollſte Zufriedenheit. Ant. Marke.

[2342] **Frz. Roth,** Maler,
Schönfeld bei Carlsbad.

Gebe aus mein. Liebhaberzucht ab:

Von prämirten edlen Stammeltern 7 fleißig ſing. **Harzer Hohlroller,** à 8 ℳ, 9 Wbch., à 1 ℳ, unter Nachnahme. [2343]

Ing. **Koeppen, Tempelhof-Berlin.**

Papagei-Amazone, gut ſprech. u. zahm, preisw. z. vk. Leipzig-A., Wurznerſtr. 81. [2344

Für 10 Mk.

einen ungezähmten **gelben Wellenſittich** zu verkaufen. [2345]

J. Gorgol, Berlin, Parkſtr. 72.

Weg. Kündg. d. Liebh. verk.: 22 St. hochf. Salonkäfige, zieml. neu, für Sproſſer u. Droſſeln u. a. v. 1—6 ℳ, u. ſämmtl. hochf. Inſektenvögel billig. Off. sub **A. M.** bei die Exped. [2346]

Der heutigen Nummer liegt ein Proſpekt über das im **Werner-Verlag, Berlin** erſchienene Werk: **Lebende Bilder aus dem Reiche der Thiere,** Augenblicksaufnahmen nach dem lebenden Thierbeſtande des Berl. Zoologiſchen Gartens. Herausgegeben von **Dr. L. Heck** bei, ferner ein Proſpekt der **Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlg.** über **Floericke, die deutſchen Sumpf- u. Strandvögel ſowie Floericke, die deutſchen Schwimm- u. Waſſervögel.**

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

1899 (XXVIII. Jahrgang). Nummer 51.

Die gefiederte Welt

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler

von

Dr Karl Ruß.

Preis: vierteljährlich
(13 Nummern mit Abbildungen)
M. 1.50.

Magdeburg
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretſchmann).

Einzelpreis der Nummer
20 Pfg.

Inhalt der Nr. 51.

Aufruf.
Die Gartengrasmücke (Sylvia hortensis, *Bchst.*).
Warum züchten Sie mit Vorliebe Miſchlinge?
Ornithologiſche Beobachtungen in Süddeutſchland und Tirol.
Zur Stubenvogelpflege im Winter.
Ein ſeltener Wintergaſt.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechſel.
Zu unſerm Bilde.

Annahme von Anzeigen in der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg ſowie in allen Annoncengeſchäften.

Anzeigen.

Inſerate für die Nummer der bevorſtehenden Woche müſſen bis ſpäteſtens Sonntag früh in Händen der Verlagshandlung in Magdeburg ſein.

Die 3geſpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 20 Pfg. berechnet.

Vom Besten das Beste! **Mehlwürmer,** rein vegetar. gefütt., Ltr. 4,50 ℳ **Neue Ameiſeneier!** Hochf., geſiebte, ſandfr., goldgelbe Ware, Ko. 3 ℳ, 5 Ko. 13,50 ℳ. **Prima Elbe-Weißwurm,** Ko. 3 ℳ, Lt. 85 ₰. **Tyroler Ameiſeneier,** hochfein, weiß u. rein, handgeleſen, Ltr. 85 ₰, 10 Ltr. 8 ℳ, 1 Ko. 4,50 ℳ. **Zeke (Musca),** 99er, feinſte, fr. Ware, à Ko. 2,50 ℳ, 5 Ko. 11,50 ℳ. Univerſal-Nachtigalenfutter, ſeit 10 Jahr. ſelbſt erprobt, Ko. 1,80, 5 Ko. 8,50 ℳ, ſowie fachkundig gemiſcht. Futter für ſämmtl. Arten Papageien, Sittiche, Kardinäle, Senegal- u. Prachtfinken, Waldvögel, Kanarien, 5 Ko. 2,50 ℳ, ſolide Bedienung. Verſuch lohnt. [2347]
Brühl's Vogelexporthaus, Kötzſchenbroda.

Graupapagei, **prachtvoller, bildſchöner, junger, heller Congo-Vogel,** hervorragend begabt, zahm und anfangend zu ſprechen, **ferngeſund, feſt akklimatiſirt und abgehärtet,** äußerſt lebhafter Vogel, verkaufe reell für nur 25 ℳ unter Garantie geſunder, tadelloſer Ankunft b. jed. Witt. [2348]
Georg Brühl, Kötzſchenbroda.

Käfige und Geräthſchaften.



50 % Eier mehr durch Knochenſchrotfütterung. **Knochenmühlen** für Hühnerzüchter v. St. 40 ℳ lief. **Behm & Steinhardt,** [2349] Waren i. Mecklenb. Proſpekte gratis.

Der beſte Fangapparat für kleine und größere Vögel iſt mein ſelbſtthätig ſicher fangendes Schlagnetz. Beſchädigungen beim Fang unmöglich, per St. 1,50 ℳ gegen Nachnahme. Ausland Voreinſendung des Betrags. [2350]
K. E. A. Müller, Schlotheim i. Th.



Vogelkäfige aller Art, **Zuchtvolieren, Niſtutenſilien,** unerreicht in praktiſcher Anordnung, großer Auswahl u. billigem Preis. [2351]
Illuſtrirte Preisliſte koſtenfrei!
August Hermann Luther, Oschatz i. S.

Neu! Senſationell!
Kanarien-Lehr-Orgeln, auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, **ohne** Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [2352] **Edmund Schlewick,** Zittau, Sachſen. Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen. **Reparaturen** aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt

Für alle Arten Vögel fertige ich **ſachgemäße**
Volieren, Käfige und Niſtutenſilien
an (höchſt prämirt mit goldenen und ſilbernen Medaillen, zuletzt die höchſte Auszeichnung für praktiſche Käfige, den Statspreis). Große, reich illuſtrirte Preisliſte verſende gegen Einſendung von 50 ₰ in Briefmarken aller Länder; beim Kauf wird dieſer Betrag zurückvergütet. Kleine Preisliſte gratis u. franko.
Paul Schindler, Berlin, Elſaſſerſtr. 78, Ecke Ackerſtr.
Spezial-Fabrik wirklich praktiſcher Vogelkäfige. [2353]

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 80 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1,50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [2354]
K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

C. L. Flemming
Holzwaarenfabrik
Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen
empfiehlt: [2355]



Flug- und Heckbauer, Einsatzbauer, Gesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirt für Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

Hunde-Halsbänder in ff. vernick. Metall mit Lederunterlage u. Namensgravur per Stück von 3–8 ℳ. [2356] **H. D. Becker,** Iſerlohn.



Käfige jeder Art (Preisliſte gratis) fabrizirt u. empfiehlt preiswerth
Arthur Herrmann & Cie.,
[2357] **Oſchatz** i. S.

Grottenſtein-Aquarien-Einſätze à Stück 25 ₰ bis 100 ℳ. Die größte Fabrik dieſer Branche. Illuſtr. Preisliſte frei. **R. Schröter** (vorm. C. A. Dietrich. Nachf.), **Clingen** bei **Greußen.** [2358]

Futtermittel.

Ameiſeneier, hochprima deutſche ſandfreie Ware, per Kilo 4,60 ℳ, p. 5 Kilo 22,50 ℳ, p. Liter 90 ₰. **Miſchfutter für Inſektenfreſſer** per Kilo 1,20 ℳ. **Sommerrübſen I, ſüß,** hochfeine Qual., per 50 Kilo 17 ℳ, per 5 Kilo 2,20 ℳ. **Weiße Hirſe,** extrafeine Qual., p. 50 Kilo 20 ℳ, p. 5 Kilo 2,50 ℳ, empfiehlt **Carl Kämpf,** Mainz. [2359]

Mehlwürmer, i. jed. Poſt., Ltr. 3,80 ℳ, Pfd. 2,90 ℳ. **Leitner, Breslau,** Weinſtr. 12. [2360]

Ameiſeneier, 1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰. **Weisswurm,** getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰. **Mehlwurm,** ausgeſiebt große Futterware, **rein gemeſſen,** 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [2361]
Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411, I.

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 4,25 ℳ, Kilo 7,75 ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ. **Ameiſeneier,** hochprima 99er, Liter 90 ₰. [2362]
Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Hier in Nordtirol fällt die mittlere Ankunftszeit des Gärtners zwiſchen den 7. und 10. Mai, und von da ab ertönt ſein Geſang ſowol in den Hausgärten und Parkanlagen der Städte, als auch in den entlegenen Auen und in zuſammenhängenden größeren Gebüſchgruppen, in Feldern und an Waldrändern erfreulicherweiſe noch ziemlich häufig.

Wer in jener Zeit mit dem Gefühle eines echten Vogelliebhabers auf die Geſangsweiſen dieſer Grasmücke lauſcht, wird ſich unbedingt von denſelben angezogen fühlen, denn ein friſcheres, in Ton und Melodie lebhafteres Vogellied kann wol kaum genannt werden. Mit kräftigem Stimmton anſetzend, ſprudeln die überaus vokalreichen, daher reinſchalligen Tonſilben aus der Kehle des nimmermüden Sängers, und es hat den Anſchein, als ob der Vogel in dem Beſtreben, ſeine Sangesfreude in vollem Umfange zur Geltung bringen zu wollen, trotz der erſtaunlich langen Strofen noch immer kein Genügen fände. Der Gärtner verweilt im Vortrag ſeines Liedes bei keiner Tonſilbe länger als bei einer anderen, ſchlägt ſie alle nur kurz an und reiht ſie aneinander wie Perlen an eine Schnur. Faſt jede Strofe wird lang geſungen und erhält oft eine Zeitdauer, bei der man unwillkürlich fragt, wo der Vogel den hierzu nöthigen Athem hernimmt. Der Abſtand zwiſchen den höchſten und tiefſten Tönen iſt allerdings kein großer und ermöglicht ein weniger anſtrengendes Singen, doch reicht er hin, deutliche Tonſtufen zu bilden, welche ſich zu verſchiedenen, leicht wahrnehmbaren und wohlig anheimelnden Melodien verbinden. In unbeſtimmbaren Formen wogen dieſe Melodien in dem langgehaltenen Orgeln auf und nieder, wie in einem aus Muſikerhänden hervorgehenden Präludium, und ermöglichen es dem Horchenden kaum, ein Motiv aus dem Geſangsganzen herauszugreifen und feſtzuhalten. Anders geſtaltet ſich die Sache, wenn die dem Gärtner innewohnende Nachahmungsgabe geweckt wird und er einzelne fremde, dem Horcher bekannte Vogelgeſänge oder Theile aus denſelben zu kopiren beginnt. Der Finkenſchlag, ein Theil oder der ganze Geſang des Fitislaubvogels, Ueberſchläge aus dem Schwarzplattlgeſang, die bekannten an eine geblaſene Oboe erinnernden Naſaltöne des Gelbſpötters und manches andere dienen dem Gärtner nicht ſelten zur wechſelvolleren Geſtaltung ſeines Liedes; er verwebt ſolche Kopien mit demſelben ſehr hübſch und bringt ſie faſt in jeder Geſangstour in einer ſehr deutlichen Weiſe.

Hat auch die Stimme des Gärtners nicht jenen bezaubernden Schmelz, welcher ſich im Ueberſchlag eines gutſingenden Schwarzkopfes ſo eigenartig bemerkbar macht, ſo beſitzt ſie doch hinreichend Kraft und Umfang bei einſchmeichelnder Rundung und Klarheit, um hiermit in auffälliger Weiſe zu glänzen. Zudem gehört der Gärtner zu jenen Sängern, welche ſich die urſprüngliche Schönheit ihres Geſanges bis auf den heutigen Tag bewahrt haben, und deshalb iſt er bedingungsweiſe höher zu ſchätzen, als ſein in jüngſter Zeit im Durchſchnitte ziemlich weit zurückgegangener ſchwarzköpfiger Rival. Namentlich hier im Gebirge, wo es ausgezeichnete Gärtner mit tiefſchalliger Stimme, hübſcher Abwechslung und langen Touren gibt, ſteht dieſe Art beim Liebhaber in viel höherem Werth als der hieſige, größtentheils armſelig ſtümpernde Schwarzkopf.

Hier in Nordtirol wird der Gärtner ausſchließlich nur mit dem 15 bis 18 Fuß langen und bis 7 Fuß hohen Staudennetz gefangen. In dem Gebüſch, in welchem der Vogel ſingt, wird eine „Gaſſe“ ausgeſchnitten, das Netz ſtramm hineingeſpannt und der Vogel demſelben zugetrieben. Auf dieſe Art gelangt der Gärtner, ſowie überhaupt jeder „Staudenvogel“ am eheſten und zwar vollkommen rein und unverſehrt in die Hände des Fängers. Man ſucht den Gärtner ſogleich nach ſeiner Ankunft zu erhaſchen, und zwar um ihn ſchneller an's Käfigfutter bringen zu können und bei der Abſicht auf Männchen um ſo ſicherer zu gehen.

Eine Unterſcheidung des Geſchlechtes iſt beim Gärtner ſehr ſchwer, und wer ſich nicht auf das myſteriöſe Steißzapfenzeichen verſteht, der käfigt oft eine ſchweigſame „Dame“ ſtatt eines ſchönen Männchens. Die Kennzeichen des Gärtners, ſowie die Unterſcheidung deſſelben von unſeren übrigen heimiſchen Grasmückenarten mögen aus folgender Ueberſicht erſehen werden:

Geſammtlänge nahezu 17 cm (Nachtigalengröße); Iris im Alter lebhaft goldgelb; die weißliche Unterſeite mit tiefgrauen Wellenlinien gezeichnet: **Sperbergrasmücke** (Sylvia nisoria, *Bchst.*)		
Geſammtlänge höchſtens 14 cm; Iris ſtets dunkelbraun; die Unterſeite ohne dunkle Wellenlinien:	Oberkopf auffällig heller oder dunkler gefärbt als die übrige Oberſeite:	Geſammtlänge reichlich 14 cm; Oberkopf ſchwarz oder düſter braun; Oberſeite olivenerdbraun; Halsſeiten grau; Kropf heller; Kinn und übrige Unterſeite bräunlich- oder bläulichweiß: **Schwarzköpfige Grasmücke (Schwarzplattl)** (Sylvia atricapilla, *L.*).
		Geſammtlänge reichlich 12 cm; Oberkopf hell-, Bürzel dunkler grau; übrige Oberſeite graulicherdbraun; Zügel und Ohrgegend grauſchwärzlich; Unterſeite weiß: **Zaungrasmücke** (Sylvia curruca, *L.*).
	Die Färbung des Oberkopfes von derjenigen der übrigen Oberſeite nicht oder kaum unterſcheidbar. Geſammtlänge reichlich 14 cm:	Füße gelblich fleiſchfarbig; Unterflügeldecken braungrau; die Außenfahne der äußerſten Schwanzfeder weiß; die Schwingen breit roſtbraun geſäumt; Oberſeite braungrau; Kopf und Wangen mit hervorſchimmerndem Aſchgrau; Kehle und Bruſt weiß: **Dorngrasmücke** (Sylvia rufa, *Bodd.*).
		Füße bleiblau; Unterflügeldecken blaßorangegelb; die äußerſte Schwanzfeder ohne Weiß; die Schwingen ſchmal fahlbräunlich geſäumt; Oberſeite olivengrau; Unterſeite grauweiß, an den Seiten gelblich angeflogen: **Gartengrasmücke** (Sylvia hortensis, *Bchst.*).

Aus dieſer Ueberſicht iſt zu entnehmen, daß der Gärtner und die geſanglich weniger werthvolle Dorngrasmücke, über welche ich mir ſpäter einmal zu berichten erlauben werde, in der Gefiederfarbe am meiſten übereinſtimmen und daher vom Laien nicht ſelten miteinander verwechſelt werden. Es iſt deshalb genau auf die vorerwähnten unterſcheidenden Merkmale zu ſehen. Als Kennzeichen des Männchens gelten ein ſchmaler weißer Strich durchs Auge und ein lebhafteres Orangegelb unter den Flügeln. Ob dieſe Kennzeichen indeß als ſtichhaltig anerkannt werden dürfen, darf ich nicht beſtimmt behaupten, obwol ſie mir in fraglichen Fällen ſchon mehrmals einen richtigen Fingerzeig boten.

Hinſichtlich der Käfigung und Eingewöhnung des Gärtners wird hier ähnlich verfahren, wie mit jedem anderen Weichfreſſer. Der für Grasmücken in Verwendung kommende Käfig mit Kreuzſprung und üblicher Wachstuchdecke iſt gewöhnlich 50 cm lang, 28 cm hoch und 19 cm tief. Der Wildfang wird „eingebunden“, d. h. ſeine Behauſung wird mit lichtem Stoff (gewaſchenem Perkal) verhüllt und dieſe Umhüllung meiſt ſo lange belaſſen, bis der Inſaſſe an das übliche Käfigfutter gebracht iſt. Da hier zur Zeit, wo der Gärtner gefangen wird, die friſchen kleinen Ameiſenpuppen gewöhnlich noch ſehr ſelten ſind, wird einfach zu Mehlwürmern gegriffen, von welchen der Vogel täglich 40 bis 50 Stück erhält. Mit dieſer Fütterung wird fortgefahren, bis das erſtgenannte Futtermittel bei entſprechender Qualität zu einem annehmbaren Preiſe erhältlich iſt. Etwa eine Woche hindurch erhält nun der Gärtner täglich einen Eßlöffel voll Ameiſenpuppen und wird dann mit denſelben an das Miſchfutter gewöhnt. Ich bereite daſſelbe aus geriebener, ſchwach ausgedrückter Gelbrübe, geriebener, altbackener, guter Semmel, ſüßem Quark, etwas ſtark zerquetſchtem Hanf und miſche dieſem Gemengſel ſoviel friſche Ameiſenpuppen bei, daß ſie in der ganzen Futter-Ration ein Drittel derſelben betragen. Der ſüße Quark wird vom Gärtner außerordentlich gern gefreſſen, ja oft noch lieber als die Ameiſenpuppen, und er darf daher, infolge ſeines großen Nährwerthes, außer der Singzeit nur in mäßigen Gaben gereicht werden. Den Hanf gebe ich nicht als Nahrungs-, ſondern als Stärkungsmittel für den Magen. Die Schalentheilchen des Hanfes verurſachen eine Reibung an den Magenwänden, kräftigen ſie hierdurch und verhindern eher ein Erſchlaffen derſelben. Auf das Futterquantum für je ſechs Weichfreſſer, einerlei welche, gebe ich ſtets einen ſchwachen Eßlöffel voll hiervon. Getrocknete Ameiſenpuppen werden vom Gärtner gewöhnlich verſchmäht; ich laſſe ſie daher in geriebener ſaftiger Möre über Nacht anziehen, worauf ſie dann ſehr gerne genommen werden.


Amazone mit rothem Flügelbug (Psittacus aestivus, *Lath.*)

Dieſe Fütterung behalte ich bei bis zur Winterſonnenwende und vervollſtändige ſie dann nur inſofern, als ich von da ab täglich 4 bis 6 Mehlwürmer beilege. Sehr empfehlenswerth iſt der Rath des den Leſern dieſer Zeitſchrift wohlbekannten Vogelwirthes Herrn Kullmann: Das tägliche Futterquantum derart zu bemeſſen, daß es bis zu Beginn der Nachmittagszeit vollſtändig aufgezehrt wird. Es iſt dies eine Vorſichtsmaßregel, welche beſonders beim ſtarkfreſſenden Gärtner behufs Verhütung der bei dieſem Vogel ſich gern einſtellenden Fettleibigkeit angewendet werden ſoll. Stellt ſich bis zur Nachtzeit noch großer Hunger ein, welcher ſich durch eine auffällige Unruhe des Vogels bekundet, ſo genügen einige Mehlwürmer zur Stillung deſſelben. Ein allzu langes Faſtenlaſſen behufs Verhütung eines Fettanſatzes kann ich indeſſen nicht für rathſam halten, ebenſowenig die Verabreichung von ſehr magerer oder abführender Koſt, weil hierdurch nur zu leicht raſche Abmagerung und Dürrſucht entſtehen kann. Um dem Vogel leichten Durchgang zu verſchaffen, genügt ein zeitweiſes Darbieten eines guten weichen Apfels oder einer in Waſſer aufgeweichten Kranzfeige.

Bei nicht wenigen Liebhabern gilt der Gärtner als ein ſehr weichlicher, im erſten Jahre kaum durchzubringender Vogel. Thatſächlich erfordert ſeine Behandlung im Allgemeinen und ſeine Fütterung im Beſonderen mehr Aufmerkſamkeit als bei vielen anderen Weichfreſſern und hierbei iſt auch ſeine Frühjahrsmauſer in Betracht zu ziehen. Indeß bei gleichmäßiger Behandlung, zeitgerechter Fütterung mit nicht zu viel, aber guter, reiner Koſt, gleichmäßiger, wenn auch nicht hoher Zimmertemperatur, Schutz vor ſcharfer Zugluft und ſteter Reinhaltung des Käfigs, werden ebenſo gute Reſultate erzielt werden, wie bei anderen aus der Freiheit geholten Sängern. Wenigſtens iſt mir bei der obenerwähnten Behandlung noch kein Gärtner im erſten Jahre ſeiner Käfigung eingegangen.

Die ſchwierigſte Periode der Ueberwinterung eines Gärtner-Friſchfanges fällt in die Zeit von anfangs

Februar bis Mitte März, wo ſich der Mauſerungsprozeß vollzieht, bezw. ſich einſtellen ſoll. Um den Vogel hierzu geeignet zu machen, iſt es nothwendig, ihn mindeſtens im Januar zum Singen zu bringen. Dies wird am eheſten dadurch erreicht, daß der Vogel an einen warmen, möglichſt ſonnigen Platz gebracht wird und eine erregende Koſt (mehr Mehlwürmer, bezw. angequellte Ameiſenpuppen) erhält. Beginnt der Vogel zu ſingen, ſo darf ſeine Ueberwinterung bei weiterer ſorgſamer Pflege als gelungen bezeichnet werden; ſelbſt auch dann, wenn ſich die erhoffte Mauſer nicht einſtellt. Der Vogel ſingt dann fort bis zur nächſten Herbſtmauſer, welche ſich nunmehr im vollem Umfang geltend macht. Dieſe Beobachtung habe ich bei meinen Gärtnern ſchon ziemlich oft gemacht und darf mit Sicherheit auf ähnliche Wahrnehmungen durch andere Vogelwirthe rechnen.

Iſt der Gärtner bis zu dieſem Grade eingewöhnt, ſo hat man in ihm einen Sänger erworben, wie er dankbarer kaum gedacht werden kann. Selbſt den überaus fleißig ſingenden Gelbſpötter ſtellt er meiſt in den Schatten, und man darf, ohne ſich einer Uebertreibung ſchuldig zu machen, behaupten, daß die geſangliche Tagesleiſtung eines Gärtners von keinem anderen Sänger überboten werden kann.

Warum züchten Sie mit Vorliebe Miſchlinge?

Ergänzung zu der Beantwortung dieſer Frage in Nr. 47.

Von W. Stehle. (Nachdruck verboten.)

Die zwei Miſchlinge vom Gürtelfink (Spormestes cincta, *Gld.*) (Männchen) und japaniſchem weißen Mövchen (Weibchen), welche ich am 13. Dezember, 5 Wochen alt, von den Alten genommen habe, ſind in folgender Weiſe gezeichnet. Der eine hat drei kleine weiße Federn im ſchwarzen Kehlfleck, der andere einen weißen Kehlfleck, ſchwarz umrandet; Bürzel und obere Schwanzdecken ſind bei beiden gleich grauſchwarz, die Federn an der Spitze etwas heller, wodurch die dem Mövchen eigene Zeichnung entſteht. Sonſt ſind die Vögel der Färbung nach ganz wie die erſten, in Nr. 47 erwähnten Jungen, alſo dem Gürtelfink am ähnlichſten. Das weiße Mövchen hat alſo, wie es ſcheint, keine Farben zu vergeben, und doch fallen ſo oft vom weißen Mövchen gelb- und ſchwarzbunte Junge, wie gewiß ſchon jeder Züchter beobachtet hat. Als ich die Jungen entfernte, hatten die Alten ſchon wieder 6 Eier im Neſt; doch werde ich dieſe Zucht aufgeben, ſobald ich ein ſchönes Gürtelgrasfinken-Weibchen erhalten kann, deren jetzt leider keine am Platz ſind.

Die letzten Jungen der Ceres-Zebrafink-Miſchlingszucht haben zuſammen mit den Miſchlingen vom Gürtelfink und weißen Mövchen ſchon zwei Ausſtellungen beſucht und ſich Preiſe geholt. Alſo zu der Freude, welche die Vögel mir ſelbſt machen, noch Ehrenbezeugungen! Ich glaube, es wird ſich nach alledem, was ich geſagt habe, nun niemand mehr wundern und mich fragen: Warum züchten Sie mit Vorliebe Miſchlinge?

Ornithologiſche Beobachtungen in Süddeutſchland und Tirol.

Von W. Hennemann, Lehrer. (Nachdruck verboten.)

Es war am 6. Juli d. J. als wir, meine Frau und ich, auf einige Wochen unſer ſauerländiſches Dorf verließen, um das deutſche Alpenland mit ſeinen herrlichen Bergen, Wäldern und Seen zu beſuchen. Von verſchiedenen ornithologiſchen Beobachtungen auf dieſer Reiſe ſei nach kurzen Aufzeichnungen hier berichtet.

Wir wandten uns zunächſt der Maingegend zu und erreichten Aſchaffenburg. Frühmorgens, als bereits zahlreiche Thurmſchwalben (Cypselus apus, *L.*) über den Häuſern dahineilten, welche ſich durch ihre gellenden Rufe wie kaum ein anderes Mitglied unſerer heimiſchen Vogelwelt bemerklich zu machen wiſſen, ſetzten wir die Reiſe über den waldreichen Speſſart fort. In der Gegend von Heigenbrücken und Wiesthal, im ſteileren, dicht bewaldeten Hochſpeſſart, beobachtete ich mehrmals den Mäuſebuſſard (Falco buteo, *L.*), der dort recht häufig vorzukommen ſcheint. Als wir dann bei Lohr, einem der bedeutendſten Plätze für das zum Verflößen gelangende Holz der Speſſartwaldungen, wieder das Mainthal erreichten und weiter in demſelben in die Gegend von Karlſtadt kamen, hatte ich Gelegenheit, zwei Schwarzſtörche (Ciconia nigra, *L.*) am Flußufer zu beobachten, und zwar zum erſten Mal in ihrem Freileben, nachdem ich ſie bereits in Gefangenſchaft geſehen hatte. Somit ſcheint dieſer im allgemeinen ſchon recht ſelten gewordene Vogel noch in den Mainbergen zu horſten. Auch den Fiſchreiher (Ardea cinerea, *L.*), der nach Ausſage eines Mitreiſenden in dieſer Gegend ſehr zahlreich vorkommen ſoll, konnte ich ſpäter bei Zell, in der Nähe von Würzburg, am Waſſer wahrnehmen. Sehr zahlreich ſind in dem Flußthal Krähen und Sperlinge vertreten, welch letztere beim Herannahen des Zuges ſich in ungemein großen Schwärmen aus den Kornfeldern erhoben.

An großen Hopfenpflanzungen vorbei, die beſonders bei Neuſtadt in Mittelfranken auftreten und dem fränkiſchen Lande ein eigenartiges Gepräge geben, ging die Fahrt weiter nach Nürnberg und ſpäterhin nach München.

Den erſten Ausflug von München aus unternahmen wir nach dem herrlichen, in den bayriſchen Voralpen gelegenen Ammerſee, deſſen hügelige Ufer von prächtigen Nadel- und Laubholzwaldungen beſchattet werden. Gar maleriſch heben ſich die trauten Fiſcherdörfer am Geſtade mit ihren braunen Dächern von dem Grün ab. Umkreiſt von flüchtigen Möven (Larus ridibundus, *L.*) fuhr das Schiff über die ſpiegelglatte, grüne Fläche des Sees dahin und erreichte nach ſtark einſtündiger Fahrt die Bucht von Herſching. Durch's romantiſche Kienthal hinauf, deſſen rauſchender Bach über wuchtige, verſtreut liegende Felsblöcke dahineilt, wanderten wir weiter nach Kloſter Andechs, deſſen Kirche bereits lange vom See aus ſichtbar war. Wir hörten im Walde noch Rothkehlchen und Droſſel ſingen; einige Male ließ auch ein Eichelheher ſeinen Schrei vernehmen. Am häufigſten machten ſich aber Buchfinken und Zaunkönige bemerklich. Auf der Höhe, bei dem inmitten von Feld und Wald gelegenen Kloſter angelangt, fielen die zahlreichen Niſtkäſten auf, welche in dem umfangreichen Kloſtergarten ausgehängt ſind. Es war meine Abſicht, bei Herrn Pater Emmeram Heindl, dem durch ſeine lehrreichen Aufſätze und gemüthvollen ornithologiſchen Plaudereien bekannten Vogelliebhaber und Züchter daſelbſt, vorzuſprechen. Ich wurde auch in freundlichſter Weiſe empfangen und konnte alsbald die bereits aus verſchiedenen Artikeln bekannten Stubengenoſſen, wie Zebrafinken, Mövchen, Elſterchen, Grauedelfinken u. a. m. in Augenſchein nehmen. Vor dem Fenſter der Zelle ſah ich das Futterblech, deſſen zahlreiche Beſucher zur rauhen Winterszeit eingehend in dem Aufſatz „Meine Wintergäſte“ in der Allgem. Thierſchutzzeitſchrift 1890 geſchildert ſind. Wenn ich auf dieſen Artikel hinweiſe, ſo geſchieht es, weil der Herr Verfaſſer in demſelben zeigt, mit welch geringen Koſten ein Futterplatz für unſere befiederten Freunde herzuſtellen und zu unterhalten iſt. Mancherlei Intereſſantes erfuhr ich aus den Erfahrungen dieſes Vogelfreundes, bis dann die Zeit kam aufzubrechen, um das Schiff in Herſching zur Rückfahrt zu erreichen.

Andern Tags fuhren wir weiter ins Gebirge, nach dem von freundlichen Dörfern umgebenen Tegernſee. In dem am öſtlichen Ufer gelegenen, gleichnamigen Dorfe ſah ich vor dem Fenſter eines Hauſes mehrere gekäfigte fremdländiſche Vögel, welche eine Vogelhandlung erwarten ließen. Ich trat ein und erfuhr, daß ſämmtliche Inſaſſen von dem Beſitzer, einem Schuhmachermeiſter, gezüchtete Grauedelfinkenbaſtarde waren, welche bereits in München prämirt worden waren. Leider fehlte mir die Zeit, nach Näherem der Miſchlingszucht dieſes ſehr geſchätzten Sängers mich zu erkundigen.

Als wir im Stellwagen die Fahrt nach dem Achenſee, dem herrlich tiefblauen Bergſee Nordtirols, fortſetzten, ließ ſich bei Dorf Kreuth ein Wendehals (Jynx torquilla, *L.*) ſehen. Am See, beſonders in der anmuthigen Pertisau, ſind Finken, Goldammern, namentlich aber Hausrothſchwänzchen ungemein häufig. Der Rothſchwanz gehört überhaupt zu den Charaktervögeln der Tiroler Dörfer, deren Häuſer mit ihren Balkonen und Schindeldächern ihm willkommene Brutſtätten bieten. An den felſigen Abhängen trafen wir hin und wieder auch den Brachpieper (Anthus campestris, *Bchst.*) an.

Angenehm überraſcht wird der Fremde im ſchönen Innsbruck durch die verſchiedenſten Stubenvögel, wie Rothkehlchen, Finken, Meiſen, Sproſſer u. a. m., welche dort in auffallend großer Anzahl gehalten werden. Auf dem Wege nach dem am Berge Iſel ſtehenden Hofer-Denkmal konnten wir zweimal den rothrückigen Würger (Lanius collurio, *L.*) beobachten, der ſich auch ſpäter, in den Nebenthälern des Inn öfters zeigte. Dagegen habe ich den grauen Würger (L. minor, *L.*) nur ein einziges Mal, und zwar am Rutzbache, feſtſtellen können.

Von Innsbruck aus fuhren wir im Stellwagen weiter in's Stubaithal. In Oberſchönberg, von deſſen Höhen man ausgedehnte Schneefelder überſchaut, raſteten wir im „Jagerhof“, deſſen Veranda mit intereſſanten Vertretern der Thierwelt Tirols geſchmückt iſt, wie Gemſe (Alte und Zicklein), Uhu, Lämmergeier, Buſſard, Birkhahn, Schwarzſpecht u. a. m. Wir erreichten Fulpmes, deſſen Bewohner große Vorliebe für Kreuzſchnäbel, hier „Krumpſchnabl“ genannt, Meiſen und Rothkehlchen zeigen, wie denn überhaupt in dem ganzen Thal dieſe die bevorzugten Stubenvögel ſind. Als ich vor dem Hauſe eines jener „Vogeltobieſe“ ſtehen blieb, trat derſelbe heraus und lud mich freundlichſt ein, ſeine „Tannameasle“ (Parus ator, *L.*) einmal näher zu betrachten. Es war mir um ſo erwünſchter, als ich aus dem intereſſanten Aufſatze des Herrn Anzinger über Meiſenliebhaberei in dortiger Gegend bereits wußte, welch' hohe Anforderungen an den Geſang dieſer Vögel geſtellt werden. Der Mann nun, ein ſchlichter Arbeiter, hatte ſeine Meiſen dem Neſt entnommen und ſie durch Vorpfeifen auf einer Blechpfeife ausgebildet. Mehrere von ihnen brachten 7 bis 8 der in genanntem Artikel angeführten „Waldſchallen“ (Geſangsſätze), darunter auch den „doppelten Wetzer“ zum Vortrag, wovon ich mich mehrmals überzeugen konnte. Die Zutraulichkeit der Vögelchen war rührend. Auch hatte der Mann ein vorzüglich ſingendes Rothkehlchen in ſeiner Behauſung; es war eben das Vögelchen, deſſen Geſang mich zum Stehenbleiben vor dem Hauſe veranlaßt hatte.

Auf dem Wege nach Neuſtift, dem letzten Pfarrdorfe des Thales, 987 m hoch gelegen, hörten wir noch Droſſeln, Rothkehlchen und Finken ſingen. Auch konnten wir eine aufſteigende Feldlerche beobachten, die ich hier nicht mehr erwartet hätte. Beſonders zahlreich zeigte ſich auch hier der Hausrothſchwanz, deſſen zwitſcherndes Liedchen in den Morgenſtunden ungemein anſpricht. Im Dorfe niſteten noch Haus- und Thurmſchwalben. Hinter dem Orte trieben ſich im Steingeröll einige Zaunammern (Emberiza cirlus, *L.*) umher, und höher hinauf ſtießen wir in einer Fichtenwaldung auf einen kleinen Flug Kreuzſchnäbel (Loxia curvirostra, *L.*).

Nach dreiſtündigem Aufenthalt kehrten wir nach Innsbruck zurück und ſetzten dann die Reiſe über den Arlberg nach dem Bodenſee fort. Als wir in Bregenz in den prächtigen Anlagen am See weilten, ließ ſich ganz in der Nähe plötzlich ein Gelbſpötter (Sylvia hypolais, *L.*) vernehmen. Unermüdlich ließ er noch ſeinen wechſelvollen Geſang, in den er manches aus den Liedern anderer Vögel hineinverwebte, hören. Da es bereits der 18. Juli war, ſo war ich recht erſtaunt über den fleißigen Spötter.

Die Fahrt über den Bodenſee gehörte bei guter Fernſicht auf die Berge und Ufer zu den genußreichſten der Reiſe. Außer der Lachmöve (Larus ridibundus, *L.*) kommt hier auch die größere, aſchgraue Sturmmöve (L. canus, *L.*) vor. Hin und wieder zeigten ſich auch Haubentaucher, Sumpf- und Waſſerhühner. Von Konſtanz fuhren wir weiter durch den fruchtbaren Hegau, vorbei an den iſolirt aus der Ebene aufſteigenden bekannten Baſaltkegeln des Hohentwiel und Hohenkrähen, dem Schwarzwalde zu.

In den Ortſchaften Gutmadingen und Neudingen, letztere 671 m hoch gelegen, niſtet noch der weiße Storch (Ciconia alba, *Bchst.*). Die Nähe des Donauriedes mag wol den Vogel zur Anſiedlung in dieſer Höhenlage bewogen haben. An dem impoſanten Waſſerfall der Gutach, in der Nähe von Triberg, beobachtete ich die liebliche Waſſeramſel (Cinclus aquaticus, *L.*); auch Zaunkönige und Gebirgsſtelzen (Motacilla sulphurea, *Bchst.*) zeigten ſich zwiſchen bemoſten Felstrümmern am rauſchenden Bergwaſſer.

Wir beſuchten noch das Heidelberger Schloß, deſſen Anlagen großen Vogelreichthum bergen, und fuhren rheinabwärts wieder den heimiſchen Bergen zu.

Zur Stubenvogelpflege im Winter.

Von F. Schlag.

(Nachdruck verboten.)

Was für uns Menſchenkinder der Nachtiſch iſt, wie Preißelbeeren, eingemachte Zwetſchen, Kirſchen, Schlehen, Birnen u. ſ. w., das ſind für inſektenfreſſende Vögel (Rothkehlchen, Grasmücken u. dergl.) die getrockneten ſchwarzen und rothen Hollunderbeeren. — In rohem getrocknetem Zuſtande aber ſind dieſe ſo hart, daß die zarteren kleinen Sänger ſie garnicht, oder doch wenigſtens nicht gern annehmen. Daher habe ich mir nachſtehendes praktiſche Rezept zurecht gemacht: In einem Taſſenköpſchen übergieße ich wöchentlich zwei- bis dreimal ungefähr ½ Loth jener Beeren mit friſchem Waſſer, ſetze das Gefäß dann in die Kochplatte des Ofens und laſſe die Beeren ein Viertelſtündchen lang aufkochen (nicht nur aufquellen) und gieße das Waſſer dann ab. Meinen gefiederten Lieblingen reiche ich hiervon alle zwei bis drei Tage eine Meſſerſpitze (oder einen Theelöffel) voll in einem beſonderen Gefäß oder Schüſſelchen. (Bei dieſer kalten Witterung halten ſich die Beeren ſechs bis acht Tage lang.)

Allein, die Käfigbewohner mögen trotz dieſes Verfahrens immer noch nicht recht dieſe Futterbeigabe genießen, weil die abgekochten Beeren ſtets noch einen etwas ſäuerlichen Beigeſchmack haben. — Neuerdings rühre ich daher, nachdem ich das Waſſer abgegoſſen, zwei Meſſerſpitzen oder einen Theelöffel voll klaren Zucker unter das Beerenquantum, und meine Vögel nehmen dies Gemiſch jetzt ſo gern und gierig an, daß es eine wahre Luſt iſt!

Kleine Roſinen (roh oder eingequellt) thun wohl dieſelben Dienſte, ſind mir aber für einen größeren Vogelbeſtand zu theuer und nicht ſo naturgemäß wie Hollunderbeeren. Es iſt namentlich während der Zeit der langen Nächte entſchieden zum Beſten der Verdauungsarbeit der kleinen Vogelmagen rathſam, daß man wöchentlich zwei- bis dreimal, je nachdem der geſammelte Beeren-Vorrath größer oder kleiner iſt, meine gegebene Anleitung befolgt. Prüfe man ſie wenigſtens. Zwei meiner Rothkehlchen lohnen mir dieſe Fütterung ſchon durch fleißigen, ziemlich lauten Geſang. Probatum est!

Ein ſeltener Wintergaſt.

Von W. Hennemann, Lehrer.

Die kürzlich durch die Zeitungen gegangene „Bitte von der Höhe des Thüringer Waldes“, die arme Bevölkerung von Steinheid durch Beſtellungen von Chriſtbaumſchmuck zu unterſtützen, hat die Erinnerung an ein überaus ſchönes und ſehr ſeltenes Vögelchen in mir wachgerufen.

Es war im Frühjahr 1894, als ich, während eines längeren Aufenthalts in Sonneberg, auf meinen Wanderungen durch's anmuthige meiningiſche Oberland mit ſeiner weitbekannten Glas- und Spielwareninduſtrie eines Tags auch in das Gebirgsdorf Steinheid kam. Am Fenſter eines der grauen Schindelhäuſer, aus welchen das Dorf zumeiſt beſteht, bemerkte ich außer einem gekäfigten Kreuzſchnabel, dem Lieblingsvogel des Wäldlers, in einem zweiten Bauer eine Laſurmeiſe (Parus cyaneus, *Pall.*), welche mir bisher nur als ausgeſtopfter Vogel und in Abbildungen zu Geſicht gekommen war. Sofort trat ich ein und erfuhr im Hauſe, daß die Meiſe im „Göritzgrund“*) gefangen worden ſei. Der Beſitzer, ein Arbeiter, wußte zwar nicht, daß es eine nordiſche Meiſe war, welche nur als ſeltener Wintergaſt bei uns in Deutſchland erſcheint; aber die Farbenſchönheit ihres Gefieders hatte ihn doch veranlaßt, den ſchmucken Vogel zu käfigen. Er befand ſich in gutem Zuſtande; ob er aber ſeinen Pfleger auf längere Zeit noch erfreut hat, vermag ich nicht zu ſagen, denn ſeitdem bin ich nicht wieder nach Steinheid gekommen.

In unſeren ſauerländiſchen Bergen habe ich dieſe hübſche Meiſe, welche unſere heimiſche Blaumeiſe ſowol an Größe als auch an Farbenpracht übertrifft, noch in keinem Winter beobachten können.

---

*) Die Göritz, ein über Felsblöcke dahineilender Bach, durchfließt ein liebliches Thal, den ſog. „Göritzgrund“, und mündet zwiſchen Steinach und Lauſcha bei der Göritz-Mühle in die Steinach.

Briefliche Mittheilungen.

... Die erſte Ausſtellung, welche meine Miſchlinge beſucht haben, war die „Allgemeine Vogelausſtellung“, zu Ende des vorigen Monats veranſtaltet vom „Verein der Vogelfreunde“. Dieſer Verein der Vogelfreunde hatte in der Kanarien-Abtheilung die Geſangskaſten geöffnet, eine Neuerung, welche gewiß jeder Vogelfreund mit Freuden begrüßt hat. Wenn der Züchter auch weiß, daß der Vogel Luft und Licht genug zu ſeinem Wohlbefinden hat, ſo macht es doch auf viele Beſucher einen unangenehmen Eindruck, wenn ſie all die geſchloſſenen Geſangskaſten ſehen; deshalb iſt dieſe Neuerung mit Freuden zu begrüßen. An gezüchteten Exoten war ſehr viel ausgeſtellt, und alle gaben Zeugniß von guter Pflege. Daß ſich die Ausſteller der erworbenen Anerkennung gefreut haben, brauche ich kaum noch zu erwähnen, und daß meine Kollektion nicht zu den ſchlechteſten gehört, wird man mir glauben, wenn ich ſage, daß ſie ſich einen Ehrenpreis errungen hat. Bleibt der Verein der Vogelfreunde dem eigentlich ſelbſtverſtändlichen Grundſatz treu, jeden nach Verdienſt zu belohnen, ſo hat er eine gute Zukunft vor ſich, trotzdem Barmbeck nur ein Vorort von Hamburg iſt. Auf der zweiten von mir beſchickten Ausſtellung, welche in Hamburg ſelbſt und zwar in den ſchönen Räumen der Alſterluſt von dem Verein der Kanarienfreunde zu Hamburg abgehalten wurde, waren, außer den ſchon anläßlich der erſten Ausſtellung erwähnten Exoten, ein Par Helmkakadus ausgeſtellt, das Männchen mit ſchönem rothen Kopf und Helm, das Weibchen mit grauem Kopf und Helm. Die Vögel waren entzückend, ich habe nur bedauert, daß ich nicht zu den „Habsburgern“ gehörte und ſie mein nennen konnte.

Meine ſelbſtgezüchteten Wachteln, nämlich ein Männchen von der Chineſiſchen Zwergwachtel und eins von der gemeinen Wachtel (leider ſind meine beiden Chineſen ſowol wie die beiden gemeinen Wachteln wieder Männchen) waren auch mit auf der Ausſtellung und haben durch ihren Größenunterſchied die Aufmerkſamkeit der Beſucher auf ſich gelenkt; jetzt erſt etwas über vier Monate alt, laſſen ſie ſchon den Wachtelſchlag hören. Mehr Freude kann kein Züchter an ſeinen Zöglingen haben als ich!

W. Stehle.

... Jetzt noch (7. Dezember) treiben ſich hier (Bocholt) die weißen Bachſtelzen herum. Man findet ſie zu Dutzenden bei den Erdarbeitern, die unterhalb der Stadt mit der Aa-Regulirung beſchäftigt ſind. Vor einigen Jahren beobachtete ich unweit der Stadt ein Pärchen dieſer Zugvögel (?) ſogar noch am 6. Januar und zwar auf einer Eisfläche.

Plümpe, Lehrer.

(Anmerkung der Leitung: Die im Winter in unſeren Gegenden beobachteten Bachſtelzen ſind aus dem Norden gekommene Wanderer, die bei uns überwintern.)

... Da ich keine Stube zur Verfügung habe, ſo habe ich mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen und muß manches Lehrgeld bezahlen. Jetzt ſind hier Nachts bis 15 Grad R. Kälte, und doch niſten meine Wellenſittiche noch und ſind ſehr munter und froh. Die ganze etwa 8 Quadratmeter große Voliere habe ich mit Dachpappe umgeben und hoffe, daß ich meine verſchiedenen Sittiche, Sonnenvögel und Finken glücklich durch den Winter bringen kann. — Intereſſant iſt es Ihnen vielleicht, daß trotz der großen Kälte eine kleine ſchwarzköpfige Nonne noch draußen iſt, eine Vogelart, die doch ſonſt ſehr empfindlich iſt.

C. Röben jr.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Friedrich Seel: 1. Der Seidenreiher bewohnt die Mittelmeerländer, beſonders die öſtlichen, die Donautiefländer, die Wolganiederungen, den Aralſee, die Seen Mittel-Aſiens. Er lebt hauptſächlich in Sümpfen und ſchlammigen Teichen, wo Baumwuchs nicht fehlt. Er niſtet zumeiſt auf Bäumen; wo ſolche nicht vorhanden ſind, baut er auch im Schilf und Rohr. Das Neſt beſteht aus dürren Zweigen und iſt locker gebaut, innen mit Schilfblättern ausgelegt. Er brütet geſellig in Kolonien. Seine Nahrung beſteht in Fiſchchen, auch in Froſchlaich, Waſſerinſekten und Fröſchen. Mit kleinen Fiſchen und klein geſchnittenem Fleiſch vermag man ihn aufzuziehen; er hält ſich vortrefflich. 2. Wenn Sie beabſichtigen, Seidenreiher zu züchten, ſo müſſen Sie ſich zoologiſche Gärten zum Muſter nehmen, wo in großartigen und koſtſpieligen Volieren dieſe Vögel gehalten werden und auch ohne weiteres zur Fortpflanzung ſchreiten, weil ihnen dort eben alles geboten werden kann, was zu ihrem Wohlbefinden gehört. Es bedürfte für den Zweck, welchen Sie im Auge haben, recht bedeutender Räume und einer den Vögeln zuſagenden Ausſtattung dieſer Räume. 3. Als Schmuckfedern dienen die Federn des Rückens und Unterhalſes; doch ſind dieſe erſt nach dreimaliger Mauſer vollſtändig entwickelt. Für die Rohfedern ſtellte ſich nach der Angabe eines Reiſenden vor einigen Jahren der Preis ſo, daß jeder Reiher dem erſten Verkäufer etwa 2 Mk. nach unſerem Gelde einbrachte. In Paris erhalten die Federn erſt ihren ganz unglaublich in die Höhe geſchraubten Preis. Es wird wol vortheilhafter ſein, in Paris Reiherfedern zuzubereiten, damit ſie von allen europäiſchen Modedamen begierig gekauft werden, als hier in Deutſchland Reiher zu züchten.

Herrn C. Röben jr. Bremen: Ein Werk, welches Ihnen in zuſammenhängender Form Rathſchläge und Anleitung für das Halten und Pflegen von Vögeln im Freien gäbe, d. h. in Ihrem Falle von fremdländiſchen, gibt es unſeres Wiſſens nicht. Dr. Ruß' Werke haben an und für ſich gar keine Veranlaſſung, auf dieſe Verhältniſſe einzugehen, denn es handelt ſich darin ja eben um „Stubenvögel“. Dennoch hat er, ſoweit Erfahrungen ſeinerſeits oder von anderen Vogelwirthen vorlagen, ſtets Gelegenheit genommen, über die Durchwinterung in ungeheizten Zimmern oder im Freien zu berichten. Er war ja im Allgemeinen gegen ſolche Verſuche, wenn ſie nicht etwa in Abſicht der Einbürgerung fremdländiſcher Vögel unternommen wurden; er ſtand auch nicht an, in einigen Fällen von Thierquälerei zu ſprechen. Wie ſehr er Recht hatte, haben Sie ja nach Ihrer eigenen Mittheilung reichlich zu erfahren bekommen! Dennoch ſind die von Ihnen jetzt gehaltenen und in Ihrem Briefe aufgeführten Vögel zum Theil als recht ausdauernd bekannt. Wenn Sie in Dr. Ruß' Werk (Handbuch für Vogelliebhaber u. ſ. w. Bd. 1 Fremdländiſche Stubenvögel) nachleſen wollen, ſo werden Sie da bei den meiſten auſtraliſchen Sittichen für Sie verheißungsvolle Angaben finden. Das Ausdauern der Wellenſittiche iſt ja ſchon nach allen Richtungen hin erprobt und feſtgeſtellt worden; daß aber die Ihrigen bei ſtrenger Winterkälte ſogar niſten, iſt mehr als man erwarten darf. Was den Sonnenvogel anlangt, ſo können Sie von ihm in dem ſchon genannten Werke auf Seite 304 leſen: anſpruchslos und ausdauernd; im ungeheizten Raum zu überwintern. Laſſen Sie ſich alſo den Muth nicht rauben, und benutzen Sie Ihre Voliere, wenn Sie durchaus keinen andern Raum zur Verfügung haben.

Schützen Sie Ihre Vögel nur ganz beſonders gegen die Nord- und Oſtwinde, ſowie gegen Zugluſt und Näſſe. Den Pferdedünger laſſen Sie bitte ganz und gar fort. Sie haben ja ſelbſt recht gut dagegen eingewendet, daß die Ausdünſtungen davon den Thieren ſchädlich ſein möchten.

Herrn Auguſt Matern: 1. Am empfehlenswertheſten wird ſein, daß Sie ſich zwei bereits eingewöhnte Vögel zu verſchaffen ſuchen, d. h. ein eingewöhntes Männchen und ein eingewöhntes Weibchen. Sie können ſich ſchon jetzt danach umthun, damit die Vögel ſich bei Ihnen recht heimiſch machen. Setzen Sie ſie dann im Frühjahr zuſammen und warten Sie, unter Innehaltung der gegebenen Vorſchriften, geduldig der Dinge, die da kommen ſollen. Im anderen Falle kaufen Sie Männchen und Weibchen an, um ſie, von einander getrennt, einzugewöhnen; das Zuſammenbringen mag, wie im erſten Falle, bei Beginn des Frühjahrs, ſtattfinden. Am beſten wäre ja freilich, wenn Sie ein bereits gepartes und eingewöhntes Pärchen erlangen könnten. Vergeſſen Sie aber in keinem Falle, ein genaues Tagebuch zu führen; denn wie Sie wiſſen, wandeln Sie auf wenig betretenen Pfaden zu mindeſtens fraglichen Erfolgen; Ihre Erfahrungen werden deshalb unter allen Umſtänden intereſſant ſein. Sollten Sie gar, wie wir recht ſehr wünſchen, Erfolge aufzuweiſen haben, ſo werden Ihre Erfahrungen naturgemäß um ſo bedeutungsvoller ſein, und es wäre dann ſehr ſchade, wenn Sie nichts niedergeſchrieben hätten, was anderen Intereſſenten zur Belehrung und Nachachtung dienen könnte. 2. Sie werden wiſſen, daß die Zaunkönige zu den Vögeln gehören, welche durch **jedes** Anfaſſen unangenehm berührt werden. Vermeiden Sie das alſo! Auch werden Sie gut thun, dem Käfig der Thierchen keinen Platz zu wählen, der von lärmender Unruhe und haſtigen Bewegungen betroffen wird. Natürlich hindert das nicht, daß Sie ſelbſt mit liebendem Auge und der vollkommenen Ruhe eines gewiegten Beobachters möglichſt alle Vorgänge zu überwachen und alle Veränderungen wahrzunehmen ſuchen. 3. Neben der Ruhe wird für glückliche Züchtung auch eine gleichmäßige Stubenwärme erfordert. Allein das kommt für Sie kaum in Betracht, da Sie ja wol am beſten erſt im Frühjahr mit dem Züchtungsverſuch beginnen werden. 4 Jeder neu ankommende Vogel iſt ſtets zunächſt für ſich abgeſondert zu halten, ehe er in den Heckraum verſetzt wird. Es iſt das nothwendig, damit nicht etwaige mitgebrachte Krankheiten auf geſunde Exemplare übertragen und Milben, Läuſe u. dergl. verbreitet werden. Feſtzuſtellen, ob ein eben ankommender Vogel an Milben leidet, macht weiter keine Schwierigkeit. Sie verfahren am beſten folgendermaßen: Sie überdecken ſeinen Käfig während der Nacht mit einem weißen Tuche; am nächſten Morgen werden Sie die Milben mehr oder minder zahlreich an dem Tuch finden. Um nach einer ſolchen Feſtſtellung des Vorhandenſeins der Milben dieſe dann völlig zu vertreiben, bepinſelt man alle nackten Stellen des Vogels, insbeſondere an Hinterkopf, Schultern und wo er ſonſt mit dem Schnabel nicht hingelangt, mit Inſektenpulver-Tinktur, am nächſten Tage mit verdünntem Glycerin, gewährt ihm nach zwei Tagen, wenn es recht warm im Zimmer iſt, Badewaſſer, ſchlägt 3 bis 4 Tage über und beginnt die Kur von neuem. Im ſchlimmſten Fall muß man das Verfahren wiederholen. Vor allem müſſen aber Käfig nebſt Sitzſtangen und ſogar der Ort, wo erſterer gehangen, alſo an der Wand, auf einem Spinde u. a., mit heißem Seifenwaſſer gereinigt, gewaſchen und abgeſcheuert, und wenn dies nicht thunlich, die betreffenden Stellen eingeölt, darauf abgerieben und mit Inſektenpulver-Tinktur bepinſelt oder neu gekalkt, bzl. tapezirt werden.

Herrn Laegenbecker, Steuerverwalter: Am beſten wenden Sie ſich in dieſer Angelegenheit an Herrn M. Rauſch ſelbſt, Wien VII/3, Schottenfeldgaſſe 95.

Briefwechſel

Herrn Lehrer Hennemann: Ihren kleinen intereſſanten Beitrag haben wir erhalten, wie Sie aus dieſer Nummer bereits erſehen haben. Beſten Dank! — „In der freien Natur“ von Dr. Karl Ruß umfaßt, wie Sie wol wiſſen werden, 2 „Reihen“ Schilderungen, d. h. 2 Bände. Der erſte Band („In der freien Natur“, Erſte Reihe) erſchien zuletzt im Jahre 1875 und zwar in 2. Auflage bei A. Haak, Berlin. Der zweite Band („In der freien Natur“ Zweite Reihe) iſt im Jahre 1868 bei Max Boettcher, Berlin, verlegt worden.

◆

Zu unſerm Bilde.

Die allbekannte **Amazone mit rothem Flügelbug** oder die **gemeine Amazone** (Psittacus aestivus, *Lath.*), deren Abbildung wir heute bringen, wird immer zu den allerbeliebteſten Vögeln gehören; ſteht ſie doch, nächſt dem Graupapagei, hochobenan unter allen ſprachbegabten Vögeln, und wieviel Freude und Vergnügen ein ſolch reichbegabter, drolliger befiederter Stubengenoſſe machen kann, werden die meiſten Liebhaber aus Erfahrung wiſſen.

Unter den 39 bekannten Arten Amazonenpapageien, von denen bis jetzt 34 Arten lebend in den Handel gelangt ſind, iſt die Amazone mit rothem Flügelbug die häufigſte. Bis zur neueren Zeit wurde ſie mit der Venezuela-Amazone mit grünem Flügelbug vielfach verwechſelt, weil der letzteren von Linné der lateiniſche Name Amazonenpapagei beigelegt worden, während er eigentlich dieſer gebührt. Sie iſt in folgender Weiſe gefärbt: Stirnrand blau; Oberkopf, Wangen und Kehle gelb; Flügelbug, Spiegelfleck im Flügel und Grund der Schwanzfedern roth; erſte Schwinge ſchwarz, Außenfahne ſchmal blau geſäumt, die übrigen Schwingen erſter Ordnung an der Außenfahne grün, an deren Enddrittel blau, an der Innenfahne ſchwarz; Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne grün, Spitze blau, Innenfahne ſchwarz, fünf bis ſechs der zweiten Schwinge an der Außenfahne, faſt vom grünen Grunde bis zur blauen Spitze ſcharlachroth; ganzes übriges Gefieder grün, an der Oberſeite jede Feder mit deutlichem, dunklem Endſaum; die kleinen und großen Flügeldecken gelbgrün geſäumt; ganze Unterſeite hellgrün; an Bruſt und Bauch jede Feder mit ſchmalem grünlichem Endſaum; Schenkelgegend gelblich; Schnabel einfarbig ſchwärzlichbraun bis ſchwarz, Wachshaut ſchwarz; Augen gelb bis orangeroth, nackte Haut um's Auge bläulich; Füße blaugrau, Krallen ſchwarz. Die Geſchlechter ſind bis jetzt noch nicht mit Sicherheit unterſchieden. Nach Renouard hat das Weibchen etwas mehr Blau am Kopf und das Roth an der Schulter geht mehr in's Gelbe. Das Jugendkleid iſt matter in den Farben; Augen ſchwarz bis graubraun. Die Größe iſt ungefähr der einer Krähe gleich (Länge 36,5 bis 41,5 cm; Flügel 20,5 bis 22,1 cm; Schwanz 10,5 bis 13 cm). Es kommen zahlreiche Farbenſpielarten vor, bei denen ſich die blaue und gelbe Färbung am Kopf mehr oder minder ausdehnt, die eine oder andere zuweilen ganz fehlt, das Roth am Flügelbug kleiner oder größer, zuweilen gelbroth bis gelb iſt u. a. m.; ja es gibt ganz gelbe Amazonen mit rothen Abzeichen, die allerdings ſehr ſelten ſind.

Heimiſch iſt die Rothbug-Amazone in Braſilien ſüdlich vom Amazonenſtrom, Paraguay, Bolivia, Peru und dem nördlichen Argentinien. Sie kommt dort ſehr häufig vor, und die Eingeborenen ſchätzen ſie mehr als alle anderen Arten, da ſie ſich für die Abrichtung am zugänglichſten von allen zeigen ſoll. Sie wird daher am zahlreichſten in den Handel gebracht. Auch bei uns gilt ſie für ſehr werthvoll, und in der That hat man Beiſpiele von erſtaunlich reich begabten Amazonen, die ſich nicht allein im Sprechenlernen, ſondern auch im Nachſingen von mehreren Liedern oder im Nachflöten von drei bis vier Weiſen außerordentlich gelehrig zeigen. Freilich kommen auch unter ihnen, wie bei allen großen Sprechern, Vögel vor, die weniger oder garnichts lernen wollen. —

Die Züchtung dieſer Art gelang 1887 Herrn Renouard in Frankreich. Herr Ingenieur Hieronymus in Blankenburg a. Harz züchtete einen Miſchling von dieſer und der Kuba-Amazone. In neueſter Zeit (1894) hat ein Par der Rothbug-Amazonen in der Schweiz bei Herrn Dr. Wyß freifliegend in einem Birnbaum geniſtet und zwei Junge großgezogen. Herr Dr. Wyß hat ſeiner Zeit in der „Gefiederten Welt“ darüber berichtet.

D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Anzeigen.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer

Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,

alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [2373]

Universalfutter.

Vor dem Kennerauge kann eine **Universalfutter-Mischung ohne Zeke** nicht mehr als vollwerthig bestehen.

Einige Jahre fehlte dieses Produkt vollständig am Vogelfuttermarkt, und mancher Liebhaber hätte gern 10 Mk. für ein Kilo bezahlt, wenn er es hätte bekommen können.

Zeke ist **jetzt wieder** überall **gut** und **billig** zu haben.

Man verlange ausdrücklich **„Zeke, Marke Amsel“.** [2374]

Bringen unſern Freunden und Abnehmern auch in dieſem Jahre unſere tieftourenreiche

Kanarien

in beſte Erinnerung. [2375]

Mathilde Erntges,
Robert Erntges,
Elberfeld.

ff. Harzer ◆ ◆
◆ ◆ Kanarien,

ſeit 1869 eigene Zucht; die Vögel gehen in gebog. Hohlrollen, Hohlklingel, Klingelrolle, Knorre, tiefe Hohlpfeife; lang u. voll mit klangvollem tiefen Organ, p. St. 8—30 ℳ, nach Werth d. Geſanges. Verſandt p. Nachnahme; größere Poſten Dep. des Betrages. Garantie für geſundes Eintreffen. Nicht Konv. nach 8 Tagen zurück. Verpackung frei.

[2376] **Eduard Zacharias,**
Ermsleben a. Harz.

Kanarien.

Von meinem ſehr tiefgehenden tourenreichen Hohlrollerſtamm m. g. Knorren, Klingeln, tiefen Pfeifen ꝛc. verſende unter Garantie des Werthes à 10—50 ℳ. Weibchen desſelben Stammes 2 ℳ. Für Wiederverkäufer ſehr empfehlenswerth, d. Dtz. Hähne 72 bis 96 ℳ.

Parade, Rentier,
[2377] **Hannover,** Alterniſtraße.

NB. Meine Verkaufsvögel erhielten nachweislich 1898 u. 99 goldene und ſilberne Medaillen.

Harzer Hohlroller,

gute Mittelvögel, à Stck. 6 und 8 ℳ, à Dtzd. 54 ℳ, 2 Dtzd. 100 ℳ.

J. O. Rohleder
[2378] **in Leipzig-Gohlis.**

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft. Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [2379]

Geſunde Stieglitze

à 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, **Rothhänflinge** à 1 ℳ Dtzd. 9 ℳ, **Zeiſige u. Buchfinken** à 90 ₰, Dtzd. 7,50 ℳ, **Grünhänflinge u. Tannenmeiſen,** à 70 ₰, Dtzd. 6 ℳ, Weibchen die Hälfte. Garantie lebender Ankunft. [2380]

Gebr. Mergler, Vogelexport,
Hofſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Harzer Kanarienvögel,

mit höchſten Preiſen prämirt, verkaufe per Stück 6, 8, 10, 15, 20 ℳ. Garantie für Hähne u. lebende Ankunft. Verpackung frei. Tauſche auch gegen Papageien oder ſonſtige ſchöne fremdländiſche Vögel. Bei Anfrage Porto für Rückantwort erbeten; nur reelle Bedienung. [2381]

Sollensberger, Wechſelwärter,
Bahnhof Roſenheim.

Kanarienvögel

von 8—35 ℳ, Preisliſte frei, verſendet
[2382] **Wilh. Schick, St. Andreasberg.**

Ausgezeichnete Harzer Kanarienſänger, hat preiswerth abzugeben. Alle Artikel für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [2383]
C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Dr. **Russ, Prachtfinken,** verkaufe für 1,30 ℳ [2384]
Carl Kerberich, Hanau.

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländiſchen und ausländiſchen körner- und inſektenfreſſende Vögel, in allerfeinſter, ſtets friſcher Ware, beſonders **Ameiſeneier,** handverleſene ganz reine, **Eintagsfliegen** (Weißwurm), **Muska** oder **Zeke** (überſeeiſche Fliege), **Mehlwürmer** und **Univerſalfutter-Miſchungen** verſendet zu billigen Preiſen [2385]

H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung,
Erfurt, Futterſtraße 3.
Preisliſte auf Wunſch umſonſt und portofrei.

Mehlwürmer, vegetab. gefüttert, ganz rein, à Liter 4,50 ℳ, Kilo 7,50 ℳ m. Verpackung. **Ameiſeneier,** feinſte ſchleſ. Ware, per Liter 80 ₰, bei 10 Liter 75 ₰, empfiehlt und verſendet [2386]

C. O. Streckenbach, Breslau X.

Halt!

Die Vogelzüchterei von [2387]
L. G. Müller, Nordhauſen a. Harz
verſendet **koſtenfrei** die Preisliſte, ſowie hochfeine Anerkennungen über gutgelieferte

ff. Harzer Kanarienvögel.

Letztere verſ. 14 Tage auf Probe überallhin.

Paſſende Weihnachtsgeſchenke.

Edle Kanarien-Hähne

offerire zu 6, 8 u. 10 ℳ, gute Mittelvögel zu 5 ℳ. Gar. für leb. u. geſ. Ankunft. Verſ. geg. Nachn., 5 Tage auf Probe.

K. Krausmüller, Vogelhdlg.,
[2388] **Zell b. Alsfeld** (Heſſen).

Dompfaffen,

ſelbſtgelernte, 2 Lied. ff. pfeif., u. Garant. [2389]

Jean Schmidt, Lehrer,
Schlotzau, Kr. Hünfeld.

Christiane Hagenbeck

Handlung exotiſcher Vögel

Spielbudenplatz 19 **HAMBURG 4** Spielbudenplatz 19.

empfiehlt in ſchönen, geſunden, eingewöhnten Exemplaren, ſo lange Vorrath reicht: **Soldaten-,** dunkelrothe und blaue gelbbrüſtige Araras; Helm-, Brillen-, Molukken-, Nacktaugen-, Inka-, Roſa-, kleine u. große Gelbhauben-Kakadus; rothmaskirte, Rothbug-, Gelbwangen-, weißſtirnige, Cuba-, Surinam-, Gelbnacken-, große u. kleine Gelbkopf-Amazonen; Graupapageien; großer u. kleiner Vaſa-Papagei; grüner Edelpapagei; Schwarzohr-Papagei; Königsſittich, Männchen; große u. kleine Alexander-, Pflaumenkopf-, Roſella-, Pennant-, Ring- u. Singſittiche; Nanday-, Jendaya-, Mönch-, Braunohr-, Braunwangen-, Gelbwangen-, Guatemala-, Feuerflügel-, Blauſtirn- und **Elfenbein-Sittiche** (C. Petzi); Nymphen- u. Wellenſittiche; rothköpfige und grauköpfige Unzertrennliche.

Ein Mönchhonigvogel

(Tropidorhynchus corniculatus). **Großer Beo, zahm, ſprechend;** Braſil-Blauraben; Sonnenvögel; Bartmeiſen; Edelammerfinken.

Rothſchnäblige und gelbſchnäblige, ſpitzſchwänzige Grasfinken, ſowie **Masken-Grasfinken,** ſchwarzköpfige und dreifarbige Nonnen; Muskatfinken; **ſchwarz- u. weißbürzelige Ringelaſtrilde;** weiße u. graue Reisfinken; hochrothe Tigerfinken; japaniſche Mövchen; Bartgirlitze; Paradis- u. Dominikaner-Wittwen; Helenafaſänchen; Broncemännchen; Webervögel; **Brillenvögel;** rothe, graue u. Dominikaner-Kardinäle; Chineſiſche Zwerg- u. Madraswachteln, ſowie californiſche Schopfwachteln; Kanarienvögel u. Lieder ſingende Dompfaffen. [2390]

Sprechende, Lieder ſingende u. flötende Papageien in allen Preislagen und großer Auswahl.

Preisliſte u. Sprachverzeichniß auf Wunſch gratis u. franko. Gewähr lebender Ankunft auch bei ſtrenger Kälte.

Tel.-Amt 1, 4344. **Tel.-Adr.: Christiane Hagenbeck, Hamburg.** Tel.-Amt 1, 4344.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Die gefiederte Welt
Wochenschrift für
Vogelliebhaber,
-Züchter und -Händler

Die gefiederte Welt.

Wochenſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Beſtellungen durch jede Buchhandlung,
ſowie jede Poſtanſtalt (unter Nr. 2823).
Preis vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg.
Wöchentlich eine gut illuſtrirte Nummer.

Begründet von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81.

Anzeigen werden für die 3geſpaltene
Petitzeile mit 20 Pfg. berechnet und Be-
ſtellungen in der Creutz'ſchen Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg entgegengenommen.

Nr. 52. Magdeburg, den 28. Dezember 1899. **XXVIII. Jahrg.**

Aufruf.

Am 29. September d. J. iſt unſer allverehrter Dr. Ruß geſtorben. Wer er geweſen, was er geleiſtet hat, niemandem brauchen wir es zu ſagen; ſeine Schriften, durch die er ſich ſchon bei Lebzeiten ein unvergängliches Denkmal geſetzt hat, geben dafür ein beredtes Zeugniß.

Tauſende haben aus ſeinen Werken werthvolle Anregungen und Belehrungen geſchöpft. Viele, die mit ihm in perſönliche oder ſchriftliche Berührung getreten ſind, haben ſich ſeine erprobten Rathſchläge mit Erfolg zu Nutzen gemacht.

Die Freude an der Natur im allgemeinen und ihren gefiederten Bewohnern im beſonderen zu wecken, war ſein Hauptbeſtreben, und tauſendfältig iſt ihm dies gelungen.

Die Unterzeichneten glauben daher im Sinne der meiſten Vogelfreunde zu handeln, wenn ſie die Anregung dazu geben, dieſem Manne als ſichtbares Zeichen des Dankes und der Verehrung ein „Grab-Denkmal“ auf ſeine jetzige Ruheſtätte, auf dem Friedhofe bei Mariendorf, zu ſetzen, ein beſcheidenes, nicht prunkhaftes Denkmal, welches mit dem Weſen des Verſtorbenen zu ſeinen Lebzeiten im Einklang ſteht.

Aus dem Grunde erlauben wir uns, an alle Vogelliebhaber die Bitte auszuſprechen, einen freundlichen Beitrag zu den Koſten des Denkmals zu leiſten, der von den Unterzeichneten, ſowie von der Redaktion dieſer Zeitſchrift gern und mit Dank entgegengenommen wird.

Quittung erfolgt ſ. Z. durch die „Gefiederte Welt“.

Karl Kullmann,
Frankfurt a. M., Gr. Eſchenheimerſtraße 72.

Direktor **Max Koſegarten,**
Berlin SO., Köpenickerſtraße 123.

* * *

Ein Morgen in der Vogelſtube.

Von Dr. Karl Ruß.

Vorbemerkung der Leitung. Noch einmal bringt der vorſtehende Aufruf allen Leſern der „Gefiederten Welt“ jenen Mann in lebhaftere Erinnerung, welcher, als Begründer, durch ſeinen Namen die Titelvignette dieſes Blattes in alle Zukunft hinein zieren und, als Ornithologe, durch ſeine Schriften auf lange hinaus einen ſicheren Fußpunkt für alle Bemühungen und Forſchungen der näheren Fachgenoſſen und freudig ſtrebenden Liebhaber bieten wird. Die Lebensarbeit eines bedeutenden Menſchen iſt ein wohlangelegtes, geiſtiges Kapital, und wohl denen, welche zu Nachfolgern und Erben berufen ſind, wenn ſie in treuem Erhalten und ſtetigem Fortarbeiten den Beſitz feſtigen und mehren! Es ſtände nicht anders zu erwarten, und die Verlagsbuchhandlung hat es verſprochen: Die „Gefiederte Welt“ ſoll im Sinne des Begründers und erſten Herausgebers weiter geleitet werden. Herr Kullmann, der Treueſten einer, treu bis über das Grab hinaus — er hat im Eingange ſeines für die letzte Nummer des laufenden Jahrgangs beſtimmten Artikels dem neuen Herausgeber, Herrn Karl Neunzig, alles Glück gewünſcht, und wir, die nächſten Angehörigen des Dr. Karl Ruß, in deren Händen bis hierher die Redaktion der „Gefiederten Welt“ übergangsweiſe gelegen hat, ſchließen uns aus vollem Herzen an.

Zugleich können wir uns nicht verſagen, noch einmal den Verblichenen an dieſer Stelle in eigenen Worten und eigenſter Ausdrucksweiſe ſprechen zu laſſen, indem wir eine Schilderung aus jenem Sammelbande zum Abdruck bringen, welcher i. J. 1882 unter dem Titel „Bilder aus der Vogelſtube“ erſchienen und ſo manchem aus dem Leſerkreiſe bekannt iſt. Dieſe Schilderung gehört ſeinen beſten Jahren an, und zeigt all die geiſtige Friſche und all die Anmuth der Schreibart, welche ihm Zeit ſeines Lebens eigen waren, und einer lebhaften Anſchauung und ſcharfer liebevoller Beobachtung entſprangen; vor einem Menſchenalter abgefaßt, wirkt ſie dennoch wie heute geſchrieben. Alle, die da wiſſen, daß Ruß ſcherzhaft als der „Erfinder der Vogelſtube“ bezeichnet wurde, und daß das Bahnbrechende ſeines Wirkens gerade auf dem Gebiete der Haltung und Züchtung fremdländiſcher Stubenvögel gelegen hat, — alle Leſer der „Gefiederten Welt“ alſo, werden begreifen, warum wir gerade den folgenden Aufſatz wählten.

Die rauhe Spätherbſtnacht hat ausgetobt. Still und friedlich naht der Morgen; doch obwol er bereits weit herausgerückt, vermögen wir noch kein Zeichen ſeines Kommens wahrzunehmen. Denn ödes Grau verhüllt draußen die ganze Natur, und hier drinnen iſt die Dunkelheit noch viel tiefer. Trotzdem auch ohne die Hilfe einer Uhr, vermag der aufmerkſame und kundige Beobachter in der Vogelſtube — ganz ebenſo wie draußen im Freien — die Reihenfolge der Morgenſtunden an den erwachenden Stimmen der Vögel gar wol zu ermeſſen.

Einzelne Laute regen ſich auch hier die ganze Nacht; wir wollen aber dem allmählichen Erwachen einmal beiwohnen, wie der Naturfreund dies am ſchönen Frühlingsmorgen in Hain, Flur und Wald zu thun pflegt. Auch wir wählen hierzu einen Morgen in der Liebe- und Wonnezeit der lieblichen fremdländiſchen Vogelwelt, alſo einen Frühlingsmorgen — der freilich meiſtentheils in den Spätherbſt und Winter unſerer Heimat fällt.

Kaum beginnt eine ſchwache Dämmerung das tiefe Dunkel unmerklich zu klären, da erſchallt das ſcharfe zit! zit! des Schmetterlingsaſtrild; mehrmals wiederholt, wird es bei der geringſten Bewegung unſererſeits ſofort von dem entrüſteten Warnungsruf tektektek! begleitet. Immer beweglich, immer leicht erregbar, wird dadurch das reizende Helenafaſänchen aufgeſchreckt, welches dann mit ängſtlichem und doch ſo melodiſchem Lockton umherflattert und damit einige ſeiner nächſten Verwandten, Orangebäckchen, Schönbürzel (Rothſchwänzchen) und andere ebenfalls aufſtört. Doch nur wenige Minuten hindurch rufen, ſchelten und flattern die kleinen, gar zu ängſtlichen Wichte; die Morgenruhe iſt ihnen allen noch zu erwünſcht, als daß ſie lange ſich derſelben berauben ließen; bald herrſcht daher wieder lautloſe Stille um uns her.

Schrit! läßt ſodann Goldbrüſtchen einen Lockton hören; ſchrit! folgt ein zweiter, ein dritter und ſchrit-ſchrit-ſchrit! immer ſchneller und immer lauter beginnt das Vögelchen ſeinen Morgengeſang. Bald fällt das zweite und dann auch das dritte Goldbrüſtchen ein, und wir haben einen vollſtändigen — Sperlingsgeſang vor uns, ſo unermüdlich, wie er im April oder Mai nur in irgend einer Fliederlaube vorgetragen wird. Es ſind aber wunderniedliche Sperlinge, dieſe kleinen Goldigen, und auch recht beträchtlich melodiſcher iſt ihr Morgenſang als der jener grauen Straßenbuben, den manches ſinnige Gemüth doch nicht ungern hört, zumal er das Nahen des lieben Frühlings ankündet.

Immer eifriger erſchallt das dreifache ſchrit-ſchrit-ſchrit!, und wir würden Mühe haben, auch die anderen erſten Töne wahrzunehmen, wenn die emſigen Sänger nicht unterbrochen würden. Ziet! Ziet! hallt aus dem Kieferngebüſch der wohllautende Lockton des Amarant. Gleich darauf huſcht der ſchöne rothe Vogel ſchon zum Fenſter her, um dem Futternapf zuzueilen. Aber darauf hat das größte Goldbrüſtchen, des Amarant naher Verwandter und doch ſein bittrer Feind, nur gewartet, denn es fliegt ihm blitzſchnell entgegen und treibt ihn vom Futter zurück. Wol zehnmal verſucht dieſer nach dem Fenſter zu gelangen, und ebenſo oft wird er verjagt. Und doch hat er es ſo nöthig, ſich ſatt zu freſſen und ſein Weibchen abzulöſen, welches auf dem Neſt mit halbflüggen Jungen ſitzt. Dabei iſt es ſonderbar, daß bei Tage das Goldbrüſtchen von dem Amarant ohne Widerſtand in die Flucht gejagt und noch viel grauſamer verfolgt wird. Jetzt aber, in dem Zwielicht der Dämmerung, kommt dem erſteren jedenfalls ſein hoher Sitz in der Nähe des Fenſters zu ſtatten, von wo es tapfer und mit Erfolg auf den Feind herabſtößt.

Wieder wirds ein Weilchen ganz ſtill. Dann beginnen die kleinen, lieblichen Triller der Tigerfinken. Dieſe ſitzen vor ihren Neſtern oder im Gebüſch, und nicht allein die Männchen, ſondern auch die nichtbrütenden Weibchen laſſen ihre immer wechſelnde Strofe hören. Tellterrell! erſchallt jetzt das ſonderbare Geſchrei des Atlasvogels, der erſt kürzlich ſein Hochzeitskleid angelegt hat. Er iſt ein leichtblütiger Geſell und beſonders in der Liebezeit der Don Juan der ganzen Geſellſchaft, welcher nicht blos ſeinem eigenen, ſondern ebenſo allen übrigen Weibchen ſtürmiſche Huldigungen erzeigt. Durch ſein Geſchrei werden auch andere wach; der Hartlaubszeiſig beginnt zu ſchmettern, dann wetteifern die beiden Graugirlitze in ihrem herrlichen Geſange, und nun leben von allen Seiten Lieder und Töne auf.

Während ſich um die Futterſtätten allmählich eine bunte, luſtige Geſellſchaft der Kleinſten verſammelt, kommt das alte Männchen der Sperlingspapageien herbei, vom Gequellten und friſchen Grünzeug wechſelnd zu freſſen, um dann Weibchen und Junge zu füttern. Ihm folgen nach einer anderen Seite des Futterplatzes die übrigen jüngeren Sperlingspapageien, dann die Wellenſittiche und die Unzer-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Der **Bandfink** ſitzt dicht vor ſeinem Neſt auf einem Zweige und leiert ſeinen ſonderbaren Sang, bei dem er zugleich tanzend ſich hebt und hüpft. **Silberfaſänchens** Lied, das wir trotz des lateiniſchen Beinamens des Vogels (cantans) kaum als einen wirklichen Geſang erachten dürfen, tönt wie das ununterbrochene Rinnen eines Bächleins und macht eben dadurch einen garnicht übeln Eindruck. Noch immer erklingen die Triller der Tigerfinken, nachdem der Spatzenſang der Goldbrüſtchen längſt erſtorben. Da hinein ſchmettert der Hartlaubszeiſig, kläffen die ſchnurrigen Trompetentönchen der Zebrafinken, hallt hin und wieder der Flötenruf des Diamantvogels, verſchwimmen die Bauchrednerſänge der Elſterchen und Muskatvögel. Lauter wird das Geplauder der **Wellenſittiche**, **Sperlingspapageien** und **Inſeparables**, dann und wann unterbrochen von einem ſchrillen Ruf oder von den hellen Tönen der **Nymphen**. Von Zeit zu Zeit erhebt ſich der Liebesſang des Helenafaſänchens oder des Schmetterlingsfink in ſcharfer und doch recht melodiſcher Weiſe über alle übrigen Laute, und da hinein ſchallt das kukru! des **Kaptäubchens**. Doch alle dieſe Stimmen übertönt und vereinigt gleichſam zum melodiſchen Ganzen der volle, laute und klangreiche Geſang des **Graugirlitz**.

Unterdeſſen hat die Morgenſonne voll und trotz der ſpäten Jahreszeit doch klar die beiden Fenſter der Vogelſtube erreicht. Alle kleine und große Welt iſt jetzt geſättigt und eilt an ihre mannigfaltigen Geſchäfte. Wol aus 10 bis 20 Neſtern*) erſchallt das zärtliche Gezwitſcher der mit dem Bau beſchäftigten Gatten oder das Zirpen der Jungen; hier werden Liebestänze aufgeführt, dort wird Stoff zum Neſtbau herbeigeſchleppt; hier gibt es einen Kampf um einen guten Brutplatz, dort iſt man eifrig mit der Herſtellung des Neſts beſchäftigt. Zebrafink Männchen trägt Halme und Reiſer herbei, Grauaſtrildchen zerrt dünne Spargeläſtchen ab, um daraus ein gar künſtliches Neſt zu formen; das Hartlaubszeiſig-Weibchen hat ein Baumwollflöckchen, das des Grauedelfink ein Werchbäuſchchen herbeigetragen. Denn bei dieſen beiden Girlitz-Verwandten holen die Weibchen die Bauſtoffe zum Neſt zuſammen, während bei allen Prachtfinken dies faſt immer nur die Männchen thun. Der **Safranfink**, auch braſilianiſcher Kanarienvogel genannt, legt einen großen Bau aus groben Reiſern an, Tigerfinkchen einen künſtlichen Beutel aus Agavefaſern, Papier- und Baſtſtreifen. So iſt das ganze Völkchen um uns her in raſtloſer Geſchäftigkeit und beweiſt dadurch augenſcheinlich, daß es ganz naturgemäß wohl und glücklich ſich fühlt.

Auch durch das Füttern, d. h. Reinigen und Neufüllen der Futter- und Trinkgeſchirre, welches regelmäßig zweimal am Tage, Früh und Abends, vorgenommen wird, laſſen die Vögel ſich nicht beſonders ſtören; man baut, füttert, ſingt und ſpielt emſig fort. Sobald aber die friſch gefüllten Näpfe mit Sämereien, gequellten Ameiſenpuppen und geriebenem Eigelb und Eierbrot, friſcher Vogelmiere u. dergl. verlockend einladen, dann hat alles andre Thun ein Ende und man ſtürzt zum zweitenmal in buntem Getümmel an die Nahrung ſpendenden Stätten.

Wenn unterdeſſen aber die Vormittagsſonne recht voll und warm in die Fenſter ſcheint und ihre goldenen Strahlen in dem kleinen Springbrunnen ſich brechen, dann eilt all dieſes Geflügel an das weite Badebecken, und hier entwickelt ſich ein ſo buntes und lebensvolles Bild, daß es die Feder kaum zu ſchildern vermag. Goldbrüſtchen iſt der erſte, der ſein ſchönes Gefieder durch und durch naßpläſchert; ihm folgen alle Verwandten, Aſtrilde und Amandinen. Auch die Witwen mit den langen Schwänzen wagen ſich ins Waſſer hinein; die Weber, beſonders die Orangevögel, ſtürzen ſich kopfüber. Dann kommen auch die Papageien, und ſie laſſen ſich gern vom Strahl des Springbrunnens beſpritzen, während manche in das bloße offene Waſſerbecken, und wenn es noch ſo geräumig iſt, ſich kaum hineinwagen. Die kleinſten Aſtrilde, beſonders der Amarant, finden ein eigenes Vergnügen darin, unzähligemal unter dem plätſchernden Waſſer hindurch hin- und zurückzufliegen, bis das Gefieder völlig durchnäßt iſt und ſie kaum noch hinaufflattern können, um einen hohen Zweig zu gewinnen.

Endlich haben ſich auch die letzten abgeplanſchert, und jetzt ſieht man alle freiſtehenden Aeſte und Vorſprünge voller Vögel, welche in der eifrigſten Weiſe ihr Gefieder abſchütteln, putzen und glätten. Das dauert wol ſtundenlang; dann eilt man abermals zu den Futter- und Trinknäpfen, und hierauf beginnen all' die geſchilderten kleinen und großen Geſchäfte wieder und mit erneuertem Eifer. Auch die ganze Stimmenmannigfaltigkeit erwacht allmählich wieder. Und alle dieſe Töne und Laute, alle dieſe bunten und reichen Farben, dies wechſelvolle, bewegliche Leben — da iſt es wol nicht ſchwer, in die Wirklichkeit einer farben- und formenreichen Tropenlandſchaft ſich hineinzuträumen, trotz der nur zu engen Grenzen einer Stube, trotz des draußen ſtürmenden Spätherbſtwetters.

---

*) Zu der Zeit, in welcher ich dieſe Schilderung geſchrieben, die Durchſchnittszahl der faſt immer zugleich in der Vogelſtube niſtenden Vogelpaare.

Die Orpheusgrasmücke (Sylvia orphea, *Naum.*).

Von **Karl Kullmann**.

(Nachdruck verboten.)

Ehrenſchulden ſind eine ganz beſondere Spezies von Schulden, und wer unter den Vogel- und auch Nichtvogelfreunden dieſe nicht kennt, kann von Glück ſagen. Der geneigte Leſer wird ſich nun, und mit Recht, fragen, was eigentlich eine „harmloſe Orpheusgrasmücke“ mit Ehrenſchulden zu thun haben mag; worauf ich ihm kurz auseinanderſetzen will, daß ich unſerm allverehrten, leider zu früh verſtorbenen Dr. Karl Ruß im Laufe des Sommers verſprochen habe, ſeinem beſonders ausgedrückten und vielleicht einem Vogelliebhaber gegenüber wol letzten Wunſche nachzukommen und ihm für die „Gefiederte Welt" eine Abhandlung über obengenannten Vogel zukommen zu laſſen. Durch überhäufte Arbeit meinerſeits blieb es bis jetzt bei dem Verſprechen, und als ſich leider Ende September die treuen Augen unſeres unvergeßlichen Dr. Ruß für immer ſchloſſen, ließ ich mir es nicht nehmen, nach Berlin zu eilen, um meinem armen Freunde die letzte Ehre zu erweiſen, wobei ich an mein ihm gegebenes Verſprechen mehr wie je erinnert wurde. Daher dieſe Ehrenſchuld, welche mir jetzt nach ſeinem Hinſcheiden mehr wie alles zur Pflicht ward und der ich mich nun heute entledigen will, und zwar zur Zeit, wo die Schriftleitung unſerer „Gef. Welt" ſich noch in den Händen der Familie Ruß befindet; denn wie die Abonnenten unſerer Zeitſchrift bereits wiſſen werden, erhält vom Jahre 1900 ab die letztere, d. h. die Redaktion derſelben Herr Karl Neunzig, welchem ich gleich bei dieſer Gelegenheit hierzu alles Glück, hauptſächlich aber dies von Herzen wünſche, unſer ſo liebes Fachorgan in den Fußſtapfen weiter zu führen, wie es unſer guter Dr. Ruß 27 Jahre lang redlich und entgegen allen Anfechtungen zu der heutigen Höhe und ſtattlichen Abonnentenzahl emporgebracht hat.

Nun zur Orpheusgrasmücke oder, wie der Vogel auch genannt wird, zum Meiſterſänger. Ich ſchicke, bevor ich zu der weiteren Abhandlung der Orphea ſchreite, gleich voraus, daß der Herr, welcher dieſe Grasmücke als „Meiſterſänger" über die Taufe gehoben hat, wenig anſpruchsvoll hinſichtlich des Vogelgeſangs geweſen ſein mag. Hierbei urtheile ich nicht allein nach den vielen Stücken, die ich ſeit vielen Jahren des Intereſſes und der Wiſſenſchaft halber als Käfigvögel ſelbſt pflegte, ſondern hauptſächlich nach dem Geſangswerth des Vogels im Freien. Während meines ſiebenjährigen Aufenthalts in Südfrankreich hatte ich Gelegenheit, unſern Orpheus, daſelbſt fauvette orphée genannt, zur Genüge beobachten und abhören zu können. Auf höchſtens fünfzig Exemplare kann man ſtets nur einen wirklichen Künſtler, wenn auch nicht Meiſterſänger, rechnen. Zu jener Zeit, im Frühjahr 1878, beſaß ich ſolch eine prima Sängergrasmücke während fünf Jahren, und es war auch von den vielen, vielen Stücken wol das einzige Exemplar, welches mich voll und ganz in ſeinen Geſangsleiſtungen befriedigt hat. Hieraus wird der geneigte Leſer auch den Schluß ziehen, daß hinſichtlich des Geſanges dieſes Vogels noch ſehr viele Meinungsverſchiedenheiten in Liebhaberkreiſen herrſchen und vor allem, daß hierdurch der Vogelpfleger, der ſich auf einen Meiſterſänger gefaßt macht und ſich auf deſſen Geſang vorher ſchon freut, durch die Minderwerthigkeit desſelben oft auf das Unangenehmſte enttäuſcht iſt. Man verfolge nur im Laufe der Jahre die verſchiedenen Artikel und Anſichten über dieſen Vogel in der „Gef. Welt", wie zweifelhaft da geurtheilt wird; und noch in dieſem Jahrgang in Nr. 27 ſchreibt Herr Anzinger aus Innsbruck, der als Geſangskenner und ſachgemäßer Pfleger bekannt iſt, daß er ſchon längſt und immer auf eine eingehende Abhandlung über die Orphea warte, da er aus den vielen entgegengeſetzten Meinungen, die über ſie verbreitet ſeien, ſich kein rechtes Bild von dem Geſangswerth dieſer Grasmücke machen könnte. Herr Anzinger hat perſönlich dieſen Vogel nie gepflegt, wie er ſchreibt, ſondern gibt den Geſang eines Meiſterſängers wieder, den ein Freund käfigt, und der meine weiter unten vorgetragenen Anſichten inſofern nur beſtärkt, als es der Beſchreibung nach ein ſog. „Meiſterſtümper" oder Herbſtvogel iſt. Ganz ähnlich ſo wie Herrn Anzinger wird es vielen, wol den meiſten Vogelfreunden ergehen. Ich ſelbſt habe nicht, wie meine übrigen Freunde, die Luſt an der Pflege dieſes Vogels verloren, im Gegentheil, mich ſpornte die Erinnerung an meinen in Frankreich gepflegten Geſangskünſtler immer von neuem in der Hoffnung an, vielleicht doch noch einmal in den Beſitz eines ſolch ähnlich guten Vogels zu kommen, und ich pflege deshalb alljährlich ein bis zwei Stücke, welche aber bald wieder, nach ſchlecht erhaltener Zenſur, oft ſchon vor der Wintermauſer, in die Hände von weniger anſpruchsvollen Liebhabern, als ich es bin, weiter wandern. Der Hauptgrund dafür, daß es anſtatt nur Meiſterſänger, mehr, wie ich ſie zu nennen pflege, Meiſterſtümper gibt, iſt der, daß faſt ausſchließlich junge, abgeflogene Herbſtvögel in den Handel gelangen, welche weder Stimme, noch Abwechslung im Vortrag haben und ſpäter dem Vogelliebhaber, wenn ſie das kommende Frühjahr überhaupt erleben (die Herbſtvögel ſind immer hinfällig und viele gehen ſchon im Dezember vor der Wintermauſer ein), die vorerwähnte Enttäuſchung bringen, ſodaß die meiſten nach wiederholt mißlungenem Verſuch dieſe Grasmücke überhaupt nicht mehr käfigen. Ganz anders nun verhält es ſich mit Frühjahrsfängen, worunter ſich auch ſtets alte drei- bis vierjährige Vögel, wenn auch in nicht allzu großer Anzahl, befinden. Als ſtreng reelle Handlung, woher ich ſeit langer Zeit und auch heute noch alte Frühjahrsfänge von Orpheusſängern beziehe, iſt die Handlung des Herrn Thomas Weſſely in Prag, welche ich jedem Vogelliebhaber, der ſich für alte, im Frühjahr gefangene Sängergrasmücken intereſſirt, warm empfehlen kann. Ohne marktſchreieriſche Reklame, wie ſie leider jetzt täglich in den Fachorganen zu leſen iſt und die Liebhaberei, anſtatt ſie zu fördern, faſt ſtets untergräbt, indem die Anfänger hierauf hereinfallen, viel Geld vergeuden, ohne im geringſten etwas davon zu haben und ſo ſchließlich gänzlich abgeſchreckt werden, ohne marktſchreieriſche Reklame ſchreibt Herr Weſſely auf eine Anfrage, ob er wirklich alte oder junge Orpheusgrasmücken vom Frühjahr hat, worauf man ſich dann auch feſt verlaſſen kann. Noch dieſes Jahr, im Monat Mai, ließ ich wieder zwei alte, ſchöne Vögel dieſer Art kommen, eine für meinen Freund, Herrn L. Wüſter hier, einen allbekannten Vogelliebhaber, und das andere Exemplar für meine Wenigkeit. Beide Vögel, ſoweit man Anſprüche an ſie als Meiſterſänger ſtellen darf und kann, erfreuen uns ſeit einiger Zeit wieder mit ihrem Geſang; es ſind etwa drei- bis vierjährige Stücke, was ſelbſt der weniger erfahrene Liebhaber erkennen kann, und zwar an den Hauptmerkmalen, welche ich zur Sicherſtellung gleich hier anführen will. Der alte Vogel erhält erſt nach der zweiten Wintermauſer, alſo im dritten Jahre ſeiner Fliegeperiode, gelbe Augen, mit einem gräulichen nackten Ring umſäumt, zu welcher Zeit auch die Kopfplatte, bei weitem dunkler d. h. ſchwärzer, ſich vom übrigen blaugrauen Gefieder weſentlich abhebt; die beiden Seiten der Bruſt ſind gleichſam von einem leichten weinrothen Hauch eingefaßt, und die Füße ſind beim alten Vogel grobknochig, faſt plump zu nennen. Es ſind dies Zeichen welche unverkennbar ſind und was das Auge beſonders, d. h. die Iris desſelben, betrifft, ſo verhält ſich dies genau ſo, wie bei ihrem allernächſten Verwandten, der Sperbergrasmücke, der Sylvia nisoria, auf die das ganze Weſen und Benehmen der Orphea auch am meiſten zurückzuführen iſt. Die jungen Vögel, wie ſie faſt zu $^7/_8$ in den Handel gebracht werden, die ſogenannten Herbſtvögel haben im erſten Jahr ſchwarzgraue, im zweiten hell- oder gelbgräuliche Augen, ſchmutziggraue Bruſt und eine bläulichgraue Kopfplatte, genau wie die alten Weibchen, ſodaß man oft nicht einmal mit Beſtimmtheit auf das Geſchlecht ſchließen kann. Um dieſe Jahreszeit hat ſich der Vielfraß an Beren und Früchten dermaßen zu Gute gethan, daß das hierdurch hervorgerufene Beleibtſein das gewöhnliche Erkennungszeichen, den Zapfen gar nicht hervortreten läßt und kaum ein Unterſchied zwiſchen Männchen und Weibchen zu machen iſt. — Anders nun im Frühjahr; die Orpheusgrasmücke hat im Süden den Federwechſel hinter ſich, und durch den minder reichlich gedeckten Tiſch ſowie durch die Strapazen der Herreiſe ſchlank, ja oft abgemagert, dazu durch den Parungstrieb noch angeregt, läßt der Vogel den Zapfen deutlich erkennen, was man mit dem Vogelliebhaberausdruck „der Vogel zeigt“ bezeichnet, ſodaß um dieſe Zeit ein Irrthum im Geſchlecht aus vorgenannten Gründen für das Kennerauge gänzlich ausgeſchloſſen iſt.

Nachdem ich nun die Hauptmerkmale der Sängergrasmücke im Vorſtehenden allgemein beleuchtet und jedem Vogelpfleger gerathen habe, nur Frühjahrsvögel und lieber gar keinen Orpheus zu käfigen, als ſich durch einen ſtümperhaften Herbſtvogel enttäuſchen und abſchrecken zu laſſen, fahre ich in meiner Schilderung fort und komme jetzt zur Eingewöhnung des Wildſanges. Hierbei meine ich ſelbſtredend nur Frühjahrsſänge, da der junge Herbſtvogel für den Pfleger, welcher auf nur einigermaßen guten Geſang Anſpruch macht, überhaupt werthlos iſt und das Futter nicht verdient. Zu dem Zeitpunkt des Eintreffens unſeres Vogels, Anfang Mai, gibt es genügend friſche Ameiſenpuppen, ſodaß man durch dieſen Hauptfaktor der Sorge einer leichten Einfütterung enthoben iſt. So wild und unmanierlich der Orpheus nach dem Einſtecken in den offenen Käfig ſich benimmt, ebenſo ruhig iſt er in einem ganz mit weißer Leinwand verhüllten und darin im Futtergefäß reichlich mit Ameiſeneiern und zehn bis zwölf Mehlwürmern verſehenen Vogelbauer, wenn man, was man ſich wohl merken mag, den Friſchfang ſo wenig wie möglich in ſeinem thunlichſt hellen Standort ſtört. Da der Meiſterſänger ein gieriger Freſſer iſt und den Wurm kaum eine Sekunde zappeln ſehen kann, ſo wird das Futter leicht angenommen und nach einigen Tagen ſchon vernimmt man den etwas ſchüchtern vorgetragenen Geſang. Letzterer erhebt ſich überhaupt im erſten Jahr ſelten zu der Stärke, die man von einem ſolchen Vogel verlangen könnte; erſt während der erſten Wintermauſer, etwa Januar bis Februar, kann man, nachdem der Vogel zahm geworden und an ſeine Umgebung gewöhnt iſt, dem vollen, lauten Geſang lauſchen. Um ſich nun ſchon vorher zu überzeugen, inwieweit man einen Meiſterſänger in spe oder einen minderwerthigen Vogel pflegt, beachte man vor allem dabei, ob während des halblauten Geſanges die Stimme recht weich und tief, ob im Vortragen viel gurgelnde Töne und ebenſo flötenartige Amſelzüge enthalten ſind; dieſe drei Prädikate ſind unerläßlich, wenn der Vogel ſpäterhin als guter Sänger, wenn auch nicht als Meiſterſchaftsſänger, ſich präſentiren ſoll.

Unſere Sylvia orphea ſingt etwa bis zum Ende Juli, aber ſchon vorher beginnt man, ſie an ihr zukünftiges Miſchfutter überzugewöhnen; was bei dem Vielfraß eine Spielerei iſt und, ohne daß man etwas merkt, leicht von Statten geht. Allmählich befreit man den Käfig von ſeiner Hülle und ſteckt an das Vordergitter mehrere Büſchel des um dieſe Zeit reifenden Traubenhollunders, welchem der Vogel als Hauptbeerenfreſſer nicht widerſtehen kann und auf dieſe Art ſich dem Käfigleben leichter fügt. An den jeweiligen Büſcheln laſſe ich ſtets mehrere Blätter, was, außer daß dies dem Käfig gutſteht, noch das Angenehme hat, dem ängſtlichen Wildfang einigermaßen Verſteck zu gewähren und ihm auch jedenfalls anheimelnder vorzukommen ſcheint.

Mit dem für dieſe Grasmücke zu bereitenden Winterfutter muß man ſich ſehr vorſehen und daſſelbe nach dem jeweiligen Befinden des Vogels mehr oder minder kräftig herrichten, denn trotz des vornehmen Namens als Orpheusſänger und Meiſterſänger iſt er, was den Punkt Nahrung anbetrifft, ein großer Proletarier und ein reiner Nimmerſatt. Er übertrifft hierin noch die Sylvia hortensis, welche wir bei uns in der Gegend wegen ihrer Gefräßigkeit die „Ente“ unter den Singvögeln zu nennen pflegen. Und gerade dieſe Untugend der Orpheusgrasmücke iſt in vielen Fällen ihr Tod, wenigſtens bei dem nichtsahnenden Pfleger, welcher ihr nicht genug vom allerkräftigſten Futter darzureichen glaubt. Häufig habe ich gefunden, daß der Orpheus beim allereinfachſten Futter, ohne jedwede Zuthat von Käſe, Ei, Hanf ꝛc. in beſcheidenen zweimaligen Rationen verabfolgt, am leichteſten die Wintermauſer aufnimmt; und iſt dies erſt ſoweit gediehen, ſo ſchadet nachher auch herzhafteres Futter mit Hinzufügung von 10 bis 12 Mehlwürmern nichts, da der Vogel während dieſer Periode tüchtig am Singen iſt, und wie allbekannt merkwürdigerweiſe ein Vogel in der Brunſt, alſo im werdenden Geſchlechtstrieb, nur die Hälfte der Nahrung zu ſich nimmt, die er während der Ruhezeit braucht. Als Herbſtfutter, was ich ſtets bei der Orpheus-, Garten- und Sperbergrasmücke, als den drei Vielfraßen, mit Erfolg verwende, nenne ich das Folgende: Abgewelkte geriebene Gelbrübe, mit etwas Milch- oder Eierbrot überrieben, dem Ganzen ſoviel trockene gute Ameiſeneier zugeſetzt, daß das Gemiſch locker und gleichſam wegzublaſen iſt; ab und zu etwas geriebener, vorher abgetrockneter Siebkäſe (Topfenkäſe), gemahlene rothe und ſchwarze Hollunderbeeren machen das Futter, wenn es zu ſchwer, d. h. zu feucht iſt, noch flaumiger, demzufolge für den Vogelmagen leichter verdaulich. Quantitativ gebe ich früh und Nachmittags zuſammen einen guten Eßlöffel voll, ſodaß die Vögel ihren Napf total bis zum Abend geleert haben müſſen. Nun kommen noch einige zerſchnittene vorher eingeweichte Korinthen, Sultaninen, zur Abwechſelung etwas Feige und eine Meſſerſpitze voll Milchhaut als Delikateſſe dazu, dieſe Zugaben jedoch nur einmal früh bei der Hauptfütterung; Mehlwürmer erhalten die Vögel das ganze Jahr zur Ruhezeit 3—5 Stück, welche Zahl man von Dezember bis Januar ab während des Geſanges auf 8—10 Stück erhöht. Ein Stück Apfel, im Ganzen und nicht zerkleinert, wird täglich gereicht; hat der Freſſer ſein Gefäß alſo vor der Zeit ſchon geleert, ſo mag er ſich an dem Apfel gütlich thun, erſtens befördert derſelbe die Verdauung, ſtillt dem Vogel die Freßgier und als Hauptſache, er zwingt ihn, ſich beim Zerſtückeln deſſelben Bewegung mit etwas Anſtrengung zu machen, was auf das Fettpolſter wirkt. Wenn ich nun die vorſtehend erläuterte Pflege in wenige Worte faſſen will, ſo hat der Vogelliebhaber und zwar mehr wie bei jedem anderen Vogel darauf aufzupaſſen, daß die Grasmücke in normaler Konſtitution bleibt, alſo Maß halten, d. h. richtig ab- und zugeben, worauf ja ſchließlich das wirkliche, verſtändnißvolle Vogelpflegen einzig und allein begründet iſt. — Bemerken will ich noch, daß der Meiſterſänger ungern, ja faſt nie badet, man genire ſich deshalb nicht, ihm im Winter im gutgeheizten Zimmer ein tüchtiges Brauſebad von lauwarmem Waſſer zu geben, es übt dies eine bedeutende Wirkung auf die Haut aus und hilft nicht unweſentlich den Federwechſel fördern.

Nun bliebe mir noch die Geſangsleiſtung des Orpheus zu beſchreiben übrig, und wie ich in der Einleitung bereits erklärt habe, daß dieſer Vogel zu Unrecht „Meiſterſänger“ heißt, ſo kann und will ich dies hier nochmals mit gutem Gewiſſen wiederholen. Die Sängergrasmücke mag ja in jener Gegend, wo weniger hervorragende Singvögel ihren Stand haben, Meiſterſänger ſein und es da bleiben; dies will ich gerne zugeben, iſt doch, wie es heißt, „im Lande der Blinden der Einäugige König“, aber wo ein guter Stamm Nachtigalen, Sproſſer, Gartengrasmücken und Schwarzköpfe ihr zu Herzen gehendes Lied ertönen laſſen, da braucht man weder alter Geſangskenner noch muſikaliſch gebildet zu ſein: — mit dieſen vier Meiſterſingern, wovon drei nach Deutſchland gehören, kann die Orphea weder in dem Schmelz der Stimme, noch in dem abwechſelungsvollen, beſeligenden Vortrag nie und nimmer in Wettſtreit treten, geſchweige denn gar ſie übertreffen. Um nun zum Schluß den Geſang der Sängergrasmücke zu beſchreiben, d. h. ihn mit den anderer Singvögel zu vergleichen, ſo kommt derſelbe, ebenſo wie ihr Benehmen im Gefangenleben, am meiſten auf den ihres allernächſten Vetters, auf eine abwechſelungsvoll gut ſingende Sperbergrasmücke heraus, da die Orpheusgrasmücke gleich der Sylvia nisoria Geſänge anderer Vögel, hauptſächlich der Amſel, des Wendehalſes, des Gelbſpötters ꝛc mit ihrem gurgelnden, an die Gartengrasmücke erinnernden Geſang verflicht, ſo daß das ganze Lied bald flötenartig, bald murmelnd, worunter oft rauhe Noten wie die der Dorngrasmücke (S. cinerea) eigenen, nicht ausgeſchloſſen ſind, mehr abſonderlich befremdend als meiſterſängerlich wirkt. Da in keinem ornithologiſchen Werk, wenigſtens in den ernſt zu nehmenden, ſehr wenig mehr als Allgemeines über dieſe Grasmücke als Stubenvogel geſagt iſt, ſo wäre es angebracht, wenn diejenigen Liebhaber, welche ſich mit dieſem, übrigens ſonſt ſo ſehr ſchönen Vogel eingehender befaßt haben, ihre Erfahrungen gleichfalls hier niederſchrieben; und wenn meine heutigen Zeilen unſerm Meiſterſänger mehr Freunde, als er bislang gehabt, zuführen werden, ſo haben dieſelben den Zweck erfüllt, welchen ich damit beabſichtigte.

1899er Züchtungsreſultate mit Dompfaffen und Kanarien.

Von F. Schlag.

(Nachdruck verboten.)

Man ſollte meinen, ein Menſch wie ich, der jahraus, jahrein mit mehr oder weniger negativen Züchtungsergebniſſen fürlieb nehmen muß, müßte beim Schreibenwollen über ſelbige die Feder ſofort wieder ſinken laſſen und denken: „Reden iſt Silber, Schweigen iſt Gold!“ — Ja, das müßte und möchte man wol, wenn einen nicht zugleich das andere Sprichwort wieder aufrichtete: „Getheilter Schmerz iſt halber Schmerz, getheilte Freude iſt doppelte Freude!“ Mein Troſt iſt der, daß ich nicht der Einzige bin, der ornithologiſches Mißgeſchick zu tragen hat, ſondern ich ahne noch viele, viele Leidensbrüder im lieben deutſchen Vaterlande, welche ſich gleich mir in's „Unvermeidliche“ ſchicken müſſen! Doch nun zur Sache!

Ich will zuerſt wieder mit der leidigen Dompfaff-Geſchichte beginnen. Im Frühjahr 1899 hatte ich zwei Dompfaff-Brutpare in Gittern bereit, und zwar je ein wildgefangenes Männchen und ein zahmes Weibchen. Anfang April d. J. kam jedes Pärchen in einen beſonderen Gitterraum (Brutraum), und ich wartete ſehnſüchtig der Dinge, die da kommen ſollten! Dieſe kamen denn auch, aber nicht, wie ich gehofft und gewünſcht hatte! Die Weibchen ſchienen taube, unparungsluſtige Dinger zu ſein. Die Pärchen befehdeten ſich zwar nicht, waren aber auch nicht ſonderlich gut und zutraulich zu einander. So ſtanden die Dinge den ganzen Monat April hindurch. — Ich hoffte nun noch auf Erfolg im Mai und Juni. Endlich bemerkte ich bei dem einen Par etwas Parungs- und Brütluſt — und erwartete nun von dieſem wenigſtens Neſtbau und Eier. — Ich hatte aber auch diesmal wieder „die Rechnung ohne den Wirth gemacht!“ Eines Morgens fand ich auf dem Boden des Käfigs des gedachten Pares ein Ei, aber ein zerbrochenes, und im Niſtkörbchen nicht eine Spur von Baumaterial... Am folgenden Tag lag wieder ein ganzes Ei auf dem Boden, welches ich ſofort wegwarf, weil ich es für unbefruchtet hielt. Ich behaupte, ein Vogel, der nicht erſt baut, ſondern ſeine Eier auf den Käfigboden fallen läßt, bringt regelmäßig nur taube Eier an's Tageslicht (Ausnahmen mag's wohl geben), obgleich auch bei ſchönſtem Neſtbau unbefruchtete Eier ſattſam vorkommen.

Ich hoffte und hoffte bis Ende Juni auf neue Ergebniſſe, allein, Hoffen und Harren war leider umſonſt. Auch das zweite Pärchen war und blieb neſt-, eier- und kinderlos, bis endlich anfangs Juli ein Händler kam und mich von beiden Pärchen befreite.

Erlebe ich noch einen Frühling, dann will ich es nochmals mit zwei Pärchen Wildfängen, welche kräftiger, feuriger und hitziger als aufgepäppelte Männchen und Weibchen ſein dürften, verſuchen. Gelingt's wieder nicht, dann verzichte ich bei längerem Leben gänzlich auf alle und jede Dompfaff-Züchtungsverſuche im Zimmer.

Mit meinen jung aufgezogenen Pfäfflein zum Anlernen iſt's ja etwas beſſer, doch auch lange noch nicht nach Wunſch gegangen. Ich habe im Laufe des Frühlings und Sommers vier bis fünf Neſter voll junger Dompfaffen aufgefüttert, darunter ungefähr ein Drittel Weibchen, aber nur drei Männchen bis jetzt lebend er- und behalten. — Ein ausgewachſenes Männchen verſandte ich nach Straßburg i. E., und fünf behielt ich für mich, wovon mir die zwei ſchönſten und größten nach ungefähr ſechs Wochen an Krämpfen (nicht Kalkdurchfall) eingingen. Ich glaube, ich habe die Thierchen zu gut und kräftig von klein auf gefüttert; die eingegangenen waren ſchon zu maſtig (halbfett). Die Neſtjungen ſperren ja faſt bis zum Zerplatzen, wenn man ihnen nach Wunſch reicht.

So habe ich denn für dies Jahr im Ganzen nur drei junge Dompfaff-Männchen und ein Weibchen in Abrichtung. In meiner jetzigen neuen Wohnung (Hauptſtraße 22) ſtehen mir aber mindeſtens ſechs Räume zur Verfügung, wohinein ich die einzelnen Vögel hängen könnte, damit keiner den anderen hört, ſtört und irre macht, wenn ich ſo viele hätte. So muß ich die angebotenen Kammern für d. J. unbenutzt laſſen.

Von meiner Kanarienzucht, von der ich am liebſten ganz ſchwiege, will ich nur in einigen Aphorismen ſchreiben. Zwei ſchöne junge Weibchen bauten prächtig, legten zuſammen fünf Gelege zu vier bis fünf Eiern und brachten leider auch nicht ein Junges zur Welt. Iſt das nicht ſcheußliches Pech?! Da ich annahm, mein urſprünglicher ſchöner Hahn tauge nicht in die Hecke, ſo beſchaffte ich mir leihweiſe einen zweiten, ſpäter einen dritten und vierten Hahn, aber es gab auch von dieſen Hähnen weder Eier noch Junge, da Männchen wie Weibchen ſchon frühzeitig anfingen ſchwach zu mauſern. — Sollte ich im Winter und Frühling vielleicht auch zu kräftig gefüttert haben? Jetzt bekommen zwei neue Kanarien-Weibchen nur blanken Sommerrübſen. Doch, nun genug meiner ornithologiſchen Jeremiade!

Rückblick.

Ueberall rüſtet man ſich, den bevorſtehenden Jahres- nicht bloß, ſondern den Jahrhundertwechſel feſtlich zu begehen. Auch wir dürfen nicht gleichgültig daran vorübereilen. Zwar — Natur und Menſchenleben gehen ihren geregelten, von Nothwendigkeit und Zufall beſtimmten Gang ohne Rückſicht auf den Wechſel in Jahreszahlen und Monatsnamen; aber der Menſch, welcher in bürgerlichem Ordnungsſinn Tage und Jahre zählt und benennt, liebt es, in dem, was er ſelbſt willkürlich feſtſetzte, eine Rückwirkung auf das eigene Geſchick und die Verhältniſſe anderer anzunehmen. Wer Zahlengeheimniſſen hold iſt, mag in dem Wechſel des Herausgebers, welcher gerade mit dem Jahre 1900 antritt, etwas Vorbedeutendes ſehen.

Wir wenden den Blick zurück und ſehen, wie das Jahr 1899 der „Gefiederten Welt" zwei erleſene Männer nimmt, Karl Ruß Vater und Karl Ruß Sohn, den Herausgeber und den ſelbſtlos thätigen Mitredakteur.

Allein wir blicken weiter zurück, über das Jahrhundert hinweg, an deſſen Ausgang wir ſtehen. Da ſehen wir, wie das Jahr 1794 die erſte Blüte der deutſchen Stubenvogel-Litteratur zeitigt, Bechſtein's Naturgeſchichte der Stubenvögel, wie das Jahr 1799 die 2. Auflage dieſes bedeutſamen Werkes bringt, und damit den Beweis für das zeitgemäße Beſtreben des „alten Bechſtein". Noch dreimal wurde ſein Buch aufgelegt, zuletzt i. J. 1870, alſo um eine Zeit, wo Ruß eben anfing, auf dieſem Gebiete hervorzutreten, wo er ſein „Handbuch für Vogelliebhaber" vorbereitete, deſſen 4. Auflage im nächſten Jahr erſcheinen wird. Welch ein Weg von Bechſteins „Naturgeſchichte" bis zur 3. oder 4. Auflage von Ruß' „Handbuch"! Wahrhaftig kein Königsweg, ſondern ein mühſames, langſames Weiterſchreiten Schritt vor Schritt, im Geiſte der naturwiſſenſchaftlichen Einzelforſchung und peinlichen Einzelbeobachtung unſeres 19. Jahrhunderts! Ein Fortſchreiten, das nicht zum wenigſten ſeit nun faſt einem Menſchenalter gerade in dieſer Zeitſchrift, der „Gefiederten Welt", bewirkt und verfolgt worden iſt! Und doch weiß jeder Kenner und jeder gut unterrichtete Liebhaber, daß noch viel zu thun, daß das Ziel noch lange nicht erreicht iſt. Wer will ſagen, ob dem Menſchen überhaupt mehr als eine Annäherung verſtattet iſt? Gleichviel! Im vernünftigen Streben liegt der Reiz des Lebens, und in reger Arbeit iſt die rechte Ruhe des Geiſtes und der Seele begründet. Wir wünſchen der „Gefiederten Welt" dies bisher ſtets bekundete eifrige Streben ihrer Mitarbeiter und dies bisher immer friſch erhaltene, aus geiſtiger Mitarbeit erwachſene Intereſſe ihrer Leſer wie für das folgende, ſo für alle weiteren Jahre ihres Beſtehens, damit der Name ihres Begründers als hellleuchtender Schild nur Treffliches ankündige. In dieſem Sinne auch wünſchen wir allen Abonnenten der „Gefiederten"

ein frohes neues Jahr! D. L.

Zu unſerm Bilde.

Ein vorzüglicher Sprecher iſt die große gelbköpfige Amazone oder der doppelte Gelbkopf (Psittacus Levaillanti, *Gr.*). Er hat eine bedeutende Faſſungsgabe, die ihn vorgeſagte Worte bald und ſtets ſehr deutlich nachſprechen läßt. Im Gegenſatz dazu gibt es auch unter den Angehörigen dieſer Art einzelne, die durchaus nichts lernen wollen, doch iſt wiederum mehrfach beobachtet worden, daß ſolch unbegabter Vogel noch nach vielen Jahren ein guter Sprecher wurde.

Der doppelte Gelbkopf iſt an Stirn und Gegend um den Schnabel weißgelb, am übrigen Kopf, Nacken und Hals ſchwefelgelb; Flügelbug, Spiegelfleck im Flügel und Grundhälfte der Innenfahne an den vier äußerſten Schwanzfedern lebhaft ſcharlachroth; Schwingen am Ende der Außenfahne blau; ganze Oberſeite dunkel, Unterſeite heller grün, überall ohne dunkle Federnſäume; Schenkelgegend gelb; Schnabel gelblichweiß, Wachshaut faſt reinweiß; Augen gelbbraun bis braunroth, um die Pupille ein gelber oder grauer Ring; nackter Augenkreis bläulichweiß, manchmal gelbgrau; Füße weißblau, Krallen grau. Geſchlechtsunterſchiede ſind nicht bekannt. Das Jugendkleid iſt nur an Stirn, Oberkopf und Kopfſeiten gelb; die rothen Abzeichen ſind hell und matt. Nahezu Rabengröße (Länge 38 bis 44 cm; Flügel 21 bis 23,5 cm; Schwanz 11 bis 14 cm).

Heimiſch iſt er in Südmexiko und Honduras; unter den Amazonenpapageien wird er am weiteſten nach dem Norden hinauf gefunden. Wie bei uns iſt er auch dort als Stubenvogel ſehr geſchätzt, und darum ſteht er höher im Preiſe als alle Verwandten. Nach der Ankunft zeigt er ſich weichlich und bedarf großer Fürſorge, eingewöhnt aber gehört er zu den ausdauerndſten aller Papageien. D. L.

Verantwortlich für die Schriftleitung und für den Anzeigentheil: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von Auguſt Hopfer in Burg b. M.

Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten



Fängisch gestellt. Zugeschlagen.

ist mein selbstthätig sicher fangendes **Schlagnetz** m. Doppelfeder. Beschäd. beim Fang unmöglich, fast täglich Anerkennungsschreiben. 30 cm br. f. kleine u. grössere Vögel 1.50 ℳ, 50 cm br. f. Fasanen, Rebhühner, Krähen etc. 3 ℳ, 75 cm br. m. Abzugvorr. z. Massenfang f. Sperlinge etc. 5 ℳ pr. St. geg. Nachnahme. [2399]

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggeräthe,
Schlotheim i. Th.

Engliſche Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten
echten Kayenne-Pfeffer,
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt die [2400]
Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.
Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt. (Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos)

Hermann Schramm's
patentirte
Original-Hohl- und Klingelroller-Apparate,

ſind die höchſtprämirteſten, weltbekannteſten und **anerkannt beſten Geſangshilfsmittel für Kanarien.** Preisliſte gratis und franko durch [2401]

Hermann Schramm's Nachf.,
Dresden 12.

Neu! **Senſationell!**

Kanarien-Lehr-Orgeln,

auch mit Walze zum Ausrücken für jede Vogelſtimme einzurichten, automatiſch, durch Uhrwerk getrieben, D. G. M. 108184, ohne Waſſer- und Luft-Keſſel, in elegantem Renaiſſance-Gehäuſe m. Reſonanzboden, empfiehlt [2402] **Edmund Schlewick, Zittau, Sachſen.**
Bitte Proſp. zu verlangen, mit ff. Ref. zu dienen.
Reparaturen aller Syſteme bzl. Verbeſſerungen werden ſchnell, billigſt und ſolid ausgeführt.

Geſangskäſten, [2403]

Geſangsſpinde, Harzer Vogelbauer, liefert (Prsl. fr.) **A. Bothe,** Weddersleben, Harz.

Futtermittel.

Neue 1899er Tyroler Ameiſeneier,
hochfein, weiß und rein, à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk.

Neuer 99er Elbe-Weißwurm
à Ko. 4 Mk., à Ltr. 85 Pf., 10 Ltr. 8 Mk. [2404]

Zeke (Muska)
à Ko. 2½, 5 Ko. 12, 10 Ko. 22 Mk.

J. O. Rohleder
Leipzig-Gohlis
Vogelfutter-Groß-Handlung.

Vogelfutter,

nur feinſte, gereinigte Ware.

Sommerrübſen,	1 Ko.	40 ₰,	5 Ko.	1.80 ℳ
Glanzkorn,	„ „	40	„ „ „	1.60 „
Hanfſat,	„ „	40	„ „ „	1 80 „
Hafer, geſchälter,	„ „	40	„ „ „	1 80 „
Hirſe, weiße,	„ „	50	„ „ „	1.80 „
do. algeriſche,	„ „	50	„ „ „	2.— „
do. Senegal,	„ „	60	„ „ „	2.30 „
do. ind. (Mohar),	„ „	35	„ „ „	1.60 „
Silberhirſe,	„ „	50	„ „ „	2.10 „
Mohn, blauer,	„ „	70	„ „ „	3.25 „
Kürbiskerne,	„ „	70	„ „ „	3.— „
Sonnenbl., weiß,	„ „	50	„ „ „	1.70 „
Reis in Hülſen,	½ „	25	„ „ „	2.25 „
Zirbelnüſſe,	1 „	100	„ „ „	4.— „
Erdnüſſe,	„ „	70	„ „ „	3.— „
Ossa Sepia,	100 Stck.	3,50 ℳ.		
Carottengries,	1 Ko.	1.10 ℳ,	5 Ko.	4.50 „
Droſſelfutter,	„ „	1.—	„ „ „	4.— „
Nachtigalfutter,	„ „	2.—	„ „ „	7.— „
Ameiſeneier,	„ Ltr.	0.85	„ 10 Ltr.	8.— „
Mehlwürmer,	1 Ltr.	4.50 ℳ,	1000 St.	1.40 „

Gemiſchtes Vogelfutter für alle körnerfreſſenden Vögel 5 Ko. 2 ℳ. Bei Aufträgen hierfür genügt Angabe der Vogelart, für die das Futter beſtimmt iſt. Ausführliche Preisl. umſonſt, Engros-Preisl. nur an Wiederverk.

H. P. Lange, Samenhandlung.
[2405] **Gottesberg i. Schleſ.**

Alle Vogelfutter,
Praktiſche Käfige und fremdländ. Vögel.
E. Schreiber, Leipzig, Königsplatz 7.

Beſte Bezugsquelle in dieſer Branche. Reelle Bedienung. Preisliſten umſonſt. [2406

Ameiſeneier,

1899er hochprima, ſorgfältigſt gereinigt, goldgelbe Ware, 1 Liter mit 90 ₰.

Weisswurm,

getrocknete Eintagsfliege, 1 Liter mit 80 ₰.

Mehlwurm,

ausgeſiebt große Futterware, rein gemeſſen, 1 Liter mit 5,50 ℳ, liefert [2407]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, **Prag 411, I.**

Präpar. Eigelb,

garantirt rein, à Ko. 3½, 5 Ko. 17.
Mehlwürmer, rein und groß, à Ltr 4½, à Ko. 8½.
Bisquit u. **Eierbrot,** beſt. Qualit. à Ko. 3.
Univerſalfutter, unübertroffen, 5 Ko. franko 5, à Ko. 1.
Sommerrübſ., 99er, Poſtſack 2 ℳ, 50 Ko. 16.

Glanzſat	Poſtſack	5	Ko.	no.	1,60
Hanfſat	„	„	„	„	1,60
Hafer geſchält	„	„	„	„	2,25
Mohn blau	„	„	„	„	3,25
Hirſe weiß Pa.	„	„	„	„	2,20
do. Senegal	„	„	„	„	2,25
do. do. i. Kolb.	„	„	„	„	5,—
do. algeriſche	„	„	„	„	2,
do. indiſche	„	„	„	„	1,75
Sonnenblumen	„	„	„	„	2,
Kürbiskerne	„	„	„	„	3,25
Reis i. Hülſen	„	„	„	„	2,25
Zirbelnüſſe	„	„	„	„	3,50

Ossa Sepia (Fiſchſchuppe) 100 St. 3½, Dtz. 45 ₰. [2408]
Prachtfinken-, Kardinal-, Sittich-, Papageien- und Waldvogelfutter Poſtſack 5 Ko. no. 2,—
Ausführl. Preisliſten ſämmtl. Vogelfutterarten gratis und poſtfrei.

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis,
Vogelfutter-Großhandlung.

Ameiſeneier,

hochprima deutſche ſandfreie Ware, per Kilo 4,60 ℳ, p. 5 Kilo 22 50 ℳ, p. Liter 90 ₰. **Miſchfutter für Inſektenfreſſer** per Kilo 1,20 ℳ. **Sommerrübſen I, ſüß,** hochfeine Qual., per 50 Kilo 17 ℳ, per 5 Kilo 2,20 ℳ **Weiße Hirſe,** extrafeine Qual., p. 50 Kilo 20 ℳ, p. 5 Kilo 2,50 ℳ, empfiehlt **Carl Kämpf,** Mainz. [2409]

Mehlwürmer, r., jed. Poſt., Ltr. 3,80 ℳ. Pfd. 2,90 ℳ. **Jeitner, Breslau,** Weinſtr. 12. [2410

Ameiseneier:

Extra Qualität,	5 Ko.	17 ℳ,	1 Ko.	3.80 ℳ
Handelsware,	„ „	13	„ „ „	3.— „
Sommerrübſ. Ia.,	50 „	15	„ 5 „	2.— „
Hafer, geſchälter,	„ „	15	„ „ „	2.— „
Sonnenblumenkerne, f. weiße,	„ „	14½	„ „ „	2.— „
Mohn, blauer,	„ „	28	„ „ „	3.30 „
Diſtelſamen,	„ „	16	„ „ „	2.— „

Zeke, loſe u. abgepackt, für 10 u. 25 ₰-Verkauf, ſowie ſämmtl. Vogelfutter billigſt.

C. Hecker,
[2411] **Friedrichsdorf** am Taunus.

Univerſalfutter

für alle feineren in- und ausländiſchen inſekten- und kerbthierfreſſenden Vögel pro Kilo 2 ℳ. Desgl. für alle Droſſelarten pro Kilo 1 ℳ. Dasſelbe bedarf keiner Beimiſchung und iſt 70 mal mit 1. und Ehrenpreiſen, ſowie mit der ſilbernen und bronzenen Stats- und ſilbernen Stadtmedaille prämirt. Ia doppelt gereinigte Ameiſeneier per Kilo 3,40 ℳ, per 5 Kilo 16 ℳ. I dito per Kilo 3,00 ℳ, per 5 Kilo 14 ℳ in Poſtpaketen franko, garantirt ſandfrei. [2412]
Muſter u. Gebrauchsanw. gratis u. franko.

J. E. Bertrand, Aachen (Rheinl.)
Vogel- und Hundefutterhandlung.
Spezialität: Univerſalfutterfab. m. Dampfbetr.

Mehlwürmer, vegetab. gef. hochfeine Ware, ganz rein, empfiehlt à Lt. 4,25 ℳ, Kilo 7,75 ℳ einſchl. Verpackung. 1000 Stück franko gegen Einſendung von 1,40 ℳ. **Ameiſeneier,** hochprima 99er, Liter 90 ₰. [2413]

Louis Conrad, Elberfeld, Oſtſtr. 45.

Für Vogelfreunde u. Züchter.

Für Vogelhandlungen.

Vogelkäfige für Körner- und Weichfreſſer, **Papageikäfige, Eichhornkäfige, Zuchtutenſilien,** alles ganz aus Metall, in ſehr ſolider, zweckmäßiger Weiſe hergeſtellt, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Th. Kapff Nachf.,
Ludwigsburg.

Ill. Katalog gratis u. franko. Streng reelle Bedienung. [2414]

Universalfutter.

Vor dem Kennerauge kann eine **Universalfutter-Mischung ohne Zeke** nicht mehr als vollwerthig bestehen.

Einige Jahre fehlte dieses Produkt vollständig am Vogelfuttermarkt, und mancher Liebhaber hätte gern 10 Mk. für ein Kilo bezahlt, wenn er es hätte bekommen können.

Zeke ist **jetzt wieder** überall **gut** und **billig** zu haben.

Man verlange ausdrücklich **„Zeke, Marke Amsel“.** [2415]

Ameiſeneier,

1899er Ia geſiebte, ſandfreie Ware,	per	Kilo	ℳ 3,50
Weißwurm, prima	„	Liter	„ 1,—
Muska	„	„	„ 0,90
Univerſalfutter, extra	„	Kilo	„ 1,20
Mohnmehl, weiß	„	„	„ 0,60
Sonnenblumenk., weiße	„	„	„ 0,60
Reis in Hülſen	„	„	„ 0,60
Ossa sepia, prima	„	„	„ 3,—
Sommerrübſen, Ia großkern. ſüß			„ 0,44

Ferner Mohar-, Senegal-, Kolben-, weiße **Hirſen, Mohn** und alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [2416]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Rheiniſches
Univerſal-Miſchfutter

für inländiſche und ausländiſche
inſektenfreſſende Singvögel
von Apotheker **Max Kruel.**

Mehrfach prämirt! Höchſte Auszeichnungen!

[2417] Allein angefertigt von

Ernst Hanke, Trier, Moſel.

Muſter und Proſpekte koſtenlos.

Mehlwürmer,

à Ltr. 4 ℳ inkl. Verp.

Bei Einſendung von 1,50 ℳ = 140 gr., alſo **weit über 1000 Stück,** frk. inkl. Verp.

[2418] **P. Bartsch, Breslau,** Flurſtr. 6.

Univerſal-S. [2419]

Röbbeckes prämirte **Univerſalfutter-Spezialitäten** ſind die beſten für alle inſektenfreſſende Vögel.

Qual. Extra, à Ko. 2,60 ℳ
„ Prima, à Ko. 2,— ℳ
„ Sekunda, à Ko. 1,— ℳ
in 1/2 u. 1/1 Pfd.-Packet.

1899er Ameiſeneier 1899er, hochprima Qual., das Feinſte, was es gibt, vollſtändig rein und ſtaubfrei, à Ko. 4 ℳ, 5 Ko. 18 ℳ, **Ameiſeneier,** naturell, à Ko. 2,20, ſtaubfrei 2,60 ℳ, offerirt

Otto Röbbecke, Meerane, Sa., II,
Sämerei- u. Vogelfutter-Handlg., gegr. 1854.

Vögel.

Schwarzplättchen,

lautſingende Exemplare, Stck. 4 ℳ, Rothkehlchen, laute Wipfelſänger, Stck. 3 ℳ, do., leiſe ſingend, Stck. 1,50 ℳ, prima Grau- u. Schwarzdroſſeln, im Geſang, Stck. 8 ℳ, Sonnenvögel, Stck. 6 ℳ, ſchlagende Edelfinken, Stck. 3 ℳ, gewöhnliche, Stck. 1,50 ℳ, ſingende Zeiſige, Stck. 1,50 ℳ, jung. Hänflinge u. Stieglitze, Stck. 2 ℳ, Grün- u. Bergfinken, Goldammern, Stck. 1 ℳ, Berghänflinge, Stck. 1,50 ℳ, Braunköpfe u. Grauammern, Stck. 3 ℳ, Goldhähnchen P. 6 ℳ, Schwanzmeiſen P. 4 ℳ, Blaumeiſen P. 2 ℳ, Kohlmeiſen P. 1 ℳ, Dompfaffen P. 5 ℳ, do., ~~liederpfeif. Stck. 40 ℳ,~~ Kanarienedelroller, Stck. 5—20 ℳ, Papageien u. Exoten in Auswahl. Pa. Ameiſeneier, Ltr. 90 ₰, Mehlwürmer, Pfd. 4 ℳ liefert reell **W. Hiltmann,**

[2420] **Berlin S.,** Dresdenerſtr. 23.

Paſſende Weihnachtsgeſchenke.
Edle Kanarien-Hähne

offerire zu 6, 8 u. 10 ℳ, gute Mittelvögel zu 5 ℳ. Gar. für leb. u. geſ. Ankunft. Verſ. geg. Nachn., 5 Tage auf Probe.

K. Krausmüller, Vogelhdlg.,
[2421] **Zell b. Alsfeld** (Heſſen).

Habe noch abzugeben:

6 Par ſchöne u. gut geparte **Norwich,** à Par 13 und 14 ℳ, 4 Stück kleinere **Yorkſhires,** à 4 ℳ, 7 Stück **Stieglitz-Hänfling-Zeiſig-** u. **Kanarien-Kreuzungen,** ſchöne, gehaubte Vögel, 2—5 ℳ. Porto u. Emball. extra, Vorauszahlung. Bei Anfragen bitte Poſtkarten mit Rückantwort zu benutzen. [2422]

Charles Backe,
Nordre Frihavns Vej 86, **Kopenhagen ø.**

Kanarienvögel

von 8—35 ℳ, Preisliſte frei, verſendet
[2423] **Wilh. Schick, St. Andreasberg.**

Halt!

Die **Vogelzüchterei** von [2424]

L. G. Müller, Nordhauſen a. Harz

verſendet **koſtenfrei** die Preisliſte, ſowie hochfeine Anerkennungen über gutgelieferte

ff. Harzer Kanarienvögel.

Letztere verſ. 14 Tage auf Probe überallhin.

Geſunde Stiglitze

à 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, **Rothhänflinge** à 1 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, **Zeiſige u. Buchfinken** à 90 ₰, Dtzd. 7,50 ℳ, **Grünhänflinge u. Tannenmeiſen,** à 70 ₰, Dtzd. 6 ℳ, Weibchen die Hälfte. Garantie lebender Ankunft. [2425]

Gebr. Mergler, Vogelexport,
Hoffſtetten b. Gemünden a. M. (Bayern).

Eine hellſchlag. Nachtigal,

prima Sänger, 14 ℳ. Gar. für lebende Ankunft. **F. Wagner,**

[2426] **Würzburg,** Domerſchulg. 17.

1 echt. reinſchall. Reitzugſ. m. Schnapp, 1 hochf. Heidiſoh-Mönch m. laut. rein. Vorgeſ. u. 1 ſ tief org. G.-Grasmücke, 1 Gelb- u. 1 Sumpfſpötter billig. Alles 98er Wildfg. [2427]

Markert, Scheibenberg (Erzgebirge).

Vogelfutter

in allen Sorten, für alle inländiſchen und ausländiſchen körner- und inſektenfreſſende Vögel, in allerfeinſter, ſtets friſcher Ware, beſonders **Ameiſeneier,** handverleſene ganz reine, **Eintagsfliegen** (Weißwurm), **Muska** oder **Zeke** (überſeeiſche Fliege), **Mehlwürmer** und **Univerſalfutter-Miſchungen** verſendet zu billigen Preiſen [2428]

H. Wagner, Vogelfutter-Großhandlung,
Erfurt, Futterſtraße 3.

Preisliſte auf Wunſch umſonſt und portofrei.

R. Buhl, Hirſchfelde i. Sachſen

Größtes Etabliſſement für Kanarienzüchterei.

Permanenter Verſandt vorzügl. **Vorſänger** in gediegenen Hohl-, Klingel- u. Schockelrollen, Knorren, tiefen Pfeifen u. Flöten; das Beſte, was exiſtirt. Jahrzehnte rein durchgezüchtete Stämme. Preiſe à 8, 10, 12, 15, 20, 25—30 ℳ. Garantie für vorzügliche Sänger und geſunde Ankunft. Prämirt mit goldenen u. ſilbernen Medaillen. Kataloge gratis u. franko. [2429]

Kanarien.

Von meinem ſehr tiefgehenden tourenreichen Hohlrollerſtamm m. g. Knorren, Klingeln, tiefen Pfeifen ꝛc. verſende unter Garantie des Werthes à 10—50 ℳ. Weibchen desſelben Stammes 2 ℳ. Für Wiederverkäufer ſehr empfehlenswerth, d. Dtz. Hähne 72 bis 96 ℳ.

Parnde, Rentier,
[2430] **Hannover,** Alternſtraße.

NB. Meine Verkaufsvögel erhielten nachweislich 1898 u. 99 goldene und ſilberne Medaillen.

Bringen unſern Freunden und Abnehmern auch in dieſem Jahre unſere tieftourenreiche
Kanarien
in beſte Erinnerung. [2431]

Mathilde Erntges,
Robert Erntges,
Elberfeld.

ff. Harzer ◆ ◆ ◆ ◆ Kanarien,

ſeit 1869 eigene Zucht; die Vögel gehen in gebog. Hohlrollen, Hohlklingel, Klingelrolle, Knorre, tiefe Hohlpfeife; lang u. voll mit klangvollem tiefen Organ, p. St. 8—30 ℳ, nach Werth d. Geſanges. Verſandt p. Nachnahme; größere Poſten Dep. des Betrages. Garantie für geſundes Eintreffen. Nicht Konv. nach 8 Tagen zurück. Verpackung frei. **Eduard Zacharias,**

[2432] Ermsleben a. Harz.

Ausgezeichnete Harzer **Kanarienſänger,** hat preiswerth abzugeben. **Alle Artikel** für den Kanarienzüchter. Preisl. franco. [2433]

C. G. Vodel, Leipzig, Pfaffendorferſtr. 16.

Weg. Aufg. d. Liebh. verk.: 22 St. hochf. Salonkäfige, zieml. neu, fü Sproſſer u. Droſſeln u. a. v. 1—6 ℳ, u. ſämmtl. hochf. Inſektenvögel billig. Off. sub. **A. M.** bef. die Exped. [2434]

Der heutigen Nummer liegt das vollſtändige Inhalts-Verzeichniß des laufenden Jahrgangs der „Gefiederten Welt“ bei.

Verlag der Creutz'ſchen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck von August Hopfer in Burg b. M.

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 04253 9083

Digitized by Google